

ADDITIONS

AU

Catalogue des Coléoptères de Belgique

PAR

RAYMOND DE RUETTE

Carabus auronitens F.

La Roche, 19-IV-31 et Maboge, 14-IV-31. En grand nombre sous les pierres.

Plusieurs auteurs considèrent cette espèce comme étant rare en Haute-Belgique, mais on la trouve en grand nombre dans la vallée de la Haute-Ourthe.

Leistus piceus FRÖL.

Orval, 26-V-33, 1 ex. en tamisant des feuilles mortes.

Notiophilus hypocrita PUTZ. Belg. nov. sp.

Hérenthals, 12-V-32, 1 ex.

Cette espèce est très voisine de *N. palustris*, mais elle s'en distingue aisément par les interstries des élytres qui sont chagrinés chez *hypocrita*, tandis qu'ils sont lisses et luisants chez *palustris*.

Bembidium brunnicornis STRM.

Orval, 31-VIII-32 et 27-V-33, 9 ex.

Bembidium Stephensi CROT.

Orval, 31-VIII-32 et 27-V-33, 10 ex.

La Roche, 6-VIII-31, 1 ex.

Bembidium concinnum STEPH.

Anvers, 30-V-1935, 2 ex. le long de l'Escaut.

Bembidium rupestre L.

Hofstade, 2-VIII-31, 6 ex.

Hérenthals, 11-V-32, 1 ex.

Anvers, 10-VI-35, 2 ex.

Bembidium gilvipes STRM.

Eppeghem, 11-XI-34, 10 ex.

Tachys bistriatus DFTS.

Anvers, 30-V-35, 1 ex.

Agonum livens GYLL.

Eppeghem, 11-XI-34, 1 ex.

Pterostichus interstinctus STRM.

Natoye, 7-IV-35, 1 ex.

Amara montivaga STRM.

Hives (La Roche), 19-V-34, 1 ex.

Amara eurynota PANZ.

Natoye, 20-III-35, 6 ex.

Amara convexior STEPH.

Hives (La Roche), 20-IV-31, 2 ex.

Hérenthals, 11-V-32, 1 ex.

Orval, 15-VI-35, 1 ex.

Pseudophonus griseus PANZ.

Saint Servais, 17-VIII-33, 1 ex.

Harpalus politus DEJ.

Heusden, 21-VII-31, 1 ex.

Stenolophus skrimshirani STEPH.

Eppeghem, 11-XI-34, 6 ex.

Anvers, 10-VI-35, 1 ex.

Masoreus Wetterhali GYLL.

Uccle, 5-VII-33, 1 ex.

Demetrias imperialis GERM.

Lierre, inondations, 18-I-34, dans des détritiques, 1 ex.

Anvers, 30-V-35 et 10-VI-35, en nombre le long de l'Escaut.

Hydrovatus cuspidatus KUNZE.

Anvers, 30-V-35, 1 ex.

Hygrotus decoratus GYLL.

Hérenthals, 10-V-32, 1 ex.

Caelambus confluens E.

Anvers, 10-VI-35, 5 ex.

Deronectes canaliculatus LAC.

Hérenthals, 26-V-35, 3 ex.

Anvers, 10-VI-35, 14 ex. en raclant le fond d'une petite mare à fond sablonneux.

Deronectes halensis F.

Anvers, 10-VI-35, 2 ex. dans la même mare que les précédents.

- Hydroporus Duftschmidti* RYE.
Hérentals, 10-V-32, 6 ex.
- Hydroporus melanarius* STRM.
Hérentals, 10-V-32, 1 ex.
- Hydroporus discretus* FAIRM.
Hérentals, 10-V-32, 1 ex.
- Laccophilus variegatus* GERM.
Anvers, 10-VI-35, 1 ex.
- Agabus affinis* PAYK.
Hérentals, 10-V-32, 4 ex.
- Rhantus bistriatus* ER.
Hérentals, 10-V-32, 3 ex.
- Encephalus complicans* WESTW.
Bois de la Cambre, 29-XI-33, en tamisant.
- Conosoma bipunctatum* GRAV.
Uccle, 13-II-34, 1 ex. sous l'écorce d'un vieux saule.
- Bryoporus analis* PAYK.
Heysel, III-35, 1 ex.
- Philonthus punctus* GRAV.
Anvers, 10-VI-35, 2 ex., au bord d'une petite mare.
- Gauropterus fulgidus* F.
Heysel, du 4 au 15-III-35, 14 ex.
- Oxyporus maxillosus* F.
Orval, 27-V-33, 1 ex., sur des moisissures d'une vieille souche d'arbre.
- Coryphium angusticollis* STEPH.
Itterbeek, 2-III-35, 2 ex., sous des écorces.
- Biblopectus ambiguus* REICH.
Lierre, 18-I-34, en grand nombre dans des détritux d'inondations.
- Agathidium badius* ER.
Orval, 26-V-33.
- Choleva Reitteri* PETRI, Belg. nov. sp.**
Bois de la Cambre, 1-IX-31, 1 ex., en tamisant des herbes sèches.
- Choleva angustata* F.
Uccle, 24-V-31, 2 ex.
Vlesenbeek, 27-IX-31, 1 ex.
- Choleva elongata* PAYK.
Uccle, 11-X-31, 1 ex.
Vlesenbeek, 11-32, 1 ex.

- Ces 3 espèces de *Choleva* ont été déterminées par M. VAN DER WIEL, d'Amsterdam.
- Necrodes litoralis* L.
Orval, 28-VIII-33, 1 ex., sur le cadavre d'un chat.
- Liodes calcarata* ER.
Orval, 28-V-33, 1 ex. en fauchant.
- Saprinus rugifrons* PAYK.
Uccle, 24-V-31, 1 ex.
- Onthophilus sulcatus* F.
Orval, 1-IV-34, 1 ex. dans un crottin de mouton.
- Amphotis marginata* F.
Hérentals, 26-V-35, 1 ex. au vol.
- Nitidula rufipes* L.
Anvers, 10-VI-35, 5 ex., sur un morceau de viande desséchée, le long de l'Escaut.
- Orthocerus clavicornis* L.
Uccle, 24-V-31, 1 ex., courant sur le sable.
- Lycoperdina bovistae* F.
Quatre-Bras, 31-III-35, 2 ex., dans une vesse de loup.
- Necrobia rufipes* DE G.
Anvers, 10-VI-35, 1 ex., sur le même morceau de viande que les *Nitidula*.
- Ernobius nigrinus* STRM.
Hérentals, 25-V-35, 1 ex.
- Cantharis sudetica* LETZN.
Orval, 27-V-33, 1 ex.
- Cantharis livida* var. *rufipes* HRBST.
Orval, 29-V-33 et 15-VI-35.
- Oedemara tristis* SCHMIDT.
Hives, (La Roche), 14-VI-35, 1 ♂ et 2 ♀.
- Hargium inquisitor* L.
Orval, 23-II-34, en grand nombre sous l'écorce de vieilles souches de sapins.
- Rhagium bifasciatum* F.
Samrée (La Roche), 11-VI-35, 1 ex., dans une scierie.
- Leptura scutellata* F.
Forêt de Soignes (Groenendael), 1 ex. sur *Spirea ulmaria*, 8-VIII-34.
- Leptura revestita* L.
Orval, 27-V-33, 1 ex., au vol.

Tetropium castaneum L.

Orval, 15-VI-35, 1 ex., sur une souche de sapin fraîchement abattu.

Tropideres niveirostris F.

Orval, 27-V-33, 1 ex.

Tropiphorus carinatus MULL.

Orval, 29-V-33, 1 ex.

Itterbeek, 2-III-35, 1 ex., sous une pierre.

Plinthus caliginosus F.

Orval, 29-V-33 et 15-VI-35.

Lixus bardanae F.

Orval, 27-V-33, sur un chardon.

Ips typographus L. Belg. nov. sp.

Orval, 27-V-33.

SECTION D'ENTOMOLOGIE APPLIQUÉE

Réunion mensuelle du 15 juin 1935

Présidence de M. A. COLLART, Membre de la Section.

— La séance est ouverte à 17 h. 10.

Excusés : MM. R. MAYNÉ et Ch. PYNAERT.

Correspondance. — Une firme étrangère fabriquant des insecticides propose d'adresser à la Section d'Entomologie appliquée des échantillons de ses produits afin d'en faire vérifier la valeur. Cette offre ne répondant pas au programme de la Section, a été déclinée.

Communications. — M. VAN DEN BRUEL présente des photographies et des échantillons d'épis de seigle attaqués par les *Thrips*, prélevés à Ruysselede le 28 mai 1935. Les épis atteints montrent la forme typique du dégât connu sous le nom de "Weissährigkeit" ou "blanchiment des épis". Les épillets avortés se localisent souvent à la base de l'épi, parfois aussi à sa partie apicale, d'autres fois encore en un endroit quelconque du rachis. Le dégât est plus ou moins grave, pouvant aller jusqu'à la destruction complète des organes floraux. Le champ observé est dévasté par une forte attaque d'*Anguillulina dipsaci* K., occasionnant au moins cinquante pour cent de diminution de rendement ; on peut évaluer à dix pour cent des épis restant le dommage dû aux *Thrips*. Les Thysanoptères récoltés dans les épis attaqués appartiennent à l'espèce *Limothrips cerealium* HALID. et non à celle de *L. denticornis* HALID. Cette dernière espèce est actuellement considérée pourtant comme la plus nuisible et plusieurs auteurs estiment même qu'elle est généralement responsable des dégâts attribués à *L. cerealium* HALID.