

- Apion dissimile* KIRBY. — Burght.
Apion difforme GERM. — Hastière.
Apion ononcola BACH. — Austruweel.
Apion affine KIRBY. — Hermeton.
Apion marchicum HERBST. — Calmpthout, Hamme, Schooten, Westmalle.
Apion violaceum KIRBY. — Santvliet, Schooten, Spa.
Apion Gyllenhalii KIRBY. — Virton.
Apion Spencei KIRBY. — Bornhem, Overmeire, Rencheux, Spa.
Apion vorax HERBST. — Austruweel, Hoboken.
Apion viciae PAYK. — Rencheux, Spa.
 ab. *Griesbachi* STEPH. — Rencheux, Spa.
Apion pisi F. — Virton.
Apion punctigerum PAYK. — Spa, Trois-Ponts.
Apion aethiops HERBST. — Hoboken, Santvliet.
Apion immune KIRBY. — Boitsfort.
Apion striatum KIRBY. — Arlon, Schilde, Virton.
Apion ervi KIRBY. — Arlon, Hermeton, Virton.
Apion ononis KIRBY. — Arlon, Blaimont, Doel, Hastière, Santvliet.
Apion virens HERBST. — Doel, Hastière, Rencheux, Spa.
Apion tenue KIRBY. — Hoboken, Virton.
Apion loti KIRBY. — Hamme, Schooten.
Apion colombinum GERM. — Virton.
Apion reflexum GYLL. — Arlon.
Rhynchites Mannerheimi HUM. — Calmpthout, Schooten.
Rhynchites interpunctatus STEPH. — Schooten.
Rhynchites cupreus DEG. — Calmpthout, Schooten, Wildert.
Diodyrhynchus austriacus OL. — Schilde.

ADDITIONS

AU

Catalogue des Coléoptères de Belgique

PAR

G. FAGEL ET F. GUILLEAUME

- Bembidion (Trepanes) octomaculatum* GOEZE. — Vilvorde, 13-5-1934, 6 ex. (G. FAGEL).
Trechus (Trechoblemus) micros HERBST. — Wemmel, 8-7-1935, 1 ex. (G. FAGEL).
Platynus (Agonum) lugens DFT. **Belg. nov. sp.** — Uccle (Vallon d'Engeland), 20-4-1935, 1 ex. (G. FAGEL).
P. (Agonum) viridicupreus austriacus FAB. — Meysse, 5-5-1935, 1 ex. (G. FAGEL).
Pterostichus (Steropus) aethiops PZ. — Elsenborn, 8-1931, 1 ex.
Ophonus (i. sp.) signaticornis DUFT. — Louvain, 7-1924, 1 ex. (G. FAGEL).
Harpalus (i. sp.) tenebricus DEJ. — Waulsort, 5-1926, 1 ex. (G. FAGEL).
Badister (i. sp.) unipustulatus BON. — Anvers (rive gauche), 10-6-1935, 1 ex. (G. FAGEL).
Dromius (i. sp.) meridionalis DEJ. **Belg. nov. sp.** — Anvers (rive gauche), 10-6-1935, 1 ex. (G. FAGEL).
 Cette espèce spéciale à l'Europe méridionale avait déjà été capturée en Hollande, dans les villes. Cette espèce ainsi que la précédente et la suivante, furent trouvées en tamisant les détritrus de la laisse de haute mer au pied de petites dunes.
D. (Dromiolus) nigriventris THOMS. — Anvers (rive gauche), 10-6-1935, 1 ex. (G. FAGEL).

Metabletus obscuroguttatus DFT. Belg. nov. sp. — Houx, 7-7-1935, 1 ex. (G. FAGEL).

Cette espèce déjà signalée de Hollande et de Rhénanie a été trouvée en battant les buissons, au sommet de la falaise de Houx, contre les ruines du Château de Poilvache.

Aleochara (Ceranota) ruficornis GRAV. — Houx, 7-7-1935, 1 ♀ (G. FAGEL).

A. (Polychara) fumata GRAV. — Uccle (Vallon d'Engeland), 13-4-1935, 1 ex. (G. FAGEL).

A. (P.) haemoptera KRAATZ. — Uccle St Job, 20-4-1935, 1 ex., Jette-St-Pierre, 1-5-1934, 1 ex. (G. FAGEL).

Microglossa pulla GYLL. — Uccle St-Job, 19-5-1929, 5 ex. dans la grande carrière, au pied de nids de *Cotyle riparia* LIN. (G. FAGEL).

Amarochara umbrosa ER. — Anvers (rive gauche), 10-6-1935, 1 ex., en tamisant (G. FAGEL).

Encephalus complicans WESTW. — Groenendael, 23-7-1935, 1 ex., en fauchant (G. FAGEL).

Philonthus pullus NORDM. — Forest, 12-3-1927, 1 ex., au vol (G. FAGEL).

P. ebeninus GRAV. — Forest, 14-6-1927 et 4-1935, 2 ♂♂, Uccle St-Job, 20-4-1935, 1 ♀ (G. FAGEL).

Baptolinus affinis PAYK. — Groenendael, 8-5-1927, 1 ex. (G. FAGEL).

Scopaeus minimus ER. — Meysse, 30-6-1935, 1 ex., sous une écorce (G. FAGEL).

Platystethus capito HEER. — Uccle St-Job, 20-4-1935, 1 ex., sur le sable (G. FAGEL).

Haploderus caelatus GRAV. — Uccle (Vallon d'Engeland), 16-3-1935, 1 ex. (G. FAGEL).

Catops morio FAB. — Houx (Poilvache), 7-7-1935, 1 ex., en fauchant (G. FAGEL).

Meligethes (Odontogethes) hebes ER. — Grande-Espinette, 11-5-1935, 1 ex. et Boitsfort, 23-7-35, 1 ex. (G. FAGEL).

Corticaria obscura BRIS. Belg. nov. sp. — Wellin, 12-7-1935, 1 ex., au tamis (F. GUILLEAUME).

Glischrochilus quadripustulatus LIN. — Jauchelette-lez-Jodoigne, 7-1926, en nombre, sur une plaie de chêne (G. FAGEL).

Atomaria Baranii BRIS. — Grande-Espinette, 11-5-1935, 1 ex. (G. FAGEL).

Tiresias serra FAB. — Meysse, 13-6-1935, 2 ex. sous l'écorce d'un *Populus*, au milieu de toiles d'Araignées, 2 larves au même endroit, le 30-6-1935 (G. FAGEL).

Agrilus aurichalceus REDT. Belg. nov. sp. — Houffalize, 10-6-1909, 1 ex. (F. GUILLEAUME); Genimont, 16-7-1935, 1 ex. (E. DERENNE).

Agrilus Roberti CHEVRLT. — Muno (Ardennes), 5-8-1935, quelques ex. (E. DERENNE).

Malthinus bilineatus KSWT. — Houx, 7-7-1935, 1 ex. (G. FAGEL).

Un exemplaire de cette belle espèce avait été trouvé l'an dernier, à Wellin, par M. F. GUILLEAUME, fait qui pouvait sembler accidentel. La capture d'un nouveau spécimen dans un endroit assez distant du premier et sans lien de communication, permet d'affirmer que cette espèce est bien indigène.

Cette forme n'étant pas décrite dans les "*Coleoptera Neerlandica*" d'EVERTS, ni dans la "*Fauna Germanica*" de REITTER, nous en donnons ci-dessous la description d'après la "*Monographie des Malthinides de l'Ancien Monde*" de KIESENWETTER, in l' "*Abeille*", XVI, 1878, 3^e série, IV :

" Très étroit, jaune. Tête un peu plus étroite et allongée que d'habitude, munie d'un col, fortement ponctuée-ridée, luisante, avec un court et large sillon à la base, noire, partie antérieure jusqu'au milieu des yeux, avec les parties buccales, jaune; yeux assez grands, renflés. Antennes courtes, atteignant à peine l'extrémité des élytres, menues, noires ou noirâtres, 1^{er} article jaune, 2^e article aussi long que le 3^e. Prothorax près de la moitié plus long que large, subparallèle, très légèrement arrondi sur les côtés; jaune, orné de deux bandes longitudinales noires, parallèles, assez larges, divisées par une ligne jaune, au milieu; ridé, un peu inégal, avec la trace d'un sillon longitudinal, un peu luisant, glabre. Elytres jaunâtres avec une teinte grise et l'extrémité jaune; finement et assez densément pubescents de gris, assez fortement, mais pas très profondément ponctués, points formant à la base des espèces de lignes sériales; ailes grises, dépassant les élytres de la moitié de leur longueur. Tout le dessous et les pattes jaunes.

" Très reconnaissable à la longueur et au dessin du prothorax, voisin des *fasciatus* et *glabellus*, il s'en distingue par la ponctuation irrégulière des élytres. Long. : 5-8 mm. France méridionale "

Metabletus obscuroguttatus DFT. Belg. nov. sp. — Houx, 7-7-1935, 1 ex. (G. FAGEL).

Cette espèce déjà signalée de Hollande et de Rhénanie a été trouvée en battant les buissons, au sommet de la falaise de Houx, contre les ruines du Château de Poilvache.

Aleochara (Ceranota) ruficornis GRAV. — Houx, 7-7-1935, 1 ♀ (G. FAGEL).

A. (Polychara) fumata GRAV. — Uccle (Vallon d'Engeland), 13-4-1935, 1 ex. (G. FAGEL).

A. (P.) haemoptera KRAATZ. — Uccle St Job, 20-4-1935, 1 ex., Jette-St-Pierre, 1-5-1934, 1 ex. (G. FAGEL).

Microglossa pulla GYLL. — Uccle St-Job, 19-5-1929, 5 ex. dans la grande carrière, au pied de nids de *Cotyle riparia* LIN. (G. FAGEL).

Amarochara umbrosa ER. — Anvers (rive gauche), 10-6-1935, 1 ex., en tamisant (G. FAGEL).

Encephalus complicans WESTW. — Groenendael, 23-7-1935, 1 ex., en fauchant (G. FAGEL).

Philonthus pullus NORDM. — Forest, 12-3-1927, 1 ex., au vol (G. FAGEL).

P. ebeninus GRAV. — Forest, 14-6-1927 et 4-1935, 2 ♂♂, Uccle St-Job, 20-4-1935, 1 ♀ (G. FAGEL).

Baptolinus affinis PAYK. — Groenendael, 8-5-1927, 1 ex. (G. FAGEL).

Scopaeus minimus ER. — Meysse, 30-6-1935, 1 ex., sous une écorce (G. FAGEL).

Platystethus capito HEER. — Uccle St-Job, 20-4-1935, 1 ex., sur le sable (G. FAGEL).

Haploderus caelatus GRAV. — Uccle (Vallon d'Engeland), 16-3-1935, 1 ex. (G. FAGEL).

Catops morio FAB. — Houx (Poilvache), 7-7-1935, 1 ex., en fauchant (G. FAGEL).

Meligethes (Odontogethes) hebes ER. — Grande-Espinette, 11-5-1935, 1 ex. et Boitsfort, 23-7-35, 1 ex. (G. FAGEL).

Corticaria obscura BRIS. Belg. nov. sp. — Wellin, 12-7-1935, 1 ex., au tamis (F. GUILLEAUME).

Glischrochilus quadripustulatus LIN. — Jauchelette-lez-Jodoigne, 7-1926, en nombre, sur une plaie de chêne (G. FAGEL).

Atomaria Baranii BRIS. — Grande-Espinette, 11-5-1935, 1 ex. (G. FAGEL).

Tiresias serra FAB. — Meysse, 13-6-1935, 2 ex. sous l'écorce d'un *Populus*, au milieu de toiles d'Araignées, 2 larves au même endroit, le 30-6-1935 (G. FAGEL).

Agrilus aurichalceus REDT. Belg. nov. sp. — Houffalize, 10-6-1909, 1 ex. (F. GUILLEAUME); Genimont, 16-7-1935, 1 ex. (E. DERENNE).

Agrilus Roberti CHEVRLT. — Muno (Ardenne), 5-8-1935, quelques ex. (E. DERENNE).

Malthinus bilineatus KSWT. — Houx, 7-7-1935, 1 ex. (G. FAGEL).

Un exemplaire de cette belle espèce avait été trouvé l'an dernier, à Wellin, par M. F. GUILLEAUME, fait qui pouvait sembler accidentel. La capture d'un nouveau spécimen dans un endroit assez distant du premier et sans lien de communication, permet d'affirmer que cette espèce est bien indigène.

Cette forme n'étant pas décrite dans les "*Coleoptera Neerlandica*" d'EVERTS, ni dans la "*Fauna Germanica*" de REITTER, nous en donnons ci-dessous la description d'après la "*Monographie des Malthinides de l'Ancien Monde*" de KIESENWETTER, in l' "*Abeille*", XVI, 1878, 3^e série, IV :

" Très étroit, jaune. Tête un peu plus étroite et allongée que d'habitude, munie d'un col, fortement ponctuée-ridée, luisante, avec un court et large sillon à la base, noire, partie antérieure jusqu'au milieu des yeux, avec les parties buccales, jaune; yeux assez grands, renflés. Antennes courtes, atteignant à peine l'extrémité des élytres, menues, noires ou noirâtres, 1^{er} article jaune, 2^e article aussi long que le 3^e. Prothorax près de la moitié plus long que large, subparallèle, très légèrement arrondi sur les côtés; jaune, orné de deux bandes longitudinales noires, parallèles, assez larges, divisées par une ligne jaune, au milieu; ridé, un peu inégal, avec la trace d'un sillon longitudinal, un peu luisant, glabre. Elytres jaunâtres avec une teinte grise et l'extrémité jaune; finement et assez densément pubescents de gris, assez fortement, mais pas très profondément ponctués, points formant à la base des espèces de lignes sériales; ailes grises, dépassant les élytres de la moitié de leur longueur. Tout le dessous et les pattes jaunes.

" Très reconnaissable à la longueur et au dessin du prothorax, voisin des *fasciatus* et *glabellus*, il s'en distingue par la ponctuation irrégulière des élytres. Long. : 5-8 mm. France méridionale "

- Necrobia ruficollis* FAB. — Wemmel, 7-7-1935, 1 ex. (G. FAGEL).
Bostrychus capucinus LIN. — Houx, 7-7-35, 4 ex. (post. mort.) sous l'écorce d'une souche de charme (G. FAGEL).
Hallomenus binotatus QUENS. — Forest, 16-6-1935, 1 ex. (G. FAGEL).
Cryptocephalus coryli FAB. — Suxy et Jamoigne, 7 et 8-1935, 1 ♂, 1 ♀ (E. DERENNE).
C. marginatus FAB. — Bierges, 30-5-1930, 2 ♀♀ (G. FAGEL).
C. nitidulus FAB. — Muno (Ardennes), 5-8-1935, 1 ex. (E. DERENNE).
Chrysomela orichalcea MÜLL. — Meysse, 13-6-1935, 2 ex. (G. FAGEL).
Melasoma (Microdera) lapponica LIN. — Rochefort, 30-7-35, 1 ex. (C. ROCHE in coll. FAGEL).
Dibolia Schillingi LETZ. **Belg. nov. sp.** — Rochefort, 30-7-1935, 3 ex., sur *Salvia officinalis* LIN., dans un jardin (C. ROCHE in coll. FAGEL).

Cette espèce, non prévue pour notre faune, existe en Allemagne, spécialement dans le Sud et l'Est.

Elle se reconnaît facilement, aux pattes antérieures entièrement jaunes, ainsi que les antennes, qui sont seulement faiblement rembrunies au sommet. Dessus brun bronzé, le pronotum et les élytres finement ou peu fortement ponctués, et quelque peu ridés entre les points, les élytres présentant des traces de rangées de points. Les pores frontaux sont aussi éloignés de la base des antennes que celles-ci entre elles. Long. : 3-3,5 mm.

- Bruchidius marginalis* FAB. **Belg. nov. sp.** — Orval, 19-7-1935, 1 ex. (E. DERENNE).
 Cette belle espèce connue de Rhénanie, Hanovre et du Nord de la France, vit dans les gousses de l'*Astragalus glycyphyllos* LIN.
Phyllobius (Pseudomylocerus) sinuatus FAB. — Houx, 7-7-1935, 1 ex. (G. FAGEL).
Cleonus trisulcatus HERBST. — Torgny-Lamorteau, 7-1935, 1 ex. (E. DERENNE).
Coniocleonus glaucus FAB. — Rixensart, 30-5-1930, 1 ex. (G. FAGEL).
Lixus punctiventris BOH. — Torgny, 12-8-1935, 1 ex. (E. DERENNE).
Dorytomus (Olamus) nebulosus GYLL. — Meysse, 13-6-35 et 30-6-35, 2 ex. (G. FAGEL).

- Magdalis violacea* LIN. — Suxy, 28-7-1935, 1 ex. (E. DERENNE).
Rhynchaenus avellanae DONOV. — Suxy, 27-7-1935, en nombre (E. DERENNE).
Sibinia viscaria LIN. — Suxy, 28-7-1935, 2 ex. (E. DERENNE).
Cleopus solani FAB. — Orval, 20-7-1935, en nombre (E. DERENNE).
Ceuthorrhynchus trimaculatus FAB. — Yvoir, 7-7-1935, 1 ex., le long de la route de Houx (G. FAGEL).
Crapontius epilobii PAYK. — Houx, 7-7-1935, 1 ex. (G. FAGEL).
Balaninus pellitus BOH. — Houx, 7-7-1935, 1 ex. (G. FAGEL).
Rhyncholus culinaris GERM. — Forest, 21-6-1935, 2 ex. (G. FAGEL).
Scolytus mali BECHST. — Wellin, 21-7-1935, 2 ex. (F. GUILLAUME).
Hylesinus oleiperda FAB. — Forêt de Soignes (Drève de Lorraine), 29-6-1935, 1 ex. (G. FAGEL).
Hylastinus trifolii MÜLL. — Wemmel, 5-5-1935, 1 ex. (G. FAGEL).
Ips typographus LIN. — Couvin, 7 ex. (VAN EENOOGHE in coll. G. FAGEL).