

Eucnemididae et *Elateridae* nouveaux

PAR

E. FLEUTIAUX

EUCNEMIDIDAE

Melasis OLIVIER, 1790

M. tenuistriata n. sp. — 8 1/4 mm. Allongé, cylindrique; noir opaque; pubescence noire, courte, peu abondante. Tête convexe, sillonnée au milieu, impressionnée en avant sur l'épistome; celui-ci non rétréci à la base, échancré au milieu en avant, obliquement tronqué latéralement; ponctuation assez forte, assez serrée. Antennes noires, n'atteignant pas la base du pronotum, graduellement pectinées à partir du 3^e article; sommet des rameaux garni de poils gris. Pronotum notablement moins long que large, un peu élargi en avant, convexe transversalement, très brusquement déclive à la base, sillonné au milieu en arrière; bord antérieur largement échancré en cercle; limites latéralement entières; ponctuation forte et rugueuse; angles antérieurs brièvement carénés en travers; angles postérieurs courts, épineux. Elytres longs, cylindriques, arrondis au sommet, très légèrement rugueux et très faiblement striés. Dessous noir; pubescence grise. Pattes noires; derniers articles des tarses ferrugineux.

Bornéo, Sarawak, Mont Dulit, sommet de l'Igok, 4000 pieds, Moss forest, octobre (B. M. HOBBY et A. W. MOORE). Un individu, Imperial Institute of Entomology, British Museum.

Diffère de *M. buprestoides* LINNÉ par le pronotum notablement moins long, moins rétréci en arrière, ponctuation moins grosse et plus serrée; élytres relativement plus longs, plus étroits, plus finement ponctués, très légèrement striés; interstries plans; antennes noires; pattes noires, moins fortement comprimées, derniers articles des tarses ferrugineux.

Hylotastes BONVOULOIR 1871-1875

H. Leyeri n. sp. — 11 mm. Étroit, cylindrique; opaque; pubescence peu apparente. Tête jaune, ornée de deux bandes noires courbes en dedans des yeux, plus larges sur le vertex, aboutissant à la base des antennes; ponctuation très fine et très serrée; yeux ovales dans le sens transversal; épistome peu rétréci à la base, à bord antérieur bianguleux, échancré au milieu. Antennes insérées loin des yeux, noires, atteignant à peu près la moitié du corps, graduellement serriformes à partir du 3^e article, fortement vers le bout; dernier article en ovale allongé. Pronotum plus large que long, parallèle sur les côtés, arrondi aux angles extérieurs, entièrement jaune convexe transversalement, très brusquement déclive à la base, sillonné au milieu en arrière, impressionné de chaque côté sur le dos, très finement et subrugueusement ponctué; limites latérales entières; angles postérieurs courts. Elytres longs, parallèles, arrondis au sommet, très finement ponctués, légèrement striés; noirs, avec une tache jaune oblongue nettement limitée à l'épaule sur l'épipleure. Propectus et métasternum jaunes; abdomen noir. Pattes jaunes.

Iles Salomon, Guadalcahal, rivière Bonegi, décembre (R. A. LEVER). Un individu. Imperial Institute of Entomology, British Museum.

Plus étroit que *H. pacificus* FLEUTIAUX. Tête jaune, ornée de deux bandes noires arquées; écusson jaune; élytres noirs sans reflet bleuté, avec une tache nettement limitée à l'épaule en dessous.

ELATERIDAE

Dioxypterus FAIRMAIRE, 1881Génotype: *D. nigrotransversus* FAIRMAIRE

D. Risbeci, n. sp. — 12 mm. Elliptique; jaune brillant, pronotum avec une bande marginale large à la base, plus étroite en avant, écusson noir, élytres avec deux bandes transversales noires, l'une au premier quart réunie sur la suture à l'écusson, l'autre au delà de la moitié, et une tache moins large le long du bord externe à l'extrémité; pubescence jaune clair, noire sur les bandes des élytres. Tête déprimée, finement et peu densément ponctuée. Antennes noires avec les deux premiers articles jaunes. Pronotum trapézoïdal, peu convexe; ponctuation fine, légère, peu serrée sur le dos, mieux marquée, plus forte et plus dense sur les flancs; angles postérieurs grands, aigus, brièvement bicarénés. Elytres parallèles jusqu'à la

bande transversale submédiane, atténués au delà, épineux au sommet convexes, fortement striés-ponctués. Dessous jaune, métasternum obscur; pubescence jaune. Pattes jaunes; tarses noirâtres.

Nouvelles-Hébrides, février (RISBEC). Un exemplaire, Museum Paris.

Diffère de *D. undulatus* SCHWARZ par le pronotum plus rétréci en avant, bordé de noir, par les bandes des élytres plus transversales, la première aussi apparente mais un peu moins large que la suivante.

D. Delaruei, n. sp. — 12 mm. Elliptique; jaune brillant, pronotum étroitement bordé de noir, élytres avec une bande noire courbe partant de l'épaule, dirigée intérieurement vers la suture et s'arrêtant à la deuxième strie, une autre bande transversale à peu près à la moitié partant du bord externe et s'arrêtant à la quatrième strie; pubescence jaune, noire sur les bandes des élytres. Tête déprimée, ponctuation fine et assez serrée. Antennes noires avec le premier article jaune. Pronotum trapézoïdal, peu convexe; ponctuation fine et légère sur le dos, un peu plus forte sur les flancs; angles postérieurs grands, aigus, brièvement bicarénés. Elytres parallèles jusqu'au delà de la moitié, atténués en arrière, épineux au sommet, convexes, fortement striés-ponctués. Dessous jaune, propleures noirs. Pattes jaunes.

Nouvelles-Hébrides, île Tanna (AUBERT DE LA RUE). Un exemplaire, Museum Paris.

Diffère de *D. Risbeci* par les bandes latérales du pronotum étroites et parallèles, l'écusson jaune, la première bande des élytres arquée, partant de l'épaule et ne joignant pas la suture, la bande submédiane marginale plus étroite et ne dépassant pas la quatrième strie, l'absence de tache postérieure latérale au sommet, les propleures noirs, le métasternum de même couleur que l'abdomen.

Pantolamprus CANDÈZE, 1859

Génotype: *P. nitens* CANDÈZE

P. Monardi n. sp. — 11 à 12 mm. Allongé; tête et pronotum vert métallique, élytres bleu métallique; pubescence noire dressée, plus longue sur le pronotum. Tête convexe, déprimée en avant; bord antérieur avancé et transversal; ponctuation large superficielle, ombiliquée, peu serrée. Antennes noires, ne dépassant pas la base du pronotum; 3^e article plus long que le 2^e et plus court que le

suivant; les autres plus larges et dentés. Pronotum plus long que large, légèrement rétréci en avant, convexe, brusquement déclive à la base; ponctuation grosse ombiliquée en avant, peu serrée, moins forte et plus écartée en arrière; angles postérieurs aigus, non divergents, brièvement carénés. Elytres parallèles jusqu'au delà de la moitié, rétrécis en arrière, conjointement arrondis au sommet, convexes, légèrement ponctués-striés; interstries plans. Dessous bleu métallique, violacé sur l'arrière-corps; ponctuation grosse et peu serrée sur le propectus, fine et plus dense en arrière. Fémurs testacés; tibias et tarses noirs.

Angola: Ebanga, novembre; Ganda, octobre. Mission suisse 1932 1933 (Dr MONARD). Ma collection et Musée de La Chaux-de-Fonds.

Voisin de *P. cyanicollis* HOPE (subsp. *perpulcher* WESTWOOD); taille moindre; tête et pronotum entièrement verts; élytres entièrement bleus; ponctuation plus grosse et moins serrée sur la tête et le pronotum; stries des élytres mieux marquées.

P. niger n. sp. — 23 mm. Allongé, robuste; entièrement noir brillant; pubescence noire dressée, plus longue sur la tête et le pronotum. Tête convexe, bord antérieur abaissé, non avancé; ponctuation assez forte, peu serrée. Antennes noires, ne dépassant pas la base du pronotum; 3^e article plus long que le 2^e et moins long que le 4^e; suivants comprimés et dentés. Pronotum plus long que large, graduellement rétréci en avant, arrondi près des angles antérieurs; convexe; ponctuation assez forte et peu serrée en avant, progressivement effacée et espacée en arrière; angles postérieurs assez longs, non divergents, carénés. Elytres subparallèles, rétrécis au delà de la moitié, conjointement arrondis au sommet, convexes, déprimés à la base de chaque côté de l'écusson, superficiellement et finement ponctués-striés. Dessous et pattes noirs.

Sierra-Leone. Ma collection.

Rappelle *P. auripennis* HOPE; entièrement noir; pronotum plus long et plus rétréci en avant; élytres plus atténués au sommet, stries à peine distinctes.

P. antennalis n. sp. — 8 mm. 1/2. Allongé, étroit, parallèle; ver métallique, bord antérieur de la tête et angles postérieurs du pronotum ferrugineux; pubescence noire clairsemée. Tête large convexe en arrière, déprimée en avant; bord antérieur avancé; ponctuation très grosse, peu serrée, ombiliquée; yeux gros. Antennes noires, dépassant la base du pronotum; 1^{er} et 2^e articles ferrugineux;