

postérieure noire est largement interrompue au centre qui est brunâtre. Une bande médiane longitudinale brunâtre, surtout visible sur les segments III, IV et V. Entre les deux bandes latérales noirâtres et la bande médiane brunâtre, les tergites sont jaune clair. Tergite VI jaunâtre, mat, couvert d'un prumineux blanchâtre; bords latéraux et bord postérieur, plus ou moins noirâtres. Dernier segment et hypopyge brun-noirâtre. Ventre jaune pâle.

Quoique dans la table dichotomique ci-dessous, l'espèce nouvelle soit opposée à *S. immaculata* CZERNY, c'est de *S. acroleuca* SPEISER, qu'elle semble se rapprocher le plus. D'après la description, *S. congoana* n. sp. paraît au moins distincte de l'espèce de SPEISER par: écusson nu dans sa partie discale; bord de l'aile légèrement éclairci, seulement entre les troisième et quatrième nervures longitudinales et taches jaunes abdominales sub-rectangulaires.

*Remarque.* — Dans l'état actuel de nos connaissances, les *Suillia* éthiopiennes paraissent ne se rencontrer qu'en Afrique méridionale et surtout orientale. En ce qui concerne plus particulièrement le Congo belge, elles ne s'écartent guère de la " Région des Grands-Lacs ".

#### Tableau des espèces éthiopiennes

- |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Ailes brun-foncé, tachetées de clair . . . . .                                                                                  | 2.                        |
| Ailes d'un autre aspect . . . . .                                                                                                  | 3.                        |
| 2. Ecusson poilu au moins sur sa partie discale . . . . .                                                                          | 4.                        |
| Ecusson poilu seulement au bord . . . . .                                                                                          | 5.                        |
| 4. Au-dessus de la transverse postérieure, sur la troisième nervure longitudinale, une tache noirâtre; hypopyge jaunâtre. . . . .  |                           |
| . . . . .                                                                                                                          | <i>laciniata</i> SPEISER. |
| Au-dessus de la transverse postérieure, sur la troisième nervure longitudinale, pas de tache noirâtre; hypopyge noirâtre . . . . . |                           |
| . . . . .                                                                                                                          | <i>acroleuca</i> SPEISER. |
| 5. Soies dorsocentrales insérées au centre de taches brunes . . . . .                                                              |                           |
| . . . . .                                                                                                                          | <i>balteata</i> LAMB.     |
| Soies dorsocentrales non insérées au centre de taches brunes . . . . .                                                             | 6.                        |
| 6. Pas de bande brune le long de la suture notopleurale; abdomen en majeure partie noir . . . . .                                  | <i>immaculata</i> CZERNY. |
| Une bande brune le long de la suture notopleurale; abdomen en majeure partie jaune . . . . .                                       | <i>congoana</i> n. sp.    |

## Catalogue des Chironomides de Belgique

PAR

M. GOETGHEBUER

### VI. — ORTHOCLADINAE

#### GENRE *EURYCNUM* VAN DER WULP

*crassipes* PANZ. — *Fauna Germ.*, CIX, 22 (*Chironomus*) (1813).  
Syn. *elegans* MEIG.; *aestivus* CURT.; *hirtipes* MACQU.  
Eprave (LESTAGE); Sy.

#### GENRE *BRILLIA* KIEFFER

*longifurca* KIEFF. — *Bull. soc. hist. nat. Moselle*, p. 86 (1924).  
Hockai; Archennes (SÉVÉRIN).  
*modesta* MEIG. — *Syst. Besch.*, VI, 256, 15 (1830).  
Syn. *sylvestris* GOETGH.; ? *bifida* KIEFF.  
Melle, Munte; Falaën, Sy, Hockai, Bullange, Virton.  
*brevinervis* KIEFF. — *Arch. f. Hydrobiol.*, suppl. II, p. 516 (1916).  
Postel (SÉVÉRIN).

#### GENRE *METRIOCNEMUS* VAN DER WULP

##### SOUS-GENRE *METRIOCNEMUS* s. str.

*picipes* MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 52, 74 (1818).  
Syn. *hirtipalpis* KIEFF.; *hygropetricus* KIEFF.; *fuscipes* GOETGH. (1921).  
Gand, Vinderhaute, Nukerke.  
*longitarsus* GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, mém. 31, p. 77 (1921).  
Destelbergen.

- fuscipes* MEIG. — *Syst. Besch.*, 1, 49, 65 (1818).  
 Syn. *adjunctus* WALK.; *alligatus* WALK.; *fertus* WALK.;  
*obsistens* WALK.; *auripilus* GTGH.  
 Gand, Destelbergen, Sy, Hockai.
- lacteolus* GOETGH. — loc. cit. *Mém.* 31, p. 80 (1921).  
 Gand, Heusden, Uccle.
- atratus* ZETT. — *Dipt. Scand.* IX, p. 3590 (1850).  
 Destelbergen, Heusden.
- hirticollis* STAEG. — *Krøj. Tidssk.* II, 582, 77 (1839).  
 Syn. *hirtellus* GOETGH.  
 Destelbergen.

SOUS-GENRE *HETEROTRISSOCLADIUS* SPARCK

- Grimshawi* EDW. — *Trans. of the Ent. Soc. of Lond.*, p. 313 (1929).  
 Bullange (SÉVÉRIN).
- marcidus* WALK. — *Ins. Brit.* III, 177, 166 (1856).  
 Syn. ? *cubitalis* KIEFF.; *aestivalis* GOETGH.  
 Postel; Bullange, Hockai.

SOUS-GENRE *PARAPHAENOCLADIUS* THIENEM.

- impensus* WALK. — *Ins. Brit.*, III, 184, 145 (1856).  
 Syn. *ampullaceus* KIEFF.; *angulatus* GOETGH.  
 La Panne, Gand, Destelbergen, Heusden.

GENRE *THIENEMANNIA* KIEFFER

- gracilis* KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. Nat. Metz*, p. 49 (1909).  
 Ette (TONNOIR).

GENRE *CRICOTOPUS* VAN DER WULP

- Syn. *Trichocladus* KF. part.; *Isocladus* KF.
- trifasciatus* PANZ. — *Fauna Germ.*, CIX, 18 (1813).  
 Syn. *limnānthemī* KIEFF.; ? *pulchellus* MEIG.  
 Gand, Destelbergen, Chiny, Virton.
- tricinctus* MEIG. — *Syst. Besch.*, 1, 41, 49 (1818).  
 Syn. *hyalinus* KIEFF.  
 Destelbergen; Auderghem (TONNOIR).
- sylvestris* FAB. — *Ent. Syst.*, 252, 89 (TIPULA) (1794).  
 Syn. *marginatus* MACQU.; *longipalpis* KIEFF.; *fusciforceps* KIEFF.; ? *amaenus* MEIG.; ? *amasia* MEIG.; *Isocladus albipes* (KIEFF.) EDWARDS.

- La Panne, Gand, Heusden, Destelbergen, Overmeire, Thuin, Virton.
- ornatus* MEIG. — *Syst. Besch.*, 1, 43, 52 (1818).  
 Tronchiennes.
- speciosus* GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, p. 96 (1921).  
 Rouge-Cloître (TONNOIR, LESTAGE).
- oscillator* MEIG. — *Syst. Besch.*, 1, 44, 54 (1818).  
 Heusden, Genck, Virton.
- tremulus* LIN. — *Fauna suec.*, 1762 (1761).  
 Syn. *pectimanus* KIEFF.; *niveimanus* KIEFF.  
 Esneux, Houyet, Sy.
- pulchripes* VERR. — *The Ent. Monthly Mag.*, p. 22 (1912).  
 Syn. *montivagus* GOETGH.  
 Postel (SÉVÉRIN); Hockai.
- bicinctus* MEIG. — *Syst. Besch.*, 1, 41, 48 (1818).  
 Syn. *atrimanus* KIEFF.; *fallax* KIEFF.; *stencsandalum* KIEFF.;  
*gibbosus* MEIG.  
 Gand, Postel, Hasselt, Mont-St-Guibert, Falaën, Chiny, Virton.
- trifascia* EDW. — *Trans. of the Ent. Soc. of Lond.*, p. 332 (1929).  
 Heusden, Falaën, Gedinne (TONNOIR), Chiny, Virton.
- similis* GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, *Mém.* 31, p. 95 (1921).  
 Chiny.
- festivus* MEIG. — *Syst. Besch.*, VI, 251, 100 (1830).  
 Syn. ? *laccophilus* KIEFF.; *angustatus* GTGH.  
 La Panne, Postel, Genck, Hasselt, Overmeire, Heusden.
- triannulatus* MACQU. — *Dipt. du Nord*, p. 30.  
 Syn. *suecicus* KIEFF.  
 La Panne, Sy, Chiny, Virton.
- motitator* LIN. — *Fauna suec.*, 1760 (1761).  
 Sy, Virton.  
 var. *subcoeruleus* EDW. — loc. cit., p. 323 (1929).  
 Destelbergen.
- annulator* GOETGH. — loc. cit. *Mém.* 31, p. 54 (1921).  
 Syn. *motitator* EDW. nec LIN.  
 Chiny, Virton.
- decorus* GOETGH. — *Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXVII, p. 53 (1927).  
 Virton.
- annulipes* MEIG. — *Syst. Besch.*, 1, 42, 51 (1818).  
 Heusden, Hockai.

- saxicola* KIEFF. — *Arch. f. Hydrobiol.*, Suppl. II, p. 512 (1916).  
Heusden.
- albiforceps* KIEFF. — *Arch. f. Hydrobiol.*, Suppl. II, p. 553 (1916).  
Syn. *bicinctellus* GOETGH.; ? *unifasciatus* MACQU.  
Virton.
- tibialis* MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 41, 47 (1818).  
Hasselt.
- ephippium* ZETT. — *Ins. lapp.*, 1814, 27 (1840).  
Overmeire.
- biformis* EDW. — *Trans. of the Ent. Soc. of Lond.*, p. 325 (1929).  
Syn. ? *glanciventr* KIEFF.  
Gand, Destelbergen, Postel.
- intersectus* STAEG. — *Dipt. dan.*, p. 574 (1840).  
Syn. *incisuratus* ZETT.  
Falaën, Linkebeek.
- brevipalpis* KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. Nat. Metz*, p. 45 (1909).  
Heusden, Destelbergen.
- brunnipes* GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, *Mém.* 31  
p. 98 (1921).  
Genvai (TONNOIR); Falaën.
- inserpens* WALK. — *Ins. Brit.*, III, p. 185, 151 (1856).  
Syn. *conversus* WALK.; *denotatus* WALK.  
Destelbergen, Linkebeek, Falaën, Virton.

#### GENRE *DIPLOCLADIUS* KIEFFER

- cultriger* KIEFF. — *Zeitsch. f. wis. Insektenbiol.*, IV, p. 6 (1908).  
Gand.

#### GENRE *TRISSOCLADIUS* KIEFF.

- griseipennis* GOETGH. — *Ann. biol. lac.*, VI, p. 7 (1913).  
Syn. ? *Hydrobaenus lugubris* GIARD non FRIES.  
Gand.
- brevipalpis* KIEFF. — *Zeitschr. f. wissen Insektenbiol.*, IV, p. 4  
(1908).  
Tronchiennes (var. *nigerrimus* GOETGH.).

#### GENRE *TRICHOCLADIUS* KIEFF.

- fuscipes* KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. Nat. Metz*, p. 45 (1909) (sec.  
typ.).

- Syn. *dispar* GTGH. (*Ann. biol. lacustre*, VI, p. 4 (1913).  
Schelderode (FL.), Melle.
- chalybeatus* EDW. — *Trans. of the Ent. Soc. of Lond.*, p. 331 (1929).  
La Panne, Sy, Virton, Chiny.
- Bastini* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXI, p. 215  
(1931).  
Virton.
- rufiventr* MEIG. — *Syst. Besch.*, VI, 249, 94 (1830).  
Syn. ? *perniger* ZETT.; *opplens* WALK.; ? *proximus* KIEFF.;  
*nudipes* GOETGH.  
Gand, Destelbergen, Bruxelles.
- lucidus* STACG. — *Kröj. Tidsk.*, II, 569 (1839).  
*lucens* ZETT.; *coaequatus* WALK.; *nitidicollis* WALK.; *obse-*  
*piens* WALK.; *patibilis* WALK.; *pervulsus* WALK.; *funebis*  
GOETGH.; *lobatus* KIEFF.; ? *grandis* KIEFF.  
Gand, Bellem, Heusden, Destelbergen, Waerschoot, La Panne,  
Genck.

#### GENRE *PSECTROCLADIUS* KIEFF.

- obvius* WALK. — *Ins. Brit.*, III, 174, 95 (1856).  
*oppertus* WALK.; ? *extensus* KIEFF.; *carbonarius* GOETGH. nec  
MEIG.  
Destelbergen.
- psilopterus* KIEFF. — *Zeitsch. f. wiss. Insektenbiol.*, p. 144 (1906).  
Syn. *luteolus* GOETGH.  
Heusden.
- platypus* EDW. — *Trans. of the Ent. Soc. of Lond.*, p. 333 (1929).  
Postel (SÉVÉRIN); Genck.
- versicolor* KIEFF. var. *marinus* KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. Nat.*  
*Moselle*, p. 61 (1924).  
Destelbergen, Loën.
- calcaratus* EDW. — *loc. cit.*, p. 133 (1929).  
Gand.
- sordidellus* ZETT., non *luteolus* EDW. — *Ins. lapp.*, p. 814, 26  
(1840).  
*remotus* KIEFF.; *exspatiens* WALK.; *albinervis* V. D. W.  
La Panne, Gand, Heusden.
- stratiotis* KIEFF. — *Bull. Acad. roy. Belg.*, p. 706 (1908).  
*Brehmi* KIEFF.  
Gand, Destelbergen.

*limbatellus* HOLMGR. — *Kongl. Svenska Vet. Akad. Handl.*, VIII, 5 (1869).

Gand.

*dilatatus* V. D. WULP. — *Bouwst.*, III, 32, 53 (1873).

Gand.

*pilimanus* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, p. 294 (1934).  
La Panne.

#### GENRE *EUKIEFFERIELLA* THIEN.

*bicolor* ZETT. — *Ins. lapp.*, 813, 23 (1840).

Syn. *femorata* STAEG.; *perexilis* WALK.; *Orthocladus nanulus*  
V. D. W.; *Cricotopus albipluma* KIEFF.; *C. albicornis* GOETGH.  
Destelbergen.

*urbana* GOETGH. — *Faune de France*, XVIII, p. 101 (1928).

Gand.

*hospita* EDW. — *Trans. of the Ent. Soc. of Lond.*, p. 351 (1929).  
Virton.

*camptophlebs* EDW. — *loc. cit.*, p. 353 (1929).

Hockai.

*stagnalis* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, p. 290 (1932).  
Genck.

#### GENRE *ORTHOCLADIUS* V. D. WULP

##### SOUS-GENRE *CHAETOCLADIUS* KIEFF.

*melaleucus* MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 39, 41.

Syn. *argentatus* GOETGH.

Virton, Hockai.

*suecicus* KIEFF. — *Arch. f. Hydrob. Suppl.* II, p. 517 (1916).  
Postel (SÉVERIN).

*piger* GOETGH. — *Ann. biol. lac.*, VI, p. 517 (1913).

Gand, Destelbergen, Heusden.

*divisus* KIEFF. — *Arch. f. Hydrob.*, II, p. 795 (1921).

Hasselt (DE BAUCHE et KOCH.).

*flavopilosellus* GOETGH.

Ballange (SÉVERIN).

*perennis* MEIG. — *Syst. Besch.*, VI, 249, 92 (1830).

Syn. *novatus* WALK.; *setiger* KIEFF.; *pentachaetus* KIEFF.,  
*polychaetus* KIEFF.; ? *trinotatus* KIEFF.

Postel (SÉVERIN).

*ouërmeirensis* GOETGH. — *Faune de France*, XVIII, p. 79 (1928).  
Overmeire.

*arenarius* GOETGH. — *loc. cit.*, p. 79 (1928).

Knocke-sur-Mer.

*ictericus* MEIG. — *Syst. Besch.*, VI, 253, 103 (1830).

Syn. *pertenuis* WALK.; *ochraceus* GTGH.

Rouge-Cloître (TONNOIR).

*bipunctellus* ZETT. — *Ins. lapp.*, IX, 3545, 70 (1840).

Syn. *hygropetricus* KIEFF.; *muscicola* GTGH. nec KIEFF.

Hockai.

*vernalis* GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. Mém.* 31,  
p. 83 (1921).

Zwijnaerde.

*nitidicollis* GOETGH. — *Ann. biol. lac.*, VI, p. 16 (1913) (*Camp-*  
*tocladius*).

Destelbergen.

*tibialis* KIEFF. — *Zetschr. f. wiss. Insektenb.*, p. 38 (1908). (*Cam-*  
*plocladius*).

Postel (SÉVERIN).

##### SOUS-GENRE *ORTHOCLADIUS* s. str.

*glabripennis* GOETGH. — *loc. cit.*, p. 85 (1921).

Syn. ? *grandis* KIEFF.

Heusden, Destelbergen.

*distylus* KIEFF. — *Broteria*, p. 85 (1915).

Melle.

*rubicundus* MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 35, 33 (1818).

*incoactus* WALK.; *persidens* WALK.; *rivinus* KIEFF.

Virton.

##### SOUS-GENRE *DACTYLOCLADIUS* KIEFF.

*verralli* EDW. — *Trans. of the Ent. Soc. of Lond.*, p. 348  
(1929).

Virton.

*rusticus* GOETGH. — *Faune de France*, XVIII, p. 91 (1928).

Postel (SÉVERIN).

*virtunensis* GOETGH. — *loc. cit.*, p. 92 (1928).

Virton.

*devonicus* EDW. — *loc. cit.*, p. 349 (1929).

Virton.

*veris* nov. nom.

Syn. *aprilinus* GOETGH. nec KIEFF. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXI, p. 216 (1931).

La Panne.

*hockaiensis* GOETGH. — *loc. cit.*, LXXIII, p. 289 (1933).  
Hockai.

SOUS-GENRE *PSEUDORTHOCCLADIUS* GOETGH.

*curtistylus* GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, *Mém.* 31, p. 101 (1921).  
Destelbergen.

### GENRE *LIMNOPHYES* EATON

*exiguus* GOETGH. — *Ann. biol. lac.*, VI, p. 14 (1913).

Syn. *hexatomus* KIEFF.; *pusillus* EAT.

Gand, Eecloo, Heusden.

*minimus* MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 47, 61 (1818).

Syn. *punctulatus* GOETGH.

Gand, Destelbergen, Heusden.

*prolongatus* KIEFF. — *Arch. f. Hydrob. Supp. Bd.* II, p. 815.

Syn. *pentaplastus* KIEFF.; *punctatellus* GOETGH.; *clavaticornis* GOETGH.

Postel (SÉVÉRIN); Falaën.

*truncorum* GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, *Mém.* 31, p. 89 (1921).

Archennes (SÉVÉRIN), Francorchamps.

*punctipennis* GOETGH. — *loc. cit.*, p. 91 (1921).

Vinderhaute.

*falaënsis* GOETGH. — *Faune de France*, 18, p. 106 (1932).

Falaën.

*acutus* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXII, p. 291 (1932).

Hockai.

*montanus* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXII, p. 292 (1921).

Hockai.

*hydrophilus* GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, *Mém.* 31, p. 169 (1921).

Syn. *longiseta* THIENEM. et KIEFF.; *foenisuga* KIEFF.

Destelbergen.

### GENRE *CAMPTOCLADIUS* V. D. WULF

*stercorarius* DE GEER. — *Ins.*, VI, 149, 22 (178).

Syn. *byssina* SCHRANK.; *trifoliata* KIEFF.

La Panne, Gand, Heusden, Destelbergen, Melle, Overmeire, Virton.

### GENRE *SMITTIA* HOLMGREEN

Syn. *Phaenocladus* KIEFF. in THIENEMANN 1921 (pro part).

*vesparum* GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, *Mém.* 31, p. 169 (1921).

Francorchamps (SÉVÉRIN).

*macrura* GOETGH. — *Faune de France*, 18, p. 120 (1932).  
Virton.

*aquatilis* GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, *Mém.* 31, p. 169 (1921).

Forest.

*anura* GOETGH. — *Faune de France*, 18, p. 121 (1932).  
Virton.

*aterrima* MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 47, 59 (1818).

Syn. *opaca* MEIG.; *nigrata* WALK.; *sinuosa* KIEFF.; *aquatica* KIEFF.

La Panne, Gand, Destelbergen.

*littorella* GOETGH. — *Ann. biol. lac.*, XV, p. 100 (1927).  
Knocke-sur-Mer.

*forcipata* GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, *Mém.* 31, p. 87 (1921).

Destelbergen, Heusden.

*nudipennis* GOETGH. — *Ann. Biol. lac.*, VI, p. 19 (1913).  
Gand.

*thalassophila* GOETGH. — *Ann. Soc. Ent. Belg.*, LVII, p. 373 (1913).

Zeebrugge, au pied du môle.

*pratorum* GOETGH. — *Ann. Biol. lac.*, XV, p. 101 (1927).  
Destelbergen.

*acutilobata* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXII, p. 292 (1932).

Hasselt (DE BAUCHE et KOCH).

*curvinervis* KIEFF. — *Bull. Soc. Ent. France*, p. 184 (1911) (*Trichocladus*).

Watermael.

*gracilis* GOETGH. — *Ann. Biol. lac.*, VI, p. 17 (1913).

La Panne, Gand, Heusden.

*trilobata* EDW. — *Trans. of the Ent. Soc. of Lond.*, p. 364 (1929).

La Panne, Overmeire.

*triappendiculata* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXI, p. 217 (1931).

La Panne.

*albipennis* GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, Mém. 31 p. 85 (1921).

Eecloo, Bellem.

*recta* EDW. — *loc. cit.*, p. 362 (1929).

Hockai.

*lacunarum* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXI, p. 217 (1931).

*brachyptera* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Entom. Belg.*, LXXV, (1935).

Syn. ? *conjuncta* EDW.

Chaudfontaine (LERUTH).

## II

## Assemblée mensuelle du 2 février 1935

Présidence de M. R. MAYNÉ, Président.

— La séance est ouverte à 17 heures 15.

*Excusé* : M. THOMAS.

— M. le Président fait part à l'assemblée de ce que S. M. LE ROI, voulant donner à notre Société une marque nouvelle de Sa bienveillance, a daigné lui maintenir Son Haut Patronage.

*Décision du Conseil.* — Le Conseil a admis en qualité de membre associé, M. Albert MICHIELS, 43, Drève du Château, à Ganshoren, présenté par MM. André JANSSENS et R. MAYNÉ. — Entomologie appliquée.

*Correspondance.* — Nous apprenons le décès de notre membre correspondant, M. G. B. C. LEMAN, de Londres. (*Condoléances*).

— MM. V. ANTOINE, R. OBERTHUR et L. VAN ROECHOUT nous informent de leur changement d'adresse. Les modifications nécessaires ont été faites à la liste des membres publiée en même temps que le présent fascicule.

— La *Fédération Belge des Sociétés Scientifiques* met à notre disposition un certain nombre d'exemplaires de sa circulaire relative au Congrès National des Sciences de 1935. Le Secrétaire se chargera de les faire parvenir à ceux de nos membres que la chose intéresse et qui en feront la demande.

*Bibliothèque.* — M. D'ORCHYMONT nous a remis trois tirés à part de ses travaux. (*Remerciements*).

*Communications.* — M. BURGEON fait circuler un exemplaire d'*Eustuhmannium mirabile* KLB. (Coleopt.), provenant de l'Urundi. Cette espèce rare existe probablement au Congo belge.