

A propos du *Notiophilus hypocrita* PUTZ.

PAR

PAUL J. ROELOFS

La découverte de cette espèce à Hérenthals, signalée par M. DE RUETTE dans le *Bulletin* de juillet, m'a incité à revoir mes *Notiophilus palustris* DUFT.

Sur 31 exemplaires de provenances diverses, j'ai trouvé 3 *hypocrita* : un de Calmpthout, un de Marbehan et un de Postel.

Cette espèce méconnue, quoique, effectivement, bien facile à reconnaître, comme notre collègue en fait la remarque, semble donc répandue dans le pays entier.

De plus, "la remarquable variété bleu d'acier", capturée par DIETZ à Calmpthout, dont parle DE BORRE dans la première centurie de ses *Matériaux pour la Faune de la Province d'Anvers*, et dont il fait un *aquaticus* "à tibias rougeâtres", est bel et bien un *hypocrita*.

Cette tendance à bleuir se retrouve chez l'exemplaire de Postel ; le disque du corselet et des élytres et même le dessus des jambes postérieures, sont nettement bleuâtres.

Le cas n'est d'ailleurs pas unique dans ce genre. GANGLBAUER, dans *Die Käfer von Mitteleuropa*, dit que *palustris* passe parfois au bleu (serait-ce d'après DE BORRE ?) ; toujours est-il que j'ai pris un *substriatus* WATERH. à Wyneghem, un autre à Schooten, qui ont le dessus du corps entièrement bleu foncé, à l'exception de l'extrémité des élytres, il en est de même d'un *biguttatus* F. que j'ai capturé à Wildert.

Coléoptères capturés en Belgique

PAR

PAUL J. ROELOFS

STAPHYLINIDAE

Micropeplus fulvus ER. — Spa.

Acrolocha striata GRAV. — Spa.

Omalius riparium THOMS. — Heyst-sur-Mer.

Lesteva Heeri FAUV. — Hoboken, Santvliet, Schilde, Tête de Flandre.

Lesteva punctata ER. — Westmalle.

Syntonium aeneum MÜLL. — Spa.

Oxytelus fulvipes ER. — Schilde.

Oxytelus Perrisi FAUV. — Heyst-sur-Mer.

Platysthetus nodifrons SAHLB. — Schooten, Tête de Flandre, Westmalle.

Stenus calcaratus SCRIBA. Belg. nov. sp. — Hamme, Hoboken.

Stenus providus ER. — Tous ceux de ma liste du 7-IX-1907 doivent être rapportés à *Rogeri* KR., forme ou espèce qui semble bien remplacer par ici le *providus*.

Stenus morio GRAV. — Deurne, Schilde.

Stenus fulvicornis STEPH. — Quatre-Bras, Spa, Tête de Flandre.

Stenus bifoveolatus GYLL. — Schilde.

Stenus palustris ER. Belg. nov. sp. — Hastière.

Scopaeus laevigatus GYLL. — Tête de Flandre, Westmalle.

Baptolinus affinis PAYK. — Spa.

Philonthus Mannerheimi FAUV. — Gand.

Staphylinus chalconcephalus F. — Le Hérou.

Quedius maurus SAHLB. — Boitsfort.

Mycetoporus punctus GYLL. — Boitsfort.

Tachinus laticollis GRAV. — Westmalle, Wilryck.

Diglossa submarina FAIRM. Belg. nov. sp. — Heyst-sur-Mer.

- Oligota inflata* MANN. — Spa.
Leptusa haemorrhoidalis HEER. — Spa.
Atheta nigella ER. — Hoboken.
Atheta incana ER. — Tête de Flandre.

TRICHOPTERIGIDAE

- Ptilium myrmecophilum* ALLIB. Belg. nov. sp. — Oostmalle.

NITIDULIDAE

- Meligethes aeneus* F. ab. *australis* KUST. — Brasschaet.

CUCUGIDAE

- Psammoechus bipunctatus* F. — Hamme.

CURCULIONIDAE

(Complément liste du 7-IV-1906).

- Oliorrhynchus veterator* UYTENBOOGAERT. — Arlon (Fauquemont, Maasbracht).
Oliorrhynchus sulcatus F. — Anvers.
Sciaphilus asperatus BONSD. — Deurne, Hermeton, Hoboken.
Sitona gressorius F. — Wildert.
Brachyderes incanus L. — Spa.
Epipolaeus caliginosus F. — Hastière.
Erirrhinus festucae HERBST. — Tête de Flandre, Santvliet.
Notaris bimaculatus F. — Hoboken, Santvliet.
Dorytomus salicinus GYLL. — Brasschaet.
Dorytomus dorsalis L. — Bornhem, Schooten.
Smicronyx jungermanniae REICH. — Deurne, Westmalle.
Bogous claudicans BOH. — Tête de Flandre.
Acalles plinoides MARSH. — Boitsfort, La Hulpe, Quatre-Bras, Spa, Westmalle.
Acalles echinatus GERM. (*turbatus* BOH.). — Arlon.
Craponius epilobii PAYK. — Westmalle.
Allodactylus extiguus OLIV. — Santvliet.
Rhytidomus globulus HERBST. — Boitsfort, Schilde.
Amalus haemorrhous HERBST. — Deurne, Calmpthout, Turnhout.
Phytobius Waltoni BOHEM. — Schilde.
Phytobius comari HERBST. — Schilde.
Ceuthorrhynchus viduatus GYLL. — Hastière.

- Ceuthorrhynchus geographicus* GOEZE. — Hastière, Waulsort.
Ceuthorrhynchus rusticus GYLL. Belg. nov. sp. — Rencheux.
Ceuthorrhynchus consputus GERM. — Hoboken.
Ceuthorrhynchus pervicax WS. — Hoboken.
Ceuthorrhynchus hirtulus GERM. — Calmpthout.
Poophagus sisymbrii F. — Burght.
Tapinotus sellatus F. — Brasschaet, Calmpthout.
Anthonomus rufus GYLL. — Heure.
Anthonomus pomorum L. — Schilde.
Tychius venustus F. — Wuestwezel.
Tychius juncus REICH. — Bornhem.
Sibinia signata GYLL. (*primita* HRBST.). — Brasschaet, Burght.
Orchestes decoratus GERM. — Hermeton, Virton.
Orchestes rufitarsis GERM. — Caprycke.
Orchestes populi F. — Hoboken, Lillo, Spa.
Miarus micros GERM. — Schilde.
Cionus scrophulariae L. — Schooten.
Cionus alauda HERBST. — Schooten.
Magdalis memnomia GYLL. — Calmpthout, Putte.
Magdalis duplicata GERM. — Calmpthout, Putte, Schooten.
Magdalis armigera GEOFFR. — Schooten.
Magdalis carbonaria L. — Schooten.
Apion onopordi KIRBY. — Blaimont, Burght, Lillo, Tête de Flandre.
Apion fuscirostre F. — Meerdael, Schilde, Spa, Westmalle.
Apion ochropus GERM. — Trois-Ponts.
Apion pomonae F. — Westmalle.
Apion cerdo GERST. — Bornhem, Spa, Virton.
Apion opeticum F. — Hermeton.
Apion aeneum F. — Burght, Doel.
Apion radiolus KIRBY. — Hamme, Hoboken, Burght.
Apion ebeninum KIRBY. — Hastière, Hermeton, Brasschaet, Schilde, Schooten.
Apion Hookeri KIRBY. — Austruweel, Hoboken.
Apion urticarium HERBST. — Hermeton.
Apion rufirostre F. — Hastière.
Apion pubescens KIRBY. — Arlon, Hermeton, Hoboken, St-Antoine, Virton.
Apion seniculum KIRBY. — Doel, Hastière, Tête de Flandre.
Apion atomarium KIRBY. — Hastière, Virton.
Apion flavimanum GYLL. — Hastière, Virton.

- Apion dissimile* KIRBY. — Burght.
Apion difforme GERM. — Hastière.
Apion ononcola BACH. — Austruweel.
Apion affine KIRBY. — Hermeton.
Apion marchicum HERBST. — Calmpthout, Hamme, Schooten, Westmalle.
Apion violaceum KIRBY. — Santvliet, Schooten, Spa.
Apion Gyllenhali KIRBY. — Virton.
Apion Spencei KIRBY. — Bornhem, Overmeire, Rencheux, Spa.
Apion vorax HERBST. — Austruweel, Hoboken.
Apion viciae PAYK. — Rencheux, Spa.
 ab. *Griesbachi* STEPH. — Rencheux, Spa.
Apion pisi F. — Virton.
Apion punctigerum PAYK. — Spa, Trois-Ponts.
Apion aethiops HERBST. — Hoboken, Santvliet.
Apion immune KIRBY. — Boitsfort.
Apion striatum KIRBY. — Arlon, Schilde, Virton.
Apion ervi KIRBY. — Arlon, Hermeton, Virton.
Apion ononis KIRBY. — Arlon, Blaimont, Doel, Hastière, Santvliet.
Apion virens HERBST. — Doel, Hastière, Rencheux, Spa.
Apion tenue KIRBY. — Hoboken, Virton.
Apion loti KIRBY. — Hamme, Schooten.
Apion colombinum GERM. — Virton.
Apion reflexum GYLL. — Arlon.
Rhynchites Mannerheimi HUM. — Calmpthout, Schooten.
Rhynchites interpunctatus STEPH. — Schooten.
Rhynchites cupreus DEG. — Calmpthout, Schooten, Wildert.
Diodyrhynchus austriacus OL. — Schilde.

ADDITIONS

AU

Catalogue des Coléoptères de Belgique

PAR

G. FAGEL ET F. GUILLEAUME

- Bembidion (Trepanes) octomaculatum* GOEZE. — Vilvorde, 13-5-1934, 6 ex. (G. FAGEL).
Trechus (Trechoblemus) micros HERBST. — Wemmel, 8-7-1935, 1 ex. (G. FAGEL).
Platynus (Agonum) lugens DFT. **Belg. nov. sp.** — Uccle (Vallon d'Engeland), 20-4-1935, 1 ex. (G. FAGEL).
P. (Agonum) viridicupreus austriacus FAB. — Meysse, 5-5-1935, 1 ex. (G. FAGEL).
Pterostichus (Steropus) aethiops PZ. — Elsenborn, 8-1931, 1 ex.
Ophonus (i. sp.) signaticornis DUFT. — Louvain, 7-1924, 1 ex. (G. FAGEL).
Harpalus (i. sp.) tenebricus DEJ. — Waulsort, 5-1926, 1 ex. (G. FAGEL).
Badister (i. sp.) unipustulatus BON. — Anvers (rive gauche), 10-6-1935, 1 ex. (G. FAGEL).
Dromius (i. sp.) meridionalis DEJ. **Belg. nov. sp.** — Anvers (rive gauche), 10-6-1935, 1 ex. (G. FAGEL).
 Cette espèce spéciale à l'Europe méridionale avait déjà été capturée en Hollande, dans les villes. Cette espèce ainsi que la précédente et la suivante, furent trouvées en tamisant les détritrus de la laisse de haute mer au pied de petites dunes.
D. (Dromiolus) nigriventris THOMS. — Anvers (rive gauche), 10-6-1935, 1 ex. (G. FAGEL).