

A propos du *Notiophilus hypocrita* PUTZ.

PAR

PAUL J. ROELOFS

La découverte de cette espèce à Hérenthals, signalée par M. DE RUETTE dans le *Bulletin* de juillet, m'a incité à revoir mes *Notiophilus palustris* DUFT.

Sur 31 exemplaires de provenances diverses, j'ai trouvé 3 *hypocrita* : un de Calmpthout, un de Marbehan et un de Postel.

Cette espèce méconnue, quoique, effectivement, bien facile à reconnaître, comme notre collègue en fait la remarque, semble donc répandue dans le pays entier.

De plus, "la remarquable variété bleu d'acier", capturée par DIETZ à Calmpthout, dont parle DE BORRE dans la première centurie de ses *Matériaux pour la Faune de la Province d'Anvers*, et dont il fait un *aquaticus* "à tibias rougeâtres", est bel et bien un *hypocrita*.

Cette tendance à bleuir se retrouve chez l'exemplaire de Postel ; le disque du corselet et des élytres et même le dessus des jambes postérieures, sont nettement bleuâtres.

Le cas n'est d'ailleurs pas unique dans ce genre. GANGLBAUER, dans *Die Käfer von Mitteleuropa*, dit que *palustris* passe parfois au bleu (serait-ce d'après DE BORRE ?) ; toujours est-il que j'ai pris un *substriatus* WATERH. à Wyneghem, un autre à Schooten, qui ont le dessus du corps entièrement bleu foncé, à l'exception de l'extrémité des élytres, il en est de même d'un *biguttatus* F. que j'ai capturé à Wildert.

Coléoptères capturés en Belgique

PAR

PAUL J. ROELOFS

STAPHYLINIDAE

Micropeplus fulvus ER. — Spa.

Acrolocha striata GRAV. — Spa.

Omalius riparium THOMS. — Heyst-sur-Mer.

Lesteva Heeri FAUV. — Hoboken, Santvliet, Schilde, Tête de Flandre.

Lesteva punctata ER. — Westmalle.

Syntonium aeneum MÜLL. — Spa.

Oxytelus fulvipes ER. — Schilde.

Oxytelus Perrisi FAUV. — Heyst-sur-Mer.

Platysthetus nodifrons SAHLB. — Schooten, Tête de Flandre, Westmalle.

Stenus calcaratus SCRIBA. Belg. nov. sp. — Hamme, Hoboken.

Stenus providus ER. — Tous ceux de ma liste du 7-IX-1907 doivent être rapportés à *Rogeri* KR., forme ou espèce qui semble bien remplacer par ici le *providus*.

Stenus morio GRAV. — Deurne, Schilde.

Stenus fulvicornis STEPH. — Quatre-Bras, Spa, Tête de Flandre.

Stenus bifoveolatus GYLL. — Schilde.

Stenus palustris ER. Belg. nov. sp. — Hastière.

Scopaeus laevigatus GYLL. — Tête de Flandre, Westmalle.

Baptolinus affinis PAYK. — Spa.

Philonthus Mannerheimi FAUV. — Gand.

Staphylinus chalconcephalus F. — Le Hérou.

Quedius maurus SAHLB. — Boitsfort.

Mycetoporus punctus GYLL. — Boitsfort.

Tachinus laticollis GRAV. — Westmalle, Wilryck.

Diglossa submarina FAIRM. Belg. nov. sp. — Heyst-sur-Mer.