

ADDITIONS

AU

Catalogue des Coléoptères de Belgique

PAR

E. DERENNE ET G. FAGEL

- Notiophilus hypocrita* PUTZ.-SPAETH.  
Ouffet, 7-1931, 1 ex. (G. FAGEL).
- Bembidion (Daniela) ascendens* K. DAN. Belg. nov. sp.  
Confluent de la Lesse et de l'Ywoigne, 5-1926, 1 ex. (G. FAGEL).
- B. (D.) atrocæruleum* STEPH.  
Java-lez-Bas-Oha, 9-1924, 1 ex. (G. FAGEL) et Malmédy, 22-7-1935, 1 ex. (DE WALSCHE).
- B. (Peryphus) modestum* F.  
Elsenborn, 8-1931, 1 ex. (G. FAGEL).
- B. (P.) saxatile* GYLL. Belg. nov. sp.  
Anvers R. G., 10-6-1935, 1 ex. appartenant à l'ab. *veclense* FOWL. connue de l'île de Whight (G. FAGEL).
- B. (P.) testaceum* DUFTS.  
Anvers R. G., 10-5-1935, 4 ex. (G. FAGEL).
- B. (Synchostictus) Millerianum* HEYD.  
Jauchette-lez-Jodoigne, 26-6-1935, 1 ex. (G. FAGEL).
- Epilachna Argus* FOURCR.  
Uccle-Calevoet, 25-8-1935, en nombre (G. FAGEL).
- Dermestes lanarius* ILL.  
Torgny, 10-8-1935, 1 ex. (E. DERENNE).

*Agrilus integerrimus* RATZB.

Muno, 8-1935, 1 ex. (E. DERENNE).

*Agrilus betuleti* RATZB. **Belg. nov. sp.**

Postel, 1-7-1935, 1 ex. (E. DERENNE).

*A. convexicollis* REDTB. **Belg. nov. sp.** (1).

Suxy, 28-7-1934, 1 ex.; Orval, 15-7-1935, 1 ex. (E. DERENNE).

*A. olivicolor* KIESW.

Orval, 19-7-1935, 2 ex. (E. DERENNE).

*Sphinginus lobatus* OLIV.

Boitsfort (étang de l'Ermitte), 15-7-1935, 1 ex. (G. FAGEL).

*Cryptocephalus signatus* LAICH. **Belg. nov. sp.**

Lives, 7-1907, 1 ex. (VREURICK); Fraiture (VAN EENOOGHE in coll. FAGEL).

*C. primarius* HAROLD = *imperialis* F. nec LAICHARTANG **Belg. nov. sp.** (2).

Torgny, 19-6-1909, 1 ex. (Dr GOETGHEBUER).

*Longitarsus ballotae* MRSH.

Wellin, 24-9-1935, en nombre, sur *Ballota nigra* (F. GUILLEAUME).

*Dibolia femoralis* REDTB. **Belg. nov. sp.**

Torgny, (FRENNET).

*D. Foersteri* BACH.

Suxy, 8-1935, en nombre (E. DERENNE).

*D. depressiuscula* LETZ **Belg. nov. sp.** (3).

Resteigne, 7-1935, quelques ex. (F. GUILLEAUME).

*Cassida splendidula* SUFF.

Orval, 8-1935, 2 ex. (E. DERENNE).

*Mecaspis coesus* GYLL. **Belg. nov. sp.**

Loën, 10-5-1934, 1 ex. (F. DARIMONT).

(1) Signalé précédemment, par erreur, sous le nom de *Agrilus chrysoderus* ABEILLE, *V. obtusus* ABEILLE.

(2) Signalé précédemment sous le nom de *imperialis* LAICH.

(3) Les spécimens signalés de St-Hubert et des environs de Wellin sous le nom de *cynoglossi* sont également des *depressiuscula*.

## CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE

DES

## Coléoptères de Belgique

(2<sup>me</sup> NOTE)

PAR

GASTON FAGEL

### RÉVISION DU GENRE *BRADYCELLUS* ER.

Ayant eu l'occasion de reconnaître parmi des spécimens indigènes de *Bradycellus* une espèce non encore signalée de notre pays et peu connue, je crois faire œuvre utile en donnant une table dichotomique de nos espèces.

1. Côtés du pronotum échancrés en avant des angles postérieurs qui sont marqués . . . . . 2.
- Côtés du pronotum subdroits ou régulièrement arrondis, non échancrés en avant des angles postérieurs qui sont tout à fait arrondis 4.
2. 3<sup>e</sup> intervalle des élytres portant un pore bien marqué, au 1/3 postérieur, contre la 2<sup>e</sup> strie . . . . . 3.
- 3<sup>e</sup> intervalle des élytres sans pore au 1/3 postérieur. Long : 3,5-4,5 mm. . . . . *distinctus* DEJ.
3. Ailé, striole juxtascutellaire complète, angles postérieurs du pronotum obtus. Long. : 3,5-4,5 mm. . . . . *verbasci* DUFT.
- Aptère, striole juxtascutellaire nulle ou atrophiée, angles postérieurs du pronotum subdroits, à sommet saillant quelque peu dentiformément. Long : 4,5 mm. . . . . *Sharpi* JOY
4. Ailé, striole juxtascutellaire complète, impressions basilaires du pronotum grandes et profondes, à ponctuation plus dense. Forme générale plus allongée. Long. : 3-4,5 mm. . . . . *harpalinus* SERV.
- Aptère, striole juxtascutellaire nulle ou incomplète, impressions basilaires du pronotum plus superficielles, à ponctuation plus éparse. Forme générale plus courte. Long. : 2 3/4-4 mm. . . . . *collaris* PAYK.