

On a plus ou moins réussi à placer quelque part cette " queue " post-brachycentrinienne, mais le reste ?

Je souhaite ardemment qu'un jeune audacieux ait enfin le courage de s'atteler à la besogne d'une bonne classification générale des Trichoptères, plus rationnelle, plus phylogénique, que celle que nous avons encore si longtemps après que le père de la trichoptérologie l'ait qualifiée du terme que j'ai déjà cité, un " curiosity shop ".

(Laboratoire de Recherches hydrobiologiques).

Bibliographie

1. BARNARD, K. H. — South African Caddis-flies (Trichoptera). (*Trans. Roy. Soc. South-Africa*, XXI, 4, 1934, p. 291-394, 52 fig.).
2. ELTRINGHAM, H. — On some particularities of the abdominal structure in certain male Trichoptera. (*Trans. Entom. Soc. London*, LXXIX, 3, 1931, p. 539-543).
3. GAUTHIER, H. — *Recherches sur la faune des eaux continentales de l'Algérie et de la Tunisie*. Alger, 1928.
4. GAUTIER, E. F. — *Le Sahara*. Paris, Payot, 1923.
5. LESTAGE, J. A. — Les Trichoptères d'Afrique. (*Rev. Zool. afric.*, VI, 3, 1919, p. 251-336).
6. — Notes trichoptérologiques. VIII. Etude du groupe Polycentropidien. (*Ann. Bull. Soc. Entom. Belg.*, LXV, 1925, p. 53-120).
7. — Notes trichoptérologiques. IX. Etude du groupe Psychomyidien. (*Ann. Bull. Soc. Ent. Belg.*, LXV, 1925, p. 363-386).
8. ULMER, G. — Trichopteren von Aequatorial Africa. (*Wiss. Ergeb. D. Zentral-Africa Expedit.*, IV, 2, (1912) 1913, p. 81-125, 50 fig.).
9. — Trichopteren aus dem ägyptischen Sudan und aus Kameroun. (*Mitt. Münch. Ent. Ges.*, 1922, p. 47-63; 1923, p. 9-20).
10. — Trichopteren und Ephemeropteren. Zool. Exped. Anglo-ägyptischen Sudan 1914. (*Densk. Akad. Wiss. Wien*, 1924, p. 1-4).
11. — Trichopteren von den Philippinen und von den Sunda-Inseln. (*Treubia*, XI, 4, 1930, p. 371-498, 146 fig.).
12. — Entomological Expedition to Abyssinia 1926-27. (*Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 10, vol. VI, 1930, p. 479-501).
13. — Trichopteren von Afrika (*Deutsch. Ent. Zeit.*, 1931, 1, p. 1-29).

UN CEUTHORRHYNCHUS NOUVEAU DE BELGIQUE

C. Derennei n. sp.

(COL. CURCULIONIDAE)

PAR

F. GUILLEAUME

Mon ami M. Emile DERENNE a recueilli à Orval, en plusieurs exemplaires, un *Ceuthorrhynchus* que je n'ai pu rapporter à aucune des espèces connues actuellement. Je considère donc cet insecte comme nouveau et je me fais un plaisir de le dédier à son heureux récolteur (1).

Ceuthorrhynchus Derennei, n. sp. — Long. 2-2,6 mm.

Ovale, noir mat; orné, sur le disque du pronotum, d'une bande médiane longitudinale blanchâtre et de deux bandes courbes blanchâtres parallèles aux bords latéraux; sur les élytres, d'un dessin blanc ou blanc-jaunâtre composé d'une tache post-scutellaire allongée et souvent d'une petite tache au sommet de la suture, d'une tache juxta-scutellaire à la base du deuxième interstrie de chaque côté de l'écusson; d'une fascie latérale placée vers le tiers antérieur de l'élytre sur les 6^e, 7^e et 8^e interstries; souvent d'une seconde fascie latérale moins marquée au tiers postérieur et de linéoles interstriales à la base et au sommet ou s'étendant parfois sur presque toute la longueur des élytres, le tout ne tranchant pas très fort sur le fond noir des téguments.

Rostre de la longueur de la tête et du pronotum réunis chez la ♀, un peu plus court chez le ♂, fortement courbé, cylindrique, ponctué-strié, finement squamulé jusqu'à l'insertion antennaire, pubescent au sommet, noir et assez brillant.

(1) Je remercie mon éminent Collègue M. le Prof. A. HUSTACHE, qui a eu la complaisance de bien vouloir examiner un spécimen de ce *Ceuthorrhynchus* et qui m'a engagé à décrire l'espèce.

Antennes noires, grêles, insérées chez la ♀ très peu au-delà du milieu du rostre, chez le ♂ un peu plus loin; scape assez fortement et presque graduellement renflé vers le sommet; 1^{er} article du funicule assez renflé, deux fois aussi long que large; 2^e un peu moins long que le 1^{er} et de moitié moins large; 3^e et 4^e un peu plus longs que larges; 5^e subglobuleux; 6^e et 7^e subconiques à peine aussi longs que larges; massue oblongue, acuminée, plus longue que les 5 articles précédents réunis.

Tête à ponctuation dense, presque uniformément garnie de squamules étroites blanchâtres ou jaunâtres; front subplan. Yeux assez convexes.

Pronotum environ une fois et demie plus large que long (♀), un peu plus allongé (♂); étranglé brièvement après le bord antérieur qui est modérément relevé; bords latéraux non ou très obsolètement tuberculés, s'élargissant progressivement à partir de l'étranglement, en courbe sinueuse jusqu'à la base, la plus grande largeur du pronotum se trouvant un peu avant la base; celle-ci finement relevée, environ deux fois aussi large que le bord antérieur. Disque subplan, densément et fortement ponctué, sans sillon médian appréciable, creusé d'une fossette devant l'écusson; garni de squamules étroites, blanchâtres ou jaunâtres, couchées, plus concentrées sur la ligne médiane et parallèlement aux bords latéraux où elles sont souvent entremêlées de squamules plus larges.

Elytres un peu plus larges que le pronotum à la base; calus huméral assez saillant; bords latéraux faiblement arqués-convergeants vers l'arrière, plus du double aussi longs que le pronotum. Stries assez larges et assez profondes, ponctuées; interstries plans, presque deux fois aussi larges que les stries; fortement ponctués, le 2^e élargi dans l'angle apical. Disque peu convexe, noir, couvert sur les interstries, de squamules étroites, blanchâtres, jaunâtres ou brunâtres, couchées et de squamules blanches plus larges, ovalaires, formant avec les squamules étroites le dessin décrit plus haut.

Pattes assez robustes, garnies de squamules étroites blanchâtres, peu serrées; fémurs noirs, claviformes, assez fortement dentés; tibias également noirs, courbés à la base, un peu élargis au sommet. Tarses assez robustes et allongés, noir-brunâtre ou noir-rougeâtre, ongles dentés.

Dessous noir, ponctué, garni de squamules blanchâtres ou jaunâtres, les unes étroites, les autres ovales, assez peu serrées, mais concentrées sous les épaules; pygidium entier, noir, squamulé comme le dessous.

♂. Segment anal avec une faible dépression. Les tibias intermédiaires et postérieurs munis d'un petit ongle à l'angle apical interne.

Orval, 18 ex., 19 et 20 juillet 1935 (Emile DERENNE).

Type ♂ long. 2 mm. et paratypes in Coll. E. DERENNE.

Paratypes ♂ et ♀ in coll. A. HUSTACHE et F. GUILLEAUME.

C'est avec *C. asperifoliarum* GYLL. que cette espèce nouvelle semble avoir le plus d'affinités. Elle en diffère surtout par les caractères suivants: pattes et antennes entièrement noires, — les tarses noir-brun ou noir-rouge, — alors que chez *asperifoliarum* les fémurs seuls sont noirs, les tibias, les tarses et les antennes étant testacés; moins grande robustesse des pattes, dont les fémurs sont moins fortement dentés; insertion antennaire plus rapprochée (♂ et ♀) du milieu du rostre et massue visiblement plus allongée; pronotum moins transverse surtout chez le ♂; étranglement, après le bord antérieur, plus court et moins accentué, bord lui-même, moins relevé; courbure des bords latéraux du pronotum nullement brusque mais régulièrement sinueuse.

Un examen un peu attentif révèle aussi que, dans le dessin blanchâtre des élytres, constitué de squamules plutôt étroites qu'ovales, le contraire existant chez *asperifoliarum*, la tache scutellaire et les deux taches juxta-scutellaires sont en général plus allongées et que, surtout, la fascie latérale sur les 6^e, 7^e et 8^e interstries est nettement plus rapprochée de l'épaule.

Ajoutons que tous les spécimens de *C. Derennei* n. sp. ont été recueillis exclusivement sur une Labiée qui sera identifiée l'été prochain, tandis qu'*asperifoliarum* vit sur diverses Borriginées.

En consultant les tableaux analytiques pour la détermination des *Ceuthorrhynchus* on pourrait être amené aux espèces nommées: *albosignatus* GYLL. et *pallidicornis* H. BRIS., mais, ici encore, pas de confusion possible avec *Derennei* n. sp., l'*albosignatus* ayant un pronotum notablement plus transverse et les interstries des élytres fortement rugueux et le *pallidicornis* ayant les funicules antennaires et les tarses roux et le rostre plus court.