

— MM. CORNU et LE MOULT remercient pour leur admission comme membres correspondants.

MM. FERRANT et JUNK remercient également pour les félicitations qui leur ont été adressées.

— M. le Ministre des Travaux publics et de la Résorption du chômage nous informe de ce que nos observations formulées au sujet du barrage projeté de la Hoëgne retiendront toute son attention.

— M. FAGEL précise que dans sa note parue dans le précédent fascicule, il n'a traité que des seules espèces du genre *Bradycellus* s. str.

Bibliothèque. — Deux brochures accompagnées de photographies détachées ont été reçues de M. l'Abbé BOLS. D'autre part, M. MARECHAL nous a fait parvenir 19 tirés à part de travaux de divers auteurs. (*Remerciements.*)

Travaux pour les Bulletin et Annales. — L'impression est décidée, dans le fasc. IV (avril), d'un travail de M. GUILLEAUME.

Communications. — M. GUILLEAUME fait circuler des exemplaires de *Ceuthorrhynchus derreni* GUILLEAUME (Col.) et donne quelques-unes des caractéristiques de cette espèce nouvelle.

— M. BURGEON montre des *Orthogonius*, *Anoncopeucus* et *Glyptus* (Col.) africains. Plusieurs espèces sont détriticoles et vivent au fond des termitières.

— M. MAYNÉ signale la capture de *Tomicus acuminatus* GYLL. **Belg. nov. sp.** (Col.), faite à Brée, le 15-V-1928, sur *Pinus sylvestris*.

— M. VAN DEN BRUEL montre des exemplaires de *Trogoderma granarium* EVERTS, **Belg. nov. sp.** (Col.) provenant des environs de Bruxelles. La larve de cet insecte vit dans le grain.

— M. A. D'ORCHYMONT s'étend sur la conception qu'avait KUWERT de son sous-genre *Crephelochares* (= *Chasmogenus* SHARP) et démontre, par les types de la collection de l'auteur, que l'une des deux espèces qu'il y rangeait (*mentinotus*) est basée sur deux exemplaires différents spécifiquement, dont aucun n'appartient à *Crephelochares*, et qui en réalité se rapportent chacun à un genre différent ! Cela démontre, une fois de plus, avec quelle légèreté KUWERT a fait l'étude d'un groupe aussi difficile que celui des *Palpicornia*.

— Enfin, M. LELEUP fait circuler une série de *Cychnus rostratus* L. (Col.) recueillis sous la mousse, dans la Forêt de Soignes, en janvier et février de cette année.

— La séance est levée à 18 h.

Nouveaux Sphénophorides Sud-Américains (CURCULIONIDAE)

PAR

A. HUSTACHE

Les Curculionides de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale ont fait l'objet de nombreux et importants travaux de sorte que la faune de ces régions en est assez bien connue. On ne peut en dire autant pour la faune de l'Amérique méridionale, délaissée par la plupart des entomologistes et cependant incomparablement riche dans tous les groupes. En particulier les *Sphénophorides*, depuis le *Genera* de SCHÖNHERR, n'ont donné lieu qu'à quelques notes isolées, n'augmentant les espèces que d'une dizaine de formes nouvelles. Il en existe cependant un grand nombre, soit dans les Muséum nationaux soit dans les Musées particuliers, qui depuis de longues années attendent un nom et une description — la plupart des noms donnés par J. FAUST restant in litteris. Ayant reçu récemment un envoi fort important à étudier, j'ai profité de l'occasion pour étudier complètement de nombreuses espèces depuis longtemps innommées dans ma propre collection.

L'ordre suivi dans ce travail est celui de CHAMPION dans la *Biologia Centrali Americana* IV, 7, 1910. Une révision complète pour l'Amérique méridionale, analogue à celle de l'Amérique centrale serait évidemment désirable, mais elle serait encore plus volumineuse que cette dernière et trouverait difficilement un éditeur. Le présent travail ne comprend donc que des descriptions isolées.

Il est utile de remarquer que dans le groupe le plus nombreux, les *Metamasius*, le ♂ est moins variable de coloration que la ♀ et qu'en outre il possède des caractères particuliers qui facilitent grandement, le plus souvent, l'identification de l'espèce. Quelques-unes de nos espèces présentent certaines particularités non observées dans les espèces de l'Amérique centrale ; ces caractères sont donnés au début de la description. Tous les types font partie de ma collection.

Cactophagus sanguinipes n. sp.

Ovale-oblong noir, la tête, le rostre, les pattes (tarses noirâtres excepté) la massue antennaire, d'un rouge sanguin, orné en outre de taches rouges ainsi disposées : sur les côtés du prothorax, en avant du milieu, une tache ronde et assez grande ; sur chaque élytre une petite tache près du milieu du 3^e interstrie, deux courtes linéoles subapicales et une bordure apicale étroite rouges ; sur la partie postérieure des épisternes métathoraciques une petite tache. Revêtement squamuleux grisâtre et condensé dans les points, en dessus et en dessous.

Rostre un peu moins long que le prothorax, arqué, finement pointillé, sa dilatation basale étroitement sillonnée au milieu ; dessous profondément sillonné. Front fovéolé.

Prothorax un peu plus long que large, fortement rétréci et tubuleux au sommet, ses côtés parallèles de la base au milieu, puis convergents en avant, la base fortement bisinuée et rebordée ; peu convexe, avec une impression antéscutellaire grossièrement ponctuée et subcarénée au milieu, la tubulure apicale et les flancs avec une forte ponctuation. Ecusson large, en avant impressionné, en arrière ogival.

Elytres triangulaires, séparément arrondis au sommet, les stries en arrière très fines et leurs points espacés, en avant leurs points devenant plus gros et plus profonds, à la base très gros et confluent, les stries creusées ; interstries obsolètement ponctués. Fémurs brièvement, tibias longuement ciliés.

Long. : 15 mm.

Equateur : Mera, un spécimen (♂ ?), ma collection (ex STAUDINGER).

Cactophagus rubricatus n. sp.

Etroit, d'un rouge ferrugineux, le dessous brun, entièrement recouvert d'une incrustation d'un gris-jaune.

Rostre un peu plus long que le prothorax, modérément arqué, en dessus obsolètement pointillé, sa dilatation basale faible, profondément sillonnée au milieu, en dessous profondément sillonné. Tête convexe, lisse, luisante.

Prothorax subconique, en avant faiblement resserré, les côtes légèrement arqués, sa plus grande largeur à la base, cette dernière fortement bisinuée ; peu convexe, avec une profonde impression transversale antéscutellaire. Ecusson semi-elliptique.

Elytres triangulaires, deux fois aussi longs que larges, la base, de chaque côté, fortement bisinuée et les épaules très obliquement arron-

dies, en arrière se rétrécissant fortement, au sommet brièvement arrondis ensemble ; peu convexes, impressionnés autour de l'écusson et sur la base du 4^e interstrie ; stries fines, leurs points grands et espacés ; interstries irrégulièrement convexes, le 2^e et la suture carénés vers leur sommet.

Long. : 12 mm., larg. 4 mm.

Guyane française : St-Laurent du Maroni, un spécimen, ma collection (ex. LE MOULT).

Cactophagus consularis n. sp. (CHEVROLAT in litt.)

Cette espèce peut facilement être confondue avec *C. Sierrakowskyi* GYLL. dont elle a la taille, la coloration, la forme et les caractères spéciaux du ♂. Elle en diffère par le pygidium grossièrement ponctué chez les deux sexes, ainsi que le dernier segment ventral ; le dessus déprimé, les stries des élytres plus fortes, leurs points bien visibles, serrés et entamant le bord des interstries, les interstries peu convexes, les hanches antérieures un peu plus écartées.

Guyane française : St-Laurent du Maroni, Nouveau Chantier, Charvein, Bas Maroni, une série de spécimens. (ex. LE MOULT).

Cactophagus aurantiacus n. sp.

Ovale-rhomboidal, noir, en dessous velouté et les points remplis par des squamules cendrées, le dessous grisâtre, les élytres, chacun, avec au moins une tache orangée, cerclée de rouge, ronde, placée derrière l'épaule sur le 8^e interstrie. Rostre aussi long que le prothorax, épais, fortement arqué, sa dilatation basale rugueuse, sillonnée au milieu, front fovéolé. Prothorax à peine aussi long que large, fortement rétréci en avant, fortement bisinué à la base, peu convexe, impressionné légèrement devant l'écusson, sa ponctuation assez forte et assez serrée. Ecusson triangulaire, noir, velouté.

Elytres triangulaires, peu convexes, les stries fines, leurs points médiocres et squamulés, les interstries plans, avec une série irrégulière de très petits points, le 8^e interstrie élargi autour de la tache. Un tubercule aigu entre les hanches antérieures, fort (♂) ou moindre (♀).

♂. — Fémurs assez longuement ciliés en dessous ; tibias antérieurs avec une frange de longs poils fauves. Rostre cylindrique, obsolètement sillonné en dessous, le sommet, en dessous, de chaque côté avec une petite dent.

Long. : 14-17 mm.

Equateur : Jarugui (ex STAUDINGER), El Napo IX-1931 (R. BENOIST).

La forme de cette espèce se rapproche de celle de *C. validirostris* GYLL. Le nombre des taches élytrales est variable ; le type ♀ a en plus de la tache latérale, une tache moindre sur le milieu du 4^e interstrie et un point rouge sur le 2^e en arrière ; le ♂ type a une tache orangée sur l'épaule et la tache latérale ; un autre ♂ (Napo) a une 2^e tache orangée sur le 8^e interstrie, en arrière, une série de petits points d'un rouge foncé sur le 2^e interstrie, un point sur la base du 4^e et un à la base de l'épaule.

Eucactophagus Appolinairei n. sp.

Rhomboidal, noir, velouté, la pruinosité cendrée ; les élytres en majeure partie d'un rouge ferrugineux, avec une étroite bordure basale fortement élargie sur l'épaule, une courte tache rectangulaire, médiane sur le 2^e interstrie (suture non comprise), une grande tache apicale dentelée en avant, au milieu remontant un peu sur la suture, sur ses bords dilatée, irrégulière et remontant jusqu'au milieu, noires.

Rostre avec sa dilatation basale grossièrement ponctuée, son sillon médian profond ; en avant moins densément ponctué et au sommet luisant et éparsément pointillé ; aussi long que la tête et le prothorax brusquement courbé vers le sommet. Tête densément ponctuée en avant, obsolètement en arrière, le front avec une grande impression rugueuse.

Prothorax subconique, peu plus long que large, en avant fortement resserré et tubuleux, la base modérément bisinuée ; peu convexe, avec une grande mais faible impression antéscutellaire, la ponctuation écartée, visible sur la tubulure antérieure, les bords latéraux, le long de la base ; milieu du disque avec une grande tache noire, ovale, non pruiteuse. Ecusson noir.

Elytres triangulaires, à la base très peu plus larges que le prothorax, les épaules très obliques, presque effacées ; peu convexes, les stries étroites et profondes, un peu élargies et creusées à la base, leurs points indistincts sur le disque mais très distincts à l'extrémité, les interstries faiblement convexes, imponctués. Pygidium grossièrement ponctué cilié, caréné sur les côtés et au milieu en arrière. Saillie métasternale assez élevée, triangulaire, à son sommet luisante, éparsément pointillée ; 5^e segment ventral avec de gros points épars et une fovéole apicale rugueuse. Pattes pruiteuses, leurs points espacés.

Long. : 18 mm.

Colombie : Muzo (F. APPOLINAIRE), type ; Santa Fé de Bogota (ex. DONCKIER).

Eucactophagus fallaciosus n. sp.

De forme et de coloration très semblables à celles de l'espèce précédente dont elle diffère par les caractères suivants : Prothorax avec les côtés parallèles de la base jusqu'au milieu ; marqué, en plus de la profonde mais courte impression antéscutellaire, de chaque côté d'une grande fovéole ronde, profonde, veloutée, noire, submédiane ; disque entièrement mat (peut-être frotté ?) avec des points squamulés épars sur toute sa surface. Elytres avec les épaules plus accusées, les stries pourvues sur toute leur longueur de fovéoles pupillées, les interstries plus convexes, particulièrement vers le sommet où les stries sont grossières. Rostre seulement aussi long que le prothorax, ponctué jusqu'au sommet, en ce dernier point non brusquement arqué.

Long. : 12 mm.

Colombie ; Muzo, type (F. APPOLINAIRE), un spécimen.

Eucactophagus viduus n. sp.

Ovale-rhomboidal, noir mat, la pruinosité foncée, chaque élytre avec une grande tache noire, veloutée, subtrapézoïdale, s'étendant en s'élargissant du 2^e interstrie au bord latéral, le prothorax avec une tache centrale oblongue d'un noir velouté.

Rostre aussi long que le prothorax, peu arqué, plus fortement vers le sommet, densément ponctué jusqu'au sommet, son sillon basal étroit mais profond, prolongé presque jusqu'au sommet par une ligne médiane lisse ; en dessous en arrière avec un sillon médian profond, s'affaiblissant en avant, les côtés densément ponctués et impressionnés devant les yeux. Tête convexe, submate, très éparsément et très finement pointillée, la base du front avec une profonde fovéole.

Prothorax un peu plus long que large, en avant fortement rétréci et tubuleux, les côtés subparallèles de la base au milieu, en avant arqués-convergeants jusqu'à la tubulure, la base fortement bisinuée, les angles postérieurs droits ; peu convexe, avec une impression antéscutellaire ovale, profonde, veloutée et de chaque côté, devant la base des interstries 4-5, avec une impression petite arrondie et veloutée ; tout le disque (impressions excepté) parsemé de petits points, plus gros en avant. Ecusson triangulaire, mat.

Elytres subtriangulaires, faiblement arqués ensemble au sommet, les épaules faiblement arrondies ; peu convexes, déprimés derrière la base étroitement rebordée ; stries fines, leurs points obsolètes sur le disque, petits mais distincts à l'extrémité, plus gros et plus visibles vers la base. Pygidium tricaréné, ses points médiocres et épars.

Dessous, dans le milieu lisse, les côtés et le 5^e segment avec des points peu gros et peu serrés. Saillie métasternale assez élevée, lisse.

♂. — Rostre un peu moins long, plus épais, plus grossièrement ponctué.

Long. : 20 mm.

Colombie : Ibagué, ♀ (F. CLAVER); Villaviciosa ♂ (F. APPOLINAIRE).

Eucactophagus carinipyga CHAMP. (*Biol. Centr. Amer. Col.* IV, 7, 1910, p. 97, 98, t. V, f. 1, a, 6 (♀)).

Pérou : Chanchamayo, deux spécimens (ex. LE MOULT).

Mes deux spécimens correspondent en tous points à la description et la figure données par C. CHAMPION, description faite sur deux ♀ ♀ du Nicaragua.

Homalostylus rufirostris n. sp. (*Rhodohaenus rufirostris* FAUST in litt.)

Oblong, d'un rouge ferrugineux, terne, le prothorax avec trois bandes noires entières, l'écusson noir, les élytres avec une étroite bordure basale, une large bande suturale (sur les deux premiers interstries), élargie au milieu, interrompue derrière l'élargissement, à l'extrémité dilatée en bande transversale recouvrant le sommet (l'impression postérieure rouge exceptée), de chaque côté deux taches, l'une humérale, l'autre médiane et sublatérale, noires. Antennes d'un brun de poix, le scape en partie et la base de la massue rougeâtres. Prosternum avec deux bandes noires. Episternes métathoraciques ponctué, noirs, à l'exception d'un point postérieur rouge.

Rostre plus long que le prothorax, séparé du front par un sillon transversal, son élargissement basal un peu plus long (♂) ou seulement aussi long (♀) que large, légèrement dilaté en avant, sillonné au milieu avec des points profonds, subsériés et squamulés; partie étroite modérément arquée, subcylindrique, pointillé éparsément en arrière, lisse en avant. Antennes avec le scape plus large que la distance de l'œil à l'insertion antenneaire.

Prothorax subconique, beaucoup plus long que large, de la base au milieu à peine rétréci et les côtés légèrement sinués en dedans, en avant assez fortement rétréci, le resserrement apical faible et foncé, la base faiblement bisinuée; marqué devant la base d'une impression transversale en forme d'arc, étroite, mais assez profonde; ponctuation fine, peu visible, éparsée. Écusson étroit, acuminé.

Elytres plus longs que larges, modérément rétrécis en arrière, sub-

tronqués au sommet; calus huméral oblique, le calus postérieur faible et suivi d'une impression distincte; peu convexes, les stries très fines, la 8^e profonde et étroite, leurs points petits, peu serrés, entamant le bord des interstries; interstries plans, obsolètement ponctué. Pygidium à points épars, dans le milieu, serrés sur les côtés, très brièvement sétulosés.

Long. : 7,5-8 mm.

Bolivie : Yungas, types, 7 spécimens dont le dessin dorsal noir est identique.

Homalostylus geniculatus n. sp. (FAUST in litt.)

Rouge, le dessin noir comprenant : sur le prothorax une étroite bande médiane, de chaque côté une linéole atteignant au plus le milieu; sur les élytres une tache humérale et une autre subapicale (ces taches manquant parfois). Tête, base et sommet du rostre noirs. Pattes avec les trochanters, le sommet des fémurs, la base et l'extrémité des tibias, les tarsi noirs. Antennes entièrement noires (sauf la partie spongieuse de la massue grise).

Points des élytres gros. Fémurs à leur sommet plus renflés et leur ponctuation plus forte, que chez l'espèce précédente.

Long. : 7,5-8 mm.

Bolivie : Yungas, 2 ♂♂, 1 ♀.

Les autres caractères sont ceux de l'espèce précédente dont elle n'est peut-être qu'une race, quoique, le dessin, la coloration des pattes, du rostre, la ponctuation des élytres lui donnent un faciès différent.

Homalostylus goyaensis n. sp.

Rouge mat, velouté, le dessin dorsal noir comprenant : sur le prothorax trois bandes entières, les latérales distinctement ponctué; sur les élytres une tache humérale allongée, oblique en dedans, une tache médiane, sublatérale, une tache subapicale de chaque côté, une tache suturale au sommet, plus ou moins foncée. Écusson noir, pattes antérieures et intermédiaires rouges, les postérieures noirâtres, à l'exception de la base des fémurs rougeâtre. Elytres avec les stries obsolètement ponctué.

Taille et autres caractères de *H. rufirostris*.

Brésil : prov. de Goyaz, Jatahy, une série de spécimens (DONCKIER).

Metamasius Benoisti n. sp.

Ovale-rhomboidal, noir, orné de bandes bien délimitées d'un rouge

orangé et comprenant: sur le prothorax de chaque côté une large bande latérale, les deux bandes se rapprochant plus ou moins en avant; sur les élytres une large bande basale.

Rostre aussi long que la tête et le prothorax, modérément arqué, en avant légèrement comprimé latéralement, en dessus lisse (♀) ou éparsément pointillé (♂) sa dilatation basale plus de deux fois aussi longue que large, avec une fine ligne enfoncée et médiane, à sa base avec une profonde fovéole. Tête convexe, éparsément pointillée.

Prothorax aussi long que large, les côtés, de la base au milieu sub-parallèles (♂) ou légèrement arqués (♀), ensuite fortement convergents jusqu'à la tubulure apicale, cette dernière moitié de la largeur de la base, la base bisinuée, précédée d'un étroit sillon n'atteignant pas les angles latéraux, arrêté à la bande rouge; peu convexe, avec une impression antéscutellaire faible, rarement profonde chez le ♂; ponctuation indistincte. Ecusson noir, imponctué, à sa base fortement impressionné, sublobé.

Elytres triangulaires, un peu plus longs que larges, la base étroitement rebordée, les épaules obtusément arrondies; stries fines, leurs points petits, un peu plus gros dans la bande rouge, à leur base même avec un gros point, les 6^e et 7^e stries réduites à une ligne de points non reliés entre eux. Pygidium à points médiocres, épars, la pubescence courte, le sommet avec deux touffes de pubescence squamuleuse jaune.

Métasternum sur les côtés, et ses épisternes, imponctués, lisses, le milieu éparsément et finement pointillé (♀), un peu plus fortement (♂). Cinquième segment ventral à son sommet densément ponctué et avec deux touffes de poils squamuleux jaunes. Fémurs (antérieurs obsolètement) et tibias avec, en dessous, une frange de cils jaunes, plus longs sur les tibias, courts chez la (♀).

♂. — Rostre à son sommet brusquement courbé et en dessous étroitement sillonné, à son sommet légèrement épaissi.

Prosternum pubescent devant les hanches. Métasternum et base de de l'abdomen profondément impressionnés.

♀. — Tête en dessus avec un court sillon oblique, de chaque côté, près de l'œil.

Long.: 12-13 mm. (pygidium compris).

Equateur: San Domingo, 400 m. d'alt., 9 ♂, ♂, 5 ♀, ♀ (R. BENOIST).

De ces 11 spécimens 8 sont identiques quant à la coloration, des trois autres, ♀ ♀ l'un a sa bande basale des élytres réduite à une tache humérale, l'autre a le prothorax entièrement rouge, sauf deux taches

basales triangulaires et noires, chez le 3^e, la bande élytrale se rétrécit de l'épaule au 2^e interstrie où elle s'efface. On voit donc que les variations de couleur affectent uniquement les ♀ chez cette espèce.

Elle appartient au 1^{er} groupe de CHAMPION, celui de *M. sericeus*, *hemipterus*, *ensirostris*. Elle est d'ailleurs très distincte de toutes les espèces connues.

Metamasius vicinus n. sp.

Ovale-rhomboidal, noir de suie, mat, chaque élytre avec deux points rouges, petits, peu apparents.

Rostre assez épais, cylindrique, aussi long que le prothorax et presque droit (♀) ou moins long et faiblement arqué (♂), obsolètement (♀) ou très finement pointillé en avant (♂), sa dilatation basale plus longue que large, finement pointillée, à sa base avec une fovéole médiocre. Tête très finement pointillée.

Prothorax de un quart environ plus long que large, ses côtés parallèles de la base au milieu, la base bisinuée, rebordée, précédée d'un sillon; avec une impression antéscutellaire peu profonde, pourvue de deux séries irrégulières de points assez gros, squamulés, les points du disque très petits et très épars. Ecusson lisse, impressionné en avant.

Elytres triangulaires, subtronqués ensemble au sommet, assez fortement striés ponctués, les interstries faiblement convexes, pourvus chacun d'une série irrégulière de points très petits microscopiquement sétulosés, plus distincts vers le sommet.

Métasternum luisant, son impression profonde avec des points petits et épars (♂) ou au moins profonde et presque imponctuée (♀), ses épisternes lisses.

♂. — Rostre en dessous avec un fin sillon, ses côtés à peine et très finement pointillés, au sommet obsolètement épaissi. Fémurs en dessous très brièvement ciliés, mais en leur milieu avec une touffe de cils plus longs, les autres tibias brièvement ciliés.

Long.: 13-14 mm.

Variations: un point rougeâtre, postérieur, sur le prothorax, 0 ou 3 points sur chaque élytre.

Pérou: Marcapata, 5 ♂♂, 2 ♀♀ (ex. STAUDINGER).

Cette espèce, voisine de *M. ensirostris* GERM., en diffère par le rostre plus long, surtout moins arqué, les élytres un peu plus allongés, la taille plus forte.

Metamasius dentirostris n. sp. (♂).

Rostre pourvu à son sommet, en dessous, d'une dent obtuse, aussi longue que la largeur du rostre (vu de profil).

Oblong, noir, le rostre, les pattes (genoux et tarsi noirs exceptés) d'un rouge sanguin, le dessin rouge dorsal composé : sur le prothorax deux bandes latérales, obliques, peu sinueuses, se rapprochant en avant, deux linéoles basales, divergentes sur l'impression postérieure ; sur chaque élytre une étroite bande, composée de courtes taches en demi-cercle traversant les interstries 2-7, interrompue par la suture en arrière de son milieu, prolongée en avant sur le 2^e interstrie jusqu'à la base, une linéole apicale en forme de V (sur les interstries 2-3, 9-10).

Rostre aussi long que le prothorax, brusquement arqué au sommet fortement comprimé latéralement, en avant lisse et luisant, sa dilatation basale médiocre, plus de deux fois aussi longue que large, finement pointillée avec un fin sillon médian, à sa base plus fort et s'évanouissant dans la fovéole basale ; en dessous simplement et finement sillonné. Tête microscopiquement pointillée.

Prothorax plus long que large, les côtés parallèles de la base au milieu, ensuite fortement arqués jusqu'à la tubulure apicale, la base subtronquée, rebordée, précédée d'un profond sillon ; peu convexe, avec une étroite impression antéscutellaire, la ponctuation indistincte. Ecusson lisse.

Elytres subtriangulaires, se rétrécissant assez fortement en arrière, au sommet faiblement arqués ensemble ; peu convexes, les stries assez fortes, leurs points serrés, profonds, les interstries faiblement convexes, imponctués.

Tous les fémurs, en dessous, tomenteux et brièvement ciliés, tous les tibias avec une frange de cils, ceux des postérieurs plus longs ; prosternum devant les hanches, les hanches (au moins en arrière), tomenteux, le prosternum rugueux, impressionné en avant ; métasternum avec une impression peu profonde, mais avec une forte ponctuation, ses épisternes lisses.

Long. : 15 mm.

Equateur : San Domingo, 1. ♂ (R. BENOIST).

Espèce de la forme de *M. cinnamominus* PERTY.

Metamasius peruanus n. sp. ♂

Rostre pourvu de chaque côté d'un profond sillon, atteignant presque le sommet, rempli d'une couche tomenteuse brune.

Oblong, allongé, peu convexe, noir, le dessin rouge, comprenant :

sur le prothorax 6 taches allongées, dont deux rapprochées en avant, près du milieu, 4 en arrière, dont deux sur les angles postérieurs, deux linéaires sur les côtés de l'étroite impression basale ; sur les élytres 6 taches, placées sur les interstries 2-3-4.

Rostre moins long que le prothorax, robuste, arqué, en avant en dessus luisant et à pointillé épars, la dilatation basale médiocre, éparsément pointillée, avec un étroit et profond sillon médian un peu prolongé en avant, s'évanouissant en arrière dans la fovéole basale ; en dessous, en arrière, hérissé de longs poils, aplati et sillonné entre les antennes, obsolètement sillonné jusqu'au sommet, ce dernier avec une courte dent obtuse.

Prothorax plus long que large, peu rétréci jusqu'au tiers antérieur, le sillon postérieur de la tubulure apicale profond sur les côtés, la base bisinuée, rebordée, précédée d'un étroit sillon densément ponctué ; points du disque très petits et très espacés, ceux de l'impression basale plus gros et irrégulièrement bisériés. Ecusson allongé, étroit, brusquement acuminé en arrière.

Elytres peu plus larges que le prothorax, modérément rétrécis en arrière, séparément arrondis au sommet, les stries étroites, les internes obsolètement les latérales distinctement ponctuées, les interstries convexes et imponctués.

Fémurs et tibias antérieurs et intermédiaires munis en dessous d'une frange de longs poils squamuleux jaunes, la frange des tibias intermédiaires plus large au milieu qu'aux extrémités ; hanches des mêmes pattes et prosternum devant les hanches tomenteux, ces mêmes hanches antérieures étroitement séparées. Impression métasternale profonde, éparsément ponctuée, les épisternes lisses.

Long. : 16.17 mm.

Pérou : Marcapata, 2 ♂♂, (ex STAUDINGER).

Le sillon latéral du rostre est caractéristique. Par sa forme, cette espèce se rapproche de *M. cinnamominus* PERTY mais elle est plus étroite et plus allongée.

Metamasius puncticeps n. sp. ♂.

Tête densément ponctuée.

Tibias postérieurs, sur leur face externe avec un sillon large et tomenteux, leur tranche interne bisinuée et brièvement ciliée.

Oblong, noir, velouté en dessus, les pattes et le dessous en partie luisants, le dessin dorsal d'un rouge foncé et composé : sur le prothorax de deux bandes latérales, convergentes en avant, légèrement

sinueuses et en arrière moins larges ; sur chaque élytre de linéoles, une sur la quart basal du 2^e interstrie, à leur extrémité une courte linéole sur les 3^e et 4^e interstries, une médiane sur le 1^{er} interstrie et à son extrémité une courte sur le 2^e, une linéole courte vers le tiers antérieur du 6^e interstrie.

Rostre moins long que le prothorax, médiocrement arqué, un peu plus au sommet, modérément comprimé, finement pointillé jusqu'au sommet, sa dilatation basale plus longue que large, faiblement élargie en avant, pointillée, sillonnée à la base ; en dessous largement sillonné, mais avec les côtés à peine sinués, au sommet légèrement épaissi. Tête avec une ponctuation peu profonde mais très serrée.

Prothorax plus long que large, les côtés subparallèles jusqu'au tiers antérieur, la base légèrement bisinuée mais fortement rebordée ; devant l'écusson avec une impression courte, assez étroite mais profonde et finement carénée au milieu. Ecusson allongé, à sa base impressionné et légèrement échancré.

Elytres modérément rétrécis en arrière, subtronqués ensemble au sommet, la base rebordée ; stries étroites, profondes, le point de leur base très gros, les autres points petits, serrés ; interstries peu convexes, plus fortement en arrière.

Fémurs en dessous tomenteux et brièvement ciliés ; tibias brièvement ciliés en dessous. Hanches antérieures et intermédiaires tomenteuses.

Episternes métathoraciques imponctués ; impression médiane grossièrement ponctuée sur le 1^{er} segment ventral, finement et éparsément sur le métasternum.

Long. : 16 mm.

Colombie : Cauca, un ♂ (ma collection).

Cette espèce appartient au groupe de *M. cinnamominus* PERTY. Le rostre est d'un rouge foncé vers sa base, coloration peut-être accidentelle.

***Metamasius conicollis* n. sp. ♂.**

Prothorax assez fortement ponctué sur tout le disque, fortement dans l'impression basale. Elytres avec les interstries pointillés. Episternes métathoraciques densément et assez grossièrement ponctués.

Elliptique, noir, luisant, le rostre et les pattes (moins les tarsi) d'un rouge brun ; dessin d'un rouge foncé, comprenant : sur le prothorax deux bandes latérales, peu apparentes ; sur les élytres trois bandes transversales, la 1^e basale, large, la 2^e postmédiane, reliée à

la 1^{re} extérieurement par une bande sur les interstries 6^e, 7^e et 8^e, la 3^e subapicale et suivie d'une bande apicale étroite, tomenteuse, jaunâtre (excepté sur la suture noire).

Rostre à peine aussi long que le prothorax, peu arqué, en avant mince, luisant, imperceptiblement pointillé, la dilatation basale plus longue que large, pointillée, à sa base avec un point enfoncé.

Prothorax conique, beaucoup plus long que large, se rétrécissant régulièrement et les côtés presque rectilignes jusqu'au quart antérieur, en avant un peu plus fortement rétréci, la tubulure apicale moitié de la largeur de la base, la base fortement bisinuée, les angles postérieurs obtus, l'impression basale subovale. Ecusson étroit, obtus au sommet, lisse.

Elytres peu rétrécis jusqu'au milieu, plus fortement en arrière, subtronqués ensemble au sommet, le calus huméral un peu élevé et pointillé ; peu convexes, profondément striés ponctués, le point basal gros, tous les points tomenteux ; interstries étroits, non ou à peine plus larges que les stries, convexes, luisants, unisérialement pointillés.

Long. : 10 mm.

Pérou : Chanchamayo, 1 ♂ (ex Le MOULT).

***Metamasius bilobus* n. sp.**

Ecusson bilobé à sa base.

Oblong, noir, mat, le dessin rouge comprenant : sur le prothorax deux bandes latérales sinuées, arquées vers leur milieu, rapprochées en avant, devant l'écusson deux courtes linéoles divergentes ; sur les élytres 4 séries de taches transversales composées de courtes linéoles, la 1^e basale (sur les interstries 3, 4, 5), la 2^e vers le tiers antérieur (interstries 2, 3, 4, 5), la 3^e médiane (interstries 1-5), la 4^e subapicale (interstries 4-5) ; une linéole médiane (interstries 7, 8 et parfois 9).

Rostre modérément arqué, moins long que le prothorax, la dilatation basale étroitement sillonnée au milieu, pointillée, la partie antérieure lisse (♀) ou pointillée (♂), la fovéole basale profonde. Tête éparsément pointillée.

Prothorax plan, plus long que large, les côtés faiblement (♀) ou plus distinctement (♂) arqués jusqu'au milieu, la base bisinuée ; tout le disque mat, avec des petits points épars, un peu plus gros chez le ♂, la dépression antéscutellaire courte, légère, ses points un peu plus gros. Ecusson triangulaire, deux fois aussi long que large, lisse, luisant, à sa base profondément impressionné et bilobé.

Elytres peu plus larges que le prothorax, en arrière modérément

rétrécis, au sommet largement arrondis; stries fines, les discales obsolètement, les latérales distinctement ponctuées, les interstries légèrement convexes. Episternes métathoraciques lisses.

♂. Rostre en dessous rugueux, râpeux, en arrière très brièvement cilié, au milieu sillonné, latéralement à peine comprimé. Tous les fémurs munis en dessous d'une frange de longs cils jaunes et serrés; tibias antérieurs avec une frange régulière de longs cils, les intermédiaires avec une frange de cils courts aux extrémités, longs au milieu. Pygidium bordé de cils sur les côtés et la carène médiane. Hanches antérieures et intermédiaires tomenteuses en arrière.

Long. 10-15 mm.

Variations de coloration (principalement chez les ♀♀): Elytres avec la 4^e tache absente, ou la linéole du 7^e absente, rarement les taches 2 et 3 réunies latéralement.

Les spécimens du Pérou ont le prothorax plus large et les points des stries plus visibles; ils font le passage à la race suivante.

Bolivie: Coroico, types, une série de spécimens; Pérou: Chamamayo, Ht Pérou (ex Le MOULT, ex STAUDINGER).

Var. *amplicolis* n. var.

Diffère de la forme typique par le prothorax plus large, parfois aussi large que les élytres et à pruinosité à reflet verdâtre, les côtés fortement arrondis, en avant très brusquement resserrés (♂).

A première vue l'ampleur et la forme du prothorax pourrait faire considérer cette forme comme spéciale, mais elle a tous les caractères essentiels de la forme typique, dont elle ne semble être qu'une forme extrême.

Equateur: Mera, une série de spécimens (ex STAUDINGER).

***Metamasius fractelineatus* n. sp.**

Elliptique, convexe, noir, la tête, le rostre, les fémurs en partie, les tibias d'un rouge sanguin; dessin rouge sanguin comprenant: sur le prothorax trois bandes, les latérales droites, la médiane étroite à ses extrémités, ovale et renfermant une ligne noire en son milieu, tous ses points densément squamulés; sur chaque élytre une ligne commençant sur la base du 4^e interstrie, traversant le 3^e en arrière de son milieu et prolongé sur le 2^e jusqu'au sommet, une tache humérale prolongée sur le 9^e interstrie, sur le 8^e interstrie une courte tache médiane et une linéole subapicale. Episternes métathoraciques avec leur moitié postérieure rouge. Flancs du prothorax avec une bande rouge.

Rostre moins long que le prothorax, très robuste, fortement arqué, lisse et très luisant (♀) très finement pointillé même sur la dilatation basale (♂), cette dernière un peu plus longue que large, dilatée en avant, au milieu largement et profondément sillonnée, la fovéole basale grande et profonde.

Prothorax peu plus long que large, peu rétréci jusqu'au milieu, en avant les côtés rectilignes et convergents jusqu'à la médiocre tubulure apicale, la base fortement bisinuée, étroitement rebordée et précédée d'un étroit sillon squamuleux, ocreux; une impression basale légère, bifurquée en forme de V, avec des points squamulés, ocreux, gros en arrière, devenant petits en avant; tubulure apicale fortement ponctuée, les points squamulés. Ecusson large, à son sommet arrondi, à sa base impressionné.

Elytres triangulaires, subtronqués ensemble à leur sommet, faiblement et très obliquement dilatés aux épaules, la base étroitement rebordée; stries fines mais pourvues de gros points arrondis, peu serrés, pupillés, les 8^e et 9^e réduites à une série de points séparés; interstries convexes, obsolètement ponctués. Pygidium grossièrement ponctué, squamulé.

Dessous, sur les côtés, grossièrement ponctué, les épisternes du métathorax assez fortement ponctués en avant. Hanches intermédiaires largement distantes. Segment anal avec une grande fovéole apicale remplie par une touffe de squamules.

♂. — Rostre plus court, en dessous avec un large et profond sillon dont les bords vers le milieu sont légèrement dilatés, subdentés. Pattes robustes, les fémurs tomenteux en dessous, les quatre antérieurs en outre ciliés; tibias ciliés en dedans, les cils plus courts aux extrémités.

Long.: 15-16 mm.

Guyane Française: St-Laurent du Maroni, Charvein, 1 ♂, 2 ♀♀ (ex LE MOULT).

Le *S. spadiceus* GYLL. a aussi l'écusson arrondi, mais d'après la description diffère de la présente espèce par plusieurs caractères.

Le ♂ est de coloration foncée, la tête noire, le rostre brun foncé.

***Metamasius scutellatus* n. sp. ♂.**

Ecusson demi-ovale, arrondi à son sommet foncé.

Elliptique; dessus rouge, avec un dessin noir, comprenant: sur le prothorax 5 bandes, la médiane large, les dorsales atteignant seulement le milieu, les latérales larges, mais de haut étroitement visibles; sur chaque élytre une bande sur les interstries 5-8, mais n'atteignant pas la base et obliquement échancrée extérieurement vers son milieu,

une raie sur le milieu du 3^e interstrie, une raie sur la base et une sur le tiers postérieur du 2^e; pattes rouges, les tarsi (et parfois les genoux) noirâtres; dessous noir avec une tache rouge sur le milieu du 1^{er} segment ventral et sur les épimères. Tous les points en dessus et en dessous, remplis par des squamules ocrées.

Rostre moins long que le prothorax, cylindrique, épais, assez fortement courbé, assez densément ponctué, fortement en arrière, finement en avant, la dilatation basale plus longue que large, dilatée en avant, profondément sillonnée, fovéolée à sa base; en dessous étroitement sillonné.

Prothorax peu plus long que large, non rétréci et les côtés parallèles jusqu'au milieu, en avant les côtés brusquement arqués-convergeants jusqu'à la tubulure, la base subtronquée de chaque côté du fort lobe médian arrondi, étroitement rebordée et précédée d'un sillon squamulé; impression antéscutellaire légère en V; tout le disque parsemé de points squamulés, relativement gros, très visibles, plus gros sur la tubulure.

Elytres en triangle allongé, se rétrécissant fortement en arrière, subtronqués ensemble au sommet, les épaules très obliques; peu convexes, les stries fines, leurs points gros, espacés, pupillés, les latérales interrompues, leurs points isolés, dans la bande noire; interstries convexes, obsolètement ponctué. Pygidium assez grossièrement ponctué, sétulosé, les soies courtes, jaunes.

Dessous à ponctuation forte, assez serrée sur la profonde impression médiane, les points assez gros sur les épisternes, la fovéole anale squamulée et sétulosée. Prosternum, entre les hanches, avec un petit tubercule aigu. Tibias postérieurs, dans le milieu, en dedans avec une touffe d'assez longs cils jaunes.

Long. : 9,5-10 mm.

Guyane Française : Nouveau Chantier, 2 ♂, ♂, (ex LE MOULT).
Par son écusson arrondi au sommet, cette espèce appartient au groupe de *M. spadiceus* GYLL.

***Metamasius tuberculipectus* n. sp.**

Prosternum muni devant les hanches d'un tubercule lamelliforme incliné et dirigé en avant.

Oblong, noir, le prothorax avec deux bandes rouges, arquées, chaque élytre avec trois taches rouges, formées de linéoles, la plus grande médiane, arquée extérieurement, la 2^e subbasale, près de l'écusson, la 3^e apicale; mat, les points du dessus et du dessous squamulés.

Rostre aussi long que le prothorax, robuste, comprimé, au sommet fortement recourbé, pointillé jusqu'au sommet, sa dilatation basale avec un sillon médian interrompu en arrière, n'atteignant pas la profonde fovéole basale. Tête très convexe, distinctement ponctué.

Prothorax plus long que large, tubuleux en avant, les côtés modérément arqués de la base à la tubulure, la base bisinuée et rebordée; marqué de points peu serrés mais assez gros, profonds, avec une large impression basale, peu profonde, atteignant ou dépassant le milieu. Ecusson triangulaire, noir.

Elytres peu plus larges que le prothorax, modérément rétrécis en arrière, les stries fortement ponctué, les interstries plans, microscopiquement ponctué.

Pattes foncées, d'un brun de poix ou rougeâtres. Métasternum assez grossièrement ponctué, même sur les épisternes, les points peu serrés. Pygidium, à son sommet pourvu d'un petit tubercule aigu et squamulé.

♂. — Pro- et mésosternum, les hanches antérieures et intermédiaires tomenteux; tibias brièvement ciliés en dedans, les antérieurs notablement dilatés vers leur tiers basal; impression du métasternum longue mais peu profonde. Rostre plus épais, en dessous sillonné.

Long. : 12-14 mm.

Guyane Française : St-Laurent du Maroni, 1 ♂, 2 ♀ ♀, types, (ex LE MOULT).

Colombie : Rio Gualiquia, 1 ♀ (F. APPOLINAIRE), variété.

Ce spécimen de Colombie diffère de ceux de Guyane par le sillon basal du rostre non interrompu, s'évanouissant dans la fovéole basale, le rostre, les pattes, les côtés du dessous en partie rouges, la tache basale des élytres atteignant l'épaule.

Le tubercule du prosternum (♂, ♀) permet de reconnaître aisément cette espèce.

***Metamasius brevinasus* n. sp.**

Dilatation basale du rostre très brusque, courte, pas plus longue que large, dilatée en avant, densément ponctué et sillonnée au milieu. Prosternum devant les hanches avec petit tubercule écrasé, lisse.

Oblong, allongé, noir, mat, le dessin rouge comprenant deux bandes latérales obliques, coudées vers le milieu et rapprochées en avant, devant l'écusson, deux linéoles divergentes, courtes; sur chaque élytre une tache humérale, deux taches discales, la 1^{re} petite, la 2^e sub-

médiane plus grande, un point sur le calus postérieur. Tarses élançés, d'un roux plus ou moins clair.

Rostre moins long que le prothorax, grêle, cylindrique, assez fortement arqué, lisse, luisant, imperceptiblement pointillé. Tête avec un pointillé fin et épars. Antennes avec les articles du funicule 3-6 globuleux.

Prothorax plus long que large, peu rétréci jusqu'au tiers antérieur et les côtés peu arqués, tubuleux et fortement rétréci en avant, la base bisinuée; subplan, avec une impression basale légère, ponctuée distinctement sur toute sa surface, les points peu serrés, tous tapissés de squamules grisâtres. Écusson lisse.

Elytres peu plus larges que le prothorax, modérément rétrécis en arrière, séparément arrondis au sommet, le bord apical étroitement ferrugineux; stries fines, obsolètement ponctuées; interstries plans, mats, imponctués. Pygidium à ponctuation fine, sa pubescence squamuleuse dense, jaune, hérissée sur les carènes.

Dessous à ponctuation fine, serrée sur le mésosternum, plus fine et écartée en arrière, nulle sur les épisternes métathoraciques. Hanches antérieures et intermédiaires tomenteuses.

♂. — Tibias munis en dedans d'une frange de pubescence très courte, couchée, plus longue aux postérieurs. Tubercule prosternal plus gros. Impression métasternale plus profonde et un peu plus fortement ponctuée.

Long. : 12-13 mm.

Pérou : Marcapata, types; Ht Pérou, Pérou mérid. (ma coll.)

Guyane Française St-Laurent du Maroni, 1 ♀ (ma coll.). Equateur : Mera, une ♀.

Variations : Pattes, tête et rostre rouges (Pérou, Equateur).

Linéoles rouges basales du prothorax rejoignant les latérales vers leur milieu, par contre absentes chez un spécimen. Taches des élytres de grandeur variable, les points des stries parfois visibles. Base des fémurs et côtés du métasternum tachés de rouge.

Malgré ces variations l'espèce est bien caractérisée par la dilatation basale et la gracilité du rostre.

Metamasius alternans n. sp. ♂.

Prosternum avec sa partie postcoxale surélevée, le lobe médian, intercoxal, plus élevé que les lobes terminaux. Tibias antérieurs en dedans bisinués et munis d'une frange de longs poils serrés et jaunes.

Oblong, peu convexe; dessous noir, mais avec le 5^e segment ventral,

une tache sur les côtés du métasternum, une sur les épimères et une sur les épisternes, une sur les flancs du prosternum rouges; rostre rouge, tête noire; prothorax noir avec deux larges bandes latérales étroitement séparées au sommet, deux linéoles médianes, basales en forme de V, rouges; écusson noir; élytres noirs avec trois fascies transversales rouges, composées de linéoles, la 1^{re} basale (interstries 2-4-6 et suivants), la 2^e médiane (interstries 2-3-4, 6-7-8-9), la 3^e apicale (interstries 2, 4, 5, 6), la suture rouge, noire au sommet; pattes avec les tibias et une partie des fémurs rouges.

Rostre moins long que le prothorax, fortement arqué, fortement comprimé latéralement, en avant luisant, avec un pointillé très fin et très épars, l'épaississement basal plus long que large, dilaté en avant, pointillé, avec une ligne médiane enfoncée et une grande et profonde fovéole basale; en dessous avec un large et profond sillon, crénelé ondulé sur ses bords. Tête mate, rugueuse, les points très serrés, assez grands mais superficiels.

Prothorax plus long que large, les côtés peu arqués de la base au milieu, plus fortement en avant, la base finement rebordée et sinuée; une impression antéscutellaire légère et courte, ses points espacés et un peu moins petits que ceux du disque, ces derniers très petits et épars, plus gros que sur la tubulure apicale.

Elytres triangulaires, assez allongés, fortement rétrécis en arrière, le calus huméral assez élevé; modérément convexes, les stries fines et ponctuées, les interstries alternativement plus convexes, obsolètement unisérialement ponctués.

Prosternum en avant, ses lobes postérieurs, les hanches antérieures et intermédiaires, tous les fémurs en dessous, tomenteux, jaunes. Métasternum avec son impression large et profonde, sa ponctuation forte et assez serrée, celle de ses épisternes éparse et fine.

Long. : 15 mm.

Equateur : Mera, 1 ♂, ma collection (ex STAUDINGER).

Metamasius elegantulus n. sp.

Rhomboidal, d'un brun noir, mat, la tête et le rostre d'un rouge sanguin, les pattes d'un rouge plus foncé; revêtu d'un enduit fin, grisâtre; orné en dessus d'un dessin d'un noir profond, velouté, comprenant : sur le prothorax une grande tache médiane, triangulaire, sur les flancs une grande tache triangulaire, sa moitié supérieure visible de haut, ces trois taches bordées par un étroit liseré d'un gris jaunâtre; sur les élytres un chevron antérieur, prolongé de chaque côté jusqu'à

la base sur le 2° interstrie, une petite tache derrière l'épaule, une grande tache marginale en demi-ovale irrégulier, un trait vers le sommet des interstries 1-5, tout ce dessin noir avec une bordure teintée de rouge vineux clair.

Rostre aussi long que le prothorax, épais, cylindrique, arqué, en avant obsolètement pointillé, la dilatation basale avec un fin sillon médian et une petite fovéole basale. Tête éparsément pointillée. Massue antennaire rouge (sauf au sommet).

Prothorax peu plus long que large, subtriangulaire, les côtes sub-parallèles seulement dans leur quart basal, ensuite convergents et peu arqués jusqu'à la tubulure apicale, cette dernière faible, la base fortement bisinuée; largement et peu profondément impressionné en arrière; tout le disque (sauf les taches noires) avec des points squamulés, peu serrés et bien nets. Ecusson triangulaire, peu plus long que large, noir, velouté, à sa base impressionné, à son sommet grisâtre.

Elytres triangulaires, courts, modérément rétrécis en arrière, séparément arrondis au sommet; peu convexes, le disque irrégulier, les interstries 2-5 relevés au sommet, le 3° à sa base élargi et fortement relevé, la base avec trois impressions, la médiane grande; stries fines, sinueuses, leurs points espacés, grands et pupillés; interstries irrégulièrement convexes, avec une série de points pupillés. Episternes métathoraciques ponctués.

Long. 11 mm.

Brésil, un spécimen (ex. C. BRUCH).

Metamasius semirubripes n. sp. ♀.

Oblong, brun de poix, le rostre et les pattes d'un rouge de sang vif, mais avec les trochanters, la moitié supérieure des fémurs, l'extrémité des tibias et des tarsi noirs. Points du dessus grands, ronds, tapissés d'un enduit jaunâtre, les intervalles des points mats. Points du dessous très grossiers, squamulés, ceux des épisternes moins gros et peu serrés.

Rostre moins long que le prothorax, robuste, cylindrique, arqué, très finement pointillé, luisant, sa dilatation basale aussi longue que large, dilatée en avant, au milieu profondément sillonnée et à sa base avec une grosse fovéole rugeuse. Tête noire, obsolètement pointillée.

Prothorax beaucoup plus long que large, ses côtés subrectilignes, de la base au milieu faiblement convergents, en avant plus fortement, la tubulure apicale faible, la base fortement bisinuée; peu convexe, avec une impression basale large, atteignant le milieu, dans son milieu

subcarénée; marqué de nombreux et gros points, plus serrés sur les côtés. Ecusson peu plus long que large, arrondi à son sommet, impressionné à sa base.

Elytres triangulaires, allongés, se rétrécissant fortement en arrière, au sommet ensemble subtronqués; faiblement convexes, les stries fines mais leurs points grands, entamant fortement les interstries (ceux du calus huméral beaucoup plus petits), séparés par des intervalles beaucoup plus grands que les points, les interstries irrégulièrement et faiblement convexes, vers leur base relevés et les stries profondes.

Tibias en dedans brièvement ciliés, les postérieurs plus longuement.

Long. : 15 mm.

Pérou : Chanchamayo, une ♀ (ex LE MOULT).

Rhodoaenus boliviensis n. sp.

Subcylindrique, noir, mat, le revêtement prumineux grisâtre, plus dense dans les points du dessus et sur le dessous, les élytres avec le sommet foncé, subdénudé, un point rond, noir, sur le milieu du 2° interstrie, un autre point noir sur les épaules.

Rostre un peu moins long que le prothorax, épais, modérément courbé, obsolètement pointillé en avant, sa dilatation basale pas plus longue que large, sillonnée au milieu et sur les côtés. Tête avec des points médiocres et épars.

Prothorax à peine aussi long que large, jusqu'au quart antérieur à peine rétréci et avec les côtés légèrement sinués en dedans en arrière du milieu, en avant brusquement et fortement rétréci, tubuleux au sommet, la base avec son lobe médian large, avancé, mais de chaque côté à peine sinuée; modérément convexe, avec une légère impression antéscutellaire, avec des points squamulés espacés mais bien visibles. Ecusson triangulaire plus long que large, mat,

Elytres un peu plus larges que le prothorax, de moitié plus longs que larges, se rétrécissant faiblement en arrière dès les épaules, ces dernières brièvement arrondies et un peu élevées; modérément convexes, légèrement impressionnés derrière le calus postérieur; stries fines, indistinctement ponctuées, interstries plans avec une série de points petits, espacés, pourvus de soies microscopiques. Pygidium avec des points râpeux, brièvement sétosulés.

Episternes métathoraciques avec des points peu grands mais profonds et espacés. Tous les fémurs brièvement ciliés.

♂. — Très peu différent de la ♀, son rostre un peu plus court et plus distinctement ponctué.

Long. : 13-14 mm.

Bolivie : Coroico, une longue série de spécimens, (ex STAUDINGER).

Cette espèce est voisine de *R. melanurus* KIRSH. (*Sphenophorus*) du Pérou dont elle diffère principalement par la forme du prothorax.

Rhodoaenus nigripes n. sp. (Faust in litt.).

Oblong, étroit, noir, en dessus velouté, le prothorax d'un rouge sanguin, à l'exception de la tubulure apicale, d'une large bande basale n'atteignant pas tout à fait les angles postérieurs, noires, les élytres avec un dessin orange comprenant : en avant deux grandes taches en dedans arrondies, séparées par les deux premiers interstries, une bande postmédiane, se rétrécissant dans son milieu, sur la suture d'un rouge foncé ; tout ce dessin orangé avec un liseré d'un rouge foncé, plus large sur le bord externe.

Rostre à peine aussi long que le prothorax, robuste, à sa base brusquement arqué, la partie antérieure obsolètement pointillée, luisante, la dilatation basale courte, étroitement sillonnée, en avant dilatée, ses angles antérieurs élevés, gibbeux. Tête légèrement conique, les yeux un peu convexes.

Prothorax beaucoup plus long que large, peu rétréci jusqu'au milieu, la base subtronquée ; devant la base avec une impression transversale en forme d'arc. Ecusson noir.

Elytres allongés, parallèles jusqu'au quart postérieur ; subcylindriques, légèrement impressionnés de chaque côté avant le sommet, les stries fines, distinctement ponctuées dans les parties colorées, les interstries plans.

Dessous et pattes luisants, les côtés finement ponctués.

♂. — Fémurs assez longuement ciliés en dessous.

Long. : 11-12 mm.

Pérou : Marcapata, 5 spécimens (ex STAUDINGER).

Rhodoaenus longicollis n. sp.

Allongé, d'un rouge ferrugineux, mat, les points du dessus remplis d'un enduit squamuleux grisâtre.

Rostre aussi long que le prothorax, fortement arqué, robuste, séparé du front par un sillon fovéole au milieu, la dilatation basale médiocre, aussi longue que large, obsolètement sillonnée, ponctuée, légèrement renflée de chaque côté au dessus de l'insertion antennaire, la partie antérieure du rostre mate, obsolètement ponctuée. Antennes grêles, le 2^e article du funicule notablement plus long que le 1^{er}, grêle, la

massue grosse, ovale. Tête luisante, glabre, à ponctuation assez profonde et serrée, le front mat, squamulé.

Prothorax subconique, plus de moitié plus long que large, ses côtés de la base au milieu presque parallèles, le resserrement apical faible, la base subtronquée, les angles postérieurs droits ; convexe, devant la base avec une grande impression transversalement ovale et profonde ; points petits, épars, un peu plus gros sur les côtés. Ecusson peu plus long que large, arrondi à son sommet.

Elytres deux fois environ aussi longs que larges, peu plus larges que le prothorax, les épaules très obliquement arrondies, en arrière les côtés modérément convergents jusqu'au cinquième postérieur, au sommet brièvement arrondis ensemble ; convexes, impressionnés autour de l'écusson, le calus postérieur distinct et suivi d'une courte mais profonde impression ; stries très fines, obsolètement ponctuées mais squamulées, grisâtres ; interstries plans, en arrière avec des points assez grands mais superficiels et grisâtres. Pygidium squamulé, jaunâtre.

Pattes élancées. Dessous, sur les côtés mat, les points épars, superficiels, les épisternes avec quelques points.

♂. — Rostre en dessous, au sommet légèrement renflé, obtusément et brièvement denté. Fémurs en dessous avec des cils courts et espacés ; impression métasternale profonde, luisante, le segment anal avec une profonde fovéole apicale et rugueuse.

Long. : 13 mm.

Equateur, sans localité précise, une paire (ex DONCKIER).

Rhodoaenus apicalis n. sp. (1).

Oblong, convexe, d'un noir de jais, le prothorax et les élytres en majeure partie d'un rouge de sang, le prothorax avec le resserrement apical et une bande basale étroite, s'élargissant sur les angles latéraux, noirs, les élytres avec une bande basale étroite, élargie autour de l'écusson et sur les calus huméraux, une large tache recouvrant le tiers apical, noires. Dessous avec un léger enduit cendré, plus dense dans les points.

Rostre coudé devant l'insertion antennaire, aussi long que le prothorax, séparé du front par un fin sillon transversal et une fovéole médiane, sa dilatation basale avec une fine ligne médiane et de chaque côté trois

(1) Au genre *Rhodoaenus* doivent être rattachés :

Sphenophorus Tornowi BRÈTHES.

Sphenophorus suturalis GYLL.

Sphenophorus laetus ER.

séries de points, la partie rétrécie légèrement comprimée, arquée, pointillée à sa base, lisse en avant. Tête finement pointillée.

Prothorax peu plus long que large, au milieu à peu près aussi large qu'à la base, en arrière les côtés légèrement sinués en dedans, la base fortement bisinuée; convexe, devant la base avec une impression transversale, légèrement arquée, n'atteignant pas les cotés; ponctuation indistincte sur le disque, fine et visible près des angles, sur les bords latéraux et sur les flancs.

Elytres peu plus larges que le prothorax, se rétrécissant faiblement en arrière jusqu'au niveau des calus postérieurs, arrondis ensemble au sommet; convexes, les stries fines, leurs points serrés, très petits dans les parties noires, plus gros mais moins visibles dans les parties rouges; interstries plans unisérialement mais microscopiquement pointillés.

Pattes luisantes, les fémurs brièvement ciliés en dedans. Métasternum sur ses côtés et ses épisternes avec des points épars, superficiels.

Premier segment ventral avec une carène médiane.

Long. : 10 mm.

Equateur : Tandapi, 2-VII-1931 (R. BENOIST), une ♀.

Sphenophorus geminatus n. sp.

Rhomboidal, mat, noir, les élytres marrons, le revêtement vernissé, sur le prothorax visible sur les côtés, grisâtres, sur la tête, la base du rostre, les pattes, le dessous dense, argileux.

Rostre moins long que le prothorax, modérément arqué, fortement comprimé latéralement, dilaté au sommet, éparsément pointillé, sa dilatation basale courte, pas plus longue que large, profondément sillonnée au milieu et ainsi que la tête, éparsément pointillée; examiné de profil élargi au sommet.

Prothorax peu plus long que large, jusqu'au quart antérieur peu rétréci et les côtés faiblement arqués, la tubulure apicale avec un profond sillon sur les côtés, la base bisinuée; avec quatre sillons larges, densément et profondément ponctués, séparant trois côtes larges, peu élevées, finement ponctuées. Ecusson peu plus long que large, à son sommet obtus.

Elytres subtriangulaires, un peu plus longs que larges, modérément rétrécis en arrière, subtronqués ensemble au sommet; convexes, les stries fines, géminées, leurs points assez gros, médiocrement serrés, les 7°, 8° réduites à des lignes de points; interstries impairs (sutural non compris) plans, les pairs plus larges, assez fortement convexes, tous finement pointillés,

Dessous à points épars, assez espacés, médiocres, sur les épisternes métathoraciques plus gros; milieu de l'abdomen noir, dénudé, luisant. Pattes éparsément ponctuées; fémurs antérieurs vers leur base, ainsi que toutes les hanches, avec un petit pinceau de 2-3 soies squamuleuses; fémurs intermédiaires frangés vers leur base; tous les tibias brièvement ciliés en dedans.

♂. — Impression métasternale profonde, grossièrement ponctuée, le milieu de l'abdomen pubescent, le 5^e segment avec une impression triangulaire, densément ponctuée, le pygidium avec deux touffes squamuleuses.

Long. : 15-16 mm.

Brésil : Santa Catarina, ♂, ♀; Joinville ♀.

Espèce de forme massive, plus large que celle de *S. aequalis* GYLL.

Le pédoncule du sous-menton est profondément sillonné et le 3^e article tarsal large, mais en dessous spongieux seulement sur les bords.

Sphenophorus brasiliensis n. sp.

Oblong, noir, le revêtement d'un jaune terreux.

Rostre moins long que le prothorax, arqué, fortement comprimé, finement pointillé, sa dilatation basale peu brusque, peu plus longue que large, profondément sillonné au milieu, sa fovéole basale petite. Tête luisante, avec un pointillé peu serré.

Prothorax beaucoup plus long que large, les côtés à peine arqués, brusquement rétréci vers son quart antérieur, le bord antérieur sinué, la base faiblement bisinuée; disque inégal, avec cinq côtes dénudées et plus ou moins ponctuées, la médiane étroite, droite, les deux dorsales sinueuses, s'écartant dans le milieu, parallèles aux extrémités, les latérales courtes, arquées vers l'intérieur, atteignant le milieu, les intervalles des côtes déprimés, grossièrement ponctués. Ecusson étroit.

Elytres peu plus larges que le prothorax, se rétrécissant en arrière dès les épaules, tronqués au sommet; modérément convexes, les stries très fines, imponctuées, les interstries alternativement plans et costiformes, la suture peu convexe.

Dessous densément ponctué, les points des épisternes petits et espacés.

Tarses avec le 3^e article plus large que le précédent.

Long. : 15-16 mm.

Brésil : Mendès, prov. de Rio de Janeiro; Sao Paulo.

Argentine : Rio Parana, Terr. des Missions (E. WAGNER). 8^e spécimens.

séries de points, la partie rétrécie légèrement comprimée, arquée, pointillée à sa base, lisse en avant. Tête finement pointillée.

Prothorax peu plus long que large, au milieu à peu près aussi large qu'à la base, en arrière les côtés légèrement sinués en dedans, la base fortement bisinuée; convexe, devant la base avec une impression transversale, légèrement arquée, n'atteignant pas les cotés; ponctuation indistincte sur le disque, fine et visible près des angles, sur les bords latéraux et sur les flancs.

Elytres peu plus larges que le prothorax, se rétrécissant faiblement en arrière jusqu'au niveau des calus postérieurs, arrondis ensemble au sommet; convexes, les stries fines, leurs points serrés, très petits dans les parties noires, plus gros mais moins visibles dans les parties rouges; interstries plans unisérialement mais microscopiquement pointillés.

Pattes luisantes, les fémurs brièvement ciliés en dedans. Métasternum sur ses côtés et ses épisternes avec des points épars, superficiels.

Premier segment ventral avec une carène médiane.

Long.: 10 mm.

Equateur: Tandapi, 2-VII-1931 (R. BENOIST), une ♀.

Sphenophorus geminatus n. sp.

Rhomboidal, mat, noir, les élytres marrons, le revêtement vernissé, sur le prothorax visible sur les côtés, grisâtres, sur la tête, la base du rostre, les pattes, le dessous dense, argileux.

Rostre moins long que le prothorax, modérément arqué, fortement comprimé latéralement, dilaté au sommet, éparsément pointillé, sa dilatation basale courte, pas plus longue que large, profondément sillonnée au milieu et ainsi que la tête, éparsément pointillée; examiné de profil élargi au sommet.

Prothorax peu plus long que large, jusqu'au quart antérieur peu rétréci et les côtés faiblement arqués, la tubulure apicale avec un profond sillon sur les côtés, la base bisinuée; avec quatre sillons larges, densément et profondément ponctués, séparant trois côtes larges, peu élevées, finement ponctuées. Ecusson peu plus long que large, à son sommet obtus.

Elytres subtriangulaires, un peu plus longs que larges, modérément rétrécis en arrière, subtronqués ensemble au sommet; convexes, les stries fines, géminées, leurs points assez gros, médiocrement serrés, les 7°, 8° réduites à des lignes de points; interstries impairs (sutural non compris) plans, les pairs plus larges, assez fortement convexes, tous

Dessous à points épars, assez espacés, médiocres, sur les épisternes métathoraciques plus gros; milieu de l'abdomen noir, dénudé, luisant. Pattes éparsément ponctuées; fémurs antérieurs vers leur base, ainsi que toutes les hanches, avec un petit pinceau de 2-3 soies squamuleuses; fémurs intermédiaires frangés vers leur base; tous les tibias brièvement ciliés en dedans.

♂. — Impression métasternale profonde, grossièrement ponctuée, le milieu de l'abdomen pubescent, le 5° segment avec une impression triangulaire, densément ponctuée, le pygidium avec deux touffes squamuleuses.

Long.: 15-16 mm.

Brésil: Santa Catarina, ♂, ♀; Joinville ♀.

Espèce de forme massive, plus large que celle de *S. aequalis* GYLL.

Le pédoncule du sous-menton est profondément sillonné et le 3° article tarsal large, mais en dessous spongieux seulement sur les bords.

Sphenophorus brasiliensis n. sp.

Oblong, noir, le revêtement d'un jaune terreux.

Rostre moins long que le prothorax, arqué, fortement comprimé, finement pointillé, sa dilatation basale peu brusque, peu plus longue que large, profondément sillonné au milieu, sa fovéole basale petite. Tête luisante, avec un pointillé peu serré.

Prothorax beaucoup plus long que large, les côtés à peine arqués, brusquement rétréci vers son quart antérieur, le bord antérieur sinué, la base faiblement bisinuée; disque inégal, avec cinq côtes dénudées et plus ou moins ponctuées, la médiane étroite, droite, les deux dorsales sinueuses, s'écartant dans le milieu, parallèles aux extrémités, les latérales courtes, arquées vers l'intérieur, atteignant le milieu, les intervalles des côtes déprimés, grossièrement ponctués. Ecusson étroit.

Elytres peu plus larges que le prothorax, se rétrécissant en arrière dès les épaules, tronqués au sommet; modérément convexes, les stries très fines, imponctuées, les interstries alternativement plans et costiformes, la suture peu convexe.

Dessous densément ponctué, les points des épisternes petits et espacés.

Tarses avec le 3° article plus large que le précédent.

Long.: 15-16 mm.

Brésil: Mendès, prov. de Rio de Janeiro; Sao Paulo.

Argentine: Rio Parana, Terr. des Missions (E. WAGNER). 8° spé-

séries de points, la partie rétrécie légèrement comprimée, arquée, pointillée à sa base, lisse en avant. Tête finement pointillée.

Prothorax peu plus long que large, au milieu à peu près aussi large qu'à la base, en arrière les côtés légèrement sinués en dedans, la base fortement bisinuée; convexe, devant la base avec une impression transversale, légèrement arquée, n'atteignant pas les cotés; ponctuation indistincte sur le disque, fine et visible près des angles, sur les bords latéraux et sur les flancs.

Elytres peu plus larges que le prothorax, se rétrécissant faiblement en arrière jusqu'au niveau des calus postérieurs, arrondis ensemble au sommet; convexes, les stries fines, leurs points serrés, très petits dans les parties noires, plus gros mais moins visibles dans les parties rouges; interstries plans unisérialement mais microscopiquement pointillés.

Pattes luisantes, les fémurs brièvement ciliés en dedans. Méta sternum sur ses côtés et ses épisternes avec des points épars, superficiels.

Premier segment ventral avec une carène médiane.

Long.: 10 mm.

Equateur: Tandapi, 2-VII-1931 (R. BENOIST), une ♀.

Sphenophorus geminatus n. sp.

Rhomboidal, mat, noir, les élytres marrons, le revêtement vernissé, sur le prothorax visible sur les côtés, grisâtres, sur la tête, la base du rostre, les pattes, le dessous dense, argileux.

Rostre moins long que le prothorax, modérément arqué, fortement comprimé latéralement, dilaté au sommet, éparsément pointillé, sa dilatation basale courte, pas plus longue que large, profondément sillonnée au milieu et ainsi que la tête, éparsément pointillée; examiné de profil élargi au sommet.

Prothorax peu plus long que large, jusqu'au quart antérieur peu rétréci et les côtés faiblement arqués, la tubulure apicale avec un profond sillon sur les côtés, la base bisinuée; avec quatre sillons larges, densément et profondément ponctués, séparant trois côtes larges, peu élevées, finement ponctuées. Ecusson peu plus long que large, à son sommet obtus.

Elytres subtriangulaires, un peu plus longs que larges, modérément rétrécis en arrière, subtronqués ensemble au sommet; convexes, les stries fines, géminées, leurs points assez gros, médiocrement serrés, les 7°, 8° réduites à des lignes de points; interstries impairs (sutural non compris) plans, les pairs plus larges, assez fortement convexes, tous finement pointillés.

Dessous à points épars, assez espacés, médiocres, sur les épisternes métathoraciques plus gros; milieu de l'abdomen noir, dénudé, luisant. Pattes éparsément ponctuées; fémurs antérieurs vers leur base, ainsi que toutes les hanches, avec un petit pinceau de 2-3 soies squamuleuses; fémurs intermédiaires frangés vers leur base; tous les tibias brièvement ciliés en dedans.

♂. — Impression métasternale profonde, grossièrement ponctuée, le milieu de l'abdomen pubescent, le 5° segment avec une impression triangulaire, densément ponctuée, le pygidium avec deux touffes squamuleuses.

Long.: 15-16 mm.

Brésil: Santa Catarina, ♂, ♀; Joinville ♀.

Espèce de forme massive, plus large que celle de *S. aequalis* GYLL.

Le pédoncule du sous-menton est profondément sillonné et le 3° article tarsal large, mais en dessous spongieux seulement sur les bords.

Sphenophorus brasiliensis n. sp.

Oblong, noir, le revêtement d'un jaune terreux.

Rostre moins long que le prothorax, arqué, fortement comprimé, finement pointillé, sa dilatation basale peu brusque, peu plus longue que large, profondément sillonnée au milieu, sa fovéole basale petite. Tête luisante, avec un pointillé peu serré.

Prothorax beaucoup plus long que large, les côtés à peine arqués, brusquement rétréci vers son quart antérieur, le bord antérieur sinué, la base faiblement bisinuée; disque inégal, avec cinq côtes dénudées et plus ou moins ponctuées, la médiane étroite, droite, les deux dorsales sinueuses, s'écartant dans le milieu, parallèles aux extrémités, les latérales courtes, arquées vers l'intérieur, atteignant le milieu, les intervalles des côtes déprimés, grossièrement ponctués. Ecusson étroit.

Elytres peu plus larges que le prothorax, se rétrécissant en arrière dès les épaules, tronqués au sommet; modérément convexes, les stries très fines, imponctuées, les interstries alternativement plans et costiformes, la suture peu convexe.

Dessous densément ponctué, les points des épisternes petits et espacés.

Tarses avec le 3° article plus large que le précédent.

Long.: 15-16 mm.

Brésil: Mendès, prov. de Rio de Janeiro; Sao Paulo.

Argentine: Rio Parana, Terr. des Missions (E. WAGNER). 8 spécimens.

Sphenophorus Bruchi n. sp.

Ovale rhomboidal, noir, le revêtement d'un jaune terreux.

Rostre moins long que le prothorax, épais, fortement comprimé, modérément arqué, en avant dénudé, pointillé, luisant, sa dilation basale forte, aussi longue que large, tricarénée, squamulée, avec une petite fovéole basale. Tête d'un noir profond, mate, ses points petits et épars. Massue antennaire subconique et plus longue que large.

Prothorax un peu plus long que large, ses côtés parallèles et rectilignes de la base au milieu, en avant arqués convergents, la tubulure apicale faible en dessus, pourvue sur les côtés d'un profond sillon; disque un peu inégal, avec une étroite carène médiane, transversalement élargie en son milieu, obsolète derrière l'élargissement, distincte vers la base; pourvu de points squamulés assez gros mais épars. Ecusson noir, dénudé, lisse, arrondi à son sommet.

Elytres triangulaires, peu plus longs que larges, fortement rétrécis en arrière, tronqués au sommet; épaules très obliquement arrondies, stries fines, obsolètement ponctuées, squamulées; suture plane; interstries alternativement plus convexes, irréguliers; côtés avec trois impressions transversales déterminant des ondulations discales interrompues par la suture et l'interstrie adjacent.

Pattes robustes; fémurs très brièvement ciliés en dedans, près de leur base avec une petite touffe de soies plus longues; fémurs antérieurs noirs sur leur moitié basale interne, le reste squamulé. Tarses avec le 3^e article à peine plus large que précédent.

Long. : 14,5 mm.

Argentine: prov. Jujuy, 1-1920 (Volcan Weiser, C. BRUCH, n° 191).

Sphenophorus napoanus n. sp. ♂.

Oblong, noir, mat, convexe, le revêtement d'un gris jaunâtre, dense sur les élytres, ailleurs condensé dans les points.

Rostre moins long que le prothorax, modérément arqué, robuste, modérément comprimé, en avant glabre, lisse, très finement pointillé, en dessous sillonné longitudinalement et au sommet de chaque côté brièvement prolongé, sa dilatation basale brusque, forte, aussi longue que large, ponctuée, sillonnée au milieu, avec deux carènes divergentes en avant, fovéolée à sa base. Tête mate, glabre, en arrière ponctuée, en avant de chaque côté, près des yeux, avec une impression ponctuée et squamulée.

Prothorax subovale, peu plus long que large au milieu, les côtés

arqués dans le milieu, droits et convergents en arrière, le resserrement apical étroit, sur ses côtés avec un profond sillon, la base légèrement oblique de chaque côté du milieu, les angles postérieurs faiblement obtus; convexe, avec une élévation médiane caréniforme, peu élevée, sillonnée vers son milieu et se terminant en arrière dans une impression légère; disque un peu inégal, les points gros et serrés sur les côtés et dans l'impression basale, épars et moindres sur le disque, squamulés. Ecusson triangulaire, à peine plus long que large.

Elytres courts, se rétrécissant fortement en arrière, largement arrondis ensemble au sommet, les épaules assez brièvement arrondies; convexes, les stries très fines, leurs points superficiels, assez grands, squamulés; interstries en partie plans, en partie irrégulièrement convexes, ponctués; disque avec quelques rugosités transversales, vers le calus postérieur plus fortes. Pygidium grossièrement ponctué.

Pattes et dessous mats. Métasternum sur ses côtés avec seulement quelques points, ses épisternes avec des points plus gros et assez serrés.

Long. : 10 mm.

Equateur: El Napo, IX-1931, 1 ♂ (R. BENOIST).

Sphenophorus semicalvus n. sp. ♂.

Oblong, noir de jais, luisant; le revêtement dans les sillons du prothorax et sur les élytres délicat, teinté de jaune; les antennes d'un brun ferrugineux.

Rostre moins long que le prothorax, presque droit, brièvement arqué près du sommet, comprimé, noir luisant, densément pointillé presque jusqu'au sommet, sa dilation basale plus longue que large, sans sillon médian, mais avec trois fovéoles basales, l'une médiane, les autres latérales, devant les yeux. Tête luisante, éparsément pointillée.

Prothorax beaucoup plus long que large, ses côtés parallèles jusqu'au tiers antérieur, la tubulure apicale densément ponctuée, la base subbisinuée; surmonté de trois carènes aplaties, séparées par des sillons profonds, la carène médiane élargie du sommet au milieu, les latérales subparallèles, en dehors, vers leur milieu, émettant un rameau oblique et atteignant l'angle postérieur; les carènes très luisantes, très finement et éparsément pointillées, mais avec leurs bords échancrés par de gros points; dans les sillons les points détachés, assez gros. Ecusson acuminé, lisse.

Elytres semi-elliptiques; modérément convexes; calus huméral, calus postérieur, suture, interstries 3-4-5, 8-9, en avant plus ou moins longuement glabres et luisants; stries fines, leurs points ronds, assez

gros, peu serrés ; interstries (7^e plan excepté) fortement convexes, carénés au moins en avant ; parties luisantes très finement pointillées.

Dessous glabre luisant, les côtés et les épisternes grossièrement ponctués, l'impression métasternale très profonde. Pattes glabres. Fémurs intermédiaires et postérieurs avec une frange étroite de dense pubescence squamuleuse fauve, les hanches antérieures et intermédiaires tomenteuses ; tibias postérieurs avec une fine et courte pubescence ; 3^e article tarsal plus large que le 2^e.

Long. : 12 mm.

Brésil : Rio Grande do Sol, 1 ♂.

Sphenophorus vilis n. sp.

Oblong, noir, en dessus mat, les côtes peu luisantes, en dessous luisant au milieu, sur les côtés mat, les points tomenteux d'un gris terreux.

Rostre aussi long que le prothorax, régulièrement mais faiblement arqué, cylindrique, sa ponctuation en avant très fine et éparse, en arrière un peu plus forte, la dilatation basale médiocre, aussi longue que large, avec une ligne médiane et une petite fovéole basale. Tête alutacée avec quelques petits points près des yeux.

Prothorax beaucoup plus long que large, parallèle jusqu'au milieu, graduellement rétréci, arqué en avant, sa tubulure apicale faible, son sillon latéral médiocre et ne traversant pas en dessous, la base légèrement bisinuée ; avec 5 impressions peu profondes, la médiane large, élargie vers le milieu, avec une ligne médiane subcaréniforme imponctuée, les points assez gros, squamulés, irréguliers, plus serrés sur les côtés de la dilatation antérieure ; de chaque côté une impression latérale, médiane, semi-oblongue, ponctuée, et une autre oblongue, sub-basale entre la médiane et la latérale, ponctuée ; intervalles des impressions peu élevés et très finement pointillés.

Ecusson faiblement acuminé au sommet.

Elytres de moitié environ plus longs que larges, peu rétrécis jusqu'au tiers postérieurs, plus fortement ensuite, subtronqués ensemble au sommet ; convexes, le calus huméral un peu luisant, lisse ; largement et profondément striés, mais les points des stries peu visibles ; interstries étroits, fortement convexes, très finement pointillés, les 2^e, 4^e, 6^e, distinctement élargis vers leur base.

Tarses d'un brun de poix, le 3^e article pas plus large que le 2^e.

Long. : 14-15 mm.

Argentine : Mendoza, C. S. Reed (C. BRUCH, n° 194).

Uruguay : Montevideo (J. TREMOLERAS).

Synonymies nouvelles d'*Hydraena*

PAR

A. D'ORCHYMONT

Grâce à l'amicale obligeance de M. R. OBERTHUR, qui m'a communiqué toutes les *Hydraena* du groupe *grandis* figurant dans la collection KUWERT, je suis à même de montrer combien peu logiquement cet auteur a interprété ce phylum dans *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 1888, p. 115 et dans *Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn*, 28, 1890, p. 279 à 282 (aussi *Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren*, Heft XIX, 1890, qui n'est qu'une réimpression de ce dernier travail, p. 124-126).

Et d'abord l'*Hydraena parvicollis* KUWERT, 1890 (? *grandis* REITTER, pars) démembrée donc, quoique avec doute, de l'espèce de REITTER. Aucun exemplaire ne figure sous ce nom, ni sous celui de *grandis*, dans la collection de l'auteur. A la place il y a d'après M. OBERTHUR et d'après l'étiquette de fond de boîte calligraphiée, que je n'ai pas vue, une *H. parallela* marquée seulement "Thessalia, 84, Volo, Stussiner" : il s'agit d'un ♂ ; l'élytre droit s'est perdu à la suite d'un montage fragile sur une épingle-bayonnette. J'ai réparé l'exemplaire et l'ai collé sur un support en carton, après avoir extrait l'édéage.

Ce nom *parallela* n'a pas été publié. Mais il est facile de voir, en confrontant la diagnose de *parvicollis* avec l'insecte, que celui-ci est un exemplaire typique de cette dernière *Hydraena* [cf. "Flügeldecken circa 2 1/2 bis 3 Mal so lang als breit, ziemlich *parallel*" (d'où le nom primitif *parallela*, sans doute, modifié en *parvicollis* au moment de la publication), "hinten breit abgerundet, den letzten Leibring freilassend...", etc.].

Cet insecte faisait partie de la série qui a servi à REITTER à établir sa *grandis*, en 1885 (REITTER : "Bei Volo in Thessalien im