

NOTE RECTIFICATIVE

CONCERNANT LE

Nouveau genre *Paracyclops*

(HYM. PLATYGASTERINAE)

PAR

H. MANEVAL

Dans le 1^{er} fascicule des *Bulletin et Annales* de cette année, j'ai donné, page 56, la description d'une espèce nouvelle de *Platygasterinae* (Hym.), dont les caractères particuliers m'ont amené à créer pour elle le genre nouveau *Paracyclops*.

Or notre collègue M. LERUTH me fait observer à juste titre que ce nom a déjà été employé par CLAUS pour un genre de Crustacés Copépodes.

Pour me conformer aux règles de la nomenclature, je substituerai donc à ma première appellation celle de *Urocyclops*, *nom. nov.*, qui fait allusion à la conformation du dernier segment abdominal du génotype ♀.

SECTION D'ENTOMOLOGIE APPLIQUÉE

Réunion mensuelle du 15 février 1936

Présidence de M. Ch. PYNAERT, Président de la Section.

— La séance est ouverte à 17 h. 10.

Excusé : M. H. SCHEERLINCK.

Communications. — M. W. E. VAN DEN BRUEL signale l'apparition en Belgique de *Trogoderma granarium* EVERTS (syn. : *T. kaprah* ARROW.), dont il montre les larves rongant du malt. Il n'a pas encore trouvé les insectes adultes. Ce Dermestide, voisin des *Anthrenus*, est originaire des Indes orientales, où il occasionne de graves dégâts aux grains emmagasinés. La présence de *T. granarium* fut constatée en 1917 dans les docks de Londres; l'insecte envahit dès 1921 les silos des brasseries du centre de l'Angleterre, puis il apparut en Allemagne : Berlin, Dusseldorf et Dortmund en 1922, Hambourg, Brême et d'autres ports de l'Allemagne du Nord ensuite; il fut aussi capturé à Rotterdam dans des marchandises d'importation. La larve de *Tr. granarium* exige une température relativement élevée pour se développer normalement, par contre elle est très résistante aux conditions d'existence défavorables. Les silos de malt constituent des milieux particulièrement propices à la multiplication de l'insecte. Les brasseurs et malteurs doivent dépister le plus rapidement possible ce nouveau déprédateur s'il s'introduit dans leurs usines. La larve de *Tr. granarium* est caractérisée par la présence d'un abondant revêtement de longs poils jaunes clairs, elle atteint une longueur de 4 à 5 mm.; l'adulte est de petite taille, de forme très ramassée, son corselet est noirâtre et ses élytres sont rousses, marquées de plages plus sombres. La femelle mesure 2 à 2,5 mm. de longueur; le mâle est plus petit, il ne compte que 1 à 1,5 mm.

Les locaux infestés doivent être soigneusement traités aux insecticides gazeux.

Discussion : MM. E. DE JONGHE D'ARDOYE, A. LAMEERE, R. MAYNÉ, Ch. PYNAERT.