

Description d'une nouvelle espèce africaine DU GENRE *MUSCA*

PAR LE

D^R J. VILLENEUVE DE JANTI

Musca lasiopa n. sp.

♀. — Semblable par la taille et les yeux velus à *Musca dasyops* STEIN avec lequel je l'ai trouvé confondu, mais de coloration quelque peu différente : 1° plus sombre sur l'abdomen où les macules blanches médianes sont mieux conservées que les voisines ; 2° les 4 bandes noires du thorax presque fusionnées deux à deux chez *M. dasyops* sont disjointes ici en sorte qu'il existe sur le devant du thorax 3 bandes blanches subégales ; 3° les parafaciaux sont obscurs et laissent voir une macule de reflet blanchâtre. Il y a de gros palpes noirs et le front est moins large que celui de la ♀ de *M. dasyops* ; les ailes ne sont pas hyalines mais légèrement rouillées.

D'autre part, *M. lasiopa* se distingue aussitôt par 2 + 4 soies dorso-centrales également développées et par les particularités suivantes : rémigium (stem vein des auteurs américains) portant plusieurs poils sétuleux espacés, nœud de la nervure III nanti de 1-2 cils, nervure III ciliée inférieurement dans sa moitié basale.

2 ♀ des forêts du Mont Kénya.

Myodaires supérieurs africains RÉCOLTÉS A KAMPALA (UGANDA)

PAR M. H. HARGREAVES

ET ÉTUDIÉS

PAR LE

D^R J. VILLENEUVE DE JANTI

Ces matériaux m'ont été confiés par M. G. A. K. MARSHALL, Directeur de l'Imperial Institute of Entomology, à Londres, et ils lui ont été retournés.

Ils comprennent :

1. *Bogosiella fasciata* F. — Nombreux exemplaires des deux sexes, obtenus, en mai-juin, de *Dysdercus nigrofasciatus*, de *Dysd. supersticiosus* et d'autres *Dysdercus* non déterminés. *Bogosiella pomeroi* n. sp., obtenu dans les mêmes conditions et décrit par moi autrefois, est synonyme de *B. fasciata* F. après comparaison avec le type.

2. *Cadurcia lucens* VILLEN. — Une ♀, en juin. *Sturmia versicauda* CURRAN (1934) paraît bien en être synonyme.

3. — Plusieurs espèces d'*Actia* ayant toutes les palpes, la base des antennes chez les ♀, les balanciers, jaunes ; le 2° article du chète antennaire est modérément allongé, le 2° segment abdominal a 2 soies marginales médianes. La coloration du thorax et du scutellum est grise, le dernier ayant souvent un peu de roux à l'apex.

Elles se répartissent comme suit :

1. — 2 espèces d'*Actia* ont les soies apicales du scutellum réduites à 2 microchètes croisés. La nervure I de l'aile est entièrement ciliée en dessus, et, dans sa portion distale, en dessous ; les nervures III et V sont aussi ciliées en dessus. Cette ciliation est faite, à la face supérieure de l'aile, de cils nombreux, égaux, équidistants. Ces 2 espèces sont :