

sur les flancs. Hypopyge (fig. 38) noir, épais et court, les appendices externes courts, en lamelle triangulaire courtement ciliée, avec un appendice en massue. Hanche I jaune, II et III noires, toutes à vestiture exclusivement noire. Trochanters jaunes. Pattes jaunes, fémur III noir à l'apex; tibia III noir à l'extrême apex, tarsi noirs à partir de l'apex du protarse. Patte I: tibia, face dorsale, 3 chètes antérieurs, 2 postérieurs, pas de soie apicoventrale. Tarse un peu plus long que le tibia, épais, les articles aplatis à la face ventrale et munis d'une peluche claire. Patte II: fémur, un préapical; face ventrale, ligne postérieure, et occupant les 2/3 basilaires, une série de 4-5 soies noires, rigides, la plus longue égale à la demi longueur du fémur. Tibia, face dorsale, 3 antérieurs, 4 postérieurs; face ventrale, 2 antérieurs. Tarse grêle. Patte III: fémur, un préapical. Tibia, face dorsale, 4 antérieurs, 5 postérieurs, pas de vrai chète ventral. Protarse égal aux 4/5 de l'article suivant, épais, les autres articles grêles. Ailes (fig. 39) enfumées, nervures noires. Section apicale de la 4^e, dans son ensemble, doucement arquée convexe vers le bord postérieur de l'aile. Transverse postérieure plus longue que le segment apical de la 5^e. Balanciers jaunes. Cuillerons jaunes à cils noirs. Long.: 4 mm.

Femelle inconnue.

Patrie: Naraikkadu, 2500-3000 ft. Tinnevely Dt. S. India B.M.-C. M. Exped.

Type au B. M.

Sciopus occultus PAR. Solomon. Is. Malaita, IV, 33, R. A. LEVER.

Dryopidae du Congo belge

PAR

J. DELÈVE

Les *Dryopidae* du Congo belge sont encore fort mal connus. En effet, à l'heure actuelle, trois espèces seulement ont été décrites provenant de cette région. Ce sont: *Potamophilinus notabilis* GROUV. (1918), *Stenelmis Clavareau* GROUV. (1900) et *Helmis illustris* GROUV. (1902).

Nos connaissances sont un peu plus avancées en ce qui concerne l'Afrique orientale, grâce aux recherches de MM. ALLUAUD et JEANNEL. Plus récemment, M. ALLUAUD a fait connaître aussi quelques espèces de l'Afrique occidentale française. Mais tout porte à croire que le catalogue des *Dryopidae* de la faune éthiopienne devra encore être considérablement augmenté. Les patientes et fructueuses recherches de mon excellent collègue et ami M. Alb. COLLART y apportent une première contribution. Le but du présent travail est de faire connaître quelques-unes des espèces récoltées par lui au Mayumbe.

Potamodytes mucronatus n. sp.

Environ trois fois et un cinquième plus long que large dans sa plus grande largeur, noir un peu olivâtre, pruinosité cendrée entremêlée de poils sombres, très courts, dressés en arrière; antennes, tibias et tarsi moins obscurs.

Mâle. — Tête très finement et très densément ponctuée; une impression arrondie au-dessus de l'insertion des antennes; tempes développées, plus courtes cependant que la longueur des yeux. Pronotum une fois et demie plus large à la base que long, rétréci d'un tiers au sommet, coupé au cinquième antérieur d'un sillon transversal marqué; densément et finement ponctué; angles antérieurs obtus, légèrement dirigés en dehors; angles postérieurs explanés, aigus, à sommet arrondi; bords latéraux rebordés; strie longitudinale médiane

imperceptible, bifurquée dans la partie basilaire pour aboutir aux deux points enfoncés devant l'écusson, arrêtée antérieurement au sillon transversal; de chaque côté, près des angles postérieurs, une impression longitudinale atteignant environ la moitié de la longueur du pronotum. Écusson en triangle curviligne, aussi long que large. Élytres de la largeur du pronotum à la base, deux fois et un cinquième environ aussi longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur; très faiblement élargis jusqu'au premier tiers de leur longueur; calus scutellaires peu développés; sur cette région deux stries supplémentaires, rejoignant la strie suturale; calus huméraux distincts; angle apical interne faiblement arrondi, externe prolongé en dent triangulaire (fig. 1 a).

Long. : 8,3 mm.




Fig. 1. — *Polamodytes mucronatus* n. sp.
Extrémité de l'élytre droit : a) chez le ♂; b) chez la ♀ (1).

Femelle. — Pronotum proportionnellement encore plus large à la base; strie longitudinale médiane, impressions latérales plus marquées. Angle apical interne des élytres prolongé en une petite dent; angle externe prolongé en dent triangulaire comme chez le ♂ (fig. 1 b).

Long. : 9 mm.

Les deux types et les paratypes : Sanzulu, 4-IV-1926.

A la même espèce appartiennent quelques exemplaires de Ganda-Buku, 15-IV-1926.

Les espèces du genre *Polamodytes* ont une forme et une sculpture désespérément uniformes. Toutefois, on peut trouver, je crois, d'assez bons caractères spécifiques dans la forme de l'extrémité des élytres. Malheureusement nous manquons de renseignements à cet égard pour les espèces anciennes (*P. africanus* BOHEM; *P. antennatus* DOHRN; *P. major* KOLBE).

(1) Le dessin a été effectué en plaçant l'insecte de telle façon que l'extrémité de l'élytre soit située dans un plan horizontal.

Stenelmis tarsalis nov. sp.

Environ trois fois aussi long que large dans sa plus grande largeur; noir, les élytres assez luisants, la tête et le pronotum plus mats, la base et le sommet du pronotum ainsi que la suture des élytres étroitement roux; antennes et tarsi testacés, tibias enfumés, les fémurs, à l'exception des genoux, encore plus obscurs; couvert d'une pubescence gris-flave, très courte, mieux visible sur les intervalles des stries élytrales.

Tête offrant de petites granulations lisses, assez denses. Pronotum légèrement plus long que large à sa base, sa plus grande largeur située à mi-distance de la base et du sommet et égale à la longueur; angles antérieurs très aigus, dirigés en avant; angles postérieurs moins aigus; bord antérieur arrondi dans le milieu, fortement sinué vers les extrémités, devant les yeux; bords latéraux légèrement denticulés; base trisinuée, étroitement devant l'écusson, largement de chaque côté; disque offrant quatre carènes longitudinales partant de la base: les deux médianes, réunies à la base devant l'écusson, puis subparallèles, limitant une impression longitudinale assez peu profonde, n'atteignant pas le sommet; les carènes latérales, plus courtes, plus rapprochées des angles postérieurs que du milieu, n'atteignant pas la moitié de la longueur du pronotum; toute la surface granuleuse, comme la tête. Élytres plus larges à la base que le pronotum, environ deux fois et un tiers plus longs que ce dernier; deux fois aussi longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, celle-ci située au deuxième tiers de la longueur à partir de la base; points des stries gros et enfoncés, plus larges que les intervalles qui les séparent; stries atténuées au sommet, sauf la suturale qui est entière (toutefois les points, comme pour les autres stries, ne sont plus indiqués, à partir de la déclivité apicale); troisième et sixième intervalles caréniformes; la carène du sixième intervalle se prolonge jusque sur la déclivité apicale sans en atteindre cependant l'extrémité, tandis que la carène du troisième intervalle, moins prononcée, s'arrête au commencement de cette déclivité; les intervalles des stries présentant des lignes irrégulières de petites granulations lisses et brillantes.

Dessous d'un brun-roux, couvert de petites granulations assez rapprochées; prolongement du prosternum entre les hanches antérieures assez large, rétréci à l'extrémité et légèrement échancré au sommet; métasternum coupé longitudinalement par un sillon étroit.

Mâle. — Dernier article des tarsi antérieurs fortement dilaté, d'aspect rectangulaire (fig. 2).

Femelle. — Tous les tarsi normaux.

Long. : 2,75 mm.

Les deux types (♂ et ♀) ainsi qu'une assez longue série de para-




Fig. 2. — *Stenelmis tarsalis* n. sp.
a) saillie du prosternum; b) tibia et tarse antérieurs ♂.

types ont été récoltés par M. A. COLLART, à Maduda (Mayumbe) en janvier 1925.

La dilatation si singulière du dernier article des tarsi antérieurs chez le ♂ constitue un caractère qui n'a été signalé, je crois, chez aucune autre espèce du genre.

Stenelmis Collarti nov. sp.

Environ deux fois et deux tiers plus long que large dans sa plus grande largeur; tête noire, pronotum noir avec le bord antérieur d'un brun-roux; élytres d'un brun assez luisant; antennes et palpes testacés; pattes testacé-enfumé.

Tête offrant de petites granulations lisses, impressionnée de chaque côté au-dessus de l'insertion des antennes; celles-ci relativement grêles. Pronotum un peu plus long que large dans sa plus grande largeur, celle-ci située un peu avant le milieu; coupé au quart antérieur par un fort sillon transversal prolongé jusque sur les flancs du prothorax; bord latéral formant, du sillon à la base, une ligne sinuée; angles

postérieurs aigus, angles antérieurs nuls; bord antérieur arrondi au milieu, sinué derrière les yeux; disque offrant, au milieu, une courte carène gibbiforme, partant de la base et s'arrêtant à mi distance entre la base et le sillon antérieur transversal; de chaque côté de cette carène, contre la base, un point enfoncé; de chaque côté encore, une impression oblique, partant de la carène médiane et se dirigeant vers le sillon transversal; couvert (sauf dans le sillon transversal et dans les deux impressions obliques) de granulations lisses, brillantes. Écusson subcordiforme. Élytres une fois et trois cinquièmes environ plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur; base formant avec le bord latéral une courbe régulièrement arrondie; ensuite subparallèles jusqu'aux trois cinquièmes de leur longueur; acuminés ensemble au sommet; ponctués en ligne; points gros, polygonaux, effacés en partie sur la région déclive apicale; intervalles des lignes plus étroits que les points; le troisième à peine élevé dans sa portion antérieure; sur chaque élytre trois gros points enfoncés contre la base.

Dessous noirâtre, couvert de granulations; saillie du prosternum à côtés subparallèles, à sommet légèrement arrondi. Métasternum longitudinalement sillonné, déprimé entre les hanches postérieures. Pattes longues; tarsi antérieurs et intermédiaires un peu moins longs que le tibia; tarsi postérieurs subégaux au tibia; dernier article de tous les tarsi égal aux autres articles réunis.




Fig. 3. — *Stenelmis Collarti* n. sp., saillie du prosternum.

Long. : 2,25 mm.

Le type et les paratypes de Sanzulu, 4-IV-1926. Plusieurs exemplaires de Lolo-Damvu, 17-IV-1926.

C'est la première espèce du genre connue du continent africain présentant un sillon transversal sur le pronotum, rappelant ainsi *S. sulcata* GROUV. de Sumatra,

Microdinodes illustris GROUV.

Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 190 (*Helmis*).

Le genre *Microdinodes* a été créé en 1906, par GROUVELLE lui-même, pour des espèces de l'Afrique orientale. Il est " caractérisé par " la forme des antennes, qui sont de 11 articles, relativement courtes " et se renflant progressivement vers l'extrémité " (GROUV. *Ann. Soc. Ent. Fr.* LXXV, 1906, p. 324). Il est assez difficile, de par cette diagnose, de se faire une idée précise du genre. Toutefois, si l'on étudie les diagnoses des espèces décrites par GROUVELLE, on s'aperçoit qu'elles présentent un certain nombre de caractères communs. Chez toutes, en effet, le pronotum offre :

1° Un sillon longitudinal médian ;

2° Dans la région basilaire, de chaque côté de l'écusson, une petite carène ou une striole ;

3° Dans la même région, mais plus près de l'angle postérieur, une carène ou une strie plus ou moins marquée.

Si l'on veut admettre ces caractères comme génériques, *Helmis illustris* GROUV., dont j'ai pu examiner le type unique au Musée de Bruxelles, appartient au genre *Microdinodes*. On peut remarquer d'ailleurs que *H. illustris* GROUV. restait, assez bizarrement, le seul représentant du genre *Helmis* dans la faune éthiopienne ; on peut supposer, enfin, qu'en 1906, GROUVELLE n'avait pas conservé un souvenir suffisamment précis de l'espèce qu'il avait décrite quatre ans auparavant, pour lui permettre de la ranger dans son nouveau genre (1).

Je crois bien faire d'en redonner ici une description plus détaillée, d'après un exemplaire de ma collection, comparé au type (sauf pour la face inférieure, le type n'ayant pas été décollé).

Environ deux fois et demie plus long que large dans sa plus grande largeur ; noir, tête et pronotum mats, élytres brillants ; fémurs brun de poix, tibias, tarsi et antennes jaunâtres ; deux taches jaunes sur chaque élytre : la première, transversale, légèrement oblique, s'étend de l'épaule à la première strie (suturale) ; la deuxième, après le milieu, allongée entre la troisième et la sixième strie, n'atteint pas le sommet. Tête chagrinée. Pronotum également chagriné mais plus fortement ; à peu près aussi long que large à la base, sa plus grande largeur située au milieu de sa longueur ; un peu plus rétréci au sommet qu'à la base ; bord antérieur arqué en avant, sinué près des angles antérieurs ; bords

(1) ALLUAUD (*Ann. Soc. Ent. Fr.* CII, 1933, p. 159) ne mentionne pas *Helmis illustris* GROUV. dans la bibliographie qui termine son travail.

latéraux épais, coupés obliquement, formés chacun de deux séries de granulations, constituant ainsi une sorte de double rebord ; ces deux rebords bien distinctement séparés au milieu, se confondant à la base et au sommet ; angles antérieurs et postérieurs aigus ; base largement sinuée de chaque côté, étroitement devant l'écusson : disque creusé en son milieu d'un sillon longitudinal assez court, assez large et profond, de forme lancéolée, plus éloigné de la base que du sommet ; marge basilaire transversalement sillonnée ; de chaque côté de l'écusson, contre la base, une petite carène longitudinale, n'atteignant pas le sillon longitudinal médian, limitant extérieurement une impression ponctiforme oblique ; en outre, partant des angles postérieurs, de chaque côté, un trait très peu élevé, dirigé obliquement en dedans, plus long que la carène interne, aboutissant dans une dépression peu profonde, de forme circulaire ; quelques soies éparses. Écusson ovale, lisse, impressionné au centre. Élytres environ une fois et deux tiers plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur ; assez largement arrondis aux épaules ; puis, côtés subparallèles jusqu'aux 3/5 de leur longueur, acuminés ensemble au sommet ; ponctués-striés ; stries enfoncées à la base ; intervalles ornés chacun d'une rangée de soies courtes, flaves ; trois premiers intervalles nettement plus larges que les points des stries, les suivants plus étroits ; points moins forts à l'extrémité ; les intervalles très finement carénés à partir du deuxième : carènes du 2° et du 3° intervalles arrêtées avant le milieu ; celles du 4° et du 6° prolongées jusqu'à la déclivité apicale ; celle du 5° plus courte que les deux précédentes, s'arrêtant au début de la tache jaune postérieure.




Fig. 4. — *Microdinodes illustris* GROUV., saillie du prosternum.

Dessous brun-foncé. Saillie du prosternum courte, large, subparallèle, rebordée, faiblement arrondie à l'extrémité, impressionnée. Mésternum longitudinalement sillonné, le sillon plus large et profond postérieurement ; fortement impressionné dans la région des hanches intermédiaires et postérieures. Abdomen finement chagriné. Ongles des tarsi assez fortement dentés à la base.

Long. : 2 mm.

M. COLLART a capturé un exemplaire de cette espèce à C.F.M. Km. 22 de Boma. Un deuxième exemplaire de même provenance a perdu la tache jaune postérieure, tandis que la tache antérieure est divisée en deux lobes étroitement unis, l'un huméral, l'autre discal.

Microdinodes nigrolineatus nov. sp.

Ovale, allongé, environ deux fois et un tiers plus long que large dans sa plus grande largeur. Tête et pronotum noirs, luisants; élytres jaunes, la base et trois bandes longitudinales brunâtres; la première dans l'intervalle sutural; la deuxième occupant près de la base, les cinquième et sixième intervalles, puis obliquant pour couvrir l'espace compris entre les quatrième et cinquième intervalles en débordant étroitement sur le troisième; la deuxième réunie en courbe à la première, arrêtée avant l'extrémité; la troisième bande sur les marges latérales, laissant à l'apex un mince liséré jaune et ne rejoignant pas la suture; antennes et palpes testacés; pattes et surtout les fémurs plus obscurs.

Tête chagrinée; front plus long que large. Pronotum chagriné, aussi long que large à la base; bords latéraux en courbe assez régulière; bord antérieur arrondi au milieu, sinué de chaque côté derrière les yeux; angles antérieurs aigus et infléchis; base sinuée de chaque côté, étroitement devant l'écusson; angles postérieurs aigus; sur le disque un sillon longitudinal médian, arrêté à égale distance de la base et du sommet; contre la base, dans la région transversale déprimée, de chaque côté de l'écusson, une très courte et très faible carène; un point enfoncé au côté interne de cette carène; entre cette carène et l'angle postérieur mais plus près de ce dernier, une vague impression oblique aboutissant avant le milieu de la longueur du pronotum dans une dépression arrondie à peine distincte (tout ceci visible seulement sous un éclairage d'incidence appropriée); bord latéral doublé dans toute sa longueur d'une fine carène (double rebord). Écusson ovale, impressionné. Élytres environ une fois et demie plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur; en angle obtus aux épaules, légèrement élargis en arrière, acuminés ensemble au sommet; stries ponctuées commençant par un point plus effacé; intervalles ridés, plus larges que les points sur le disque, finement pubescents; les rides mieux visibles dans les parties obscures, les points, au contraire, plus distincts dans les parties jaunes; de fines carènes granuleuses, difficiles à distinguer, sur le deuxième intervalle et sur tous les autres intervalles à partir du quatrième.

Dessous brun-noirâtre. Saillie du prosternum large, courte, subparallèle, faiblement arrondie à l'extrémité, finement rebordée, le rebord




Fig. 5. — *Microdinodes nigrolineatus* n. sp.

longé intérieurement par un fin sillon; fortement chagrinée. Mésternum lisse au milieu, avec quelques points épars, longitudinalement sillonné, ce sillon plus large et profond dans la région postérieure déprimée; chagriné sur les côtés, plus fortement au-dessus des hanches postérieures; abdomen chagriné, plus fortement entre les hanches postérieures. Ongles des tarsi très finement dentés à la base.




Fig. 6. — *Microdinodes nigrolineatus* n. sp., saillie du prosternum.

Long. : 1,8 mm.

Le type et les paratypes de Maduda, janvier 1925.

Microdinodes similis nov. sp.

Plus robuste que *M. nigrolineatus*, mais de forme, de proportions et de sculpture absolument identique à cette espèce.

Pronotum brun-roux assez foncé; élytres offrant le même système de coloration que *M. nigrolineatus*, mais brun plus clair, la deuxième bande brune s'étendant toutefois jusqu'au bord externe, y devenant simplement plus claire, le calus huméral restant jaune; carènes granuleuses mieux visibles.

Ongles des tarsi bidentés à la base.

Long. : 2,1 mm.

Le type et les paratypes de Maduda, janvier 1925. Un exemplaire de Samba, 2-XII-1923, de couleur mieux développée que chez ceux de Maduda.

J'ai longtemps hésité avant de me décider à séparer spécifiquement *M. nigrolineatus* et *M. similis*. Toutefois, le fait que tous les exemplaires de cette dernière espèce possèdent ce caractère curieux de présenter deux petites dents à la base des ongles ainsi qu'une coloration un peu différente jointe à une forme plus robuste m'incline à croire qu'il s'agit bien de deux espèces distinctes.

Microdinodes immaculatus nov. sp.

Environ deux fois et demie plus long que large dans sa plus grande largeur; élytres peu convexes, déclivité apicale moins prononcée; noir; élytres, pattes et antennes testacés.

Tête chagrinée. Pronotum plus finement chagriné que la tête; environ aussi long que large; légèrement plus rétréci au sommet qu'à la base; bord antérieur arqué en avant, sinué près des angles antérieurs qui sont aigus; rebord latéral crénelé, épais; base largement sinuée de chaque côté, étroitement devant l'écusson; angles postérieurs aigus; sillon médian longitudinal large et profond, atténué aux extrémités, n'atteignant ni la base ni le sommet; de chaque côté contre la base: 1°) en face de l'écusson, une fossette limitée extérieurement par une très courte carène; 2°) plus près des angles antérieurs que du milieu, un sillon large et bien marqué, un peu relevé en carène extérieurement; ce sillon faiblement courbé en dedans, aboutissant un peu avant le milieu de la longueur du pronotum, dans une impression circulaire moins nettement marquée que le sillon lui-même; sillon basilaire transversal, lisse, très étroit. Ecusson ovale, ponctué. Élytres striés-ponctué; intervalles discoïdaux

plus larges que les points; deuxième, quatrième et sixième intervalles orné chacun d'une fine carène granuleuse plus foncée que l'élytre même; carène du deuxième intervalle appliquée tout contre la strie ponctuée, les deux autres au milieu de l'intervalle.

Dessous brunâtre. Saillie du prosternum assez longue et étroite, finement rebordée, anguleuse à l'extrémité. Métastrernum coupé longitudinalement par un sillon élargi postérieurement. Ongles des tarsi offrant une dent à la base.




Fig. 7. — *Microdinodes immaculatus* n. sp., saillie du prosternum.

Long. : 2 mm.

Le type et un paratype : Km. 22 de Boma (C.F.M.).

Le pronotum et la face inférieure sont recouverts d'un enduit tenace, d'aspect granuleux, masquant la sculpture.

Pachyelmis madudana nov. sp.

Oblong, convexe, environ deux fois plus long que large dans sa plus grande largeur; d'un brun-roux, les élytres et les appendices plus clairs, tête (sauf la bouche) noire.

Tête fortement rugueuse. Pronotum très légèrement plus large à la base que long, très rétréci au sommet; finement alutacé et superficiellement pointillé; bord antérieur arrondi et saillant en avant, sinué et infléchi dans la région des angles antérieurs; ceux-ci invisibles de dessus; bords latéraux arrondis, fortement infléchis en avant, indiqués seulement par un épaississement de la granulation râpeuse qui occupe les flancs du prosternum et les parties latérales du pronotum; cette granulation limitée intérieurement, de chaque côté, sur le disque, par un sillon assez large et profond dans sa portion basilaire, atténué au sommet; base étroitement sinuée devant l'écusson, largement de chaque côté. Ecusson triangulaire, aussi large à la base que long. Élytres environ une fois et un tiers plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur; aussi larges que le pronotum à la base, très faiblement élargis jusqu'au milieu de leur longueur, puis

rétrécis jusqu'au sommet qui est très brièvement réfléchi. Stries ponctuées bien marquées, une impression ponctiforme un peu allongée au




Fig. 8. — *Pachyselmis madudana* n. sp.

début de chacune des cinq premières stries; intervalles discotiaux plus larges que les points, intervalles externes plus étroits. Trois carènes granuleuses sur chaque élytre: la première, sur le cinquième intervalle, appliquée contre la quatrième strie ponctuée; la deuxième, humérale, sur le septième intervalle, dans le prolongement du sillon prothoracique; la troisième, sur le huitième intervalle, semble former, lorsque l'insecte est vu de dessus, le rebord externe de l'élytre; ce rebord, en réalité, invisible de dessus.




Fig. 9. — *Pachyselmis madudana* n. sp., saillie du prosternum.

Saillie du prosternum large, couvrant en partie les hanches antérieures, impressionnée en arrière, brusquement rétrécie pour former le

lobe correspondant à la fossette du mésosternum. Métasternum longitudinalement sillonné, assez densément ponctué. Abdomen offrant, de chaque côté, sous les hanches, une double rangée longitudinale de petites granulations.

Long : 1,4 mm.

Type et paratypes (1,4 mm.-1,6 mm.): Maduda, janvier 1925.

***Pseudomacronychus humeralis* nov. sp.**

Allongé, convexe, environ deux fois et un tiers plus long que large dans sa plus grande largeur, brun-noirâtre assez luisant, antennes et palpes testacés, pattes obscures, les genoux, l'extrémité des tibias et les tarses plus clairs; bord antérieur du pronotum étroitement roux, région scutellaire d'un roux un peu clair; éparsément et finement pubescent.




Fig. 10. — *Pseudomacronychus humeralis* n. sp.

Tête alutacée, brillante. Pronotum moins long d'un sixième environ que large à la base; rétréci d'un tiers au sommet; angles antérieurs aigus, infléchis, peu visibles de dessus; angles postérieurs aigus, dirigés en arrière; très finement et très densément pointillé sur le disque, striolé dans la région des angles. Écusson en triangle curviligne, finement ponctué et finement pubescent. Élytres presque une fois et trois quarts aussi longs que larges ensemble; présentant leur plus grande largeur aux deux tiers environ de leur longueur, d'ailleurs peu élargis depuis les épaules, celles-ci bien accusées; base, entre l'écusson et le calus huméral, longitudinalement ridée sur une bande étroite; intervalles des stries ponctuées plus larges que les points, transversalement ridés.

Dessous brun de poix. Saillie du prosternum large et tronquée, rugueusement impressionnée. Métasternum convexe, longitudinalement




Fig. 11. — *Pseudomacronychus humeralis* n. sp., saillie du prosternum.

silloné, et, de même que l'abdomen, éparsément ponctué sur fond alutacé.

Long. : 3 mm.

Type et paratypes : Singa-Kondo. 20-IV-1926.

Par la sculpture, très semblable aux autres *Pseudomacronychus* connus, mais s'en distinguant à première vue par les épaules bien marquées et la forme nettement plus parallèle des élytres.

***Ancyronyx robustus* nov. sp.**

Oblong, environ deux fois et demie plus long que large dans sa plus grande largeur; noir-bronzé; antennes brun-roux; pattes (y compris les tarses) obscures; sur chaque élytre deux petites taches jaunes: la première, arrondie, à l'épaule entre le sixième et le septième intervalles; la deuxième, linéaire, au début de la déclivité apicale, sur le cinquième intervalle.

Tête allongée, rugueuse sauf un petit espace lisse entre les yeux; sur le vertex une carène bifurquée en avant en deux carènes étroites dirigées vers les yeux. Pronotum nettement moins long que large à la base, rétréci au sommet dont la largeur est sensiblement égale à la longueur du pronotum; côtés sinués en avant, au niveau du sillon transversal coupant le disque au tiers antérieur, légèrement sinués avant la base; partie située en avant du sillon transversal occupée par un lobe convexe transversal, atténué aux extrémités, n'atteignant pas la région rugueuse des angles antérieurs; région située en arrière de ce sillon chargée de quatre lobes arrondis convexes, contigus en avant au sillon transversal, séparés entre eux par des sillons moins profonds que le large sillon transversal; lobes externes moins grands

que les lobes internes et n'atteignant pas les bords latéraux; une fine carène longitudinale médiane dans le sillon séparant les deux lobes internes, s'arrêtant dans le sillon transversal antérieur; un bourrelet basilaire atténué de chaque côté au niveau du sillon séparant le lobe interne du lobe externe. Écusson subpentagonal, plus large que long, silloné au milieu, impressionné. Élytres environ une fois et demie plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, celle-ci située après les épaules; subparallèles jusqu'au deuxième tiers de leur longueur; arrondis ensemble au sommet; bord externe très finement denticulé au sommet; ponctués-striés; les stries, sauf toutefois les externes, bien marquées jusqu'à l'extrémité, les points effacés postérieurement; intervalles subconvexes, un peu plus larges que les points.

Dessous noirâtre. Saillie du prosternum large, bord postérieur anguleux au milieu; fortement rugueux ainsi que le mésosternum. Métasternum rugueux sauf sur les côtés et dans la partie médiane longitudinalement silloné. Arceaux ventraux de l'abdomen rugueux au milieu; le dernier longuement et densément pubescent à l'extrémité.

Long : 2,8 mm.

Type (unique) : Singa-Kondo, 20-VI-1926.

***Ancyronyx quadriguttatus* nov. sp.**

Oblong, environ deux fois et trois quarts plus long que large dans sa plus grande largeur, noir à reflet métallique visible surtout sur les espaces lisses du pronotum; antennes jaune-pâle; pattes brun de poix, les tarses clairs, sauf les jointures des articles et l'extrémité du dernier, rembrunis; sommet des élytres étroitement jaune et, sur le disque, deux taches arrondies, jaunes: la première, près de la base, située entre la deuxième et la cinquième stries; la deuxième, après le milieu, un peu plus étroite, entre la troisième et la sixième stries.

Tête allongée, alutacée, présentant sur le vertex une faible carène bifurquée en avant en deux carènes peu marquées, dirigées vers les yeux. Pronotum très peu moins long que large à la base, plus rétréci au sommet qu'à la base; côtés sinués en avant au niveau du sillon transversal et plus légèrement en arrière; partie située en avant du sillon transversal occupée par un lobe convexe, allongé contre le bord antérieur, devenant moins large aux extrémités, très éparsément pointillé; zone située en arrière chargée de quatre lobes convexes, contigus en avant au sillon transversal, séparés entre eux par des sillons peu larges et peu profonds; les lobes externes atteignant les côtés,

les lobes internes, moins grands, arrondis; une fine carène longitudinale médiane, plus visible dans le sillon transversal où elle s'arrête, partant de la région basilaire relevée en bourrelet atténué de chaque côté au niveau du sillon séparant le lobe interne du lobe externe; tout le pronotum, sauf les lobes dont il vient d'être question, fortement chagriné. Élytres de la largeur du pronotum à la base, leur plus grande largeur située après l'épaule, subparallèles jusqu'au deuxième tiers de leur longueur environ, les côtés offrant seulement une brève sinuosité avant le milieu; sommet brièvement arrondi; ponctués-striés, les stries, sauf toutefois les externes, bien marquées jusqu'à l'extrémité, les points effacés cependant presque complètement à hauteur de la tache jaune postérieure; intervalles subconvexes, plus larges que les points.

Dessous brunâtre, chagriné. Saillie prosternale large, faiblement arrondie à l'extrémité, impressionnée dans sa moitié apicale. Méta-sternum longitudinalement sillonné, le sillon n'atteignant pas le méso-sternum. Arceaux ventraux de l'abdomen éparsément pubescents, le dernier plus longuement à l'extrémité.

Long. : 2 mm.

Type et paratypes : Sanzulu, 4-IV-1926.

Espèce élégante, caractérisée par la sculpture du pronotum, les calus huméraux noirs et les quatre taches jaunes des élytres.

IV

Assemblée mensuelle du 3 avril 1937

Présidence de M. L. FRENNET, Président.

— La séance est ouverte à 17 h.

— *Excusés* : MM. BALL, CRÈVECŒUR, LELEUP, LESTAGE et D'ORCHYMONT.

— M. A. COLLART remplit les fonctions de Secrétaire.

— Le compte rendu de l'assemblée de mars est approuvé.

Nécrologie. — Nous apprenons le décès de notre membre associé, M. Joseph GILLET. Notre Collègue s'était spécialisé dans l'étude des Lamellicornes et il publia, à diverses reprises, dans nos *Bulletin* et *Annales* ainsi que dans nos *Mémoires*. Une lettre de condoléances a été envoyée à la Famille du défunt.

— La Direction du Museo Entomologico "Pietro Rossi" nous fait part du décès du fondateur de l'Institution, PRINCE ALESSANDRO DELLA TORRE E TASSO, Duca di Castel Duino. Une lettre de condoléances a été adressée.

Correspondance. — M. C. DONIS communique sa nouvelle adresse : 99, rue de Bloquay à Comblain-Fairon.

— L'adresse de notre éminent membre honoraire Sir E. B. POULTON doit être modifiée comme suit : Emeritus Professor of Entomology, University Museum, Oxford (Angleterre).

— La Fondation Universitaire nous annonce l'octroi d'un subside de 3.000 francs pour l'exercice 1936-37 (*Remerciements*).

— M. W. E. VAN DEN BRUEL nous rappelle que l'organisation de l'excursion annuelle, à faire en commun avec la Société Royale Zoologique, incombe cette année à notre association. MM. MAYNÉ et DONIS étant les promoteurs de l'excursion projetée, ces collègues sont priés de soumettre aussitôt que possible, un projet de circulaire.