

*Communications.* — Au nom de M. OVERLAET, M. BURGEON montre divers insectes et, notamment, 1 exemplaire ♀ de *Paururus juvencus* L. var. *noctilio* F., capturé à Cappellenbosch le 12-IX-1935, et un exemplaire ♀ du rarissime Cynipide *Ibalia leucospoides* HOCHENW., pris à Calmpthout le 30-VIII-1936.

— Lecture est donnée d'une lettre de M. LESTAGE signalant l'abandon dans lequel se trouve actuellement l'étude des Éphéméroptères, des Plécoptères (Perlides) et des Stégoptères (Mécoptères, Planipennes, Trichoptères, etc.). M. LESTAGE souhaiterait voir certains de nos membres se consacrer à la spécialisation de l'un ou l'autre de ces groupes.

L'Assemblée forme le vœu que cet appel de M. LESTAGE, qui pourrait d'ailleurs être répété pour nombre d'autres groupes entomologiques, soit entendu de nos jeunes collègues.

— La séance est levée à 17 h. 45.

## Une excursion au "Boerenkreek"

A SAINT-JEAN IN EREMO

PAR LE

D<sup>r</sup> M. GOETGHEBUER

Saint-Jean in Eremo est une petite bourgade de 925 habitants, située au nord d'Eecloo, en Flandre orientale. La plus grande partie de son territoire est occupée par des polders. Le village fut anéanti par l'invasion de la mer en 1377; le pays fut de nouveau englouti pendant les troubles religieux du XVI<sup>e</sup> siècle (1). Son altitude ne dépasse pas 3 m. 70. Il ne présente plus actuellement comme témoins du temps passé, que des criques d'eau saumâtre, séparées tout à fait de la mer et de l'Escaut.

La plus importante de ces criques est le "Boerenkreek"; sa salure, sa faune et sa flore remontent au temps où il recevait librement l'eau salée à chaque marée haute (2). On y voit, abondamment répandus, *Aster tripolium*, aux fleurons violets et *Scirpus maritimus*, avec *Glaux maritima*, *Plantago maritima* et d'autres plantes de schorre.

Nous nous y sommes rendus, le Dr Mich. BEQUAERT et moi, le 24 août dernier, pour explorer sommairement la région au point de vue entomologique et spécialement à celui des Cératopogonides et des Chironomides.

Une des premières captures faite, fut le *Culicoides circumscriptus* KIEFF. (*Edwardsi* GOETGH.), espèce rare et plutôt halophile, qui se trouve répandu au littoral, dans les bas-fonds de Knocke et à la Panne.

Je rencontraï aussi *Culicoides nebeculosus* MEIG. Une espèce trouvée en grande abondance est *Atrichopogon rostratus* WINN. Plus rare est le *Bezzia xanthocephala* GOETGH., pris aussi aux environs de Gand et sur le littoral et *Kempia infusca* GOETGG.

(1) DE SEYN : Dictionnaire historique et géographique des communes belges, Bruxelles, 1925, p. 327.

(2) J. MASSART : Pour la protection de la nature en Belgique, Brux., 1912, p. 110.

Une espèce nouvelle et très abondante est le *Tanytarsus scirpeti* GOETGH. qui fréquente les touffes de *Scirpus maritimus*; j'en pus recueillir de nombreux exemplaires.

Une forme également fort répandue, assez rare dans nos environs, est le *Polypedilum arundineti* GOETGH.; il habitait aussi les mêmes *Scirpus*.

Enfin d'autres espèces ont été prises, comme *Chironomus dorsalis* MEIG., *sordidatus* KIEFF., *Trichocladus lucidus* STAEG., *Tanytarsus lactipes* ZETT. et *macrosandalum* K., *Pentapedilum sordens* V. D. W., *Smittia trilobata* EDW., *Cricotopus festinus* MG., *Metriocnemus fuscipes* MEIG., *Procladius parvulus* KIEFF., etc.

Saint-Jean in Emero et ses criques constituent un intéressant terrain de chasse; ces quelques lignes ont été écrites pour attirer l'attention sur cet endroit, qui n'a pas encore été exploré au point de vue entomologique.

## On a collection of Carabidae from the island of Bali

BY

H. E. ANDREWES

The island of Bali, situated immediately to the east of Java, seems, from an entomological point of view, to be very little known. In 1856 A. R. WALLACE spent two days there, collecting birds and butterflies, but the coleoptera, so far as I am aware, have not hitherto attracted attention. A small collection of Carabidae from the eastern part of the island was recently sent to me by Mr. C. J. LOUWERENS, who has also collected a good deal in eastern Java, and below will be found an enumeration of the species which he met with, together with descriptions of seven new species and two new varieties, and a key to the species of *Colpodes*, a genus very well represented in the Malay islands. Mr. LOUWERENS has kindly allowed me to retain the type specimens in my collection.

### ENUMERATION OF THE SPECIES

- Peronomerus xanthopus* ANDR., 2 ex., Batoeriti.  
*Chlaenius bimaculatus* DEJ., 2 ex., Moendoek.  
 " *circumdatus* BR., 1 ex., Git-Git.  
 " *mutatus* GEMM. and HAR., 3 ex., Batoeriti.  
 " *semiviridis* ANDR., 16 ex., Batoeriti and Git-Git.  
*Gnathaphanus vulneripennis* MACL., 1 ex., Batoeriti.  
 " *punctilabris* MACL., 2 ex., Batoeriti.  
*Morion orientale* DEJ., 3 ex., Batoeriti.  
*Cosmodiscus umeralis* sp. n., 1 ex.  
*Colpodes halurgus* sp. n., 7 ex.  
 " *nigellus* ANDR., 2 ex., Moendoek.  
 " *louwerensi* sp. n., 3 ex.