

d'Europe<sup>1</sup>, il m'a été facile, grâce aux excellentes figures de ce travail, de vérifier mes déterminations.

Cependant, et afin de dissiper les doutes pouvant subsister après cette étude, j'ai envoyé, avec l'assentiment de M. VANDERGUCHT, deux exemplaires de chacune des espèces précitées, à M. le Docteur H. DEBAUCHE, spécialiste en *Geometridae*.

De plus, je me suis conformé aux instructions de M. VANDERGUCHT, en offrant au Musée Royal d'Histoire Naturelle, deux beaux exemplaires de *Sterrhia fuscovenosa* GÖZE.

ADDITIONS

AU

Catalogue des Cératopogonides  
et des Chironomides

DE BELGIQUE (1)

PAR LE

D<sup>R</sup> M. GOETGHEBUER

CÉRATOPOGONIDES

GENRE *FORCIPOMYIA* MEIGEN.

*diversipes* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXVI, p. 319 (1936).

Chiny-sur-Semois.

*Guilleaumei* GOETGH. — *loc. cit.*, LXXV, p. 413 (1935).

Wellin.

*urbana* GOETGH. — *loc. cit.*, LXXVII, p. 273 (1937).

Poperinghe.

GENRE *ATRICHOPOGON* KIEFFER.

*trifasciatus* KIEFF. — *Ann. Mus. Nat. Hungar.*, XVI, p. 90 (1918).

Doische (Namur).

GENRE *DASYHELEA* KIEFFER.

*littoralis* GOETGH. — *Bull. Ent. Soc. Ent. Belg.*, LXXIV, p. 287 (1934).

La Panne.

(1) Voir : *Bull. et Ann. Soc. Ent. Belg.*, t. LXXIII (1933) p. 363-372 ; id. t. LXXIV (1934) p. 209-213 ; id. t. LXXIV (1934) p. 391-405 ; id. t. LXXV (1935) p. 63-72.

GENRE *CULICOIDES* LATREILLÉ.

*Dewulfi* GOETGH. — *loc. cit.*, LXXVI, p. 320 (1936).

Syn. (?) *pegobius* KIEFF.

Poperinghe (Dr DE WULF). Nombreux exemplaires.

*neglectus* WINN. — *Linn. ent.*, VI, p. 46 (1852).

Melle (bois).

*Parroti* KIEFF. — *Arch. des Inst. Past. de l'Afr. du Nord*, II, fasc. 4, p. 502.

Poperinghe (Dr DE WULF).

*punctidorsum* KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle*, XXX, p. 17 (1924).

Poperinghe (Dr DE WULF).

GENRE *SERROMYIA* MEIGEN.

*bispinosa* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXVI, p. 321 (1936).

La Panne (Dunes).

GENRE *BEZZIA* KIEFFER.

*armaticrus* KIEFF. — *Ann. Mus. Nat. Hungar.*, XVII, p. 125 (1919).

La Panne (Dunes).

*exigua* GOETGH. — *Diptera*, VIII, p. 4 (1935).

Sy.

*gandavensis* GOETGH. — *loc. cit.*, VIII, p. 4 (1935).

Gand.

*heusdenis* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXV, p. 414 (1935).

Heusden (Flandre orientale).

*radialis* GOETGH. — *loc. cit.*, LXXVI, p. 323 (1936).

Destelbergen.

GENRE *MACROPEZA* MEIGEN.

*albitarsis* MEIG. — *Syst. Besch.*, I, p. 87 (1818).

de Liège (Prof. GADE IN, MEIGEN).

## CHIRONOMIDES

## Tanypodinae

GENRE *PROCLADIUS* KIEFFER.

*islandicus* GOETGH. — in LINDROTH: *Zool. Bidrag fran Uppsala*, Bd. XIII, p. 277 (1931).

Heusden.

## Diamesinae

GENRE *DIAMESA* MEIGEN.

*campestris* EDW. — *Trans. of the Ent. Soc. of London*, p. 307 (1929).

Environs de Malmédy (A. COLLART).

## Chironominae

GENRE *DOLICHOPELMA* KIEFFER.

*nigriventre* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXIII, p. 210 (1933).

Localités de capture: Heusden, Overmeire.

GENRE *POLYPEDILUM* KIEFFER.

*dickebuschense* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXVI, p. 325 (1936).

Dickebusch, près d'Ypres (Etang).

*leucopus* MEIG. — *Syst. Besch.*, VI, p. 249 (1830).

Gand. Ne semble être qu'une variété de *P. nubeculosum* MEIG.

*prolixitarsis* LUNDSTR. — *Act. Soc. Fauna fenn.*, 44, n° 2 (1916).

Hockai (Hautes-Fagnes); Chiny-sur-Semois.

*quadriguttatum* KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle*, XXIX, p. 74 (1921).

Virton.

*rydalens* EDW. — *Trans. of the Ent. Soc. of Lond.*, p. 404 (1929).

Chiny-sur-Semois.

*scalaenum* SCHRANK var. *trinotatum* V. D. WULP. — *Tydsch. v. ent.*, XVII, p. 138 (1874).

Syn. *conjunctum* KIEFF.

Uccle (J. LESTAGE).

GENRE *STENOCHIRONOMUS* KIEFFER.

*fascipennis* ZETT. — *Ins lapp.*, p. 813 (1838).  
Chiny-sur Semois

GENRE *CHIRONOMUS* MEIGEN.

Syn. *Tendipes* MEIG.

SOUS-GENRE *LIMNOCHIRONOMUS* KIEFF.

*miriforceps* KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle*, XXX, p. 25 (1924).

Dickebusch (Etang).

*pulsus* WALK. — *Ins. brit.*, III, p. 156 (1856).  
Dickebusch.

SOUS-GENRE *CRYPTOCHIRONOMUS* KIEFFER.

*tener* KIEFF. — *Entom. Mitteil.*, VII, p. 48 (1918).  
La Panne (Dunes).

*Krusemani* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXV, p. 416 (1935).  
Overmeire.

GENRE *PENTAPIDILUM* KIEFFER.

*sordens* v. D. W. — *Tytsch. v. Ent.*, XVII, p. 141 (1873).  
Gand, Heusden, Overmeire, Bellem, Dickebusch.

GENRE *MICROPSECTRA* KIEFFER.

*subnitens* GOETGH. — in "*Faune de France*", XVIII, p. 115 (1928).  
Hockai (Hautes-Fagnes).

GENRE *LUNDSTROEMIA* KIEFFER.

*pseudopraecox* GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. Mém.*, 31, p. 172 (1921) (sub. *praecox* GOETGH. nec MEIG.).  
Gand.

GENRE *TANYTARSUS* v. D. WULP.

*gregarius* KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. Nat. Metz*, p. 50 (1909).  
Destelbergen, Overmeire, Dickebusch.

*ordinatus* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXV, p. 416 (1935).

Heusden.

*inopertus* WALK. — *Ins. brit.*, III, p. 190 (1853).

Chiny : vallée de la Vierre.

*scirpeti* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXVI, p. 324 (1936).

Saint-Jean in Eremo.

*autumnalis* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXVIII, p. 59 (1938).

La Panne.

*sylvaticus* v. D. W. — *Tydsch. v. Ent.*, II, p. 168.

Vinderhaute.

## Orthocladinae

GENRE *METRIOCNEMUS* v. D. WULP.

*camptoneurus* KIEFF. — *Bull. Soc. Ent. France*, p. 201 (1911).  
Munte, Melle (♂ ♀).

GENRE *CARDIOCLADIUS* KIEFFER.

*fuscus* KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle*, XXX, p. 72 (1924).

Sy. (P. MARÉCHAL).

GENRE *CRICOTOPUS* v. D. WULP.

*pilitarsis* ZETT. — *Dipt. Scand.*, IX, p. 3565 (1850).

La Panne (Dunes).

*sylvestris* FAB., var. *obscurimanus* ZETT. — *loc. cit.*, IX, p. 3564 (1850).

Melle.

*vierrensis* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXV, p. 417 (1935).

Chiny : vallée de la Vierre.

*vitripennis* MEIG. — *Syst. Besch.*, I, p. 32 (1818).

Syn. *variabilis* STAEG.; † *Kervillei* KIEFF.; ? *marinus* ALV.  
Duinbergen : sur brise-lames.

*halophilus* KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. Nat. Metz*, XXVI, p. 46 (1909).

Knoeke : bas-fonds du Zwijn.

GENRE *DIPLOCLADIUS* KIEFFER.

*cultriger* KIEFF. — *Zeitsch. f. Insektenbiol.*, IV, p. 6 (1908).  
Gand, Melle, Waerschoot.

GENRE *TRICHOCLADIUS* KIEFFER.

*sylvaticus* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXVII, p. 274 (1937).  
Munte, Melle.

GENRE *ORTHOCLADIUS* v. D. WULP.

*xanthogyne* EDW. — *Trans. of the Ent. Soc. of Lond.*, p. 342 (1929).  
Munte, Melle.

*tuberculatus* EDW. — *loc. cit.*, p. 341 (1929), var. *lucorum* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXVII, p. 276 (1937).  
Melle.

GENRE *LIMNOPHYES* EUTON.

*macrocerus* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXVII, p. 278 (1937).  
La Panne.

*curticornis* GOETGH. — *loc. cit.*, LXXVIII, p. 64 (1938).

GENRE *SMITTIA* HOLMGREEN.

*foliifera* GOETGH. — *loc. cit.*, LXXVII, p. 277 (1937).  
Poperinghe.

*rupicola* KIEFF. — in MERCIER, *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXIII, p. 10 (1923).  
Zeebrugge, (Dr M. BEQUAERT).

*foliacea* KIEFF. — *Arch. f. Hydrobiol.*, p. 789 (1921).  
La Panne.

GENRE *EUKIEFFERIELLA* THIEN.

*calvescens* EDW. — *Trans. of the Ent. Soc. of Lond.*, p. 353 (1929).  
Postel (SEVERIN).

## Notes sur les Cercopides

PAR LE

D<sup>R</sup> V. LALLEMAND

SOUS-FAM. TOMASPISINAE

TRIBU *ISCHORHINI*

*Baetkia maroniensis* n. sp.

Tête, méso- et métasternum, abdomen, écusson et élytres : rouge sang ; cuisses, base des tibias postérieurs, yeux, vertex et base de l'écusson plus foncés ; pronotum, prosternum, partie postérieure du front (à partir de la carène transversale et jusqu'au clypeus), clypeus, rostre, pattes antérieures et médianes, ainsi qu'une bordure des élytres partant de la base et s'étendant jusqu'à la pointe du clavus : noirs ; antennes, tibias et tarses postérieurs : brun rougeâtre.

Deux épines sur les tibias postérieurs, dont la supérieure, située près de la base, est chez certains exemplaires très petite.

Longueur : 13 mm. ; élytres, longueur : II, 1/3 mm., largeur : 4 mm.

Habitat : Guyane française : Charvein, roches de Kourou, (bas Maroni).

Type : ma collection, 3 ♀.

*Neolaccogrypota brunnea, nigricans.*

Les élytres au lieu d'être brun clair sont noirs à base rouge.

Habitat : Pérou, Marcapata.

TRIBU *TOMASPISINI*

*Tomaspisinella bimaculata* n. sp.

Noire ; deux taches ocre jaune sur les élytres, dont une occupe le tiers basal du clavus, mais déborde légèrement sur le corium ; la seconde se trouve au devant du tiers apical, elle atteint la suture