

— M. BURGEON exhibe des spécimens d'*Apion orthorhynchum* WAGNER (Col.), capturés au Congo belge.

— M. CRÉVECEUR fait circuler des exemplaires de *Bracon guttiger* WESM. (Hym.), espèce à laquelle est consacrée une note qui paraîtra dans le prochain fascicule. Il attire spécialement l'attention sur le fait que la larve de ce Braconide peut se comporter en parasite externe.

— M. COLLART présente un spécimen de *Marpissa muscosa* CLERCK (Aranéide, Salticide) et de son abri en soie blanche, tissé pour la mauvaise saison, sous une écorce de piquet.

Ces documents ont été recueillis à Chaudfontaine par notre collègue M. Henri A. WARLET qui a publié récemment dans nos *Bulletin et Annales* (1937, p. 262-264) une note sur l'accouplement de cette belle Salticide.

— M. POLL montre une petite collection de Sphérides provenant de Calmpthout parmi lesquels *Psammophila affinis* K., *Pemphredon unicolor* var. *Wesmaeli* MOR., *Crabro subterraneus* F. et *Oxybelus mandibularis* DAHLB. **Belg. nov. sp.**, ce dernier capturé le 11-IX-36. Il signale également la capture à Nadrin (Hérou), le 28-VIII-37 par M. MARLIER, de *Astata boops* SCHRK., et donne d'intéressants détails sur la biologie et l'abondance relative de plusieurs espèces.

— La séance est levée à 17 heures 35.

Compsus sud-américains

(COL. CURCULIONIDAE)

PAR

A. HUSTACHE

Le groupe des *Compsus* renferme de magnifiques insectes, la plupart de taille au-dessus de la moyenne des Curculionides. Aussi est-il tout indiqué que ce groupe soit largement représenté dans la plupart des collections publiques et privées. Mais très souvent si la beauté des spécimens excite l'admiration des visiteurs, l'entomologiste est obligé de constater l'absence de nom spécifique. Et en effet, le *Catalogus Coleopterorum* de GEMMINGER et HAROLD, VIII, 1871, cite seulement 45 espèces ; depuis, 70 autres espèces ont été décrites par CHEVOLAT, KIRSCH, PASCOE, FAUST, CHAMPION et M. G. A. K. MARSHALL. Ce total de 120 espèces environ, qui semble imposant, ne donne cependant qu'une idée incomplète de la richesse de ce groupe dispersé dans les deux Amériques mais particulièrement bien représenté dans les contrées équatoriales de l'Amérique du Sud. Son centre de dispersion est vraisemblablement la Colombie, à en juger par la multiplicité non seulement des *Exorides* mais surtout des *Compsus* ; nombre d'espèces sont étroitement localisées. On ne sera donc pas surpris que le présent travail accroisse d'une cinquantaine le nombre des espèces antérieurement connues ; parmi ces espèces, un assez grand nombre d'entre elles se rencontrent dans les collections avec des noms restés in litteris, et qu'il était donc utile de décrire pour permettre leur identification ; ces noms in litt. ont été conservés autant qu'il a été possible.

M. G. A. K. MARSHALL a publié une importante contribution à ce groupe et précisé les caractères du genre *Exorides* PASC. (*Trans. of the Entomol. Soc. Lond.*, 1922). Les présentes espèces sont en conséquence réparties dans les genres *Compsus* SCHÖNH., *Plococompsus* MARSH., *Exorides* PASC. Les espèces de ces deux derniers genres

étant peu nombreuses, il n'a pas été dressé de tableau analytique pour elles; mais, par contre, ce tableau était nécessaire pour les *Compsus* comprenant 40 espèces, et il a été établi sur les caractères les plus apparents afin d'orienter plus aisément les déterminations. On remarquera que les caractères sexuels secondaires sont très faibles, ne se manifestant chez le mâle que par une taille moindre et une forme plus étroite des élytres que chez la femelle.

Cette étude n'ayant pu être menée à bien que grâce aux types et aux nombreux matériaux de la célèbre collection SCHOENHERR-CHEVROLAT très obligeamment communiqués par M. le Dr A. ROMAN du Museum de Stockholm, c'est un devoir très agréable à remplir de reconnaître l'aide précieuse et désintéressée apportée à mes recherches par cet établissement scientifique et d'offrir en particulier à M. le Dr A. ROMAN l'hommage de ma profonde gratitude.

TABLEAU DES *COMPSUS* SCHOENH.

1. Scape des antennes normal. 2.
Scape des antennes pédonculé à la base, comprimé, large, ses côtés parallèles. Elytres avec le 3^e interstrie terminé au sommet de la déclivité par un tubercule ordinairement nacré, parfois fauve. Long. 11-13 mm. 27. *eustylodes* n. sp.
2. Ecusson normal 3.
Ecusson très petit ou nul 36.
3. Fémurs antérieurs plus ou moins renflés mais inermes 4.
Fémurs antérieurs fortement renflés, armés d'une dent triangulaire et obtuse. Scape antennaire très épais. Dessus légèrement teinté de brun, avec un dessin blanc. Long. 7 mm.
. 34. *parvus* n. sp.
4. Troisième interstrie des élytres non ou faiblement costiforme mais au sommet de la déclivité postérieure brusquement relevé en forme de dent comprimée ou de tubercule. 5.
Troisième interstrie en arrière non ou graduellement relevé et sans tubercule 10.
5. Tubercule postérieur du 3^e interstrie arrondi ou allongé. 6.
Ce même tubercule en forme de dent comprimée et horizontale. Elytres blancs, la suture en avant, le milieu du prothorax, la tête et le rostre d'un brun fauve. Long. 19-23 mm.
. 2. *Otti* n. sp.
6. Elytres en arrière ayant au plus trois tubercules. 7.
Chaque élytre en arrière pourvu de 7 tubercules séparés dont les

- plus gros sur le 3^e interstrie. Elytres blancs, convexes, brièvement arrondis à leur sommet. Long. 12 mm.
. 1. *tuberculatus* n. sp.
7. Elytres avec de forts mucrons apicaux, le tubercule du 3^e interstrie arrondi 8.
Elytres étroits, leurs mucrons apicaux courts, le 3^e interstrie en arrière brusquement relevé en forme de côte épaissie. Verdâtre, mat, partiellement teinté de brun fauve. Long. 11 mm. 26. *viridulus* n. sp.
 8. Disque des élytres uni. 9.
Elytres verts, le disque avec quelques pustules roses, les tubercules postérieurs très gros. Long. 12-15 mm.
. 23. *pustulosus* n. sp.
 9. Elytres avec les fovéoles grosses, sur les côtés plus ou moins confluentes, leurs intervalles rugueux et transversalement ondulés, le 3^e interstrie un peu relevé mais non costiforme. Revêtement blanchâtre. Long. 18 mm. 21. *latifrons* n. sp.
Elytres avec les fovéoles nettes, alignées en séries géminées régulières, les 3^e, 5^e, 7^e interstries relevés, faiblement costiformes, la 2^e côte (5^e interstrie) effacée dans sa moitié antérieure. Revêtement d'un brun grisâtre, parfois en partie vert. Long. 12-17 mm. 16. *pertinax* n. sp.
 10. Antennes avec le 2^e article de un tiers au moins plus long que le 1^{er} 11.
Antennes avec le 2^e article non ou très peu plus long que le 1^{er} 38.
 11. Elytres avec au moins le 3^e interstrie costiforme. 12.
Elytres avec les interstries non costiformes, parfois le 3^e relevé en arrière 26.
 12. Elytres blancs avec ou sans taches métalliques, bleues ou vertes 13.
Elytres d'une autre coloration 16.
 13. Elytres unicolores 14.
Elytres avec des taches 15.
 14. Interstries convexes (suture en avant excepté), les impairs plus élevés, tous pourvus de nombreuses et courtes soies blanches; arête antérieure des épaules faiblement sinuée avant la base. Long. 17-18 mm. 3. *candidus* n. sp.
Interstries 3, 5, 7 costiformes, la suture en avant et les autres interstries plans, les soies dorsales microscopiques, les épaules

- avec leur arête antérieure fortement sinuée avant la base.
Long. 13-18 mm. 4. *albus* n. sp.
15. Pattes blanches, les fémurs avec une petite tache verte; tache médiane des élytres oblique. Long. 10 mm.
. 6. *obliquatus* n. sp.
Pattes en majeure partie, la tête, le rostre verts. Long. 15 mm.
. 5. *affinis* n. sp.
16. Côtes des élytres normales 17.
Elytres avec les 3^e, 5^e, 8^e interstries costiformes, le 8^e vers son milieu bifurqué en deux côtes se prolongeant en arrière, l'une sur le 8^e, l'autre sur le 7^e interstrie, leur intervalle pourvu de deux lignes légères de points. Revêtement d'un bleu opalin. Long. 13-18 mm. 11. *divisus* n. sp.
17. Elytres avec les interstries alternativement clairs ou plus foncés, formant des bandes bleues, blanches ou brunes 18.
Dessin des élytres non formé de bandes alternées 22.
18. Bandes alternativement blanches ou bleu pâle et blanches 19.
Elytres avec les interstries impairs verts, les pairs d'un brun chocolat. Long. 14-15 mm. 10. *lineatus* n. sp.
19. Bandes blanches et les autres bleues ou vertes très tranchées. 20.
Revêtement des élytres d'un vert cendré glauque, les interstries pairs légèrement teintés de gris-perle, les bandes peu tranchées. Long. 20 mm. 9. *deliciosus* n. sp.
20. Prothorax assez fortement rugueux. Déclivité postérieure des élytres à 60°. Antennes, tête, rostre, la majeure partie des pattes bleus ou verts 21.
Prothorax faiblement rugueux; déclivité postérieure des élytres à 45°. Tibias, tarsi, antennes, tête et rostre dorés. Long. 18 mm. 8. *delicatulus* n. sp.
21. Fovéoles élytrales petites, densément squamulées, peu visibles excepté contre les bords des interstries qu'elles échancrent légèrement. Long. 11-16 mm. 12. *alternivittatus* n. sp.
Elytres avec les côtes plus élevées, leurs bords fortement échancrenés par les fovéoles, ces dernières plus grossières. Long. 12-16 mm. 13. *attenuatus* n. sp.
22. Elytres au sommet au moins assez longuement mucronés 23.
Elytres au sommet rétrécis acuminés mais non mucronés, le 1^{er} interstrie costiforme mais dans son tiers antérieur plan. Tête et rostre d'un pourpre violet. Long. 12-16 mm.
. 20. *violaceus* n. sp.

23. Deuxième côte (5^e interstrie) des élytres effacée en avant 24.
Elytres avec les côtes peu élevées mais entières, blancs, ornés d'une ligne d'un brun noir, dentelée, sur le 5^e interstrie jusqu'à son tiers postérieur, arquée ensuite en dedans et se réunissant à la ligne opposée en formant un arc large au sommet de la déclivité. Long. 11-12 mm. 18. *azureipes* n. sp.
24. Elytres à revêtement brun ou grisâtre, parfois en partie bleuâtre, entremêlé de nombreuses soies, les côtes fortes se prolongeant en arrière jusqu'au sommet 25.
Elytres à revêtement d'un brun teinté de rosé, brun dans les fovéoles, les côtes peu élevées; s'arrêtant au commencement de la déclivité, les soies microscopiques. Long. 12-15 mm.
. 19. *bellus* n. sp.
25. Interstries pairs plans ou peu convexes
. 14. *canescens* BOH. var. *dorsalis* n. v.
Interstries convexes, tous pourvus de deux séries assez régulières d'assez longues soies blanches. Long. 13-15 mm.
. 15. *alboretotus* n. sp.
26. Revêtement élytral dense et vert 27.
Elytres autrement colorés. 30.
27. Elytres larges, sans taches, avec des séries de points, les interstries sur le disque plans ou très peu convexes et non rugueux.
Vert en entier 28.
Elytres avec des taches ou des ondulations noires 29.
28. Elytres avec leurs points gros, transversaux et noirs. Long. 17-18 mm. 39. *viridissimus* n. sp.
Elytres avec leurs points petits, squamulés, Long. 16 mm.
. 40. *cyphoides* n. sp.
29. Elytres avec des ondulations transversales noires. Long. 13 mm. 35. *nigroundulatus* n. sp.
Elytres finement ponctués, chacun d'eux avec 5 points noirs assez gros, leur sommet, la tête, le rostre, les fémurs en partie d'un rosé nacré. Long. 11-13 mm. 38. *Benoisti* n. sp.
30. Revêtement dorsal dense 31.
Noir de poix, revêtu en-dessus de squamules peu serrées, petites, rondes, ne recouvrant pas complètement les téguments, les élytres brièvement acuminés au sommet, leurs fovéoles grosses. Long. 8-13 mm. 28. *scrutator* n. sp.
31. Revêtement dorsal non blanc 32.
Revêtement compact, blanc, le funicule antennaire, l'extrémité

- des tibias et les tarsi bleus. Elytres grossièrement fovéolés, à leur sommet brièvement et faiblement acuminés. Long. 7-12 mm. 24. *cyanitarsis* n. sp.
32. Elytres mucronés à leur sommet 33.
Elytres à leur sommet subarrondis ensemble ou obtusément acuminés. 35.
33. Soies dorsales des élytres microscopiques et éparses, 3^e interstrie au sommet de la déclivité s'effaçant graduellement. Long. 11-13 mm. 34.
Elytres criblés sur toute leur surface de très petits points, brièvement sétigères, le 3^e interstrie brièvement costiforme en arrière, la côte nette mais se terminant brusquement au commencement de la déclivité postérieure. Revêtement d'un blond légèrement teinté de vert. sur les tarsi et le funicule antennaire d'un bleu cendré. Long. 13 mm. 32. *sulcicollis* n. sp.
34. Revêtement d'un rose cuivreux mat, entremêlé de quelques squamules scintillantes vertes, sur les antennes et les tarsi vert. 29. *aurisquamosus* n. sp.
Revêtement dorsal brun, mat, très dense 30. *subcostatus* n. sp.
35. Elytres s'élargissant fortement en arrière, à revêtement d'un jaune verdâtre, les troisièmes interstries au sommet de la déclivité plus élevés et reliés entre eux par une faible cloison transversale ondulée, émettant chacun en arrière un rameau arqué. Long. 16 mm. 22. *sylvaticus* n. sp.
Elytres s'élargissant peu en arrière, leur revêtement nacré, irisé, les 3^e et 5^e interstries en arrière costiformes et brusquement terminés le 3^e au sommet, le 5^e au milieu de la déclivité, le 7^e relevé sur toute sa longueur. Long. 12,5 mm. 31. *roseomicans* n. sp.
36. Revêtement vert, dense et mat, les côtes élytrales nulles ou faibles 37.
Oblong, d'un marron foncé, le revêtement grisâtre, pourvu de nombreuses soies blanches, les 3^e, 5^e, 7^e interstries costiformes. Long. 12-16 mm. 17. *peruvianus* n. sp.
37. Interstries latéraux rugueux, le 3^e relevé en arrière. Long. 12-16 mm. 25. *parviscutum* n. sp.
Elytres avec trois petits points noirs, convexes, pourvus de petites fovéoles en séries peu régulières, leurs intervalles d'égale et faible convexité, faiblement ondulés sur les côtés. Long. 9-12 mm. 37. *tripunctatus* n. sp.

38. Revêtement dorsal blanc au moins en partie 39.
Revêtement vert, en partie doré sur la tête, le rostre, les élytres avec des ondulations transversales noires. Long. 13 mm. 36. *cicatricosus* n. sp.
39. Revêtement dorsal blanc, chaque élytre avec 5 points verts (d'un brun noir dans leur centre). Long. 9 mm. 7. *viridipunctatus* n. sp.
Revêtement d'un brun ocré pâle, les élytres ornés d'un dessin blanc comprenant une tache cruciforme et des points. Long. 9-12 mm. 33. *alboguttatus* n. sp.

DESCRIPTION DES ESPÈCES

1. *Compsus tuberculatus* n. sp.

Revêtement compact blanc de craie, sur le disque du prothorax, la tête, le rostre, les antennes (massue noire exceptée), les tarsi, les tibias et les genoux antérieurs, brun.

Rostre rectangulaire, un peu plus long que large, les ptérygies très peu développées, ne débordant que très peu sur les côtés, le scrobe profond, régulièrement arqué, tangeant au bord inférieur de l'œil; en dessus largement et profondément impressionné, avec un sillon médian prolongé jusqu'au vertex, à sa base de chaque côté avec une carène obtuse séparant une impression antéoculaire triangulaire de l'impression dorsale, ainsi que la tête avec quelques points dénudés noirs. Tête avec une impression transversale séparant le vertex convexe du front plan, ce dernier double du diamètre d'un œil, les yeux semi-globuleux, leurs orbites blanches et ciliées. Antennes grêles; scape fortement claviforme à son sommet atteignant juste le bord antérieur du prothorax; tous les articles du funicule plus longs que larges, le 2^e presque le double du 1^{er}, la massue étroite et allongée.

Prothorax un peu plus large que long, subcylindrique, les côtés légèrement sinués en dedans devant les angles postérieurs, ces derniers aigus, la base fortement bisinuée, un peu plus large que le bord antérieur; disque déprimé et étroitement canaliculé au milieu, les rugosités fortes, pointillées. Écusson semi-ovale, plan, squamulé.

Elytres convexes, à leur sommet brièvement arrondis ensemble, la base fortement bisinuée, les épaules très obliques en avant, à leur extrémité en angle presque aigu et débordant les côtés, la déclivité postérieure faiblement arquée à 60°, non impressionnée mais tuberculée; chaque élytre pourvu de trois séries de tubercules coniques, arrondis

ou faiblement acuminés (les plus petits) à leur sommet, la 1^{re} série sur le 3^e interstrie relevé et subtuberculé en avant, composée principalement de 3 gros tubercules en arrière, le plus gros (2^e) au sommet de la déclivité; la 2^e série, sur le 5^e interstrie, en arrière, comprenant 4 tubercules petits, la 3^e série composée de 2 petits tubercules sur le 7^e interstrie en arrière; séries peu régulières, leurs points petits mais profonds; interstries plans, marqués de nombreux points aussi gros que ceux des séries; tous ces points sétigères, les soies apicales assez longues et blanches, les autres noires, les antérieures très courtes, les postérieures longues, dressées, particulièrement au voisinage des tubercules.

Pattes et dessous avec de nombreux points sétigères.

Long. 12 mm.

Brésil: Espirito Santo, 1 specimen, ma collection (ex STAUDINGER).

2. *Compsus Otta* n. sp. (CHEVR. in litt.)

♂. Revêtement très dense et blanc, sur la tête et le rostre, le milieu du prothorax, l'écusson, la base de la suture, les antennes (massue noire exceptée), d'un brun fauve, les points des séries élytrales gros et bruns.

Rostre aussi long que large, s'élargissant de la base au sommet le sillon médian profond, recouvert ainsi que les côtés de l'impression apicale de très petites squamules. Yeux globuleux. Antennes avec le scape robuste.

Prothorax cylindrique, plus long que large, grossièrement ponctué.

Écusson fortement rétréci en avant.

Elytres avec leur base distinctement plus large que celle du prothorax, terminés par deux longs mucrons parallèles et sétosulés, pourvus chacun de trois côtes surmontées de tubercules arrondis ou faiblement acuminés, la 1^{re} côte avec 10 tubercules, les premiers très petits et en arrière de la base, le 10^e fort et horizontal, la 2^e côte se rapprochant en arrière de la 3^e, pourvue de 8 tubercules, le dernier petit et situé au milieu de la déclivité postérieure, le 1^{er} vers le quart antérieur, la 3^e côte avec 12 tubercules très petits, le 1^{er} situé derrière le calus huméral; séries de fovéoles géminées, les fovéoles grandes, mais d'inégale grosseur.

♀. Plus grande, plus large, la coloration brune recouvrant le dessous, (trois derniers segments ventraux exceptés), les côtés du prothorax (ce dernier de chaque côté avec seulement une ligne blanche), la base des interstries, les 7^e et 8^e interstries presque en entier, leur sommet restant blanc. Elytres avec les côtes plus élevées, les fovéoles dorsales

moins grandes, les latérales réduites à de simples points dans les parties brunes; deux séries supplémentaires de fovéoles, en arrière, entre les 3^e et 4^e séries. De nombreux poils blancs, courts, fins se détachant nettement dans les parties brunes.

Long.: ♂, 23 mm.; ♀, 17 mm.

Brésil, sans localité précise, ♀, type (coll. OTT), Museum de Stockholm; ♂ (ex PORTEVIN), ma collection.

Cette espèce, voisine de *C. niveus* F., s'en distingue par les caractères indiqués ci-dessus; les autres caractères sont semblables.

3. *Compsus candidus* n. sp. (CHEVR. in litt.)

Revêtement compact d'un blanc de craie, la tête en avant, le rostre, les pattes en partie, le sommet des élytres avec un léger reflet doré, la massue antennaire grise.

Rostre moins long que large, s'élargissant de la base au sommet, en dessus convexe, finement sillonné, pointillé, l'échancrure apicale forte, noire. Tête courte, convexe, éparsément pointillée, les tempes moins longues que les yeux convexes et tronqués en avant. Antennes avec le scape médiocre, graduellement épaissi, à son sommet seulement deux fois aussi épais qu'à la base, le 2^e article du funicule presque aussi long que les 3^e et 4^e ensemble.

Prothorax subconique, peu plus large que long, en avant un peu moins large qu'à la base et très légèrement resserré, convexe, ses rugosités assez fortes. Écusson arrondi, tronqué à sa base.

Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu, au sommet brièvement mucronés, les mucrons pubescents et rapprochés, les épaules obliquement arrondies, leur arête antérieure à peine sinuée en dedans derrière la base; aire suturale plane, la déclivité postérieure à 60°; chacun muni de 3 côtes lisses et modérément élevées, la 1^{re} légèrement épaissie au sommet de la déclivité postérieure; tous les interstries (suture en avant exceptée) convexes, pourvus de nombreux mais très petits points sétigères, les soies courtes et blanches; les séries de fovéoles géminées, les fovéoles assez grandes et pourvues au fond d'une petite squamule granuleuse.

Pattes robustes; fémurs antérieurs peu renflés; tibias densément squamulés et sétosulés, les antérieurs arqués vers leur sommet.

Long. 17-18 mm.

Colombie: Bogota, 1 ♀, collection CHEVOLAT; Cartago, 3 ♀♀, (F. BERNARD); Palmira, 1 ♀ (F. HILAIRE), ma collection.

Cette espèce est très voisine de *C. virginialis* FAUST du Venezuela

et de *C. virgineus* PASC. du Pérou; elle se distingue de *C. virginalis* par les élytres ayant leur déclivité postérieure moins forte et dépourvue en son milieu de tubercule sur la 2^e côte, le prothorax plus large et plus court, le scape antennaire plus épais dès la base, le rostre plus large, son sillon plus fin; elle se distingue de *C. virgineus* par la coloration des pattes, le front plus large, le rostre moins long, non longitudinalement creusé, les élytres non impressionnés latéralement avant le sommet, leurs mucrons apicaux moins longs.

4. *Compsus albus* n. sp. (*C. carinatus* CHEV. in litt.).

Revêtement compact d'un blanc de craie, la massue antennaire grise.

♀. Rostre aussi long que large, s'élargissant modérément de la base au sommet, en dessus convexe, sans sillon médian, les impressions latérales obsolètes, ainsi que la tête avec de très petits points épars. Scrobes dirigés contre le milieu de l'œil. Tête conique, longue, convexe, les tempes aussi longues que le diamètre longitudinal d'un œil, le front très large. Antennes médiocres, le scape graduellement épaissi.

Prothorax subcylindrique, presque aussi long que large, les rugosités assez fortes.

Elytres avec des épaules obtusément arrondies, leur arête antérieure distinctement sinuée en dedans avant la base, avec leur sommet faiblement acuminé, sans mucron; munis chacun de trois côtes lisses, non interrompues et subparallèles, les interstries plans (suture relevée en arrière exceptée), les séries géminées formées de fovéoles petites, superficielles mais pourvues en leur centre d'un petit point noir; soies dorsales excessivement courtes, à peine visibles.

♂. Forme plus étroite, la sculpture plus forte, les élytres plus fortement acuminés au sommet, leurs côtes parallèles.

Long. ♀, 17-18 mm.; ♂, 13-14 mm.

Colombie: Ibagué, 4 ♀♀, 3 ♂♂, types (F. CLAVER); Fusaganya, 1 ♂, (F. APOLLINAIRE); sans localité précise, 1 ♂ (JAVET) coll. Museum de Stockholm.

Cette espèce diffère de *C. candidus* par les caractères indiqués ci-dessus, les caractères non indiqués étant communs aux deux espèces.

Sa sculpture la rapproche de *C. albarius* BOH., du Brésil dont elle diffère d'ailleurs par sa forme plus allongée et moins convexe, les antennes beaucoup plus grêles et plus courtes, le rostre plus long, non sillonné, le front plus large, les yeux moins convexes, les tibias élançés, etc.

5. *Compsus affinis* n. sp.

Revêtement blanc, orné d'un dessin vert comprenant: sur chaque élytre une tache humérale et seulement deux autres taches, l'une un peu avant le milieu entre les deux premières côtes, l'autre punctiforme, médiane et sur le 8^e interstrie; sur le prothorax trois bandes; la tête, sauf la pourtour des yeux, le rostre, les antennes, les pattes (femurs à la base et en dessus exceptés) verts.

Rostre non sillonné en dessus. Prothorax large, ses côtés arqués, devant les angles postérieurs distinctement sinués échancrés, les angles postérieurs non prolongés en arrière, la base faiblement bisinuée.

Elytres avec les épaules peu obliques, leur arête antérieure presque droite et formant avec la base un angle de 30°, les mucrons apicaux divariqués, les soies blanches microscopiques. Tibias antérieurs peu arqués.

Les autres caractères analogues à ceux de *C. viridimaculatus* BOH. Long. 15 mm.

Colombie: Villavicencia, 1 ♀, ma collection (F. HILAIRE).

Cette espèce, très voisine de *C. viridimaculatus* BOH. de Cayenne, en diffère par la coloration, la taille plus grande, les antennes plus robustes, le prothorax moins conique, ses côtés plus arrondis et échancrés en arrière, la sculpture plus forte, la forme caractéristique des épaules, les côtes des élytres plus élevées, les fovéoles plus grosses.

6. *Compsus obliquatus* n. sp.

Oblong, le revêtement compact blanc, orné d'un dessin vert clair et brillant comprenant; sur le prothorax cinq bandes; sur les élytres une tache subrectangulaire oblique, placée vers le milieu des interstries 3-6, une linéole sur la base de la suture, une tache contre l'épaule sur le 6^e interstrie, en arrière une courte linéole sur les interstries 2, 4, 6, 8, sur ce dernier plus longue et se réunissant en arrière à celle du 6^e, sur le bord latéral une tache en avant, une linéole en arrière; sur le milieu externe des femurs une petite tache.

Rostre moins long que large, peu élargi en avant, longitudinalement mais faiblement impressionné, avec une fine carène médiane squamulée, la ponctuation très fine et très éparse. Tête courte, les tempes moins longues que les yeux, le front double de la largeur d'un œil avec une petite fovéole squamulée, les yeux peu convexes, leur orbite enfoncé en avant. Antennes courtes; scape épais, graduellement mais peu fortement épaissi, atteignant le milieu du vertex; funicule avec

le 2° article à peine plus long que le 1^{er}, le 5° indistinctement plus long que large, la massue oblongue.

Prothorax subcylindrique, presque aussi long que large, les côtés très peu arqués vers leur milieu, la base fortement bisinuée et aussi large que le bord antérieur; convexe, impressionné sous la bande verte médiane, les fovéoles profondes, formant des rugosités peu irrégulières, les bandes latérales n'atteignant pas la base. Ecusson ovale, plus long que large.

Elytres un peu plus du double aussi longs que larges, à leur sommet brièvement arrondis, les épaules obtuses, ne débordant pas les côtés, les côtés parallèles jusqu'au tiers postérieur; convexes, mais l'aire suturale déprimée entre les 3^{es} interstries, les 3^e, 5^e, 7^e interstries costiformes, les autres interstries peu convexes.

Pattes peu élancées; fémurs antérieurs fortement renflés; tibias antérieurs modérément arqués en avant.

Long. 10 mm.

Colombie: Rio Chili, VI-1918, 1 ♂ type, ma collection (F. HILAIRE). Bogota, 1 ♂, Museum de Stockholm.

Le spécimen de Bogota a le dessin dorsal d'un bleu de ciel mat, et le bord latéral des élytres est presque entièrement bleu.

Petite et élégante espèce.

7. *Compsus viridipunctatus* n. sp. (CHEVR. in litt.).

Ovale oblong, le revêtement d'un blanc crayeux, orné d'un dessin vert comprenant: sur chaque élytre 5 points (brun noir dans leur centre) dont 1 près de la base du 3^e et du 7^e interstrie (calus huméral) 1 vers le milieu des mêmes interstries, 1 sur le sommet du 5^e; sur le prothorax 5 points, dont 3 sur le bord antérieur et 2 près du milieu; les côtés du scrobe, les tibias, les tarses, les genoux, les fémurs antérieurs en dessus, une tache sur les autres fémurs.

Rostre aussi long que large, peu dilaté en avant, longitudinalement impressionné et sillonné au milieu, de chaque côté avec un fin et court sillon arqué. Tête courte, les tempes moins longues que les yeux, le front moindre que le double du diamètre de l'œil, avec une petite fovéole, les yeux modérément convexes. Antennes courtes, assez robustes; scape assez épais, graduellement épaissi; funicule avec le 2^e article d'un quart à peine plus long que le 1^{er}, les 4^e et 5^e transversaux.

Prothorax plus large que long, sa plus grande largeur vers le milieu, les côtés faiblement arqués, la base fortement bisinuée et un peu plus

large que le bord antérieur; disque avec une impression ovale, faible, rétrécie en avant, avec quelques points médiocres, les côtés à peine impressionnés et plus densément ponctués; tout le disque, ainsi que la tête, avec de très petits points épars. Ecusson transversal.

Elytres courts, convexes, la région suturale plane, au sommet brièvement acuminés, les épaules en angle obtusément arrondi et très peu saillantes latéralement, les côtés parallèles jusqu'au tiers postérieur, la déclivité postérieure à 45°; séries de fovéoles faiblement géminées, presque équidistantes, leurs points petits, profonds; interstries plans, les 3^e, 5^e, 7^e peu convexes en avant, plus fortement en arrière, le 7^e vers son sommet confluent avec le 3^e.

Pattes médiocres, les tibias antérieurs droits, les tarses bruns en dessous.

Long. 9 mm.

Colombie: Bogota, 1 ♀, type Museum de Stockholm.

Guyane français: Cayenne, 1 ♀, ma collection.

Cette petite espèce ressemble à *C. Lebas* BOH. dont elle se distingue par son dessin vert, le rostre et le front plus larges, le 2^e article des antennes plus long que le 1^{er}, les élytres plus larges, leurs points moindres, le 3^e interstrie non brusquement terminé au sommet de la déclivité.

8. *Compsus delicatulus* n. sp.

Oblong, convexe, le revêtement compact, mat, délicat, de colorations variées, d'un blanc rosé, vert très pâle, doré, ainsi disposé: les parties blanches sont, sur le prothorax quatre bandes, les dorsales larges et confluentes sur le bord antérieur, sur les élytres les interstries costiformes, 3, 5, 7, en entier, le 9^e à ses extrémités, le bord marginal, l'écusson, sur la suture une ligne partant de l'écusson, s'élargissant en arrière, recouvrant toute la suture sur la déclivité ainsi que les forts mucrons apicaux, sur les pattes les fémurs, à l'exception d'une large tache apicale d'un bleu de ciel, les hanches (les antérieures à la base, les intermédiaires dans le milieu vertes), la saillie mésosternale; les parties dorées sont les tibias et les tarses, les antennes, la tête et le rostre (ces deux derniers d'un nacré doré); le reste vert.

Rostre seulement aussi long que large, assez fortement élargi en avant, convexe, son sillon médian obsolète, ses impressions latérales faibles. Tête convexe, les tempes plus longues que les yeux, le front double du diamètre d'un œil, avec une étroite fovéole médiane. Antennes élancées, le funicule avec les articles 5-7 beaucoup plus longs que larges.

Prothorax subconique, un peu moins long que large, les côtés rectilignes et faiblement convergents de la base au sommet, la base fortement bisinuée et recouverte par les bandes vertes, les latérales légères et rugueuses, la médiane peu large, plus profonde, se rétrécissant graduellement en avant, subinterrompue en son milieu; bandes blanches avec de très petits points, leurs soies courtes et blanches. Ecusson ovale, plus long que large.

Elytres convexes, ne s'élargissant pas en arrière, les épaules obtusément arrondies et assez saillantes latéralement; déclivité postérieure à 45°; suture en arrière, 3°, 5°, 7°, 9° (à ses extrémités) interstries costiformes, les autres interstries à peine convexes, les fovéoles petites en séries géminées très régulières.

Tibias antérieurs fortement arqués vers leur sommet.

Long. 18 mm.

Colombie: Cartago, 1 ♀, ma collection (F. BERNARD).

9. *Compsus deliciosus* n. sp.

Oblong, convexe, le revêtement dense, mat, d'un vert cendré glauque, en partie très légèrement teinté d'une coloration d'un gris perle.

Rostre un peu plus long que large, modérément élargi en avant, convexe, avec une fine ligne médiane noire et de chaque côté un trait court et net; vert au sommet et sur les côtés. Tempes plus longues que les yeux, le front plus du double du diamètre d'un œil, avec un point enfoncé, noir; yeux assez fortement convexes, entourés de squamules blanches, nacrées. Scape antennaire robuste, linéaire, s'épaississant un peu au sommet, lie de vin comme le milieu de la tête.

Prothorax aussi long que large, cylindrique, les côtés parallèles jusqu'au brusque mais faible rétrécissement apical, la base fortement bisinuée; disque avec quatre bandes grises, les deux médianes délimitant une aire légèrement aplanie, traversée par quelques faibles rugosités; sur les côtés les points et les rugosités plus serrés; squamules foncées subgranuleuses, les grises entremêlées de quelques petits points. Ecusson en demi-ovale, tronqué en avant, vert.

Elytres convexes, parallèles jusqu'au tiers postérieur, leurs mucrons apicaux assez courts et robustes, les épaules en angle obtus, large, peu saillantes latéralement; séries géminées, leurs points noirs et petits; suture plane jusqu'à la déclivité, convexe sur cette dernière; tous les interstries assez fortement convexes, reliés transversalement par de courtes et très faibles rugosités transversales plus foncées, les 3°, 5°, 7° interstries un peu plus élevés, subcostiformes, les 5° et 7° brusque-

ment terminés et non reliés entre eux sur la déclivité postérieure, cette dernière à 50°.

Pattes vertes en partie, leur pubescence blanche, les tibias antérieurs assez fortement arqués au sommet. Dessous vert.

Long. 20 mm.

Colombie: Cauca, Pereira, une femelle, ma collection (ex DONCKIER).

Cette belle espèce est voisine de *C. delicatulus* dont elle diffère par la coloration, la forme du prothorax, celle du scape antennaire, la sculpture des élytres, leur mucron plus court.

10. *Compsus lineatus* n. sp. (HELL. in litt.).

Oblong, noir, le revêtement d'un vert légèrement brillant et d'un brun chocolat, les élytres avec la suture et les interstries impairs verts, le prothorax avec quatre bandes vertes, les antennes noires avec la pubescence d'un gris bleuâtre, éparse sur le funicule, le dessous vert, avec les épimères et le métasternum en partie, foncés, les pattes brunes, la moitié basale des fémurs verte.

Rostre plus long que large, en avant fortement élargi, en dessus faiblement déprimé, la dépression avec une très fine carène médiane, les impressions latérales linéaires, peu profondes, obliques. Tempes moins longues que les yeux, le front à peine de moitié plus large qu'un œil, avec un point enfoncé; yeux fortement convexes, entourés d'un anneau d'un vert nacré; tête et rostre en dessus noirs, dénudés, leurs côtés et les lobes de l'échancrure apicale verts. Antennes avec la scape robuste, comprimé, graduellement mais faiblement élargi, funicule avec le 2° article de moitié plus long que le 1°, les 5° et 6° un peu plus longs que larges, la massue cendrée.

Prothorax subcylindrique, un peu plus large que long, en avant nettement et assez fortement resserré latéralement, la base fortement bisinuée et peu plus large que le bord antérieur, ce dernier un peu relevé; marqué d'une large et profonde impression médiane obsolètement rugueuse, les côtés légèrement comprimés et plus fortement rugueux. Ecusson ovalaire, convexe, vert.

Elytres se rétrécissant légèrement en arrière dès les épaules, leurs mucrons apicaux assez forts, les épaules brièvement arrondies, leur arête antérieure formant avec la base un angle de 45°; peu convexes, l'aire suturale plane, la déclivité postérieure à 45°; tous les interstries impairs en côtes assez élevées, les 2° et 3° côtes non réunies à leur extrémité, la suture plane en avant, costiforme sur la déclivité, les

autres interstries bruns, convexes, échancrés par les fovéoles, pourvus de très courtes soies brunes, les points des fovéoles petits et pourvus d'une squamule verte.

Pattes élancées; fémurs antérieurs non épaissis, leurs tibias élancés, assez fortement courbés; tarsi en dessus avec la pubescence d'un gris bleuâtre.

Long. 14-15 mm.

Colombie: S. Antonio, 3 spécimens, ma collection (ex STAUDINGER).

Espèce caractérisée par les lignes des élytres alternativement vertes et brunes.

11. *Compsus divisus* n. sp.

Oblong, convexe, le revêtement d'un bleu opalin, pâle, quelque peu luisant, sur la tête, le rostre, les fémurs et les tibias, sur l'abdomen, doré, sur les antennes et les tarsi d'un vert obscur à reflets dorés.

♀. Rostre aussi long que large, les ptérygies modérément développées, contre les yeux, en avant, avec un court et profond sillon semicirculaire; en dessus plan, avec une ligne médiane noire, dénudée, se terminant dans la fovéole frontale. Tête conique, courte, les tempes moindre que les yeux, les yeux gros, semiglobuleux, le front à peine plus long que le diamètre d'un œil. Antennes courtes; scape assez épais, un peu plus épais au sommet; funicule avec les articles 4-7 plus longs que larges, la massue brune.

Prothorax plus large que long, les côtés faiblement arqués, la base faiblement bisinuée et plus large que le bord antérieur; milieu du disque largement mais faiblement impressionné, à peine rugueux, les côtés légèrement impressionnés et couverts de rugosités médiocres et serrées; les petits points épars pourvus de microscopiques soies blanches.

Elytres avec la base légèrement bisinuée, les épaules largement arrondies, débordant peu les côtés, les mucrons apicaux courts, divariqués, les côtés parallèles; de moitié plus larges que le prothorax, leur déclivité postérieure à 60°; convexes, l'aire dorsale plane entre les troisièmes interstries; interstries 3, 5, 8 costiformes, le 8° vers son milieu bifurqué en deux côtes se prolongeant en arrière l'une sur le 7° interstrie, l'autre sur le 8° et l'intervalle de ces deux dernières pourvu de deux séries de fovéoles (une série supplémentaire); les autres interstries peu convexes; tous les petits points pourvus de courtes soies blanches.

Pattes assez élancées, les tibias antérieurs assez fortement arqués au sommet.

♂. Taille moindre, les épaules plus saillantes, les élytres subtrianulaires, se rétrécissant en arrière dès les épaules.

Long. 13-18 mm.

Colombie: Muzo, une paire, ma collection (ex F. HILAIRE).

Espèce des plus belles et des plus tranchées.

12. *Compsus alternevittatus* n. sp.

Allongé, déprimé en dessus, le revêtement d'un blanc rosé et d'un vert bleuté. Prothorax avec 5 bandes vertes; élytres avec les interstries impairs blancs et légèrement costiformes, les interstries pairs bleus, formant des bandes nettes. Tête, rostre, antennes, pattes (base des fémurs, en dessus, exceptée blanche) verts; dessous avec le milieu du metasternum, une tache sur les épimères mésothoraciques et une autre à l'extrémité du segment anal verts. Une petite fovéole noire sur le front.

Rostre pas plus long que large, modérément élargi en avant, ses côtés parallèles en arrière, l'échancrure apicale limitée par une carène arquée en arrière; en dessus convexe, avec une très fine ligne médiane et de chaque côté avec un court trait droit, oblique, sur les côtés avec quelques points brièvement sétigères. Tête convexe, les tempes presque aussi longues que les yeux, le front large, les yeux modérément convexes, leurs orbites blanches, enfoncées en avant. Antennes grêles; scape graduellement et faiblement épaissi, atteignant le milieu des tempes; tous les articles du funicule plus longs que larges, la massue oblongue et grise.

Prothorax subcylindrique, presque aussi long que large, la base bisinuée et à peine plus large que le bord antérieur, assez fortement rugueux, le sillon médian peu profond et vert, les points plus gros et plus visibles dans les bandes vertes. Ecusson ovale.

Elytres avec les épaules arrondies obtusément, peu saillantes latéralement, les côtés parallèles jusqu'au delà du milieu, au sommet brièvement acuminés; suture plane, relevée en arrière, finement pointillée ainsi que les côtes blanches, ces dernières peu élevées, leurs bords entamés par les fovéoles des séries, ces fovéoles petites, densément squamulées; soies dorsales blanches, très courtes, même sur la déclivité postérieure, cette dernière à 60°.

Pattes élancées: fémurs antérieurs fortement renflés et inermes; tibias antérieurs grêles et assez fortement arqués. Tarsi fauves en dessous.

♂. Plus étroit, plus petit, les segments ventraux en partie verts.

Long. 11-16 mm.

Colombie: Rio Chili, VI-1918, types; Muzo; Pensylvanie; 4 ♂♂, 6 ♀♀ (F. HILAIRE).

Espèce facile à reconnaître aux bandes alternées de ses élytres. La coloration est des plus délicates; elle varie quant aux taches du dessous, particulièrement chez le ♂.

13. *Compsus attenuatus* n. sp. (CHEVR. in litt.).

Revêtement d'un blanc rosé et d'un vert pâle. Parties vertes: Tête, rostre, antennes (massue grise exceptée), cinq bandes sur le prothorax, sur les élytres la suture (comptée comme 1^{re} interstrie), sur la déclivité postérieure exceptée, les interstries 2, 4, 6, 8, 9 (ce dernier blanc à ses extrémités), les tarsi, les tibias, la moitié apicale et dorsale des fémurs, les épimères mésothoraciques, le milieu du métasternum et parfois une partie des segments ventraux.

Quant au reste, semblable à *C. alternevittatus* m. dont elle diffère par la disposition des bandes élytrales, la sculpture dorsale plus forte sur le prothorax et sur les élytres, les côtes blanches des élytres plus élevées, plus larges, les bandes vertes plus étroites et leurs fovéoles plus grandes.

Long. 12-16 mm.

Colombie; Ibagué, ♂♀, types (F. CLAVER); Rio Chili, VI-1918, Muzo, Quindio, 9 spécimens (F. HILAIRE).

Colombie, sans localité précise, 1 ♂ (GOUDOT), Museum de Stockholm.

Var. *interruptus* n. var.

Deuxième côte blanche effacée dans sa moitié antérieure.

Mêmes localités que la forme typique.

14. *Compsus canescens* BOH. var. *dorsalis* n. var.

Rostre, tête, impression médiane du prothorax, intervalle des troisième interstries, antennes et pattes d'un bleu cendré mat.

Colombie: Villavicencio, une paire, ma collection (ex STAUDINGER).

La coloration dorsale de cette forme, très différente de la forme typique, pourrait la faire supposer appartenir à une forme distincte, mais elle a tous les autres caractères de *C. canescens* BOH. dont elle n'est certainement qu'une variation de coloration.

15. *Compsus albosetosus* n. sp. (HELLER in litt.).

Noir de poix, le revêtement d'un brun grisâtre, sur le dessous et les

fémurs avec un léger reflet verdâtre ou cuivreux métallique. Revêtu en dessus de soies relativement longues, soulevées, acuminées, blanches, assez régulièrement bisériées sur les interstries des élytres. Elytres avec tous les interstries (suture en avant exceptée) relevés en côtes faibles mais régulières, leurs bords indistinctement échancrés par les fovéoles, les 3^e, 5^e, 7^e plus larges et plus élevés, le 5^e effacé en avant. Fovéoles élytrales presque entièrement recouvertes par les squamules.

Les autres caractères analogues à ceux de *C. canescens* BOH. dont elle se distingue à première vue par la plus grande longueur et la disposition des soies élytrales, la forme des interstries.

Long. 13-15 mm.

Colombie, sans localité précise, types (ex-STAUDINGER), 5 ♀♀, 1 ♂; Bogota, 1 ♂.

16. *Compsus pertinax* n. sp. (FAUST in litt.).

♀. Oblong, les téguments bruns, le revêtement dense, d'un brun grisâtre, les derniers articles du funicule et sa massue d'un bleu grisâtre, les articles des tarsi ou tout au moins le 3^e d'un bleu noir.

Rostre un peu moins long que large en avant, les ptérygies peu développées, l'échancrure apicale bordée par une carène noire, arquée en arrière; en dessus irrégulièrement convexe, plus fortement en arrière et le front déprimé et avec un point petit et noir; derrière l'échancrure apicale avec une impression triangulaire prolongée par un fin sillon; de chaque côté avec un court mais profond sillon. Tête conique, convexe, les tempes aussi longues que les yeux; le front un peu plus large que le double du diamètre transversal d'un œil, les yeux peu convexes tronqués en avant, rétrécis inférieurement. Antennes assez longues; scape graduellement mais faiblement épaissi, dépassant un peu l'œil; funicule avec le 2^e article aussi long que les 3^e et 4^e ensemble, tous les suivants notablement plus longs que larges, la massue ovale, à peine plus longue que les articles 6-7 ensemble.

Prothorax cylindrique, aussi long que large, d'égale largeur à ses extrémités, la base faiblement sinuée, derrière le bord étranglé, le bord antérieur relevé, impressionné sur le milieu du disque, légèrement comprimé sur les côtés, les rugosités fortes, peu serrées, les fovéoles plus nettes sur les côtés. Ecusson ovale.

Elytres s'élargissant faiblement jusqu'au tiers postérieur, leurs mucrons apicaux forts, contigus, parallèles, leurs épaules en angle obtus, émoussé, débordant à peine les côtés; disque plan entre les 3^e interstries, la déclivité postérieure à 60°, pourvue à son sommet, de chaque

côté (3^e interstrie) d'une élévation tuberculeuse assez forte; fovéoles grosses, régulières, les interstries peu convexes, les 3^e, 5^e, 7^e plus convexes, les soies microscopiques et nombreuses.

Fémurs antérieurs modérément épaissis, leurs tibias arqués.

♂. Plus petit, les élytres subparallèles, les fovéoles dorsales plus grossières.

Long. 12-17 mm,

Colombie: Cauca, types, ma collection (ex STAUDINGER).

La coloration est remarquablement variable chez cette espèce. Voici les principales formes:

Var. *vilis* n. var. (CHEVR. in litt.).

Antennes (massue exceptée), tête, rostre, prothorax en avant, la majeure partie des pattes, les élytres en arrière, teintés de vert clair. Rarement le prothorax et les élytres verts presque entièrement. —

Cauca.

Var. *dorsofuscus* n. var. (CHEVR. in litt.).

Revêtement blanc, la tête, le rostre, les antennes à la base, les tibias, les mucrons apicaux des élytres avec un léger reflet doré. Dos des élytres, entre les troisièmes interstries, légèrement enfumé.

Colombie, sans localité (coll. CHEVROLAT); Cauca (ma coll.).

Equateur, spécimen à reflets dorés vifs, ma coll. (ex DONCKIER).

Etudié 40 spécimens de cette espèce, la plupart du Cauca.

17. *Compsus peruvianus* n. sp.

Oblong, marron foncé, le revêtement grisâtre, pourvu de nombreuses soies blanches, relativement longues, sur les élytres soulevées et peu régulièrement alignées le long des interstries; tête, rostre, dessous, pattes, revêtus de squamules d'un brun de poix, formant un revêtement compact, fortement appliqué, semblant être les téguments; funicule des antennes (la massue cendrée) bleu, tarsi antérieurs verts, pubescents.

Rostre s'élargissant de la base au sommet, en ce dernier point aussi large que long, en dessus convexe, ses sillons latéraux longs, profonds, obliques, ainsi que la tête pourvu de nombreux petits points, leurs soies blanches. Tempes aussi longues que les yeux, le front large, fovéolé, les yeux saillants. Antennes médiocres; scape noir, claviforme, droit, sétulosé; funicule avec le 2^e article à peine plus long que le 1^{er}, le 6^e seulement aussi long que large.

Prothorax aussi long que large, subcylindrique, brièvement étranglé en avant, les côtés légèrement arqués, la base modérément bisinuée et à peine plus large que le bord antérieur; convexe, le long du milieu

étroitement et légèrement impressionné, mais avec au milieu un profond sillon n'atteignant pas le bord antérieur, interrompu en son milieu par une élévation transversale, les côtés de l'impression avec des points petits, sétulosés et quelques points plus gros; les côtés squamulés et avec une ligne ruguleuse de gros points squamulés. Ecusson oblong, très petit, plan, squamulé.

Elytres s'élargissant très peu en arrière, brièvement rétrécis arrondis au sommet, les épaules très obliques, peu développées, brièvement arrondies; déclivité postérieure à 60°; aire suturale plane, s'élargissant un peu jusqu'au delà du milieu; 3^e, 5^e, 7^e interstries costiformes, les 3^e et 5^e parallèles, légèrement incurvés en dehors jusqu'au delà du milieu, au sommet de la déclivité épaissis, calleux et brusquement terminés; les autres interstries plans, les fovéoles grosses sur le disque, petites sur les côtés et le sommet.

Pattes élancées; fémurs antérieurs peu renflés, les tibias antérieurs élancés et droits.

Long. 14 mm.

Pérou: Chanchamajo, un spécimen, ma collection.

Cet unique spécimen a le disque des élytres dénudé, peut-être par suite de frottement; les soies sont cependant intactes.

18. *Compsus azureipes* n. sp. (HELLER in litt.).

Oblong, déprimé, le revêtement d'un blanc nacré ou souvent légèrement teinté de gris, mat, la moitié apicale et supérieure des fémurs, les tibias et les tarsi d'un bleu d'azur, les antennes d'un bleu plus foncé; orné de chaque côté d'une ligne d'un brun noir, dentelée, échancrée par les fovéoles sur les élytres, commençant sur les côtés de la tête, prolongée sur le côté du prothorax, sur le 5^e interstrie des élytres, jusqu'à son tiers postérieur, ensuite arquée en dedans et se réunissant à la ligne opposée en formant un arc au sommet de la déclivité postérieure.

Rostre plus long que large, fortement élargi en avant, avec un fin sillon médian et de chaque côté une courte ligne antéoculaire, ses points et ceux de la tête épars et brièvement sétigères. Tempes moindres que le diamètre de l'œil. Front plan, les yeux semi-globuleux. Antennes peu robustes; scape graduellement et modérément épaissi, dépassant le bord antérieur du prothorax; funicule avec le 2^e article presque aussi long que les 3^e et 4^e ensemble, le 5^e aussi long que large, la massue oblongue.

Prothorax aussi long que large au milieu (où il est le plus large),

faiblement arqué sur les côtés, la base bisinuée et un peu plus large que le bord antérieur; peu convexe, les rugosités squamulées et médiocres, les petits points sétigères. Ecusson subovale, rétréci en avant, plan.

Elytres allongés, terminés à leur sommet par un mucron court, la base fortement bisinuée, les épaules obtuses, les côtés convergents faiblement en arrière dès les épaules; séries régulières, leurs fovéoles médiocres, avec un point dans leur centre; interstries peu convexes, entamés par les fovéoles; chaque élytre avec trois faibles côtes (interstries 3, 5, 7); la déclivité postérieure à 80°. Fémurs antérieurs fortement renflés mais inermes; tibias élancés, les antérieurs assez fortement arqués.

Long. 11-12 mm.

Amazones: Santarem, 8 spécimens (ex STAUDINGER).

Cette espèce se distingue aisément par sa coloration et son dessin.

19. *Compsus bellus* n. sp.

♀. Oblong, la tête, le rostre, les antennes, les genoux, les tibias et les tarsi, les forts mucrons apicaux des élytres d'un pourpre brillant, le dessous en majeure partie et les fémurs d'un vert cendré, avec des squamules éparses, scintillantes, le prothorax avec les rugosités d'un blanc teinté de rosé, les cavités brunes, les élytres d'un blanc rosé, avec une large bande latérale, en arrière traversant la déclivité postérieure, une tache humérale, une bande médiane entre la 1^{re} et la 2^e côtes, légèrement teintés de vert (forme typique) ou de brun clair (variété) ou les élytres unicolores (variété).

Rostre large et court, les ptérygies fortement développées, entre ces dernières aussi large que long; en dessus, en avant avec une légère impression triangulaire, pourvue d'une fine carène noire, les impressions dorsales nettes, obliques. Tête conique, les tempes plus longues que les yeux, le front fovéolé, double de la largeur d'un œil; les yeux fortement convexes, entourés de squamules claires. Antennes médiocres; scape graduellement épaissi, au sommet un peu plus fortement; funicule avec les articles 4-5 beaucoup plus longs que larges, la massue cendrée.

Prothorax cylindrique, plus long que large, la base modérément bisinuée, brièvement étranglé latéralement derrière le bord antérieur; déprimé sur le milieu; criblé de rugosités assez fortes de hauteur presque égale, les fovéoles irrégulières. Ecusson ovalaire.

Elytres s'élargissant jusqu'au tiers postérieur, leurs mucrons apicaux

longs et parallèles, les épaules en angle obtus, leur arête antérieure atteignant la base sans sinuosité; aire suturale plane entre les troisièmes interstries; 3^e et 7^e interstries jusqu'à la déclivité, le 5^e dans ses deux tiers postérieurs costiformes, les autres interstries faiblement convexes; fovéoles dorsales grosses, les latérales petites, les séries régulières excepté en avant entre les 3^e et 7^e interstries. Tibias antérieurs assez fortement arqués.

♂. Taille moindre, les élytres parallèles.

Long. 12-15 mm.

Colombie: Antiqua, 2 ♂♂, 2 ♀♀, ma collection.

La coloration est variable sur le dessus des élytres mais reste constante sur les autres parties du corps. Par sa 2^e côte effacée en avant, cette espèce se rapproche de *C. canescens* BOH.

20. *Compsus violaceus* n. sp.

Ovale oblong, le revêtement dense, mat, varié, le prothorax en avant, la tête et le rostre d'un pourpre violet, les pattes d'un vert luisant, mais avec le 3^e article des tarsi noir, les autres articles d'un vert foncé, le dessus du prothorax et des élytres en avant teintés de bleu verdâtre, les élytres en arrière d'un blanc rosé, le dessous en avant dans le milieu doré et nacré, vert sur les côtés, l'abdomen noir brillant, éparsément, pubescent, ses côtés avec une bordure nacréée très large sur les deux premiers segments, très étroite sur les 3^e et 4^e, nulle sur le 5^e.

♀. Rostre aussi long que large, modérément élargi en avant, son impression dorsale limitée de chaque côté par une carène obtuse, ces deux carènes convergentes, confluentes devant la petite fovéole frontale, les côtés du rostre impressionnés largement et profondément en dehors des carènes dorsales. Tête large, les tempes plus longues que les yeux, le front plus du double du diamètre d'un œil, les yeux fortement convexes, entourés de squamules nacréées. Antennes avec le scape verdâtre, linéaire, à peine épaissi au sommet, atteignant le bord antérieur du prothorax; funicule cendré, le 2^e article moins long que les 3^e et 4^e ensemble, le 5^e plus long que large.

Prothorax subcylindrique, aussi long que large, en avant légèrement resserré latéralement et à peine moins large que la base, les angles postérieurs droits; disque plan, les côtés obliquement comprimés; couvert de fortes rugosités serrées sur les côtés, faibles sur l'impression médiane en arrière. Ecusson ovalaire, cendré, plan.

Elytres larges, s'élargissant jusqu'au tiers postérieur, au sommet

rétrécis acuminés mais non mucronés, les épaules petites, en angle obtus mais assez accusé débordant nettement les côtés, ces derniers sinués derrière les épaules; aire suturale déprimée entre les troisièmes interstries, les côtés légèrement et obliquement comprimés entre les 3^e et 7^e interstries; la déclivité postérieure arquée (vue de profil), à 60°; fovéoles grandes, en séries géminées assez régulières; interstries convexes, échancrés par les fovéoles, les 3^e, 5^e, 7^e costiformes, mais leur arête dorsale irrégulière, ondulée, les interstries latéraux reliés par des ondulations transversales; tous les interstries pourvus de très petits points épars, leurs soies blanches et microscopiques, sur la déclivité plus longues comme d'ordinaire.

Pattes assez élancées, les tibias antérieurs légèrement arqués vers leur sommet.

♂. Taille moindre, les élytres moins élargis.

Long. 12-16 mm.

Colombie: Rio Chili, VI-1918, 3 ♂♂, 4 ♀♀, ma collection (F. HILAIRE).

La coloration des élytres est quelque peu variable mais celle de la tête, du rostre et des pattes est identique chez les 7 spécimens présents.

Cette espèce est probablement voisine de *C. variegatus* KIRCH qui m'est inconnue en nature; elle en diffère, d'après la description, par la forme des élytres, leur sculpture, et la coloration.

21. *Compsus latifrons* n. sp.

Ovale oblong, le revêtement dense blanchâtre, cuivreux sur la tête, le rostre, les antennes (massue cendrée exceptée), les genoux, les tibias, les tarsi, les mucrons apicaux. Elytres avec de forts mucrons apicaux et le sommet du 3^e interstrie tuberculeux.

Rostre fortement élargi en avant, aussi long que large, profondément impressionné latéralement et devant les yeux, l'impression antérieure courte et en avant avec une courte et fine carène médiane. Tête large, les tempes plus longues que les yeux, le front presque trois fois aussi large qu'un œil, légèrement convexe, avec une petite fovéole noire, les yeux assez petits, modérément convexes, entourés d'un cercle nacré. Antennes avec leurs cils blancs, nombreux et hérissés sur le scape; scape robuste, linéaire, dépassant les yeux; funicule avec le 2^e article aussi long que les 3^e et 4^e ensemble, les 5^e et 6^e un peu plus longs que larges.

Prothorax subcylindrique, aussi long que large, en avant peu rétréci

et légèrement étranglé latéralement, la base légèrement bisinuée, les angles postérieurs aigus et peu prolongés en arrière; disque avec une impression médiane, oblongue, peu profonde, les côtés à peine impressionnés obliquement; couvert de rugosités assez fortes, plus serrées sur les côtés. Ecusson semi-ovale, plan, tronqué en avant.

Elytres larges, s'élargissant légèrement en arrière, leurs mucrons apicaux épais, obtus et un peu divergents, les épaules obtuses, ne débordant pas les côtés, leur arête antérieure légèrement sinuée en dedans; convexes, l'aire suturale plane, les 3^e, 5^e, 7^e interstries un peu plus convexes que les autres, le 3^e, au sommet de la déclivité, terminé par un tubercule obtus; côtés transversalement ondulés, les fovéoles avec des squamules plus blanches que celles des interstries, disposées en séries peu régulières; tout le disque avec de nombreux petits points sétigères, les soies courtes et blanches, plus longues sur la déclivité, cette dernière à 60° et avec la suture fortement convexe.

Pattes robustes; tibias densément sétosulés, les antérieurs assez fortement arqués vers le sommet. Dessous à pubescence longue, peu serrée.

Long. 18 mm.

Colombie: Cauca, Pereira, 1 ♀, ma collection (ex DONCKIER).

Var. *hypocritus* n. var.

Tarsi et les trois derniers articles des antennes d'un bleu vert. Front moins large, le rostre un peu moins élargi en avant et un peu plus court.

Long. 15 mm.

Manizales, 1 ♀, ma collection.

22. *Compsus sylvaticus* n. sp.

Ovale oblong, le revêtement dense, mat, pourpre, rosé, doré sur la tête, le rostre, les genoux, le sommet des élytres, d'un jaune verdâtre entremêlé de quelques très petites squamules scintillantes sur le prothorax, les élytres et le dessous, vert sur les pattes et le scape des antennes, bleu foncé (massue grise) sur le funicule antennaire. Elytres à leur sommet rétrécis brièvement arrondis, non acuminés.

Rostre large, assez fortement élargi en avant, un peu moins long que large, son impression peu profonde, avec une fine carène médiane noire atteignant la petite fovéole frontale noire, ses impressions latérales oblongues et faibles. Tête large, convexe, les tempes plus longues que les yeux, le front double de la largeur d'un œil, les yeux modérément convexes, acuminés inférieurement. Antennes médiocres;

scape linéaire, peu épaissi au sommet, atteignant presque le bord antérieur du prothorax ; funicule avec le 2^e article à peine aussi long que les 3^e et 4^e ensemble, les 4^e, 5^e et 6^e un peu plus longs que larges.

Prothorax subcylindrique, aussi long que large, d'égale largeur à ses extrémités, la base faiblement bisinuée ; disque plan ; rugosités dorsales faibles, les latérales un peu plus fortes, pourvues de très petits points sombres, avec une très fine ligne médiane fortement abrégée à ses extrémités. Ecusson ovale.

Elytres larges, s'élargissant fortement en arrière, la base échancrée en arc, ses lobes très peu avancés, les épaules en angle très obtus, arrondies à leur sommet, débordant un peu les côtés ; convexes, l'aire suturale plane, les côtés obliquement comprimés entre les 3^e et 7^e interstries, la déclivité postérieure à 60°, avec la suture convexe seulement dans la moitié supérieure de la déclivité ; grossièrement fovéolés, les fovéoles séparées par des intervalles sensiblement d'égale élévation, transversalement ondulés, le 3^e interstrie dans le milieu semblable aux autres interstries, en avant plus relevé, à sa base plus épais et légèrement gibbeux, au sommet de la déclivité épaissi, plus élevé, relié à la suture par une ondulation peu élevée, émettant en arrière un rameau arqué et rejoignant le sommet des 5^e et 6^e interstries ; disque pourvu de microscopiques soies, très éparses, peu visibles, sur la déclivité plus longues.

Pattes assez élancées ; tibias avec de nombreuses et longues soies pâles, les tibias antérieurs peu arqués à leur sommet.

Long. 16 mm.

Venezuela, sans localité précise, 1 ♀, ma collection (ex coll. SCHRAMM.).

23. *Compsus pustulosus* n. sp.

Oblong, le revêtement d'un vert mat, doré sur la tête, le rostre et les mucrons apicaux des élytres, en dessus pourvu d'élévations en forme de pustules roses ainsi disposées : sur le prothorax deux, en arrière ; sur chaque élytre sept, une en avant sur l'interstrie 3^e, quatre près du milieu sur les interstries 5, 7, deux sur le milieu de la déclivité postérieure sur les interstries 3, 5. Elytres pourvus à leur sommet de forts mucrons, leur 3^e interstrie non costiforme, mais pourvu au sommet de la déclivité postérieure d'un très gros tubercule conique, arrondi à son sommet.

Rostre plus long que large, très peu élargi en avant, pourvu d'un très fin sillon médian et de chaque côté d'un profond sillon peu arqué. Tête convexe, les tempes plus longues que l'œil, le front double de la

largeur d'un œil, avec un très petit point enfoncé, les yeux fortement convexes. Antennes grêles et longues ; scape grêle, brusquement épaissi au sommet ; funicule avec le 2^e article presque double du 1^{er}, le 5^e plus de deux fois aussi long que large.

Prothorax aussi long que large, se rétrécissant légèrement de la base au sommet, les côtés obliques et rectilignes ; sur le milieu aplani ; grossièrement fovéolé, rugueux ; sur les côtés légèrement comprimé. Ecusson brièvement ovale.

Elytres s'élargissant légèrement jusqu'au tiers postérieur, les épaules assez largement arrondies, un peu relevées et peu saillantes latéralement ; disque déprimé entre les troisièmes interstries ; grossièrement fovéolés, les séries peu régulières, les intervalles des fovéoles sensiblement de même hauteur ; transversalement rugueux, ondulés particulièrement sur les côtés ; 3^e interstrie vers la base et devant le gros tubercule postérieur un peu relevé.

Pattes élancées ; tibias antérieurs grêles et modérément arqués, tibias en partie à reflets cuivreux.

Long. 12-15 mm.

Equateur : Quito, une paire, ma collection.

24. *Compsus cyanitarsis* n. sp. (*viriditarsis* FST in litt.).

Revêtement dorsal compact blanc, sur la tête, le rostre, le scape antennaire, les tibias, avec un léger reflet doré (1), le funicule antennaire, l'extrémité des tibias et les tarses d'un bleu foncé ; soies dorsales très courtes.

Rostre aussi long que large, en avant un peu élargi, les côtés devant les yeux parallèles sur une petite longueur, faiblement impressionné en avant, le sillon médian squamulé, peu visible ; échancrure apicale rebordée en arrière ; pourvu ainsi que la tête, sur les côtés, de quelques petits points sétulosés. Tête avec les tempes non impressionnées et aussi longues que les yeux, le front subplan et presque deux fois aussi large que le diamètre d'un œil (♀) moins large (♂). Antennes assez robustes ; scape large dès la base, s'élargissant un peu graduellement ; funicule avec le 2^e article de un tiers plus long que le 1^{er}, le 3^e deux fois aussi long que large, les suivants plus courts, la massue ovale-oblongue, d'un bleu plus foncé.

(1) Chez les exemplaires défrachis, ce reflet est remplacé par une légère teinte brune. Les élytres ont parfois çà et là quelques très petites taches à reflet doré, visibles en examinant l'insecte de profil.

Prothorax subcylindrique, aussi long que large, le bord antérieur un peu moins large que la base, derrière les yeux assez fortement sinué; convexe, marqué de gros points peu serrés, squamulés, leurs intervalles rugueux. Ecusson plus long que large, arrondi au sommet, se rétrécissant en avant, tronqué à sa base.

Elytres s'élargissant faiblement (♀) ou parallèles (♂) jusqu'au tiers postérieur, au sommet brièvement, faiblement acuminés, à la base modérément et isolément arqués, les épaules obliques, un peu relevées; disque déprimé entre les premières côtes, plus fortement dans la région scutellaire, couvert de fovéoles séparées par des rugosités transversales fortes, ondulées, la 1^{re} côte (3^e interstrie) distincte seulement en arrière, la 2^e plus longue et se réunissant à la 1^{re} vers le milieu de la déclivité postérieure, la 3^e la plus longue et la moins élevée. Fémurs antérieurs fortement renflés, plus fortement encore chez le ♂.

Long. 7-12 mm.

Bolivie: Coroico, types (ex STAUDINGER), 8 spécimens.

Colombie (ex STAUDINGER).

L'un des spécimens ♂ a les tibias antérieurs entièrement bleus.

Cette espèce diffère des autres espèces à pattes partiellement bleues par sa forte sculpture dorsale, les côtes élytrales raccourcies, formées par la jonction de tubercules rapprochés, par suite plus ou moins dentellées.

C'est l'une des nombreuses espèces de J. FAUST restées inédites.

25. *Compsus parviscutum* n. sp.

Ovale oblong, le revêtement compact d'un vert d'eau, pâle, mat, le funicule des antennes, les tibias et les tarsi bleus.

♀. Rostre aussi long que large, très peu élargi en avant, avec une profonde impression longitudinale pourvue, en son milieu, d'un fin sillon s'évanouissant dans la petite fovéole frontale, les impressions dorsales oblongues, profondes, squamulées, peu obliques. Tête courte, les tempes un peu moins longues que les yeux, le front à peine du double de la largeur d'un œil, les yeux convexes, en avant tronqués et précédés d'un court sillon semi-circulaire, entourés d'un anneau nacré. Antennes grêles; scape peu épais, graduellement épaissi, dépassant le bord postérieur de l'œil; funicule avec le 2^e article aussi long que les 3^e et 4^e ensemble, tous les suivants notablement plus longs que larges, leurs cils blancs, la massue oblongue, plus foncée.

Prothorax un peu plus large que long, en avant légèrement resserré latéralement, les côtés très peu arqués et faiblement convergents, la

base assez fortement bisinuée et de un quart plus large que le bord antérieur; convexe, le milieu légèrement impressionné; marqué de gros points, peu serrés, subdénudés dans leur centre, séparant des rugosités médiocres, peu inégales et finement pointillées. Ecusson remarquablement petit, enfoncé, à peine visible, tomentueux.

Elytres larges, moins du double aussi longs que larges, parallèles jusqu'au milieu, leurs mucrons apicaux assez forts et parallèles, les épaules brièvement arrondies et peu saillantes latéralement; convexes, l'aire suturale plane délimitée par les troisièmes interstries, la déclivité postérieure à 50°; fovéoles profondes, serrées, les deux premières et les marginales en séries régulières, les autres irrégulières, leurs fovéoles séparées par les élévations transversales et ondulées des interstries, les élévations devenant latéralement en arrière presque isolées, en forme de tubercules arrondis; suture plane, un peu relevée au sommet de la déclivité; 3^e interstrie nettement relevé au sommet de la déclivité, en avant se distinguant à peine des autres; 5^e interstrie pourvu d'un petit tubercule à son sommet, au milieu de la déclivité; rugosités avec de très petits points, brièvement sétulosées, les soies blanches.

Dessous et pattes densément squamulés, leurs points épars, petits, leurs courtes soies blanches. Pattes élancées, les tibias antérieurs assez fortement arqués en avant. Tarsi élancés.

♂. Plus petit et plus étroit.

Long. 12-16 mm.

Equateur; Ambato, type; Quito (ma collection), 2 ♀♀, 3 ♂♂, ma collection.

26. *Compsus viridulus* n. sp. (CHEVR. in litt.).

Oblong, le revêtement d'un vert cendré mat, les pattes avec un léger reflet cuivreux, pourvu en dessus de nombreuses, fines et courtes soies fauves, chaque élytre pourvu au sommet de la déclivité d'une élévation costiforme sur le 3^e interstrie.

♀. Rostre peu plus long que large, au sommet assez fortement élargi, avec un étroit et profond sillon médian, en arrière atteignant le vertex, les deux sillons dorsaux longs peu arqués, subparallèles, en arrière dépassant le niveau du bord antérieur de l'œil; ponctuation obsolète; pourvu de nombreuses soies hérissées. Tempes aussi longues que les yeux, le front double du diamètre d'un œil, les yeux convexes entourés de squamules nacrées. Antennes avec le scape robuste, graduellement mais modérément épaissi, atteignant presque le bord

antérieur du prothorax, le funicule mince, tous les articles au moins de moitié plus longs que larges.

Prothorax d'un quart plus long que large, cylindrique, les côtés très peu arqués, la base faiblement bisinuée et à peine plus large que le bord antérieur; aplani sur le disque; couvert de rugosités médiocres finement pointillées et sétulosées, les squamules subgranuleuses. Ecusson rétréci dans sa moitié antérieure.

Elytres allongés, étroits, s'élargissant légèrement jusqu'au tiers postérieur, en ce dernier point à peine de moitié plus larges que le prothorax, au sommet brièvement acuminés, à la base brièvement resserrés, les épaules petites très obtuses, leur arête antérieure sinueuse en dedans avant la base; aire suturale plane, la déclivité postérieure à 45°, rugueuse latéralement avec le 5^e interstrie plus élevé et rejoignant le 9^e près du sommet, et la ponctuation irrégulière; 3^e interstrie faiblement costiforme mais brusquement, relevé, se terminant brusquement au sommet de la déclivité, le 5^e un peu relevé, plus distinct dans sa moitié postérieure, le 7^e presque aussi élevé que le 3^e mais non relevé en arrière; séries de fovéoles peu nettes, irrégulières, les fovéoles séparées par des élévations presque d'égale hauteur.

Fémurs antérieurs assez fortement renflés, leurs tibias modérément arqués, les tarses robustes.

♂. Plus étroit, le prothorax un peu plus long, les élytres parallèles. Long. 11 mm.

Colombie: Bogota, ♀ type, Museum de Stockholm, ♂ ma collection.

Les fovéoles et les rugosités dorsales sont partiellement teintées de brun fauve.

27. *Compsus eustylodes* n. sp.

Ovale oblong, le revêtement dense, varié, sur le dessus verdâtre, rose sur les côtés et les élévations des élytres, sur l'écusson, sur une bande latérale du prothorax, vert sur les tibias et les tarses, en partie rose sur les fémurs et le dessous. Antennes d'un jaune-verdâtre, le scape remarquablement épais, comprimé, ses côtés parallèles, à la base brièvement pédonculé. Elytres au sommet de la déclivité avec un gros tubercule arrondi, nacré-rosé, sur le 3^e interstrie.

♀. Rostre à peine aussi long que large, au sommet peu élargi, avec un fin sillon médian, squamulé, prolongé jusqu'au vertex, les impressions dorsales et antéoculaires faibles, l'impression apicale assez profonde, l'incision en arrière arquée et rebordée; scrobes en avant

droits, profonds et glabres, en arrière brusquement obliques, faibles et squamulés. Tête conique, les tempes plus longues que les yeux, le front fovéolé, double du diamètre d'un œil, les yeux convexes. Antennes avec le scape atteignant le bord antérieur du prothorax, le funicule le tiers de l'épaisseur du scape, mince, ses soies longues et blondes, le 2^e article à peine aussi long que les 3^e et 4^e ensemble, tous les suivants beaucoup plus longs que larges, les derniers grisâtres.

Prothorax un peu plus large que long, peu arqué sur les côtés, la base fortement bisinuée et peu plus large que le bord antérieur; disque avec une profonde impression médiane oblongue et faiblement rugueuse, les côtés obliquement comprimés et avec les rugosités fortes, transversales, incisant les bords. Ecusson subpyriforme, tronqué en avant, plan.

Elytres s'élargissant assez fortement jusqu'à leur tiers postérieur, au sommet terminés par deux mucrons épais, divergents et rosés, les épaules petites, obtuses, très obliques, leur arête antérieure sinuée en dedans avant la base; aire suturale plane, la déclivité postérieure à 45° et pourvue d'un petit tubercule en son milieu, sur le 5^e interstrie; fovéoles peu apparentes, cachées par le revêtement, les deux premières séries plus distinctes; 3^e interstrie convexe, peu relevé, pourvu de quelques petites taches rosées et d'un gros tubercule rose au sommet de la déclivité; 7^e interstrie avec de faibles élévations rosées; les autres interstries plans, la suture relevée sur la déclivité; les côtés obliquement comprimés, plus fortement en avant, derrière la base; pubescence dorsale foncée, fine mais assez dense.

Pattes très densément squamulées, les fémurs antérieurs modérément renflés, leurs tibias peu arqués, les tarses robustes.

♂. Taille moindre, les élytres peu élargis, le prothorax plus cylindrique et plus long.

Long. 11-13 mm.

Colombie: Fusaguzaga, types; Viota; Villavicencia (F. HILAIRE), 4 ♀♀, 2 ♂♂.

La coloration du dessous et des fémurs est variable, le vert ou le rose dominant suivant les individus; celle du dessus est plus constante; les parties verdâtres sont cependant teintées çà et là de brun clair; chez l'un des spécimens le rose envahit la majeure partie du dessus, tandis qu'il fait presque entièrement défaut chez un autre.

La forme du scape antennaire, rappelant tout à fait celle des *Eustylus* SCHÖNH., est caractéristique.

Var. **conspicillatus** n. var. (CHEVR. in litt.).

Revêtement d'un gris teinté de brun, sans trace de vert, le prothorax plus long, aussi long que large, les élytres avec leur tubercule postérieur moins élevé, plus comprimé et blanchâtre.

Colombie : Bogota, type ♀, Museum de Stockholm, ♂ ma collection.

28. **Compsus scrutator** n. sp. (FAUST. in litt.).

Oblong, noir de poix, revêtu de petites squamules rondes, verdâtres, entremêlées de quelques squamules dorées, scintillantes, en dessus peu serrées, sur le dessous plus serrées, les tibias et les antennes bruns, leur pubescence grise ou brune, fine, peu serrée.

♀. Rostre plus long que large, peu élargi en avant, profondément impressionné longitudinalement et avec un sillon médian profond, prolongé jusqu'au vertex. Tête courte, les tempes à peine aussi longues que les yeux, le front double de la largeur d'un œil, ses points petits, recouverts par les squamules, les yeux peu convexes, cerclés de squamules claires, nacrées, Antennes grêles; scape grêle, claviforme, droit, atteignant le bord antérieur du prothorax; funicule élancé, tous les articles plus longs que larges, la massue fusiforme.

Prothorax aussi long que large, faiblement rétréci en avant, les côtés très peu arqués, la base faiblement bisinuée; disque plan, légèrement impressionné, avec quelques gros points épars et les rugosités faibles; côtés légèrement comprimés, les gros points plus serrés et les rugosités courtes et faibles. Ecusson ovalaire, rétréci à sa base, élevé.

Elytres allongés, parallèles jusqu'au tiers postérieur, brièvement rétrécis, acumés au sommet, les épaules élevées, largement arrondies, ne débordant pas les côtés; disque plan, les côtés obliquement mais faiblement comprimés, la déclivité postérieure à 45°; grossièrement fovéolés, les séries équidistantes, obsolètes sur la déclivité postérieure, sur les côtés peu nettes, les intervalles des fovéoles transversalement rugueux, ondulés; interstries: le 3^e en arrière nettement costiforme et la côte se terminant brusquement au sommet de la déclivité, en avant-plan, à sa base un peu relevé, le 5^e convexe, un peu plus relevé en arrière, le 7^e de la base au tiers postérieur convexe.

Pattes élancées; fémurs densément squamulés, brièvement sétulosés, les antérieurs peu renflés; tibias pourvus de nombreuses et courtes soies, les antérieurs fortement arqués dans leur moitié apicale; tarses élancés, le 4^e article deux fois aussi long que le 3^e.

♂. Taille moindre; prothorax un peu plus long, son impression médiane et celle du rostre plus profondes, les épaules plus accusées.

Long. 8-13 mm.

Colombie: Cauca, types, ma collection, 18 spécimens (ex STAUDINGER).

Brésil: Espirito Santo, 1 ♀ (ex STAUDINGER).

Venezuela, trois spécimens (ex coll. SCHRAMM).

La coloration du revêtement est variable, parfois bleuâtre, parfois grisâtre.

29. **Compsus aurisquamosus** n. sp. (CHEVR. in litt.).

Oblong, le revêtement dense, d'un rose cuivreux mat, entremêlé de quelques squamules d'un vert doré, scintillantes, sur les antennes et sur les tarses vert.

♂. Rostre plus long que large, subcylindrique, les ptérygies non développées latéralement, avec une impression longitudinale triangulaire, finement sillonnée au milieu et de chaque côté une impression courte, ainsi que la tête avec des petits points épars. Tête conique, les tempes aussi longues que les yeux, le front moindre que le double du diamètre d'un œil, les yeux peu convexes, cerclés de clair. Antennes grêles, les articles 5-7 du funicule un peu plus longs que larges.

Prothorax oblong, presque aussi long que large, dans le milieu un peu élargi et les côtés faiblement arqués, la base assez fortement bisinuée et plus large que le bord antérieur; avec une assez large impression médiane, peu profonde, rétrécie en avant; densément squamulé, les rugosités obsolètes, avec d'assez nombreux points petits, subdénudés. Ecusson ovale, squamulé.

Elytres parallèles jusqu'au milieu, leurs mucrons courts et rapprochés, les épaules en angle obtus, débordant très peu les côtés; disque, entre les troisièmes interstries, plan et peu rugueux; côtés transversalement rugueux, les rugosités peu élevées et assez régulières, pointillées, les séries équidistantes, leurs fovéoles petites et pourvues au fond d'une squamule; en arrière les interstries plus convexes, le 3^e en outre relevé dans son quart antérieur; déclivité postérieure à 45°, arquée, ses soies très fines.

Tibias antérieurs faiblement arqués au sommet.

♀. Taille plus grande, l'impression dorsale du rostre moins forte, les fovéoles élytrales plus grosses, les séries équidistantes bien nettes.

Long 11-13 mm.

Venezuela : Caracas, une paire, types, Museum de Stockholm.

Même localité, une ♀, ma collection.

Chez ce dernier spécimen les squamules vertes sont plus beaucoup plus nombreuses, de sorte que la teinte dorsale est plutôt verte que rosée.

30. *Compsus subcostatus* n. sp. (CHEVR. in litt.).

Oblong, noir, le revêtement brun, mat, avec un léger reflet cuivreux métallique sur les fémurs et le dessous, les tarsi d'un noir bleuté, les antennes noires, leur pubescence couchée cendrée sur le funicule.

♂. Prothorax avec l'impression dorsale légère, mais les côtés distinctement comprimés; densément pointillé.

Elytres avec les séries de fovéoles équidistantes, très nettes, les marginales plus fines, les interstries plans en avant, faiblement convexes en arrière mais non rugueux, le 3^e relevé, subcostiforme, derrière la base et avant la déclivité. Tibias antérieurs assez fortement arqués.

Les autres caractères analogues à ceux de *C. aurisquamosus*.

Vénézuéla, une paire, Museum Stockholm.

31. *Compsus roseomicans* n. sp.

Oblong, le revêtement nacré, à reflets irisés, entremêlé de quelques squamules vertes, brillantes, les antennes noires, leur pubescence dense.

Rostre à peine aussi long que large à la base, peu élargi en avant; en dessus plan, avec un fin sillon médian, et de chaque côté une faible impression triangulaire et squamulée. Tête convexe, le front plan, plus du double de la largeur d'un œil, avec un point médian enfoncé. Yeux modérément convexes. Antennes grêles; scape brusquement épaissi au sommet, atteignant le milieu de la tempe; funicule avec le 2^e article seulement aussi long que les deux suivants ensemble.

Prothorax aussi long que large, les côtés parallèles et rectilignes jusqu'au faible rétrécissement antérieur, la base subtronquée, un peu plus large que le bord antérieur; disque assez légèrement impressionné, l'impression sur ses bords avec des points gros, irréguliers, dénudés, peu serrés; côtés légèrement comprimés, les points moins gros, plus serrés. Ecusson semi-ovale.

Elytres s'élargissant faiblement en arrière, à leur sommet obtusément acuminés, les épaules obtusément arrondies, peu saillantes latéralement; déclivité postérieure à 45°; disque légèrement impressionné entre les 3^e interstries; fovéoles dorsales grosses, en parties squamulées, les latérales beaucoup plus petites, les deux premières séries régulières,

les suivantes irrégulières et leurs intervalles transversalement ondulés; interstrie 3^e costiforme, interrompu en son milieu; le 5^e costiforme en arrière, le 7^e sur toute sa longueur.

Tibias antérieurs fortement arqués.

Long. 12,5 mm.

Colombie : Muizo, 1920, une femelle, ma collection (F. HILAIRE).

32. *Compsus sulcicollis* n. sp.

Oblong, le revêtement dense, mat, d'un blond légèrement teinté de vert, sur la tête et le rostre cuivreux, sur les tarsi et le funicule des antennes d'un bleu cendré, les élytres pourvus de très nombreuses et très courtes soies pâles.

Rostre aussi long que large, subcylindrique, non élargi en avant, en dessus convexe, en avant faiblement impressionné, avec un fin sillon médian prolongé jusqu'au vertex, les impressions latérales obliques. Tête avec les tempes plus longues que les yeux, pourvue de chaque côté, en arrière des yeux, d'un profond sillon arqué, noir, les yeux convexes, tronqués en avant. Antennes médiocres; scape brusquement épaissi au sommet; funicule avec le 2^e article aussi long que les 3^e et 4^e ensemble, les suivants plus longs que larges, la massue oblongue fusiforme.

Prothorax plus large que long, se rétrécissant légèrement de la base au sommet, les côtés peu arqués, la base fortement bisinuée, les angles postérieurs aigus; convexe, sur le milieu avec une impression peu profonde, ovale, interrompue au milieu, rugueux, les côtés non impressionnés et faiblement rugueux. Ecusson ovalaire, rétréci en avant, tronqué à sa base.

Elytres parallèles jusqu'au tiers postérieur, à leur sommet assez longuement mucronés, leur base fortement bisinuée, relevée et épaissi au commencement du 3^e interstrie, les épaules largement arrondies, élevées, mais ne débordant nullement les côtés; aire suturale plane, la déclivité postérieure à 45°, plane vue de profil; 3^e interstrie calceux à sa base, ensuite plan, se relevant en arrière, au sommet de la déclivité en côte nette se terminant brusquement au commencement de la déclivité; 5^e interstrie convexe, brusquement terminé sur le milieu de la déclivité; 7^e interstrie convexe; les interstries latéraux irrégulièrement convexes, entamés par les fovéoles; fovéoles squamulées, leurs points petits, squamulés, les séries latérales peu nettes; toute la surface des élytres criblée de très petits points, brièvement sétigères.

Pattes élancées ; fémurs antérieurs modérément renflés, leurs tibias élancés et assez fortement arqués.

Long. 13 mm.

Venezuela, sans localité précise, un spécimen, ma collection (ex LE MOULT).

33. *Compsus alboguttatus* n. sp. (CHEVR. in litt.).

Ovale oblong, déprimé en dessus, le revêtement dorsal d'un brun ocré pâle, orné d'un dessin blanc, composé sur les élytres d'une tache médiane cruciforme, d'une bande transversale dentelée au sommet de la déclivité, d'une large bande latérale entière sur les deux derniers interstries et remontant un peu sur la suture au sommet, cette bande triinterrompue sur les 7^e et 8^e interstries, d'une courte tache recouvrant l'écusson, chaque élytre pourvu encore de 5-7 petites taches blanches, dont une sur le calus postérieur, une sur l'épaule, les autres autour de la tache centrale ; le prothorax avec une bande latérale inférieure blanche, échancrée en dedans (étroitement visible de haut), ses deux impressions médianes transversales, rhomboïdales, faibles, reliées par une ligne médiane d'un brun très clair ou même blanche. Funicule des antennes et les tarsi d'un bleu d'acier. Dessous blanc. Pattes en partie fauves.

♀. Rostre aussi long que large, à peine élargi en avant ; en dessus avec une large impression, subinterrompue par une élévation transversale, squamulée et située au niveau de l'insertion antennaire, avec une courte carène noire se prolongeant en un très fin sillon jusqu'au sommet du front, devant l'œil avec un sillon ponctué ; scrobes en avant profonds et glabres, en arrière évasés, squamulés, assez éloignés de l'angle inférieur de l'œil. Tête conique, les tempes aussi longues que les yeux, le front plan, double du diamètre d'un œil, les yeux fortement convexes. Antennes médiocres ; scape assez épais, lineaire, atteignant le bord antérieur du prothorax ; funicule avec le 2^e article seulement aussi long que le 1^{er}, les 4^e et 5^e un peu plus longs que larges.

Prothorax subcylindrique, les côtés peu arqués, la base fortement bisinuée et un peu plus large que le bord antérieur, les angles postérieurs aigus ; convexe, sur le milieu avec deux légères impressions rhomboïdales, transversales, très éparsemment et peu visiblement ponctué, peu inégal, les rugosités obsolètes. Ecusson pyriforme, fortement rétréci en avant, plan.

Elytres s'élargissant un peu en arrière, à leur sommet brièvement acuminés, obsolètement mucronés, à la base séparément et régulière-

ment arqués, les épaules obliques, élevées, en angle obtus très arrondi ; le disque plan, la déclivité postérieure à 45° ; ponctués-sériés, les séries équidistantes, les interstries convexes, le 3^e plus élevé en arrière, le 5^e à son sommet formant un petit tubercule arrondi et blanc.

Fémurs antérieurs fortement renflés, leurs tibias modérément arqués.

♂. Plus étroit, les élytres parallèles, leur sommet pourvu d'un très court mucron.

Long. 9-12 mm.

Guyane Française : St-Laurent du Maroni, 3 ♀♀, types, ma coll. (ex LE MOULT) ; Para (?), 1 ♂, type, ma coll. (ex STAUDINGER).

Localité illisible, 1 ♀, coll. CHEVROLAT, Museum de Stockholm.

Les taches élytrales sont variables, toutefois la tache cruciforme, la bande postérieure, les taches du prothorax sont présentes chez tous les spécimens, quoique de teinte plus ou moins blanche.

34. *Compsus parvus* n. sp.

Ovale oblong, le dessus d'un brun fauve clair et orné d'un dessin blanc comprenant une bande latérale commençant sous les yeux et prolongée jusqu'au sommet des élytres, cette bande très étroite sur le prothorax (vue de haut), visible sur la base des épaules, sur les élytres dilatée au milieu et atteignant le 4^e interstrie, au sommet dilatée, formant une tache remontant jusqu'au sommet de la déclivité sur les trois premiers interstries, échancrée sur les 4^e et 5^e interstries, enclosant en arrière une tache brune ; sur les élytres une tache sur le tiers antérieur des interstries 1 (suture) et 2, en son milieu brièvement dilatée et recouvrant le 3^e interstrie. Ecusson blanc. Tout le dessous et les pattes blancs.

Rostre plus large que long, non dilaté en avant, longitudinalement impressionné, avec un fin sillon médian prolongé jusque sur le vertex, traversant la petite fovéole frontale. Tête courte, peu convexe, les tempes moitié de la longueur d'un œil, le front moindre que le double de la largeur d'un œil ; yeux grands, convexes. Antennes : scape arqué, très épais, atteignant le milieu des tempes ; funicule avec le 2^e article de un tiers plus long que le 1^{er}, le 4^e plus long que le 3^e, les 5^e et 6^e subcylindriques, plus longs que larges, le 7^e et la massue d'un brun noir.

Prothorax aussi long que large, subcylindrique, la base bisinuée et très peu plus large que le bord antérieur, convexe, de chaque côté avec une impression postmédiane, ovale, légère ; peu inégal, le revêtement très dense, dans le milieu en partie blanc, irisé, voilant complètement la

sculpture, les petits points épars pourvus de très courtes mais épaisses soies squamuleuses. Ecusson subtriangulaire arrondi à son sommet, tronqué à sa base, blanc.

Elytres se rétrécissant légèrement en arrière dès les épaules, ces dernières peu développées, obtusément arrondies; disque peu convexe, la déclivité postérieure à 60°; au sommet séparément rétrécis arrondis, obtusément acuminés; ponctués sériés, les points petits, écartés, les séries équidistantes, en arrière un peu flexueuses, les interstries peu convexes, les 3^e, 5^e plans à leur base, se relevant, costiformes en arrière, se terminant sur le milieu de la déclivité, le 7^e costiforme dès la base.

Fémurs antérieurs fortement renflés et avec une petite dent obtuse et squamulée; tibias antérieurs assez fortement arqués.

Long. 7 mm.

Vénézuela: Bois du Rio Apure, un spécimen, ma collection (ex BOURGOIN).

Cette espèce a quelque peu le fasciès de *C. alboguttatus* mais elle s'en distingue par de nombreux caractères.

35. *Compsus nigroundulatus* n. sp. (STENH. in litt.).

Oblong, le revêtement d'un vert luisant, sur les tibias, les fémurs postérieurs et intermédiaires, les genoux antérieurs, le sommet des élytres d'un cuivreux doré. Prothorax et élytres en avant avec de nombreuses ondulations transversales, parallèles, noires.

Rostre plus long que large, à peine élargi en avant, l'impression antérieure avec une fine carène médiane, ses côtés limités par une carène obtuse et arrondie en arrière, ses sillons dorsaux obliques. Tête conique, les tempes plus longues que les yeux, le front sillonné au milieu, plus du double du diamètre d'un œil; avec deux bandes longitudinales dénudées, noires; yeux semi-globuleux, en avant entourés d'un profond sillon squamulé, nacré. Antennes fines; scape claviforme, dépassant un peu l'œil; funicule avec le 2^e article plus de moitié plus long que le 1^{er}, aussi long que les 3^e et 4^e ensemble, le 5^e peu plus long que large.

Prothorax cylindrique, plus long que large, en avant faiblement rétréci et légèrement resserré, la base fortement bisinuée; avec un large et assez profond sillon médian traversé par les ondulations transversales. Ecusson pyriforme.

Elytres allongés, parallèles, au sommet assez longuement mucronés, les épaules obliquement arrondies, débordant peu les côtés, leur arête antérieure sinuée en dedans avant la base; modérément convexes,

l'aire suturale plane mal délimitée, la déclivité postérieure à 45°; disque, jusqu'à la déclivité, traversé par des ondulations transversales assez régulières, séparées par des intervalles aussi larges que les ondulations, ces dernières s'effaçant vers le 7^e interstrie, les fovéoles superficielles, squamulées, en séries irrégulières; 3^e interstrie brusquement et brièvement relevé au sommet de la déclivité.

Tibias antérieurs élancés, faiblement arqués.

Long. 13 mm.

Colombie, sans localité précise, un spécimen, ma collection (ex STAUDINGER).

36. *Compsus cicatricosus* n. sp. (CHEVR. in litt.).

Revêtement vert, en partie doré sur la tête, le rostre et dans les fovéoles élytrales.

Antennes assez robustes, le 2^e article du funicule peu plus long (à peine un quart) que le 1^{er}, les articles 4-6 pas plus longs que larges. Prothorax largement et assez profondément impressionné sur le disque, légèrement sur les côtés, les rugosités entremêlées, peu élevées, noires. Elytres avec l'aire suturale légèrement enfoncée, ses côtés obliquement relevés jusqu'au 3^e interstrie; disque traversé par des ondulations transversales noires peu élevées, se prolongeant jusque sur les bords latéraux, sur le disque séparées par des intervalles plus larges que les ondulations.

Quant au reste, très semblable à l'espèce précédente dont elle se distingue nettement par les antennes plus robustes et plus courtes.

Colombie, un spécimen, Museum de Stockholm.

37. *Compsus tripunctatus* n. sp.

Ovale oblong, le revêtement dense d'un vert d'eau, mat, les élytres brièvement acuminés à leur sommet, chacun avec trois points noirs.

♀. Rostre plus long que large, obsolètement élargi en avant, avec un profond sillon médian, s'évanouissant dans la fovéole frontale, les sillons dorsaux légers et droits, courts. Tête courte, les tempes moins longues que les yeux, le front du double du diamètre d'un œil, les yeux fortement convexes, entourés d'un sillon pâle, en avant plus profond. Antennes grêles; scape linéaire, un peu épaissi au sommet, atteignant le milieu des tempes, funicule avec le 5^e article un peu plus long que large, la massue cendrée, acuminée à son sommet.

Prothorax un peu plus large que long, les côtés parallèles dans leur moitié basale, faiblement convergents en avant, derrière le bord

sculpture, les petits points épars pourvus de très courtes mais épaisses soies squamuleuses. Ecusson subtriangulaire arrondi à son sommet, tronqué à sa base, blanc.

Elytres se rétrécissant légèrement en arrière dès les épaules, ces dernières peu développées, obtusément arrondies; disque peu convexe, la déclivité postérieure à 60°; au sommet séparément rétrécis arrondis, obtusément acuminés; ponctués sériés, les points petits, écartés, les séries équidistantes, en arrière un peu flexueuses, les interstries peu convexes, les 3^e, 5^e plans à leur base, se relevant, costiformes en arrière, se terminant sur le milieu de la déclivité, le 7^e costiforme dès la base.

Fémurs antérieurs fortement renflés et avec une petite dent obtuse et squamulée; tibias antérieurs assez fortement arqués.

Long. 7 mm.

Vénézuëla: Bois du Rio Apure, un spécimen, ma collection (ex BOURGOIN).

Cette espèce a quelque peu le faciès de *C. alboguttatus* mais elle s'en distingue par de nombreux caractères.

35. *Compsus nigroundulatus* n. sp. (STENH. in litt.).

Oblong, le revêtement d'un vert luisant, sur les tibias, les fémurs postérieurs et intermédiaires, les genoux antérieurs, le sommet des élytres d'un cuivreux doré. Prothorax et élytres en avant avec de nombreuses ondulations transversales, parallèles, noires.

Rostre plus long que large, à peine élargi en avant, l'impression antérieure avec une fine carène médiane, ses côtés limités par une carène obtuse et arrondie en arrière, ses sillons dorsaux obliques. Tête conique, les tempes plus longues que les yeux, le front sillonné au milieu, plus du double du diamètre d'un œil; avec deux bandes longitudinales dénudées, noires; yeux semi-globuleux, en avant entourés d'un profond sillon squamulé, nacré. Antennes fines; scape claviforme, dépassant un peu l'œil; funicule avec le 2^e article plus de moitié plus long que le 1^{er}, aussi long que les 3^e et 4^e ensemble, le 5^e peu plus long que large.

Prothorax cylindrique, plus long que large, en avant faiblement rétréci et légèrement resserré, la base fortement bisinuée; avec un large et assez profond sillon médian traversé par les ondulations transversales. Ecusson pyriforme.

Elytres allongés, parallèles, au sommet assez longuement mucronés, les épaules obliquement arrondies, débordant peu les côtés, leur arête antérieure sinuée en dedans avant la base; modérément convexes,

l'aire suturale plane mal délimitée, la déclivité postérieure à 45°; disque, jusqu'à la déclivité, traversé par des ondulations transversales assez régulières, séparées par des intervalles aussi larges que les ondulations, ces dernières s'effaçant vers le 7^e interstrie, les fovéoles superficielles, squamulées, en séries irrégulières; 3^e interstrie brusquement et brièvement relevé au sommet de la déclivité.

Tibias antérieurs élancés, faiblement arqués.

Long. 13 mm.

Colombie, sans localité précise, un spécimen, ma collection (ex STAUDINGER).

36. *Compsus cicatricosus* n. sp. (CHEVR. in litt.).

Revêtement vert, en partie doré sur la tête, le rostre et dans les fovéoles élytrales.

Antennes assez robustes, le 2^e article du funicule peu plus long (à peine un quart) que le 1^{er}, les articles 4-6 pas plus longs que larges. Prothorax largement et assez profondément impressionné sur le disque, légèrement sur les côtés, les rugosités entremêlées, peu élevées, noires. Elytres avec l'aire suturale légèrement enfoncée, ses côtés obliquement relevés jusqu'au 3^e interstrie; disque traversé par des ondulations transversales noires peu élevées, se prolongeant jusque sur les bords latéraux, sur le disque séparées par des intervalles plus larges que les ondulations.

Quant au reste, très semblable à l'espèce précédente dont elle se distingue nettement par les antennes plus robustes et plus courtes.

Colombie, un spécimen, Museum de Stockholm.

37. *Compsus tripunctatus* n. sp.

Ovale oblong, le revêtement dense d'un vert d'eau, mat, les élytres brièvement acuminés à leur sommet, chacun avec trois points noirs.

♀. Rostre plus long que large, obsolètement élargi en avant, avec un profond sillon médian, s'évanouissant dans la fovéole frontale, les sillons dorsaux légers et droits, courts. Tête courte, les tempes moins longues que les yeux, le front du double du diamètre d'un œil, les yeux fortement convexes, entourés d'un sillon pâle, en avant plus profond. Antennes grêles; scape linéaire, un peu épaissi au sommet, atteignant le milieu des tempes, funicule avec le 5^e article un peu plus long que large, la massue cendrée, acuminée à son sommet.

Prothorax un peu plus large que long, les côtés parallèles dans leur moitié basale, faiblement convergents en avant, derrière le bord

antérieur très légèrement resserrés, la base fortement bisinuée et de un quart plus large que le bord antérieur, les angles postérieurs aigus; convexe, le disque un peu déprimé; marqué de points très épars, profonds, peu gros, dont deux plus gros vers les extrémités de la ligne médiane, les intervalles des points peu inégaux, faiblement rugueux. Ecusson enfoncé, très petit, à peine visible.

Elytres parallèles jusqu'au tiers postérieur, la base fortement bisinuée, les épaules petites, noires, dénudées, ne débordant pas les épaules; convexes, l'aire suturale subplane, mal délimitée, la déclivité postérieure à 45°; marqués de petites fovéoles, en leur centre pourvues d'un petit point dénudé, disposées en séries peu régulières, équidistantes, leurs intervalles d'égale et faible convexité, faiblement ondulés transversalement sur les côtés, pourvus de très petits points noirs, l'un sur l'épaule, le 2° sur le milieu du 3° interstrie, le 3° sur le sommet du 5° interstrie.

Pattes élancées, leurs soies blanches, les tibias antérieurs arqués au sommet.

♂. Taille moindre; élytres se rétrécissant légèrement en arrière dès les épaules, leurs mucrons apicaux plus aigus.

Long. 9-12 mm.

Equateur: San Domingo, 300 m. d'alt., 5 ♂♂, 4 ♀♀, ma collection (R. BENOIST).

Chez les grosses femelles l'interstrie 3° est un peu relevé, particulièrement en arrière.

38. *Compsus Benoisti* n. sp.

Tête, rostre, sommet des élytres et les fémurs d'un rose nacré brillant, prothorax élytres et dessous d'un vert légèrement argenté, antennes, tibias et tarsi d'un beau violet, les genoux d'un bleu vert. Chaque élytre avec 5 assez gros points noirs: un transversal, vers le milieu des interstries 3-5, un derrière la base du 5° interstrie, deux parallèles, au sommet de la déclivité sur les interstries 4 et 6, le 5° vers le tiers antérieur du 9° interstrie. Prothorax et élytres avec leurs fovéoles petites, leurs points centraux petits. Ecusson arrondi, assez petit, vert.

Rostre à peine plus long que large, très peu élargi en avant, son sillon médian squamulé peu net. Tête et antennes analogues à celles de *C. tripunctatus*.

Prothorax moins long que large, les côtés légèrement et assez régulièrement arqués, la base assez fortement bisinuée, un peu plus large

que le bord antérieur; le milieu plan; la ponctuation fine, espacée, les points un peu plus gros sur le milieu.

Elytres acuminés à leur sommet, les épaules brièvement arrondies et débordant un peu les côtés, l'aire dorsale plane mal délimitée, la déclivité postérieure à 45°, les fovéoles petites, en séries peu régulières, les marginales plus nettes et plus régulières, les intervalles faiblement rugueux transversalement.

Fémurs antérieurs fortement renflés, leurs tibias fortement arqués.

Long. 11-13 mm.

Equateur: San Domingo, une paire, ma collection.

Je me fais un plaisir de dédier cette magnifique espèce à M. le Dr R. BENOIST qui, pendant sa mission à l'Equateur a profité de ses excursions botaniques pour recueillir de nombreux et fort intéressants Curculionides.

39. *Compsus viridissimus* n. sp.

Ovale oblong, noir, le revêtement d'un beau vert luisant; élytres sans côtes, mucronés au sommet.

Rostre plus long que large, au sommet faiblement élargi, l'impression apicale faible, avec un fin sillon médian noir s'évanouissant dans la fovéole frontale, les sillons dorsaux courts, peu obliques, densément squamulés comme tout le rostre et la tête. Tête conique, les tempes plus longues que les yeux, le front double du diamètre d'un œil, les yeux assez fortement convexes, auréolés de nacré. Antennes densément squamulées, assez robustes, scape faiblement claviforme, atteignant le bord postérieur de l'œil; funicule court, le 2° article de moitié plus long que le 1°, les 5° et 6° ovoïdes et peu plus longs que larges, la massue ovale oblongue, acuminée.

Prothorax fortement transversal, les côtés parallèles jusqu'au quart antérieur, ensuite obliquement convergents jusqu'au faible mais distinct resserrement apical, la base fortement bisinuée et un peu plus large que le bord antérieur; convexe, à peine déprimé sur le milieu, marqué de gros points noirs, profonds, inégaux, quelques-uns en forme de courtes lignes, médiocrement serrés, sur le milieu du disque avec une courte ligne noire, interrompue en son milieu. Ecusson arrondi, plan.

Elytres courts, plus de moitié plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au tiers postérieur, leurs mucrons apicaux subparallèles, les épaules très obliques et ne débordant pas les côtés; disque presque plan, sans aire suturale délimitée, la déclivité postérieure à 60°; marqués de gros points profonds noirs transversaux, alignés, séparés par des intervalles

plus larges que les points et sur le même plan que les interstries, les interstries plans, non ou peu plus larges que les points, les latéraux pourvus de courtes soies blanches, visibles de haut, plus longues vers le sommet.

Pattes très densément squamulées, leurs soies courtes et blanches. Fémurs en dessous avec une ligne de squamules opalines. Fémurs antérieurs assez fortement renflés; tibis antérieurs au sommet assez fortement arqués; soies des corbeilles tarsales, pubescence du dessus des tarsi d'un brun fauve.

Long. 17-18 mm.

Colombie: Muzo, X-1919, 3 ♀♀, ma collection (F. HILAIRE).

Equateur, 1 ♀ (ex DONCKIER).

40. *Compsus cyphoides* n. sp.

Ovale rhomboïdal, noir, le revêtement dense, d'un beau vert clair, un peu luisant, les antennes vertes, leur massue cendrée.

Rostre large et court, plus large que long, en avant très peu élargi, les scrobes presque entièrement visibles de haut, l'impression dorsale faible, non sillonnée, les sillons dorsaux droits, obliques, convergents, squamulés. Front plus du double du diamètre d'un œil, avec une petite fovéole noire. Antennes courtes, densément squamulées, leur soies extrêmement courtes et à peine soulevées; scape n'atteignant pas le bord postérieur de l'œil; funicule avec les articles 5-6 un peu moins longs que larges.

Prothorax convexe, sur le milieu devant la base légèrement impressionné, entièrement vert, à l'exception d'un petit point brunâtre de chaque côté sur la base, la ponctuation sur le disque nulle, sur les côtés microscopique et les rugosités très faibles. Écusson allongé, petit, tomenteux, brun.

Elytres larges, de moitié seulement plus longs que larges, les épaules accusées avec un point noir sur leur sommet, les mucrons apicaux courts; disque subplan, la déclivité postérieure forte, à 80°; fovéoles petites, espacées, leurs points centraux très petits, dénudés, les fovéoles alignées en séries régulières, les interstries plans, beaucoup plus larges que les fovéoles, les latéraux non pubescents sur les côtés, très brièvement vers leur sommet; sur la déclivité postérieure, les interstries légèrement convexes et la suture nettement relevée dans la moitié supérieure.

Pattes robustes, très brièvement sétulosées; fémurs antérieurs modérément renflés, leurs tibias arqués sur toute leur longueur.

Long. 16 mm.

Colombie: Villaviciosa, un spécimen, ma collection (F. HILAIRE).

Cette espèce, à cause de sa coloration, ressemble à *C. viridissimus*; elle s'en distingue par sa forme plus large et plus courte, la déclivité postérieure plus forte, les mucrons plus courts, la sculpture différente des élytres et les autres caractères indiqués ci-dessus.

Sa forme courte la rapproche davantage de *C. gentilis* OL. dont elle se distingue par les élytres à déclivité postérieure plus forte, les points des fovéoles beaucoup plus petits, le prothorax à ponctuation obsolète, le rostre plus large.

Compsus armatissimus MARSH. Trans. Ent. Soc. Lond. 1922 p. 193, pl. III, fig. 4. = (*C. serietuberculatus* VOSS, Rev. Entom., Sao Paulo, II, 1932, p. 38).

Cette espèce se rencontre dans les collections sous les deux noms précédents in litt. *armatissimus* CHEVR., *serietuberculatus* JCK; VOSS a évidemment ignoré la description de M. G. A. K. MARSHALL.

GENRE *PLOCOCOMPSUS* MARSH.

41. *Plococompsus mansuetus* n. sp.

Revêtement compact, blanc.

♀. Rostre aussi large que long, peu élargi en avant, les ptérygies faiblement élargies; en dessus subplan, avec un fin sillon médian se terminant dans une petite fovéole frontale, de chaque côté avec deux courts sillons arqués, parallèles, le postérieur devant l'œil; en avant évasé, l'échancrure apicale forte, ses cils bruns; scrobes en arrière squamulés, dirigés contre le tiers inférieur des yeux. Tête courte, les tempes moindres que le diamètre d'un œil, le front plan, double du diamètre d'un œil, les yeux brièvement ovales et fortement convexes. Antennes courtes et robustes; scape graduellement épaissi, atteignant le bord postérieur de l'œil; funicule avec le 1^{er} article plus de moitié plus long que large, le 2^e aussi long que les 3^e et 4^e ensemble, les 5^e et 6^e seulement aussi longs que larges, la massue oblongue et aussi longue que les trois articles précédents ensemble.

Prothorax transversal, les côtés très peu convergents et subrectilignes jusqu'au cinquième antérieur, dans ce dernier cinquième resserrés, la base fortement bisinuée et un peu plus large que le bord antérieur, ce dernier légère sinué et avancé au milieu, sur les côtés avec une frange de courtes soies squamuleuses; convexe, les rugosités fortes,

irrégulières, obsolètement pointillées, devant l'écusson avec une courte impression transversale et arquée. Ecusson ovalaire, élevé.

Elytres convexes, légèrement déprimés sur le milieu du disque, courts, de un tiers seulement plus longs que larges, au sommet brièvement acuminés, la base fortement bisinuée, les épaules largement arrondies, élevées, très peu saillantes latéralement, les côtés presque parallèles, légèrement convergents jusqu'au tiers postérieur; fovéoles profondes, entamant les bords des interstries; interstries convexes, irréguliers, éparsément pointillés, la suture plane en avant, les interstries 3, 5, 7, plus élevés, en forme de côtes peu élevées, ondulées le long de leur crête (voir de profil), la 1^{re} côte plus fortement relevée au sommet de la déclivité postérieure, cette dernière à 60°.

Fémurs assez épais, leurs points petits, épars, leurs soies microscopiques; tibias larges, légèrement comprimés, brièvement pubescents, les antérieurs légèrement arqués en dedans au sommet. ♂. Plus petit et un peu plus étroit.

Long. 9-13 mm.

Argentine: Rio Salado, une série de spécimens, (ex LE MOULT, J. BOSQ).

Cette espèce est voisine de *C. argentinicus* HELLER et *C. dubius* VOSS. dont elle se distingue par la coloration, la forme et la sculpture du prothorax, la forme des épaules, la sculpture moins régulière des élytres. Quoique leurs vibrisses soient courtes elle appartient ainsi que *C. argentinicus* HELLER, *C. dubius* VOSS, *C. bimaculatus* HUST. au genre *Plococompsus* MARSH. et forment un groupe remarquable par la brièveté des élytres.

42. *Plococompsus cinereus* n. sp.

Ovale oblong, le revêtement dense, blanchâtre, légèrement teinté de brun sur le sommet des élytres, pourvu de nombreuses soies blanches, courtes sur les élytres, longues sur les tibias; les élytres avec une légère tache noirâtre vers le milieu du 3^e interstrie.

♀. Rostre plus large que long, fortement élargi au sommet, l'impression antérieure avec un fin sillon médian s'évanouissant dans la fovéole frontale, les sillons dorsaux étroits et courts. Tête large, conique, les tempes plus longues que les yeux, le front moindre que le double d'un œil, les yeux modérément convexes. Antennes assez élançées, leurs cils blancs et assez longs; scape claviforme, atteignant presque le bord antérieur du prothorax; funicule avec le 2^e article moins long que les 3^e et 4^e ensemble, le 3^e aussi long que le 1^{er},

tous les suivants au moins du double aussi longs qu'épais.

Prothorax peu plus large que long, en avant fortement rétréci et légèrement resserré derrière le bord antérieur, les côtés subparallèles de la base au milieu, la base fortement bisinuée, le bord antérieur nettement sinué derrière les yeux, les vibrisses courtes et cendrées; le milieu avec une large et profonde impression, à peine rugueuse, les côtés avec une impression moindre mais densément fovéolée et rugueuse. Ecusson ovale, convexe.

Elytres larges, s'élargissant peu en arrière, plus de moitié plus larges que le prothorax, à leur sommet obtusément acuminés, les épaules accusées, débordant les côtés; aire suturale plane, la déclivité postérieure arquée, en quart de cercle; interstries 3, 5, 7 costiformes, la côte du 5^e effacée dans son cinquième basal, les autres interstries étroits, à peine convexes, la suture plane sur le disque, relevée sur la déclivité; fovéoles assez grosses, entièrement squamulées, en séries geminées; soies alignées, unisériées sur les interstries.

Pattes robustes; fémurs renflés, les antérieurs plus fortement; tibias antérieurs à peine arqués vers le sommet.

♂. Taille moindre; forme moins large.

Long. 11-15 mm.

Equateur; Ambato, 2 ♂♂, 1 ♀, types, ma collection; Quito, 1 ♀ (R. BENOIST).

La femelle est de forme remarquablement large. Le spécimen de Quito est en dessus légèrement teinté de brun rosé.

43. *Plococompsus exaratus* n. sp.

Ovale oblong, convexe, noir, le revêtement dense d'un vert mat, la tête, le rostre, le sommet des élytres d'un cuivreux doré luisant, les antennes, les tarsi, les tibias antérieurs, d'un noir bleuté, leur pubescence appliquée courte, leurs cils fins et courts. Elytres grossièrement fovéolés et rugueux, brièvement acuminés au sommet, sans côtes.

♀. Rostre plus long que large, assez élargi en avant, les côtés parallèles en arrière, l'impression apicale profonde, de chaque côté limitée par une carène obtuse et noire, ces deux carènes reliées en arrière par une carène moins élevée, arquée en avant et atteignant presque le sommet du rebord de l'incision apicale; en arrière l'impression s'affaiblissant mais distincte jusqu'à la base; avec un fin sillon médian, se transformant en avant en une fine carène coupée par la carène transversale; impressions latérales étroites, profondes, peu

arquées; scrobes en arrière squamulés atteignant le tiers inférieur des yeux. Front fovéolé, plan, très large, presque trois fois aussi large qu'un œil. Yeux fortement convexes, entouré d'un sillon nacré. Antennes assez élancées; scape faiblement claviforme; atteignant le bord antérieur du prothorax; tous les articles du funicule notablement plus longs que larges.

Prothorax subconique, plus long que large, les côtés droits, convergents, légèrement ondulés, derrière le bord antérieur légèrement incisés, la base faiblement bisinuée et de un quart plus large que le bord antérieur, ce dernier épaissi, en dessus sans rugosité, latéralement derrière les yeux sinué lobé et avec une frange de courtes soies squamuleuses serrées, claires; avec une large impression médiane subinterrompue en son milieu par un pli transversal, les côtés comprimés et couverts de grossières rugosités squamulées. Ecusson ovulaire, rétréci en avant, squamulé.

Elytres semi-elliptiques, leur plus grande largeur très peu en arrière du milieu, au sommet brièvement acuminés, leurs mucrons très courts, leurs épaules brièvement arrondies, leur arête antérieure subrectiligne atteignant la base sans sinuosité et en formant avec elle un angle de 45°; convexes, l'aire suturale à peine déprimée, la déclivité postérieure arquée et à 45°; criblés de très grandes et profondes fovéoles, séparées, par des cloisons transversales ondulées; interstries étroits, vue de profil leur arête ondulée, les 3^e, 5^e, 7^e un peu plus élevés que les autres.

Tibias antérieurs assez élancés, arqués à leur sommet.

♂. Taille moindre, les élytres moins élargis en arrière.

Long. ♀ 19 mm., ♂ 12 mm.

Colombie, Transylvanie (1), une paire, ma collection (F. HILAIRE).

44. *Plococompsus sinuatocostatus* n. sp.

Revêtement compact d'un blanc de craie, le funicule antennaire cendré.

Rostre aussi long que large, en avant fortement élargi, les côtés parallèles en arrière des ptérygies, en dessus plan, sillonné au milieu, l'échancrure apicale triangulaire, large mais courte, ses cils clairs et serrés, les impressions dorsales indistinctes, ainsi que le front criblé de points sétulosés. Tête courte, légèrement impressionnée transversalement derrière les yeux, le front moindre que le double du diamètre

(1) Cette localité est sans doute la désignation particulière d'un lieu de chasse du F. HILAIRE qui habite Bogota.

des yeux, ces derniers globuleux. Antennes avec le scape épais dès la base, linéaire, le funicule grêle, son 2^e article à peine de moitié plus long que le 1^{er}.

Prothorax cylindrique, aussi long que large, la base légèrement bisinuée et rebordée, épaissie, les rugosités fortes, criblé de très petits points piligères, la pubescence blanche dressée, bien visible sur les côtés. Ecusson allongé, fortement et graduellement rétréci en avant, arrondi en arrière.

Elytres déprimés sur le disque, les épaules obliquement arrondies, modérément saillantes, le sommet terminé par deux mucrons pubescents écartés, parallèles et assez longs; chaque élytre avec 4 côtes (sur les interstries 3, 5, 7, 9) lisses, la 1^{re} légèrement sinueuse, formant au sommet de la déclivité un tubercule triangulaire horizontal assez fort, la 2^e vers son tiers antérieur infléchie en dedans et se rapprochant notablement de la 1^{re}, la 3^e également infléchie en dedans en avant, parallèle à la 2^e avec laquelle elle se réunit à leur extrémité, la 4^e courte sur le quart antérieur du 3^e interstrie, l'interstrie marginal lisse, plan, imponctué, la suture plane jusqu'à la déclivité, les autres interstries étroits, les points des séries assez petits mais serrés; déclivité postérieure à 50°, pubescente, impressionnée derrière la jonction des 2^e et 3^e côtes.

Tibias antérieurs bisinués en dedans, arqués à leur sommet. Tarses cendrés en dessus.

Long. 11 mm.

Amazones: Santarem, un spécimen ♂, ma collection (ex STAUDINGER).

45. *Plococompsus tarapotae* n. sp. (C. HELLER in litt.).

Ovale oblong, le revêtement dense, d'un vert argenté, les élévations du prothorax, le 3^e interstrie élytral teinté de blanc rosé, les élytres à leur sommet acuminés, les mucrons courts.

Rostre un peu plus long que large, peu élargi en avant, son impression antérieure atteignant le milieu et à son sommet avec une fine et courte carène noire, avec une élévation transversale obtuse au niveau de l'insertion antennaire, ses sillons dorsaux profonds, arqués, se réunissant devant la fovéole frontale, les yeux précédés d'un profond sillon arqué, les côtés teintés de brun, densément ponctués et brièvement sétulosés. Tête courte, les tempes un peu moins longues que les yeux, le front à peine du double d'un œil, les yeux assez fortement convexes, fortement rétrécis inférieurement, entourés de squamules nacrées.

Antennes assez courtes; scape graduellement épaissi, dépassant un peu l'œil; funicule avec le 2^e article moins long que les 3^e et 4^e ensemble, les 5^e et 6^e plus longs que larges, la massue noire.

Prothorax peu plus large que long, légèrement resserré à ses extrémités, plus brièvement devant la base, les côtés faiblement arqués, la base assez fortement bisinuée et un peu plus large que le bord antérieur; convexe, couvert de rugosités médiocres serrées, entremêlées de fovéoles profondes, le disque subplan et rugueux. Ecusson subpyriforme, convexe, vert.

Elytres s'élargissant en arrière jusqu'au delà du milieu, la base fortement bisinuée, les épaules peu développées, très obtusément arrondies, ne débordant que peu sur les côtés; aire suturale plane, la déclivité postérieure à 45°: 3^e, 5^e, 7^e interstries plus convexes que les autres; le 3^e au sommet de la déclivité beaucoup plus élevé, en côte ondulée, brusquement terminée; fovéoles grandes, leurs points centraux très petits, noirs, dénudés, leurs intervalles transversalement ondulés, l'interstrie 5^e flexueux, en arrière s'écartant du 3^e et leur intervalle plus large qu'en avant.

Pattes robustes, les tibias antérieurs peu arqués au sommet.

Long. 14-15 mm.

Pérou: Tarapoto, deux spécimens, ma collection (ex STAUDINGFR).

46. *Plococompsus texatus* n. sp. (*C. texatus* CHEVR. in litt.).

Oblong, noir, le revêtement dense d'un vert peu brillant, le disque des élytres avec des rugosités noires, transversales, ondulées, linéaires, plus ou moins parallèles; les squamules mates entremêlées de nombreuses petites squamules vertes et scintillantes.

♀. Rostre plus long que large, très peu élargi en avant, l'impression apicale obtusément carénée rebordée sur ses côtés, dans le milieu avec une carène vive, noire, les soies apicales longues et fauves; sillons postérieurs latéraux fortement obliques. Tête conique, les tempes presque aussi longues que les yeux, le front double du diamètre d'un œil, plan, avec une petite fovéole. Antennes avec le scape claviforme, atteignant à peine le bord postérieur de l'œil, les articles 5-6 du funicule plus longs que larges.

Prothorax aussi long que large, subcylindrique, en avant très peu rétréci mais nettement étranglé latéralement derrière le bord antérieur, les côtés très peu arqués, la base bisinuée, les angles postérieurs droits, brièvement arrondis; couvert de rugosités transversales, noires, interrompues par un sillon médian irrégulier; vibrisses fauves. Ecusson pyriforme, squamulé.

Elytres parallèles jusqu'au milieu, leurs mucrons apicaux assez forts, parallèles, pubescents, dorés ou nacrés, les épaules obtusément arrondies, débordant peu les côtés, leur arête antérieure à 45° avec la base; disque subplan, l'aire suturale mal délimitée, la déclivité postérieure à 45°; fovéoles obsolètes, indiquées par des petites taches mates, pâles; suture plane, relevée sur la déclivité postérieure; 3^e, 5^e, 7^e interstries relevés seulement au sommet de la déclivité, le 3^e très brièvement et plus fortement que les 5^e et 7^e.

Pattes normales, parfois avec un léger reflet doré, tibias avec leurs soies très courtes, blanches, les antérieurs assez fortement arqués. Une touffe de soies blanches sur le milieu postérieur du prosternum.

♂. Taille moindre, plus étroit, le prothorax plus long, les pattes (tarses exceptés) le plus souvent à reflets dorés, rarement aussi le sommet du rostre,

Long. 11-17 mm.

Colombie: Muzo, types, ma collection (F. HILAIRE); sans localité précise, diverses collections.

Equateur, sans localité précise, ma collection.

Les ondulations noires des élytres sont évidemment quelque peu variables, mais dans leur ensemble caractéristiques. La coloration dorsale est souvent d'un vert légèrement teinté de bleu, plus brillant chez le ♂ que chez la ♀; rarement la tête, le rostre, le sommet des élytres ont un reflet doré.

47. *Plococompsus viridiaeris* n. sp.

Oblong, le revêtement d'un vert de gris pâle, mat.

Rostre plus long que large, au sommet non élargi, l'impression antérieure finement carénée au milieu, les sillons dorsaux fortement obliques mais n'atteignant pas la base, l'incision apicale avec ses soies longues, serrées et jaunes. Tête courte, conique, les tempes à peine aussi longues que les yeux, le front large, plus du double du diamètre d'un œil, avec une fovéole petite. Yeux petits, assez fortement convexes, tétrécis inférieurement. Antennes courtes; scape claviforme dépassant à peine l'œil; funicule avec le 2^e article de un tiers plus long que le 1^{er}, les 5^e et 6^e subglobuleux, pas plus longs que larges.

Prothorax aussi long que large, les côtés faiblement arqués et légèrement resserrés derrière le bord antérieur, la base bisinuée et plus large que le bord antérieur; avec un large sillon médian, faiblement rugueux, les côtés peu densément fovéolés, ponctués et les rugosités médiocres. Ecusson oblong, rétréci en avant, plan.

Elytres parallèles jusqu'au tiers postérieur, acuminés et densément pubescents au sommet, les épaules peu saillantes, leur arête antérieure sinuée en dedans avant la base; aire suturale plane, nettement délimitée par les troisièmes interstries, la déclivité postérieure à 45°; intervalle des 3^e et 7^e interstries légèrement, les côtés plus fortement comprimés; fovéoles médiocres, leurs points centraux petits et noirs, les deux premières séries de fovéoles et les latérales régulières, les dorsales irrégulières et les intervalles des fovéoles transversalement convexes mais peu ondulés, le 3^e interstrie assez nettement relevé, un peu plus fortement en arrière, le 7^e et le 5^e peu relevés et ce dernier relevé seulement dans sa moitié postérieure. Soies dorsales microscopiques, longues sur le sommet.

Pattes assez robustes; fémurs antérieurs brusquement et fortement renflés, presque incisés en dessous près du genou; tibias antérieurs modérément arqués; tarses robustes et courts.

Long. 14 mm.

Colombie, un spécimen, ma collection (ex STAUDINGER).

Les lobes inférieurs du prothorax sont très faibles, mais leurs vibrisses nettes, fauves. Les scrobes sont squamulés en arrière.

GENRE *EXORIDES* PASC.

48. *Exorides otiosus* n. sp.

Allongé, noir, densément revêtu de squamules d'un vert foncé, mat, très petites, rondes, dans les rugosités dorsales teintées de brun jaune, les soies dorsales très courtes, jaunes, sur le sommet des élytres plus longues, très longues et serrées sur les forts mucrons apicaux, assez longues et nombreuses sur les tibias. Dessous le long du milieu dénudé en partie.

♀. Rostre plus long que large, modérément élargi au sommet, les côtés parallèles jusqu'à l'insertion antennaire; impression dorsale peu profonde, avec une fine et obtuse carène médiane, les sillons latéraux peu profonds; ainsi que la tête en dessus avec des squamules très éparses. Tête courte, les tempes moins longues que les yeux, le front plus du double du diamètre d'un œil, les yeux assez fortement convexes. Antennes avec le scape atteignant presque le bord antérieur du prothorax, presque dépourvu de squamules, sétosulé; funicule avec les articles 1 et 3 de même longueur, le 2^e de moitié plus long que 1 ou 3, les articles 3-6 faiblement coniques, diminuant graduellement de longueur, le 6^e encore de moitié plus long que large, le 7^e conique, plus large, presque aussi large que long.

Prothorax subconique, un peu plus large que long, en avant un peu moins large qu'à la base et légèrement resserré, les côtés parallèles dans leur moitié postérieure, en avant biéchancré par les plis latéraux, la base fortement bisinuée; impression dorsale oblongue, médiocrement profonde, faiblement rugueuse; côtés obliquement impressionnés, fortement rugueux. Ecusson ovale, petit, convexe.

Elytres s'élargissant en arrière jusqu'au milieu, leurs mucrons apicaux longs, velus et parallèles, la base de chaque côté modérément arquée mais fortement relevée et rebordée, les épaules obtuses, débordant les côtés, leur arête antérieure fortement sinuée en dedans derrière la base; aire suturale plane, la déclivité postérieure longue et à 45°; 3^e interstrie assez fortement relevé, costiforme, épaissi et plus relevé à sa base; 5^e et 7^e interstries obsolètement relevés, le 5^e terminé sur le milieu de la déclivité par un petit tubercule nacré; fovéoles superficielles, en séries peu nettes, leurs intervalles plans et pointillés.

♂. Taille moindre; forme plus étroite; impression du rostre plus profonde; prothorax cylindrique et aussi long que large; élytres s'élargissant très peu en arrière.

Long. 12-18 mm.

Equateur: Carretas, 2.600 m. d'alt., kilomètre 23 route de Aloag à San Domingo, 3-VII-1931, 2 ♂♂, 2 ♀♀ (R. BENOIST); Ambato, 1 ♀.

Cette espèce se place dans le groupe de *E. quadrivittatus* KIRSCH.

49. *Exorides octocostatus* n. sp.

Oblong, allongé, noir, peu luisant, les élytres avec un revêtement dense, jaunâtre, dans l'intervalle des côtes, tout le reste des téguments non squamulé.

Rostre triangulaire, s'élargissant de la base au sommet, en ce dernier point aussi large que long au milieu, avec une impression longitudinale en avant plus large et plus profonde, séparée de la partie postérieure par une faible cloison transversale interantennaire, en arrière avec un sillon médian traversant la ronde fovéole frontale et se prolongeant jusqu'au vertex en s'affaiblissant; impressions dorsales oblongues, profondes, peu arquées, subparallèles; avec un sillon profond circulaire contre les yeux, en avant; ainsi que la tête avec des petits points épars, leurs soies microscopiques, les soies de l'échancrure apicale longues et ferrugineuses. Tête courte, les tempes à peine aussi longues que les yeux, le front une fois et demi du diamètre d'un œil, les yeux fortement convexes. Antennes robustes, courtes,

leurs cils blancs, courts, à peine soulevés; scape claviforme, atteignant le bord postérieur de l'œil; funicule avec le 2^e article seulement aussi long que le 1^{er}, les suivants courts, les 5^e et 6^e subglobuleux moins longs que larges, la massue cendrée,

Prothorax aussi long que large, subcylindrique, en avant étranglé, le bord antérieur en forme de bourrelet, relevé, un peu moins large que la base, les côtés légèrement arqués dans le milieu, plissés, la base tronquée et faiblement oblique de chaque côté; disque avec une large et profonde impression faiblement rugueuse, les côtés avec une impression oblique, fortement rugueuse; toutes les rugosités éparsement pointillées. Ecusson arrondi, convexe.

Elytres oblongs, allongés, d'un tiers plus larges que le prothorax, à la base très peu plus larges que le prothorax, de chaque côté tronqués et faiblement obliques, sans épaules mais la 3^e côte se réunissant à la 2^e en formant un angle externe très obtus (voir de haut), au sommet séparément terminés par une callosité arrondie à son extrémité et reliée en avant par une courte côte à la jonction des 1^{re} et 4^e côtes, les deux calus apicaux séparés par la suture; convexes, la déclivité postérieure longue, se relevant légèrement vers les calus apicaux; pourvus chacun de 4 fortes côtes entières noires (interstries 3, 5, 7, 9), la suture convexe, beaucoup moins élevée que les côtés.

Pattes avec des points petits, espacés sur les fémurs, plus serrés sur les tibias, leurs soies courtes et blanches; dessous à ponctuation très espacée et très fine, un peu plus dense sur le 5^e segment, les soies blanches, très courtes. Saillie mésosternale élevée mais non tuberculeuse.

Long. 17 mm.

Pérou, sans localité précise, un spécimen (♂ ?), ma collection.

Espèce intermédiaire entre les genres *Xenogaster* MARSH. et *Exorides* PASC., plus voisin cependant de ce dernier auquel elle est rattachée, provisoirement tout au moins.

SECTION D'ENTOMOLOGIE APPLIQUÉE

Réunion mensuelle du 18 décembre 1937.

Présidence de M. Ed. DE JONGHE D'ARDOYE, Président de la Section.

— La séance est ouverte à 17 h.

Communications. — M. W. E. VAN DEN BRUEL décrit l'état sanitaire des plantations de chicorée et autres plantes racines sises à Dieghem. Les terres y sont très légères, et largement infestées par *Heterodera marioni* CORNU. Les dégâts sont aggravés par la présence de diverses maladies d'origine cryptogamique (*Rhizoctonia violacea*, *Scerotinia*, *Libertiana*, etc.). Les mouches de la chicorée (*Napomyza lateralis* FALL et *Ophiomyia pinguis* FALL) n'y sont guère dangereuses, mais les cultivateurs ont observé leur abondance dans les racines provenant de terres plus lourdes (Erps-Querbs, etc.).

— M. J. A. LESTAGE a donné d'intéressantes précisions sur la distribution actuelle en Europe et plus particulièrement en Belgique du Crabe chinois: *Eriocheir sinensis* H. MILNE-EDWARDS.

— M. Ed. DE JONGHE D'ARDOYE a constaté la présence de colonies hivernantes de *Eriosoma lanigerum* HAUSM. à la base des grosses racines de pommier (Petit-Enghien). M. W. E. VAN DEN BRUEL a examiné des pommiers fortement infestés de pucerons lanigères à Gembloux sans observer des colonies sur les organes hypogés. La présence de ces colonies a déjà été signalée, surtout en terres légères. Dans ce cas, le traitement habituel d'hiver doit être complété par celui des racines: dégagement du collet de l'arbre et des grosses racines, et copieuse pulvérisation de ces organes au moyen d'une bonne émulsion de carbolinéum, ou arrosage de la naissance des racines et du sol au moyen de 5 à 10 litres d'une solution à 3 à 4 % de sulfocarbonate de potasse en cristaux.