

*halophilus* KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. Nat. Metz*, XXVI, p. 46 (1909).

Knocke : bas-fonds du Zwijn.

GENRE *DIPLOCLADIUS* KIEFFER.

*cultriger* KIEFF. — *Zeitsch. f. Insektenbiol.*, IV, p. 6 (1908).  
Gand, Melle, Waerschoot.

GENRE *TRICHOCLADIUS* KIEFFER.

*sylvaticus* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXVII, p. 274 (1937).  
Munte, Melle.

GENRE *ORTHOCLADIUS* v. D. WULP.

*xanthogyne* EDW. — *Trans. of the Ent. Soc. of Lond.*, p. 342 (1929).  
Munte, Melle.

*tuberculatus* EDW. — *loc. cit.*, p. 341 (1929), var. *lucorum* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXVII, p. 276 (1937).  
Melle.

GENRE *LIMNOPHYES* EUTON.

*macrocerus* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXVII, p. 278 (1937).  
La Panne.

*curticornis* GOETGH. — *loc. cit.*, LXXVIII, p. 64 (1938).

GENRE *SMITTIA* HOLMGREEN.

*foliifera* GOETGH. — *loc. cit.*, LXXVII, p. 277 (1937).  
Poperinghe.

*rupicola* KIEFF. — in MERCIER, *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXIII, p. 10 (1923).  
Zeebrugge, (Dr M. BEQUAERT).

*foliacea* KIEFF. — *Arch. f. Hydrobiol.*, p. 789 (1921).  
La Panne.

GENRE *EUKIEFFERIELLA* THIEN.

*calvescens* EDW. — *Trans. of the Ent. Soc. of Lond.*, p. 353 (1929).  
Postel (SEVERIN).

## Notes sur les Cercopides

PAR LE

D<sup>R</sup> V. LALLEMAND

SOUS-FAM. TOMASPISINAE

TRIBU *ISCHORHINI*

*Baetkia maroniensis* n. sp.

Tête, méso- et métasternum, abdomen, écusson et élytres : rouge sang ; cuisses, base des tibias postérieurs, yeux, vertex et base de l'écusson plus foncés ; pronotum, prosternum, partie postérieure du front (à partir de la carène transversale et jusqu'au clypeus), clypeus, rostre, pattes antérieures et médianes, ainsi qu'une bordure des élytres partant de la base et s'étendant jusqu'à la pointe du clavus : noirs ; antennes, tibias et tarses postérieurs : brun rougeâtre.

Deux épines sur les tibias postérieurs, dont la supérieure, située près de la base, est chez certains exemplaires très petite.

Longueur : 13 mm. ; élytres, longueur : II, 1/3 mm., largeur : 4 mm.

Habitat : Guyane française : Charvein, roches de Kourou, (bas Maroni).

Type : ma collection, 3 ♀.

*Neolaccogrypota brunnea, nigricans.*

Les élytres au lieu d'être brun clair sont noirs à base rouge.

Habitat : Pérou, Marcapata.

TRIBU *TOMASPISINI*

*Tomaspisnella bimaculata* n. sp.

Noire ; deux taches ocre jaune sur les élytres, dont une occupe le tiers basal du clavus, mais déborde légèrement sur le corium ; la seconde se trouve au devant du tiers apical, elle atteint la suture

clavo-coriale mais ne touche pas le bord externe; rostre, hanches et pattes postérieures: brunâtres. Le dessin des élytres rappelle tout-à-fait celui de *Tom. tettigoniella* BREDD.

Sur le front, quelques stries latérales peu marquées et pas de carène; bord antérieur de la tête largement arrondi; pas de carène sur le vertex; ocelles plus proches l'un de l'autre que des yeux; pronotum ponctué en stries plus ou moins transversales et portant de vagues traces de carène; écusson à peu près plan, la fossette médiane est à peine indiquée, tandis que les latéro-antérieures sont mieux marquées; deux épines sur les tibias postérieurs.

Longueur: 10 mm.

Habitat: Pérou, Vilcanota.

***Tomaspisinella transita* n. sp.**

Noire; face supérieure du corps traversée par une large bande jaune, voisine de la base des élytres, elle occupe tout l'écusson, et son bord postérieur est situé un peu en arrière de la pointe de ce dernier; partie du sternum au-devant des pattes antérieures et second article du rostre: brun clair; clypéus ocre teinté de brun; premier article du rostre, sternum et pattes, ocre.

Mêmes caractères génériques que la précédente.

Longueur: 5 à mm.

Habitat: Equateur, Tena.

***Tomaspisinella quinquesignata* n. sp.**

Noire; une large bande derrière le bord antérieur du pronotum et sur les élytres deux taches ovoïdes, blanc jaunâtre; la première sur le clavus, voisine de la base, débordant légèrement sur le corium, la seconde entre le radius et la suture clavo-coriale; hanches, pattes, rostre, ocre brun; tibias postérieurs, tarsi et abdomen brun clair.

Sur le front, pas de carène, quelques stries latérales peu marquées; bord antérieur du vertex largement arrondi, sans carène; ocelles plus proches l'un de l'autre que des yeux; pronotum ponctué en stries transversales avec des traces de carène; sur l'écusson une large fossette; sur les tibias postérieurs deux épines.

Longueur: 9 mm.

Habitat: Colombie.

Type: ma collection.

***Tomaspisinella ripuaris* n. sp.**

Noire; premier article du rostre, sternum, pattes, organes génitaux, bord antérieur du pronotum, écusson: jaunes; sur les élytres, deux bandes d'un blanc légèrement jaunâtre, la première sur les trois-quarts antérieurs du clavus, longe la suture clavo-coriale, la seconde traverse le corium à la fin du second tiers; bord externe des élytres sauf à la base et à l'extrémité, brun clair; segments abdominaux étroitement bordés d'ocre jaune; tibias antérieurs légèrement teintés de brun.

Front partagé en trois parties une médiane, légèrement bombée et deux latérales perpendiculaires, sans carène médiane, à stries transversales très légères; vertex à bord antérieur arrondi, sans carène; ocelles un peu plus près l'un de l'autre que des yeux; pas de carène sur le pronotum; écusson à disque aplati; rostre s'étendant jusque l'extrémité des hanches médianes; deux épines sur les tibias postérieurs.

Long. totale: 8 mm.; élytres, long: 6 3/4 mm., larg.: 2 mm.

Habitat: Paraguay, Rio Agnatal.

Type: ma collection.

***Tomaspisinella picea, interrupta.***

Diffère de l'espèce par la bande jaune des élytres beaucoup plus large, coupée en deux au coude au-devant de la partie apicale des élytres.

Habitat: Bolivie, Mapiri.

***Monecphora ornata* n. sp.**

Front ocre rougeâtre; vertex, pronotum, écusson brun clair; sur le milieu du vertex une bande longitudinale se continuant sur le pronotum, ainsi que les bords latéro-antérieurs de ce dernier: ocre jaune; sur les élytres brun clair, une bande longeant le bord interne et s'étendant jusqu'à la pointe du clavus, la suture clavo-coriale, une bande le long de la moitié antérieure du bord externe, et, au même bord, en face de la pointe du clavus une grande tache carrée, ocre jaune; yeux, second article du rostre, mésosternum, tibias et tarsi antérieurs et médians: bruns; pro- et métasternum, les cuisses et les tibias postérieurs: ocre jaune sale; abdomen ocre jaune teinté de brun; ailes enfumées à base jaunâtre.

Sur le front une carène médiane obtuse et des stries transversales, vu de côté, il est arrondi; ocelles rapprochés, leur distance des yeux égale au moins trois fois leur écartement; pas de carène sur le vertex, ni sur le pronotum; trois fossettes sur l'écusson, deux petites

latéro-antérieures et une grande médiane; le médian et le cubitus ne sont pas soudés sur le tiers basal des élytres, mais réunis par une branche transversale; deux fortes épines sur les tibias postérieurs.

Longueur totale: 13 mm.; élytres, long.: 11 mm., larg.: 3,5 mm.

Habitat: Costa Rica.

Type: ma collection.

***Monecphora fossor* n. sp.**

Tête, prosternum, orange; rostre, métasternum, abdomen: ocre brun; antennes, ocelles: noirs; yeux, mésosternum et tarière: bruns; pattes ocre jaune brunâtre; pronotum orange sur les deux cinquièmes antérieurs, noir sur le restant; écusson et élytres noirs, sur ces derniers deux bandes transversales orange: la première, située à l'extrémité du tiers antérieur, s'élargit progressivement vers l'extérieur, et du côté interne de la nervure anale, se prolonge en avant jusque près de la base, la seconde se trouve au devant du tiers postérieur; ailes enfumées à base orange.

Front à carène médiane obtuse et stries transversales, vu de côté, il montre une ligne courbe assez allongée; bord antérieur du vertex arrondi; ocelles beaucoup plus près l'un de l'autre que des yeux; vertex et pronotum sans carène, le dernier est ponctué en stries transversales; écusson creusé de trois fossettes, une grande discale et deux petites latéro-antérieures; cubitus et médian soudés sur le tiers antérieur des élytres; deux épines sur les tibias postérieurs.

Longueur totale: 8 mm.; élytres: long.: 7 mm.; larg.: 2 mm.

Habitat: Brésil, Minas Geraes.

Type: ma collection.

***Monecphora pseudoflavopicta* n. sp.**

Ressemble à *flavopicta* STAL par le dessin des élytres; noire; bords de l'écusson, plaques jugales, antennes, rostre, pattes, hanches, métathorax, bord postérieur des segments abdominaux, une petite tache à chacun des angles scapulaires du pronotum, base des élytres: rouge carmin; sur les élytres, une bande longitudinale et deux taches jaunes; la bande se termine en pointe et occupe une grande partie du clavus; la première tache, plus longue que large, se trouve sur le tiers basal, entre le radius et le bord costal, elle commence près de la base et à son extrémité s'élargit brusquement pour atteindre le médian; la seconde tache se trouve en face de la pointe du clavus, entre le bord costal et la branche interne du radius.

Le front est typique du genre *Monecphora*; bord antérieur du vertex largement arrondi; ocelles séparés par une fine carène; pronotum densément ponctué, avec carène longitudinale; sur l'écusson trois fossettes; sur les élytres le médian et la cubitus ne sont pas soudés, mais réunis par un rameau transversal, tandis que chez *flavopicta*, ils sont soudés sur une certaine longueur; deux épines sur les tibias postérieurs.

Longueur totale: 10,5 mm.; élytres, longueur: 9 mm., largeur: 3 mm.

Habitat: Brésil.

Type: ma collection.

***Monecphora trifasciata* n. sp.**

Front, partie frontale du vertex, milieu du clypéus, rouge carmin; milieu du vertex rouge brunâtre; parties latérales du vertex, pronotum, écusson, élytres: noirs; sur la partie postérieure du pronotum une large bande transversale et sur les élytres deux bandes, ocre jaune; la première part de l'extrémité de l'écusson, la seconde de la pointe du clavus; sternum, abdomen et pattes: brun noirâtre.

La face vue de côté présente une ligne courbe; deux épines sur les tibias.

Longueur: 9 mm.

Habitat: Brésil, Etat de Rio, Itatiaya.

Type: ma collection.

***Monecphora insignis* n. sp.**

Tête, pattes, sternum, les deux cinquièmes antérieurs du pronotum: orange; yeux, antennes, second article du rostre, tarsi et épines: bruns; abdomen brun à segments finement bordés de jaune orange; sur le pronotum, derrière la bande orange, se trouvent deux autres bandes, une noire, puis une jaune: sur les élytres noirs, à extrémité brun clair transparente, deux taches arrondies jaunes, la première, située à un millimètre de la base, s'étend du radius jusqu'au milieu du clavus, la seconde se trouve au bord externe en face de la pointe du clavus.

Front à carène médiane longitudinale saillante et à stries transversales, vu de côté, il dessine une courbe allongée; bord antérieur du vertex arrondi; ocelles très proches l'un de l'autre; vertex et pronotum sans carène médiane; sur l'écusson trois fossettes peu profondes, une discale, deux latéro-antérieures; médian et cubitus réunis sur un

court trajet sur le tiers basal des élytres; deux épines sur les tibias postérieurs.

Longueur totale: 8 mm.; élytres: long.: 6,5 mm.; larg.: 2 mm.

Habitat: Colombie.

Type: ma collection.

**Monecphora transversa** n. sp.

Noire: méso- et métasternum, 1<sup>er</sup> segment abdominal, organes génitaux, une bande transversale se trouvant en arrière du tiers basal des élytres, rouges; segments de la face supérieure de l'abdomen finement bordés de rouge, milieu de sa face inférieure et cuisses postérieures rouges teintés de noir.

Sur le front bombé une carène médiane nette et des stries transversales; bord antérieur de la tête en angle obtus; la distance des yeux et des ocelles égale à peu près trois fois l'écartement de ces derniers; une carène sur le vertex et le pronotum; trois fossettes sur l'écusson, une grande discale et deux petites latéro-antérieures; médian et cubitus réunis sur le tiers basal des élytres; deux fortes épines sur les tibias postérieurs.

Longueur totale: 7,5 mm.; élytres, long.: 6 mm.; larg.: 2 mm.

Habitat: Brésil, Serinhaem.

Type: ma collection.

**Monecphora nigroapicata** n. sp.

Ocre très légèrement teinté de brunâtre; les antennes, les yeux, les quatre neuvièmes postérieurs des élytres: noirs; tibias antérieurs, extrémité des tarsi et des épines, une bande longitudinale du côté externe des cuisses antérieures: brun noir.

Vertex et pronotum sans carène; la surface de ce dernier est ponctué en stries irrégulières, mais n'est pas rugueuse; distance des ocelles et des yeux égale à trois fois l'écartement de ces derniers; le bord antérieur du vertex est en angle obtus et sa longueur est à peu près égale à sa largeur entre les yeux; sur les élytres, les médian et cubitus sont soudés sur un court trajet sur le tiers basal; le réseau apical est assez dense et saillant.

Longueur: 11 mm.; élytres: longueur: 9 mm, largeur: 2,6 mm.

Habitat: Pérou, Marcapata.

Type: ma collection.

**Monecphora longula** n. sp.

Ocre, face supérieure du corps traversée par trois bandes brunes, la première sur le pronotum, la deuxième occupe la base du clavus et l'écusson (sauf sa pointe), la troisième est située au devant du milieu des élytres; ocelles, yeux, extrémité des tarsi et des épines: noirs.

Sur le front une carène et des stries nettes, vu de côté, le front dessine une ligne courbe; ocelles très proches, séparés par une fine carène; bord antérieur de la tête en angle obtus arrondi; une courte carène sur le pronotum, elle ne s'étend que sur la partie médiane; élytres semi transparents; deux épines sur les tibias postérieurs.

Longueur: 8 mm.; élytres: longueur: 6,5 mm.; largeur: 2 mm.

Habitat: Pérou, Marcapata,

**Sphenorhina sanguiniplaga** n. sp.

Tête, pronotum, écusson et élytres noir brun; écusson bordé de rouge; sur les élytres deux bandes transversales et deux longitudinales, une de ces dernières le long du bord externe, s'étendant jusque la seconde bande transversale et l'autre au bord interne atteignant la première transversale; ailes enfumées, à base rouge; rostre rouge à extrémité brun rouge; bords latéraux du prosternum noirs, son milieu comme celui du mésosternum est brun rouge; métasternum, face supérieure de l'abdomen: rouges; face inférieure de ce dernier rouge au milieu et noir rougeâtre sur les côtés; organes génitaux, pattes antérieures et médianes brun rougeâtre; pattes postérieures rouge légèrement brunâtre; épines et tarsi: noir un peu rougeâtre.

Front à carène médiane et stries latérales bien marquées, vu de côté, il dessine un angle obtus; bord antérieur du vertex anguleux, ocelles petits, séparés par la carène longitudinale; pronotum rugueux; densément ponctué, portant une fine carène; sur le tiers basal des élytres, le médian et cubitus sont soudés; deux épines sur les tibias postérieurs.

Longueur totale: 9 mm.; élytres, long.: 7,5 mm.; larg.: 2,5 mm.

Habitat: Vénézuéla, Caracas.

Type: ma collection.

**Sphenorhina colombiana** n. sp.

Noire; sur le pronotum une légère teinte cuivrée, brillante; premier article du rostre, métasternum et hanches postérieures: bruns; yeux gris brunâtre: sur les élytres deux taches ocres, une près du bord

externe, à la fin du deuxième tiers et l'autre sur le cubitus au même niveau.

Sur le front une carène médiane saillante et des stries transversales, vu de côté il dessine un angle aigu, proéminent; ocelles petits très proches l'un de l'autre, séparés par la carène longitudinale; pronotum granuleux portant une carène longitudinale; sur l'écusson une grande fossette médiane et deux petites antéro-latérales; médian et cubitus réunis sur un court trajet sur le tiers basal des élytres; rostre s'étendant jusqu'à l'extrémité des hanches postérieures.

Longueur totale: 8,5 mm.; élytres, long.: 7,5 mm.; larg.: 2 3/4 mm.

Habitat: Colombie.

Type: ma collection.

**Sphenorhina fissurata** n. sp.

Noire; sur les élytres, deux bandes ocre jaune, la première, située à la fin du premier tiers, part de la pointe de l'écusson et s'élargit progressivement vers le bord externe, la seconde part de l'extrémité du clavus et est coupée en son milieu; partie médiane des pro- et mésosternum, hanches, roses; pointe de l'écusson rouge carmin; ailes enfumées à base rosée.

Sur le front une carène médiane saillante et des stries latérales très légères, à peine indiquées, vu de côté, il dessine un angle droit; bord antérieur du vertex en angle obtus; ocelles très proches, séparés par la carène longitudinale; pronotum densément ponctué, sans carène; écusson creusé de trois fossettes, une grande médiane et deux petites latéro-antérieures; médian et cubitus soudés sur le tiers basal des élytres; deux épines sur les tibias postérieurs.

Longueur totale: 8,5 mm.; élytres: long.: 7 mm.; larg.: 2 mm.

Habitat: Bolivie.

Type: ma collection.

**Sphenorhina coronata** n. sp.

Tête noire; pronotum rouge, sauf une étroite bordure postérieure noire; écusson noir, sauf les bords latéraux et la pointe qui sont rouge pâle; élytres noirs avec deux bandes blanchés, la première plus large que la seconde va en se rétrécissant progressivement jusqu'au bord externe; premier article du rostre, prosternum rouge pâle; mésosternum brun noirâtre; hanches médianes et mésosternum blanc rougeâtre sale; second article du rostre, pattes: noirs; abdomen noir à segments finement bordés postérieurement de rouge.

Front vu de côté présentant un angle droit saillant; sur le pronotum une trace de carène en avant du bord postérieur; médian et cubitus soudés sur le tiers basal des élytres.

Longueur: 8 mm.

Habitat: Pérou, Marcapata.

**Sphenorhina Kolleri** LALL.

A la page 40 de *Archiv für Naturgeschichte*, A. 12 (1921), M. JACOBI met mon espèce en synonymie avec *Sph. nox* BREDD., il en critique le dessin qui est fait dans *Genera Insectorum*, Cercopides, pl. 4, fig. 1; le seul point où l'artiste a fait erreur est dans la coloration de la tache, qui est blanchâtre au lieu d'être jaunâtre, mais ses dimensions sont exactes, voici d'ailleurs les différences entre les deux espèces:

*Sph. Kolleri* LALL.

Carène frontale médiane longitudinale très nette, s'étendant jusqu'au bord antérieur de la tête.

Bord antérieur des lobes latéraux du vertex mince.

Tache des élytres limitée au corium, plus longue que large, n'atteignant pas le bord costal, elle commence en arrière de la séparation du médian et du cubitus, sur sa surface le clavus se bifurque.

Longueur: 14 mm.

*Sph. nox* BREDD.

Carène frontale mousse ne s'étendant pas jusqu'au bord antérieur de la tête, à la partie supérieure du front un triangle plan.

Bord antérieur du vertex beaucoup plus épais.

Tache des élytres transversale, s'étendant du bord costal jusque près du bord postérieur, une partie du tronc commun du médian et du cubitus s'étend sur sa surface et sa limite postérieure est antérieure à la bifurcation du clavus.

Longueur: 12,5 mm.

**Triecphora signifera** n. sp.

Clypéus et front jaunes, à la partie supérieure du dernier une bande transversale noire; bords du prosternum, tous les tarses, tibias antérieurs et médians, vertex, pronotum, écusson, élytres: noir brunâtre, luisant; face supérieure de l'abdomen noir brunâtre avec la base d'un jaune légèrement teinté de brun, face inférieure jaunâtre sur le milieu et noir brun sur les côtés; milieu du prosternum, bords du mésosternum,

métasternum, cuisses et tibias postérieurs: ocre jaune un peu brunâtre; cuisses antérieures et médianes: jaune brunâtre teinté de rouge; sur les élytres sont jaunes: une bande longeant l'écusson jusque sa pointe, une tache à l'extrémité du premier tiers du bord externe et s'étendant jusqu'au médian, une bande transversale à la fin du deuxième tiers; ailes enfumées; face supérieure de l'insecte recouverte d'une villosité dense.

Front assez aplati sur les côtés, portant trois carènes longitudinales, dont les latérales ne sont visibles que sur le tiers supérieur, vu de côté il dessine une ligne courbe; bord antérieur du vertex en angle aigu, sa longueur est un peu plus grande que sa largeur; ocelles très proches, séparés par la carène longitudinale; sur le pronotum densément ponctué, une fine carène sur sa moitié antérieure; écusson transversalement strié, creusé de trois fossettes, une grande et profonde médiane et deux petites latéro-antérieures; sur les élytres, le médian et le cubitus ne sont pas soudés; deux épines sur les tibias postérieurs.

Longueur totale: 11 mm.; élytres, long.: 9,5 mm., larg.: 3 mm.

Habitat: Brésil, Para.

Type: ma collection.

TRIBU *FUNKHOUSERINI* n. Trib.

*Funkhouseria* n. g.

M. CHINA, du British Museum, avec son obligeance habituelle, a bien voulu comparer un exemplaire de *Sph. bipunctata* que je possède avec le type de WALKER. En l'étudiant plus spécialement, j'ai constaté que cette espèce présente la particularité de porter trois fortes épines sur les tibias postérieurs, ce qui la distingue de toutes les autres *Sphenorhina* que je connais.

Je dédie ce genre à M. FUNKHOUSER, le spécialiste bien connu des Membracides.

*Funkhouseria bipunctata* WALK.

Front vu de côté montrant une ligne brisée en angle obtus; forte carène sur le pronotum; médian et cubitus soudés sur le tiers basal des élytres; bords latéro-antérieur du pronotum légèrement relevés.

SOUS-FAM.: CERCOPINAE

TRIBU *CLASTOPTERINI*

*Clastoptera aequinoctalis* n. sp.

Tête, pronotum, écusson jaune olive pale; sur le front une bande transversale, et au-dessus de celle-ci des stries latérales et une fine ligne longitudinale médiane, noires; sur le pronotum deux bandes longitudinales brunes, voisines de la ligne médiane et de chaque côté une bande transversale de même couleur, partant de sangles latéraux pour rejoindre l'extrémité de la longitudinale; angles antérieurs de l'écusson brun clair; clavus brun, partagé en deux par une bande jaune partant de l'angle de l'écusson et se dirigeant d'abord en arrière et en dehors, jusque la suture clavo-coriale pour longer celle-ci sur un court trajet; corium décoloré, hyalin sur la moitié antérieure jaune brunâtre clair, transparent, sur la moitié postérieure; à la fin du deuxième tiers une tache costale transversale, dépassant un peu le radius, noir brun et une tache calleuse subapicale noire; sternum et abdomen jaune brunâtre clair, sur le premier une bande transversale noire; pattes jaunâtres, deux bandes obliques sur les tibias antérieurs et médians, les épines et tarsi brun noir.

Pronotum et écusson finement et densément transversalement striés; deux épines sur les tibias postérieurs.

Longueur: 4 mm.; largeur: 2 1/3 mm.

Habitat: Equateur, Buccay.