

Espèce nouvelle pour la faune belge :  
*STERRHA (ACIDALIA) FUSCOVENOSA* GÖZE  
(*INTERJECTARIA* BSD.)

PAR

LÉON LEGIEST

C'est à notre collègue de Namur, M. le Major VANDERGUCHT, que nous sommes redevables de l'adjonction de cette intéressante *Sterrhinae* à notre faune.

Chargé de la préparation et de l'étude des milliers de papillons capturés à la lumière à Saint-Idesbald, en juin et juillet 1937, par cet infatigable chasseur, j'ai trouvé, dans le formidable matériel qui m'a été confié, vingt-six exemplaires de *Sterrho fuscovenosa* GÖZE.

La chenille vit sur des plantes basses, surtout sur des feuilles sèches, et croît lentement. POPE l'a trouvée en hiver mangeant sur une mousse (*Hylocomium triquetrum*). Papillon fréquent par places en juin et juillet en Europe centrale et méridionale, au nord de l'Afrique, en Asie Mineure et Arménie. STAUDINGER écrit par erreur "excepté en Angleterre", où ce papillon est d'ordinaire très fréquent au sud..." (L. B. PROUT, in *Seitz*, vol. IV, page 133).

*Fuscovenosa* GÖZE forme avec ses voisines *dilutaria* HBN. et *humiliata* HUFN., un groupe très difficile à débrouiller. La côte des ailes antérieures, à peu près concolore au reste de l'aile chez *dilutaria*, rougeâtre chez *humiliata* et s'étendant presque jusqu'à l'apex, est brunâtre chez *fuscovenosa* et ne dépasse pas la ligne coudée. Chez *dilutaria* et *humiliata*, la ligne subterminale claire ne forme pas de saillies comme chez *fuscovenosa*, où cette ligne fait une assez forte saillie vers la base entre les nervures radiales et de nouveau près du bord postérieur.

M. le Conservateur d'ORCHYMONT ayant eu l'obligeance de mettre à ma disposition l'ouvrage de J. CULOT "Noctuelles et Géométrides

d'Europe<sup>1</sup>, il m'a été facile, grâce aux excellentes figures de ce travail, de vérifier mes déterminations.

Cependant, et afin de dissiper les doutes pouvant subsister après cette étude, j'ai envoyé, avec l'assentiment de M. VANDERGUCHT, deux exemplaires de chacune des espèces précitées, à M. le Docteur H. DEBAUCHE, spécialiste en *Geometridae*.

De plus, je me suis conformé aux instructions de M. VANDERGUCHT, en offrant au Musée Royal d'Histoire Naturelle, deux beaux exemplaires de *Sterrhia fuscovenosa* GÖZE.

ADDITIONS

AU

Catalogue des Cératopogonides  
et des Chironomides

DE BELGIQUE (1)

PAR LE

D<sup>R</sup> M. GOETGHEBUER

CÉRATOPOGONIDES

GENRE *FORCIPOMYIA* MEIGEN.

*diversipes* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXVI, p. 319 (1936).

Chiny-sur-Semois.

*Guilleaumei* GOETGH. — *loc. cit.*, LXXV, p. 413 (1935).

Wellin.

*urbana* GOETGH. — *loc. cit.*, LXXVII, p. 273 (1937).

Poperinghe.

GENRE *ATRICHOPOGON* KIEFFER.

*trifasciatus* KIEFF. — *Ann. Mus. Nat. Hungar.*, XVI, p. 90 (1918).

Doische (Namur).

GENRE *DASYHELEA* KIEFFER.

*littoralis* GOETGH. — *Bull. Ent. Soc. Ent. Belg.*, LXXIV, p. 287 (1934).

La Panne.

(1) Voir : *Bull. et Ann. Soc. Ent. Belg.*, t. LXXIII (1933) p. 363-372 ; id. t. LXXIV (1934) p. 209-213 ; id. t. LXXIV (1934) p. 391-405 ; id. t. LXXV (1935) p. 63-72.