

Bibliothèque. — Notre Bibliothèque s'est enrichie de tirés à part de MM. COLLART (1 brochure), DUFRANE (2), D'ORCHYMONT (2) et VANSCHUYTBROECK (1). (*Remerciements*).

Travaux pour les Bulletin et Annales. — L'impression est décidée de notes de MM. COLLART, LECLERCQ et LELEUP.

Communications. — M. SEYDEL qui pendant 17 ans a étudié au Congo, principalement dans les environs d'Elisabethville, la biologie de beaucoup de Lépidoptères et a réalisé de nombreux élevages, présente une remarquable collection de chenilles, de diverses familles. Les curieuses chenilles de *Limacodidae* notamment y sont particulièrement représentées. M. SEYDEL parle des troubles souvent graves provoqués chez l'Homme par les poils urticants dont certaines sont revêtues. A ce propos, MM. COLLART, DUFRANE et MAYNÉ rapportent toute une série d'observations et de souvenirs personnels.

M. SEYDEL exhibe également un exemplaire congolais du rare *Palophus Leopoldi* SCHOUT. (Orth. *Phasmidae*).

— M. LELEUP commente sa note publiée plus loin. Il rend compte d'autre part du résultat de ses chasses dans les carrières de Wavreille.

— M. FACEL a constaté, dans les carrières de Seilles, de grandes fluctuations dans l'abondance, d'une année à l'autre, de diverses espèces de Carabiques. M. MAYNÉ, de son côté, a fait des observations identiques pour plusieurs espèces de Pentatomides. De pareilles constatations peuvent, il est vrai, être faites dans tous les groupes d'insectes, mais la recherche des causes de ces variations constitue un problème complexe jusqu'ici peu abordé.

— Enfin, en vue de compléter les recherches faunistiques et écologiques qu'il a entreprises sur les Pentatomides, M. MAYNÉ se recommande auprès des Collègues chassant en Campine et au Littoral pour que du matériel, accompagné si possible de renseignements biologiques, lui soit envoyé de ces régions.

— La séance est levée à 16 heures.

NOUVELLES ADDITIONS AU CATALOGUE des *Ceratopogonidae* et des *Chironomidae*

DE BELGIQUE (1)

PAR LE

DR M. GOETGHEBUER

Cette nouvelle liste d'espèces complète celles qui ont paru antérieurement (1). Elle comporte 14 Cératopogonides et 37 Chironomides nouveaux pour la Belgique et comprend également l'énoncé des localités nouvelles où certaines espèces, déjà signalées, ont été capturées dans notre pays.

Le nombre des Cératopogonides et des Chironomides en Belgique, s'élève actuellement à 528 espèces, (dont 374 sont des Chironomides et 154 des Cératopogonides) et à 25 variétés.

CERATOPOGONIDES

GENRE *FORcipomyia* MEIGEN

alacris WINN. — Autres loc. : Overmeire, Assenede.

Bequaerti GOETGH. — (1942) *Bull. Mus. roy. d'Hist. nat.*, XVIII, p. 1, n° 46. Knocke s/m. (dunes).

Braueri WASM. — (1893) *Wien. Ent. Zeitg.* XII, 277. Waarschoot.

ciliata WINN. — Autres localités de capture : Dickebusch, Westcapelle (Fl. Occ.), Beyne-Heusay (M. LECLERCQ).

divaricata WINN. — Autres loc. : Waarschoot, Schelderode, Melle, Hockai.

knockensis GOETGH. — *Bull. et Ann. Soc. ent. Belg.* LXXVIII, p. 375 (1938). Knocke s/m.

fuliginosa MEIG. — Autres loc. : Beyne-Heusay (M. LECLERCQ), Heusden (Fl. or.), Overmeire.

(1) Voir : *Bull. et Ann. Soc. ent. Belg.* (1933) p. 363-372 ; id. (1934) p. 209-213 ; id. (1934) p. 391-405 ; id. (1935) p. 63-72 ; id. (1938) p. 131-136.

laguncula KIEFF. — (1919) *Ann. Mus. nat. Hungar.*, p. 13. Liège.
marina WINN. — Autre loc. : Poperinghe.
nigra WINN. — Autre loc. : Waarschoot, Heusden.
pallida WINN. — Autre loc. : Waarschoot.
titillans WINN. — Autres loc. : Waarschoot, Heusden.
velox WINN. — Autre loc. : Dickebusch.

GENRE *ATRICHOPOGON* KIEFF.

fuscus MEIG. — Autres loc. : Gand, Overmeire, Hockai.
lucorum MEIG. — Syn. : (?) *meloesugans* KIEFF. Autres loc. : Chiny s/Semois, Hockai. A. COLLART a découvert à Hamoir (Prov. de Liège) un *Meloe* (Coléopt.) parasité par une vingtaine d'*A. lucorum* qui lui suçaient le sang.
minutus MEIG. — Autres loc. : St Jean in Eremo, Dickebusch, Overmeire, Heusden.
rostratus WINN. — Autres loc. : St Jean in Eremo, Overmeire, Asse-nede, Hockai.

GENRE *DASYHELEA* KIEFF.

flavoscutellata ZETT. — Autres loc. : Melle (bois), Poperinghe, Oostkerke (Fl. occ.).
insignipalpis KIEFF. — (1925) *Faune de France*, Paris, XI, p. 61. Heusden.
obscura WINN. — Autre loc. : Poperinghe.
sericata WINN. — Autre loc. : Westcapelle.
versicolor WINN. — Autre loc. : Waarschoot.

GENRE *CULICOIDES* LATREILLE

albicans WINN. — Autres loc. : Melle (bois), Destelbergen, Eecloo, Hockai. Rem. : D'après EDWARDS, cette espèce n'est pas synonyme de *C. vexans* STAEG. Elle se reconnaît à la coloration pâle de ses pattes et à son hypopyge.
chiopterus MEIG. — Autres loc. : Poperinghe, Dickebusch, Overmeire.
circumscriptus KIEFF. — Autre loc. : St Jean in Eremo.
fascipennis STAEG. — Autres loc. : Poperinghe, Knocke s/M.
maritimus KIEFF. — (1924) *Bull. Soc. Hist. nat. Moselle*, XXX, p. 62. (Voir aussi : EDWARDS, *British Blood-sucking flies* (1939), p. 38. Knocke s/m., Hoecke (Fl. Occ.).

nubeculosus MEIG. — Autres loc. : St Jean in Eremo, Hoecke, Westcapelle, Oostkerke (Fl. Occ.).

obsoletus MEIG. — Autres loc. : Poperinghe, Dickebusch, Waerschoot, Chiny, Hockai.

odibilis AUST. — Autres loc. : Poperinghe, Waerschoot, Overmeire.

Parroti KIEFF. — Autre loc. : Westcapelle.

pictipennis STAEG. — Syn. : *arcuatus* WINN., *guttularis* KIEFF. Autres loc. : Poperinghe, Knocke s/m., Hoecke, Oostkerke, Westcapelle.

pulicaris LIN. — Autres loc. : Waerschoot, Oostkerke, Hockai.

pulicaris var. *punctatus* MEIG. — Syn. : *pulicaris* var. *ocellaris* KIEFF. Autres loc. : Poperinghe, Hoecke, Roly (Pr. Namur.).

Riethi KIEFF. — (1914) *Arch. f. Hydrobiol.*, Suppl. II, p. 217. Hamme (DE WULF). Rem. : *C. Riethi* K. n'est pas synonyme de *C. nubeculosus* MG. ; son hypopyge est bien différent de celui de ce dernier.

setiger GOETGH. — (1938) *Bull. et Ann. Soc. ent. Belg.*, LXXVIII, p. 379. Hamme (DE WULF).

simulator EDW. — *British Blood-suck. flies*, London, p. 136 (1939). La Panne, Poperinghe.

vexans STAEG. — *Nat. Tidsk.*, II, p. 593 (1939). Syn. : *pungens* KIEFF., *perpungens* KIEFF. Poperinghe, Mont de l'Enclus près Renaix, Destelbergen, Heusden, Melle, Nukerke. Rem. : *C. vexans* n'est pas synonyme de *C. albicans* ; les soies insérées sur la cellule R_2 ne constituent pas un caractère distinctif entre les deux espèces.

GENRE *STILOBEZIA* KIEFF.

flavirostris WINN. — Autre loc. : Dickebusch.

gracilis HAL. — Autres loc. : Zillebeke, Dickebusch, Chiny.

GENRE *CERATOPOGON* MEIGEN

communis MEIG. — (1818) *Syst. Besch.*, I, 70, 2. Hockai (A. COLLART).

niveipennis MEIG. — Autres loc. : Heusden, Melle.

GENRE *JOHANNSEONYIA* MALLOCH

inermis KIEFF. — Autres loc. : Dickebusch, Zillebeke.

nitida MACQU. — Autres loc. : Dickebusch, Zillebeke,

setigera LOEW. — (1864) *Zeitsch. Naturwiss.*, XXIV, p. 680.
Dickebusch. Rem.: N'est pas synonyme de *J. sylvicola*, ainsi que le suggère EDWARDS. *J. setigera* se distingue de tous ses congénères par ses tibias qui portent, au bord postérieur, une rangée de soies épineuses.
sylvicola GOETGH. — (1920) *Mém. du Mus. d'Hist. nat. Belg.*, t. VIII, fasc. 3, p. 75. Virton, Houyet.

GENRE *CLINOHELEA* KIEFF.

unimaculata MACQU. — Autres loc. : Dickebusch, Chiny.

GENRE *PALPOMYIA* MEIG.

flavipes MEIG. — Autres loc. : Dickebusch, Chiny.
fulva MACQU. — Autres loc. : Dickebusch, Zillebeke.
lineata MEIG. — Autres loc. : Dickebusch, Poperinghe.
nemorivaga GOETGH. — Autre loc. : Chiny.

GENRE *SPHAEROMIAS* CURTIS

picta MEIG. — Autre loc. : Heusden.

GENRE *DICROBEZZIA* KIEFF.

venusta MEIG. — Autres loc. : Dickebusch, Zillebeke.

GENRE *BEZZIA* KIEFF.

annulipes MEIG. — Autres loc. : Schelderode, Dickebusch, Westcapelle.
bicolor MEIG. — Autre loc. : Heusden.
multiannulata STROBL. — Hoecke.
rubiginosa WINN. — Autres loc. : Zillebeke, Woumen (Etang du Blanckaert).
spinifera GOETGH. — Autres loc. : Dickebusch, Zillebeke, Etang du Blanckaert, Hoecke.
gracilis WINN. — (1852) *Lin. entom.*, VI, p. 76. Hockai.

CHIRONOMIDES

Tanypodinae

GENRE *ANATOPYNIA* JOHANNSEN
plumipes FRIES. — (1828) *Monogr. Tanypod. suec.*, 9, I. Heusden (J. VERBEKE).

varia FAB. — Autres loc. : Dickebusch, Zillebeke.

GENRE *ABLABESMYIA* JOHANNSEN

carnea MEIG. — Autres loc. : Beyne-Heusay (M. LECLERCQ).
guttipennis V. D. W. — Autre loc. : Zillebeke.
longipalpis GOETGH. — Autre loc. : Dickebusch.
melanops WIED. — Autre loc. : Onoz-Spy (R. TOLLET).
nubila FAB. — Fayenbois (M. LECLERCQ).

sulfurea GOETGH. — (1942) *Bull. Mus. Hist. nat. Belg.*, n° 46, p. 9. Destelbergen (J. VERBEKE).
Verbekei GOETGH. — (1942) *loc. cit.*, p. 8. Mont-Saint-Amand, Destelbergen, Vinderhaute.

GENRE *TANYPLUS* MEIGEN

punctipennis FAB. — Autres loc. : Bruges, Dickebusch, Zillebeke, Heyst s/m.

GENRE *PSILOTANYPLUS* KIEFFER

albinervis KIEFF. — Autre loc. : Zillebeke.

Corynoneurinae

GENRE *CORYNONEURA* WINNERTZ

lobata EDW. — (1924) *The Ent. Month. Mag.* IX, p. 186. Schelderode.
scutellata WINN. — Autres loc. : Dickebusch, Zillebeke.

Clunioninae

GENRE *CLUNIO* HALIDAY

marinus HAL. — Autres loc. : Knocke s/m., Heyst s/m.

Chironominae

GENRE *MICROTENDIPES* KIEFFER

chloris var. *lividus* MEIG. — Autre loc. : Heyst s/m.
pedellus DE G. — Autre loc. : Dickebusch.
difinis EDW. — (1929) *Trans. of the ent. Soc. of London*, p. 397, Houx (R. TOLLET).

GENRE *POLYPEDILUM* KIEFFER

- appendiculatum* GOETGH. — *Bull. et Ann. Soc. ent. Belg.*, LXXIX, p. 219 (1939). Woumen (Etang du Blanckaert).
- arundineti* GOETGH. — Autre loc. : St Jean in Eremo.
- flavoviride* GOETGH. — *Bull. et Ann. Soc. ent. Belg.*, LXXIX, p. 219 (1939). Dickebusch.
- nubeculosum* MEIG. — Autres loc. : Overmeire, Dickebusch, Heyst s/m., Visé (Liège).
- leucopus* MEIG. — Autre loc. : Forêt de Soignes : Rouge-Cloître (R. TOLLET).

GENRE *ENDOCHIRONOMUS* KIEFFER

- albibipennis* MEIG. — Autre loc. : Heyst s/m.
- dispar* MEIG. — Autres loc. : Dickebusch, Heyst s/m.
- tendens* FAB. — Autres loc. : Dickebusch, Heyst s/m.

GENRE *DEMEIJERA* KRUSEMAN

- rufipes* LIN. — Autre loc. : Overmeire.

GENRE *GLYPTOTENDIPES* KIEFFER

- barbipes* STAEG. — *Krøj. Tidsk.*, II, p. 561 (1836). Knocke s/m.
- follicola* KIEFF. — Autre loc. : Knocke s/m.
- Gripekoveni* KIEFF. — Autre loc. : Knocke s/m.
- pallens* var. *glaucus* MEIG. — Autres loc. : Dickebusch, Zillebeke, Heyst s/m., Hoecke, Assenede.
- paripes* EDW. — Autre loc. : St Jean in Eremo.
- Severini* var. *bicoloratus* GOETGH. — (1939) *Bull. et Ann. Soc. ent. Belg.*, LXXIX, p. 380. Zillebeke.

GENRE *CHIRONOMUS* MEIGEN.

- albofasciatus* STAEG. — Autre loc. : Zillebeke.
- aprilinus* MEIG. — Autre loc. : Oostacker.
- arcuatus* GOETGH. — Autres loc. : Dickebusch, Heyst s/m.
- atriforceps* GOETGH. — Autre loc. : Chiny.
- bacilliger* KIEFF. — Autres loc. : Dickebusch, Heyst s/m.
- biannulatus* STAEG. — Autre loc. : Dickebusch.
- cingulatus* MEIG. — Autre loc. : Attre (M. HUET).

dorsalis var. *atrolineatus* GOETGH. — Autre loc. : Forêt de Soignes : Rouge-Cloître (A. COLLART).

imberpipes KIEFF. — (1918) *Ent. Mitt.*, VII, p. 48. Syn. *obrepans* WALK. Mont-St Amand.

longipes STAEG. — Autre loc. : Dickebusch.

major GOETGH. — Autre loc. : La Panne.

miriforceps (KIEFF.) EDW. — (1929) *Trans. of the entom. Soc. of London*, p. 386. Autre loc. : Dickebusch. Rem. : *C. miriforceps* semble être une espèce particulière, qui n'est pas synonyme de *C. lobiger*.

monochromus v. d. W. — Syn. *claviforceps* EDW. (Ap. KRUSEMAN). Autre loc. : Dickebusch.

monotomus KIEFF. — (1924) *Bull. Soc. Hist. nat. Moselle*, XXX, p. 28. Heusden (J. VERBEKE).

nervosus STAEG. — Autres loc. : Overmeire, Dickebusch, Zillebeke.

notatus MEIG. — Autre loc. : Dickebusch.

plumosus LIN. — Autres loc. : Melle, Dickebusch, Heyst s/M.

plumosus var. *flaveolus* MEIG. — Autres loc. : Overmeire, Destelbergen, Dickebusch, Zillebeke.

plumosus var. *prasinus* MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 22, 4 (1818). Overmeire.

sordidatus KIEFF. — Autre loc. : St Jean in Eremo.

supplicans MEIG. — Autres loc. : Gand, Hamme, La Panne.

tener KIEFF. — Autres loc. : Zillebeke, Oostkerke.

triseta KIEFF. — (1916) *Arch. f. Hydrobiol. Supp.* Bd II, p. 506. Knocke s/m.

viridulus FAB. — Autres loc. : Dickebusch, Heyst s/m.

vilosus GOETGH. — Autre loc. : Dickebusch.

xenolabis KIEFF. — Autre loc. : Dickebusch.

GENRE *STICTOCHIRONOMUS* KIEFFER

- maculipennis* MEIG. — Autre loc. : Dalhem (M. LECLERCQ).

GENRE *PENTAPEDILUM* KIEFFER

- mellense* GOETGH. — (1942) *Bull. Mus. Hist. nat. Belg.*, XVIII, n° 46, p. 7. Melle (bois).

- punctipes* WIED. — Autre loc. : Dickebusch.

GENRE *MICROPSECTRA* KIEFFER
praecox MEIG. — Autres loc. : Overmeire, Heusden.

GENRE *TANYTARSUS* V. D. W.
excavatus EDW. — (1929) *Trans. of the ent. Soc. of London*, p. 416.

Knocke s/m.

Humphriesae GOETGH. — (1937) *Arch. f. Hydrobiol.*, p. 509.
Destelbergen.

Humphriesae var. *nigroviridellus* GOETGH. — Destelbergen.

Hueti GOETGH. — (1942) *Bull. Mus. Hist. nat. Belg.*, XVIII,
n° 46, p. 6. Arbre (M. HUET).

junci MEIG. — Autre loc. : Forêt de Soignes (Rouge-Cloître).

laetipes ZETT. — Autres loc. : Bellem (Etang du Kraenpoel), Dicke-
busch.

Lestagei GOETGH. — Autre loc. : Heyst s/m.

mancus WALK. — Autres loc. : St Jean in Eremo, Heyst s/m.

nigricollis GOETGH. — (1939) *Bull. et Ann. Soc. ent. Belg.*
LXXIX, p. 222. Dickebusch.

paludum GOETGH. — (1939) *Bull. et Ann. Soc. ent. Belg.*
LXXIX, p. 382. Dickebusch.

tenuis MEIG. — Autre loc. : Bellem (Etang du Kraenpoel).

Orthocladiinae

GENRE *METRIOCNEMUS* V. D. WULP

arciger KIEFF. — *Ann. Soc. scient. Brux.*, XLIV, p. 283 (1925).
Waha.

fuscipes MEIG. — Autres loc. : Waarschoot, Heyst s/m., Westcapelle ;
Beyne-Heusay (M. LECLERCQ).

impensus WALK. — Autre loc. : Overmeire.

picipes MEIG. — Autre loc. : Fayenbois (Jupille) (M. LECLERCQ).

lacteolus GOETGH. — Autre loc. : Waerschoot.

GENRE *CRICOTOPUS* VAN DER WULP

annulator GOETGH. — Autres loc. : Beyne-Heusay, Fayenbois (M.
LECLERCQ).

bicinctus MEIG. — Autres loc. : Heusden, Overmeire.

decorus GOETGH. — Autre loc. : Chiny. Rem. : *C. vierrensis* GOETGH.
est synonyme de *C. decorus* GOETGH.

festivus MEIG. — Autres loc. : Dickebusch, Heyst s/m.

lacuum EDW. — (1929) *Trans. of the ent. Soc. of London*, p. 324.
Mont-Saint-Amand (J. VERBEKE).

oscillator MEIG. — Autres loc. : Dickebusch, Chiny.

pilatris ZETT. — Autres loc. : Knocke s/M., Heyst s/m.

praecox GOETGH. — (1942) *Bull. Mus. Hist. nat. Belg.*, n° 46,
p. 11. Mont-Saint-Amand.

sylvestris FAB. — Autres loc. : Overmeire, Dickebusch, Heyst s/m.,
Westcapelle.

tibialis MEIG. — Autres loc. : St Jean in Eremo, Dickebusch, Heus-
den.

trifasciatus PANZ. — Autres loc. : Overmeire, Dickebusch ; Bellaire
(M. LECLERCQ).

GENRE *DIPLOCLADIUS* KIEFFER

cultriger KIEFF. — Autre loc. : Bois d'Héverlé près Louvain (R. TOL-
LET).

GENRE *CARDIOCLADIUS* KIEFFER

fuscus KIEFF. — Autre loc. : Beyne-Heusay (Liège) (M. LECLERCQ).

GENRE *TRICOCLADIUS* KIEFFER

lucidus STAEG. — Autres loc. : St Jean in Eremo, Overmeire, Heyst
s/m., Westcapelle.

Severini GOETGH. — *Bull. et Ann. Soc. ent. Belg.*, LXXIX, p.
229 (1939). Postel (G. SEVERIN).

GENRE *ORTHOCLADIUS* VAN DER WULP

antennalis GOETGH. — (1944) *Biolog. Jaarboek, Dodonaea*, XI,
p. 39. Melle (bois).

Collarti GOETGH. — (1941) *Bull. Mus. Hist. nat. Belg.*, XVII,
n° 67, p. 7. Hockai (Hautes Fagnes) (A. COLLART).

excerptus EDW. — Rem. : *O. divisus* KIEFF. n'est pas synonyme de
O. excerptus EDW.

femineus EDW. — (1929) *Trans. of the ent. Soc. of London*, p. 343,
Hockai (Hautes Fagnes).

- imperfectus** GOETGH. — (1944) *Biolog. Jaarboek, Dodonea*, XI, p. 43. Schelderode-lez-Gand (bois), 28.V.-1944.
- trifurcatus** GOETGH. — (1941) in LINDNER: *Tendipedidae-Orthocladiinae*, p. 70. Heusden.
- perennis** MEIG. — Autre loc.: Beyne-Heusay (M. LECLERCQ).
- Tolleti** GOETGH. — (1944) *Biolog. Jaarboek, Dodonea*, XI, p. 39. Onoz (Namur).

GENRE *PSECTROCLADIUS* KIEFFER

- pallidipes** GOETGH. — (1942) *Bull. Mus. Hist. nat. Belg.*, XVIII, n° 46, p. 12. La Panne.

GENRE *EUKIEFFERIELLA* THIENEMANN

- bicolor** ZETT. — Autre loc.: Dickebusch.

GENRE *LIMNOPHYES* EATON

- flexuellus** EDW. — Syn.: *macrocerus* GOETGH. Autres loc.: Schelderode, Knocke s/m. Rem.: *L. flexuellus* doit être rangé dans le genre *Limnophyes* et non dans le genre *Orthocladius*.
- minimus** MEIG. — Autre loc.: Overmeire.
- pusillus** EATON. — Syn.: *exiguus* GOETGH. Autres loc.: Overmeire, Waerschoot, Hockai.
- truncorum** GOETGH. — Autre loc.: Dickebusch.
- praecox** GOETGH. — (1944) *Biolog. Jaarboek, Dodonea*, XI, p. 43. Melle (bois).

GENRE *SMITTA* HOLMGREEN

- aquatilis** GOETGH. — Autre loc.: St Jean in Eremo. Rem.: *S. littoralis* est synonyme de *S. aquatilis*.
- flavescens** GOETGH. — (1942) *Bull. Mus. Hist. nat. Belg.*, XVIII, n° 46, p. 13. Heusden.
- foliata** KIEFF. — (1921) *Arch. f. Hydrob. S. B.*, II, p. 799 (sub. *Trichocladius*). Westcapelle (Fl. Occ.).
- fuscifolium** KIEFF. — *Ann. Soc. scient. Brux.*, XL, p. 291 (1925). Melle.
- nigrita** GOETGH. — (1939) *Bull. et Ann. Soc. ent. Belg.*, LXXIX, p. 223. Knocke s/m.
- superata** GOETGH. — (1939) *loc. cit.*, p. 385. Destelbergen.

Diamesinae

GENRE *DIAMESA* MEIGEN

- Bohemani** GOETGH. — in *Faune de France*, XXIII, p. 181 (1932). Beyne-Heusay (M. LECLERCQ).

GENRE *PRODIAMESA* KIEFFER

- olivacea** MEIG. — Autre loc.: Beyne-Heusay (M. LECLERCQ).

Coléoptères capturés en Belgique

PAR

PAUL J. ROELOFS

- Phyllodrepa ioptera* STEPH. ab. *melanocollis* nov. ab. — Berchem (Anvers) sur Aubépine. Cet exemplaire est très brillant, entièrement noir, à l'exception des 5 premiers articles des antennes et des pattes: testacés, ainsi que d'une tache aux épaules, se prolongeant le long de la marge élytrale: brun clair, alors que l'*ioptera* typique a le corselet et une partie de l'abdomen testacés.
- Quedius brevicornis* THOMS. Belg. nov. sp. — Berchem (Anvers).
- Tachyusa scitula* ER. Belg. nov. sp. — Berchem (Anvers).
- Atheta Aubei* BRIS. — Hoboken.
- Atheta meridionalis* MULS. Belg. nov. sp. — Santvliet.
- Atheta subglabra* SHARP. Belg. nov. sp. — Wellin.
- Atheta negra* KEY. — Tête de Flandre.
- Atheta mortuorum* THOMS. Belg. nov. sp. — Tête de Flandre.
- Atheta scapularis* SAHLB. — Arlon.
- Atheta coriaria* KR. — Hove, Spa, Wellin.
- Atheta myrmecobia* KR. — Forêt de St Hubert.
- Atheta pallidicornis* THOMS. Belg. nov. sp. — Forêt de Soignes.
- Atheta longiuscula* GRAV. — Hoboken, Spa.