

M. J. GHESQUIÈRE soumet à l'approbation des membres présents un projet de réforme de la présentation des comptes rendus de communications effectuées au cours des séances. Chaque communication, résumée par l'auteur, pourvue d'un titre très bref et signée, serait insérée sans modifications dans les comptes rendus. Ainsi présenté, le texte de ces communications serait d'une consultation plus aisée et, d'après notre collègue, ferait l'objet de mentions dans les ouvrages bibliographiques. Après un échange de vues, cette modification est adoptée par l'assemblée.

COMMUNICATIONS

L'arista de *Lophosia fasciata* MEIGEN.

Contrairement à ce que pense le D^r BEQUAERT (voir *Bull. Ann. Soc. ent. Belg.*, LXXXII, 1946, pp. 132-135, figs.), l'arista de *Lophosia fasciata* MEIGEN, *Diptera Tachinidae*, se termine en pointe effilée comme c'est généralement le cas chez les Myodaires supérieurs. Les deux spécimens exhibés — un mâle et une femelle provenant de la collection J. Villeneuve de Janti — ne laissent aucun doute à ce sujet.

L'exemplaire qui a motivé la note du D^r BEQUAERT est évidemment un spécimen anormal, d'autant plus remarquable que l'anomalie est bilatérale. On trouvera de plus amples détails sur cette monstruosité dans une note publiée sous peu.

Ajoutons que *Lophosia fasciata* MEIGEN a été signalé de Belgique dès 1900 par J.C.H. DE MEIJERE d'après une capture faite par H. VERHEGGEN à Heure, prov. de Namur. — A. COLLART.

Hyménoptères polyembryoniques de l'Afrique tropicale.

1.227 Chalcidiens Encyrtidae (*Litomastix delattrei*, sp. n.) sont éclos d'une chenille de Noctuelle récoltée à Bouaké (Côte de l'Ivoire IX-1946) par l'entomologiste français J. DELATTRE; de nombreuses ♀♀ ont déposé des œufs polyembryoniques sur les parois du bocal d'élevage. C'est le second cas de polyembryonie constaté en Afrique centrale. Le premier fut observé au Congo belge chez un Braconide du gn. *Apanteles*: 392 individus de *A. aethiopicus* WLKN. sortirent simultanément — en quelques minutes — d'une chenille de Ludiide, *Holocera angulata* AUR., pour construire leurs cocons (Kivu: Rutshuru, III-1938, GHESQUIÈRE). Des projections accompagnent cette communication. — J. GHESQUIÈRE.

Un Scélionide microptère de Belgique (*Hym. Proct.*).

Un *Plastogryon* Kieff (*P. leleupi* sp. n.) a été recueilli en plusieurs exemplaires par N. LELEUP dans une microcaverne endoxyle d'*Ulmus campestris* L. au bois de la Cambre (4 et 20-III-1947), et dans un nid endogé de Mulot, *Apodemus sylvaticus sylvaticus* L. à Boitsfort (25-II-1947). C'est la deuxième espèce signalée dans le genre *Plastogryon* (s. str.), la première a été récoltée en 1856 par FOERSTER à Aix-la-Chapelle et n'a plus été revue depuis. Des projections accompagnent cette communication. — J. GHESQUIÈRE.

Capture de *Rhizophagus grandis* GYLL.

Un exemplaire de *R. grandis* GYLL (Col. Nitidulidae) fut capturé le 12-VI-1947, dans une galerie de *Dendroctonus micans* KÜG. (Col. Scolytidae) creusée sous l'écorce d'un *Picea Sitkensis* (Épicéa de Sitka), dans l'arboretum de Vielsalm (Prov. de Luxembourg). — J. DECELLE.

— La séance est levée à 17 heures.