

Une forme rare de *Colias hyale* L.

On sait que la ♀ de *C. hyale* L. se présente sous deux fasciès : 1^o la forme typique, de couleur blanchâtre, 2^o une forme beaucoup moins fréquente, d'une coloration jaune identique à celle du ♂. Le cas inverse peut se présenter chez le ♂, mais il est extrêmement rare. Un tel spécimen (ma coll.) a en effet été capturé par M. G. COREMANS à Strijtem (Brabant) au cours de l'été 1947. La couleur de fond de ce *C. hyale* L. est d'un blanc bleuâtre qui rappelle beaucoup celle de certains ♂♂ des espèces boréales *nastes* B. et *tyche* BOEBER. Cette forme que nous considérons comme atavique est **nouvelle pour la faune belge**. FRITSCH, *Ent. Rundschau*, 30., p. 46, 1913, a décrit une ♀ sous le nom de *argentea*, notre ♂ est presque identique à cette forme et peut donc être considéré comme l'allotype de *argentea* FRITSCH. — L.-A. BERGER.

Déformation des tibias postérieurs chez une Noctuelle.

Un *Agrotis clavis* HUFNGL. capturé par nous à Linkebeek en VIII-1947, a ses deux tibias postérieurs presque symétriquement déformés. La déformation a l'aspect d'une baïonnette et peut être très exactement comparée, en petit, à la baïonnette de certains Pins qui ont subi un arrêt de croissance dû au sectionnement du bourgeon terminal. — L.-A. BERGER.

— M. A. VAN HOEGAERDEN commente une exploration entomologique qu'il a faite dans les Alpes dolomitiques du nord de l'Italie en compagnie d'un collègue français (M. G. PECOUD). Il signale diverses captures intéressantes pour la faune des Carabiques de cette région.

— M. COLLART montre de la part du R. P. LICENT une lithographie en couleur de *Eligma Narcissus* Cr. (Lépid.) qui a fait l'objet d'une communication à la séance précédente.

— M. L. FRENNET donne des précisions au sujet des captures faisant l'objet de la note publiée d'autre part.

— La séance est levée à 16 heures.

Sur quelques nouveaux *Pterostichini* d'Afrique

(Coleoptera Carabidae)

par S.-L. STRANEO (Gallarate, Italie)

DEUXIEME PARTIE

***Metaxenus sudanensis* n. sp.**

Long. 8,7 mm.; max. lat. 3,5 mm. Colore nigro, undique fortiter iridescenti, elytris immaculatis, antennis, partibus oris et pedibus brunneo-ferrugineis. Caput leve; oculis amplis, parum convexis, sulcis frontalibus fere nullis, tantum apud basim antennarum præsentibus; antennis modice elongatis, articulis 4^o et sequentibus pubescientibus. Pronotum trapezoidale, long. 1,9 mm.; lat. 3,1 mm.; antice modice excavatum, lateribus modice rotundatis, maxima latitudine parum ante basim posita; lat. anter. 2,2 mm.; lat. bas. 3 mm.; angulis anticis modice prominentibus, parum acutis, apice rotundato; angulis posticis fere rectis, apice rotundato; basi non punctata, utrinque sulco brevi longitudinali notata, ad latera fortiter marginata; canaliculo laterali angusto, poris setigeris binis prædicto, quorum postico conspicuo, apud angulos posticos posito; disco convexo, apud angulos posticos, inter sulcos basales et marginem lateralem, depressione parva prædicto; linea mediana levi, parum impressa, antice et postice parum elongata. Elytra convessa, elongato-ovalia; long. 5,3 mm.; max. lat. 3,5 mm.; humeris parum obtusis, apice minute dentato, striis profundis, crebre punctatis, interstitiis convexis, præcipue apicem versus, tertio impunctato. Subtus prœepisternis levibus, metepisternis elongatis, processu prosternali fortiter et late marginato, sternitibus, latera versus, sparse punctatis, sternite anali punctis binis utrinque prædicto (?). Pedes ut in speciebus generis *Metaxenus* instructi, tibiis intermediis tamen spinulis subtilioribus

præditis, tarsorum posticorum articulis binis basalibus extus sulcatis; onychio subtus setis binis subtilibus prædicto.

Habitat: Sudan, Lob, 1 ♀.

Le pronotum de cette espèce s'adapte très bien à la base des élytres, de sorte que le rebord basilaire et les angles huméraux sont couverts par la base du pronotum.

Les élytres sans taches, la couleur très noire et les proportions sont suffisants pour distinguer cette forme nouvelle de toutes les autres déjà décrites.

Metaxenus ellipticus n. sp.

Long. 8,7 mm.; max. lat. 3,8 mm. Colore brunneo-piceo, nitido, fortiter iridescenti, margine laterali et angulis posticis pronoti rubro-ferrugineis per transparentiam, pedibus, ore, antennis, sterno et abdomen ferrugineis. Caput modicum, leve, oculis amplis, modice convexis, temporibus brevissimis, sed distinctis, sulcis frontalibus vix impressis, tantum apud suturam clypealem; antennis subtilibus, modice elongatis, vix basim pronoti superantibus. Pronotum subtrapezoidale, convexum, long. 2,2 mm.; max. lat. 3,6 mm.; antice perparum excavatum; lateribus postice parum excavatum; lateribus, basim versus fere parallelis; lat. anter. 2 mm., lat. bas. 3,6 mm.; angulis anticis obtusis, rotundatis, non prominentibus; angulis posticis fere rectis, apice vix rotundato; margine laterali angusto, linearis, poris setigeris binis regularibus prædicto, quorum postico ab angulo postico sat amoto; basi utrinque sulco linearis brevi, parum profundo, punctato, prædicta, punctis paucis subtilibus et evanescentibus apud angulos basales instructa; disco convexo, etiam inter sulcos et marginem lateralem, linea media fere indistincta. Elytra ovalia, minime post humeros dilatata; dein lateribus usque ad 3/4 longitudinis parum convergentibus, inde sat abrupte angustatis; humeris fere rectis non dentatis, margine basali recto; striis sat profundis, crebre sed subtiliter crenulatis; interstitiis in disco sat convexis, valde apicem versus. Subtus proepisternis levibus, prosterno fortiter marginato ex coxis usque ad processum intercoxalem; metepisternis valde elongatis, sternitibus leviter depressis secundum basim, ad latera punctis paucis evanescentibus notatis; sternite anali (♀) punctis binis utrinque instructo. Pedes ut in gen. *Metaxenus* instructi, tarsis posticis articulo 1^o et 2^o extus sulcatis, onychio subtus setis binis subtilibus prædicto.

Habitat: Côte d'Ivoire, Dimbroko; 1 ♀.

C'est encore une espèce dépourvue de taches jaunes aux élytres. Par sa forme parfaitement elliptique, elle se rapproche de *M. latithorax* STRANEO, qui est autrement coloré.

Metaxenus Ugandae n. sp.

Long. 8,1 mm.; max. lat. 3,4 mm. Colore brunneo piceo, fortiter iridescenti, margine laterali pronoti et epipleuris rubro-ferrugineis, ore, antennis, palpis et pedibus ferrugineis; sterno et abdomen ferrugineis. Caput sat robustum, leve, oculis amplis, sat convexis, temporibus et sulcis frontalibus fere nullis, antennis subtilibus et sat elongatis, basim pronoti articulis duobus superantibus. Pronotum transversum, modice convexum, long. 1,9 mm.; max. lat. 3,1 mm.; lateribus modice rotundatis, antice sat convergentibus (lat. anter. 1,8 mm.), prostice parum convergentibus (lat. bas. 2,8 mm.), maxima latitudine parum ante basim posita; angulis anticis mediocriter prominentibus, sat late rotundatis; angulis posticis obtusis, apice rotundato; basi non punctata, undique anguste marginata, utrinque sulco linearis angusto, sat brevi, punctato, prædicta; margine laterali angusto, poris setigeris binis regularibus instructa, quorum postico non in margine laterali posito; disco parum convexo, linea media subtili, antice evanescens; portione disci inter sulcos basales et marginem lateralem late depresso. Elytra parum convessa, long. 4,9 mm., max. lat. 3,4 mm.; humeris fere rectis, apice rotundato, striis profundis, subtiliter sed crebre punctatis, interstitiis modice convexis. Subtus proepisternis apud coxas levissime, fere indistincte punctatis; metepisternis angustis, elongatis, subtiliter punctatis; processu prosternali fortiter marginato; sternitibus levibus, sternite anali (♂) puncto setigero singulo, a margine sat amoto, utrinque prædicto. Pedes ut in gen. *Metaxenus* instructi, tarsis posticis articulo 1^o et 2^o extus sulcatis; onychio subtus setis binis subtilibus prædicto.

Habitat: Uganda, Entebbe, 1 ♂.

Chez cette espèce, qui est moins luisante que les précédentes, les élytres sont également sans taches jaunes; la base du pronotum ne s'adapte pas parfaitement à celle des élytres, de sorte que la forme est un peu moins elliptique. La partie du pronotum comprise entre les sillons basilaires et le rebord latéral est assez

largement déprimée ; le fond de l'impression est constitué par une ligne oblique, qui rejoint le rebord latéral à peu près vers la moitié de sa longueur.

Celioschesis angolana n. sp.

Long. 9,6 mm. ; max. lat. 4,4 mm. Colore brunneo-nigro nitidissimo, lateribus pronoti ferrugineis per transparentiam ; pronoto et elytris iridescentibus, his præditis macula flava anteapicali, oblonga, interstitia 2 et 3 occupanti ; antennis, ore et pedibus rubro-ferrugineis. Caput robustum, sat curtum, oculis convexis, modice amplis, carina supraoculari fortiter explicata ; temporibus nullis ; sulcis frontalibus brevibus, profundis, in fundo leviter rugosis, fortiter divergentibus, primum porum supraocularem versus ; antennis sat robustis, elongatis, basim pronoti articulo ultimo superantibus. Pronotum transversum, amplum, long. 2,4 mm., max. lat. 3,6 mm., antice modice excavatum, omnino marginatum, lateribus fortiter et regulariter rotundatis, maxima latitudine paullo post medianam longitudinem posita ; angulis anticis a collo sat amotis, rotundatis, non prominentibus ; angulis posticis obtusis, apice parce rotundato ; lat. anter. 2,3 mm. ; lat. bas. 3,1 mm. ; basi utrinque notata impressione evanescenti, fere nulla ; anguste marginata ex angulis basalibus usque ante scutellum ; margine laterali angusto, sed sat spisso, poris setigeris binis prædicto, antico a margine fortiter amoto, postico in margine positio. Elytra subparallelo-ovalia, long. 5,9 mm., max. lat. 4,3 mm. ; humeris obtusis, apice tamen minute dentato ; margine basali fere recto, angulos versus modice curvato ; striis profundis, levibus, intersticiis convexis 3° poro parvo prædicto, post medianam longitudinem positio. Subitus prosterno longitudinaliter non sulcato, processu prosternali marginato, metepisternis longis, antice, intus et extus modice sulcatis ; sternitibus ad latera sat crebre, sed parum profunditer, punctatis ; sternite anali levi, ad latera sat depresso, punctis conspicuis binis utrinque prædicto (?), quorum mediis a margine sat amotis. Pedes ut in gen. *Celioschesis* instructi, sed tibiis posticis distincte curvatis, et spinulis prædictis.

Habitat : Angola, Congulu (1 ♀).

Je possédais cette espèce sous le nom de *distigma* TSCHIT., mais la description de cette dernière ne lui convient pas. Elle diffère de toutes les autres formes du genre par le fort rebord du côté

antérieur du pronotum, qui est entièrement marginé ; ce rebord, qui est très étroit près des angles, s'élargit graduellement, en rejoignant sa plus grande largeur au milieu.

Celioschesis nairobiana n. sp.

Long. 8,8 mm. ; max. lat. 3,8 mm. Colore brunneo-piceo, modice nitido, perparum, iridescenti, margine apicali elytrorum ferrugineo et interstitio secundo elytrorum, ante apicem, macula parva, parum notata, prædicto ; antennis, palpis et pedibus ferrugineis. Caput modicum, oculis sat convexis, temporibus fere nullis, sulcis frontalibus brevibus, sed profundis, fere parallelis ; antennis longis, basim pronoti superantibus articulis duobus. Pronotum transversum, valde convexum, long. 1,9 mm. ; max. lat. 3,1 mm. ; lateribus regulariter et sat fortiter rotundatis, lat. anter. 1,6 mm., lat. bas. 2,6 mm. ; antice fere truncatum, angulis anticis obtusis, rotundatis, non prominentibus, angulis posticis obtusis, apice rotundato ; basi utrinque prædicta sulco linearis sat profundo, angusto ; margine laterali angusto, canaliculo laterali antice angusto, postice valde dilatato ; basi non punctata, fere recta, ex angulis usque post sulcos fortiter, sed angustissime, marginata ; disco convexo, linea media subtili, tantum inter sulcos dilatata et profunda. Elytra subparallelia, valde convexa, long. 5,4 mm. ; max. lat. 3,8 mm. ; humeris apice bene determinato, nec dentato ; lateribus, post humeros, fere parallelis per 3/4 longitudinis ; striis modice profundis, levibus, non punctatis, intersticiis parum convexis, tertio poro parvo post diuidiam longitudinem prædicto. Prosternum leve, processu ad apicem margine rudimentali prædicto ; metepisternis longis, modice rugosis ; sternitibus primis ad latera punctatis, sternite anali punctis binis (?) utrinque prædicto. Pedes regulares, articulo basali tarsorum posticorum extus sat leviter sulcato ; onychio subtus glabro.

Habitat : Kenya, Nairobi, 1 ♀.

Cette nouvelle espèce est assez voisine de *distigma* TSCHIT., mais la forme du pronotum est assez différente ; chez *distigma*, ce dernier n'est presque pas rétréci vers l'arrière et la gouttière latérale est étroite, tandis que chez *nairobianus* les côtés du pronotum sont très nettement rétrécis vers la base et la gouttière s'élargit fortement en arrière.

Celioschesis bicolor n. sp.

Long. 6 mm., max. lat. 2,7 mm.; capite nigro, partis buccalibus rubro-ferrugineis, antennis et palpis clarioribus; pronoto ferrugineo, margine antico obscuriore, fere piceo; elytra nigra, margine basali rufescente; sterno ferrugineo; pedibus omnino ferrugineis. Caput sat robustum, triangulare, curtum, oculis amplis et fortiter convexis, temporibus fere nullis, sulcis, frontalibus fere rectis, divergentibus, brevibus, antennis modice elongatis, basim pronoti superantibus articulo ultimo. Pronotum transversum, long. 1,4 mm.; max. lat. 2,3 mm.; margine antico ad perparum excavato, ad latera marginato; lateribus modice, sed regulariter rotundatis usque ante basim, ubi latera fiunt recte convergentia; lat. anter. 1,5 mm.; lat. bas. 2,1 mm.; angulis anticis non prominentibus, apice rotundato, sed bene determinato, a collo sat amoto; angulis posticis parum obtusis, apice vix rotundato; basi utrinque impressione subtili, linearis praedita, inter sulcos cum vestigio evanescenti punctorum superficialium; margine laterali angustissimo, poris binis regularibus praedito, quorum postico in vertice basali positio; disco modice convexo, linea media sat elongata, sed modice impressa; portione inter sulcos et marginem lateralem convexo, leviter ruguloso et subpunctato. Elytra convexa, subparallelia, long. 3,5 mm.; max. lat. 2,7 mm.; lateribus modice rotundatis post humeros, dein fere parallelis usque post dimidiad longitudinem; humeris obtusis, rotundatis, margine basali fere indistincte crenulatis, interstitiis valde convexis, tertio puncto parvo prope dimidiad longitudinem praedito. Prosternum leve, processu non marginato, metepisternis longis, sternitibus primis ad latera sparse punctatis, cæteris levibus; sternite anali, poris setigeris binis utrinque notato (?).

Habitat: Entebbe, Uganda.

La couleur de cette nouvelle espèce suffit à la distinguer de toutes les autres du genre *Celioschesis*.

Celioschesis ugandana n. sp.

Long. 9 mm.; max. lat. 3,8 mm. Colore brunneo-piceo, parum iridescente, lateribus pronoti late rubrescentibus per transparemiam, ore et epipleuris brunneo-rubrescentibus, antennis, palpis et pedibus ferrugineis, apice elytorum brunnescente. Caput sat robustum, oculis amplis, fortiter convexis, temporibus nullis, sulcis frontalibus brevibus sed profundis, antennis longis, basim

pronoti distincte superantibus. Fronotum transversum, long. 2 mm., lat. 3,2 mm.; margine antico truncato, non excavato, omnino marginato; lateribus regulariter rotundatis usque ad basim, maxima latitudine parum post dimidiad longitudinem posita; lat. anter. 2,1 mm.; lat. bas. 3 mm.; angulis anticis non prominentibus, rotundatis, angulis posticis obtusis, apice dentato; basi non punctata, ad latera anguste marginata, utrinque sulco subtili, modice impresso, subtiliter punctato, poris binis regularibus praedito, quorum postico in angulo positio; disco modice convexo, portione inter sulcos et marginem lateralem cum vestigio impressionis oblique. Elytra ovalia, long. 5,2 mm.; lat. 3,8 mm.; post dimidiad longitudinem, dein convergentibus ad apicem; humeris obtusis, apice minute sed distincte dentato; margine basali modice curvato humeros versus; striis profundis, fere levibus, interstitiis convexis, tertio poro parvo post dimidiad longitudinem praedito. Subtus parum iridescens, prosterno levi, processu prosternali depresso, non distincte marginato; metepisternis longis, sternitibus ad latera rugosis et modice, sed crebre punctatis; sternite anali (?) punctis setigeris binis praedito. Pedes regulares generis *Celioschesis*, sed tibiis intermediis minus spinosis quam in cæteris speciebus; tarsorum posticorum articulo basali modice, sed distincte carinato.

Habitat: Entebbe, Uganda.

Cette nouvelle espèce est facilement reconnaissable par l'absence de taches jaunes sur les élytres; les angles basilaires et les épaules légèrement, mais bien distinctement dentés; la saillie prosternale non rebordée, etc. Aucune autre espèce ne présente ces caractères.

Celioschesis Basilewskyi n. sp.

Long. 5,4 mm.; max. lat. 2,4 mm. Colore capitis brunneo-piceo, ore et antennis clarioribus; pronoti brunneo-rufescenti obscuro, margine laterali ferrugineo; elytrorum nigro-piceo cum maculis binis ut in fig. 1 instructis; subtus colore brunneo-ferrugineo, pedibus ferrugineis. Caput regulare, oculis amplis et mediocriter convexis; temporibus nullis; sulcis frontalibus sat brevibus, fere parallelis, modice impressis; antennis vix basim pronoti superantibus. Pronotum transversum, long. 0,8 mm.; max. lat. 1,6 mm., margine antico parum excavato, lateribus regulariter rotundatis usque ad basim; angulis anticis obtusis, parum prominentibus,

apice rotundato; angulis posticis obtusis, apice minute dentato; lat. anter. 1,4 mm.; lat. bas. 1,7 mm.; canaliculo laterali antice angusto, basim versus fortiter dilatato; basi sat crebre punctata, sicut etiam canaliculo laterali, et utrinque impressione sulciformi curta, basim non attingente, praedita; disco parum convexo, linea media subtili et curta. Elytra modice convexa, ovalia, elongata, long. 3,1 mm.; max. lat. 2,4 mm.; humeris obtusis, apice bene determinato, sed non dentato; margine basali recto, humeros versus non curvato; lateribus post humeros modice rotundatis, maxima latitudine elytrorum ad $1/3$ longitudinis posita; striis profundis, subtilissime, fere indistincte, crenulatis; intersticiis in disco parum, apicem versus valde convexis tertio poro, ad secundam striam et post dimidiam longitudinem posito, praedito. Subtus levis, praeter latera metasterni et primorum sternitum, plus minusve punctata; prosterno medio parum explanato, non sulcato, processu prosternali margine apicali rudimentali praedito; sternite anali ♂ puncto singulo utrinque praedito. Pedes regulares, articulo basali tarsorum posticorum extus distincte carinato.

Habitat: Gabon, Lambarené (*holotypus*, in coll. STRANEO); Cameroun (*paratypus*, in coll. BASILEWSKY).

Cette petite espèce se rapproche seulement de *C. maculata* Straneo, mais en diffère par la disposition différente des taches des élytres, par la forme plus ovale, par la base pourvue d'une ponctuation serrée, qui couvre aussi la gouttière latérale du pronotum. Dédiée à M. P. BASILEWSKY.

Basilewskya gen. nov.

Caput glabrum, clypeo bisetoso; setis supraorbitalibus binis, quarum postica valde amota a loco regulari, verticem capitum versus; antennis filiformibus; articulis 4^o et sequentibus pubescensibus, articulo primo longitudine tertio subæquali; labro sex-setoso; mandibulis elongatis, apice sat acuto et parum curvato, in scrobis puncto nullo praeditis; ligula bisetosa, apice libero, paraglossis angustis et brevibus, membranaceis; maxillis modice arcuatis et parum acuminatis; intus dentibus paucis praeditis: palpis labialibus regularibus, articulo pœnultimo bisetoso, ultimo subcylindrico et subtruncato; maxillaribus valde elongatis, articulo ultimo elongato et acuto; dente medio menti simplici, modice producto (fig. 2). Pronotum cordiforme, seta antica tantum in mar-

gine laterali praeditum, basi utrinque impressione singula praedito. Elytra basi marginata, 9-striata, striola scutellari non elongata, sed profunde impressa, inter suturam et primam striam posita, secunda interstria ad basim poro setigerō praedita; scutello parvo; interstitio tertio impunctato. Epipleura cruciata. Series umbilicata media valde rarefacta. Sternites non sulcati. Pedes subtile et regulares, tarsis elongatis et subtilibus, articulo basali posticorum non irregulariter elongato, articulis tribus basalibus maris perparum dilatatis, subtus levissime squamułosis; onychio tarsorum omnium subtus glabro. Aedeagus maris fere symmetricus, non inversus, leviter ad dexteram effundens, stylo dextero conchiformi, laeve subtili.

Genotypus: *Basilewskya trachelocyphoides* STRANEO.




FIG. 1. — Disposition des taches jaunes élytrales chez *Celioschesis Basilewskyi* n. sp.

FIG. 2. — Labium de *Basilewskya trachelocyphoides* n. gen., n. sp.

FIG. 3. — *Basilewskya trachelocyphoides* n. gen., n. sp.

Je dois créer ce genre nouveau pour une espèce appartenant aux *Pterostichini s. str.*, mais dont la dent labiale non échancrée, la forme des maxilles, la position de la soie supraorbitale postérieure et surtout la structure des palpes, rappelant ceux des *Caelostomini*, ne me permettent de ranger dans aucun des genres déjà connus. Je le dédie à M. P. BASILEWSKY.

Basilewskya trachelocypoides n. sp. (fig. 3).

Long. 7,2 mm.; max. lat. 2,7 mm. Colore nigro profundo, modice nitido, pedibus, antennis et palpis rubro-ferrugineis. Caput punctis conspicuis praedito, sulcis frontalibus brevibus, sed valde profundis et latis; antennis subtilibus et elongatis, basim pronoti distincte superantibus. Fronotum cordiforme, angulis posticis rectis, apicie acuto, basi non punctata nec marginata; linea media fortiter impressa. Elytra valde convexa, ovalia, interstitiis profundis, non punctatis, interstitio tertio impunctato. Prosternum antice leviter sulcatum, leve, processu intercoxali obtuso, non depresso nec marginato; metepisterna parva, subquadrata, non punctata; sternites primi ad latera punctis paucissimis praediti, cæteri leves; sternites analis maris simplex, puncto setigero singulo utrinque instructo. Pedes ut in descriptione generis; tibiis extus non spinulosis. Microsculptura elytrorum isodiametrica, bene distincta (35 x).

Habitat: S. Africa, Cape Town (J. Frey, 1932), 1 ex. ♂.

J'ajoute à cette brève description une figure reproduisant cette espèce nouvelle. On pourra juger ainsi qu'elle rappelle, par sa forme les *Trachelocyphus*, qui appartiennent aux *Abacetini*. L'exemplaire unique qui m'a servi pour la description est malheureusement en assez mauvais état. La soie pronotale postérieure, figurée sur ce dessin, doit en réalité être supprimée.

NOTES

SUR LA

Faune des Hautes-Fagnes en Belgique

XVI

Coleoptera Pythidae

par N. LELEUP

Grâce à de nombreuses prospections, l'étude de la faune entomologique des Hautes-Fagnes de Belgique commence à être bien connue. Les Lépidoptères de ces régions ont notamment été l'objet d'une sollicitude toute particulière et les Coléoptères, bien que souvent plus difficilement dépistables, ont toutefois été relativement bien recherchés.

C'est à M. A. COLLART que revient l'honneur d'avoir imaginé et appliqué le meilleur moyen de mettre en évidence le caractère nordique — voire boréo-alpin — d'une partie de la faune du « Haut-Plateau » en y pratiquant des chasses d'hiver, par temps de neige avec une température voisine de 0° cent. Ainsi qu'on le sait, cette initiative a été couronnée de succès et plusieurs Insectes nettement cryophiles sont venus allonger la liste des Arthropodes de la Faune belge.

Au cours d'une exploration effectuée en Hautes Fagnes pour le compte du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique et en suivant les conseils de M. COLLART, nous avons eu l'occasion de récolter à Hockai, sur la rive gauche de la Hoëgne et 500 m. en aval du Pont du Centenaire (Altitude : 500 m.), 1 ex. de *Sphaeristes* (*Rabocerus*) *Gabrielli* GERK. (dét. E. DERENNE). Ce Coléoptère courait sur la neige par une température de +4° cent.

L'espèce n'était connue que du Nord de l'Europe: Finlande, Suède, Allemagne (Mecklembourg) et Irlande.

Sa présence dans nos Hautes Fagnes souligne une fois de plus les conditions climatériques de cette région.

Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique.