


Un *Catops* nouveau pour la faune de Belgique

par F. CATELIN.

Parmi de nombreux *Catops fuliginosus* ER. capturés dans la Forêt de Soignes (Espinette Centrale) le 9-9-1946, j'ai eu le bonheur de découvrir 1 ♂ de la très intéressante sous-espèce *inermis* JEANN.



1. *Catops fuliginosus* ER. s. str., tibia antérieur du ♂. — 2. *Catops fuliginosus* ER. subsp. *inermis* JEANN., tibia antérieur du ♂. — 3. *Catops fuliginosus* ER. s. str. et subsp. *inermis* JEANN., pénis.

Le *Catops fuliginosus* ER. subsp. *inermis* JEANN. se distingue du type par la forme des tibias antérieurs du ♂.

Chez *Catops fuliginosus* ER. s. str. les tibias antérieurs ♂ sont plus épais et présentent du côté ventral une tubérosité très apparente ; chez la sous-espèce *inermis* JEANN. les tibias antérieurs sont plus minces et la tubérosité ventrale est obsolète (voir croquis 1 et 2).

Chez les deux formes le pénis est absolument identique (voir croquis 3). Tandis que le *Catops fuliginosus* ER. s. str. est répandu dans toute l'Europe occidentale et centrale, la sous-espèce *inermis* JEANN. n'est citée que d'Europe orientale.

Roumanie : Transylvanie, Câmpeni, monts Bihar (JEANNEL) ; Scârisoara : monts Bihar (JEANNEL) ; Brasov : Alpes de Transylvanie (DEUBEL) Banat : Bâile Erculane (WINGELMÜLLER ; JEANNEL).