

Bibliothèque. — *Dons* : Nous avons reçu l'ensemble des travaux entomologiques édités par l'Institut des Parcs nationaux du Congo belge.

M. CORPORAAL, d'autre part, nous a adressé 10 *separata*. (*Remerciements*.)

Travaux pour les Bulletin et Annales. — Il a été décidé de procéder à la publication d'un article de M. M. LECLERCQ : Les Oestrides du Musée zoologique de Strasbourg.

Divers. — M. R. VIEUJANT présente à l'assemblée des exemplaires des « Handbooks for the identification of British Insects » édités par les soins de la *Royal Entomological Society of London*. Divers fascicules ont paru jusqu'à présent : *Dermoptera and Orthoptera* by W.D. HINCKS ; *Odonata* by F.C. FRASER et *Diptera*. (Introduction and Key to Families) by H. OLDROYD. Les membres sont unanimes à reconnaître le grand intérêt pratique de ces publications.

COMMUNICATIONS

Capture de *Aulonium trisulcum* FOURCR.

Un exemplaire de l'espèce *Aulonium trisulcum* FOURCR. (Col. *Colydiidae*), prédateur des Ipides de l'Orme, a été capturé à la lumière, à Bruxelles. Cet Insecte n'a été récolté en grand nombre qu'une seule fois par M. DERENNE, sous l'écorce d'Ormes abattus, au bord de la route de Mont-St-Jean à Malines.

Cet Insecte a toujours été considéré comme rare ; la disparition progressive des Ormes le long de nos grandes routes ne peut que confirmer cette réputation.

Cet exemplaire a été exposé dans les collections de l'Institut royal des Sciences naturelles.

F. CATELIN.

Invasion des habitations par un Diptère Trypétide : *Phagocarpus permundus* (HARRIS).

Phagocarpus permundus (HARRIS), seule espèce du genre en Europe, est un Trypétide qui se reconnaît facilement grâce à un dessin alaire des plus caractéristique (1) et qui comprend notam-

(1) Voir HENDEL, F., 1927, *Trypetidae* in LINDNER : Die Fliegen der palaearktischen Region (Stuttgart), pl. V, fig. 4, et SÉGUY, E., 1934, Diptères Brachycères in Faune de France, 28, *Muscidae acalypterae* et *Scatophagidae* (Paris), pl. VIII, fig. 92.

ment, vers l'apex de l'aile, une étroite bande brune courbée en forme de fer à cheval.

Phytophage à l'état larvaire, ce Trypétide a été obtenu de fruits du *Crataegus oxyacantha* L. et du *Cotoneaster tomentosus* LINDL. D'après BOIE, la larve vivrait également dans les fruits du *Sorbus aucuparia* L.

E. SÉGUY considère l'Insecte comme assez rare. En fait, les collections de l'Institut royal des Sciences naturelles ne renfermaient qu'un seul spécimen de ce Diptère, recueilli en juillet 1907 à Groenendael, par le D^r A. GUILLIAUME, jusqu'au jour où une douzaine d'exemplaires vinrent enrichir les collections nationales. Ces *Phagocarpus* provenaient de Boitsfort et avaient été prélevés en juillet 1947, parmi un grand nombre d'individus ayant envahi l'habitation de M. COSYNS ; ils avaient été déterminés par M. LECLERCQ. En août de la présente année, M. le Baron de ROSEN m'apporta une série de ce Diptère dont des milliers d'individus s'étaient rassemblés dans certaines pièces de son château situé aux environs de Tervueren (Quatre-Bras) ; enfin, mon ami J. VRYNAGH m'a soumis des *Ph. permundus* capturés à Barvaux, le 7 août dernier, dans une habitation où ils s'étaient fait remarquer par leur abondance. C'est donc parmi des centaines et même des milliers d'individus que furent recueillis les spécimens remis à l'Institut.

J'ai fouillé vainement la littérature entomologique pour trouver mention de ce phénomène d'autant plus curieux, que les essaims de *Phagocarpus* paraissent uniquement composés de mâles.

A. COLLART.

Hippobosca equina L. (Dipt. Hippoboscidae), parasite de l'homme.

Le 8-VIII-1949, j'ai vu à Castel Gandolfo (Italie) deux chevaux de montagne parasités par plus d'une centaine de *Hippobosca equina* L. (DIPT. HIPPOBOSCIDAE). Ceux-ci étaient fixés, suivant leur habitude, dans la région périanale et sous la queue. J'en ai récolté quinze exemplaires. Rentré à l'hôtel, le soir, vers 21 heures, l'un des *Hippobosca equina* s'échappa du tube. Quelques instants après, il m'attaqua en pleine figure, puis il disparut. Je le retrouvai cinq minutes plus tard dans la pièce voisine sur le dos d'un ami qui était torse nu.