

J'ai relevé la présence, dans la collection de l'Institut royal des Sciences naturelles, de quatre autres exemplaires, à savoir :

1) Eschenbeek — 3-VIII-1881. (Collection JACOBS) (spécimen signalé par JACOBS - *Ann. Soc. Entom. Belg.*, XLV, 1901, p. 325). Je note que la capture a été effectuée en septembre, mais l'étiquette qui figure au spécimen de la coll. JACOBS porte la date du 3 août.

2) Namur — 19-VIII-1896 (GÉRARD). Collection E. CANDÈZE.

3) Groenendael — VIII-1903 (A. GUILLIAUME).

4) Uccle — 14-VII-1918 (VAN DRISCHE).

Il est très curieux que la variété n'ait été constatée jusqu'ici que chez les ♀♀.

L. MARNEF.

Tenthredinidae nouvelles pour la faune belge.

Un exemplaire ♀ de *Messa glaucopis* KONOW a été capturé à Woluwe-St-Lambert (Bruxelles), le 27 mai 1948. Cette espèce rare avait été citée jusqu'à présent de France (d'après KONOW), d'Allemagne et de Croatie.

R. VIEUJANT.

— La séance est levée à 16 h. 50.

Les "Mouches de fumées,, aux environs de Bruxelles :

(Dipt. : Clythiidae)

Microsania pectinipennis MEIGEN et *Stigmatalis* ZETTERSTEDT

par E. JANSSENS.

Notre collègue A. COLLART a déjà attiré plus d'une fois l'attention des entomologistes sur l'étrange idiosyncrasie du genre *Microsania* ZETT. Il a lui-même contribué plus que quiconque à l'étude de ces curieux Diptères qui n'apparaissent que dans la fumée des feux d'herbes ou de bois. Nous ne referons pas l'histoire de cette question (1), mais nous rappellerons que le genre fut trouvé pour la première fois en Belgique sur le plateau des Hautes-Fagnes par SÉVERIN en 1921, avec détermination spécifique : *M. stigmatalis* ZETT. A. COLLART établissait bientôt que les insectes récoltés par SÉVERIN appartenaient en réalité à trois espèces : *stigmatalis* ZETT., *pectinipennis* MEIG. et *pallipes* MEIG. Depuis cette découverte, ces insectes réputés rarissimes étaient retrouvés par SÉVERIN en 1922 à Postel (Campine), par COLLART en 1942 à La Reid et en 1946 près de la Montagne Saint-Pierre; enfin le D^r GOETGHEBUER en capturait à Knocke en 1947.

Toutes ces captures étaient faites dans les mêmes conditions, soit dans la fumée des feux de bois ou d'herbes allumés dans la campagne. Dans la plupart des cas, les Diptères abondaient, dansant dans la fumée. Parfois ils s'y aventuraient isolément ou en petit nombre.

(1) A. COLLART. *Bulletin et Annales Soc. Ent. Bel.*, LXXIV, 1934, pp. 377-384, v. autres travaux, repris dans une bibliographie complète de E.-A. KESSEL, *The Wasmann Collector*, VII, 1947, pp. 23-30.