

pèce *Perilitus falciger* RUTHE (Hym. Braconidae), inféodée à *T. tenebricosa* en Angleterre. M. G.E.J. NIXON, du British Museum, a bien voulu nous préciser la détermination spécifique de ce *Perilitus*. Nous rappelons qu'en France une forme un peu différente *Perilitus sicheli* GIARD dont nous avons étudié par ailleurs les modalités de développement (P. JOLIVET, *Miscell. Ent.*, XLII, pp. 8-11, 1945; *ibid.*, XLIII, pp. 33-35, 1946; *ibid.*, XLV, pp. 24-26, 1948) parasite les *Timarcha* indigènes (*T. tenebricosa* F., *T. goettingensis* L., *T. normanna* REICHE, etc.). *Perilitus falciger* RUTHE, qui s'attaque d'ailleurs également à *T. goettingensis*, est nouveau pour la faune belge.

P. JOLIVET.

Syrphidae de Belgique. II.

- 1) *Triglyphus primus* LOEW, sur les ombellifères au mois d'août : Melle, 16-VIII-1942 (1 ♂), 20-VIII-1944 (2 ♀♀), 27-VIII-1945 (1 ♀); Anvers (rive gauche), 4-VIII-1944 (1 ♀); Mont-St-Amand, 18-VIII-1942 (1 ♂), 15-VIII-1947 (1 ♂, 1 ♀).
- 2) *Pelecocera tricincta* MEIGEN (BELG. NOV. SP.): Geel (Campine), 15-VIII-1941 (2 ♀♀), en fauchant sur la bruyère.
- 3) *Chamaesyrphus lusitanicus* MIK. (BELG. NOV. SP.): Geel, 15-VIII-1941 (1 ♂), ensemble avec l'espèce précédente.
- 4) *Brachyopa conica* PANZER : Eupen (val. Vesdre), 15-V-1949 (1 ♀) sur fleur de Crataegus.
- 5) *Brachyopa scutellaris* ROBINEAU-DESVOIDY : Heusden, 29-IV-1943 (1 ♀); Melle, 10-V-1950 (2 ♂♂); Zutendaal, 16-V-1949 (1 ♀), sur ombellifère.
- 6) *Brachyopa bicolor* FALLEN : Mont-St-Amand, 26-IV-1943 1 ♂; Melle, 9-V-1943 (1 ♂).
- 7) *Eriozona syrphoides* FALLEN : Melle (bois), 6-VIII-1940 (1 ♂).
- 8) *Xanthogramma citrofasciatum* DEG. : Leupegem, 17-V-1942 (1 ♂, 1 ♀); Flobecq (bois), 25-V-1942 (1 ♂); Overmeire, 14-V-1950 (1 ♀); Overijse, 23-V-1950 (1 ♀).
- 9) *Baccha obscuripennis* MEIGEN : Feschaux (Nam.), 7-VIII-1942 (1 ♂).
- 10) *Eristalis alpina* PANZER (BELG. NOV. SP.), Oud-Tunhout, 1-VIII-1943 (1 ♀); Diepenbeek, 13-VI-1912 (1 ♀); rare en Campine.
- 11) *Eristalis vitripennis* STROBL (LUNDBECK) (BELG. NOV. SP.):

Destelbergen (Bergen Kruis), 22-V-1950 (1 ♀); Overmeire, 30-V-1950 (1 ♀); cette espèce ainsi que la précédente ont été souvent confondues avec la suivante.

- 12) *Eristalis rupium* FABRICIUS : Mellier (Lux.), 20-VII-1943 (1 ♀).
- 13) *Eristalis jugorum* EGGER : Feschaux (Nam.), 7-VIII-1942 (1 ♂), 17-VI-1943 (3 ♀♀); Champlon (Ft de Freyr), 23-VIII-1950 (5 ♀♀).
- 14) *Brachypalpus bimaculatus* MACQUART : St-Antoine (Anvers), 30-V-1943 (1 ♀).
- 15) *Criorrhina floccosa* MEIGEN : Melle (bois), 19-V-1950 (1 ♂), 26-V-1950 (1 ♀).
- 16) *Criorrhina asilica* FALLEN : Melle (bois), 10-V-1950 (1 ♂), 26-V-1950 (1 ♀).
- 17) *Chrysochlamis ruficornis* F. : Feschaux, 16-VI-1943 (2 ♂♂).
- 18) *Temnostoma vespiforme* L. : Feschaux, 18-VI-1943 (1 ♂, 1 ♀).
- 19) *Calliprobola speciosa* ROSSI : Feschaux, 18-VI-1943 (1 ♀).
- 20) *Eurinomyia transfuga* LINNÉ : Heusden, 10-VIII-1946 (1 ♀); Melle, 15-VI-1945 (1 ♀); Overmeire, 30-VIII-1942 (1 ♀); Geel, 15-VIII-1941 (2 ♀♀).

J. VERBEKE.

Dioryctria mutata FUCHS, nuisible au Pin silvestre.

Attaque les tiges et les bourgeons, plus rarement aussi les cônes de *Larix*, *Picea excelsa* et divers *Pinus*. Parfois assez abondant sur *Pinus silvestris* où elle provoque des dégâts très semblables à ceux de *Evetria buoliana* SCHIFF., mais caractérisés par un faible écoulement de résine et un entassement d'excréments. La chenille striée longitudinalement de brun et de gris, est moitié adulte en mars-avril, adulte de fin avril jusque fin mai; elle ronge les tiges avant et les bourgeons après la dernière mue (THOMANN). Pupa en mai-juin, dans la terre. Papillon en juin-juillet.

J. VERBEKE.

Une espèce nouvelle pour la faune belge : *Aneurhynchus pentatomus* THOMSON (Hymenoptera Diapriinae).

Le 23-IX-50, je découvre dans une pièce d'eau à Linkebeek un petit Hyménoptère. L'ayant déterminé avec M. P. BENOÎT, il se révèle que nous nous trouvons devant un insecte qui n'a nullement