

Cette remarquable espèce ne peut être rattachée à aucune autre. La configuration du métasternum, jointe à la forme large, la convexité peu marquée, rapproche cette espèce du sous-genre *Megalogyrus* OCHS, mais l'absence de stries transverses, l'existence de 7 stries élytrales obsolètes, l'angle épipleural tout à fait effacé et la ponctuation extrêmement dense ne permettent nullement de l'y classer.

Il convient donc d'envisager la création d'un nouveau sous-genre* pour cette unique espèce :

SUBG. NOV. **Proteogyrus.**

Taille forte, forme largement ovale et assez déprimée; portion externe du métasternum largement triangulaire; élytres et pronotum non bordés et jaune; apex arrondi à peu près régulièrement; angle épipleural nul ou presque nul; stries élytrales indiquées, quoique obsolètes, sur la totalité de l'élytre; dessus non striolé mais fortement et densément ponctué.

Type: *Macroglyrus (Proteogyrus) leechi* n. sp.

14. **Orectochilus melli** OCHS.

Chine: E. Kwantung S., Tein leong San, 5-VI-1936, J.L. GRESST Coll., 1 ♂, 1 ♀.

15. **Orectochilus crassipes** RÉG.

Bornéo: 2 ♀.

(*) L'excellente table des sous-genres de *Macroglyrus*, publiée récemment par M. OCHS (1949, *Rec. Austr. Mus.*, XXII, p. 177) doit donc être légèrement modifiée :

9.

9'. Larger, broader, size 15 to 18 mm (exceptionally only 12 mm).

10. Elytra with transverse scratches and only 1 lateral stria.

Type, *M. striolatus*... Subg. 9 *Megalogyrus* OCHS.

One species in Australia (*M. striolatus* GUÉRIN).

10'. Elytra without transverse scratches and with 7 faint striae.

Type, *M. leechi*..... Subg. 10 *Proteogyrus* nov.

One species in N. Guinea (*M. leechi* nov.)

Contribution à la connaissance des Staphylinidae

IX. - Un *Staphylinus* nouveau d'Afrique occidentale

par Gaston FAGEL (Bruxelles)

Staphylinus (Platydracus) Bocandéi n. sp. (FAUVEL. i. litt.) (1).

Entièrement d'un bronzé verdâtre, nettement plus sombre à l'abdomen, tête avec deux petites taches interoculaires rouge brique, antennes brun noir, la base des trois premiers articles rougeâtre, ainsi que parfois les articles 6-10 en entier; palpes et pièces buccales variant de brun noir à jaune roux; pattes brun noir, le sommet de chaque article des tarses, rougeâtre, tibias ornés de nombreuses épines rougeâtres.

Avant-corps à pubescence hirsute, foncière courte, argentée, augmentée d'abondants poils jaune pâle, subdressés, de soies plus longues, jaunes, d'autres marron et de quelques très grandes soies dressées, noirâtres. Ce mélange de pubescence et la variation de leur direction déterminant des plages plus sombres.

Scutellum à disque portant une tache de tomentosité noire, quelque peu cordiforme, entourée de fine pubescence jaunâtre.

Abdomen à pubescence quelque peu analogue à celle de l'avant-corps, mais avec une moins grande abondance de longues soies, portant de part et d'autre du milieu des tergites découverts 2-5, une petite tache de tomentosité brun noir, sternites avec une bande basilaire de poils gris jaunâtre, de part et d'autre de la ligne médiane.

(1) Description et mensuration établies x 50.

Tête trapézoïdale, transverse (1,39-1,44), tempes à peu près aussi longues que le diamètre longitudinal des yeux, vu de dessus; submate, ponctuation ombiliquée forte et dense, sauf vers le bord antérieur où elle devient un peu plus éparse, microsculpture extrêmement fine, plutôt formée de très fines rides que de réticulation, plage postoculaire lisse peu indiquée sur la région temporale, bien mieux vers le dessous; ligne médiane vaguement imponctuée en avant du bord postérieur.

Antennes courtes et épaisses, atteignant à peine le quart antérieur du pronotum, largeur maximum aux articles 6-8, puis s'atténuant jusqu'au sommet, 11 à peine plus large que 5.

Pronotum subcarré (0,97 à 1,00) plus large que la tête, angles antérieurs bien marqués, mais à peine saillants, les postérieurs très fortement obtus, les côtés amorçant une courbe en arrière des angles antérieurs, puis subdroits, légèrement convergents jusqu'aux angles postérieurs, puis nettement obliques, se rencontrant en large courbe, la base non délimitée; ponctuation analogue à celle de la tête, mais irrégulièrement répartie, orientée en courants de directions variées, les intervalles, en certains endroits, très étroits et cariniformes, quelques petites plages imponctuées; microsculpture, par places, identique à celle de la tête, par places, imperceptible; ligne médiane imponctuée de largeur variable, en général égale au diamètre de 2-3 points, joignant les bords antérieur et postérieur, légèrement relevée en avant de ce dernier.

Elytres, pris ensemble, nettement moins larges aux épaules, que longs (0,86 à 0,97), mais plus larges, à leur largeur maximum (1,12 à 1,23), subplans, les calus huméraux bien marqués; mats, téguments à surface vermiculée, sur laquelle la ponctuation est à peine discernable; ce n'est que vers les épaules que les téguments deviennent plus lisses et que les points sont bien nets; ponctuation bien plus faible que celle du pronotum.

Abdomen à réticulation extrêmement fine, en mailles transversales, ponctuation foncière très fine, assez dense, augmentée vers l'arrière des tergites d'une forte et dense ponctuation et de quelques très gros points cratériformes (2); ponctuation des sternites analogue.

(2) La grande variété de ponctuation de ces insectes est en rapport avec la multiplicité d'aspects de la pubescence. Aussi ce n'est que sur les spécimens frottés et épilés que la ponctuation peut être convenablement étudiée.

♂: Bord postérieur du cinquième sternite à très large, mais très faible, échancrure; sixième sternite avec une encoche médiane, à fond arrondi, bien marquée, précédée d'une très légère dépression.

Edéage: du type habituel des *Platydracus*, variable comme chez toutes les espèces du groupe, le sommet du paramère pouvant être subtronqué, arrondi ou échancré.

Long.: 22-26 mm (3).

Holotype: ♂: Sénégal, 7-VIII-1939 (BOUVET) in coll. Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

Allotype: ♀: Sénégal: Thiès, VIII-1938, in coll. G. FAGEL.

Paratypes: 1 ♀: Guinée française: Kouroussé, ex coll. A. FAUVEL; 1 ♂: Guinée (BOCANDÉ), ex coll. A. FAUVEL; 1 ♂: Sénégal, 7-VIII-1939 (BOUVET) in coll. Institut royal des Sciences naturelles de Belgique; 1 ♂: Guinée française: Ditinn, 14-X-1945 (P. CLÉMENT), in coll. J. JARRIGE (Paris).

Les exemplaires de la collection A. FAUVEL portaient le nom in litt.: *Bocandéi* FAUVEL.

Cette belle espèce appartient au même groupe que *Platydracus giganteus* KR., *cantharophagus* m. *goliathus* BERNH., *fauvelianus* m. et *Brédoi* m., mais s'en séparera au premier coup d'œil par la taille bien moindre, la forme plus grêle, même que *Brédoi* m., et la ponctuation différente.

(3) Les spécimens provenant de Guinée sont légèrement plus grands que ceux du Sénégal, mais n'en diffèrent pas autrement.