

Cet *Atheta* est considéré par SCHEERPELTZ et HÖFLER parmi les « Pilz Atheten im engeren Sinne ». Deux des spécimens capturés étant un peu immatures, il est probable que la nymphose a lieu dans l'humus.

*A. (s. str.) fungicola* THOMS. (*nitidicollis* FAIRM.): Hockai, 20-VII-1938, 2 ♀♀, dans des champignons, dans un bois d'épicéas (!) et 12-X-1947, 7 ♂♂ 2 ♀♀, dans cavité d'un hêtre creux contenant des polypores (N. LELEUP).

Espèce qui a déjà été signalée des régions voisines, mais qui semble marquer une préférence pour les zones subalpines, elle serait abondante, notamment, dans les montagnes hercyniennes de l'Allemagne méridionale. Elle ressemble beaucoup au si vulgaire *A. crassicornis* F., mais s'en sépare, notamment, par la base des antennes sombre, dont le troisième article n'est pas dilaté chez le ♂, et le dernier sternite nettement échancré chez la ♀.

*A. (Hypatheta) brunneicornis* THOMS. (*valida* KR.): Hockai, 15-IX-1947, 5 ♂♂ 2 ♀♀, dans le même arbre creux que l'espèce précédente (N. LELEUP).

Cette espèce a souvent été confondue, à l'étranger, avec des spécimens immatures de *Megista graminicola* GRAV., à qui elle ressemble quelque peu, mais de stature plus forte, ponctuation des derniers tergites non granuleuse, antennes du type *Hypatheta* et surtout tempes incomplètement rebordées.

*Atheta brunneicornis* THOMS. existe, notamment, en Fennoscandie, Allemagne et France, où elle semble se rencontrer surtout en montagne.

*A. (Hypatheta) incognita* SHARP: Mirwart (Parfondry), 8-X-1948, 5 ♂♂ 5 ♀♀, dans des champignons; Ben-Ahin (ravin de Solières), 2 ♀♀, au bord du ruisseau, dans des détritiques de crue.

Espèce citée des principaux massifs du Sud de l'Allemagne, et en France, des Vosges, Alpes et Pyrénées, probablement en zone subalpine; signalée de Belgique, mais suivant EVERTS (*loc. cit.*, p. 221) d'après un spécimen inexactement nommé. Suivant UHMANN (*Ent. Blätter*, xx, 1924, p. 56) elle se trouverait particulièrement, en Allemagne méridionale, dans les forêts de Conifères.

Contrairement à nos autres *Hypatheta*, le ♂ de *incognita* SHARP.

n'a pas de crénelures nettes au bord postérieur du sixième tergite découvert.

*A. (Dimetrota) putrida* KR.: Hockai, 13-IV-1947, 1 ♀, dans sphaignes immergées, dans fossé de drainage (N. LELEUP); Mirwart (Parfondry), 8-X-1948, 1 ♂, dans un champignon pourri (!).

Espèce répandue dans les massifs d'Europe centrale et dans la zone subalpine des Alpes, mais se rencontrant parfois en plaine. Elle est citée, notamment, de quelques rares localités hollandaises. Dans les collections belges, nous n'avons encore vu aucun spécimen appartenant réellement à cette espèce.

*A. (Pachyatheta) cribrata* KR.: Waesmunster, 14-V-1939, 1 ♀, dans des sphaignes; Mirwart (Parfondry), 27-VII-1948, 1 ♂, sous des mousses, sur un tronc de hêtre.

SAINTE CLAIRE DEVILLE (*loc. cit.*, p. 128) le signale des Cévennes, Alpes Maritimes et Hautes-Pyrénées, tandis que SCHEERPELTZ et HÖFLER (*loc. cit.*, p. 216) le donne comme seulement trouvé, par individus isolés, en Europe centrale, Angleterre, Norvège et Russie.

Belle petite espèce, remarquable par la largeur du pronotum, la forte sculpture de l'avant-corps et la microsculpture du cinquième tergite découvert, formée de mailles transversales et non isodiamétrales comme chez la plupart des *Microdota* ou *Datomicra*, auxquels elle ressemble quelque peu.

G. FAGEL.

#### Rectification.

Dans le *Bulletin* de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (tome XXVII, 1951, n° 22, p. 10) nous avons décrit un *Ancyrophorus (s. str.) Gigolettoi*. Il s'agit d'un lapsus calami. Prière de bien vouloir lire: *Ancyrophorus Grigolettoi*, l'espèce étant dédiée à M. l'abbé Giuseppe GRIGOLETTO. G. FAGEL.

#### *Spathius pedestris* WESM., parasite de *Pentarthrum Huttoni* WOLL.

*Pentarthrum Huttoni* WOLL., Curculionide Cossonien très répandu en Grande Bretagne, fut rarement récolté sur le continent. M. André JANSSENS, qui identifia mes exemplaires, m'a montré les seuls individus à l'Inst. roy. Sc. nat., capturés à Bruxelles et présents dans la collection Guillaume. HONORÉ (*Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1918, p. 126) l'a obtenue à Paris dans de vieilles planches