

Crataerina pallida LATR. (Dipt. Hippoboscidae) dans une caserne à Liège.

En 1948, M. LECLERCQ signalait à la Société Entomologique que plusieurs personnes, à Liège, avaient été piquées par des *Hippoboscidae* appartenant à l'espèce *Crataerina pallida* LATR. L'espèce est très répandue dans la région liégeoise, mais connue comme s'attaquant au Martinet (*Cypselus apus*). En juillet 1951, la Station d'Entomologie a reçu des exemplaires de *Crataerina pallida*, découverts dans une caserne à Liège. D'après l'expéditeur, ces insectes étaient très nombreux et incommodaient les soldats. Il semble donc que ce Diptère puisse occasionnellement attaquer l'homme, dans les régions où il abonde.

J. BERNARD.

— La séance est levée à 16 h. 30.

BIBLIOGRAPHIE

Die Schmetterlinge Mitteleuropas par W. FORSTER et Th.A. WOHLFAHRT, Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart. — Le fasc. 2 vient de paraître, contenant les pp. 33-64 du vol. I (la fin du chapitre sur la chasse, l'élevage, la préparation des spécimens et l'arrangement des collections) et les pp. 33-64 du vol. II (la fin des *Satyridae* et quelques genres des *Nymphalidae*).

Aucun ouvrage existant ne donne autant de détails et de renseignements utiles sur la chasse, la préparation, etc. que le manuel présent. Aucun point n'a été laissé dans l'ombre et le Dr FORSTER s'est réellement acquitté de sa tâche d'une manière magistrale.

Dans la partie systématique, la nomenclature est tout à fait moderne, peut-être même un peu trop. Beaucoup d'amateurs seront par exemple étonnés de trouver *Dira petropolitana* F. au lieu de *Pararge hiera* F. Le principe même est cependant inattaquable. Ce qui l'est moins, est le morcellement des genres fondé le plus souvent sur des détails de l'armure génitale. Le rang subgénérique serait plutôt indiqué dans la plupart des cas, surtout dans un ouvrage destiné en premier lieu aux amateurs. Tout cela n'enlève évidemment rien aux nombreux mérites de cet excellent manuel et on ne peut que souhaiter que le travail entrepris par FORSTER et WOHLFAHRT soit mené à bonne fin dans les délais prévus.

S.G. KIRIAKOFF.

Descriptions de deux Carabiques nouveaux du Mozambique

(Col. Carabidæ)

par P. BASILEWSKY

Madame Maria CORINTA FERREIRA, du Museum Dr Alvaro de Castro, de Lourenço-Marques (Afrique Orientale Portugaise) a eu l'amabilité de me confier l'étude d'une série assez importante de Carabiques, recueillis à mon intention, ce dont je la remercie sincèrement. Parmi ces Insectes, se trouvaient deux espèces nouvelles que je décris ci-dessous; l'une d'elles appartient à un genre remarquable et inédit.

Subfam. SCARITINAE

Corintascaris, gen. nov.

Corps très allongé, cylindrique, presque paralléliforme.

Tête large et courte, fortement enchassée dans le pronotum, les tempes très courtes, les yeux fortement enchassés dans les gênes, qui en cachent une partie du bord externe; clypéus simple et court; labre bilobé; mandibules volumineuses et très larges, recourbées au sommet en une pointe aiguë, toute la surface fortement multicarénée longitudinalement. Menton profondément échancré au milieu, la dent labiale forte et acérée, présentant environ un tiers de la longueur des lobes qui sont larges et arrondis au sommet; fente humérale faible; paragènes larges et peu saillants. Languette large, bisétulée au sommet; paraglosses très étroits, presque aussi longs que la languette. Palpes glabres et allongés, l'avant dernier article des labiaux uniséulé, le dernier inséré un peu excentriquement. Lobe interne des maxilles terminé par une forte dent en crochet vers l'intérieur. Antennes courtes et épaisses, atteignant à peine le premier tiers de la longueur du pronotum, pubescentes à partir du cinquième article; premier article de forme très particulière, en grande palette arrondie et aplatie, aussi long que les