

et du pronotum extrêmement dense et très fine, les élytres largement arrondis au sommet et un peu moins finement ponctués. La coloration est assez semblable, mais la bande médiane du pronotum est plus large et dédoublée au milieu, les bandes élytrales sont plus larges et jaunes.

Longueur: 15 mm. Largeur: 3 1/4 mm.

Type du Congo belge: Bambesa, 26-IV-1937, leg. J. VRYDAGH.

43. *Eohippopsicon kivuense*, n. sp.

Antennes aussi longues que le corps, le troisième article presque aussi long que le quatrième, aussi long que le cinquième. Tubercules antennifères rapprochés et élevés. Lobes inférieurs des yeux deux fois plus longs que les joues. Ponctuation de la tête et du pronotum très dense et très fine. Élytres très densément et finement ponctués, leur angle apical marginal étiré en un lobe triangulaire obtus.

Brun foncé, revêtu d'une pubescence brun rougeâtre. Le front, les joues, les parties latérales du pronotum et le tiers latéral des élytres, couverts de pubescence jaune paille; sur les deux tiers internes de l'élytre se trouvent trois lignes longitudinales jaune paille, interrompues par places. Dessous du corps à pubescence brun foncé.

Longueur: 7 mm. Largeur: 1 1/2 mm.

Type du Congo belge: Mts. Nyamukubi (Kivu), XI-1932, 2600 m. leg. L. BURGEON.

Un Paratype, idem.

44. *Anauxesida cuneata* JORDAN m. *kivuensis*, nova

Comme la forme typique, mais la face dorsale des fémurs et les tibias entiers sont brun foncé, les bandes élytrales confluent par places en sens transversal, chacun des articles antennaires trois à sept est annelé de blanc à l'extrême base, le neuvième est jaune pâle, couvert de pubescence blanche.

Type du Congo belge: Kivu, Kamituga, 12-X-1938, leg. Alb. DUFRANE.

Un Paratype, idem.

Inventaire faunistique d'un Égoût

par Marcel LECLERCQ

Au cours de l'été et de l'automne 1945, j'ai inventorié la faune d'un égoût situé au milieu d'un pré à Beyne-Heusay (Liège). Cet égoût reçoit les eaux polluées d'une habitation, il déborde par intermittence et est entouré de quelques mètres carrés de marécages groupant les espèces végétales suivantes (citées dans l'ordre de leur abondance): *Alopecurus pratensis* L., *Polygonum aviculare* L., *Dactylis glomerata* L., *Rumex acetosella* L., et autres espèces, *Chenopodium album* L., *Atriplex* sp., *Plantago major* L., *Solanum nigrum* L., *Capsella bursa-pastoris* L., *Senecio vulgaris* L., *Taraxacum officinale* WEB., *Ranunculus acris* L. et *Trifolium repens* L. Le pH de l'eau déversée est légèrement alcalin.

On trouve dans les marécages des paquets d'une algue Cyanophycée: *Oscillatoria chlorina* KÜTZ, (det. P. DUVI-GNEAUD), espèce cosmopolite, commune dans les eaux putrides.

Voici le relevé de la faune:

1. **Crustacea Isopoda**: *Armadillidium vulgare* LATR. (det. A. CAPART).

2. **Hemiptera**: *Salda* sp.

3. **Coleoptera** (det. F. GUILLEAUME): SCARABEIDAE: *Aphodius sphacelatus* PANZ., adultes et larves dans la boue.

STAPHYLINIDAE: *Paederus littoralis* GRAV.

CARABIDAE: *Bembidion ustulatum* L. et *Chlaenius vestitus* PAYK. trouvés sous les pierres.

HYDROPHILIDAE: *Helophorus aquaticus* L. et *Cercyon haemorrhoidalis* F.

DYSTICIDAE: *Agabus bipustulatus* L.

4. **Diptera**: PETAURISTIDAE: *Petaurista hiemalis* DE G.

PSYCHODIDAE: *Psychoda phalaenoides* L. et autres espèces en nombre considérable.

TENDIPEDIDAE (det. M. GOETGHEBUER): *Metriocnemus hirticollis* STGR. (?) et *Smittia aquatilis* GOETGH.

LIMONIIDAE (det. M. GOETGHEBUER): *Polymeda* (= *Erioptera*) *griseipennis* MG. et *P. trivialis* MG. *Symplectomorpha stictica* MG. et *Limnophila* sp.

DOLICHOPODIDAE (det. A. COLLART): *Dolichopus unguatus* L., *Medetera truncorum* MG. et *Campsicnemus curvipes* FALL.

SYRPHIDAE: *Neoascia podagrica* F., *Syrphus corollae* F., *Eristalinus sepulchralis* L., *Eristalomyia tenax* L., *Eristalis arbutorum* L. et *E. pertinax* SCOP., *Tubifera pendula* L. et *Syritta pipiens* L. Tous les spécimens récoltés étaient des femelles.

SEPSIDAE: *Themira putris* L.

EPHYDRIDAE: *Notiphila cinerea* FALL. (det. A. COLLART), *Hydrellia griseola* FALL. et *Scatella stagnalis* MG. en quantité.

SPHAEROCERIDAE (det. P. VANSCHUYTBROECK): *Copromyza equina* FALL., *Borborus ater* MG., *Limosina bequaerti* VILLEN., *L. nana* ROND. et *Thoracochoeta zosterae* HAL.

CORDYLURIDAE: *Scopeuma stercorarium* L.

ANTHOMYDAE: *Musca domestica* L., *Graphomyia maculata* SCOP., *Phaonia querceti* BChé., *Hydrotaea ciliata* F., *Lispa tentaculata* DE G. et *Chortophila antiqua* MG. (?) (det. H. AUDCANT).

TACHINIDAE: *Calliphora erythrocephala* MG.

Remarques:

1. Les éléments dominants de cette faunule sont les Diptères; parmi eux, il faut surtout noter les Psychodidae et les Ephydriidae qui comptent des espèces (*Psychoda phalaenoides* L., *Hydrellia griseola* FALL.) rencontrées par centaines d'exemplaires.

2. Les Syrphidae rencontrés dans ce biotope sont tous des femelles, qui venaient là pour pondre. Il était d'ailleurs aisé de retrouver les larves de ces espèces dans la vase et d'en suivre l'élevage.

3. L'observation quotidienne m'a permis de découvrir les mœurs vespérales des Nématocères suivants: *Smittia aquatilis* GOETGH., *Polymeda griseipennis* MG. et *P. trivialis* MG. Pendant le jour, ils restent groupés autour de l'égoût, ça et là dans les herbes. Quand vient la soirée, ils commencent à sortir et à voler en nombre dans les environs.

Université de Liège,
Institut de Clinique
et de Policlinique médicales.

BULLETIN & ANNALES

de la Société Entomologique de Belgique

Le prix de chaque volume isolé des *Annales* est porté à trois cinquante francs.

Le prix de chacun des tomes I à VI du *Bulletin* est de cent

francs. Le prix de la collection des tomes I à LXXXVI des *Annales* (*Bulletin et Annales*) a été fixé à vingt-cinq mille francs (assemblée du 14 janvier 1951).



MÉMOIRES

de la Société Entomologique de Belgique

Les *Mémoires* de la Société, d'importance variable, paraissent à intervalles irréguliers. Prix de chaque volume: I (90 fr); II (90 fr); III (75 fr); IV (75 fr); V (140 fr); VI (75 fr); VII (75 fr); VIII (75 fr); IX (75 fr); X (140 fr); XI (75 fr); XII (75 fr); XIII (75 fr); XIV (75 fr); XV (75 fr); XVI (75 fr); XVII (90 fr); XVIII (90 fr); XIX (90 fr); XX (110 fr); XXI (90 fr); XXII (110 fr); XXIII (150 fr); XXIV (450 fr); XXV (90 fr).

Le prix de la collection des tomes I à XXV des *Mémoires* a été fixé à deux mille deux cents francs (assemblée générale du 14 janvier 1951).



TABLES GÉNÉRALES

de la Société Entomologique de Belgique

Table générale des Annales (I-XXX) par A. LAMERE (1887), 250 francs belges.

Table générale des Bulletin et Annales (XXXI-LXXX), *Bulletin (I-VI)* et *Mémoires (I-XXIV)*, 1888-1944, et *Répertoire des espèces citées dans les comptes rendus des assemblées mensuelles (1902 à 1944)*, par J. COOREMAN (1950), 250 francs.



Les Membres de la Société désirant obtenir les volumes antérieurs à l'année de leur réception, jouissent d'une réduction d'un tiers de la valeur.