

Epurea pygmaea GYLL. — Vallée de la Warche, 13-V-1951, 5 exemplaires.

Endomychus coccineus L. — Malmédy, 13-VI-1952, 1 exemplaire sous l'écorce d'un tronc abattu.

Aphodius depressus KUGEL. — Vallée de la Warche, 13-VI-1952, 2 exemplaires.

Oedemera tristis SCHMIDT. — Malmédy (Vallée de la Warche), 13-VI-1952, 3 exemplaires sur fleurs de *Polygonum cuspidatum* SIEB.

Chrysomela orichalcea MÜLL. — Vallée de la Warche, 13-VI-1952, 1 exemplaire.

Phytodecta pallida L. — Vallée de la Warche, 23-V-1951, 3 exemplaires.

G. DEBATISSE.

Hylesinus crenatus F. et Trypodendron signatum F. (Coléopt. Scolytides).

M. R. MAYNÉ, dans un article récent (*Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, 1953, 89, pp. 309-311), relève uniquement comme localité de capture pour ces deux Scolytides très rares, Tervueren pour la première espèce et la forêt de Saint-Hubert pour la seconde et y ajoute des captures inédites des deux insectes dans les environs de Laroche en Ardenne (Maboge).

Il y a lieu de tenir compte également des captures suivantes, déjà signalées dans la présente revue :

Hylesinus crenatus F. — Visé, 23-VII-1935, Dalhem, 9-I-1916 (MULLER); Chaudfontaine, 21-VI-1940, Wandre, 7-VI-1942 et 9-VI-1945 (DEBATISSE, *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, 1945, 81, 253). — Malmédy, 23-V-1951 (DEBATISSE, l.c. 1952, 88, 61).

Trypodendron signatum F. — Kinkempois (LECLERCQ); Hautes-Fagnes, 12-IX-1937 (DEPRÉ); Liège, IV-1942 (DEBATISSE, l.c., 1945, 81, 256); ainsi que la capture inédite d'un exemplaire le 23-V-1951 dans la vallée de la Warche (à proximité du barrage de Robertville) sur des bûches de feuillus en compagnie de *T. lineatum* OL. et *T. domesticum* L.

G. DEBATISSE.

Contribution à la connaissance des Staphylinidæ

XXVI. — Qu'est le *Neobisnius semipunctatus*
FAIRMAIRE ET GERMAIN?

par Gaston FAGEL (Bruxelles)

Depuis longtemps la littérature sur les *Staphylinidæ* européens renseigne un *Neobisnius semipunctatus* FAIRM. ET GERM. (1) décrit du Chili, dans le genre *Othius*, et que personne n'a jamais pu définir.

FAUVEL (2), dans le préambule de son étude sur les *Staphylinidæ* chiliens, signale être en possession des types de FAIRMAIRE ET GERMAIN. Il redécrit l'espèce, mais la place dans le genre *Philonthus* (3), et dit « cette espèce dont je n'ai vu que trois exemplaires ressemble extrêmement à notre *P. procerulus* d'Europe ».

Dans sa Faune Gallo-Rhénane (4), le grand entomologiste français indique l'espèce de France, Hollande, Belgique et signale qu'elle existe en Espagne, Algérie, Chili et Australie. Une remarque signifie qu'il a vu le type de l'espèce. In fine il ajoute « cet insecte ne serait-il qu'une variété du *procerulus*, à élytres colorés? ».

HORN (5) place l'espèce dans le genre *Actobius* et en donne une description correspondant quelque peu au *semipunctatus* sensu FAUVEL.

FAUVEL (6) signale l'espèce d'Australie et ajoute « L'extension

(1) Ann. Soc. Ent. France, 1861, p. 434.

(2) Bull. Soc. Linn. Normandie, 1864-65 (1866), p. 251.

(3) Bull. Soc. Linn. Normandie, 1864-65 (1866), p. 346.

(4) Faune Gallo-Rhénane, III, 1872, p. 431.

(5) Trans. Amer. Ent. Soc., XI, 1884, p. 227.

(6) Ann. Mus. Genova, XIII, 1878, p. 81.