



## III. — Sous-famille TABANINAE

Le genre *Tabanus* doit être divisé en quatre sous-genres (M. LECLERCQ, 1952):

- Yeux nus. Callosité frontale inférieure toujours très bien développée, large; callosité frontale médiane, parfois libre, mais le plus souvent connectée avec la callosité inférieure . . . . . *Tabanus s. str.*
- Yeux velus. Vertex légèrement renflé, surélevé, mais ne forme pas de tubercule luisant, plus ou moins divisé longitudinalement par une dépression. Callosité frontale inférieure bien développée . . . . . *Theriopectes*
- Yeux velus ou pubescents. Vertex avec un tubercule luisant bien net, souvent avec des traces d'ocelles. Callosité frontale inférieure bien développée et il y a souvent aussi une callosité frontale médiane . . . . . *Hybomitra*
- Yeux plus ou moins pubescents. Vertex plat. Callosité frontale inférieure minuscule ou même absente, ainsi que la callosité frontale médiane . . . . . *Atylotus*

1. *Tabanus s. str.* (*Sraba* ENDERLEIN).

2. *Theriopectes* ZELLER (*Sziladya* ENDERLEIN).

3. *Hybomitra* ENDERLEIN (*Sziladynus* ENDERLEIN).

4. *Atylotus* OSTEN SACKEN (*Ochrops* SZILADY; *Dasystypia* ENDERLEIN).

7. — ***Tabanus apricus* MEIGEN.**

Lot : Autoire, ♀, 22.VI.1945 (DOUBLET) ; Alpes Maritimes : Saint-Etienne de Tinée, Lioson-Bercia, nombreuses ♀♀, VII.1938 (DE WITTE, I.r.S.n.B.) ; Haute Garonne : Superbagnères, Luchon, ♀, 15.VII.1928 (BURGEON, I.r.S.n.B.) ; Pyrénées Orientales : Col de Jau, 2 ♀, 4.VII.1950 (HARANT).

8. — ***Tabanus autumnalis* LINNÉ.**

Gard : Aiguës-mortes, ♀, 10.VII.1954 ; Bouches du Rhône : Camargue, ♀, 5.V.1948 et ♂, 21.VI.1949 (HARANT) ; Somme : Rubescourt, ♀, 4.VII.1943 (DOUBLET).

9. — ***Tabanus bovinus* LINNÉ.**

Bouches du Rhône : Les Baux, ♀, 10.VII.1945 (HARANT) ; Gironde : Carcans, ♀, VII.1947 (CHABOUSSOU).

10. — ***Tabanus bromius* LINNÉ.**

Yonne : Lordonnois, ♀, 16.VII.1954 ; Nièvre : Poiseux, ♀, 16.VII.1954 ; Côte d'or : Savigny, ♀, VI (HARANT) ; Seine et Marne : Cannes Ecluse, ♀, 1.IX.1930 (SURCOUF, coll. VILLENEUVE, I.r.S.n.B.) ; Gironde : Avensan, ♀♀, 11.VI.1947 (CHABOUSSOU) ; Haute Garonne : Superbagnères, Luchon, ♂, 15.VII.1928 (BURGEON, I.r.S.n.B.) ; Pyrénées Orientales : Port Vendres, ♂, 15.VII.1904 (I.r.S.n.B.) ; Col de Jau, Prades, ♂ et ♀ (HARANT) ; Gard : Saint-Romans ♀, VII (I.r.S.n.B.) ; Mont Aigonal, 1.000 m, ♂, (HARANT) ; Var : Cavalière, ♀, 1.VI.1906 (I.r.S.n.B.) ; Bouches du Rhône : Camargue, étangs de Vaccarès, ♀, 10.VII.1954.

11. — ***Tabanus cordiger* MEIGEN.**

Alpes Maritimes : Saint-Etienne de Tinée, Lioson-Bercia, ♀, 25.VII.1928 (DE WITTE, I.r.S.n.B.) ; Lot : Autoire, ♀, 19.VIII.1945 (DOUBLET).

12. — ***Tabanus glaucopsis* MEIGEN.**

Oise : Boulogne la Grasse, ♀, 29.VII.1939 (DOUBLET) ; Bas Rhin : Chateau du Haut Barr, ♀, 22.VII.1949 ; Schirmeck, 3 ♀, 22.VII.1949 ; Côte d'Or : Savigny, ♀, VII (HARANT) ; Gard : Mont Aigoual, 1.000 m, ♀, (HARANT) ; Alpes Maritimes : Saint-Etienne de Tinée, Lioson, 2 ♀, 22.VII.1938 (DE WITTE, I. r. S. n. B.) ; Haute Garonne : Superbagnères, Luchon, ♀, 15.VII.1928, (BURGEON, I.r.S.n.B.) ; Puy de Dôme : Besse en Chandesse, 1050 m, ♀, 14.VII.1954.

13. — ***Tabanus maculicornis* ZETTERSTEDT.**

Oise : La Neuville en Her, ♀, 24.VI.1936 (DOUBLET) ; Cantal : Saint-Flour, ♀, 14.VII.1954 ; Puy de Dôme : Besse en Chandesse, 3 ♀, 15.VII.1954 ; Pyrénées Orientales : Col de Jau, 7 ♀, 4.VII.1950 (HARANT).

14. — *Tabanus rectus* LOEW.

Indre et Loire: Richelieu, ♀, VIII.1948 (CHABAUD); Bouche du Rhône: Camargue; Salin de Badon, ♀ sur chevaux, 10.VII.1954; Gard: Aiguesmortes, ♀, 10.VII.1954.

15. — *Tabanus regularis* JAENNICKE.

Bouches du Rhône: Camargue: Pont des Ecluses, Salin de Badon, 3 ♀ sur chevaux, 10.VII.1954; Pyrénées Orientales: Prades, ♀ (HARANT).

16. — *Tabanus sudeticus* ZELLER.

Oise: La Neuville en Her, ♀, 24.VI.1936 (DOUBLET); Bas Rhin: Schirmeck et Schaeferhof, ♀♀, 22.VII.1949; Vosges: Petit Drumont, 3 ♀, 29.VII.1949; Côte d'Or: Savigny, ♀, 7.VIII.1943 (HARANT); Gironde: Carcans, ♀, VII.1947 (CHABOUSSOU); Pyrénées Orientales: Crêtes et Pacagues, ♀, 23.VI.1950 (HARANT); Gard: Ledignan, Mont Aigoual, 3 ♀ (HARANT); Alpes Maritimes: Saint-Etienne de Tinée, ♀, 27.VII.1938 (DE WITTE, I.r.S.n.B.).

17. — *Tabanus tergestimus* EGGER.

Indre et Loire: Richelieu, nombreuses ♀, VII et VIII.1946 et 1948 (CHABAUD et DUPUIS); Nièvre: Poiseux, 3 ♀ sur une vache, 16.VII.1954; Côte d'Or: Savigny, ♀, VI.1949 (HARANT); Gard: Mont Aigoual, ♀ (HARANT); Sauveterre, ♀, 3.VII.1949 (HARANT); Pyrénées Orientales: Col de Jau: ♀, 4.VII.1950 (HARANT); Gironde: Avensan, ♀, 11.VI.1947 (CHABOUSSOU); Alpes Maritimes: Saint-Etienne de Tinée, 3 ♀, VII 1938 (DE WITTE, I.r.S.n.B.).

18. — *Theriopectes ater* ROSSI.

Bouches du Rhône: Les Pinchinats près d'Aix, ♀, 21.V.1914 (VITALIS, I.r.S.n.B.); Pyrénées Orientales: Prades, Canigou, 3 ♀, 2.VII.1950 (HARANT).

19. — *Theriopectes erberi* BRAUER.

Gard: Sauveterre, ♂, 4.VII.1949 (HARANT).

20. — *Theriopectes expollicatus* PANDELLÉ.

Bouches du Rhône: Camargue; Salin de Badon, 17 ♀ sur

chevaux, 10.VII.1954; Albaron, 10 ♀ volant autour de l'auto vers la soirée, 10.VII.1954; Gard: Aiguesmortes, ♀, 10.VII.1954; Gallician, 2 ♀ (HARANT).

A notre connaissance, cette espèce a seulement été signalée jusqu'à présent de France: Lyon, VIII (E. SÉGUY, 1926), Montpellier (J. SURCOUF, 1924) et de Belgique: Blankenberghe, VIII (M. LECLERCQ, 1952). Comme le mâle, la femelle a les yeux verts sans bande, quand l'exemplaire est en vie.

21. — *Theriopectes nemoralis* MEIGEN.

Gard: Mont Aigoual, 5 ♀, 26.VI.1949 (HARANT).

22. — *Theriopectes quartuornotatus* MEIGEN.

Gard: Mont Aigoual, 5 ♀, VI.1949 (HARANT).

23. — *Hybomitra aterrima* var. *auripila* MEIGEN.

Gard: Mont Aigoual, ♂ et ♀, 2.VI.1949 (HARANT); Pyrénées Orientales: Col de Jau, ♀, 4.VII.1950 (HARANT); Haute Garonne: Superbagnères, Luchon, ♀, 15.VII.1923 (BURGEON, I.r.S.n.B.); Puy de Dôme: Royat, ♀, 25.VII.1926 (VENET, coll. VILLENEUVE, I.r.S.n.B.).

24. — *Hybomitra distinguenda* VERRALL.

Somme: Bois de Quarbigny, ♀, 7.VII.1936 (DOUBLET).

25. — *Hybomitra micans* MEIGEN.

Somme: Montdidier, ♀, 7.VII.1946 (DOUBLET); Nièvre: Poiseux, ♀ sur une vache, 16.VII.1954; Puy de Dôme: Besse en Chandesse, 1.050 m, nombreuses ♀ volant autour de l'auto, 15.VII.1954.

26. — *Hybomitra tropica* PANZER.

Gard: Aiguesmortes, ♀, 10.VII.1954; Gallician, ♀ (HARANT); Bouches du Rhône: Camargue: Pont des Ecluses, ♀, 10.VII.1954; Seine et Oise: Rambouillet, ♀, 7.VII.1935 (coll. VILLENEUVE, I.r.S.n.B.); Nord: Le Quesnoy, ♀, 30.V.1917 (id.); Somme, ♂ (id.).

26bis — **Hybomitra tropica** var. **bisignata** JAENNICKE.

Somme: Ayencourt, ♀, 1.VI.1942; Courtemanche, ♀, 10.V.1946 et 21.V.1946; Bois de Quarbigny, ♀, 24.V.1939 (DOUBLET); Seine et Oise: Rambouillet, 2 ♂, 7.VII.1935 et ♂, 11.VII.1935 (coll. VILLENEUVE, I.r.S.n.B.).

27. — **Atylotus agrestis** WIEDEMAN.

Saône et Loire: Lasalle, ♂, 6.VII.1954; Bouche du Rhône: Camargue: Salin de Badon, nombreuses ♀ sur des chevaux, Pont des Ecluses, Etangs de Vaccarès, Beauduc, 10.VII.1954; Gard: Aiguesmortes, ♀, IX.1947 (HARANT).

28. — **Atylotus fulvus** MEIGEN.

Indre et Loire: Richelieu, ♀, 12.VIII.1946 (DUPUIS); Landes: Luc, ♀, VII.1947 (CHABOUSSOU); Gard: Mont Aigoual, ♂ (HARANT).

29. — **Atylotus rusticus** MEIGEN.

Bas Rhin: Saverne, ♂ et ♀♀, 10.VIII.1949; Gard, ♀, 17 et 18.VI.1950 (HARANT).

#### IV. — Sous-famille HAEMATOPOTINAE

30. — **Haematopota bigoti** var. **Monspellensis** VILLENEUVE.

Bouches du Rhône: Camargue: Salin de Badon, ♀ sur un cheval, 10.VII.1954.

31. — **Haematopota crassicornis** WAHLBERG.

Puy du Dôme: Besse en Chandesse, 1.050 m, 3 ♀, 15.VII.1954; Pyrénées Orientales: Col de Jau, 2 ♀, 4.VII.1950 (HARANT).

32. — **Haematopota italica** MEIGEN.

Gard: Mont Aigoual, 1.000 mètres, ♀, 8.IX.1943 (HARANT); Landes: 2 ♀, VIII.1947 (CHABOUSSOU).

32bis. — **Haematopota italica** var. **nigricornis** GOBERT.

Somme: Rubescourt, ♀, 4.VII.1943 (DOUBLET); Seine et Marne:

Cannes Ecluse, ♀, 1.IX.1930 (SURCOUF, coll. VILLENEUVE, I.r.S.n.B.).

33. — **Haematopota pluvialis** LINNÉ.

Nièvre: Poiseux, 16.VII.1954; Seine et Marne: Cannes écluse, VIII et IX.1930 (coll. VILLENEUVE, I.r.S.n.B.); Nemours, VI.1930 id.); Sarthe: Forêt de Perceigne, VIII.1930 (id.); Hautes Alpes: col du Lautaret, VII.1930 (idem); Cantal: Saint-Flour, 14.VII.1954; Puy de Dôme: Besse en Chandesse, 15.VII.1954; Durtol Vallette, V.1917 (coll. VILLENEUVE, I.r.S.n.B.); Bouches du Rhône: Camargue, Salin de Badon, 10.VII.1954; Gard: Mont Aigoual (HARANT); Pyrénées Orientales: Crêtes et Pacages, VI (HARANT).

Toutes ces récoltes concernent des exemplaires femelles.

#### BIBLIOGRAPHIE

- LECLERCQ, M., 1952, *Introduction à l'Etude des Tabanides et Révision des Espèces de Belgique*. (Mém. Inst. roy. Sc. nat. Belg., n° 123, 80 pp. SÉGUY, E., 1926, *Faune de France*, XIII. (Paris, Lechevalier édit., pp. 119-157.)  
SURCOUF, J., 1924, *Les Tabanides de France et des pays limitrophes*. (Paris, Lechevalier édit., 261 pp.)

Institut royal des Sciences naturelles  
de Belgique.