

Assemblée mensuelle du 7 décembre 1957

Présidence de M. S.G. KIRIAKOFF, *Président*

Correspondance. — Changement d'adresse : M. L. REMY, avenue Gochet, 34, Tamines (anciennement au n° 26).

Bibliothèque. — *Dons.* — Nous avons reçu des separata de MM. P. VAN DER WIEL (1) et E. JANSSENS (3). En outre, nous avons reçu : *The Classification of Insects*, a text for the use of students of the taxonomy of insects in Cornell University, par J. Chester BRADLEY. (*Remerciements*).

Divers. — M. G. DEMOULIN présente deux exuvies nymphales de l'Ephéméroptère *Behningia lestagei* MOTAS. Ces insectes sont rarissimes, et présente des caractères morphologiques très originaux. On en a signalé de la Volga, du Dniestr et de l'embouchure de l'Amour. Les exemplaires exhibés proviennent de la rivière Warta (Pologne), où ils ont été recueillis par M^{lle} M. KEFFER-MÜLLER (Poznań).

M. P. BASILEWSKY parle de la mission qu'il a effectuée en III-VIII.1957, pour le compte de l'IRSAC et du Musée Royal du Congo Belge, en Afrique Orientale, en compagnie de M. N. LÉLEUP. Notre collègue présente divers insectes coléoptères appartenant à la faune orophile (dont l'intérêt en Afrique Orientale n'est plus à démontrer), et illustre sa causerie par des photographies en noir et blanc et des diapositives en couleurs. L'exposé de M. BASILEWSKY est suivi avec le plus grand intérêt par les assistants, et est longuement applaudi.

COMMUNICATION

Une aberration nouvelle du *Chrysocarabus auronitens* F. : *ab. Christyi* ab. nov.

Dans un lot de Carabiques provenant des environs d'Arlon, j'ai eu la surprise de trouver un *Chrysocarabus auronitens* d'une coloration tout à fait inattendue et remarquable, en ce sens qu'elle est, en quelque sorte, l'opposé des variétés à élytres mélanisants. En effet, chez cet exemplaire, alors que les élytres ont la coloration normale des *auronitens*, c'est le pronotum, au contraire,

qui offre un mélanisme très accentué. D'un noir violacé brillant sur tout le disque jusque contre le bord antérieur, il ne laisse apparaître la teinte générale vert-doré qu'en une étroite bande, le long des côtés et de la base. L'exemplaire est parfaitement frais et ne porte aucune trace d'usure.

Quoique étant peu enclin à ajouter encore à la liste déjà fort chargée des variétés de coloration chez les *Chysocarabus*, je crois néanmoins, qu'il ne serait pas inutile de fixer par un nom, une variation qui, pour beaucoup d'amateurs, et j'en suis, était presque une utopie. Je dédie cette aberration à ma femme qui a recueilli le lot.

Bois de Beynert, 5.IX.1957, type 1 ♀, ma collection.

R. VAN DORSSELAER.