

BIBLIOGRAPHIE

- FAIN A., 1958, Les Acariens psoriques parasites des Chauve-souris. I. Révision du genre *Ncyteridocoptes* OUDEMANS, avec description de 3 espèces nouvelles chez les Roussettes africaines. — Rev. Zool. Bot. Afr., LVIII, 3-4 p. 232-248.
- OUDEMANS A.C., 1915, (cité par Van Eynhoven 1947, p. 145, 146, 152) Acarologische Aanteekeningen I.VIII. — Ent. Ber. IV, n° 85, p. 210-212.
- GRANDJEAN F., 1938, observations sur les Acaridiae (1^{re} Série). — Bull. Soc. zool. France, LXIII, n° 4-5, p. 221-224, f. 1-2.
- GRANDJEAN F., 1938, Observations sur les Acaridiae (2^e Série). Bull. Soc. zool. France, LXIII, n° 6, p. 278-288.
- VAN EYNHOVEN G.L., 1947, beschrijving van een nieuwe vleermuisparasiet, *Notoedres vanschajki* v. Eynhd. 1946 (Acar.) — Tijdschr. v. Ent. LXXXVIII, p. 132-154.

Laboratoire de Zoologie Médicale.
Institut de Médecine tropicale d'Anvers.

SOCIÉTÉ ROYALE D'ENTOMOLOGIE DE BELGIQUE

Assemblée mensuelle du 9 mai 1959

Présidence de M. J. DE WALSCHE, Président.

Divers. — M. J. COOREMAN signale avoir été averti par M. le Directeur de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique que des raisons de service l'obligent à transférer la bibliothèque de la Société dans un nouveau local.

M. C. SEGERS fait circuler une boîte contenant des Coléoptères (*Staphylinidae* et *Pselaphidae*) trouvés dans une fourmière artificielle appartenant à M. DEHOUSE.

COMMUNICATION

Captures d'*Elateridae*.

Ctenicera cuprea F. type — 1 ♂ pris à Hockai le 6.VII.57. La variété *aeruginosa* F. y est commune, mais le type « ne semble avoir été capturé qu'une seule fois en Belgique, aux environs des Hautes-Fagnes » (JEUNIAUX, Bull. Soc. Ent. Belg., LXXXVII, 1951, p. 222).

Ctenicera (Aplotarsus) quercus GVILL. u. *ochroptera* STEPH. — avec le type, mais beaucoup moins commun, dans la proportion de 1 pour 50 environ. Ces insectes se rencontrent en nombre dans les coupe-feu des bois d'épicéas, au bord des fossés, sur les herbes, surtout sur *Luzula albidula* HOFFM. (Juncacées). Hockai, 30.V.57, 8.V.57, etc... Gileppe, Munsterbilsen.

Ctenicera (Selatosomus) nigricornis PANZ. — sur les herbes en été, pas rare; Bois de Seraing, 27.VII.56; Bonheyden, 5.VIII.56.

Hypoganus cinctus PAVK. — contrairement à une opinion répandue, cet insecte est très commun partout dans le Saule en mars-avril; la forme à élytres noirs (a. *akbesianus* PIC) domine.

Cardiophorus ruficollis L. — Bois de Hez, Baisy-Thy (Brabant) sous les Pins, à terre, un exemplaire.

Ampedus sanguinolentus SCHR. — Munsterbilsen, 21.IV.57, 4 ex. Bouleau, aune. Avait été capturé en nombre par Candèze en cet endroit en 1890. Autrefois commun à Hockai avant le reboisement des Fagnes.

L. LAURENT.