

COMMUNICATION

M. René VANBELLINGEN (Rhode-St-Genèse) a obtenu d'élevage, à partir de cécidies caulinaires de *Linaria vulgaris*, le Coléoptère Curculionide *Gymnetrum hispidum* BRULLÉ. Date et localité de récolte des cécidies : fin VIII-1961, Rhode-St-Genèse. Date d'éclosion : 29.IX.1961.

A. COLLART.

BIBLIOGRAPHIE

The Moths of the British Isles, by Richard SOUTH, edited and revised by H.M. EDELSTEN, D.S. FLETCHER, and R.J. COLLINS. 2 volumes, 427 pp. et 148 ppl.+379 pp. et 141 ppl. Frederick Warne et Co. Ltd., London, 1961. Prix 35/ — par volume, en Belgique 595 F, pour les deux volumes.

C'est la quatrième édition de cet ouvrage classique paru en 1907. La nouvelle édition précédente datait de 1939 et a été réimprimée 4 fois. L'édition 1961 a conservé l'essentiel du texte original, mais celui-ci a été complètement mis à jour, par les soins des lépidoptéristes du British Museum (Natural History) MM. EDELSTEN, FLETCHER et COLLINS, aidés par plusieurs spécialistes dont M. TAMS. Il n'est que naturel qu'avec une collaboration aussi brillante, le nouveau « South » soit ce qu'il est, c'est-à-dire une mine inépuisable d'informations sur toutes les espèces et formes de Macrohétérocères signalées aux Iles Britanniques. Toutes les planches en couleur, qui représentent les deux sexes de toutes les espèces mentionnées, ont été spécialement dessinées pour la nouvelle édition par feu M. SWAIN. Il y a également un grand nombre de planches en blanc et noir, représentant les stades imparfaits, et plusieurs figures dans le texte. Nous regrettons devoir constater que plusieurs des planches en couleur ne sont pas réussies, p. ex. les planches 21 et 22 de la première série, les planches 19 et 21 de la deuxième série etc. Nous reprocherons aussi à nos amis de ne pas avoir observé certaines règles de la nomenclature zoologique. Nous trouvons p. ex. p. 292 de la première série *Luperina nickerlii* subsp. *guenéei* DOUBL., alors que ce nom doit s'écrire *Luperina nickerlii guenéei*. D'un autre côté, l'accord entre les noms génériques et spécifiques n'est pas observé : nous trouvons p. ex. *Procus latruncula*, *Tathorhynchus exsiccata*, *Hepialus sylvina*, *Spilosoma lutea* etc. Nous y voyons l'influence de M. TAMS qui est, comme on sait, un défenseur convaincu de l'immuabilité des noms spécifiques. L'accord entre les noms génériques et spécifiques est cependant prescrit par les Règles de la nomenclature zoologique.

Ce sont des détails qui peuvent facilement être corrigés par les lecteurs et qui n'atteignent en rien la valeur exceptionnelle du nouveau « South ». La grande majorité des espèces signalées aux Iles Britanniques se retrouve chez nous. Aussi, recommanderons-nous chaleureusement à nos lépidoptéristes l'ouvrage en question.

S.G. KIRIAKOFF.

SYRPHIDAE (DIPTERA) DU MAROC. I.

par Marcel LECLERCQ (*)

Cette note donne le relevé des *Syrphidae* récoltés au cours d'une mission entomologique au Maroc en juillet 1961.

LISTE DES RECOLTES

Sous-famille SYRPHINAE :

1. *Paragus tibialis meridionalis* BECKER.

Taza, 2 ♂ et 2 ♀, 6.VII.1961; Bab Taza, ♀, 6.VII.1961; Bordj Doumergue, ♀, 14.VII.1961. Répartition : Europe, Afrique Septentrionale, Asie Septentrionale.

2. *Melanostoma mellinum* LINNE.

Ifrane, 3 ♀, 15.VII.1961. Répartition : Europe, Afrique Septentrionale, Asie, Amérique du Nord.

3. *Sphaerophoria scripta* LINNE.

Daïet Aoua, ♂ ♀, 15.VII.1961; Ifrane, 3 ♂ et 5 ♀, 15.VII.1961; Azrou, ♂ ♀, 16.VII.1961. Répartition : Europe, Afrique Septentrionale, Asie Mineure, Septentrionale et Orientale, Amérique Septentrionale.

4. *Scaeva albomaculata* MACQUART.

Azrou, ♀, 13.VII.1961. Répartition : Europe méridionale, Afrique Septentrionale, Asie Mineure, région septentrionale de l'Iran.

5. *Syrphus corollae* FABRICIUS.

Ifrane, 4 ♂, 15.VII.1961. Répartition : Europe, Afrique Septentrionale, Asie Mineure, Septentrionale et Orientale.

(*) Contribution du Laboratoire de Zoologie générale, Institut agronomique de l'Etat, Gembloux.