

LISTE SYNONYMIQUE DES ORTHOPTÈRES

ET

DERMAPTÈRES INDIGÈNES ET ACCIDENTELS DE BELGIQUE

par J.-A. LESTAGE.

Il y a quelque temps, lorsque WILLEMSE a publié ses *Orthoptera neerlandica* (1), notre Société émit le vœu que semblable travail fut fait pour nos membres.

J'ai jugé que c'était chose inutile d'abord, et surtout trop onéreuse, car cela aurait nécessité un nombre trop grand de dessins. La Faune de LAMEERE, que possède tout entomologiste belge, suffit pour la détermination des Orthoptères de Belgique (2); seulement, la critique entomologique a fait subir à la synonymie de tels changements que, sur ce point, il y a lieu d'opérer bien des remaniements aux noms génériques et spécifiques de la partie de cette faune traitant des Orthoptères. Les présentes notes ont pour but d'établir cette concordance.

Si, aux espèces mentionnées par la Faune de Belgique, j'ai ajouté les espèces accidentelles, importées, etc., c'est uniquement pour attirer l'attention sur leur présence occasionnelle chez nous, ce que m'ont paru ignorer quelques auteurs traitant de l'aire de répartition possible de ces espèces.

Enfin, j'ai ajouté quelques autres espèces qui sont probablement endémiques.

Les noms anciens sont entre parenthèses.

ORDRE ORTHOPTÈRES

I. -- SOUS-ORDRE DICTYOPTÈRES

FAM. BLATTIDÆ

Ectobius lapponicus L. (*Blatta lapponica*).

Ect. lividus F. (*Blatta livida*).

Ect. panzeri ST. (*Blatta ericetorum* WESM.).

Blatella germanica L. (*Phyllodromia germanica*).

(1) Tijdschr. v. Entomol., LX, 1917.

(2) Les Orthoptères viennent de paraître dans la *Faune de France* (212 pp., 465 fig.) étudiés par le spécialiste bien connu L. CHOPARD.

Blatta orientalis L. (*Periplaneta orientalis*).

Periplaneta americana L.

P. australasiae F. (importé).

FAM. MANTIDÆ

Mantis religiosa L. — Trouvée en 1890 à Haine-Saint-Pierre et en 1892 à Chimay (accidentel).

II. -- SOUS-ORDRE ENSIFÈRES

FAM. PHASGONURIDÆ

(ancienn. *Locustidae*, *Tettigoniidae*)

Leptophyes punctatissima BOSC.

Meconema thalassina DEG. (*M. varium* FAB.).

Xiphidion dorsalis LATR. (*Xiphidium dorsale*).

Phasgonura viridissima L. (*Locusta viridissima*).

Pholidoptera griseoptera DEG. (*Thamnotrizon cinereus* L.).

Metriopectera albopunctata GOEZE (*Platycleis grisea* FAB.).

Metriopectera brachyptera L. (*Platycleis brachyptera*).

M. ræseli HAG. — environs de Heyst s/mer.

M. bicolor PHIL. — environs de Bruxelles.

Gampsocleis glabra HERBST. — Campine limbourgeoise.

Tettigonia verrucivora L. (*Decticus verrucivorus*).

Ephippiger ephippiger FIEBR. (*Ephippigera vitium* SERV.).

Tachycines asynamorus ADEL. (importé).

FAM. GRYLLIDÆ

Oecanthus pellucens SCOP. (Cité de Trahan, Ardennes).

Nemobius sylvestris BOSC.

Acheta campestris L. (*Gryllus campestris*).

Ach. bimaculata DEG. (importé).

Gryllus domesticus L.

Gryllotalpa gryllotalpa L. (*Gryllotalpa vulgaris* LATR.).

Scapteriscus didactyla LATR. (importé).

III. — SOUS-ORDRE PHASMODÉS

Bacillus rossii ROSSI (accidentel) (1).

* *

IV. — SOUS-ORDRE LOCUSTODÉS

FAM. LOCUSTIDÆ

(ancien. *Acridiidae*)

Acrydium bipunctatum L. (*Tettix bipunctata* L.).

Acr. subulatum L. (*Tettix subulata* L.).

Stenobothrus stigmaticus RAMB.

St. lineatus PANZ.

Omocestus hæmorrhoidalis CHARP. — Pas rare en Campine.

Om. ventralis ZETT. (*Stenobothrus rufipes* ZETT.).

Om. viridulus L. (*Stenobothrus viridulus* L.).

Stauroderus vagans EVERSM. — Spa, Poilvache.

St. bicolor CHARP. (*Stenobothrus bicolor*).

St. biguttulus L. (*Stenobothrus biguttulus*).

Chorthippus albomarginatus DEG. (*Stenobothrus elegans* CHARP.).

Ch. dorsatus ZETT. (*Stenobothrus dorsatus*).

Ch. parallellus ZETT. (*Stenobothrus parallellus*).

Ch. longicornis LATR. — Laeken.

Gomphocerus rufus L.

G. maculatus THUNB.

Stethophyma grossum L. (*Mecostethus grossus* L.).

Psophus stridulus L. — Lanaeken.

Locusta migratoria L. — (*Pachytylus danicus* L.).

Ædipoda cærulescens L.

Orthacanthacris ægyptia L. (accidentel).

Calliptamus italicus L. — Torgny.

* *

ORDRE DERMAPTÈRES

Labia minor L.

Chelidurella acanthopygia GÉNÉ (*Chelidura acanthopygia*).

Apterygida albipennis CHARP. (*Chelidura albipennis*).

Forficula auricularia L.

(1) Je dois cette communication à l'obligeance de M. le Dr SCHOUTEDEN qui m'écrivit avoir vu vivants des *B. rossii* importés avec des fleurs de Nice; on les voit aussi errant parfois sur les pierres, échappés des boîtes d'élevage des amateurs.