Katalog der Araneae

von 1758 bis 1940, bzw. 1954

bearbeitet von

Prof. Dr. C. Fr. Roewer

Bremen

2. Band, Abt. b

(Salticiformia, Cribellata)
(Synonyma-Verzeichnis, Gesamtindex)

Tous droits réservés
Ouvrage édité par le Patrimoine
de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
RUE VAUTIER, 31
BRUXELLES
1954

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE

Katalog der Araneae

von 1758 bis 1940, bzw. 1954

bearbeitet von

Prof. Dr. C. Fr. Roewer

Bremen

2. Band, Abt. b

(Salticiformia, Cribellata)

(Synonyma-Verzeichnis, Gesamtindex)

Tous droits réservés

Ouvrage édité par le Patrimoine
de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
RUE VAUTIER, 31
BRUXELLES
1954

Imprimé en Allemagne
Carl Schünemann Bremen

6. Superfam. SALTICIFORMIA

51. Fam. LYSSOMANIDAE

Gen. **Asamonea** Simon 1885.

(= **Asemonea** auct. alt.)

Aethiopische Arten:

♀ **bella** Lenz 1891. Madagascar

A. **b.** Lenz 1891, Jahrb. Hambg. Wiss. Anst. 9 (1) p. 164 T. 1 F. 1 (D ♀).

♀ **ornatissima** Peckham & Wheeler 1889. Madagascar

A. o. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 244 T. 12 F. 22 (D ♀).

o **pallens** (Blackwall) 1877. Seychellen

Lyssomanes p. Blackwall 1877, Proc. Irish. Ac. Sci. (2) 3 p. 6 T. 1 F. 5 (D o).
A. **p.** Simon 1885, Bull. Soc. Zool. France 10 (4—6) p. 27 (N).
A. **p.** Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p 246 (D o).

♂♀ **puella** Simon 1885. Senegambien, Congo, S.-Afrika

A. **p.** Simon 1885, Bull. Soc. Zool. France 10 (4—6) p. 27 (D ♂♀).
A. **p.** Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 242 (D ♂♀).

♂ **pulchra** Berland & Millot 1941. Franz. Sudan

A. **p.** Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 401 f. 93 (D ♂).

♀ **punctata** Peckham & Wheeler 1889. Madagascar

A. **p.** Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 244 T. 12 F. 21 (D ♀).

Orientalische Arten:

♂ **cingulata** Thorell 1895. Burma

Asemonea **c.** Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 314 (D ♂).

♂ **cristata** Thorell 1895. Burma

Asemonea **c.** Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 316 (D ♂).

♀ **picta** Thorell 1895. Burma

Asemonea **p.** Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 318 (D ♀).

♂♀ **tenuipes** (Cambridge) 1869. – * Indien, Ceylon, Burma

Lyssomanes t. Cambridge 1869, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 3 p. 65 T. 5 F. 50—52 (D ♂).
A. **t.** Peckham 1886, Proc. Acc. Sci. Wiscons. 4 p. 340 (D).
A. **t.** Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 243 T. 12 F. 5, 19 (D ♂♀).
Asemonea **t.** Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 319 (D ♀).
Asemonea **t.** Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 399 f. 399, 400, 412 (N ♂).

Gen. **Chinoscopus** Simon 1901.

♂ **brasiliensis** Mello-Leitao 1917. Brasilien

C. b. Mello-Leitao 1917, Broteria 15 p. 100 (D ♂).

♂ **ernsti** (Simon) 1900. Venezuela

Epicharmus e. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 28 (D ♂).
C. e. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 391, 393 f. 401, 402 (N ♂).

♂♀ **flavus** (Peckham & Wheeler) 1889. Centr.-Amerika

Asamonea f. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 246 T. 12 F. 18 (D ♀).
Asemonea f. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 186 T. 13 F. 8 (C ♀).
C. f. Banks 1929, Bull. Mus. Zool. Harvard 69 (3) p. 76 T. 1 F. 13 (D ♂).
C. f. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 7 f. 1 (D ♂, N ♀).

♂ **gracilis** (Taczanowski) 1872. – * Guiana

Jelskia g. Taczanowski 1872, Hor. Soc. Ent. Ross. 9 p. 70 T. 3 F. 3 (D ♂).
Asamonea g. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 245 T. 12 F. 2 (D ♂).
C. g. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 399 (N).
C. g. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 697 (N ♀).

♂ **maculipes** Crane 1943. Brit. Guiana, Venezuela

C. m. Crane 1943, Zoologica. N. York 28 (3; 16) p. 128 f. 1L—O (D ♂).

Gen. **Lyssomanes** Hentz 1844.

§ 14 (♂, ♀): Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 225.
§ 6 ♂: Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 98.
§ 13 ♂, 6 ♀: F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 179.
§ 4 Arten: Banks 1929, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 69 (3) p. 74.
§ 9 ♂, 9 ♀: Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 8—12.

♂♀ **amazonicus** Peckham & Wheeler 1889. Amazonas

L. (Jelskia) a. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 240 T. 11 F. 1, 16 (D ♂♀).

♂♀ **antillanus** Peckham & Wheeler 1889. Haiti, San Domingo, Cuba

L. (Maroussa) a. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 226 T. 11 F. 1 (D ♂).
L. a. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 448 T. 17 F. 230; T. 18 F. 237 (D ♂♀).

♂♀ **austerus** Peckham & Wheeler 1889. Brasilien

L. (Maroussa) a. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 231 T. 1 F. 7; T. 12 F. 17 (D ♂♀).

♂ **banksi** Chickering 1946. Panama

L. b. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 12 f. 2—4 (D ♂).

♂♀ **beebei** Crane 1943. Brit. Guiana

L. b. Crane 1943, Zoologica, N. York 28 (3; 16) p. 126 f. 1F—K (D ♂♀).

♂ **bifasciatus** Mello-Leitao 1917. Brasilien

L. b. Mello-Leitao 1917, Ardı. Escol. Sup. Agr. 1 p. 125 TF. 5 (D ♂).

♂ **bitaeniatus** Peckham & Wheeler 1889. Venezuela

L. (Maroussa) b. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 229 T. 11 F. 4 (D ♂).

♀ **blandus** Peckham & Wheeler 1889. Guatemala

L. (Jelskia) b. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 241 T. 12 F. 13 (D ♀).
L. b. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 186 T. 13 F. 17 (N ♀).

♂♀ **bradyspilus** Crane 1949. Venezuela
L. b. Crane 1949, Zoologica, N. York 34 (2) f. 1 (D ♂♀).
L. b. Crane 1950, Zool. Sci. Contrib. N. York Zool. Soc. 35 (1) p. 255 (D ♂♀).

♀ **bryantae** Chickering 1946. Panama
L. b. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 14 f. 5 (D ♀).

♂ **consimilis** Banks 1929. Panama
L. c. Banks 1929, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 69 (3) p. 75 T. 1 F. 4; T. 2 F. 30 (D ♂).
L. c. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 17 (N).

♀ **convexus** Banks 1909. Costa Rica
L. c. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 225 T 6 F. 41 (D ♀).

♂♀ **deinognathus** F. Cambridge 1900. Mexico, Panama
L. d. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 182 T. 13 F. 5, 6 (D ♂♀).
L. d. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 17 (N).

♂♀ **devotoi** Mello-Leitao 1917. Brasilien
L. d. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 127 TF. 25, 26 (D ♂♀).

♂♀ **dissimilis** Banks 1929. Panama
L. d. Banks 1929, Bull. Mus. Zool. Harvard. 69 (3) p. 74 T. 1 F. 1, 2; T. 2 F. 25; T. 4 F. 62 (D ♂♀).
L. d. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 17 f. 6—7 (N ♂♀).

♀ **dubius** Mello-Leitao 1927. S.-Brasilien
L. d. Mello-Leitao 1927, Rev. Mus. Paulista 15 p. 407 (D ♀).

♀ **eatoni** Chickering 1946. Panama
L. e. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 19 f. 8 (D ♀).

♀ **elegans** F. Cambridge 1900. Panama, Mexico
L. e. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 186 T. 12 F. 14; T. 13 F. 12 (D ♀).
L. e. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 21 (N).

♀ **gracilis** F. Cambridge 1900. Guatemala
L. g. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 186 T. 13 F. 16 (D ♀).

♀ **hieroglyphicus** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires
L. h. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 3 (24) p. 371 f. 65—66 (D ♀).

♂♀ **jemineus** Peckham & Wheeler 1889. S.- u. Centr.-Amerika
L. (Jelskia) j. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 234 T. 11 F. 9; T. 12 F. 14 (D ♂♀).
L. j. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 184 T. 13 F. 14, 15 (N ♂♀).
L. femineus Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 394 f. 406—409 (N ♂).
L. j. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 21 (N ♂♀).

♂♀ **leucomellas** Mello-Leitao 1917. Brasilien
L. l. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 128 TF. 13, 17 (D ♂♀) (in TF.: **leucomelas)**

♂♀ **longipes** (Taczanowski) 1871. Guiana
Jelskia l. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 129 T. 4 F. 11 (D ♂♀).
Jelskia l. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 333 (D).
L. (Jelskia) l. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 238 T. 11 F. 12 (D ♂).

♂ **lupus** Mello-Leitao 1945. Argentinien
L. l. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 271 f. 58 (D ♂).

♂ **mandibulatus** F. Cambridge 1900. Guatemala, Mexico, Costa Rica, Panama
L. m. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 186 T. 13 F. 11 (D ♂).

♂ **miniaceus** Peckham & Wheeler 1889. Brasilien
L. (Maroussa) m. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 230 T. 11 F. 6 (D ♂).

♀ **montanus** Chickering 1946. Panama
L. m. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 22 f. 9 (D ♀).

♂ **nigrofimbriatus** Mello-Leitao 1941. Rio Negro
L. n. Mello-Leitao 1941, Arqu. Inst. Biol. S. Paulo 11 (30) p. 254 (D ♂).

♂o **nigropictus** Peckham & Wheeler 1889. Amazonas, Guiana, Venezuela
L. (Jelskia) n. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 235 T. 11 F. 10 (D ♂).
L. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 391 f. 394, 395, 410, 411 (N ♂).
L. n. Crane 1943, Zoologica, N. York 28 (3; 16) p. 126 f. 1A—E (D ♂♀).

♂ **pachygnathus** F. Cambridge 1900. Guatemala
L. p. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 182 T. 13 F. 7 (D ♂).

♀ **parallelus** Peckham & Wheeler 1889. S.-Amerika
L. (Jelskia) p. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 236 T. 12 F. 15 (D ♀).

♀ **parki** Chickering 1946. Panama
L. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 24 f. 10 (D ♀).

♂♀ **patens** Peckham 1896. Panama, Honduras, Costa Rica
L. p. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 99 T. 4 F. 8 (D ♂♀).
L. p. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 186 T. 13 F. 1—2 (N ♂♀).
L. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 26 (N).

♀ **pauper** Mello-Leitao 1945. Argentinien
L. p. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 272 f. 59 (D ♀).

♂ **penicillatus** Mello-Leitao 1927. S.-Brasilien
L. p. Mello-Laitao 1927, Rev. Mus. Paulista 15 p. 407 T. 15 F. 3 (D ♂).

♂ **placidus** Peckham & Wheeler 1889. Mexico
L. (Maroussa) p. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 229 T. 11 F. 5 (D ♂).
L. p. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 185 T. 13 F. 3 (N ♂).

♂♀ **portoricensis** Petrunkevitch 1930. Portorico
L. p. Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 31 p. 112 f. 91—96 (D ♂♀).

♂ **protarsalis** F. Cambridge 1900. Guatemala
L. p. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 183 T. 13 F. 3 (D ♂).

♂ **quadrinotatus** Simon 1900. Venezuela
L. q. Simon 1900, Ann. Soc Ent. France 69 p. 27 (D ♂).

♀ **quadripunctatus** Mello-Leitao 1917 Brasilien
L. q. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 128 TF. 15 (D ♀).

♂ **reductus** Peckham 1896. Honduras
L. r. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 100 (D ♂).

♂ **remotus** Peckham 1896. Panama, Guatemala
L. r. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 100 T. 7 F. 9 (D ♂).
L. r. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 185 T. 13 F. 8 (N ♂).

♂ **robustus** (Taczanowski) 1878. Peru, Centr.-Amerika
Jelskia r. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 373 (D ♂).
L. (Jelskia) r. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 239 T. 11 F. 13; T. 12 F. 7 (D ♂).

♀ **shropshirei** Chickering 1946. Panama
L. s. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 27 f. 11 (D ♀).

♂♀ **simplicipes** F. Cambridge 1900. Panama, Guatemala
L. s. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 183 T. 13 F. 4 (D ♂).

♂♀ **spinifer** F. Cambridge 1900. Costa Rica, Guatemala, Mexico
L. s. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 284 T. 12 F. 12, 13 (D ♂♀).

♂ **spiralis** F. Cambridge 1900. Guatemala
L. s. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 183 T. 12 F. 11 (D ♂).

♂ **tenuis** Peckham & Wheeler 1889. Brasilien
L. (Jelskia) t. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 233 T. 11 F. 8 (D ♂).

♂♀ **trifurcatus** F. Cambridge 1900. Panama
L. t. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 184 T. 13 F. 9, 10 (D ♂♀).

♀ **tristis** Peckham & Wheeler 1889. Brasilien
L. (Maroussa) t. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 232 T. 11 F. 12 (D ♀).

♂♀ **unicolor** (Taczanowski) 1871. Guiana, Peru
Jelskia u. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 131 (D ♂).
Jelskia u. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 373 (N ♂, D ♀).

L. (Maroussa) u. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p 226 T. 11 F. 9; T. 12 F. 21 (D ♂♀).

♂ **velox** Peckham & Wheeler 1889. Brasilien

L. (Jelskia) v. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 237 T. 11 F. 11 (D ♂).

♂♀ **viridis** (Walckenaer) 1837. – * Centr.- u. südl. N.-Amerika, Haiti

Attus v. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 469 (D ♀).
L. v. Hentz 1845, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 198 T. 17. F. 3 (D ♂).
L. v. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 97 (D ♂♀).
L. (Maroussa) v. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 228 T. 11 F. 3; T. 12 F. 6 (D ♂♀).
L. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign, 2 (3) p. 398 f. 391—393 (N).
L. v. Emerton 1902, Common Spid. p. 65 f. 165 (D ♂♀).
L. v. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 595 (D ♂♀).

♂ **zeteki** Chickering 1946. Panama

L. Z. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 29 f. 12—15 (D ♂).

Gen. **Lyssorthrus** Roewer 1938.

♂ **vanstraeleni** Roewer 1938. Neu-Guinea

L. v. Roewer 1938, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors Sér.) 3 (19) p. 76 f. 51—54 (D ♂).

Gen. **Macopaeus** Simon 1900.

Aethiopische Arten:

♀ **madagascariensis** Peckham 1903. Madagascar

M. m. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 182 T. 19 F. 5 (D ♀).

♀ **spinosus** Simon 1900. – * Madagascar

M. s. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 381 (D ♀).
M. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 399 (N).

Orientalische Arten:

♀ **celebensis** Merian 1911. Celebes

M. c. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) p. 304 f. P1, Q1 (D ♀).

Gen. **Onomastus** Simon 1900.

♂ **nigricauda** Simon 1900. – * Ceylon

O. n. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 29 (D ♂).
O. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 400 f. 398 (N ♂).

♂ **patellaris** Simon 1900. Indien

O. p. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 29 (D ♂).

♀ **quinquenotatus** Simon 1900. Ceylon

O. q. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 29 (D ♀).

Gen. **Orthrus** Simon 1900.

♂ **bicolor** Simon 1900. Philippinen

O. b. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 28 (D ♂).
O. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 400 f. 404, 405 (N ♂).

Gen. **Pachyonomastus** Caporiacco 1947.

♀ **kittenbergeri** Caporiacco 1947. O.-Afrika
P. k. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 250 T. 2 F. 77 (D ♀).

Gen. **Pandisus** Simon 1900.

♀ **modestus** (Peckham & Wheeler) 1889. Madagascar
Lyssomanes (Maroussa) m. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 231 T. 12 F. 10 (D ♀).
P. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 396 (N).

♂ **scalaris** Simon 1900. – * Madagascar
P. s. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 27 (D ♂).
P. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 398 f. 396, 397 (N ♂).

52. Fam. SALTICIDAE

§ 33 Gruppen: Mello-Leitao 1921, Rev. Soc. Bras. Sci. 4 p. 156—158.

1. Sect. Pluridentati

1. Subfam. Boethinae

1. Gr. Boetheae

Gen. **Boethoportia** Hogg 1915.

♂♀ **ocellata** Hogg 1915. Neu-Guinea
B. o. Hogg 1915, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 502 f. 1 (D ♂♀).

Gen. **Boethus** Thorell 1878.

♀ **caligatus** (Simon) 1900. Ceylon
Nealces c. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 30 (D ♀).
B. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 401 f. 419, 420 (N).

♂♀ **gracilis** (Thorell) 1891. Sumatra
Spartaeus g. Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 137 (D ♂).
B. g. Reimoser 1925, Suppl. Ent. 10 p. 90 (N ♀).

O **spinimanus** Thorell 1878. – * Amboina
B. s. Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 221 (D O).
B. s. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 295 (D).
B. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 402 (N).

♂ **striatipes** (Simon) 1900. Java
Nealces s. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 30 (D ♂).
B. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 401 f. 413—415 (N ♂).

Gen. **Portia** Karsch 1878.

Aethiopische Arten:

♂ **deciliata** Strand 1907. Madagascar
P. d. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (23) p. 745 (D ♂).
P. d. Strand 1908, Nyt Mag. Naturw. Christiania 46 (2) p. 182 (D ♂).

♂ **durbanii** Peckham 1903. Natal
P. d. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 183 T. 19 F. 2 (D ♂).

♂ **kenti** Lessert 1925. Natal
P. k. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 32 (21) p. 339 f. 8 (D ♂).

♀ **russata** Simon 1900. Madagascar
P. r. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 381 (D ♀).

♀ **schultzii** Karsch 1878. – * Natal, Madagascar
P. s. Karsch 1878, Zeitschr. ges. Naturw. 51 p. 774 (D ♀).
Brettus martini Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 31 (D ♀).
Brettus martini Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 403 (N).

♀ **solitaria** Lessert 1927. Congo
P. s. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 425 f. 14 (D ♀).

♂ o **strandi** Caporiacco 1941. S.-Abessinien
P. s. Caporiacco 1941, Miss. Biol. Sagan-Omo 12, Zool. 6 p. 136 f. 58 (D ♂ o).

Orientalische Arten:

♀ **adonis** (Simon) 1900. Ceylon
Brettus a. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 32 (D ♀).

♀ **albolimbata** (Simon) 1900. Indien
Brettus a. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 31 (D ♀).

♂♀ **cingulata** (Thorell) 1895. Burma
Brettus c. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 355 (D ♂).
P. c. Reimoser 1925, Suppl. Ent. 10 p. 90 (N ♀).

♀ **semifimbriata** (Simon) 1900. Indien
Brettus s. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 31 (D ♀).
P. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 401 f. 416—418 (N).
P. s. Strand 1911, Arch. Naturg. 77 (I; 2) p. 148 (N ♀).
P. s. (? = foveolata) Strand 1912, Arch. Naturg. 78 (A; 8) p. 148 (D ♀).

2. Gr. Cocaleae

Gen. **Cocalus** C. L. Koch 1846.

Aethiopische Arten:

♂ **africanus** Thorell 1899. Camerun
C. a. Thorell 1899, Bih. Svensk. Vet. Ak. Handl. 25 (4; 1) p. 91 (D ♂).

Orientalische Arten:

♂ **limbatus** Thorell 1878. Amboina
C. l. Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 283 (D ♂).

♀ **macellus** Thorell 1878. Amboina
C. m. Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 287 (D ♀).

♀ **murinus** Simon 1899. Sumatra
C. m. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 102 (D ♀).
C. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 406 f. 429—433 (N).

♂ **salax** Thorell 1877. Celebes
C. s. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 594 (D ♂).

Transgredierende Arten:

♂ **concolor** C. L. Koch 1846. – * I. Bintang, Neu-Guinea

C. c. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 180 TF. 1230 (D ♂).
C. c. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 288 (D).
C. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 408 f. 408 (N).

♂♀ **longipes** Thorell 1881. Luzon, Neu-Guinea

C. l. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 495 (D ♂♀).

Australische Arten:

♀ **protervus** Thorell 1881. Neu-Guinea

C. p. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 493 (D ♀).

Gen. **Phaeacius** Simon 1900.

♀ **fimbriatus** Simon 1900. – * Sumatra, Java

P. f. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 32 (D ♀).
P. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 408 f. 434 (N).
P. f. Reimoser 1925, Suppl. Ent. 10 p. 90 (N).

♂ **lancearius** (Thorell) 1895. Burma

Cocalus l. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 357 (D ♂).

♂♀ **ramipalpis** (Thorell) 1890. Sumatra

Cocalus r. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 165 (D ♂♀).
Cocalus r. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 353 (D ♂♀).
P. r. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 406 f. 435 (N).

3. Gr. Lineae

Gen. **Linus** Peckham 1885.

Aethiopische Arten:

♂♀ **africanus** Simon 1885. I. Principe, Congo, Natal, Senegal

L. a. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 393 (D ♂).
L. a. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 398 f. 91 (D ♂♀).

♀ **guineensis** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea

L. g. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 399 f. 92 (D ♀).

♀ **alboguttatus** Lawrence 1938. Natal

L. a. Lawrence 1938, Ann. Natal Mus. 8 (3) p. 520 f. 38 (D ♀).

♂ **lesserti** Lawrence 1937. Zululand

L. l. Lawrence 1937, Ann. Natal Mus. 8 (2) p. 254 f. 22 (D ♂).

O **nigrolineatus** Strand 1908. Madagascar

L. n. Strand 1908, Zool. Jahrb. Syst. 26 (4) p. 482 (D O).

Transgredierende Arten:

♂♀ **fimbriatus** (Doleschall) 1859. – * Ceylon, Indien bis Neu-Guinea u. Australien, Madagascar

Salticus f. Doleschall 1859, Act. Soc. Ind. Neerl. 5 p. 22 T. 5 F. 8 (D ♂♀).
Sinis f. Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 269 (D ♂).

Sinis f. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 499 (D ♀).
L. f. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 289 (D).
L. f. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 342 T. 25 F. 5 (N).
L. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 411 f. 435—443 (N ♂).
L. f. Strand 1909, Abh. Nat. Ges. Görlitz 26 p. 97 (N ♂♀).
L. f. Sherriffs 1939, Hong Kong Nat. 9 (4) p. 196 T. 24 F. 2 (N ♀).

Orientalische Arten:

♂ **albimanus** Simon 1900. Indien
L. a. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 33 (D ♂).

♂ **crassipalpis** Peckham 1907. Borneo
L. c. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 605 (D ♂).

♂♀ **subvexus** Thorell 1890. Sumatra, Nias
L. s. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 79 (D ♂).
L. s. Reimoser 1925, Suppl. Ent. 10 p. 90 (N ♀).

Australische Arten:

♀ **alticeps** Pocock 1899. Salomonen
L. a. Pocock 1899, in: Willey, Zool. Res.... fr. N.-Brit., Salomon. Isl. 1 p. 117 T. 11 F. 14 (D ♀).

Gen. **Tanna** Berland 1938.

♂♀ **ornatipes** Berland 1938. Neue Hebriden
T. o. Berland 1938, Ann. Soc. Ent. France 107 p. 142 f. 30—35 (D ♂♀).

4. Gr. Cocalodeae

Gen. **Cocalodes** Pocock 1897.

Orientalische Arten:

♂♀ **leptopus** Pocock 1897. – * Molukken
C. l. Pocock 1897, Abh. Senckenbg. Ges. 23 (4) p. 628 T. 26 F. 29 (D ♀).
C. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 405 f. 421—425 (N ♂).

♂ **melanognathus** Pocock 1897. Molukken
C. m. Pocock 1897, Abh. Senckenbg. Ges. 23 (4) p. 629 T. 26 F. 30 (D ♂).
C. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 403 f. 428 (N ♂).

Australische Arten:

♂ **armatissimus** Strand 1913. Schouten-I.
C. a. Strand 1913, Arch. Naturg. 79 (A; 6) p. 122 (D ♂).
C. a. Strand 1914, Abh. Senckenbg. Ges. 36 (2) p. 262 T. 14 F. 23; T. 19 F. 101 (D ♂).

♂ **papuanus** Simon 1900. Neu-Guinea
C. p. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 32 (D ♂).
C. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 403 f. 428 (N ♂).

♂♀ **plebejus** Szombathy 1915. Neu-Guinea
C. p. Szombathy 1915, Ann. Mus. Nat. Hungar. 13 p. 468 f. 1, 2 (D ♂♀).

♂♀ **thoracicus** Szombathy 1915. Neu-Guinea
C. t. Szombathy 1915, Ann. Mus. Nat. Hungar. 13 p. 470 f. 3 (D ♂♀).

Gen. **Sonoita** Peckham 1903.

♂ **lightfootii** Peckham 1903. Capland

S. **l.** Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 184 T. 19 F. 4 (D ♂).

5. Gr. Holcolaeteae

Gen. **Holcolaetis** Simon 1885.

Aethiopische Arten:

♀ **albobarbata** Simon 1909 (1910). Congo

Holcolethis a. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 413 (D ♀).

♀ **strandi** Caporiacco 1940. Abessinien

H. s. Caporiacco 1940, Atti Accad. Ital. 11 (18) p. 855 f. 48 (D ♀).
H. s. Caporiacco 1941, Mis. Biol. Sagan-Omo 12, Zool. 6 p. 135 f. 57 (D ♀).

♀ **vellerea** Simon 1909 (1910). San Thomé

Holcolethis v. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 412 (D ♀).

♂♀ **vidua** Lessert 1927. Congo

H. v. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 426 f. 15 (D ♂).

♂♀ **xerampelina** Simon 1885. – * Gabun, Abessinien, Natal, O.-Afrika

H. x. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 394 (D ♀).
H. x. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 454 f. 518—521 (N ♀).
H. x. Strand 1909, Soc. Ent. 23 p. 181 (D ♂♀).
H. x. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 432 f. 5, 6 (D ♂♀).
H. x. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 227 (N ♀).

♀ **zuluensis** Lawrence 1937. Zululand

H. z. Lawrence 1937, Ann. Natal Mus. 8 (2) p. 255 f. 23 (D ♀).

Orientalische Arten:

♂♀ **dyali** Roewer 1951. Panjab

H. vidua Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 222 (D ♂♀) (praeocc. Lessert 1927).
H. d. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 444 (nom. nov.).

2. Subfam. Myrmarachninae

1. Gr. Ligonipeae

Gen. **Colaxes** Simon 1900.

♂ **nitidiventris** Simon 1900. Indien

C. n. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 402 (D ♂).
C. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 493 (N).

Gen. **Haterius** Simon 1900.

♀ **semitectus** Simon 1900. – * Queensland

H. s. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 403 (D ♀).
H. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 493 f. 579 (N).

♀ **synageloides** Szombathy 1915. Neu-Guinea

H. s. Szombathy 1915, Ann. Mus. Nat. Hungar. 13 p. 476 f. 7 (D ♀).

Gen. **Ligonipes** Karsch 1878.

Orientalische Arten:

♀ **similis** (Hasselt) 1882. Sumatra

Rhombonotus s. Hasselt 1862, in: Veth, Midd. Sumatra 4 (11 A) p. 54 T. 5 F. 17 (D ♀).

Australische Arten:

♀ **flavipes** Rainbow 1920. Norfolk-I.

L. f. Rainbow 1920, Rec. S. Austral. Mus. 1 p. 263 T. 30 F. 100—102 (D ♀).

♂♀ **illustris** Karsch 1878. – * Queensland

L. i. Karsch 1878, Mitt. München. Ent. Ver. 2 p. 26 (D ♀).
Rhombonotus gracilis L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1067 T. 93 F. 8; T. 94 F. 1 (D ♂♀).
Rhombonotus gracilis Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 279 (D).
L. i. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 303 (D).
L. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 493 (N).

Gen. **Marengo** Peckham 1892.

Aethiopische Arten:

♂o **coriacea** Simon 1900. Natal

M. c. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 401 (D ♂).
M. c. Lawrence 1949, Göetborgs Vet. Handl. (B) 5 (9) p. 36 f. 22 (D ♀).

♀ **kibonotensis** Lessert 1925. O.-Afrika

M. k. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (1) p. 439 f. 15—17 (D ♀).

Orientalische Arten:

♂ **chelifer** Simon 1900. Java

M. c. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 400 (D ♂).
M. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 488 f. 577 (N).

♀ **crassipes** Peckham 1892. – * Ceylon

M. c. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 66 T. 5 F. 4 (D ♀).
M. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 492 f. 578 (N).

♂ **nitida** Simon 1900. Ceylon

M. n. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 401 (D ♂).
M. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 488 f. 574—576 (N ♂).

♀ **striatipes** Simon 1900. Ceylon

M. s. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 400 (D ♀).

Gen. **Philates** Simon 1900.

♂♀ **grammicus** Simon 1900. – * Philippinen

P. g. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 402 (D ♂♀).
P. g. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 493 f. 580, 581 (N).

♀ **inornatus** Simon 1900. Ceylon

P. i. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 403 (D ♀).

2. Gr. Myrmarachneae

Gen. **Arachnotermes** Mello-Leitao 1928.

♀ **termitophilus** Mello-Leitao 1928. Brasilien
A. t. Mello-Leitao 1928, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 4 (3) p. 48 (D ♀).
A. t. Mello- Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 86 (D ♀).

Gen. **Belippo** Simon 1909.

o **anguinea** Simon 1909 (1910). San Thomé
B. a. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 416 (D o).

Gen. **Bizonella** Strand 1929.

♀ **longiventris** Simon 1903. Madagascar
Bizone l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 1051 (D ♀).
B. l. Strand 1929, Act. Univ. Latviens. 20 p. 15 (nom. nov. gen.).

Gen. **Bocus** Peckham 1892.

♂♀ **excelsus** Peckham 1892. – * Philippinen
B. e. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Wiscons. 2 p. 39 T. 3 F. 4 (D ♂).
B. e. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 505 f. 598, 599 (N ♀).

♂ **flavus** Simon 1900. Philippinen
B. f. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 406 (D ♂).

Gen. **Emertonius** Peckham 1892.

Aethiopische Arten:

rufescens Simon 1900. Madagascar
E. r. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 405 (D).

Orientalische Arten:

♂ **exasperans** Peckham 1892. – * Java
E. e. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Wiscons. 2 p. 54 T. 4 F. 8 (D ♂).
E. e. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 504 f. 595 (N).

Gen. **Myrmarachne** Mac Leay 1830.

Palaearktische Arten:

§ 1 ♂, 2 ♀: Roewer 1928, Tierw. Mitteleurop. 3 (6) p. 42 TF. 467.

austriaca (Doleschall) 1852. Unter-Oesterreich
Pyrophorus au. Doleschall 1852, S. B. Ak. Wiss. Wien 9 p. 644 (D).

♀ **gisti** Fox 1937. China
M. g. Fox 1937, Journ. Wash. Ac. Sci. 27 (1) p. 13 f. 4, 9, 12, 14 (D ♀).

♀ **grahami** Fox 1937. China
M. g. Fox 1937, Journ. Wash. Ac. Sci. 27 (1) p. 12 f. 1, 2 (D ♀).

♀ **hidaspis** Caporiacco 1935. Karakorum
M. h. Caporiacco 1935, Mém. Soc. Ent. Ital. 13 p. 196 T. 3 F. 16 (D ♀).

♂♀ **hoffmanni** Strand 1913. Kiautschou
M. h. Strand 1913, Arch. Naturg. 79 (A; 7) p. 168 (D ♂♀).

♂♀ **inermichelis** Bösenberg & Strand 1906. Japan, Formosa

M. i. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 329 T. 9 F. 128; T. 14 F. 382 (D ♂).
M. i. Strand 1918, Arch. Naturg. 82 (A; 11) p. 100 (D ♀).
M. i. Saito 1933, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. 13 (1) p. 39 T. 3 F. 7a, b (N).

♂♀ **japonica** (Karsch) 1879. Japan, Formosa

Salticus j. Karsch 1879, Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf. 36 p. 82 (D ♂).
M. j. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 498, 500 (N).
M. j. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 328 T. 9 F. 149; T. 14 F. 372 (D ♂).
M. j. Strand 1918, Arch. Naturg. 82 (A; 11) p. 101 (N).
M. j. Saito 1933, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. 13 (1) p. 39 T. 3 F. 17 (N ♀).
M. j. Saito 1939, Saito Ho-on Kai Mus. Res. Bull. 18 p. 43 (N ♀).

♂♀ **joblotii** (Scopoli) 1763. Europa, Armenien, Transkaukasien

Aranea j. Scopoli 1763, Ent. Carniol. p. 402 (D).
Aranea formicaria De Geer 1778, Mém. p. s. Hist. Iat. Ins. 7 p. 293 T. 18 f. 1, 2 (D ♀).
Aranea formicaria Olivier 1789, Encycl. Méthod. 4 p. 221 (D ♀).
Attus formicarius Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 26 (N).
Attus formicarius Walckenaer 1825, Faun. Franç. p. 64 T. 5 F. 1—3 (D).
Salticus formicarius Sundevall 1832, Vet. Ak. Handl. p. 200 (D ♂♀).
Attus formicarius Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 470 (D ♂♀).
Pyrophorus helveticus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 26 TF. 1094, 1095 (D ♂).
Pyrophorus siciliensis C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 28 TF. 1096 (D ♂).
Salticus formicarius C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 33 TF. 1101, 1102 (D ♂♀).
Attus helveticus Walckenaer 1847, Hist. Nat. Ans. Apt. 4 p. 520 (D ♂).
Salticus formicarius Blackwall 1851, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) 7 p. 448 (N).
Salticus formicarius Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 64 T. 3 F. 36 (D ♂♀).
Salticus formicarius Westring 1862, Aran. Svec. p. 542 (D ♂♀).
Saltica formicaria Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 335 (C).
Salticus formicarius Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 150 (D ♂♀).
Pyrophorus venetiarum Canestrini 1868, Annuar. Soc. Nat. Modena 3 p. 203 (D ♂).
Pyrophorus venetiarum Canestrini & Pavesi 1868, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 11 p. 864 (D ♂).
Pyrophorus flaviventris Canestrini & Pavesi 1868, Atti. Soc. Ital. Sci. Nat. 11 p. 865 (D ♀).
Pyroderes formicarius Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 715 T. 3 F. 16—18 (D ♂♀).
Pyroderes helveticus Canestrini & Pavesi 1870, Arch. Zool. Anat. Fis. Bologna (2) 2 p. 55 (C).
Pyroderes siciliensis Canestrini & Paversi 1870, Arch. Zool. Anat. Fis. Bologna (2) 2 p. 55 (C).
Pyroderes venetiarum Canestrini & Pavesi 1870, Arch. Zool. Anat. Fis. Bologna (2) 2 p. 55 (C).
Pyroderes flaviventris Canestrini & Pavesi 1870, Arch. Zool. Anat. Fis. Bologna (2) 2 p. 55 (C).
Salticus formicarius Thorell 1872, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 357 (N).
Salticus formicarius Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 7 T. 9 F. 1 (D ♂♀).
Salticus formicarius Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 6 T. 1 F. 1 (D ♂♀).

Salticus formicarius Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 76 (D ♂♀).
Salticus formicarius Hansen 1885, in: Schiödte, Zool. Danica p. 158 T. 5 F. 10 (D ♂♀).
Salticus formicarius Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 4 (D ♂♀).
Salticus formicarius Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Wiscons. 2 p. 16 T. 1 F. 1 (D ♂♀).
M. formicaria Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 499 f. 594 (N ♂).
Salticus formicarius Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 412 T. 39, F. 60 (D ♂♀).
Toxeus formicarius Smith 1907, Journ. Quekett Micr. Cl. (2) 10 p. 181 (N).
M. formicaria Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 540 (D ♂♀).
M. j. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 23 (D ♂♀).
M. formicaria Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1150, 1246 f. 1783—86 (D ♂♀).
M. formicaria Palmgren 1936, Act. Zool. Fenn. 36 p. 11 f.... (N).
M. j. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 17 f. 16; T. 1 F. 1—3 (D ♂♀).
M. formicaria Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 240 f. 116A, B; 117C, D; 118A—C (D ♂♀).

♂♀ **joblotii tyrolensis** (C. L. Koch) 1846. Alpen
Pyrophorus tyrolensis C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 29 TF. 1097, 1098 (D ♂).
Pyroderes tyroliensis Canestrini & Pavesi 1870, Arch. Zool. Anat. Fis. Bologna (2) 2 p. 55 (C).
Salticus tyrolensis Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 8 (D ♂♀).
M. formicaria t. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 541 (D ♂♀).

♂♀ **lugubris** (Kulczynski) 1895. Ussuri-Gebiet
Salticus l. Kulczynski 1895, Rozpraw. Ak. Umiej. Krakow. (2) 12 p. 46 T. 2 F. 1—5 (D ♂♀).
M. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 503 (N).

♂ **myrmicaeformis** (Lucas) 1870. Algier
Salticus m. Lucas 1870 (1871), Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 8 T. 1 F. 1 (D ♂).
Salticus desertus Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 21 T. 2 F. 6 (D ♂).
M. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 501 (N).
M. m. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 97 (C).

♂ **semirufa** (C. L. Koch) 1837. Bayern, Oberitalien
Pyrophorus s. C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 29 (N).
Pyrophorus s. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 24 TF. 1093 (D ♂).
Pyroderes s. Canestrini & Pavesi 1870, Arch. Zool. Anat. Fis. Bologna (2) 2 p. 55 (C).

♂♀ **simonis** (Herman) 1879. Siebenbürgen, Dalmatien
Salticus s. Herman 1879, Ungarns Spinn. Faun. 3 p. 295, 383 T. 8 F. 185 (D ♂♀).
Salticus s. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 4 (D ♂♀).

♂ **vehemens** Fox 1937. China
M. v. Fox 1937, Journ. Wash. Ac. Sci. 27 (1) p. 16 f. 6, 10 (D ♂).

Aethiopische Arten:

♂♀ **akermani** Lawrence 1942. Natal
M. a. Lawrence 1942, Ann. Natal Mus. 10 (2) p. 181 f. 28—29 (D ♂♀).

♂ **augusta** (Peckham) 1892. Madagascar
Salticus a. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 24 T. 1 F. 5 (D ♂).
M. angustiformis Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 503 (nom. nov., err. pro **angusta**).

♂ **bamakoi** Berland & Millot 1941. Franz. Sudan
M. b. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 404 f. 94 (D ♂).

♂ **calcarata** Roewer 1942. Fernando Poo
M. c. Roewer 1942, Veröff. Deutsch. Kol. Uebersee Mus. 3 (3) p. 253 T. 19 F. 9 (D ♂).

o **constricta** (Blackwall) 1877. Seychellen
Salticus c. Blackwall 1877, Proc. Irish Ac. (2) 3 p. 5 T. 1 F. 4 (D o).
M. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 503 (N).

♂ **coppeti** Berland & Millot 1941. Senegal
M. c. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 405 f. 95, 101 C (D ♂).

♀ **cowanii** (Peckham) 1892. Madagascar
Iola c. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 75 T. 6 F. 3 (D ♀).
M. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 503 (N).

♀ **diversicoxis** Caporiacco 1947. O.-Afrika
M. d. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 227 T. 2 F. 62 (D ♀).

♂ **eidmanni** Roewer 1942. Fernando Poo
M. e. Roewer 1942, Veröff. Deutsch. Kol. Uebersee Mus. 3 (3) p. 252 T. 19 F. 8 (D ♂).

♂ **electrica** (Peckham) 1892. Madagascar
Salticus e. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 25 T. 1 F. 3 (D ♂).
M. e. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 500 (N).

♂ **elongata** Szombathy 1915. Uganda
M. e. Szombathy 1915, Ann. Mus. Nat. Hungar. 13 p. 475 f. 6 (D ♂).

♂ **eumenes** (Simon) 1900. Madagascar
Salticus eu. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 405 (D ♂).
M. e. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 499, 500 f. 587—589 (N ♂).

♀ **exultans** Caporiacco 1949. Kenya
M. e. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 462 f. 83 (D ♀).

♂♀ **foenisex** Simon 1909 (1910). Congo, Senegal, Franz. Guinea
M. f. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 415 (D ♂).
M. f. Giltay 1929, Rev. Zool. Bot. Afr. 18 (1) p. 25 f. 3—4 (D ♂♀).
M. f. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 406 f. 96 (N ♂♀).
M. f. Lessert 1942, Rev. Suisse Zool. 49 (2) p. 10 f. 5 (N ♀).

♂ **foreli** Lessert 1926. Natal
M. f. Lessert 1926, Rev. Suisse Zool. 32 (21) p. 342 f. 9—10 (D ♂).

♂ **hesperia** (Simon) 1887. W.-Afrika

Salticus h. Simon 1887, Ann. Soc. Ent. France (6) 7 p. 261 (D ♂).
M. h. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 498—500 (N).
M. h. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 414 (N).
M. h. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 407 f. 97 (D ♂).

♂♀ **ichneumon** (Simon) 1885. Sansibar

Salticus i. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 387 (D ♂).
Salticus i. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 17 T. 1 F. 7 (D ♂).
M. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 499 (N).
Salticus i. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 250 (D ♀).

♀ **insulana** Roewer 1942. Fernando Poo

M. i. Roewer 1942, Veröff. Deutsch. Kol. Uebersee Mus. 3 (3) p. 254 T. 19 F. 10 (D ♀).

♂♀ **kiboschensis** Lessert 1925. O.-Afrika

M. k. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 441 f. 18—22 (D ♂♀).

♂ **lesserti** Lawrence 1938. Natal

M. l. Lawrence 1938, Ann. Natal Mus. 8 (3) p. 521 f. 39 (D ♂).

♂♀ **maerens** Lessert 1925. O.-Afrika, Abessinien

M. m. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 445 f. 23—25 (D ♂).
M. m. Caporiacco 1940, Atti Accad. Ital. 11 (18) p. 855 (N ♂♀).

♀ **majungae** Strand 1907. Madagascar

M. m. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (23) p. 745 (D ♀).
M. m. Strand 1908, Nyt. Mag. Naturvid. 46 (2) p. 185 (D ♀).

♂♀ **marshallii** Peckham 1903. Mashonaland

M. m. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 249 T. 29 F. 6 (D ♂♀).

♂ **militaris** Szombathy 1913. O.-Afrika

M. m. Szombathy 1913, Allat. Közlem. 12 p. 33, 56 f. 9 (D ♂).

♂♀ **milloti** Lessert 1942. Congo

M. m. Lessert 1942, Rev. Suisse Zool. 49 (2) p. 8 f. 1—4 (D ♂♀).

♀ **natalica** Lessert 1925. Natal

M. n. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 32 (21) p. 344 f. 11 (D ♀).

♂♀ **nexilis** Simon 1909 (1910). San Thomé

M. n. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 415 (D ♂♀).

♂ **paucidentata** Berland & Millot 1941. Senegal

M. p. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 408 f. 98 (D ♂).

♀ **peckhami** Roewer 1951. Madagascar

Salticus gracilis Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 26 T. 2 F. 1 (D ♀) (praeocc. Hahn 1831).
M. p. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 450 (nom. nov.).

♂ **riveti** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea

M. r. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 410 f. 99 (D ♂).

♂ **rufisquei** Berland & Millot 1941. Senegal

M. r. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 411 f. 100, 101 A. B (D ♂).

♂ **sansibarica** Strand 1910. Sansibar, O.-Afrika

M. s. Strand 1910, Internat. Ent. Zeitschr. Guben 4 (3) p. 13 (D ♂).
M. s. Caporiacco 1949, Comment. Pontif. Ac. Sci. 13 (6) p. 461 (N ♂♀).

♂ **simplexella** Roewer 1951. Madagascar

Salticus simplex Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 23 T. 1 F. 4 (D ♂) (praeocc. Blackwall 1865).
M. simplex Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 501 (N).
M. s. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 450 (nom. nov.).

♂♀ **solitaria** Peckham 1903. Capland

M. s. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 250 T. 29 F. 5 (D ♂♀).

♀ **volatilis** (Peckham) 1892. Madagascar

Hermosa v. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 53 T. 4 F. 7 (D ♀).
M. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 504 (N).

Transgredierende Arten:

♂♀ **tristis** (Simon) 1882. Yemen, Abessinien, Indien

Salticus t. Simon 1882, Ann. Mus. Civ. Genova 18 p. 212 (D ♀).
Salticus t. Simon 1890, Ann. Soc. Ent. France (6) 10 p. 115 (D ♂).
Salticus t. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 22 T. 3 F. 2 (D ♂♀).
M. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 501 (N).
M. t. Narayan 1915, Rec. Ind. Mus. Calcutta 11 p. 397 T. 32 F. 3 (D ♀).
M. t. Caporiacco 1940, Atti Accad. Ital. 11 (18) p. 854 (N ♀).

Orientalische Arten:

§ 9 Arten: Badcock 1917, Proc. Zool. Soc. London p. 279.
§ 14 Arten: Banks 1930, Psyche 37 (3) p. 207.

♀ **albicrurata** Badcock 1917. Malakka

M. a. Badcock 1917, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 306 f. 9a (D ♀).

♂ **alticeps** (Thorell) 1890. Java

Salticus a. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 157 (D ♂).
Salticus a. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 239 (D ♂).

♂ **angusta** (Thorell) 1877. Celebes

Salticus a. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 553 (D ♂).

♂ **annandalei** Simon 1901. Malakka

M. a. Simon 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. (2; 4) p. 72 (D ♂).

♂♀ **assimilis** Banks 1930. Luzin

M. a. Banks 1930, Psyche 37 (3) p. 210 T. 11 F. 7, 13 (D ♂♀).

♀ **attenuata** (Cambridge) 1901. Singapore

Salticus a. Cambridge 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 15 T. 5 F. 6 (D ♀).

♂ **bakeri** Banks 1930. Luzon

M. b. Banks 1930, Psyche 37 (3) p. 216 T. 11 F. 8 (D ♂).

♂ **bicurvata** (Cambridge) 1869. Ceylon

Salticus b. Cambridge 1869, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 3 p. 67 T. 6 F. 57—60 (D ♂).

♂ **bidentata** Banks 1930. Luzon
M. b. Banks 1930, Psyche 37 (3) p. 209 T. 11 F. 4 (D ♂).

♂ **biseratensis** Badcock 1917. Malakka
M. b. Badcock 1917, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 312 f. 10 (D ♂).

♂ **borneensis** Peckham 1907. Borneo
M. b. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 604 (D ♂).

♀ **capito** (Thorell) 1890. Java
Synemosyna c. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 155 (D ♀).
Synemosyna c. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 215 (D ♀).

♂ **chapmani** Banks 1930. Luzon
M. c. Banks 1930, Psyche 37 (3) p. 214 T. 11 F. 6, 11 (D ♂).

♂ **clavigera** (Thorell) 1877. Celebes
Synemosyna c. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 548 (D ♂).
M. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 500 (N).

♂♀ **cornuta** Badcock 1917. Malakka
M. c. Badcock 1917, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 291 f. 5 (D ♂♀).

♀ **cuneata** Badcock 1917. Malakka
M. c. Badcock 1917, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 300 f. 7 (D ♀).

♀ **debilis** (Thorell) 1890. Java
Synemosyna d. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 155 (D ♀).
Synemosyna d. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 218 (D ♀).

♀ **decorata** Reimoser 1927. Sumatra
M. d. Reimoser 1927, Misc. Zool. Sumatra. 13 p. 3 f. 3 (D ♀).

♂ **dubia** (Peckham) 1892. Luzon
Salticus d. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 29 T. 2 F. 4 (D ♂).

♀ **edentata** (Peckham) 1892. Luzon
Salticus e. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 31 T. 2 F. 5 (D ♀).

♂ **formicae** (Doleschall) 1859. Amboina
Salticus f. Doleschall 1859, Act. Ac. Ind. Neerl. 5 p. 23 T. 5 F. 7 (D ♂).
Synemosyna decipiens Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 545, 546 (nom. nov.).

♀ **formosa** (Thorell) 1890. Sumatra, Celebes
Salticus f. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 156 (D ♀).
Salticus f. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 230 (D ♀).
Pergassus f. Thorell 1894, Bih. Svensk. Vet. Ak. Handl. 20 (4; 4) p. 55 (nom. nov. gen.).

formosana (Matsumura) 1911. Formosa
Pyroderes f. Matsumura 1911, Mém. Soc. Ent. Belg. 18 p. 150 (D).

♂ **formosicola** Strand 1910. Formosa
M. f. Strand 1910, Internat. Ent. Zeitschr. Guben 4 (3) p. 14 (D ♂).

♂ **gedongensis** Badcock 1917. Malakka
M. g. Badcock 1917, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 315 f. 11 (D ♂).

♂ **himalayensis** Narayan 1915. Indien
M. h. Narayan 1915, Rec. Ind. Mus. Calcutta 11 p. 399 T. 32 F. 5 (D ♂).

♂♀ **imbellis** (Peckham) 1892. Ceylon
Salticus i. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 36 T. 2 F. 10 (D ♂♀).
M. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 498, 500 (N).

♀ **incerta** Narayan 1915. Indien
M. i. Narayan 1915, Rec. Ind. Mus. Calcutta 11 p. 396 T. 32 F. 2 (D ♀).

♂♀ **iridescens** Banks 1930. Luzon
M. i. Banks 1930, Psyche 37 (3) p. 216 T. 11 F. 3 (D ♂♀).

♂ **jacobsoni** Reimoser 1925. Sumatra
M. j. Reimoser 1925, Suppl. Ent. 10 p. 90 (D ♂).

♂♀ **kochi** Reimoser 1925. Malakka, I. Bintang, Sumatra
Janus melanocephalus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 22 TF. 1092 (D ♂).
Janigena melanocephala Karsch 1880, Zeitschr. ges. Naturw. 53 p. 394 (N ♂).
Synemosyna melanocephala Hasselt 1882, in: Veth, Midd. Sumatra 4 (11 A) p. 47 (D ♂).
Salticus melanocephalus Simon 1885, Ann. Soc. Ent. Belg. 29 C. R. p. 30 (D ♂).
Janigena melanocephala Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 278 (D).
Synemosyna melanocephala Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 224 (D ♂♀).
M. k. Reimoser 1925, Suppl. Ent. 10 p. 90 (N ♂).

♂♀ **laeta** (Thorell) 1887. Indien, Nias, S.-China
Synemosyna l. Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 339 (D ♀).
Ascalus l. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 321 (D ♂♀).
M. l. Gravely 1922, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 28 p. 1049 T. 4 F. 12 (N ♂♀).
M. l. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 220 T. 17 F. 160—164 (D ♂♀).

♂ **laeta flava** Narayan 1915. Indien, Panjab
M. l. f. Narayan 1915, Rec. Ind. Mus. Calcutta 11 p. 399 (D ♂).
M. l. f. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 221 (N ♂).

♂ **laeta praelonga** (Thorell) 1890. Burma
Synemosyna praelonga Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 64 (D ♂).
M. l. p. Strand 1909, Abh. Nat. Ges. Görlitz 26 p. 103 (D ♂).

♀ **lateralis** Badcock 1917. Malakka
M. l. Badcock 1917, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 310 f. 9b (D ♀).

♂ **leptognatha** (Thorell) 1890. Java
Salticus l. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 158 (D ♂).
Salticus l. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 242 (D ♂).

o **lugens** (Thorell) 1881. Ternate
Synemosyna l. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 406 (D o).

♂ **macgregori** Banks 1930. Luzon
M. m. Banks 1930, Psyche 37 (3) p. 213 T. 11 F. 9, 14 (D ♂).

♂ **macrognatha** (Thorell) 1894. Java

Salticus m. Thorell 1894, Bih. Svensk Vet. Ak. Handl. 20 (4; 4) p. 58 (D ♂)

♂ **magna** Saito 1933. Formosa

M. m. Saito 1933, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. 13 (1) p. 40 T. 3 F. 27**a**—g (D ♂).

♂ **mandibularis** (Thorell) 1890. Java

Toxeus m. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 156 (D ♂).
Toxeus m. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 220 (D ♂).

♂♀ **manducator** (Westwood) 1831. Indien, Burma, Malakka, Sumatra

Salticus m. Westwood 1831, Mag. Zool. p. 1 T. 1 (D ♀).
Salticus luridus Simon 1885, Bull. Soc. Zool. France 10 (4—6) p. 453 (D ♂).
Ascalus m. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 323 (D ♂).
M. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 500 (N).
M. lurida Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 500 (N).
M. m. Simon 1904, Arachn. in: Miss. Pavie Indo-Chin. 3 p. 290 T. 16 F. 8 (N ♂).
M. m. Reimoser 1925, Suppl. Ent. 10 p. 90 (N ♂).

♂♀ **maxillosa** (C. L. Koch) 1846. Burma, Malakka, Sumatra, Celebes Andamanen, Luzon, Formosa, Canton

Toxeus m. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 19 TF. 1090 (D ♂).
Synemosyna procera Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 538 (D ♂).
Toxeus procerus Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 346 (D ♂).
Salticus bellicosus Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 32 T. 2 F. 11 (D ♂).
Salticus modestus Thorell 1892, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 9 p. 235 (D ♀).
Toxeus m. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 328 (D ♀).
M. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 498—501 (N).
M. bellicosa Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 500 (N).
M. m. Simon 1905, Mitt. Nat. Mus. Hambg. 22 (2) p. 70 (C).
M. m. Szombathy 1913, Allat. Közlem. 12 p. 31, 56 f. 8 (N ♂).
M. m. Badcock 1917, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 287 f. 4 (D ♀).
M. m. Reimoser 1925, Suppl. Ent. 10 p. 90 (N ♂).

♂ **maxillosa septemdentata** Strand 1907. S.-China (Canton)

M. m. 7-dentata Strand 1907, Zool. Anz. 31 (17—18) p. 568 (D ♂).
M. m. s. Strand 1909, Abh. Nat. Ges. Görlitz 26 p. 99 (D ♂).

♀ **moesta** (Thorell) 1877. Celebes

Synemosyna m. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 541 (D ♀).

♂ **nemorensis** (Peckham) 1892. Burma

Salticus n. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 28 T. 2 F. 3 (D ♂).

♂ **nigella** Simon 1901. Luzon

Salticus niger Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 30 T. 2 F. 7 (D ♂).
M. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 503 (nom. nov.).

♀ **nigra** (Thorell) 1877. Celebes

Synemosyna n. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 544 (D ♀).
M. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 503 (N).

♂ **nitidissima** (Thorell) 1877. Celebes
Synemosyna n. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 546 (D ♂).

♂ **opaca** (Karsch) 1880. Indien
Synemosyna o. Karsch 1880, Zeitschr. ges. Naturw. 53 p. 395 (D ♂).
M. o. Banks 1930, Psyche 37 (3) p. 211 T. 7 F. 12 (N).

♂ **paivae** Narayan 1915. Indien
M. p. Narayan 1915, Rec. Ind. Mus. Calcutta 11 p. 403 T. 32 F. 8 (D ♂).

♂ **patellata** Strand 1907. S.-China
M. p. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (17—18) p. 568 (D ♂).
M. p. Strand 1909, Abh. Nat. Ges. Görlitz 26 p. 101 (D ♂).

♂ **paviei** (Simon) 1886. Siam
Salticus Simon 1886, Act. Soc. Linn. Bord. 40 p. 137 (D ♂).
Salticus p. Simon 1904, Aradın. in: Miss. Pavie Indo-Chin. 3 p. 290 (D ♂).

♂♀ **pectorosa** (Thorell) 1890. Sumatra
Salticus p. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 157 (D ♂).
Salticus p. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 234 (D ♀).

♀ **pectorosa sternodes** (Thorell) 1890. Sumatra
Salticus p. s. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 157 (D ♀).
Salticus p. s. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 234 (D ♀).

♂♀ **piercei** Banks 1930. Luzon
M. p. Banks 1930, Psyche 37 (3) p. 214 T. 11 F. 2 (D ♂♀).

♂♀ **plataleoides** (Cambridge) 1869. Ceylon, Indien
Salticus p. Cambridge 1869, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 3 p. 68 T. 6 F. 61—65 (D ♂).
Salticus p. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 33 T. 3 F. 1 (D ♂).
M. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 499 f. 586, 590—592 (N ♂).
M. p. Szombathy 1913, Allat. Közlem. 12 p. 23 f. 1—6 (N ♂♀).

♂ **prognatha** (Thorell) 1887. Burma
Synemosyna p. Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 343 (D ♂).

♂♀ **providens** (Peckham) 1892. Ceylon, Panjab
Salticus p. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 34 T. 3 F. 3 (D ♂♀).
M. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 500 (N).
M. p. Narayan 1915, Rec. Ind. Mus. Calcutta 11 p. 399 (N).
M. p. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 221 (N ♂).

♀ **pygmaea** (Thorell) 1894. Singapore
Ascalus p. Thorell 1894, Bih. Svensk. Vet. Ak. Handl. 20 (4; 4) p. 56 (D ♀).

o **radiata** (Thorell) 1894. Java
Herilus r. Thorell 1894, Bih. Svensk. Vet. Ak. Handl. 20 (4; 4) p. 61 (D o).

♂ **ramosa** Badcock 1917. Malakka
M. r. Badcock 1917, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 303 f. 8 (D ♂).

♂♀ **ramunni** Narayan 1915. Indien
M. r. Narayan 1915, Rec. Ind. Mus. Calcutta 11 p. 400 T. 32 F. 4 (D ♂).
M. r. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 221 (N ♀).

♂ **rhopalota** (Thorell) 1895. Burma
Ascalus r. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 326 (D ♂).

♂ **robusta** (Peckham) 1892. Burma
Salticus r. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 27 T. 2 F. 2 (D ♂).

♂ **roeweri** Reimoser 1934. Indien
M. r. Reimoser 1934, Rev. Suisse Zool. 41 (32) p. 500 f. 22 (D ♂).

♂ **rufescens** (Thorell) 1877. Celebes
Synemosyna r. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 552 (D ♂).

♂ **satarensis** Narayan 1915. Indien
M. s. Narayan 1915, Rec. Ind. Mus. Calcutta 11 p. 404 T. 32 F. 9 (D ♂).

♂ **seriatus** Banks 1930. Luzon
M. s. Banks 1930, Psyche 37 (3) p. 215 T. 11 F. 5 (D ♂).

♂ **shelfordii** Peckham 1907. Borneo
M. s. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 603 (D ♂).

♂ **spissa** (Peckham) 1892. Ceylon
Salticus s. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 37 T. 2 F. 8 (D ♂).
M. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 500 (N).

♂ **tagalica** Banks 1930. I. Mindanao
M. t. Banks 1930, Psyche 37 (3) p. 212 T. 11 F. 1, 10 (D ♂).

♂ **tayabasana** Chamberlin 1925. Philippinen
M. t. Chamberlin 1925, Bull. Mus. Zool. Harvard 67 p. 232 (D ♂).

♂♀ **turriformis** Badcock 1917. Malakka
M. t. Badcock 1917, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 296 f. 6 (D ♂♀).

♂ **uniseriata** Narayan 1915. Indien
M. u. Narayan 1915, Rec. Ind. Mus. Calcutta 11 p. 402 T. 32 F. 6 (D ♂).

♀ **vestita** (Thorell) 1895. Burma
Ascalus v. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 322 (D ♀).

Australische Arten:

♂ **bicolor** (L. Koch) 1879. Queensland
Salticus b. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1055 T. 93 F. 2 (D ♂).

o **cognata** (L. Koch) 1879. Victoria, Neu-S.-Wales
Leptorchestes c. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1063 T. 93 F. 6 (D o).

♀ **cuprea** (Hogg) 1896. Centr. Australien
Leptorchestes c. Hogg 1896, Aran. in: Rep. Horn Exped. 2 (Zool.) p. 352 T. 24 F. 16, 17 (D ♀).

♀ **erythrocephala** (L. Koch) 1879. Queensland
Leptorchestes e. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1057 T. 93 F. 3 (D ♀).

♂ **luctuosa** (L. Koch) 1879. Neu-S.-Wales
Leptorchestes l. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1065 T. 93 F. 7 (D ♂).

♂ **lupata** (L. Koch) 1879. Queensland
Synemosyna l. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1052 T. 93 F. 1 (D ♂).

♂ **macleayana** (Bradley) 1876. Queensland
Salticus m. Bradley 1876, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1 (3) p. 220 T. 2 F. 1 (D ♂).

♀ **simoni** (L. Koch) 1879. Queensland
Leptorchestes s. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1061 T. 93 F. 5 (D ♀).

♀ **striatipes** (L. Koch) 1879. Queensland, Neu-S.-Wales
Leptorchestes s. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1059 T. 93 F. 4 (D ♀).

Neotropische Arten:

§ 2 ♂, 2 ♀: F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 173 (sub **Toxeus**).
§ 5 Arten: Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 64—65.

♂♀ **armata** (Peckham) 1892. Peru
Salticus a. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 20 T. 7 F. 6 (D ♂).
M. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 502 (N).

♂ **brasiliensis** Mello-Leitao 1922. Brasilien
M. b. Mello-Leitao 1922, Ann. Soc. Ent. France 91 p. 219 f. 21, 22 (D ♂).
M. b. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 66 T. 2 F. 7 (D ♂).

♂♀ **centralis** (Peckham) 1892. Centr. Amerika, Mexico
Salticus c. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 19 T. 1 F. 6 (D ♀).
Toxeus c. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 173 T. 11 F. 9—11 (D ♂♀).
M. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 503 (N).
M. c. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 455 (N ♂♀).

♂♀ **championi** (F. Cambridge) 1900. Centr. Amerika, Mexico
Toxeus c. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 174 T. 11 F. 12—13 (D ♂♀).
M. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 503 (N).
M. c. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 456 (N ♂♀).

♂ **melanocephala** Mac Leay 1839. – * Cuba
M. m. Mac Leay 1839, Ann. Mag. Nat. Hist. (1) 2 p. 11 T. 1 F. 4 (D ♂).
Myrmecia m. Walckenaer 1841, Hist. Nat. Ins. Apt. 2 p. 462 (D ♀).
M. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 505 (N).

♀ **melanops** (Taczanowski) 1871. Guiana, Peru
Salticus m. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 117 (D ♀).
M. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 503 (N).

♂ **parallela** (Fabricius) 1798. Antillen
Aranea p. Fabricius 1798, Syst. Ent. Suppl. p. 292 (D).
Attus p. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 474 (D ♂).
M. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 503 (N).

♂ **penicillata** Mello-Leitao 1933. Brasilien
M. p. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 67 T. 2 F. 9 (D ♂).

Nearktische Arten:

♂♀ **albocincta** (C. L. Koch) 1846. U. St. Amerika

Salticus a. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 36 TF. 1105 (D ♂).
Salticus ephippiatus Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 249 T. 21 F. 4 (D ♀).
M. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 503 (N).
M. a. Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 233 (N).
M. a. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 371 T. 50 F. 2 (D ♂♀).

♂♀ **hentzi** Banks 1913. U. St. Amerika

Salticus ephippiatus Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 96 T. 6 F. 73 (D ♂♀).
Salticus ephippiatus Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 p. 18 T. 1 F. 2 (D ♂♀).
M. h. Banks 1913, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 65 p. 188 (nom. nov.).
M. ephippiata Kaston 1938, Bull. Connect. Geol. Nat. Hist. Surv. 60 p. 196 (N).
M. h. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 449 T. 86 F. 1611—12; T. 87 F. 1625—27 (D ♂♀).

Arten ungenannter Herkunft:

♂ **jugularis** Simon 1901. Patria?

M. j. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 499 f. 593 (N ♂).

Gen. **Panachraesta** Simon 1900.

♀ **paludosa** Simon 1900. Ceylon

P. p. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 405 (D ♀).
P. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 504 f. 596, 597 (N ♀).

Gen. **Pseudomarengo** Caporiacco 1947.

♂ **inermis** Caporiacco 1947. – * Ost-Afrika

P. i. Capariacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 228 T. 2 F. 63 (D ♂).

♀ **rufescens** Caporiacco 1947. Ost-Afrika

P. r. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 229 T. 2 F. 64 (D ♀).

3. Gr. Sarindeae

Gen. **Arindas** Mello-Leitao 1933.

♀ **ornatus** Mello-Leitao 1933. Parana

A. o. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 88 T. 3 F. 15 (D ♀).

Gen. **Erica** Peckham 1892.

♂♀ **eugenia** Peckham 1892. – * Brasilien, Peru, Panama

E. e. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 55 T. 4 F. 9 (D ♂♀).
E. e. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 175 T. 12 F. 10 (N ♂♀).
E. e. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 508 (N).
E. e. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. E. d. Janeiro 9 (2) p. 81 (D ♂♀).
E. e. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 454 (N).

Gen. **Parafluda** Chickering 1946.

♂ **banksi** Chickering 1946. Panama

P. b. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 456 f. 419—424 (D ♂).

Gen. **Sarinda** Peckham 1892.

§ 11 Arten: Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 73—74.
§ 3 Arten: Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 460.

♂ **albianus** Mello-Leitao 1947. Süd-Brasilien

S. a. Mello-Leitao 1947, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan., Zool. 80 (N. S.) Zool. 29 T. 1 F. 3—4 (D ♂).

♂ **armata** (Taczanowski) 1871. Guiana

Janus a. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 123 (D ♂).
S. a. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 74 (N).

♀ **australis** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires

S. a. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 3 (24) p. 387 f. 85 (D ♀).

♀ **bicavata** Chickering 1946. Panama

S. b. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 460 f. 425—427 (D ♀).

♂ **elongata** Mello-Leitao 1940. Guiana

S. e. Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. Paulista 25 p. 189 TF. 30 (D ♂).

♂ **flavimana** Mello-Leitao 1940. Guiana

S. f. Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. Paulista 25 p. 189 (D ♂).

♂♀ **laeta** Peckham 1892. Brasilien, Guatemala

S. l. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 41 T. 3 F. 6 (D ♂).
Martella pottsii Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 45 T 4 F. 2 (D ♂♀).
Martella pottsii F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 174 T. 11 F. 14, 15 (D ♂♀).
S. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 506 f. 600—603 (N).
S. pottsii Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 703 (C).
S. l. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 75 (D ♂♀).

♀ **lineatipes** (F. Cambridge) 1900. Costa Rica, Mexico

Martella l. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 175 T. 11 F. 16 (D ♀).
S. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 507 (N).

♂♀ **marcosi** Piza 1937. S.-Brasilien

S. m. Piza 1937, Rev. Mus. Paulista 23 p. 309 T. 1 F. 1—3 (D ♂♀).

♂♀ **maria** (Peckham) 1892. Parana

Martella m. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 46 T. 4 F. 3 (D ♀).
S. m. Mello-Leitao 1922, Ann. Soc. Ent. France 91 p. 221 (D ♂).
S. m. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 76 (D ♀).

♂ **mariana** Mello-Leitao 1933. Parana

S. m. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 77 (D ♂).

♀ **mulata** Mello-Leitao 1939. San Paulo
S. m. Mello-Leitao 1939, Bol. Biol. S. Paulo (N. S.) 4 (2) p. 290 f. 11—12 (D ♀).

♀ **multifasciata** Mello-Leitao 1933. Amazonas
S. m. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 79 T. 3 F. 12 (D ♀).

♂♀ **nigra** Peckham 1892. – * Brasilien, Mato Grosso
S. n. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 40 T. 3 F. 5 (D ♂♀).
S. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 508 f. 604 (N ♂).
S. n. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 74 (D ♂♀).

♀ **obesa** Mello-Leitao 1933. Pernambuco
S. o. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 79 T. 2 F. 11 (D ♀).

♂ **pretiosa** Banks 1909. Costa Rica
S. p. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 225 T. 6 F. 21 (D ♂).

♂ **scutata** Mello-Leitao 1947. Süd-Brasilien
S. s. Mello-Leitao 1947, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. (N. S.) 80, Zool. p. 30 T. 1 F. 7; T. 2 F. 8; T. 5 F. 17 (D ♂).

♀ **silvatica** Chickering 1946. Panama
S. s. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 463 f. 428—430 (D ♀).

♀ **stricta** Chickering 1946. Panama
S. s. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 466 f. 431—432 (D ♀).

♀ **zorodes** Mello-Leitao 1922. Brasilien
S. z. Mello-Leitao 1922, Ann. Soc. Ent. France 91 p. 222 (D ♀).
S. z. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro (9) 2 p. 78 (D ♀).

4. Gr. Synemosyneae

Gen. **Simonella** Peckham 1885.

Orientalische Arten:

♂ **formosana** Saito 1933. Formosa
S. f. Saito 1933, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. 13 (1) p. 40 T. 3 F. 5a—e (D ♂).

Neotropische Arten:

§ 3 ♂, 2 ♀: F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 169.
§ 11 Arten: Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 52—55.

♂♀ **americana** Peckham 1885. – * Guatemala, Panama
S. a. Peckham 1885, Proc. Nat. Hist. Soc. Wiscons. p. 23 T. 1 F. 1 (D ♂).
S. a. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 341 (D).
S. a. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 252 T. 12 F. 4 (D ♂).
S. a. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 252 T. 12 F. 4 (D ♂).
S. a. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 80 T. 7 F. 3 (D ♂).
S. a. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 170 T. 11 F. 17 (D ♂♀).
S. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 511 (N).
S. a. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 468 (N).

♀ **atrogaster** Mello-Leitao 1941. Rio Negro
S. a. Mello-Leitao 1941, Arqu. Inst. Biol. S. Paulo 11 (30) p. 256 (D ♀).

♀ **aurantiaca** Mello-Leitao 1917. Brasilien
S. a. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 138 (D ♀).
S. a. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 58 T. 1 F. 2 (D ♀).

♂♀ **bicolor** Peckham 1892. Venezuela, Panama
S. b. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 83 T. 7 F. 5 (D ♀).
S. b. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 171 T. 12 F. 1, 2 (D ♂♀).
S. b. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 468 (N ♂♀).

♀ **bimaculata** Mello-Leitao 1917. Brasilien
S. b. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 139 (D ♀).
S. b. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 58 T. 1 F. 3 (D ♀).

♀ **claustrorum** Mello-Leitao 1933. Rio Negro, Parana
S. c. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 62 T. 1 F. 6 (D ♀).

♂♀ **decipiens** Cambridge 1896. Mexico
S. d. Cambridge 1896, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 163 T. 19 F. 15, 16 (D ♂♀).
S. d. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 171 T. 12 F. 3, 4 (N ♂♀).

♀ **fissidentata** Szombathy 1913. Paraguay
S. f. Szombathy 1913, Allat. Közlem. 12 p. 34, 57 f. 10, 11 (D ♀).

♀ **lucasii** (Taczanowski) 1871. Guiana
Janus l. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 127 T. 3 F. 10 (D ♀).
S. l. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 254 T. 12 F. 9 (D ♀).

♂♀ **mastigostyla** Mello-Leitao 1917. Brasilien
S. m. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 140 TF. 2 (D ♂).
S. m. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 59 T. 1 F. 4; T. 2. F. 8 (D ♂♀).

♂♀ **myrmeciaeformis** (Taczanowski) 1871. Brasilien, Guiana
Janus m. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 125 T. 4 F. 9 (D ♂).
S. m. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 253 T. 12 F. 8 (D ♂).
S. m. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 81 T. 7 F. 4 (D ♂♀).
S. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 509 f. 605—609 (N ♂).

♂♀ **peckhami** Mello-Leitao 1933. Brasilien
S. p. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 56 (D ♂♀).

♂ **petrunkevitchi** Chapin 1922. Florida
S. p. Chapin 1922, Proc. Biol. Soc. Wash. 34 p. 129 f. 1, 2 (D ♂).

♀ **scutata** Mello-Leitao 1943. Rio Grande do Sul
S. s. Mello-Leitao 1943, Arqu. Mus. Nac. R. d. Jan. 37 p. 231 TF. 58 (D ♀).

♀ **simplex** Chamberlin 1925. Guatemala
S. s. Chamberlin 1925, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 67 p. 232 (D ♀).

♂ **taperae** Mello-Leitao 1933. Brasilien
S. t. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 61 T. 1 F. 5 (D ♂).

♂♀ **ypsilon** Piza 1937. S.-Brasilien
S. y. Piza 1937, Rev. Mus. Paulista 23 p. 311 T. 1 F. 3, 4; T. 2 F. 5 (D ♂♀).

Gen. **Synemosyna** Hentz 1846.

Neotropische Arten:

§ 7 Arten: Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 47.

♀ **fasciata** Mello-Leitao 1922. Brasilien
S. f. Mello-Leitao 1922, Ann. Soc. Ent. France 91 p. 222 (D ♀).
S. f. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 51 (D ♀).

♀ **hentzii** Peckham 1892. Brasilien, Mato Grosso
S. h. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 78 T. 7 F. 2 (D ♀).
S. h. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 48 (D ♀).

♂♀ **lauretta** Peckham 1892. Brasilien
S. l. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 79 T. 7 F. 1 (D ♂♀).
S. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 509 f. 610, 611 (N ♂).
S. l. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 142 (D ♂♀).
S. laureta Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 49 (D ♂♀).

♂ **magniscuti** Mello-Leitao 1939. San Paulo
S. m. Mello-Leitao 1939, Bol. Biol. S. Paulo (N. S.) 4 (2) p. 292 f. 13—14 (D ♂).

♀ **melanura** Mello-Leitao 1917. Brasilien
S. m. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 142 (D ♀).
S. m. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 50 (D ♀).

♂♀ **smithi** Peckham 1893. St. Vincent, Cuba
S. s. Peckham 1893, Proc. Zool. Soc. London p. 692 T. 61 F. 1 (D ♂♀).
S. formica Banks 1909, Sec. Rep. Centr. Exper. Stat. Cuba p. 169 (N).
S. s. Banks 1926, Trans. Ent. Soc. London 74 p. 427 T. 93 F. 5—6 (N ♂♀).
S. s. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 450 T. 18 F. 244, 246 (D ♂♀).

♀ **subtilis** (Taczanowski) 1871. Guiana
Janus s. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 122 (D ♀).
S. s. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nat. R. d. Janeiro 9 (2) p. 48 (N).

Nearktische Arten:

♂♀ **formica** Hentz 1846. – * U. St. Amerika
? Myrmecia lunata Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 387 (D ♂).
? Myrmecia rubra Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 387 (D ♂♀).
S. f. Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 368 T. 22 F. 18 (D ♀).
Janus gibberosus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 21 TF. 1091 (D ♀).
S. f. Peckham 1883, Descr. Spid. Fam. Attid. p. 30 T. 3 F. 23 (D ♂♀).
S. f. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 278 (D).
S. f. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 93 T. 6 F. 70 (D ♂♀).
S. f. Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 243 T. 21 F. 5 (D ♂♀).

S. f. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 77 T. 6 F. 4 (D ♂♀).
S. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 512 f. 612 (N ♂).
S. f. Emerton 1902, Common Spid. p. 64 f. 163, 164 (D ♂♀).
S. f. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 366 T. 50 F. 1 (D ♂♀)
? **Myrmecium lunatum** Simon 1897, Hist. Nat. Araign. 2 (1) p. 170 (N).
S. f. Comstock 1912, Spider Book p. 672 f. 743, 744, 747 (N).
? **Myrmecium lunatum** Mello-Leitao 1932, Ann. Ac. Bras. Sci. 4 (4) p. 151 (N).
S. **lunata** Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 215 (N ♂♀).
? **Myrmecium rubrum** Mello-Leitao 1932, Ann. Ac. Bras. Sci. 4 (4) p. 150 (N).
S. f. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 25 p. 208 f. 136—139 (D ♂♀).
S. f. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 448 T. 86 F. 1609—10 T. 87 F. 1623—24 (D ♂♀).

5. Gr. Sobasineae

Gen. **Fluda** Peckham 1892.

§ 5 Arten: Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 89—90.

♂ **angulosa** Simon 1900. Venezuela

F. a. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 407 (D ♂).
F. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 513 f. 619 (N ♂).

♀ **goianinae** Soares & Camargo 1948. Brasilien

F. g. Soares & Camargo 1948, Rev. Bras. Biol. Rio. d. Jan. 8 (4) p. 442 f. 38—40 (D ♀).

♂♀ **narcissa** Peckham 1892. – * Brasilien, Mato Grosso

F. n. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 57 T. 4 F. 10 (D ♀).
F. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 516 (N).
F. n. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 90 (D ♂♀).

♂ **nigritarsis** Simon 1900. Venezuela

F. n. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 406 (D ♂).
F. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 513 f. 618 (N ♂).

♂ **opica** (Peckham) 1892. Amazonas

Martella o. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 47 T. 4 F. 4 (D ♂).
F. o. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 513 f. 616, 617 (N ♂).
F. o. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 91 (D ♂).

♂♀ **princeps** Banks 1929. Panama

F. p. Banks 1929, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 69 (3) p. 73 T. 2 F. 22; T. 3 F. 38; T. 4 F. 73 (D ♂♀).
F. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 454 (N ♂♀).

♂♀ **ruficeps** (Taczanowski) 1878. Peru

Salticus r. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 369 (D ♂♀).
F. r. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 58 T. 5 F. 3 (D ♀).

♂ **usta** Mello-Leitao 1940. Guiana

F. u. Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. Paulista 25 p. 186 TF. 21—22 (D ♂).

Gen. **Keyserlingella** Peckham 1892.

♂ **cara** Peckham 1892. Guatemala
K. c. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 71 T. 5 F. 8 (D ♂).
K. c. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 177 T. 12 F. 9 (N ♂).

♀ **minuta** Peckham 1893. St. Vincent
K. m. Peckham 1893, Proc. Zool. Soc. London p. 693 (D ♀).

♂♀ **perdita** Peckham 1892. – * Columbien
K. p. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 70 T. 5 F. 7 (D ♂♀).
K. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 516 (N).

Gen. **Pseudofluda** Mello-Leitao 1928.

♂ **pulcherrima** Mello-Leitao 1928. Brasilien
P. p. Mello-Leitao 1928, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 4 (3) p. 47 (D ♂).
P. p. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 97 T. 2 F. 16 (D ♂).

Gen. **Sobasina** Simon 1897.

♂♀ **amoenula** Simon 1897. Austral. I. Vanikoro
S. a. Simon 1897, Ann. Soc. Ent. France 66 p. 276 (D ♀).
S. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 515 f. 613—615 (N).
S. a. Berland 1938, Ann. Soc. Ent. France 107 p. 151 f. 50—60 (D ♂, N ♀).

3. Subfam. Magoninae

1. Gr. Codeteae

Gen. **Codeta** Simon 1900.

♂ **argenteolimbata** Simon 1900. – * Singapore
C. a. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 33 (D ♂).
C. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 413 f. 444—446 (N ♂).

♂ **bouchardi** Simon 1903. Sumatra
C. b. Simon 1903, Ann. Soc. Ent. France 72 p. 305 (D ♂).

Gen. **Gelotia** Thorell 1890.

♀ **frenata** Thorell 1890. Sumatra
G. f. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 164 (D ♀).
G. f. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 345 (D ♀).
G. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 413 (N).

Gen. **Policha** Thorell 1892.

♀ **bimaculata** (Thorell) 1890. Borneo
Gelotia b. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 165 (D ♀).
P. b. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 348, 351 (nom. nov.).
P. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 413 (N).

2. Gr. Amyceae

Gen. **Acragas** Simon 1900.

♂♀ **carinatus** Crane 1943. Brit. Guiana, Venezuela
A. c. Crane 1943, Zoologica, N. York 28 (3; 16) p. 129 f. 2 A—F (D ♂♀).

♂ **castaneiceps** Simon 1900. Brasilien
A. c. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 39 (D ♂).

♂ **concolor** Mello-Leitao 1922. Brasilien
A. c. Mello-Leitao 1922, Ann. Soc. Ent. France 91 p. 215 f. 14, 15 (D ♂).

♂ **erythraeus** Simon 1900. Brasilien
A. e. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 41 (D ♂).

♂ **humilis** Simon 1900. Brasilien
A. h. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 41 (D ♂).

♂ **leucaspis** Simon 1900. Venezuela
A. l. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 38 (D ♂).

♂ **longimanus** Simon 1900. – * Brasilien
A. l. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 37 (D ♂).
A. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 426 f. 452—454 (N).

♂ **miniaceus** Simon 1900. Brasilien
A. m. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 40 (D ♂).
A. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 415 f. 455 (N).

♂ **phasianius** Simon 1900. Brasilien
A. p. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 40 (D ♂).

♂ **procalvus** Simon 1900. Peru
A. p. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 39 (D ♂).

♂ **rosenbergi** Simon 1901. Ecuador
A. r. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 416 f. 456, 457 (D ♂).

♂ **taczanowskii** Mello-Leitao 1948. Brit. Guiana
A. t. Mello-Leitao 1948, An. Ac. Bras. Ci. 20 p. 187 f. 27 (D ♂).

♂ **trimaculatus** Mello-Leitao 1917. Brasilien
A. t. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 129 TF. 3, 7 (D ♂).

♂ **unidentatus** Mello-Leitao 1930. Amazonas
A. u. Mello-Leitao 1930, Arch. Mus. Nac. R. d. Janeiro 32 p. 68 TF. 36, 37 (D ♂).

Gen. **Amphidraus** Simon 1900.

♂ **auriga** Simon 1900. – * Bolivien
A. a. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 60 (D ♂).
A. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 428 f. 475, 476 (N ♂).

♂ **nigritarsis** Simon 1900. Venezuela
A. n. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 60 (D ♂).
A. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 419 f. 477 (N ♂).

Gen. **Amycus** C. L. Koch 1846.

§ 5 ♂, 2 ♀: F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 192—193.
§ 7 ♂: Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 347—348.

♂ **annulatus** Simon 1900. Brasilien

A. a. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 36 (D ♂).

♂ **argentinus** Mello-Leitao 1945. Argentinien

A. a. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 275 f. 63 (D ♂).

♀ **australis** Mello-Leitao 1941. Brasilien

A. a. Mello-Leitao 1941, Arqu. Inst. Biol. S. Paulo 11 (30) p. 255 (D ♀).

♂♀ **benignus** (Peckham) 1885. Panama, Guatemala, Mexico

Triptolemus b. Peckham 1885, Proc. Nat. Hist. Soc. Wiscons. p. 64 T. 2 F. 2 (D ♂).
A. b. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 18 T. 1 F. 2 (D ♂♀).
A. majori Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 25 T. 1 F. 6 (D ♂♀).
A. b. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 193 T. 14 F. 5, 6 (N ♂♀).
Lyssomonea saphes Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah 27 (5), Biol. 3 (5) p. 31 T. 5 F. 36; T. 8 F. 56—57 (D ♂).
A. b. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 348 (N ♂♀).

♂♀ **cambridgei** Bryant 1942. San Domingo

A. c. Bryant 1942, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 457 T. 2 F. 12, 13, 16, 17, 19 (D ♂♀).

♂♀ **carvalhoi** Mello-Leitao 1949. Süd-Brasilien

A. c. Mello-Leitao 1949, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan., Zool. 80 p. 22 T. 1 F. 1—2; T. 6 F. 16 (D ♂♀).

♂♀ **crocutus** Taczanowski 1878. Peru

A. c. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 355 (D ♂♀).

♀ **delicatus** (Blackwall) 1862. Brasilien

Salticus d. Blackwall 1862, Ann. Mag. Nat. Hist. 3 (10) p. 353 (D ♀).
A. d. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 591 (C).

♂ **ectypus** Simon 1900. Brasilien

A. e. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 34 (D ♂).

♂ **equulus** Simon 1900. Brasilien

A. e. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 36 (D ♂).

♂♀ **fallax** Peckham 1896. Panama

A. f. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 22 T. 1 F. 3 (D ♂♀).
A. f. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 195 T. 15 F. 4, 5 (N ♂♀).
A. palpinalis F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 195 T. 14 F. 11 (D ♂).
A. palpinalis Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 196 f. 112 bis 117 (D ♂).
A. f. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 349 (N ♂♀).

♂ **flavicomis** Simon 1900. Brasilien

A. f. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 36 (D ♂).

♂ **flavolineatus** C. L. Koch 1846. Mexico

A. f. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 185 TF. 1234 (D ♂).
Attus f. Walckenaer 1847, Hist. Nat. Ins. Apt. 4 p. 428 (N).

♂♀ **fuscomanus** Taczanowski 1878. Peru

A. f. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 347 (D ♂♀).

♀ **gertschi** Soares & Camargo 1948. Süd-Brasilien

A. g. Soares & Camargo 1948, Rev. Bras. Biol. R. d. Jan. 8 (4) p. 437 f. 29 (D ♀).

♂♀ **hieroglyphicus** Peckham 1896. Panama, Mexico

A. h. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 23 T. 1 F. 4 (D ♂♀).
A. h. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 194 T. 14 F. 9, 10 (N ♂♀).
A. h. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 349 (N).

♂ **igneus** (Perty) 1833. – * Brasilien

Salticus i. Perty 1833, Delect. Anim. Artic. p. 199 T. 39 F. 7 (D ♂).
Attus i. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 475 (D ♂).
A. i. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 182 TF. 1232 (D ♂).
A. i. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 302 (D).
A. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 426 (N).

♀ **lechugalensis** Taczanowski 1878. Peru

A. l. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 351 (D ♀).

♂ **longipalpus** Peckham 1885. Guatemala

A. l. Peckham 1885, Proc. Nat. Hist. Soc. Wiscons. p. 66 T. 2 F. 3 (D ♂).
A. l. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 19 (D ♂).
A. l. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 195 (N ♂).

♂♀ **lycosiformis** Taczanowski 1878. Peru

A. l. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 359 (D ♂♀).

♂♀ **mystacalis** Taczanowski 1878. Peru

A. m. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 358 (D ♂♀).

♂ **pacatus** Peckham 1896. Centr. Amerika

A. p. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 20 T. 1 F. 5 (D ♂).
A. p. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 195 T. 15 F. 3 (N ♂).

♂♀ **peckhami** Chickering 1946. Panama

A. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 349 f. 304—310 (D ♂♀).

♂ **pertyi** Simon 1900. Peru

A. p. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 34 (D ♂).
A. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 415 f. 447—451 (N ♂).

♂♀ **quadriguttatus** F. Cambridge 1901. Panama, Guatemala, Mexico

A. q. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 194 T. 14 F. 7, 8 (D ♂♀).
A. q. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 354 (N ♀).

♂♀ **rufifrons** Simon 1900. Brasilien

A. r. Simon 1896 in: Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 17 T. 1 F. 1 (nom. nud.).
A. r. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 35 (D ♂♀).

♂♀ **spectabilis** C. L. Koch 1846. Brasilien, Peru

A. s. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 134 TF. 1233 (D ♂).
A. s. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 345 (N ♂♀).

♂♀ **spinipes** (Taczanowski) 1871. Guiana, Peru

Attus s. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Boss. 8 p. 65 (D ♂♀).
A. s. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 593 (C).

♂ **spiralifer** F. Cambridge 1901. Guatemala, Panama

A. s. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 196 T. 15 F. 2 (D ♂).
A. s. Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 199 f. 118, 119 (D ♂).
A. s. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 354 (N O).

♂♀ **steindachneri** Taczanowski 1878. Peru

A. s. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 349 (D ♂♀).

♂♀ **thoracicus** Taczanowski 1878. Peru

A. t. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 353 (D ♂♀).

♂ **tristis** Mello-Leitao 1940. Brasilien

A. t. Mello-Leitao 1940, Ann. Ac. Bras. Sci. 12 (1) p. 30 (D ♂).

♂ **zeteki** Chickering 1946. Panama

A. z. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 355 f. 311—315 (D ♂).

Gen. **Cobanus** F. Cambridge 1900.

Orientalische Arten:

♂ **beebei** Petrunkevitch 1914. Borneo

C. b. Petrunkevitch 1914, Ann. Ent. Soc. Amer. 7 (3) p. 173 T. 26 F. 14—18 (D ♂).

Neotropische Arten:

§ 5 ♂, 2 ♀: F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p, 189.
§ 9 ♂, 7 ♀: Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 358—359.

♂♀ **bifurcatus** Chickering 1946. Panama

C. b. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 364 f. 322—325 (D ♂♀).

♂♀ **cambridgei** Chickering 1946. Panama

C. c. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 360 f. 316—321 (D ♂♀).

♂♀ **electus** Chickering 1946. Panama

C. e. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 369 f. 326—330 (D ♂♀).

♂♀ **extensus** (Peckham) 1896. – * Panama

Helorus e. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 30 T. 2 F. 2 (D ♂).

C. e. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 190 T. 13 F. 20—21 (N ♂♀).
Helpidius e. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 428 f. 478 (N ♂).
C. e. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 374 (N ♂♀).

♂♀ **flavens** (Peckham) 1896. Panama
Helorus f. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 31 T. 2 F. 3 (D ♂).
C. f. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 190 T. 14 F. 1—2 (D ♂♀).
C. f. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 374 (N ♂♀).

♀ **incurvus** Chickering 1946. Panama
C. i. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 375 f. 331—332 (D ♀).

♂ **mandibularis** (Peckham) 1896. Panama
Helorus m. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 29 T. 2 F. 1 (D ♂).
C. m. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 190 T. 13 F. 19 (D ♂).
C. m. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 377 (N ♂).

♀ **obscurus** Chickering 1946. Panama
C. o. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 377 f. 333—334 (D ♀).

♂♀ **perditus** (Banks) 1898. Mexico
Helorus p. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 283 T. 17 F. 19 (D ♂♀).
C. p. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 191 (N ♂♀).

♂♀ **scintillans** Crane 1943. Brit. Guiana, Venezuela
C. s. Crane 1943, Zoologica, N. York 28 (3; 16) p. 131 f. 2G—M (D ♂♀).

♀ **seclusus** Chickering 1946. Panama
C. s. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 380 f. 335—336 (D ♀).

♂ **subfuscus** F. Cambridge 1900. Costa Rica, Panama
C. s. F. Cambridge 1900, Biol. Zentr. Amer. Aran. 2 p. 191 T. 14 F. 4 (D ♂).
C. s. Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 201 f. 120—121 (D ♂).
C. s. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 382 (N ♂).

♂ **unicolor** F. Cambridge 1900. Costa Rica, Panama
C. u. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 190 T. 14 F. 3 (D ♂).
C. u. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 382 (N ♂).

Gen. **Dasyophrys** Mello-Leitao 1930.

♂ **nigra** Mello-Leitao 1930. Amazonas
D. n. Mello-Leitao 1930, Arch. Mus. Nac. R. d. Jan. 32 p. 73 TF. 47 (D ♂).

Gen. **Encolpius** Simon 1900.

♂ **abrahami** Mello-Leitao 1948. Brit. Guiana
E. a. Mello-Leitao 1948, An. Ac. Bras. Ci. 20 p. 189 f. 29 (D ♂).

♂ **albobarbatus** Simon 1900. – * Amazonas
E. a. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 59 (D ♂).
E. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 427 f. 474 (N ♂).

♂♀ **fimbriatus** Crane 1943. Brit. Guiana, Venezuela
E. f. Crane 1943, Zoologica, N. York 28 (3; 16) p. 135 f. 3J—N (D ♂♀).

Gen. **Hypaeus** Simon 1900.

♂ **annulifer** Simon 1900. Amazonas
H. a. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 46 (D ♂).

♂ **barromachadoi** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
H. b. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 30 (D ♂).
H. b. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 698 TF. 122 (D ♂).

♂ **bivittatus** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
H. b. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 30 (D ♂).
H. b. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 699 TF. 123 (D ♂).

♂ **catharinensis** Mello-Leitao 1927. Süd-Brasilien
H. c. Mello-Leitao 1927, Rev. Mus. Paulista 15 p. 409 T. 15 F. 7 (D ♂).

♂ **concinnus** Simon 1900. Brasilien
H. c. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 48 (D ♂).
H. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 415 f. 459—461 (N ♂).

♂ **cucullatus** Simon 1900. Ecuador
H. c. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 49 (D ♂).

♂ **duodentatus** Crane 1943. Brit. Guiana
H. d. Crane 1943, Zoologica, N. York 28 (3; 16) p. 134 f. 3F—I (D ♂).

♂ **estebanensis** Simon 1900. Venezuela
H. e. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 44 (D ♂).

♂ **flavipes** Simon 1900. Brasilien, Guiana
H. f. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 45 (D ♂).
H. f. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 698 TF. 121 (N ♂).

♂ **flemingi** Crane 1943. Venezuela
H. f. Crane 1943, Zoologica, N. York 28 (3; 16) p. 132 f. 3A—E (D ♂).

♂ **frontosus** Simon 1900. Amazonas, Peru
H. f. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 47 (D ♂).

♂ **furcifer** Simon 1900. Brasilien
H. f. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 48 (D ♂).

♂ **ignicomis** Simon 1900. Amazonas
H. i. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 47 (D ♂).
H. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 419 f. 464 (N ♂).

♂ **luridomaculatus** Simon 1900. Amazonas
H. l. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 48 (D ♂).

♂ **miles** Simon 1900. Amazonas
H. m. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 46 (D ♂).

♂ **nigrocomosus** Simon 1900. Brasilien
H. n. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 49 (D ♂).
H. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 419 f. 467 (N).

♂ **petropolis** Mello-Leitao 1943. Brasilien
H. p. Mello-Leitao 1943, Ann. Ac. Bras. Sci. 15 (3) p. 263 (D ♂).

♂ **porcatus** (Taczanowski) 1871. – * Guiana
Attus p. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 53 T. 4 F. 5 (D ♂).
H. p. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 45 (D ♂).
H. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 426 (N).
H. p. Crane 1943, Zoologica, N. York 28 (3; 16) p. 132 f. 2 N—Q (N).

♂ **quadrinotatus** Simon 1900. Amazonas
H. q. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 44 (D ♂).
H. q. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 419 f. 465, 466 (N ♂).

♂ **tenuimanus** Simon 1900. Amazonas
H. t. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 42 (D ♂).

♂ **triplagiatus** Simon 1900. Amazonas
H. t. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 43 (D ♂).

♂ **venezuelanus** Simon 1900. Venezuela
H. v. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 42 (D ♂).
H. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 415 f. 462, 463 (N ♂).

♂ **vividus** Simon 1900. Brasilien
H. v. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 42 (D ♂).

Gen. **Kolomana** Roewer 1951.

♂ **orientalis** (Szombathy) 1915. Singapore
Pseudamycus o. Scombathy 1915, Ann. Mus. Nat. Hungar. 13 p. 474 f. 5 (D ♂).
K. o. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 450 (gen. nov.).

Gen. **Letoia** Simon 1900.

♀ **ephippiata** Simon 1900. Venezuela
L. e. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 61 (D ♀).
L. e. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 429 (N).

Gen. **Maenola** Simon 1900.

♀ **brasiliana** Soares & Camargo 1948. Mato Grosso
M. b. Soares & Camargo 1948, Bol. Mus. Paraens. Goeldi 10 p. 399 f. 74—75 (D ♀).

♀ **lunata** Mello-Leitao 1940. Guiana
M. l. Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. Paulista 25 p. 186 TF. 23—24 (D ♀).

♂ **starkei** Simon 1900. – * Venezuela
M. s. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 37 (D ♂).
M. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 426 f. 458 (N ♂).

Gen. **Mago** Cambridge 1882.

♂♀ **acutidens** Simon 1900. Brasilien, Guiana
M. a. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 56 (D ♂).
M. a. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 697 TF. 119 (D ♀).

♂ **angustichelis** Simon 1901. Venezuela
M. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 420 (D ♂).

♂ **australis** Mello-Leitao 1917. Brasilien
M. a. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 130; TF. 10, 21 (D ♂).

♂ **cinereus** Mello-Leitao 1945. Argentinien
M. c. Mello Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 287 f. 76—77 (D ♂).

♂♀ **dentichelis** Crane 1949. Venezuela
M. d. Crane 1949, Zoologica, N. York 34 (2) p. 49 f. 8 (D ♂♀).
M. d. Crane 1950, Zool. Sci. Contrib. N. York Zool. Soc. 35 (1) p. 258 (D ♂♀).

♂ **difficilis** Soares & Camargo 1948. Brasilien
M. d. Soares & Camargo 1948, Rev. Bras. Biol. R. d. Jan. 8 (4) p. 439 f. 31—34 (D ♂).

♀ **fasciatus** Mello-Leitao 1940. Guiana
M. f. Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. Paulista 25 p. 187 TF. 25—26 (D ♀).

♂ **fonsecai** Soares & Camargo 1948. Süd-Brasilien
M. f. Soares & Camargo 1948, Rev. Bras. Biol. R. d. Jan. 8 (4) p. 440 f. 35—37 (D ♂).

♂ **intentus** Cambridge 1882. – * Amazonas
M. i. Cambridge 1882, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 439 T. 31 F. 14 (D ♂).
M. i. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 283 (D).
M. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 427 (N).

♂ **longidens** Simon 1900. Brasilien
M. l. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 57 (D ♂).
M. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 419 f. 473 (N ♂).

♂ **opiparis** Simon 1900. Brasilien
M. o. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 58 (D ♂).

♂ **pallidus** Mello-Leitao 1947. Süd-Brasilien
M. p. Mello-Leitao 1947, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan., Zool. 80 p. 24 T. 2 F. 11—12 (D ♂).

♂ **pexus** Simon 1900. Brasilien
M. p. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 57 (D ♂).

♂ **procax** Simon 1900. Peru
M. p. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 59 (D ♂).

♂ **proximus** Mello-Leitao 1943. Rio Grande do Sul
M. p. Mello-Leitao 1943, Arqu. Mus. Nac. R. d. Jan. 37 p. 224 TF. 50 (D ♂).

♂ **saperda** Simon 1900. Amazonas
M. s. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 58 (D ♂).

♂♀ **silvae** Crane 1943. Brit. Guiana
M. s. Crane 1943, Zoologica, N. York 28 (3; 16) p. 136 f. 4A—E (D ♂♀).

♂ **taeniatus** Mello-Leitao 1943. Rio Grande do Sul
M. t. Mello-Leitao 1943, Arqu. Mus. Nac. R. d. Jan. 37 p. 225 TF. 51 (D ♂).

♀ **trilineatus** Mello-Leitao 1940. Guiana
M. t. Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. Paulista 25 p. 188 TF. 27—28 (D ♀).

♂ **vicanus** Simon 1900. Amazonas
M. v. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 57 (D ♂).

Gen. **Noegus** Simon 1900.

♂ **actinosus** Simon 1900. Amazonas, Peru
N. a. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 53 (D ♂).

♂ **arator** Simon 1900. Amazonas
N. a. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 55 (D ♂).

♂ **argenteopunctatus** Mello-Leitao 1922. Brasilien
N. a. Mello-Leitao 1922, Ann. Soc. Ent. France 91 p. 216 (D ♂).

♂ **bidens** Simon 1900. Brasilien
N. b. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 55 (D ♂).
N. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 419 f. 468 (N ♂).

♂ **coccineus** Simon 1900. Amazonas
N. c. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 52 (D ♂).

♂ **comatulus** Simon 1900. Brasilien
N. c. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 52 (D ♂).

♂ **fulvocristatus** Simon 1900. Brasilien
N. f. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 50 (D ♂).

♂ **fuscimanus** Simon 1900. Brasilien
N. f. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 52 (D ♂).
N. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 419 f. 471, 472 (N ♂).

♂♀ **nigromaculatus** Mello-Leitao 1922. Brasilien
N. n. Mello-Leitao 1922, Ann. Soc. Ent. France 91 p. 216 f. 16—19 (D ♂♀).

♂ **niveogularis** Simon 1900. Brasilien
N. n. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 54 (D ♂).
N. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 419 f. 469 (N ♂).

♂ **niveomarginatus** Simon 1900. Brasilien
N. n. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 51 (D ♂).

♂ **nudus** Mello-Leitao 1940. Guiana
N. n. Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. Paulista 25 p. 188 TF. 29 (D ♂).

♂ **rufus** Simon 1900. Brasilien, Peru
N. r. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 51 (D ♂).

♂ **transversalis** Simon 1900. Brasilien
N. t. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 50 (D ♂).

♂ **uncatus** Simon 1900. Amazonas
N. u. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 55 (D ♂).
N. u. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 419 f. 470 (N ♂).

♂ **vulpio** Simon 1900. – * Brasilien
N. v. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. France 69 p. 53 (D ♂).
N. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 427 (N).

Gen. **Pseudamphidraus** Caporiacco 1947.

♂ **niger** Caporiacco 1947. – * Brit. Guiana

P. n. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 30 (D ♂).
P. n. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 700 TF. 124 (D ♂).

♂ **variegatus** Caporiacco 1947. Brit. Guiana

P. v. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 30 (D ♂).
P. v. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 700 TF. 125 (D ♂).

Gen. **Wallaba** Mello-Leitao 1940.

♂ **decora** Bryant 1943. Haiti

W. d. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 519 T. 8 F. 88 (D ♂).

♂ **metallica** Mello-Leitao 1940. – * Guiana

W. m. Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. Paulista 25 p. 191 TF. 31 (D ♂).

3. Gr. Astieae

Gen. **Adoxotoma** Simon 1909.

♀ **chionopogon** Simon 1909. W.-Australien

A. c. Simon 1909, Faun. S. W. Austral. 2 (12) p. 196 (D ♀).

♀ **nigroolivacea** Simon 1909. – * W.-Australien

A. n. Simon 1909, Faun. S. W. Austral. 2 (12) p. 196 (D ♀).

Gen. **Agelista** Simon 1900.

♀ **amazonica** Mello-Leitao 1930. Amazonas

A. a. Mello-Leitao 1930, Arch. Mus. Nac. R. d. Janeiro 32 p. 69 TF. 38, 39 (D ♀).

♂ **andina** Simon 1900. – * Argentinien

A. a. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 383 (D ♂).
A. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 439 f. 489 (N ♂).

♂♀ **hirsuta** Mello-Leitao 1941. Argentinien

A. h. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 2 p. 179 T. 11 F. 49; f. 71 (D ♂♀).

modesta Simon 1901. Paraguay

A. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 436 (nom. nud.).

♀ **notabilis** Mello-Leitao 1943. Rio Grande do Sul

A. n. Mello-Leitao 1943, Arqu. Mus. Nac. R. d. Jan. 37 p. 221 TF. 47 (D ♀).

♀ **petrusewiczi** Caporiacco 1947. Brit. Guiana

A. p. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 31 (D ♀).
A. p. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 704 (D ♀).

♀ **rosea** Mello-Leitao 1941. Nord-Argentinien

A. r. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 2 p. 180 f. 72 (D ♀).

♂ **schubarti** Soares & Camargo 1948. Brasilien

A. s. Soares & Camargo 1948, Bol. Mus. Paraens. Goeldi 10 p. 398 f. 72—73 (D ♂).

Gen. **Albionella** Chickering 1946.

♀ **propria** Chickering 1946. Panama
A. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 74 f. 58—61 (D ♀).

Gen. **Anaurus** Simon 1900.

♀ **flavimanus** Simon 1900. – * Brasilien
A. f. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 382 (D ♀).
A. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 439 f. 486 (N ♀).

♂ **trimaculatus** Mello-Leitao 1943. Rio Grande do Sul
A. t. Mello-Leitao 1943, Arqu. Mus. Nac. R. d. Jan. 37 p. 222 TF. 48 (D ♂).

Gen. **Arasia** Simon 1901.

♂♀ **mollicoma** (L. Koch) 1880. Queensland, Neu-S.-Wales
Astia m. L. Koch 1880, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1158 T. 100 F. 6, 7 (D ♂♀).
A. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 438 f. 483 (N ♀).

Gen. **Aruana** Strand 1911.

♂ **silvicola** Strand 1911. Aru-I.
A. s. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (1) p. 178 T. 4 F. 29; T. 6 F. 92 (D ♂).

Gen. **Astia** L. Koch 1879.

Orientalische Arten:

♂ **maculata** (Thorell) 1895. Burma
Vindima m. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 348 (D ♂).
A. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 436 (N).

Australische Arten:

♂♀ **aurea** L. Koch 1880. Neu-S.-Wales
A. a. L. Koch 1880, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1167 T. 101 F. 4, 5 (D ♂♀).

♂♀ **hariola** L. Koch 1879. – * Queensland, Neu-S.-Wales
A. h. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1153 T. 100 F. 3, 4 (D ♂♀).
A. h. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 332 (D).
A. h. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 438 (N).

♂ **nodosa** L. Koch 1879. Queensland
A. n. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1156 T. 100 F. 5 (D ♂).

♀ **tristicula** Simon 1909. W.-Australien
A. t. Simon 1909, Faun. S. W. Austral. 2 (12) p. 194 (D ♀).

Gen. **Beccaria** Caporiacco 1947.

♂ **franganilloi** Caporiacco 1947. – * Brit. Guiana
B. f. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 30 (D ♂).
B. f. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 703 TF. 127—129 (D ♂).

♀ **lineatipes** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
B. l. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 30 (D ♀).
B. l. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 703 TF. 130—132 (D ♀).

Gen. **Charippus** Thorell 1895.

♂ **errans** Thorell 1895. Burma
C. e. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 351 (D ♂).
C. e. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 440 (N).

Gen. **Helpis** Simon 1901.

♂ **longichelis** Strand 1914. Neu-Mecklenburg
H. l. Strand 1914, Abh. Senckenbg. Ges. 36 (2) p. 263 T. 14 F. 24; T. 19 F. 102 (D ♂).

♂ **minitabunda** (L. Koch) 1880. – * Neu-S.-Wales
Astia m. L. Koch 1880, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1160 T. 101 F. 1 (D ♂).
H. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 438 f. 484, 485 (N ♂).

♀ **occidentalis** Simon 1909. W.-Australien
H. o. Simon 1909, Faun. S. W. Austral. 2 (12) p. 195 (D ♀).

♂♀ **respersa** (L. Koch) 1880. Queensland, Neu-S.-Wales
Astia r. L. Koch 1880, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1163 T. 101 F. 2, 3 (D ♂♀).
H. r. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 436 (N).

Gen. **Lagnus** L. Koch 1879.

♀ **kochi** Simon 1900. Queensland
L. k. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 381 (D ♀).
L. k. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 431 f. 479—482 (N).

♂ **longimanus** L. Koch 1879. – * Ovalau
L. l. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1074 T. 94 F. 4 (D ♂).
L. l. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 329 (D).
L. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 438 (N).

Gen. **Lapsias** Simon 1900.

♂♀ **ciliatus** Simon 1900. Venezuela
L. c. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 384 (D ♂).
L. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 431 f. 491 (N ♀).

♂ **cyrboides** Simon 1900. Venezuela
L. c. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 384 (D ♂).

♂ **estebanensis** Simon 1900. – * Venezuela
L. e. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 383 (D ♂).
L. e. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 439 f. 490, 492 (N ♂).

♂ **guianensis** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
L. g. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 30 (D ♂).
L. g. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 701 TF. 126 (D ♂).

♀ **melanopygus** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
L. m. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 30 (D ♀).
L. m. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 702 (D ♀).

♂♀ **tovarensis** Simon 1901. Venezuela
L. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 435 (D ♂♀).

Gen. **Suaruna** Mello-Leitao 1945.

♀ **delicata** Mello-Leitao 1945. Argentinien
S. d. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 298 f. 91 (D ♀).

Gen. **Titanattus** Peckham 1885.

♀ **cretatus** Chickering 1946. Panama
T. c. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 383 f. 337—340 (D ♀).

♀ **juduliani** Simon 1900. Argentinien
T. j. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 382 (D ♀).

♀ **paganus** Chickering 1946. Panama
T. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 385 f. 341—342 (D ♀).

♂ **pallidus** Mello-Leitao 1943. Rio de Janeiro
T. p. Mello-Leitao 1943, Ann. Ac. Bras. Sci. 15 (3) p. 265 (D ♂).

♂ **pegaseus** Simon 1900. Amazonas
T. p. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 382 (D ♂).
T. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 431 f. 488 (N ♂).

♂ **saevus** Peckham 1885. – * Guatemala
T. s. Peckham 1885, Proc. Ac. Sci. Wiscons. p. 63 T. 2 F. 1 (D ♂).
T. s. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 191 T. 15 F. 1 (N ♂).
T. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 438 f. 487 (N ♂).

4. Gr. Tomocyrbeae

Gen. **Tomocyrba** Simon 1900.

♂ **barbata** Simon 1900. Madagascar
T. b. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 389 (D ♂).

♂ **decollata** Simon 1900. – * Madagascar
T. d. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 388 (D ♂).
T. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 442 f. 493—495 (N ♂).

♂♀ **sjöstedti** Lessert 1925. O.-Afrika
T. s. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 429 f. 1—4 (D ♂♀).

5. Gr. Rogmocrypteae

Gen. **Orvilleus** Chickering 1946.

♂♀ **crassus** Chickering 1946. Panama
O. c. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 401 f. 358—362 (D ♂♀).

Gen. **Rogmocrypta** Simon 1900.

Orientalische Arten:

♀ **nigella** Simon 1900. Philippinen
R. n. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 387 (D ♀).

♀ **puta** Simon 1900. Singapore
R. p. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 387 (D ♀).
R. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 446 f. 502—504 (N).

Australische Arten:

♂♀ **elegans** (Simon) 1885. – * Neu-Caledonien
Chalcoscirtus e. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. Belg. 29 C. R. p. 90 (D ♂♀).
R. e. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 445 f. 505, 506 (N ♂).

6. Gr. Balleae

Gen. **Ballognatha** Caporiacco 1935.

O **typica** Caporiacco 1935. Karakorum
B. t. Caporiacco 1935, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 215 T. 6 F 1 (D O).

Gen. **Ballus** C. L. Koch 1850.

Palaearktische Arten:

§ 4 (♂, ♀): Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1147—1150.

♂♀ **armadillo** (Simon) 1871. Corsica, Sardinien, Calabrien
Attus a. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 227 (D ♂♀).
B. a. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 204 (D ♂♀).
B. a. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1150, 1245 (D ♂♀).

♂♀ **biimpressus** (Doleschall) 1852. Unter-Oesterreich, Schweiz, Frankreich, Italien, Dalmatien, Algier
Attus b. Doleschall 1852, S. B. Ak. Wiss. Wien 9 p. 646 (D).
Attus seguipes Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 631 (D ♀).
B. seguipes Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 539 (D ♂).
B. depressus seguipes Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1149, 1245 (D).

♂♀ **chalybeius** (Walckenaer) 1802. – * Europa, N.-Afrika
Aranea depressa Walckenaer 1802, Faun. Paris. 2 p. 242 (D ♀) (praeocc. Razoumowsky 1789).
Aranea c. Walckenaer 1802, Faun. Paris. 2 p. 245 (D ♂).
Attus c. Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 23 (N).
Attus depressus Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 27 (N).
Salticus annulipes Latreille 1819, Nouv. Dict. Hist. Nat. 30 p. 100 (D).
Attus annulipes Walckenaer 1825, Aran. Franc. p. 55 (D ♀).
Salticus brevipes Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 75 TF. 56 (D ♀).
Salticus heterophthalmus Wider 1834, Mus. Senckenbg. 1 (3) p. 279 T. 18 F. 11 (D ♀).
Euophrys suralis C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 34 (D ♂).
Euophrys brevipes C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 33 (N ♂).
Attus c. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 412 (D ♀).
Attus annulipes Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 417 (D ♀).
Attus depressus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 469 (D ♀).
Marpissa brevipes C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 58 TF. 1126 (D ♀).
Attus heterophthalmus C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 50 TF. 1308 (D ♂).
Salticus obscurus Blackwall 1850, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) 6 p. 336 (D ♂).
B. heterophthalmus C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 68 (N ♂).
Attus brevipes Westring 1851, Göteborg Vet. Handl. 2 p. 56 (N ♀).
Salticus obscurus Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 53 T. 3 F. 28 (D ♂♀).
Attus brevipes Westring 1862, Aran. Svec. p. 552 (D ♀).
Balla heterophthalma Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 311 (C).

Dendryphantes annulipes Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 314 (C).
Dendryphantes brevipes Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 314 (C).
Attus brevipes Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 626 (D ♀).
B. depressus Thorell 1869, On Europ. Spid. p. 212 (N ♀).
B. depressus Thorell 1870, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 370 (N).
B. depressus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 203 T. 11 F. 19 (D ♂♀).
B. depressus Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N.F.) 4 p. 484 T. 79 F. 274(A) (D ♂).
B. obscurus Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N.F.) 4 p. 484 T. 79 F. 274(B) (D ♂♀).
B. depressus Cambridge 1881, Proc. Dorset. F. Cl. 2 p. 399 (D ♂♀).
B. depressus Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 73 T. 4 F. 4 (D ♂♀).
B. depressus Dahl 1833, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 80 (D ♂♀).
B. depressus Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 286 (D).
B. depressus Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 47 (D ♂♀).
B. depressus Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 166 T. 15 F. 8 (N ♀).
B. depressus Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 486 f. 561—564 (N ♂♀).
B. depressus Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 445 T. 43 F. 651 (D ♂♀).
B. depressus Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 538 (D ♂♀).
B. depressus Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 34 (D ♂♀).
B. depressus Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1149, 1245 f. 1781, 1782 (D ♂♀).
B. depressus Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna, Salticidae p. 32 T. 2 F. 39—40; T. 3 F. 41 (D ♂♀).
B. depressus Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 220 f. 108C—E (D ♂♀).

♀ **japonicus** Saito 1939. Japan

B. j. Saito 1939, Saito Ho-on Kai Mus. Res. Bull. 18 p. 36 f. 5 (1); T. 1 F. 4 (D ♀).

♀ **lendli** Kolosvary 1934. Ungarn

B. l. Kolosvary 1934, Folia Zool. Hydrobiol. 6 (1) p. 17 f. 21 (D ♀).

♂ **obscuroides** (Canestrini & Pavesi) 1868. S.-Tirol

Euophrys o. Canestrini & Pavesi 1868, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 11 p. 869 (D ♂).
Attus o. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 229 (N).

♀ **piger** Cambridge 1876. Aegypten

B. p. Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 609 (D ♀).

♀ **planus** Schenkel 1936. S.-Kansu

B. p. Schenkel 1936, Ark. Zool. 29 (A; 1) p. 244 f. 80 (D ♀).

♂♀ **rufipes** (Simon) 1868. Algier, Frankreich, Spanien, Sizilien, Attika, Turkestan

Attus r. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 627 T. 2 F. 10 (D ♂♀).
B. r. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1149, 1246 (D ♂♀).

♀ **sociabilis** Franganillo 1910. Portugal

B. s. Franganillo 1910, Broteria 9 p. 18 TF. 9 (D ♀).

♂o **variegatus** Simon 1876. S.-Frankreich, Spanien

B. v. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 205 T. 11 F. 19 (D ♂ o).
B. v. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1149, 1245 (D ♂).

♀ **vulpinus** (Westring) 1851. Schweden

Attus v. Westring 1851, Göteborg Vet. Handl. 2 p. 56 (N ♀).
Attus v. Westring 1862, Aran. Svec. p. 554 (D ♀).

Orientalische Arten:

♂ **segmentatus** Simon 1900. Ceylon

B. s. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 398 (D ♂).
B. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 482 f. 565 (N ♂).

♀ **sellatus** Simon 1900. Ceylon

B. s. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 398 (D ♀).

♀ **tabupumensis** Petrunkevitch 1914. Burma

B. t. Petrunkevitch 1914, Ann. Ent. Soc. Amer. 7 (3) p. 174 T. 26 F. 19, 20 (D ♀).

Australische Arten:

♀ **decempunctatus** Szombathy 1915. Neu-Guinea

B. d. Szombathy 1915, Ann. Mus. Nat. Hungar. 13 p. 472 f. 4 (D ♀).

Nearktische Arten:

♂♀ **youngii** Peckham 1888. U. St. Amerika

B. y. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 87 T. 1 F. 66; T. 6 F. 66 (D ♂♀).
Attidops y. Banks 1905, Amer. Natural. 39 p. 322 (N).
B. y. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 586 T. 49 F. 9; T. 51 F. 13 (D ♂♀).
B. g. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 447 T. 87 F. 1621—1622 (D ♂♀).

Gen. **Cylistella** Simon 1901.

♂♀ **adjacens** (Cambridge) 1896. Costa Rica, Mexico

Coccorchestes a. Cambridge 1896, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 162 T. 20 F. 4 (D ♂).
Coccorchestes a. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 295 T. 28 F. 15 (N ♂♀).
C. a. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 620 (C.)

♀ **castanea** Petrunkevitch 1925. Panama

C. c. Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 203 f. 122, 122a (D ♀).

♀ **coccinelloides** (Cambridge) 1896. S.-Brasilien

Salticus c. Cambridge 1869, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 3 p. 66 T. 5 F. 53—56 (D ♀).
C. c. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 620 (C).

♂♀ **cuprea** (Simon) 1864. – * Brasilien

Rhanis c. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 309 (D).
Coccorchestes c. Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 169 T. 15 F. 10 (D ♂♀).
C. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 487 f. 572, 573 (N).

♀ **fulva** Chickering 1946. Panama

C. f. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 394 f. 348—349 (D ♀).

♀ **sanctipauli** Soares & Camargo 1948. S.-Brasilien

C. s. Soares & Camargo 1948, Rev. Bras. Biol. R. d. Jan. 8 (4) p. 438 f. 30 (D ♀).

♂♀ **scarabaeoides** Cambridge 1894. Mexico

Coccorchestes s. Cambridge 1894, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 121 T. 15 F. 8 (D ♂♀).

Coccorchestes s. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 295 T. 28 F. 14 (N ♂♀).
C. s. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 621 (C).
C. s. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 396 f. 350—356 (D ♂♀).

Gen. **Pachyballus** Simon 1900.

Aethiopische Arten:

♀ **castaneus** Simon 1900. Natal
P. c. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 400 (D ♀).

♂ **cordiformis** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste
P. c. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 396 f. 90 (D ♂).

♀ **flavipes** Simon 1909 (1910). Fernando Poo, O.-Afrika
P. f. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 414 (D ♀).
P. f. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 434 f. 7—9 (D ♀).
P. f. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 464 (N ♀).

♀ **flavipes aurantius** Caporiacco 1949. Kenya
P. f. a. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 464 (D ♀).

O ♀ **transversus** Simon 1900. – * Portug. Guinea, Congo, Sansibar, Transvaal
P. t. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 399 (D ♀).
P. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 482 f. 570, 571 (N).
P. t. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 397 (N ♂♀).

♂♀ **variegatus** Lessert 1925. O.-Afrika
P. v. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 437 f. 10—14 (D ♂♀).

Australische Arten:

♂ **gambeyi** (Simon) 1880. Neu-Caledonien
Homalattus g. Simon 1880, Ann. Soc. Ent. Belg. 23 C.R. p. 166 (D ♂).
P. g. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 485 (N).

Gen. **Peplometus** Simon 1900.

♀ **biscutellatus** (Simon) 1887. – * W.-Afrika
Homalattus b. Simon 1887, Ann. Soc. Ent. France (6) 7 p. 262 (D ♀).
P. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 486 (N).
P. b. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 414 (C).
P. b. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 398 (N).

♂ **chlorophthalmus** Simon 1900. Natal
P. c. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 399 (D ♂).
P. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 482 f. 566—569 (N).

Gen. **Porius** Thorell 1892.

♀ **papuanus** (Thorell) 1881. Neu-Guinea
Ballus p. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 665 (D ♀).
P. p. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 252 (N).
P. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 487 (N).

4. Subfam. Thiodininae

1. Gr. Thiodineae

Gen. **Arachnomura** Mello-Leitao 1917.

♂ **hyeroglyphica** Mello-Leitao 1917. Brasilien
A. h. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 137 TF. 18—20, 24 (D ♂) (in TF.: **hieroglyphica).**

Gen. **Banksetosa** Chickering 1946.

♂ **dubia** Chickering 1946. – * Panama
B. d. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 78 f. 62—66 (D ♂).

♂ **notata** Chickering 1946. Panama
B. n. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 81 f. 67—72 (D ♂).

Gen. **Carabella** Chickering 1946.

♂ **banksi** Chickering 1946. – * Panama
C. b. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 87 f. 73—77 (D ♂).

♀ **insignis** (Banks) 1929. Panama
Paramarpissa i. Banks 1929, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 69 (3) p. 64 T. 3 F. 44; T. 4 F. 78 (D ♀).
C. i. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 90 (N ♀).

Gen. **Ceriomura** Simon 1901.

♀ **cruenta** (Peckham) 1894. Amazonas
Omura c. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 103 T. 10 F. 2 (D ♀).
C. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 459 (N).

♀ **mathematica** Mello-Leitao 1917. Brasilien
C. m. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 134 (D ♀).

♀ **perita** (Peckham) 1894. Peru
Omura p. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 104 T. 10 F. 3 (D ♀).
C. p. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 609 (C).

Gen. **Cotinusa** Simon 1900.

♀ **adelae** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires
C. a. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 3 (24) p. 386 f. 76 (D ♀).

♀ **albescens** Mello-Leitao 1945. Argentinien
C. a. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 280 f. 70 (D ♀).

♀ **bisetosa** Simon 1900. Venezuela
C. b. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 389 (D ♀).
C. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 457 (N).

♂♀ **bryantae** Chickering 1946. Panama
C. b. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 90 f. 78—85 (D ♂♀).

♂♀ **deserta** (Peckham) 1894. Brasilien
Sadala d. Peckham 1894, Ccc. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 138 T. 14 F. 3 (D ♂♀).
C. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 458 (N).

♀ **dimidiata** Simon 1900. Amazonas
C. d. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 391 (D ♀).

♂ **distincta** (Peckham) 1888. – * Peru
Sadala d. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 53 T. 1 F. 70; T. 6 F. 76 (D ♂).
Sadala d. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 132 T. 13 F. 4 (N ♂).
C. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 459 (N).
C. d. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 299 T. 29 F. 12 (N ♂)

♂♀ **fenestrata** (Taczanowski) 1878. Peru
Maevia f. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 327 (D ♂♀).
Sadala f. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 133 (N)
C. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 458 (N).

♂♀ **gemmea** (Peckham) 1894. Brasilien
Sadala g. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 135 T. 14 F. 1 (D ♂♀).
C. g. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 458 (N).

♂♀ **horatia** (Peckham) 1894. Amazonas
Sadala h. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 136 T. 14 F. 2 (D ♂♀).
C. h. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 458 (N).

♂ **humillima** Mello-Leitao 1943. Rio Grande do Sul
C. h. Mello-Leitao 1943, Arqu. Mus. Nac. R. d. Jan. 37 p. 223 TF. 49 (D ♂).

♂♀ **magna** (Peckham) 1894. Brasilien
Sadala m. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 133 T. 13 F. 5 (D ♂♀).
C. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 458 (N).

♀ **melanura** Mello-Leitao 1939. Paraguay
C. m. Mello-Leitao 1939, Rev. Suisse Zool. 46 (2) p. 83 f. 72 (D ♀).

♀ **puella** Simon 1900. Amazonas
C. p. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 391 (D ♀).

♀ **pulchra** Mello-Leitao 1917. Brasilien
C. p. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 135 TF. 14 (D ♀).

♂ **rosascostai** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires
C. r. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 3 (24) p. 382 f. 77 (D ♂).

♂♀ **septempunctata** Simon 1900. Venezuela
C. s. Simon 1900, Ann. Ent. Soc. Belg. 44 p. 390 (D ♂♀).

♂ **simoni** Chickering 1946. Panama
C. s. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 96 f. 86—88 (D ♂).

♂♀ **stolzmanni** (Taczanowski) 1878. Peru
Maevia st. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 329 (D ♂♀).
Sadala st. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 163 (N).
C. st. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 458 (N).

♀ **trimaculata** Mello-Leitao 1922. Brasilien
C. t. Mello-Leitao 1922, Ann. Soc. Ent. France 91 p. 218 f. 20 (D ♀).

♂♀ **vittata** Simon 1900. Brasilien
C. v. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 390 (D ♂♀).

Gen. **Gertschnusa** Mello-Leitao 1947.

♀ **gertschi** Mello-Leitao 1947. S.-Brasilien
G. g. Mello-Leitao 1947, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. (Zool.) 80 p. 23 T. 6 F. 19 (D ♀).

Gen. **Nilakantha** Peckham 1901.

♂♀ **cockerelli** Peckham 1901. – * Jamaica, Haiti
N. c. Peckham 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 8 T. 2 F. 1 (D ♂♀).
Nilacantha cockwelli Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 459 (N).

♂♀ **peckhami** Bryant 1940. Cuba
N. p. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 454 T. 18 F. 238 (D ♂♀).

Gen. **Parathiodina** Bryant 1943.

♂ **compta** Bryant 1943. Haiti
P. c. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 50 T. 4 F. 42 u. 45 (D ♂).

Gen. **Thiodina** Simon 1900.

Neotropische Arten:

♀ **candida** Mello-Leitao 1922. Brasilien
T. c. Mello-Leitao 1922, Ann. Soc. Ent. France 91 p. 218 (D ♀).

♀ **crucifera** (F. Cambridge) 1901. Panama
Colonus c. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 247 T. 21 F. 13 (D ♀).
T. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 1050 (N).

♂ **germaini** Simon 1900. Brasilien
T. g. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 392 (D ♂).

♂♀ **inerma** Bryant 1940. Cuba
T. i. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 451 T. 17 F. 231; T. 18 F. 239 (D ♂♀).

♂ **melanogaster** Mello-Leitao 1917. Brasilien
T. m. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 132 TF. 4 (D ♂).

♀ **nicoleti** Roewer 1951. – * Chile

Attus elegans Nicolet 1849, in: Gay. Hist. Chili 10 (3) p. 367 T. 3 F. 2 (D ♀). (praeocc. Hentz 1846).
T. elegans Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 459 (N).
T. n. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 450 (nom. nov.)

♂♀ **pallida** (C. L. Koch) 1846. Brasilien, Peru, Columbien, Guiana

Alcmena p. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 179 TF. 1229 (D ♂).
Dendryphantes p. Simon 1864, Hist, Nat. Araign. (1. Ed.) p. 315 (C).
Attus branickii Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 94 (D ♂♀).
Marpessa branickii Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 327 (N).
Attus branickii Hasselt 1888, Tijdschr. Ent. 31 p. 196 (D ♂).
T. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 455 f. 522—525 (N ♂♀).
T. p. Crane 1945, Zoologica N. York 30 p. 35 f. 2 (D ♂♀).
T. branickii Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 705 TF. 133 (D ♀).

♂ **pseustes** Chamberlin & Ivie 1936. Panama

T. p. Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah, Biol. 27 (5) p. 29 T. 8 F. 61—62 (D ♂).

♀ **punctulata** Mello-Leitao 1917. Brasilien

T. p. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 133 TF. 9 u. 12 (D ♀).

♂ **robusta** Mello-Leitao 1945. Argentinien

T. r. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 299 f. 92—93 (D ♂).

♀ **setosa** Mello-Leitao 1947. S.-Brasilien

T. s. Mello-Leitao 1947, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan., Zool. 80 p. 32 T. 6 F. 14 (D ♀).

♂ **vaccula** Simon 1900. Amazonas

T. v. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 392 (D ♂).
T. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 455 f. 526—527 (N ♂).

♀ **vellardi** Soares & Camargo 1948. San Paulo

T. v. Soares & Camargo 1948, Bol. Mus. Paraens. Goeldi 10 p. 400 f. 76 (D ♀).

Transgredierende Arten:

♂♀ **puerpera** (Hentz) 1846. Panama, U. St. Amerika

? **Attus irroratus** Walckenaer 1937, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 466 (D ♀).
Attus p. Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 360 T. 21 F. 22 (D ♀).
Attus agrestis Peckham 1883, Descr. Spid. . . . Fam. Attid. p. 12 T. 1 F. 9 (D ♀).
Phidippus p. Emerton 1902, Common Spid. p. 51 f. 137—139 (D ♂♀).
T. p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 449 T. 35 F. 8 (D ♂♀).
T. irrorata Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 215 TF. 11 (N ♂♀).

♂♀ **sylvana** (Hentz) 1846. Panama, Guatemala, Mexico, U. St. Amerika

? **Attus inquies** Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 438 (D ♀).
Attus s. Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 364 T. 22 F. 10 (D ♂♀).
Attus retiarius Hentz 1850, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 6 p. 288 T. 10 F. 11 (D ♀).

Plexippus puerperus Peckham 1885, Proc. Nat. Hist. Soc. Wiscons. p. 68 T. 2 F. 5 (D ♂♀).
Plexippus puerperus Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 33 T. 1 F. 23; T. 2 F. 23; T. 3 F. 23 (D ♀).
Dendryphantes retarius Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 284 (C).
Colonus puerperus F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 246 T. 21 F. 11, 12 (N ♂♀).
Metaphidippus retiarius F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 272 (N).
T. puerpera Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 457 (N).
T. retarius Banks 1904, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 3 (13) p. 358 (C).
T. retarius Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 224 (N).
T. s. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 449 T. 35 F. 9 (D ♂♀).
T. iniquies Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 216 (N ♂♀).
T. s. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 106 (N).

2. Gr. Bavieae

Gen. **Bavia** Simon 1877.

Orientalische Arten:

♂ **annamita** Simon 1902. — Annam
B. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 730 (D ♂).

♀ **decorata** (Thorell) 1890. — Sumatra
Marptusa d. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 161 (D ♀).
Marptusa d. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 292 (D ♀).
B. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 461 (N).

♀ **hians** (Thorell) 1890. — Sumatra
Marptusa h. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 161 (D ♀).
Marptusa h. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 289 (D ♀).
B. h. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 461 (N).

♀ **smedleyi** Reimoser 1929. — Mentawei-I.
B. s. Reimoser 1929, Bull. Raffles Mus. Singapore 2 p. 130 f. 4 (D ♀).

♂ **thorelli** Simon 1901. — Celebes
B. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 461 f. 532 (N).
B. t. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 24 (D ♂).
B. t. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) p. 305 (N ♂).

Transgredierende Arten:

♂♀ **aericeps** Simon 1877. – * — Sumatra, Philippinen, Neu-Guinea, Marianen, Samoa, Hawai, Funafuti
B. a. Simon 1877, Ann. Soc. Ent. France (5) 7 p. 61 (D ♂).
Acompse suavis L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1146 T. 99 F. 6, 7 (D ♂♀).
B. a. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. Belg. 29 C.R. p. 31 (N).
B. a. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. p. 307 (D).
B. a. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 99 T. 9 F. 4 (D ♂).
B. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 470 f. 529—531 (N ♂).

♂♀ **sexpunctata** (Doleschall) 1859. Sumatra, Java, Amboina, Neu-Guinea, Pelew-I., Santa Cruz, Aru-I., Kei-I., Dekan

Salticus s. Doleschall 1859, Act. Soc. Ind. Neerl. 5 p. 24 T. 4 F. 8 (D ♂).
Marptusa s. Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 224 (D ♂♀).
Acompse dulcinervis L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1149 T. 100 F. 1, 2 (D ♂♀).
B. s. Simon 1905, Mitt. Nat. Mus. Hambg. 22 (2) p. 70 (N).
B. s. Reimoser 1934, Rev. Suisse Zool. 41 (32) p. 501 (N).

Australische Arten:

♀ **ludicra** (Keyserling) 1882. Queensland

Acompse l. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1326 T. 113 F. 1, 2 (D ♀).
B. l. Rainbow 1911, Rec. Austral. Mus. 9 (2) p. 281 (C).

♀ **modesta** (Keyserling) 1883. Queensland

Acompse m. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1455 T. 122 F. 8 (D ♀).
B. m. Rainbow 1911, Rec. Austral. Mus. 9 (2) p. 281 (C).

♂♀ **papakula** Strand 1911. Aru-I.

B. p. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (1) p. 179 T. 4 F. 26; T. 6 F. 98 (D ♂♀).

♂♀ **valida** (Keyserling) 1882. Cap York, Gilbert-I.

Acompse v. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1371 T. 116 F. 3, 4 (D ♂♀).
B. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 462 (N).

Gen. **Baviola** Simon 1897.

♂♀ **braueri** Simon 1897. – * Seychellen

B. b. Simon 1897, Ann. Soc. Ent. France 66 p. 386 (D ♂♀).
B. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 471 f. 537 (N ♂).

♀ **tenuimana** (Simon) 1893. Seychellen

Viciria t. Simon 1893, Bull. Soc. Zool. France 18 p. 210 (D ♀).

Gen. **Cynapes** Simon 1900.

♂ **albolineatus** (Peckham) 1885. Madagascar

Bavia a. Peckham 1885, Proc. Nat. Hist. Soc. Wiscons. p. 39 T. 1 F. 9 (D ♂).
C. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 467 (N).

♀ **baptizatus** (Butler) 1876. I. Rodriguez

Salticus b. Butler 1876, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 17 p. 440 (D ♀).
Salticus b. Butler 1878, Trans. Phil. Soc. Lond. 168 p. 506 T. 52 F. 2 (D ♀).
C. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 467 (N).

♂♀ **canosus** Simon 1900. I. Mauritius

C. c. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 393 (D ♂♀).
C. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 467 (N).

♂♀ **whrightii** (Blackwall) 1877. – * Seychellen

Salticus w. Blackwall 1877, Proc. Irish Ac. Sci. (2) 3 p. 2 T. 1 F. 1 (D ♀).
B. w. Simon 1893, Bull. Soc. Zool. France 18 p. 209 (D ♂).
B. w. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 471 f. 533, 534 (N ♂♀).

Gen. **Goleta** Peckham 1894.

♀ **peckhami** Simon 1900. Madagascar

G. p. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 396 (D ♀).
G. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 468 (N).

♂♀ **workmanii** (Peckham) 1885. – * Madagascar

Ganesa w. Peckham 1885, Proc. Nat. Hist. Soc. Wiscons. p. 27 T. 1 F. 2 (D ♂♀).
Ganesa w. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 340 (D).
G. w. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 124 T. 12 F. 7 (N ♀).
G. workmanni Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 472 (N).

Gen. **Padilla** Peckham 1894.

Aethiopische Arten:

♂♀ **armata** Peckham 1894. – * Madagascar

P. a. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 130 T. 13 F. 1 (D ♂♀).
P. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 472 f. 542 (N ♂).

♂ **glauca** Simon 1900. Madagascar

P. g. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 395 (D ♂).
P. g. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 468 (N).

♂ **lancearia** Simon 1900. Madagascar

P. l. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 394 (D ♂).
P. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 461 f. 453 (N ♂).

♂♀ **mantis** Simon 1900. Madagascar

P. m. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 394 (D ♂♀).
P. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 468 (N).

♂ **sartor** Simon 1900. Madagascar

P. s. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 393 (D ♂).
P. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 461 f. 539—541 (N ♂).

Orientalische Arten:

♂ **javana** Simon 1900. Java

P. j. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 395 (D ♂).
P. j. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 468 (N).

Gen. **Padillithorax** Simon 1901.

♀ **elegans** Reimoser 1927. Sumatra

P. e. Reimoser 1927, Misc. Zool. Sumatran. 13 p. 2 f. 2 (D ♀).

♂ **semiostrinus** Simon 1901. – * Malakka

P. s. Simon 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. (2; 4) p. 71 (D ♂).
P. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 471 f. 535 (N ♂) (in f.: **substrinus**).

♂♀ **taprobanicus** Simon 1902. Ceylon

P. t. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 24 (D ♂♀).

Gen. **Piranthus** Thorell 1895.

♀ **casteti** Simon 1900. Indien

P. c. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 396 (D ♀).
P. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 468 (N).

♀ **decorus** Thorell 1895. – * Burma

P. d. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 339 (D ♀).
P. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 473 (N).

Gen. **Psecas** C. L. Koch 1850.

♀ **bacelarae** Caporiacco 1947. Brit. Guiana

P. b. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 31 (D ♀).
P. b. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 706 TF. 134 (D ♀).

♀ **barbaricus** (Peckham) 1894. I. Trinidad

Epinga b. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 96 T. 9 F. 2 (D ♀).
Epinga b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 471 (N).
P. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 1050 (N).

♂ **bubo** (Taczanowski) 1871. Guiana

Attus b. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 75 (D ♂).
P. b. Mello-Leitao 1948, An. Ac. Bras. Ci. 20 (2) p. 191 (N).

♂♀ **chapoda** (Peckham) 1894. – * Brasilien

Epinga c. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 95 T. 9 F. 1 (D ♂♀).
Epinga c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 471 (N).
P. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 1050 (N).

♂ **chrysogramma** (Simon) 1901. S.-Amerika

Epinga c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 460 f. 528—536 (D ♂).
P. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 1050 (N).

♂♀ **cyaneus** (C. L. Koch) 1846. Surinam

Cocalus c. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 181 TF. 1231 (D ♂).
P. c. C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 50 (N).
P. c. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 294 (D).
Attus croesus Hasselt 1888, Tijdschr. Ent. 31 p. 196 T. 6 F. 3, 4 (D ♀).
P. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 1050 (N).

♂♀ **euoplus** Chamberlin & Ivie 1936. Panama

Deza sumptuosa Banks 1929, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 69 (3) p. 63 (C).
P. e. Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah, Biol. 27 (5) p. 28 T. 8 F. 67 (D ♀).
P. enoplus Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 99 f. 89—95 (D ♂♀).

jaguatirica Mello-Leitao 1941. Columbien

P. j. Mello-Leitao 1941, Ann. Ac. Bras. Sci. 13 (4) p. 299 f. . . (D).

♂ **pulchra** Badcock 1932. Paraguay Chaco, Santa Fe

P. p. Badcock 1932, Journ. Linn. Soc. Lond. 38 p. 39 f. 30 (D ♂).

♀ **splendidus** Badcock 1932. Paraguay Chaco

P. s. Badcock 1932, Journ. Linn. Soc. Lond. 38 p. 38 f. 29 (D ♀).

♂♀ **sumptuosus** (Perty) 1833. Brasilien, Trinidad, Panama, Guatemala, Venezuela, Argentinien

Salticus s. Perty 1883, Delect. Anim. Artic. p. 199 T. 39 F. 8 (D ♂).
Attus s. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 475 (D ♂).
Thiania s. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 172 TF. 1224 (D ♂).
Deza s. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 98 (D ♂♀).
Epinga s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 468 (N).
P. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 1050 (N).
P. s. Crane 1945, Zoologica, N. York 30 p. 33 (N ♂).

♂ **vellutinus** Mello-Leitao 1948. Brit. Guiana

P. v. Mello-Leitao 1948, An. Ac. Bras. Ci. 20 p. 192 f. 32 (D ♂).

viridipurpureus (Simon) 1901. S.-Amerika

Epinga v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 468 (N).

zonatus (Simon) 1901. S.-Amerika

Epinga z. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 468 (N).

Gen. **Stagetillus** Simon 1885.

♂ **opaciceps** Simon 1885. Sumatra

S. o. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. Belg. 29 C. R. p. 32 (D ♂).
S. o. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 338 (D).
S. o. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 472 f. 538 (N).

Gen. **Stenodeza** Simon 1900.

o **acuminata** Simon 1900. – * Amazonas

S. a. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 396 (D o).
S. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 473 (N).

♂ **fallax** Mello-Leitao 1917. Brasilien

S. f. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 137 TF. 23 (D ♂) (im **Text Stenodoza;** in TF. u. Regist.: **Stenodeza).**

♂ **foestiva** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires

S. f. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 3 (24) p. 389 f. **86** (D ♂).

3. Gr. Scopocireae

Gen. **Cyllodania** Simon 1902.

♂ **bicruciata** Simon 1902. Venezuela

C. b. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 363 (D ♂).
C. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 1049 f. 1118, 1119, (N ♂).

Gen. **Gypogyna** Simon 1900.

♂o **forceps** Simon 1900. Paraguay

G. f. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 387 (D ♂ o).
G. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 444 f. 500, 501 (N ♂).

Gen. **Scopocira** Simon 1900.

♂ **atypica** Mello-Leitao 1922. Brasilien

S. a. Mello-Leitoa 1922, Ann. Soc. Ent. France 91 p. 217 (D ♂).

♂ **carinata** Crane 1945. Brit. Guiana
S. c. Crane 1945, Zoologica, N. York 30 p. 34 f. 1A—E (D ♂).

♂♀ **dentichelis** Simon 1900. – * Venezuela
S. d. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 385 (D ♂♀).
S. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 444 f. 496—498 (N ♂).

♂♀ **histrio** Simon 1900. Brasilien
S. h. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 386 (D ♂).
S. h. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 442 f. 499 (N ♂).

♀ **obscura** Mello-Leitao 1943. Rio Grande do Sul
S. o. Mello-Leitao 1943, Arqu. Mus. Nac. R. d. Jan. 37 p. 230 TF. 57 (D ♀).

♂♀ **panamena** Chamberlin & Ivie 1936. Panama
S. p. Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah, Biol. 27 (5) p. 28 T. 8 F. 58—60 (D ♂).
S. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 103 f. 96—97 (D ♀).

♀ **tenella** Simon 1900. Brasilien
S. t. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 386 (D ♀).
S. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 444 (N).

♂ **vivida** (Peckham) 1900. Amazonas
Grauhara v. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 226 T. 2 F. 2 (D ♂).
S. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 1049 (N).

4. Gr. Cyrbeae

Gen. **Cyrba** Simon 1876.

Transgredierende Arten:

♂♀ **algerina** (Lucas) 1846. – * Mittelmeergebiet, W.-Afrika, Canaren, Turkestan, Indien, Burma, Sumatra, Portug. Guinea
Salticus a. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 148 T. 6 F. 6 (D ♂♀).
Attus leporinus L. Koch 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 874 (D ♀).
Attus armiger L. Koch 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 876 (D ♂).
Attus a. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 219 (N ♂♀).
Attus diversipes Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 550 (D ♀).
Attus a. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 219 (N ♂♀).
Salticus cephalotes Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 321 (N ♂♀).
Euophrys ocellata Kroneberg 1875, Nachr. Ges. Moskau 19 (3) p. 48 T. 5 F. 35 (D ♀).
C. a. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 167 T. 11 F. 18 (D ♂♀).
C. a. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 318 (D).
Stasippus inornatus Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 375 (D ♀).
C. a. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 38 T. 1 F. 30 (D ♂♀).
C. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 449 f. 507—510 (N ♂).
C. a. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1146, 1245 f. 1779, 1780 (D ♂♀).

Aethiopische Arten:

♀ **bidentata** Strand 1906. Abessinien
C. b. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 662 (D ♀).
C. b. Strand 1909, Soc. Entom. 23 p. 180 (D ♀).

♀ **bimaculata** Simon 1885. Congo
C. b. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 392 (D ♀).
C. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 448 (N).

♂ **boveyi** Lessert 1933. Angola, Portug. O.-Afrika
C. b. Lessert 1933, Rev. Suisse Zool. 40 (4) p. 145 f. 63 (D ♂).

♀ **dotata** Peckham 1903. Capland
C. d. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 185 T. 19 F. 6 (D ♀).

♂♀ **nigrimana** Simon 1900. Transvaal, O.-Afrika
C. n. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 389 (D ♀).
C. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 448 (N).
C. n. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 230 (D ♂).

Orientalische Arten:

♀ **armillata** Peckham 1907. Borneo
C. a. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 606 (D ♀).

♀ **flavimana** Simon 1899. Sumatra
C. f. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 103 (D ♀).
C. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 448 (N).

♂ **micans** Simon 1885. Indien
C. m. Simon 1885, Bull. Soc. Zool. France 10 (4—6) p. 457 (D ♂).
C. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 448 (N).

♀ **picturata** Karsch 1898. Hongkong
C. p. Karsch 1898, Wiss. Erg. Reis. B, Szechenyi O.-Asien 2 p. 561 f. 8 (D ♀).

♀ **szechenyii** Karsch 1898. Hongkong
C. s. Karsch 1898, Wiss. Erg. Reis. B, Szechenyi O.-Asien 2 p. 561 f. 2, 7 (D ♀).

5. Gr. Hisponeae

Gen. **Astaenorchestes** Simon 1900.

♀ **continentalis** Caporiacco 1949. Kenya
A. c. Caporiacco 1949, Comment. Pontif. Ac. Sci. 13 (6) p. 462 (D ♀).

♂ **frenatus** Simon 1900. – * Madagascar
A. f. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 397 (D ♂).
A. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 452 f. 515, 516 (N ♂).

Gen. **Hispo** Simon 1885.

Aethiopische Arten:

♀ **cingulatus** Simon 1885. – * Madagascar
H. c. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 394 (D ♀).
H. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 452 f. 511—513 (N).

♂ **striolata** Simon 1897. Seychellen
H. s. Simon 1897, Ann. Soc. Ent. France 66 p. 387 (D ♂).
H. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 450 f. 514 (N ♂).

Orientalische Arten:

♀ **alboguttata** Simon 1903. Sumatra
H. a. Simon 1903, Ann. Soc. Ent. France 72 p. 306 (D ♀).

Gen. **Massagris** Simon 1900.

♂ **constricta** Simon 1900. – * Capland
M. c. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 397 (D ♂).
M. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 452 f. 517 (N ♂).

♂ **martini** Simon 1900. Natal
M. m. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 398 (D ♂).

♂ **mirifica** Peckham 1903. Natal
M. m. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 186 T. 19 F. 1 (D ♂).

6. Gr. Copocrosseae

Gen. **Copocrossa** Simon 1901.

Aethiopische Arten:

♀ **albozonata** Caporiacco 1949. Kenya
C. a. Caporiacco 1949, Comment. Pontif. Ac. Sci. 13 (6) p. 463 (D ♀).

O **bimaculata** Peckham 1903. Natal
C. b. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 187 T. 19 F. 7 (D O).

Orientalische Arten:

♀ **harpina** Simon 1903. Sumatra
C. h. Simon 1903, Ann. Soc. Ent. France 72 p. 306 (D ♀).

♂ **politiventris** Simon 1901. Malakka
C. p. Simon 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. (2; 4) p. 71 (D ♂).
C. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 474 f. 550, 551 (N ♂).

Australische Arten:

♂ **tenerrima** (L. Koch) 1879. Queensland
Marptusa t. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1115 T. 97 F. 5 (D ♂).
C. t. Rainbow 1911, Rec. Austral. Mus. 9 (2) p. 281 (C).

♂ **tenuilineata** (Simon) 1900. – * Queensland
Stenodina t. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 388 (D O).
C. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 475 f. 548, 549, 552 (N ♂).

Gen. **Ligdus** Thorell 1895.

♀ **chelifer** Thorell 1895. Burma
L. c. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 337 (D ♀).
L. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 476 (N).

Gen. **Mantisatta** Warburton 1900.

♀ **trucidans** Warburton 1900. Borneo
M. t. Warburton 1900, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 385 f. 1—4 (D ♀).
M. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 475 f. 544, 547, 553 (N).

7. Gr. Diolenieae

Gen. **Chalcolecta** Simon 1884.

Orientalische Arten:

♂♀ **bitaeniata** Simon 1884. Celebes, Molukken

C. b. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. Belg. 28 C. R. p. 231 (D ♀).
C. b. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 273 (D).
C. b. Pocock 1897, Abh. Senckenbg. Ges. 23 (4) p. 627 T. 26 F. 28 (D ♂).
C. b. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) p. 306 (N ♂).

♂ **dimidiata** Simon 1884. – * Molukken

C. d. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. Belg. 28 C. R. p. 230 (D ♂).
C. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 481 (N).

Australische Arten:

♂ **prensitans** (Thorell) 1881. Neu-Guinea

Marptusa p. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 432 (D ♂).
C. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 479 (N).

♀ **rapax** (Thorell) 1881. Neu-Guinea

Marptusa r. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 434 (D ♀).
C. r. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 479 (N).

Gen. **Diolenius** Thorell 1869.

Orientalische Arten:

♂ **armatissimus** Thorell 1881. Molukken

D. a. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 417 (D ♂).

♂ **carinifer** Strand 1907. Halmahera

D. (Diolenella) c. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (17—18) p. 568 (D ♂).
D. c. Strand 1909, Abh. Nat. Ges. Görlitz 26 p. 97 (D ♂).

♂ **venustus** Thorell 1881. Ternate

D. v. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 421 (D ♂).
D. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 477 (N).

♂ **vittatus** Thorell 1881. Ternate

D. v. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 423 (D ♂).
D. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 477 (N).

Transgredierende Arten:

♂♀ **bicinctus** Simon 1884. Molukken, Neu-Guinea

D. b. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. Belg. 28 C. R. p. 227 (D ♀).
D. b. Roewer 1938, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors Sér.) 3 (19) p. 78 f. 55—58 (D ♂♀).

♂♀ **phrinoides** (Walckenaer) 1837. – * Amboina, Neu-Guinea

Attus ph. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 479 (D ♂).
Salticus obisioides Doleschall 1857, Nat. Tijdschr. Need. Ind. 13 p. 433 f. 2 (D ♂).
Salticus obisioides Doleschall 1859, Act. Soc. Ind. Neerl. 5 p. 26 T. 4 F. 1 (D ♂).
Saltica phrynoides Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 336 (C).
D. p. Thorell 1869, On Europ. Spid. p. 203 (N).
D. p. Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 215 (D O).

D. p. L. Koch 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1240 T. 104 F. 4 (D ♀).
D. p. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 409 (D ♂♀).
D. p. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 272 (N).
P. phrynoides Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 480 f. 555—559 (N).

Australische Arten:

♂ **albomaculatus** Thorell 1881. Neu-Guinea, Aru-I., Kei-I.
D. a. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 418 (D ♂).
D. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 477 (N).

♀ **albopiceus** Hogg 1915. Neu-Guinea
D. a. Hogg 1915, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 504 f. 2 (D ♀).

♀ **amplectens** Thorell 1881. Neu-Guinea, Aru-I.
D. a. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 412 (D ♀).
D. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 477 (N).

♀ **bifasciatus** Thorell 1881. Neu-Guinea, Kei-I.
D. b. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 425 (D ♀).
D. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 477 (N).

♂ **lugubris** Thorell 1881. Neu-Guinea, Neu-Pommern
D. l. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 414 (D ♂).
D. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 477 (N).

Gen. **Discocnemius** Thorell 1881.

o **albocingulatus** Simon 1884. Neu-Guinea
D. a. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. Belg. 28 C. R. p. 229 (D o).
D. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 479 (N).

♂ **coccineopilosus** Simon 1884. Neu-Guinea
D. c. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. Belg. 28 C. R. p. 230 (D ♂).
D. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 479 (N).

♀ **lacertosus** Thorell 1881. – * Queensland
D. l. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 429 (D ♀).
D. l. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 273 (D).
D. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 480 (N).

Gen. **Lystrocteisa** Simon 1884.

♂ **myrmex** Simon 1884. Neu-Caledonien
L. m. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. Belg. 28 C. R. p. 229 (D ♂).
L. m. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 272 (D).
L. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 481 f. 554, 560 (N ♂).

Gen. **Tarodes** Pocock 1899.

♂ **lineatus** Pocock 1899. Neu-Pommern
T. l. Pocock 1899, in: Willey, Zool. Res.... fr. N. Brit. Salom. Isl. 1 p. 116 T. 11 F. 13 (D ♂).
T. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 481 (N).

8. Gr. Diplacanthopodeae

Gen. **Diplacanthopoda** Abraham 1925.

♂♀ **marina** Abraham 1925. Tasmanien

D. m. Abraham 1925, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 1358 T. 1 (D ♂♀).
Diplocanthopoda m. Bristowe 1931, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 8 p. 461 f. 1, 2 (N ♂♀).

Gen. **Toloella** Chickering 1946.

♂♀ **eximia** Chickering 1946. Panama

T. e. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 107 f. 98—103 (D ♂♀).

2. Sect. Fissidentati

5. Subfam. Peckhamiinae

Gen. **Consingis** Simon 1900.

♂ **semicana** Simon 1900. – * Brasilien

C. s. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 404 (D ♂).
C. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 496 f. 582, 583 (N).
C. s. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 9 (2) p. 95 (D ♂).

Gen. **Gertschia** Kaston 1945.

♂ o **idahoana** (Gertsch) 1934. Idaho

Peckhamia i. Gertsch 1934, Amer. Mus. Novit. 726 p. 11 TF. 11—12 (D ♂ o).
G. i. Kaston 1945, Amer. Mus. Novit. 1290 p. 17 (N).

♂♀ **noxiosa** (Hentz) 1850. U. St. Amerika

Synemosyna n. Hentz 1850, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 6 p. 288 T. 10 F. 10 (D ♀).
Peckhamia scorpiona Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 370 T. 50 F. 3; T. 51 F. 3 (D ♂♀).
Peckhamia scorpionia Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 233 T. 12 F. 6 (D ♂♀).
Peckhamis scorpiona Kaston 1938, Bull. Connect. Geol. Nat. Hist. Surv. 60 p. 196 (N).
G. n. Kaston 1945, Amer. Mus. Novit. 1290 p. 17 (N).
G. n. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 450 T. 88 F. 1632—33; T. 89 F. 1648—49; T. 144 F. 2138 (D ♂♀).

Gen. **Peckhamia** Simon 1901

Neotropische Arten:

♂♀ **prescotti** Chickering 1946. Panama

P. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 415 f. 373—375 (D ♂♀).

♂ **seminola** Gertsch 1936. Florida

P. s. Gertsch 1936, Amer. Mus. Novit. 852 p. 18 TF. 36—37 (D ♂).

♂♀ **variegata** (F. Cambridge) 1900. Panama

Synageles v. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 176 T. 12 F. 7—8 (D ♂♀).
P. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 495 (N).
P. v. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 418 (N ♂♀).

Transgredierende Arten:

♂♀ **americana** (Peckham) 1892. Mexico, U. St. Amerika

? Myrmecium caliginosum Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 388 (D ♂).
Synageles a. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 65 T. 5 F. 1 c (D ♀).
Myrmecium caliginosum Simon 1897, Hist. Nat. Araign. 2 (1) p. 170 (N).
P. a. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 368 T. 50 F. 4; T. 51 F. 1 (D ♂♀).
Myrmecium caliginosum Mello-Leitao 1932, Ann. Ac. Bras. Sci. 4 (4) p. 150 (N).
P. caliginosa Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 204 (N).

Nearktische Arten:

♂♀ **picata** (Hentz) 1846. U. St. Amerika, Canada

Synemosyna p. Hentz 1946, Boston. Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 370 T. 22 F. 21 (D ♀).
Synageles p. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 94 T. 6 F. 71 (D ♀).
Synageles p. Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 250 T. 21 F. 3 (D ♂♀).
Synageles p. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 64 T. 5 F. 2 (D ♂♀).
P. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 495 (N).
P. p. Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 232 T. 12 F. 7 (D ♂♀).
P. p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 369 T. 51 F. 2 (D ♂♀).
P. p. Comstock 1912, Spider Book p. 699 f. 770 a, b (N).
P. p. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 183 f. 83—85 (D ♂♀).
P. p. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 452 T. 88 F. 1628—30; T. 89 F. 1646—47; T. 144 F. 2137 (D ♂♀).

♂♀ **scorpionia** (Hentz) 1846. – * U. St. Amerika, Canada

Synemosyna s. Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 369 T. 22 F. 19 (D ♂).
Synemosyna ephippiata Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 369 T. 22 F. 20 (D ♀).
Salticus fuligineus Blackwall 1846, Ann. Mag. Nat. Hist. (1) 17 p. 36 (D ♂♀).
Synageles scorpiona Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 95 T. 6 F. 72 (D ♂♀).
Synageles scorpiona Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 63 T. 5 F. 1d (D ♂♀).
P. scorpionea Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 496 f. 584, 585 (N).
P. s. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 105 f. 86—87 (D ♂♀).

Gen. **Uluella** Chickering 1946.

♂♀ **formosa** Chickering 1946. Panama

U. f. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 419 f. 376—383 (D ♂♀).

6. Subfam. Spilarginae

1. Gr. Spilargeae

Gen. **Eupalina** Strand 1932.

♂ **praemandibularis** (Hasselt) 1893. Singapore, Sumatra, Celebes

Attus p. Hasselt 1893, Tijschr. Ent. 36 p. 157 (D ♂).
Lagnus ruber Workman 1896, Malays. Spid. p. 104 TF. 104 (D ♂).
Eupalia rubra Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 104 (D ♂).
Eupalia rubra Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 763 f. 908—910 (N ♂).
Eupalia p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 767 (N).
Eu. p. Strand 1932, Folia Zool. Hydrobiol. 4 (2) p. 136 (nom. nov. gen.).

Gen. **Spilargis** Simon 1902.

♂ o **ignicolor** Simon 1902. – * Halmahera

S. i. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 366 (D ♂♀).
S. i. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 767 f. 904—907 (N ♂).

♂♀ **ignicolor bimaculata** Strand 1909. Halmahera

S. i. b. Strand 1909, Abh. Nat. Ges. Görlitz 26 p. 122 (D ♂♀).

Gen. **Thorelliola** Strand 1942.

(= **Thorellia** Keyserling 1882, nec Boeck 1865)

Transgredierende Arten:

♂♀ **ensifera** (Thorell) 1877. – * Sumatra, Java, Celebes, Amboina, Samoa, Tahiti, Marquesas-I., Marshall-I.

Plexippus e. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 606 (D ♂).
Plexippus e. Thorell 1778, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 257 (D ♀).
Thorellia e. Keyserling 1882, Arachn. Austral 1 (2) p. 1353 T. 116 F. 1, 2 (D ♂).
Hasarius e. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 430 (N).
Thorellia e. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 24 p. 767 f. 911—914 (N ♂).
Thorellia e. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) p. 318 f. Y1 (N ♂).
Thorellia e. Berland 1935, Pacif. Ent. Surv. Publ. 8 (4) p. 46 f. 6, 7 (N ♂).
T. e. Strand 1942, Fol. Zool. Hydrobiol. 11 (2) p. 400 (nom. nov. gen.).

Australische Arten:

♂ **doryphora** (Thorell) 1881. W.-Neu-Guinea

Plexippus d. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 615 (D ♂).
Thorellia d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 766 (N).

♂ **monoceros** (Karsch) 1881. I. Jaluit

Ictidops m. Karsch 1881, Berlin. Ent. Zeitschr. 25 p. 16 (D ♂).

♂ **nigromaculata** (Keyserling) 1883. Queensland

Ergane n. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1463 T. 123 F. 5 (D ♂).
Thorellia n. Rainbow 1911, Rec. Austral. Mus. 9 (2) p. 302 (C).

2. Gr. Ematheae

Gen. **Bindax** Thorell 1892.

♂♀ **chalcocephalus** (Thorell) 1877. Celebes

Plexippus c. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 613 (D ♂♀).
B. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 428 (N).

Gen. **Emathis** Simon 1899.

Orientalische Arten:

♂♀ **coprea** (Thorell) 1890. Sumatra
Hasarius c. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 170 (D ♂♀).
Hasarius c. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 431 (D ♂♀).
E. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 808 (N).

♀ **scabra** (Thorell) 1890. Sumatra
Hasarius s. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 170 (D ♀).
Hasarius s. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 436 (D ♀).

♂ **weyersi** Simon 1899. – * Sumatra, Borneo
E. w. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 108 (D ♂).
E. w. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 810 (N).

Neotropische Arten:

§ 4 Arten: Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 31 p. 110.

♀ **luteopunctata** Petrunkevitch 1930. Portorico
E. l. Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 31 p. 135 f. 117—119 (D ♀).

♂♀ **minuta** Petrunkevitch 1930. Portorico
E. m. Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 31 p. 130 f. 110—116 (D ♂♀).

♂♀ **portoricensis** Petrunkevitch 1930. Portorico
Prostheclina illustris Banks 1901, Proc. U. Stat. Nat. Mus. 24 p. 225 (C ♂).
E. p. Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 31 p. 118, 188 f. 97—103 (D ♂♀).

♂♀ **tetuani** Petrunkevitch 1930. Portorico
E. t. Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 31 p. 125 f. 104—109 (D ♂♀).

Gen. **Gedea** Simon 1902.

♂♀ **flavogularis** Simon 1902. Java
G. f. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 390 (D ♂).
G. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 809 f. 952 (N ♂).

Gen. **Lepidemathis** Simon 1903.

♂ **haemorrhoidalis** (Simon) 1899. Philippinen
Emathis h. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 109 (D ♂).
L. h. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 810 (N).

♂ **sericea** (Simon) 1899. – * Philippinen
Emathis s. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 108 (D ♂).
L. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 810 f. 949 (D ♂).

Gen. **Lophostica** Simon 1902.

♀ **mauriciana** Simon 1902. I. Mauritius
L. m. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 390 (D ♀).
L. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 810 f. 950, 951 (N).

Gen. **Paralophostica** Soares & Camargo 1948.

♂♀ **centralis** Soares & Camargo 1948. Brasilien

P. c. Soares & Camargo 1948, Bol. Mus. Paraens. Goeldi 10 p. 397 f. 67—71 (D ♂♀).

Gen. **Pristobaeus** Simon 1902.

♂ **jocosus** Simon 1902. Celebes

P. j. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 391 (D ♂).
P. j. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 809 (N ♂).

Gen. **Pseudemathis** Simon 1902.

♂♀ **trifida** Simon 1902. I. Mauritius

P. t. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 391 (D ♂♀).
P. t. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 810 (N).

Gen. **Thysema** Mello-Leitao 1944.

♀ **dorae** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires

T. d. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 3 (24) p. 390 f. 87 (D ♀).

7. Subfam. Hasariinae

1. Gr. Athameae

Gen. **Athamas** Cambridge 1877.

♀ **univittata** Berland 1938. Neue Hebriden

A. u. Berland 1938, Ann. Soc. Ent. France 107 p. 155 f. 71—75 (D ♂).

♂♀ **whitmaei** Cambridge 1877. – * Samoa, Tahiti, Loyalty-I., Marquesas-I.

A. w. Cambridge 1877, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 576 T. 56 F. 11 (D ♂).
A. w. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1076 T. 94 F. 5, 6 (D ♂♀).
A. w. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 334 (D).
A. w. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 247 T. 12 F. 3, 11 (D ♂♀).
A. w. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 759 f. 896—900 (N).
A. w. Berland 1935, Pacif. Ent. Surv. Publ. 8 (4) p. 47 f. 8, 9 (N ♂♀).

2. Gr. Microhasarieae

Gen. **Maileus** Peckham 1907.

♀ **fuscus** Peckham 1907. Borneo

M. f. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 612 (D ♀).

Gen. **Microhasarius** Simon 1902.

♂♀ **animosus** Peckham 1907. Borneo

M. a. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 608 (D ♂♀).

♀ **pauperculus** Simon 1902. – * Java

M. p. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 395 (D ♀).
M. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 822 f. 966—968 (N).

Gen. **Ramboia** Mello-Leitao 1943.

♀ **helenica** Mello-Leitao 1943. Rio Grande do Sul
R. h. Mello-Leitao 1943, Arq. Mus. Nac. R. d. Jan. 37 p. 229 TF. 56 (D ♀).

3. Gr. Hasarieae

Gen. **Asaphobelis** Simon 1902.

♂♀ **fasciiventris** Simon 1902. Brasilien
A. f. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 385 (D ♂).
A. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 782 (N).

♀ **pluripunctatus** Mello-Leitao 1947. Brasilien
A. p. Mello-Leitao 1947, Arqu. Mus. Paranaense 6 (6) p. 295 T. 42 F. 42 (D ♀).

♂ **physonychus** Simon 1902. – * Brasilien
A. p. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 384 (D ♂).
A. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 801 f. 932 (N ♂).

Gen. **Bacelarella** Berland & Millot 1941.

♂ **fradei** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste, Franz. Guinea
B. f. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 390 f. 85, 86a, b (D ♂♀).

Gen. **Chalcotropis** Simon 1902.

Orientalische Arten:

♂ **acutefrenatus** Simon 1902. – * Java
C. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 377 (D ♂).
C. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 780 f. 933, 934 (N O) (in f.: **acutecarinata**).

♂ **caelodentatus** Merian 1911. Celebes
C. c. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) p. 321 f. B2 (D ♂).

♂♀ **celebensis** Merian 1911. Celebes
C. c. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) p. 320 f. Z1, A2 (D ♂♀).

♂ **decemstriatus** Simon 1902. Philippinen
C. d. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 380 (D ♂).
C. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 788 (N).

♂ **pennatus** Simon 1902. Indien
C. p. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 378 (D ♂).
C. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 788 (N ♂).

♂ **praeclarus** Simon 1902. Philippinen
C. p. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 378 (D ♂).
C. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 788 (N ♂).

♂ **radiatus** Simon 1902. Celebes
C. r. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 379 (D ♂).
C. r. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 788 (N ♂).

Australische Arten:

♂ **barbipalpis** (Keyserling) 1882. Queensland

Hyllus b. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1344 T. 114 F. 4 (D ♂).
C. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 788 (N).

♀ **insularis** (Keyserling) 1881. Tonga-I.

Hasarius i. Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1283 T. 109 F. 7 (D ♀).
C. i. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 789 (N).

Gen. **Chapoda** Peckham 1896.

§ 4 Arten: Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 113.

♂♀ **festiva** Peckham 1896. – * Brasilien, Guatemala, Panama

C. f. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Wiscons. 3 (1) p. 26 T. 1 F. 7 (D ♂♀).
Sidusa f. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 208 T. 16 F. 1, 2 (D ♂♀).
C. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 804 f. 948 (N ♂).
C. f. Chickering 1946. Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 114 (N ♂♀).

♂♀ **inermis** (F. Cambridge) 1901. Costa Rica, Mexico, Panama

Sidusa i. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 209 T. 16 F. 3, 4 (D ♂♀).
C. i. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 804 (N).
C. i. Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 225 f. 138 (D ♀).
C. i. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 114 (N).

♂ **panamana** Chickering 1946. Panama

C. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 114 (D ♂).

♂♀ **peckhami** Banks 1929. Panama

C. p. Banks 1929, Bull. Mus. Zool. Harvard 69 (3) p. 70 T. 1 F. 5, 15; T. 4 F. 65 (D ♂♀).
C. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 114 (N ♂).

Gen. **Chloridusa** Simon 1902.

♂ **viridiaurea** Simon 1902. Amazonas

C. v. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 388 (D ♂).
C. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 803 (N).

Gen. **Commoris** Simon 1902.

♂ **enoplognatha** Simon 1902. – * I. Guadeloupe

C. e. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 382 (D ♂).
C. e. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 800 f. 935 (N ♂).
C. e. Petrunkevitch 1914, Journ. N. York Ent. Soc. 22 p. 329 f. 1—3 (D ♂).

minor Simon 1903. I. Guadeloupe

C. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 789 (nom. nud. C).

♂ **modesta** Bryant 1943. San Domingo

C. m. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 466 T. 3 F. 22—23 (D ♂).

Gen. **Coryphasia** Simon 1902.

♂♀ **albibarbis** Simon 1902. – * Brasilien

C. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 380 (D ♂♀).
C. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 800 (N).

♂ **castaneipedis** Mello-Leitao 1947. Brasilien
C. c. Mello-Leitao 1947, Arqu. Mus. Paranaense 6 (6) p. 298 (D ♂).

♂ **furcata** Simon 1902. Brasilien
C. f. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 46 p. 381 (D ♂).
C. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 789 (N).

♂ **melloleitaoi** Soares & Camargo 1948. S.-Brasilien
C. m. Soares & Camargo 1948, Rev. Bras. Biol. R. d. Jan. 8 p. 435 f. 27—28 (D ♂).

♂ **nigriventris** Mello-Leitao 1947. Brasilien
C. n. Mello-Leitao 1947, Arqu. Mus. Paranaense 6 (6) p. 298 T. 40 F. 46 (D ♂).

Gen. **Curubis** Simon 1902.

♂ **annulata** Simon 1902. Ceylon
C. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 372 (D ♂).

♂ **erratica** Simon 1902. – * Ceylon
C. e. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 372 (D ♂).
C. e. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 797 f. 926 (N ♂).

♂ **tetrica** Simon 1902. Ceylon
C. t. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 373 (D ♂).
C. t. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 788 (N).

Gen. **Donoessus** Simon 1902.

♂♀ **nigriceps** (Simon) 1899. – * Sumatra, I. Sipora, I. Siberut
Hasarius n. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 105 (D ♂).
D. n. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 799 (N).
D. n. Reimoser 1925, Suppl. Ent. 10 p. 91 (N ♂♀).
D. n. Reimoser 1929, Bull. Raffles Mus. Singapore 2 p. 132 (N ♂♀).

♂ **striatus** Simon 1902. Borneo
D. s. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 376 (D ♂).
D. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 772 f. 928, 929 (N ♂).

Gen. **Dudasia** Strand 1911.

♀ **fissidentata** Strand 1911. Aru-I.
Plexippus dilanians Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 548 (D ♀, nec ♂).
D. f. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (1) p. 190 T. 4 F. 18; T. 6 F. 87 (D ♀).

Gen. **Echeclus** Thorell 1890.

♂ **concinnus** Thorell 1890. I. Pinang
E. c. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 348 (D ♂).

Gen. **Encymachus** Simon 1902.

♀ **hesperus** Lawrence 1927. SW.-Afrika
E. h. Lawrence 1927, Ann. S. Afr. Mus. 25 (1) p. 66 T. 2 F. 52 (D ♀).

♂ **livingstonei** Simon 1902. – * Sambesi
E. l. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 370 (D ♂).
E. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 797 (N).

Gen. **Epidelaxia** Simon 1902.

♂ **albocruciata** Simon 1902. Ceylon

E. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 367 (D ♂).
E. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 788 (N).

♂ **albostellata** Simon 1902. – * Ceylon

E. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 367 (D ♂).
E. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 796 f. 917 (N ♂) (in f.: **albosellata**).

♀ **obscura** Simon 1902. Ceylon

E. o. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 368 (D ♀).
E. o. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 788 (N).

Gen. **Ergane** L. Koch 1881.

♂ **cognata** L. Koch 1881. – * Pelew-I.

E. c. L. Koch 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1261 T. 108 F. 3 (D ♂).
E. c. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 315 (D).
E. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 802 (N).

♂ **insulana** L. Koch 1881. Pelew-I.

E. i. L. Koch 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1265 T. 108 F. 5 (D ♂).
E. i. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 789 (N).

Gen. **Gastromicans** Mello-Leitao 1917.

♀ **sexpunctata** Mello-Leitao 1945. Argentinien

G. s. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 284 f. 73 (D ♀).

♂ **squamulata** Mello-Leitao 1917. Brasilien

G. s. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 147 TF. 16, 22 (D ♂).

Gen. **Hasarius** Simon 1871.

Cosmopolitische Arten:

♂♀ **adansonii** (Audouin) 1827. – * Cosmopolit

Attus a. Audouin 1827, Explic. Planch. Arachn. Savigny Descr. Egypt. p. 404 T. 7 F. 8 (D ♂♀).
Attus tardigradus Audouin 1827, Explic. Planch. Arachn. Savigny Descr. Egypt. p. 406 T. 7 F. 13 (D ♂).
Attus forskaeli Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 428 (D ♀).
Attus capito Lucas 1838, Hist. Nat. Iles Canar. 4 p. 27 T. 7 F. 8 (D ♀).
Salticus oraniensis Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 144 T. 5 F. 8 (D ♂).
Salticus striatus Lucas 1853, Rev. Mag. Zool. (2) 3 (11) p. 521 (D ♀).
Salticus citus Cambridge 1863, Zoologist p. 8561 (D o).
Attus nigrofuscus Vinson 1863, Aran. Réun. Mauric. Madagasc. p. 59, 302 T. 10 F. 8 (D ♀).
Plexippa nigrofusca Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 326 (C).
Plexippus a. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 644 T. 2 F. 12; T. 3 F. 3 (D ♂♀).
H. a. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 330 (108) (N).
Eris niveipalpis Gerstäcker 1873, Gliedertier. Faun. Sansibar-Geb. P. 477 (D ♂).
Salticus scabellatus Butler 1876, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 17 p. 441 (D ♀).
H. a. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 79 (D ♂♀).

Salticus acutus Blackwall 1877, Proc. Irish Ac. Sci. (2) 3 p. 3 T. 1 F. 2 (D ♂♀).
Plexippus ardelio Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 603 (D ♂).
Salticus scabellatus Butler 1878, Trans. Phil. Soc. Lond. 168 p. 507 T. 52 F. 9 (D ♀).
H. citus Cambridge 1878, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 1 p. 127 (N ♂).
H. a. Cambridge 1881, Proc. Dorset F. Cl. 2 p. 566 (D ♂♀).
H. garetti Keyserling 1881, Aradın. Austral. 1 (2) p. 1289 T. 110 F. 4 (D ♀).
H. a. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 312 (D).
Ergane signata Keyserling 1889, Arachn. Austral. 2 p. 263 T. 24 F. 5, 6 (D ♂♀).
H. a. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 56 T. 5 F. 1 (N ♀).
H. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 795 f. 915, 916 (N ♂).
Sidusa borealis Banks 1904, Journ. N. York Ent. Soc. 12 p. 116 T. 6 F. 18 (D ♂).
H. a. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 367 T. 9 F. 134; T. 14 F. 371 (D ♂♀).
Sidusa borealis Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 593 T. 47 F. 10 (D ♂).
H. a. Strand 1918, Arch. Naturg. 82 (A; 11) p. 109 (D ♂).
Sidusa borealis Muma 1944, Amer. Mus. Novit. 1257 p. 12 (N ♂♀).
Nebridia borealis Kaston 1945, Amer. Mus. Novit. 1290 p. 16 TF. 77—79 (N ♂♀).
H. a. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 493 T. 97 F. 1816; T. 100 F. 1851—52 (D ♂♀).
H. a. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 242 f. 115 A, C (D ♂♀).

Palaearktische Arten:

♂ **crinitus** Karsch 1879. Japan
H. c. Karsch 1879, Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf. 36 p. 86 (D ♂).
H. c. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 368 (D ♂).

♀ **doenitzi** Karsch 1879. Japan
H. d. Karsch 1879, Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf. 36 p. 86 (D ♀).
H. d. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 368 T. 13 F. 355, 362 (D ♀).

♂♀ **fulvus** L. Koch 1878. Japan
H. f. L. Koch 1878, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 27 p. 782 T. 16 F. 40 (D ♂♀).
H. f. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 369 (D ♂).

Aethiopische Arten:

♂♀ **berlandi** Lessert 1925. O.-Afrika
H. b. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 511 f. 94—97 (D ♂♀).

♂ **biprocessiger** Lessert 1927. Congo
H. b. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 459 f. 32 (D ♂).

♂ **insignis** Simon 1886. I. Mayotte
H. i. Simon 1886, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 392 (D ♂).

♂ **pauciaculeis** Caporiacco 1941. S.-Abessinien
H. p. Caporiacco 1941, Mis. Biol. Sagan-Omo 12, Zool. 6 p. 157 f. 70 (D ♀).

♂ **roeweri** Lessert 1925. O.-Afrika
H. r. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 509 f. 92, 93 (D ♂).

♀ **rufociliatus** Simon 1897. Seychellen
H. r. Simon 1897, Ann. Soc. Ent. France 66 p. 387 (D ♀).

Australische Arten:

♂ **albocircumdatus** (L. Koch) 1880. Tahiti
Jotus a. L. Koch 1880, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1250 T. 107 F. 4 (D ♂).
H. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 795 (N).

♀ **glaucus** Hogg 1915. Neu-Guinea
H. g. Hogg 1915, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 523 f. 9 (D ♀).

♀ **inhonestus** Keyserling 1881. Neu-S.-Wales
H. i. Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1312 T. 111 F. 8 (D ♀).

♀ **mulciber** Keyserling 1881. Queensland
H. m. Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1310 T. 111 F. 7 (D ♀).

♀ **obscurus** Keyserling 1881. Neu-S.-Wales
H. o. Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1315 T. 112 F. 2 (D ♀).
Ergane o. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1477 (N).

♂ **varicans** (Thorell) 1881. Queensland
Attus v. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 514 (D ♂).

♂ **villosus** Keyserling 1881. Queensland
H. v. Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1281 T. 109 F. 6 (D ♂).

♂♀ **vittatus** Keyserling 1881. Queensland
H. v. Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1304 T. 111 F. 4, 5 (D ♂♀).
H. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 786 (N).

Neotropische Arten:

♀ **bellicosus** Peckham 1896. Guatemala
H. b. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 56 T. 5 F. 2 (D ♀).

♂ **peckhami** Petrunkevitch 1914. Dominica
H. p. Petrunkevitch 1914, Journ. N. York Ent. Soc. 22 p. 330 T. 12 F. 6—9 (D ♂).

Gen. **Longarenus** Simon 1903.

♂ **brachycephalus** Simon 1903. Span. Guinea
L. b. Simon 1903, Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 1 (3) p. 122 (D ♂).
L. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 798 f. 924 (N ♂).

Gen. **Mantius** Thorell 1891.

♂ **armipotens** Peckham 1907. Borneo
M. a. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 610 (D ♂).

♀ **difficilis** Peckham 1907. Borneo
M. d. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 609 (D ♀).

♂ **frontosus** (Simon) 1899. Java
Distillus f. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 107 (D ♂).
M. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 780 f. 944, 945 (N ♂).

♀ **ravidus** (Simon) 1899. Sumatra
Distillus r. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 106 (D ♀).

♀ **russatus** Thorell 1891. – * I. Pinang

M. r. Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 140 (D ♀).
Hasarius r. Workman 1896, Malays. Spid. p. 9 T. 9 (D ♀).
M. r. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 802 (N).

Gen. **Marma** Simon 1902.

♂♀ **baeri** Simon 1902. – * Ecuador

M. b. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 376 (D ♂♀).
M. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 799 (N).

♀ **trifidocarinata** Caporiacco 1947. Brit. Guiana

M. t. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 34 (D ♀).
M. t. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 731 TF. 165 (D ♀).

Gen. **Mopiopia** Simon 1902.

♂♀ **comatala** Simon 1902. S.-Brasilien

M. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 375 (D ♂♀).
M. comatula Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 799 (N).

Gen. **Nannenus** Simon 1902.

♂ **lyriger** Simon 1902. Singapore

N. l. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 371 (D ♂).
N. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 772 f. 921—923 (N ♂).

♂ **syrphus** Simon 1902. – * Singapore

N. s. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 370 (D ♂).
N. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 797 f. 920 (N ♂).

Gen. **Nebridia** Simon 1902.

♂♀ **manni** Bryant 1943. Haiti

N. m. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 492 T. 5 F. 48; T. 6 F. 61, 64, 66 (D ♂♀).

♂ **mendica** Bryant 1943. San Domingo

N. m. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 494 T. 6 F. 62, 65 (D ♂).

♀ **parva** Mello-Leitao 1945. Argentinien

N. p. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 289 f. 79 (D ♀).

♂ **semicana** Simon 1902. – * Venezuela

N. s. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 373 (D ♂).
N. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 798 f. 927 (N ♂).

Gen. **Ocnotelus** Simon 1902.

♀ **argentinus** Mello-Leitao 1941. Argentinien

O. a. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 185 f. 78 (D ♀).

♂ **imberbis** Simon 1902. – * Brasilien

O. i. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 382 (D ♂).
O. i. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 800 f. 930 (N ♂).

♂♀ **lunatus** Mello-Leitao 1947. Süd-Brasilien
O. l. Mello-Leitao 1947, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan., Zool. 80 p. 25 T. 5 F. 52—53 (D ♂♀).

♀ **rubrolunatus** Mello-Leitao 1945. Argentinien
O. r. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 291 f. 80 (D ♀).

Gen. **Ogdenia** Peckham 1908.

♀ **mutilla** (Peckham) 1907. Borneo
Rooseveltia m. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 614 (D ♀).
O. m. Peckham 1908, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 6 (3—4) p. 171 (N).

Gen. **Panysinus** Simon 1901.

♂ **grammicus** Simon 1902. Indien
P. g. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 387 (D ♂).
P. g. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 783 (N).

♂♀ **nicholsoni** (Cambridge) 1899. Java (in europ. Treibhäuser eingeschleppt)
Hasarius n. Cambridge 1899, Proc. Dorset F. Cl. 30 p. 12 T. A (D ♂♀).
P. vittatus Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 386 (D ♂).
P. n. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1244, 1272 f. 2027, 2028 (D ♂♀).

♀ **nitens** Simon 1901. – * Malakka, Sumatra
P. n. Simon 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. (2; 4) p. 74 (D ♀).
P. n. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 803 (N).

♀ **semiargenteus** (Simon) 1877. Philippinen
Euophrys s. Simon 1877, Ann. Soc. Ent. France (5) 7 p. 57 (D ♀).

♂ **semiermis** Simon 1902. Ceylon
P. s. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 387 (D ♂).
P. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 783 (N).

Gen. **Phausina** Simon 1902.

♂ **bivittata** Simon 1902. Ceylon
P. b. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 368 (D ♂).
P. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 741 (N).
P. b. Simon 1905, Mitt. Nat. Mus. Hambg. 22 p. 72 (N).

♂ **flavofrenata** Simon 1902. – * Ceylon
P. f. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 368 (D ♂).
P. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 771, 796 (N).
P. f. Simon 1905, Mitt. Nat. Mus. Hambg. 22 p. 72 (N).

♂ **guttipes** Simon 1902. Ceylon
P. g. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 368 (D ♂).
P. g. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 771 (N).
P. g. Simon 1905, Mitt. Nat. Mus. Hambg. 22 p. 72 (N).

♂ **leucopogon** Simon 1905. Java
P. l. Simon 1905, Mitt. Nat. Mus. Hambg. 22 p. 72 (D ♂).

Gen. **Ptocasius** Simon 1885.

Orientalische Arten:

♂ **fulvonitens** Simon 1902. Ceylon

P. f. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 386 (D ♂).
P. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 779 (N).

♂ **gratiosus** Peckham 1907. Singapore

P. g. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 612 (D ♂).

♂ **plumipalpis** (Thorell) 1895. Burma

Hasarius p. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 395 (D ♂).

♂ **strupifer** Simon 1901. Hongkong

P. s. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 65 (D ♂).
P. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 780 f. 939 (N ♂).

♂ **weyersi** Simon 1885. – * Sumatra

P. w. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. Belg. 29 C. R. p. 35 (D ♂).
P. w. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 337 (D).
P. w. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 802 f. 936—938 (N).

Australische Arten:

♂ **plumbeiventris** (Keyserling) 1881. Queensland

Hasarius p. Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1295 T. 110 F. 7 (D ♂).
P. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 778 (N).

Gen. **Roeweriella** Kratochvil 1923.

♀ **balcanica** Kratochvil 1923. Slavonien

R. b. Kratochvil 1923, Bull. Inst. Nat. Agr. Brünn C 23 p. 5, 8, 15 f. 5—8 (D ♀).

Gen. **Schenkelia** Lessert 1927.

♀ **gertschi** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea

S. g. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 395 f. 86c (D ♀).

♀ **lesserti** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea

S. l. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 393 f. 87, 88 (D ♀).

♂♀ **modesta** Lessert 1927. – * Congo

S. m. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 466 f. 36, 37 (D ♂♀).

Gen. **Semnolius** Simon 1902.

♀ **albofasciatus** Mello-Leitao 1941. Argentinien

S. a. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 188 T. 11 F. 54; f. 81 (D ♀).

♀ **brunneus** Mello-Leitao 1945. Argentinien

S. b. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 296 f. 88 (D ♀).

♂ **chrysotrichus** Simon 1902. – * Brasilien

S. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 369 (D ♂).
S. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 796 f. 918, 919 (N ♂) (in f.: **chrysochirus**).

Gen. **Sidusa** Peckham 1895.

Neotropische Arten:

§ 20 ♂, 22 ♀: F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 197 (part.).

♀ **albida** F. Cambridge 1901. Mexico

S. a. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 213 T. 16 F. 9 (D ♀).
S. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).

♂ **angulitarsis** Simon 1902. Brasilien

S. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 388 (D ♂).
S. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).

♀ **dominicana** Petrunkevitch 1914. Dominica

S. d. Petrunkevitch 1914, Journ. N. York Ent. Soc. 22 p. 329 T. 12 F. 4, 5 (D ♀).

♂ **femoralis** Banks 1909. Costa Rica

S. f. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 222 T. 5 F. 1, 6 (D ♂).

♂♀ **gratiosa** Peckham 1895. – * Amazonas

S. g. Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 175 T. 16 F. 10 (D ♂♀).
S. g. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 803 f. 947 (N ♂).

♀ **inconspicua** Bryant 1940. Cuba

S. i. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 460 T. 18 F. 250 (D ♀).

♂♀ **mona** Bryant 1947. Mona-Ins. (bei Haiti)

S. m. Bryant 1947, Psyche 54 (2) p. 95 T. 4 F. 5—6 (D ♂♀).

♀ **marmorea** F. Cambridge 1901. Panama, Costa Rica

S. m. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 211 T. 15 F. 10 (D ♀).
S. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).

♀ **nigrina** F. Cambridge 1901. Mexico

S. n. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 213 T. 16 F. 8 (D ♀).
S. n. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).

♀ **olivacea** F. Cambridge 1901. Guatemala

S. o. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 211 T. 15 F. 11 (D ♀).
S. o. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).

♀ **pallida** F. Cambridge 1901. Guatemala

S. p. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 (4) p. 211 T. 15 F. 12 (D ♀).
S. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).

♂ **pavida** Bryant 1942. Jungfern-Ins.

S. p. Bryant 1942, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 89 (7) p. 353 T. 3 F. 34, 40 (D ♂).

♂♀ **recondita** Peckham 1896. Panama, Guatemala

S. r. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 96 T. 7 F. 6 (D ♀).
S. r. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 210 T. 15 F. 6, 7 (D ♂♀).
S. r. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).
S. r. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 241 (nach Chickering: spec. **Unidentati**).

♂♀ **stoneri** Bryant 1923. I. Antigua
S. s. Bryant 1923, Univ. Iowa Stud. Nat. Hist. 10 (3) p. 16 T. 2 F. 3—5 (D ♂♀).

♀ **tarsalis** Banks 1909. Costa Rica
S. t. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 221 T. 6 F. 17 (D ♀).

♂♀ **turquinensis** Bryant 1940. Cuba
S. t. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 461 T. 18 F. 240, 248 (D ♂♀).

Nearktische Arten:

♀ **arizonensis** Banks 1904. Arizona
S. a. Banks 1904, Journ. N. York Ent. Soc. 12 p. 116 T. 5 F. 9 (D ♀).
S. a. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 594 (D ♀).

Gen. **Siloca** Simon 1902.

♂♀ **bulbosa** Tullgren 1905. Argentinien
S. b. Tullgren 1905, Ark. Zool. 2 (19) p. 77 T. 10 F. 41 (D ♂♀).

♂ **campestrata** Simon 1902. Mato Grosso
S. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 389 (D ♂).
S. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 785 (N).

♂ **cubana** Bryant 1940. Cuba
S. c. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 456 T. 18 F. 242—243 (D ♂).

♂♀ **electa** Bryant 1943. San Domingo
S. e. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 516 T. 8 F. 89—91 (D ♂♀).

♂♀ **minuta** Bryant 1940. Cuba
S. m. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 457 T. 18 F. 241, 245, 249 (D ♂♀).

♂♀ **monae** Petrunkevitch 1930. Portorico
S. m. Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 31 p. 151 f. 135—139 (D ♂♀).

♂ **sanguiniceps** Simon 1902. – * Brasilien
S. s. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 389 (D ♂).
S. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 804 (N).

Gen. **Tachyskarthmos** Hogg 1922.

♂ **annamensis** Hogg 1922. Annam
T. a. Hogg 1922, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 310 (D ♂).

Gen. **Tariona** Simon 1902.

bruneti Simon 1903. Brasilien
T. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 789 (nom. nud. C).

♂ **gounellei** Simon 1902. – * Brasilien
T. g. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 383 (D ♂).
T. g. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 801 (N).

mutica Simon 1903. Brasilien

T. **m.** Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 789 (nom. nud.).

Gen. **Tarne** Simon 1885.

♂♀ **dives** Simon 1885. W.-Afrika

T. d. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 392 (D o).
T. d. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 374 (D ♂♀).
T. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 798 f. 925 (N ♂).

Gen. **Tularosa** Peckham 1903.

♀ **ogdoni** Peckham 1903. – * S.-Afrika

T. o. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 246 T. 28 F. 4 (D ♀).

♂♀ **plumosa** Lessert 1925. O.-Afrika

T. p. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 519 f. 105—109 (D ♂♀).

Gen. **Tusitala** Peckham 1902.

♂♀ **barbata** Peckham 1902. – * S.- u. O.-Afrika

T. b. Peckham 1902, Psyche 9 (312) p. 330 (D ♂).
T. hirsuta Peckham 1902, Psyche 9 (312) p. 330 (D ♂).
Monoclova braunii Peckham 1902, Psyche 9 (312) p. 331 (D ♀).
T. b. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 243 T. 28 F. 2 (D ♂).
T. hirsuta Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 244 T. 28 F. 3 (D ♂).
T. braunsii Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 245 T. 28 F. 1 (D ♀).
T. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 802 f. 940—943 (N).
T. sansibarica Strand 1907, Zool. Anz. 31 (23) p. 748 (D ♂♀).
T. sansibarica Strand 1908, Nyt Mag. Naturw. Christiania 46 (2) p. 219 (D ♂♀).
T. emertoni Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 514 f. 98—100 (D ♂♀).
T. b. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 395 (N ♂).

♂♀ **barbata longipalpis** Lessert 1925. Ost-Afrika, Abessinien

T. b. l. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 517 f. 101—103 (D ♂).
T. b. l. Caporiacco 1940, Atti. Accad. Ital. 11 p. 867 f. 57 (N ♂♀).

♂ **discibulba** Caporiacco 1941. Süd-Abessinien

T. d. Caporiacco 1941, Miss. Biol. Sagan-Omo 12, Zool. 6 p. 158 f. 71 (D ♂).

♀ **guineensis** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea

T. g. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 395 f. 89 (D ♀).

♂ **lutzi** Lessert 1927. Congo

T. l. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 462 f. 33—35 (D ♂).

Gen. **Tylogonus** Simon 1902.

§ 2 ♂, 1 ♀: F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 197 (sub **Sidusa**; part.).

♂ **auricapillus** Simon 1902. – * Ecuador

T. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 384 (D ♂).
T. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 801 (N).

♂ **dentichelis** (F. Cambridge) 1901. Mexico
Sidusa d. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 212 T. 15 F. 13 (D ♂).
T. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790, 801 (N).

miles Simon 1903. Venezuela
T. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 789 (nom. nud. C).

♂ **minutus** (F. Cambridge) 1901. Mexico
Sidusa m. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 212 T. 15 F. 14 (D ♂).
T. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).

♂ **prasinus** Simon 1902. Amazonas
T. p. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 384 (D ♂).
T. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 783 (N ♂).

♀ **vittatus** (F. Cambridge) 1901. Guatemala
Sidusa v. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 213 T. 16 F. 7 (D ♀).
T. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).

Gen. **Uxuma** Simon 1902.

♂ **impudica** Simon 1902. Gabun
U. i. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 372 (D ♂).
U. i. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 797 f. 931 (N ♂).

Gen. **Viroqua** Peckham 1901.

♂ **ultima** (L. Koch) 1881. Australien
Jotus u. L. Koch 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1259 T. 108 F. 2 (D ♂).
V. u. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 334 (N).
V. u. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 796 (N).

8. Subfam. Maeviinae

1. Gr. Simaetheae

Gen. **Afrobeata** Caporiacco 1941.

♀ **latithorax** Caporiacco 1941. Süd-Abessinien
A. l. Caporiacco 1941, Miss. Biol. Sagan-Omo 12, Zool. 6 p. 155 f. 69 (D ♀).

Gen. **Beata** Peckham 1895.

Aethiopische Arten:

♀ **lineata** (Vinson) 1863. Madagascar
Attus l. Vinson 1863, Aran. Réun. Mauric. Madagasc. p. 53, 301 T. 10 F. 4 (D ♀).
B. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).

Neotropische Arten:

§ 19 ♂, 16 ♀: F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 258—262 (sub. **Metaphidippus**, part.).
§ 5 ♂, 7 ♀: Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 258—259.

♂ **albopilosa** Simon 1903. Paraguay
B. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 831 f. 988 (N ♂).

♂♀ **blauveldae** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
B. b. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 34 (D ♂♀).
B. b. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 732 TF. 167—168 (D ♂♀).

♀ **cephalica** F. Cambridge 1901. Panama
B. c. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 293 T. 28 F. 9 (D ♀).
B. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).
B. c. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 260 (N ♀).

♀ **cinereonitida** Simon 1902. Brasilien
B. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 396 (D ♀).
B. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).

♂ **digitata** (F. Cambridge) 1901. Guatemala, Mexico
Metaphidippus d. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 269 T. 24 F. 12 (D ♂).
B. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).
Dendryphantes d. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 220 (C).

♂ **flavolineata** (F. Cambridge) 1901. Panama
Metaphidippus f. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 268 T. 24 F. 9 (D ♂).
B. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).
B. f. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 260 (N).

♀ **germaini** Simon 1902. Brasilien, Paraguay
B. g. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 396 (D ♀).
B. g. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).

♂ **jubata** (C. L. Koch) 1846. I. St. Thomas
Eris j. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 190 TF. 1238 (D ♂).
B. j. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).

♂♀ **levispina** (F. Cambridge) 1901. Panama
Metaphidippus l. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 267 T. 24 F. 4 (D ♂♀).
Dendryphantes l. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 634 (C).
B. l. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 260 f. 219—224 (D ♂♀).

♂ **longipes** (F. Cambridge) 1901. Panama
Homalattoides l. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 294 T. 28 F. 12 (D ♂).
B. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).
B. l. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 265 (N ♂).

♀ **magna** Peckham 1895. – * Columbien, Panama, Guatemala
B. m. Peckham 1895, Proc. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 168 T. 15 F. 9 (D ♀).
B. m. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 293 T. 28 F. 8 (N ♀).
Bianor m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 638 (N).
B. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 841 (N).
B. m. Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 221 f. 136 (D ♀).
B. m. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 264 (N ♀).

♀ **munda** Chickering 1946. Panama
B. m. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 265 f. 225 (D ♀).

♂♀ **octopunctata** (Peckham) 1893. I. St. Vincent
Dendryphantes o. Peckham 1893, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 679 T. 61 F. 5 (D ♂♀).
B. o. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).

♂♀ **pernix** (Peckham) 1901. Brasilien
Dendryphantes p. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 321 T. 28 F. 5 (D ♂♀).
B. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).

♀ **striata** Petrunkevitch 1925. Panama
B. s. Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 223 f. 137 (D ♀).
B. s. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 267 (N ♀).

♂♀ **variegata** (F. Cambridge) 1901. Mexico
Metaphidippus v. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 268 T. 24 F. 10, 11 (D ♂♀).
B. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).
B. v. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 267 f. 226—227 (D ♀).

♂ **venusta** Chickering 1946. Panama
B. v. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 271 f. 228—230 (D ♂).

♀ **zeteki** Chickering 1946. Panama
B. z. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 276 f. 231—232 (D ♀).

Gen. **Heratemita** Strand 1932.

♂ **alboplagiata** (Simon) 1899. Philippinen
Heratemis a. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 111 (D ♂).
Heratemis a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 835 (N).
H. a. Strand 1932, Folia Zool. Hydrobiol. 4 (2) p. 138.

♂♀ **chrysozona** (Simon) 1899. – * Philippinen
Heratemis c. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 110 (D ♂♀).
Heratemis c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 835, 843 f. 990 (N).
H. c. Strand 1932, Folia Zool. Hydrobiol. 4 (2) p. 138 (nom. nov. gen.).

Gen. **Irura** Peckham 1900.

o **mandarina** Simon 1902. Cochinchina
I. m. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 735 (D o).
I. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 836 (N).

♀ **pulchra** Peckham 1900. – * Ceylon
I. p. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 227 T. 2 F. 3 (D ♀).
I. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 836, 843 (N).

♀ **pygaea** (Thorell) 1891. I. Pinang
Euophrys p. Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 135 (D ♀).
Euophrys p. Workman 1896, Malays. Spid. p. 6 T. 6 (D ♀).

Gen. **Ligurra** Simon 1903.

♀ **aheneola** (Simon) 1885. Malakka
Simaetha a. Simon 1885, Bull. Soc. Zool. France 10 p. 454 (D ♀).
L. a. Simon 1905, Mitt. Nat. Mus. Hambg. 22 (2) p. 73 (N).

♂ **albostriata** (Thorell) 1891. Nicobaren

Homalattus a. Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 104 (D ♂).
L. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 842 (N).

♂♀ **latidens** (Doleschall) 1859. – * Malakka, Java, Philippinen

Salticus l. Doleschall 1859, Act. Soc. Ind. Neerl. 5 p. 21 T. 10 F. 6 (D ♀).
Homalattus l. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 262 (D ♂♀).
Simaetha severa Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 307 (D ♀).
L. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 842 f. 986, 987 (N ♂).
L. l. Simon 1905, Mitt. Nat. Mus. Hambg. 22 (2) p. 73 (N ♂).

Gen. **Maeviobeata** Caporiacco 1947.

♂♀ **charitonovi** Caporiacco 1947. Brit. Guiana

M. c. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 34 (D ♂♀).
M. c. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 734 TF. 169 (D ♂♀).

Gen. **Phyaces** Simon 1902.

♂♀ **comosus** Simon 1902. – * Ceylon

P. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 399 (D ♂♀).
P. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 844 f. 992 (N).

♂o **furiosus** Hogg 1919. Sumatra

P. f. Hogg 1919, Journ. Fed. Malay. Mus. 8 (3) p. 101 T. 11 F. 10 (D ♂ o).

Gen. **Simaetha** Thorell 1881.

Aethiopische Arten:

♂♀ **castanea** Lessert 1927. Congo

S. c. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 469 p. 38, 39 (D ♂♀).

Orientalische Arten:

♀ **angulosa** (Karsch) 1879. Ceylon

Ballus a. Karsch 1879, Zeitschr. ges. Naturw. 52 p. 553 (D ♀).
S. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).

♀ **cingulata** (Karsch) 1891. Ceylon

Homalattus c. Karsch 1891, Berlin. Ent. Zeitschr. 36 (2) p. 299 T. 12 F. 25 (D ♀).
S. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).

♂ **laminata** (Karsch) 1891. Ceylon

Homalattus l. Karsch 1891, Berlin. Ent. Zeitschr. 36 (2) p. 298 T. 12 F. 23 (D ♂).
S. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).

♀ **reducta** (Karsch) 1891. Ceylon

Homalattus r. Karsch 1891, Berlin. Ent. Zeitschr. 36 (2) p. 299 T. 12 F. 24 (D ♀).
S. r. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).

Australische Arten:

♀ **chelicerata** Szombathy 1915. Neu-Guinea

S. c. Szombathy 1915, Ann. Mus. Nat. Hungar. 13 p. 482 f. 10 (D ♀).

♂♀ **paetula** (Keyserling) 1882. Queensland

Eulabes p. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1388 T. 117 F. 6, 7 (D ♂♀).
Pirithous p. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1477 (N).

Pirithous p. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 285 (D).
S. p. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 306 T. 25 F. 3 (N).
S. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 832 f. 981—984 (N ♂).

♂ **robustior** (Keyserling) 1882. N.-Australien
Eulabes r. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1396 T. 118 F. 5 (D ♂).
Pirithous r. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1477 (N).
S. r. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).

♂♀ **tenuideus** (Keyserling) 1882. (recte: **tenuidens**) Queensland
Eulabes t. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1393 T. 118 F. 3, 4 (D ♂♀).
Pirithous t. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1477 (N).
S. t. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 306 (N).
S. t. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).

♂♀ **thoracica** Thorell 1881. – * Queensland
S. t. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 521 (D ♀).
Eulabes fissidens Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1391 T. 118 F. 1, 2 (D ♂♀).
Pirithous fissidens Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1477 (N).
S. t. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 300 (D).
S. t. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 842 (N).

Gen. **Simaethula** Simon 1902.

♂♀ **auronitens** (L. Koch) 1879. Queensland, Neu-S.-Wales
Homalattus a. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1085 T. 95 F. 2, 3 (D ♂♀).
S. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 839 (N).

♂ **chalcops** Simon 1909. W.-Australien
S. c. Simon 1909, Faun. S. W. Austral. 2 (12) p. 207 (D ♂).

♀ **janthina** Simon 1902. – * Queensland
S. j. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 399 (D ♀).
S. j. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 843 f. 991 (N).

♂ **mutica** Szombathy 1915. Neu-S.-Wales
S. m. Szombathy 1915, Ann. Mus. Nat. Hungar. 13 p. 484 f. 11 (D ♂).

♂♀ **tenuior** (Eyserling) 1882. Queensland
Eulabes t. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1399 T. 118 F. 6, 7 (D ♂♀).
Pirithous t. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1477 (N).
S. t. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 832 f. 985 (N ♂).

♀ **violacea** (L. Koch) 1879. Queensland
Homalattus v. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1090 T. 95 F. 6 (D ♀).
S. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 839 (N).

Gen. **Stergusa** Simon 1888.

Orientalische Arten:

♂ **aurata** Simon 1902. Ceylon
S. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 401 (D ♂).

♂♀ **aurichalcea** Simon 1902. Ceylon
S. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 401 (D ♂♀).
S. orichalcea Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 840 (C).

♂ **stelligera** Simon 1902. Ceylon

S. s. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 402 (D ♂).

Australische Arten:

♂ **improbula** Simon 1888. – * Neu-Caledonien

S. i. Simon 1888, Ann. Soc. Ent. France (6) 8 p. 239 (D ♂).
S. i. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 844 (N).

Gen. **Stertinius** Simon 1890.

Orientalische Arten:

♂ **balius** (Thorell) 1890. Sumatra

Bianor b. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 73 (D ♂).
Bianor b. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 256 (D ♂).
Bianor b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 638 (N).

♂♀ **capucinus** Simon 1902. Java

S. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 398 (D ♂♀).
S. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 834 (N).

♂♀ **cyprius** Merian 1911. Celebes

S. c. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) p. 326 f. D 2, E 2 (D ♂♀).

♀ **incitatus** (Thorell) 1890. Sumatra, Java

Bianor i. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 159 (D ♀).
Bianor i. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 259 (D ♀).
Bianor i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 638 (N).

♂ **leucostictus** (Thorell) 1890. Sumatra

Bianor l. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 158 (D ♂).
Bianor l. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 252 (D ♂).
S. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 839 (N).

♂♀ **magnificus** Merian 1911. Celebes

S. m. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) p. 328 f. F 2 (D ♂♀).

♂♀ **niger** Merian 1911. Celebes

S. n. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) p. 327 (D ♂♀).

♂ **nobilis** (Thorell) 1890. Celebes

Homalattus n. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 160 (D ♂).
Homalattus n. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 278 (D ♂).
S. n. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).

♂ **patellaris** Simon 1902. Molukken

S. p. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 399 (D ♂).
S. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).

♀ **pilipes** Simon 1902. Philippinen

S. p. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 397 (D ♀).

♂♀ **splendens** Simon 1902. Celebes

S. s. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 397 (D ♂♀).
S. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).

Australische Arten:

♂ **dentichelis** Simon 1890. – * Marianen, I. Guam

S. d. Simon 1890, Ann. Soc. Ent. France (6) 10 p. 136 (D ♂).
S. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 842 f. 989 (N).

Gen. **Uroballus** Simon 1902.

♂ **henicurus** Simon 1902. Ceylon
U. h. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 401 (D ♂).
U. h. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 839 (N).

♂♀ **octovittatus** Simon 1902. – * Ceylon
U. o. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 400 (D ♂♀).
U. o. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 844 f. 993 (N).

Gen. **Vatovia** Caporiacco 1940.

♂ **albosignata** Caporiacco 1940. Abessinien
V. a. Caporiacco 1940, Atti Accad. Ital. 11 (18) p. 869 f. 58 (D ♂).

2. Gr. Donaldieae

Gen. **Donaldius** Chickering 1946.

♀ **lucidus** Chickering 1946. Panama
D. l. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 278 f. 237—241 (D ♀).

3. Gr. Maevieae

Gen. **Anicius** Chamberlin 1925.

♂ **dolius** Chamberlin 1925. Mexico
A. d. Chamberlin 1925, Proc. Calif. Ac. Sci. 4 (14) p. 131 f. 45—46 (D ♂).

Gen. **Balmaceda** Peckham 1894.

♂ **anulipes** Soares 1942. San Paulo
B. a. Soares 1942, Pap. Avuls. S. Paulo 2 (19) p. 262 f. 7 (D ♂).

♀ **biteniata** Mello-Leitao 1922. Brasilien
B. b. Mello-Leitao 1922, Ann. Soc. Ent. France 91 p. 226 (D ♀).

♂ **chickeringi** Roewer 1951. Panama
B. peckhami Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 58 f. 36—41 (D ♂) (praeocc. Bryant 1940).
B. c. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 450 (nom. nov.).

estebanensis Simon 1903. Venezuela
B. e. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 848 (nom. nud. C).

♂♀ **modesta** (Taczanowski) 1878. Peru
Marptusa m. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 320 (D ♂♀).
B. m. Peckham 1894 Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 101 (N).

♂ **nigrosecta** Mello-Leitao 1945. Argentinien
B. n. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 277 (D ♂).

♀ **peckhami** Bryant 1940. Cuba
B. p. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 464 T. 18 F. 247; T. 19 F. 251 (D ♀).

♂♀ **picta** Peckham 1894. – * Guatemala, Panama

B. p. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 101 T. 10 F. 1 (D ♂♀).
B. p. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 297 T. 28 F. 18—19 (N ♂♀).
B. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 61 f. 42—44 (D ♀).

♀ **reducta** Chickering 1946. Panama

B. r. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 64 f. 45—47 (D ♀).

♂ **tristis** Mello-Leitao 1945. Argentinien

B. t. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 278 f. 67 (D ♂).

♀ **turneri** Chickering 1946. Panama

B. t. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 66 f. 48—51 (D ♀).

variegata Simon 1903. Brasilien

B. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 846 f. 999 (N).

O o **vera** Mello-Leitao 1917. Brasilien

B. v. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 148 (D O o).

Gen. **Empanda** Simon 1903.

♂♀ **ornata** (Peckham) 1885. Guatemala

Bavia o. Peckham 1885, Proc. Ac. Sci. Wiscons. p. 80 T. 2 F. 11 (D ♂♀).
Epinga o. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 95 (N).
Epinga o. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 9 (N).
Epinga o. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 248 T. 21 F. 14—16 (N ♂♀).
E. o. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 850 f. 997, 998 (N).

Gen. **Fuentes** Peckham 1894.

Neotropische Arten:

♀ **floridana** (Gertsch) 1934. Florida

Metacyrba f. Gertsch 1934, Amer. Mus. Novit. 726 p. 19 (D ♀).

♂♀ **insularis** (Banks) 1902. Galapagos-I.

Cyrba i. Banks 1902, Proc. Wash. Ac. Sci. 4 p. 66 (D ♀).
Metacyrba i. Banks 1931, Nyt. Mag. Naturw. Christiania 68 p. 278 T. 1 F. 1, 2 (D ♂).

♂♀ **pertinax** Peckham 1894. – * Honduras

F. p. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 113 T. 11 F. 4 (D ♂♀).
F. p. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 297 T. 28 F. 16, 17 (N ♂♀).
F. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 850 (N).

♂ **pictipes** (Banks) 1903. Haiti

Metacyrba p. Banks 1903, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 55 p. 343 T. 15 F. 7 (D ♂).
Metacyrba p. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 489 T. 5 F. 49 (D ♂).

♀ **sexguttata** Mello-Leitao 1945. Argentinien

F. s. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 282 f. 72 (D ♀).

Transgredierende Arten:

♂♀ **taeniola** (Hentz) 1846. I. Bonaire, Cuba, Costa Rica, Mexico, U. St. Amerika

Attns t. Hentz 1846, Boston. Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 353 T. 21 F. 5 (D ♀).
Attus t. Hasselt 1887, Tijdschr. Ent. 30 p. 242 (D ♂).
Cyrba t. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 75 T. 5 F. 56; T. 6 F. 56 (D ♂♀).
Metacyrba t. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 252 T. 22 F. 9, 10 (N ♂♀).
Cyrba t. Emerton 1902, Common Spid. p. 63 f. 159, 160 (D ♀).
F. t. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 846 f. 1000 (N ♂).
Metacyrba similis Banks 1904, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 3 (13) p. 360 T. 38 F. 9 (D ♂).
Metacyrba t. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 486 T. 39 F. 5; T. 40 F. 4 (D ♂♀).

Nearktische Arten:

♂♀ **lineata** (C. L. Koch) 1848. U. St. Amerika, Labrador

Maevia l. C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 77 TF. 1332 (D ♂).
Attus quadrilineatus Peckham 1883, Descr. Spid. Fam. Attid. p. 19 T. 2 F. 15 (D ♀).
Icius l. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 45 T. 1 F. 32; T. 3 F. 32 (D ♀).
Menemerus l. Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 239 T. 19 F. 5 (D ♂♀).
F. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 848 (N).
Onondaga l. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 4) p. 492 T. 39 F. 9 (D ♂♀).
Onondaga l. Comstock 1912, Spider Book p. 696 f. 764 (N).
F. l. Kaston 1938, Bull. Connect. Geol. Nat. Hist. Surv. 60 p. 195 (N).
F. l. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 147 f. 9—11 (D ♂♀).
Onondaga l. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 494 T. 99 F. 1850; T. 100 F. 1854—1857 (D ♂♀).

Gen. **Maevia** C. L. Koch 1848.

Palaearktische Arten:

♂ **nigrifrontis** Saito 1939. N.-Japan

M. n. Saito 1939, Saito Ho-on Kai Mus. Res. Bull. 18 p. 41 f. 5 (5); T. 1 F. 14 (D ♂).

Neotropische Arten:

♂ **gracilipes** Taczanowski 1878. Peru

M. g. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) 332 (D ♂).

♀ **stellifera** Holmberg 1876. Argentinien

M. s. Holmberg 1876, An. Agr. Republ. Argentin. 4 p. 147 (24) (D ♀).

♂ **susiformis** Taczanowski 1878. Peru

M. s. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 330 (D ♂).

♀ **trilineata** Taczanowski 1878. Peru

M. t. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 331 (D ♀).

♀ **virilis** Holmberg 1876. Argentinien

M. v. Holmberg 1876, An. Agr. Republ. Argentin. 4 p. 147 (24) (D ♀).

Nearktische Arten:

♂♀ **poultonii** Peckham 1901. Texas, Arizona

M. p. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 344 T. 25 F. 15; T. 26 F. 3 (D ♂♀).
Plexippus vittatus Banks 1905, Proc. Ent. Soc. Wash. 7 p. 100 T. 2 F. 6 (D ♀).
M. p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 451 T. 49 F. 8 (D ♂♀).

♂♀ **vittata** (Hentz) 1856. – * U. St. Amerika, Canada

? **Attus inclemens** Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 465 (D ♂♀).
? **Attus ictericus** Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 452 (D ♀. part.).
? **Attus aspergatus** Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 467 (D ♀).
Attus v. Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 360 T. 22 F. 23 (D ♂♀).
Attus niger Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 359 T. 21 F. 19 (D ♂).
Plexippus undatus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 123 TF. 1183 (D ♂).
M. pennicillata C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 69 TF. 1325 (D ♂).
M. annulipes C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 80 TF. 1335 (D ♀).
M. penicillata Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 308 (D).
Astia v. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 70 T. 1 F. 52; T. 5 F. 52 (D ♂♀).
M. v. Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 236 T. 19 F. 1 (D ♂♀).
M. v. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 344 T. 25 F. 7 (N).
M. v. Emerton 1902, Common Spid. p. 59 f. 152—154 (D ♂♀).
M. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 849 f. 994—996 (N ♂).
M. v. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 452 T. 49 F. 7; T. 51 F. 8 (D ♂♀).
M. v. Comstock 1912, Spider Book p. 694 f. 761—763 (N).
M. v. Painter 1913, Zool. Jahrb. Syst. 35 (5—6) p. 627 f. 1 (N ♂♀).
M. inclemens Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 202 T. 1 F. 21 (N ♂♀).
M. v. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 166 f. 50—52 (D ♂♀).
M. v. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 495 T. 100 F. 1858—1860; T. 101 F. 1871—1873 (D ♂♀).

4. Gr. Rudreae

Gen. **Marbellina** Chickering 1946.

♂ **prescotti** Chickering 1946. Panama

M. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 68 f. 52—57 (D ♂).

Gen. **Poultonella** Peckham 1909.

♀ **alboimmaculata** (Peckham) 1883. Jowa

Attus a. Peckham 1883, Descr. Spid. Fam. Attid. p. 24 T. 3 F. 19 (D ♀).
Dendryphantes a. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 41 T. 3 F. 29 (D ♀).
P. a. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 577 (D ♀).

Gen. **Pseudomaevia** Rainbow 1920.

♂ **cognata** Rainbow 1920. – * Lord Howe-I.

P. c. Rainbow 1920, Rec. S. Austral. Mus. 1 p. 269 T. 31 F. 123—127 (D ♂).

♂♀ **insulana** Berland 1942. Marotini
P. i. Berland 1942, Occ. Pap. Bishop Mus. Honolulu 17 (1) p. 7 f. 1b, c (D ♂♀).

♀ **insulana aorai** Berland 1942. Tahiti
P. i. a. Berland 1942, Occ. Pap. Bishop Mus. Honolulu 17 (1) p. 8 f. 1f (D ♀).

Gen. **Rudra** Peckham 1885.

♀ **baurensis** Badcock 1932. Paraguay-Chaco
R. b. Badcock 1932, Proc. Linn. Soc. Lond. 38 p. 46 f. 38 (D ♀).

♀ **geniculata** Peckham 1885. – * Guatemala, Panama
R. g. Peckham 1885, Proc. Nat. Hist. Soc. Wiscons. p. 77 T. 2 F. 9 (D ♀).
R. g. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 121 T. 12 F. 3 (D ♀).
R. g. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 255 T. 22 F. 14 (N ♀).
R. g. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 852 (N).
R. g. Banks 1929, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 69 (3) p. 65 (C ♂).
R. g. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 72 (N ♂♀).

♀ **humilis** Mello-Leitao 1945. Argentinien
R. h. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 294 f. 86 (D ♀).

♂ **impatiens** Mello-Leitao 1945. Brasilien
R. i. Mello-Leitao 1945, Trans. Connect. Ac. Sci. 36 p. 174 (D ♂).

♀ **multispina** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
R. m. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 34 (D ♀).
R. m. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 732 TF. 166 (D ♀).

♀ **polita** Peckham 1894. Guatemala
R. p. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 121 T. 12 F. 4 (D ♀).
R. p. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 255 T. 22 F. 14 (N ♀).
R. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 851 f. 1001—1003 (N).

♀ **proxima** Mello-Leitao 1922. Brasilien
R. p. Mello-Leitao 1922, Ann. Soc. Ent. France 91 p. 227 f. 24 (D ♀).

♀ **tenera** Peckham 1894. Brasilien
P. t. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Winscons. 2 (2) p. 122 T. 12 F. 5 (D ♀).

9. Subfam. Zygoballinae

1. Gr. Hyetusseae

Gen. **Atmosphyrus** Simon 1902.

O **tristiculus** Simon 1902. Chile
A. t. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 405 (D O).
A. t. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 862 (N).

Gen. **Hyetussa** Simon 1902.

♀ **cribrata** Simon 1902. Venezuela
H. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 404 (D ♀).
H. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 862 f. 1014—1016 (N).

Gen. **Tanybelus** Simon 1902.

♂ **aeneiceps** Simon 1902. Venezuela

T. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 405 (D ♂).
T. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 862 (N ♂).

2. Gr. Zygoballeae

Gen. **Rhetenor** Simon 1902.

Neotropische Arten:

♀ **diversipes** Simon 1902. – * Amazonas

R. d. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 406 (D ♀).
R. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 866 f. 1023 (N).

Nearktische Arten:

♂♀ **texanus** Gertsch 1936. Texas

R. t. Gertsch 1936, Amer. Mus. Novit. 852 p. 25 TF. 25, 26 (D ♂♀).

Gen. **Zygoballus** Peckham 1885.

Neotropische Arten:

§ 4 ♂, 4 ♀: F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 289.

♂♀ **concolor** Bryant 1940. Cuba

Z. c. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 480 T. 20 F. 265; T. 21 F. 272—273 (D ♂♀).

♀ **desidiosus** (Peckham) 1896. Panama, Costa Rica

Messua d. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 94 T. 6 F. 9; T. 7 F. 5 (D ♀).
Messua d. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 299 T. 29 F. 10 (N ♀).
Z. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 865 (N).
Z. d. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 405 (N ♀).

♂♀ **electus** Chickering 1946. Panama

Z. e. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 405 f. 363—367 (D ♂♀).

♂ **gracilipes** Crane 1945. Brit. Guiana

Z. g. Crane, Zoologica, N. York 30 p. 36 f. 3A—E (D ♂).

♀ **maculatipes** Petrunkevitch 1925. Panama

Z. m. Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 226 f. 139 (D ♀).

♀ **maculatus** F. Cambridge 1901. Guatemala

Z. m. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 292 T. 28 F. 7 (D ♀).

♂♀ **minutus** Peckham 1896. Guatemala

Z. m. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 90 T. 7 F. 3 (D ♂♀).
Z. m. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 292 T. 28 F. 5, 6 (N ♂♀).

♀ **mundus** (Cambridge) 1896. Guatemala, Mexico

Rhane m. Cambridge 1896, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 162 T. 19 F. 17 (D ♀).
Z. strenuus Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 92 T. 7 F. 4 (D ♀).

Z. rufipes F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 291 T. 28 F. 1 (N ♀, nec ♂).
Z. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 865 (N).

♂♀ **optatus** Chickering 1946. Panama
Z. o. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 410 f. 368—373 (D ♂♀).

♂ **remotus** Peckham 1896. Guatemala
Z. r. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 89 T. 7 F. 2 (D ♂).
Z. r. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 291 T. 28 F. 2 (N ♂).
Z. r. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 865 (N).

♂♀ **suavis** Peckham 1895. Jamaica
Z. s. Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 173 T. 16 F. 6 (D ♂♀).
Z. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 865 (N).

♂♀ **tibialis** F. Cambridge 1901. Costa Rica, Guatemala, Panama
Z. t. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 292 T. 28 F. 3, 4 (D ♂♀).

Transgredierende Arten:

♂♀ **rufipes** Peckham 1885. – * Guatemala, Panama, Mexico, Texas
Z. r. Peckham 1885, Proc. Nat. Hist. Soc. Wiscons. p. 82 T. 2 F. 12 (D ♂).
Z. r. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 291 T. 27 F. 16 (N ♂, nec ♀).
Z. r. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 866 (N).
Z. r. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 581 (D ♂♀).

Nearktische Arten:

§ 4 ♂: Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 578.
§ 2 ♂, 2 ♀: Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 218.

♂♀ **bettini** Peckham 1888. U. St. Amerika
Z. b. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 89 T. 1 F. 68; T. 6 F. 68 (D ♂♀).
Z. b. Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 230 T. 17 F. 4 (D ♂♀).
Z. b. Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 172 T. 16 F. 4 (N ♀).
Z. b. Emerton 1902, Common Spid. p. 48 f. 132 (D ♂♀).
Z. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 865 (N).
Z. b. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 579 T. 50 F. 7; T. 51 F 10 (D ♂♀).
Z. b. Comstock 1912, Spider Book p. 697 f. 765—767 (N).
Z. b. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 218 f. 155—159 (D ♂♀).
Z. b. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 496 T. 100 F. 1861—62; T. 101 F. 1874—75 (D ♂♀).

♀ **iridescens** Banks 1895. U. St. Amerika
Z. i. Banks 1895, Canad. Ent. 27 p. 102 (D ♀).

♂♀ **nervosus** (Peckham) 1888. U. St. Amerika
Eris n. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 56 T. 1 F. 39; T. 3 F. 39 (D ♀).
Z. terrestris Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 231 T. 17 F. 5 (D ♂♀).

Z. terrestris Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 172 T. 16 F. 5 (N ♀).
Z. terrestris Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 865 (N).
Eris n. Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 227 (N).
Z. terrestris Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 580 T. 50 F. 8; T. 51 F. 12 (D ♂♀).
Z. n. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 719 (C).
Z. n. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 220 f. 160—164 (D ♂♀).
Z. n. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 497 T. 100 F. 1862—64; T. 101 F. 1876—77 (D ♂♀).

♂♀ **quaternus** (Walckenaer) 1837. Georgia

Attus q. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 452 (D ♂♀, part.).
Z. q. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 216 TF. 35 (D ♀).

♂♀ **sexpunctatus** (Hentz) 1845. U. St. Amerika

Attus s. Hentz 1845, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 202 T. 17 F. 14 (D ♂).
Z. s. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 89 T. 1 F. 67; T. 6 F. 67 (D ♂).
Z. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 863 f. 1017—1022 (N ♂).
Z. s. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 583 T. 51 F. 11 (D ♂♀).

3. Gr. Servaeeae

Gen. **Goajara** Peckham 1907.

♂ **crassipes** Peckham 1907. Borneo

G. c. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 616 (D ♂).

Gen. **Servaea** Simon 1888.

Orientalische Arten:

♀ **murina** Simon 1902. Java

S. m. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 394 (D ♀).

Australische Arten:

♂♀ **barbatissima** (Keyserling) 1881. Queensland, Neu-S.-Wales

Hasarius b. Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1272 T. 109 F. 1, 2 (D ♂♀).
Cytaea b. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1477 (N).
S. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 819 f. 965 (N ♂).

♀ **obscura** Rainbow 1915. S.-Australien

S. o. Rainbow 1915, Trans. Soc. S. Austral. 39 p. 791 T. 68 F. 22 (D ♀).

♂ **spinibarbis** Simon 1909. W.-Australien

S. s. Simon 1909, Faun. S. W. Austral. 2 (12) p. 204 (D ♂).

♂♀ **vestita** (L. Koch) 1879. – * Australien, Tasmanien

Scaea v. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1142 T. 99 F. 4, 5 (D ♂♀).
Scaea v. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 330 (D).
S. v. Simon 1888, Journ. Asiat. Soc. Bengal. 56 p. 283 (nom. nov.).
Scaea v. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 302 T. 25 F. 2 (N).
S. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 820 f. 963, 964 (N).

10. Subfam. Cytaeinae

1. Gr. Harmochireae

Gen. **Harmochirus** Simon 1885.

Aethiopische Arten:

♂ **albibarbis** Peckham 1895. Sansibar

H. a. Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 171 T. 16 F. 3 (D ♂).
H. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 867 (N).

♂ **luculentus** Simon 1885. Sansibar

H. l. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 387 (D ♂).
H. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 867 (N).

♀ **rufescens** Caporiacco 1940. Somaliland

H. r. Caporiacco 1940, Boll. Labor. Zool. Agr. Portici 31 p. 304 f. 4 (D ♀).

Orientalische Arten:

♂♀ **brachiatus** (Thorell) 1877. – * Indien, Ceylon, Annam, Sumatra, Celebes, Philippinen, Japan

Ballus b. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 626 (D ♂).
H. malaccensis Simon 1885, Bull. Soc. Zool. France 10 p. 441 (D ♂).
H. nervosus Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 68 (D ♂).
H. malaccensis Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 68, 336 (N).
H. nervosus Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 246 (D ♂).
H. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 867 f. 1024—1026 (N ♂).
H. b. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 373 T. 9 F. 147; T. 13 F. 356 (D ♂♀).
H. b. Strand 1918, Arch. Naturg. 82 (A; 11) p. 110 (D ♂♀).

♀ **lloydii** Narayan 1915. Indien

H. l. Narayan 1915, Rec. Ind. Mus. Calcutta 11 p. 394 T. 32 F. 1 (D ♀).

Gen. **Paraharmochirus** Szombathy 1915.

♂ **monstrosus** Szombathy 1915. Neu-Guinea

P. m. Szombathy 1915, Ann. Mus. Nat. Hungar. 13 p. 489 f. 13 (D ♂).

Gen. **Rarahua** Berland 1929.

♂ **nitida** Berland 1929. I. Upolu

R. n. Berland 1929, Insect. Samoa 8 (2) p. 75 f. 73—79 (D ♂).

Gen. **Vailima** Peckham 1907.

♂ **masinei** Peckham 1907. Borneo

V. m. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 617 (D ♂).

2. Gr. Bellieneae

Gen. **Agobardus** Keyserling 1885.

§ 6 ♂: Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 467.

♂♀ **anormalis** Keyserling 1885. – * Westindien

A. a. Keyserling 1885, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. 519 T. 13 F. 21 (D ♂♀).

A. a. Peckham1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 338 (D).
A. a. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 90 T. 1 F. 69; T. 6 F. 74 (D ♂♀).
A. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 869 (N).
A. a. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 584 T. 48 F. 8; T. 49 F. 13 (D ♂♀).
A. a. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 450 T. 1 F. 1—4 (D ♂♀).

♂ **anormalis montanus** Bryant 1943. Haiti

A. a. m. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 452 T. 1 F. 5 (D ♂).

♀ **blandus** Bryant 1947. Portorico

A. b. Bryant 1947, Psyche 54 (3) p. 187 T. 16 F. 6 (D ♀).

♂♀ **brevitarsus** Bryant 1942. Haiti

A. b. Bryant 1942, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 89 (7) p. 453 T. 1 F. 6, 8, 11 (D ♂♀).

♂♀ **cubensis** (Franganillo) 1934. Cuba

Emathis c. Franganillo 1934, Mem. Soc. Cubana Hist. Nat. Nr. 107 f. 28 (sep.) (D).
Emathis c. Franganillo 1936, Los Aracnidos de Cuba 1936 p. 129 f. 72 (D).
A. c. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 468 T. 19 F. 252, 253, 256 (D ♂♀).

♂ **fimbriatus** Bryant 1940. Cuba

A. f. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 470 (D ♂).

♂♀ **keyserlingi** Bryant 1940. Cuba

A. k. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 471 T. 19 F. 254, 255, 257, 259 (D ♂♀).

♂♀ **mandibularis** Bryant 1940. Cuba

A. m. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool., Harvard 86 (7) p. 474 T. 20 F. 262, 263, 268 (D ♂♀).

♂♀ **mundus** Bryant 1940. Cuba

A. m. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 476 T. 20 F. 258, 260, 264 (D ♂♀).

♂ **obscurus** Bryant 1943. Haiti

A. o. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 455 T. 1 F. 7 (D ♂).

♂ **perpilosus** Bryant 1943. San Domingo

A. p. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 456 T. 1 F. 9—10 (D ♂).

♂♀ **prominens** Bryant 1940. Cuba

A. p. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 478 T. 20 F. 261, 266, 267 (D ♂♀).

Gen. **Antillattus** Bryant 1943.

♂ **gracilis** Bryant 1943. Haiti

A. g. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 461 T. 2 F. 14, 18, 20 (D ♂).

♂ **placidus** Bryant 1943. Haiti
A. p. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 462 T. 2 F. 15 (D ♂).

Gen. **Belliena** Simon 1902.

♂♀ **biocellosa** Simon 1902. – * Venezuela
B. b. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 403 (D ♂♀).
B. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 859 (N).

♂ **flavimana** Simon 1902. Venezuela
B. f. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 403 (D ♂).
B. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 858 (N).

♂ **phalerata** Simon 1902. Venezuela
B. p. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 403 (D ♂).
B. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 857 f. 1012, 1013 (N).

♀ **scotti** Hogg 1918. I. Trinidad
B. s. Hogg 1915, Nat. Hist. Rep. Zool. 3 (6) p. 168 f. 2 (D ♀).

Gen. **Dinattus** Bryant 1943.

♀ **erebus** Bryant 1943. Haiti
D. e. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 485 T. 5 F. 51 (D ♀).

♂♀ **heros** Bryant 1943. Haiti
D. h. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 482 T. 4 F. 39; T. 5 F. 47, 50, 54 (D ♂♀).

♂ **minor** Bryant 1943. Haiti
D. m. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 485 T. 5 F. 46, 52, 55 (D ♂).

Gen. **Efate** Berland 1938.

♂ **albocinctus** Berland 1938. Neue Hebriden
E. a. Berland 1938, Ann. Soc. Ent. France 107 p. 154 f. 67—70 (D ♂).

Gen. **Mirandia** Badcock 1932.

♀ **australis** Badcock 1932. Paraguay-Chaco
M. a. Badcock 1932, Proc. Linn. Soc. Lond. 38 p. 47 f. 39 (D ♀).

Gen. **Nagaina** Peckham 1896.

♂ **berlandi** Soares & Camargo 1948. Brasilien
N. b. Soares & Camargo 1948, Bol. Mus. Paraens. Goeldi 10 p. 395 f. 61—66 (D ♂).

♀ **diademata** Simon 1902. Brasilien
N. d. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 404 (D ♀).
N. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 858 (N).

♀ **incunda** Peckham 1896. – * Costa Rica, Guatemala
N. i. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 55 T. 4 F. 10 (D ♀).

N. i. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 298 T. 29 F. 4 (N ♀).
N. i. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 859 f. 1011 (N).

♀ **tricincta** Simon 1902. Amazonas

N. t. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 404 (D ♀).
N. t. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 858 (N).

3. Gr. Hermotimeae

Gen. **Bokokius** Roewer 1942.

♂ **penicillatus** Roewer 1942. Fernando Poo

B. p. Roewer 1942, Veröff. Dt. Kolon. Übersee-Mus. Bremen 3 (3) p. 256 T. 19 F. 11 (D ♂).

Gen. **Gorgasella** Chickering 1946.

♀ **eximia** Chickering 1946. Panama

G. e. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 192 f. 163—167 (D ♀).

Gen. **Hermotimus** Simon 1903.

♂♀ **coriaceus** Simon 1903. W.-Afrika

H. c. Simon 1903, Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 1 (3) p. 120 (D ♂♀).
H. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 762 f. 901—903 (N).

Gen. **Tatari** Berland 1938.

♂ **multispinosa** Berland 1938. Neue Hebriden

T. m. Berland 1938, Ann. Soc. Ent. France 107 p. 152 f. 61—66 (D ♂).

4. Gr. Cytaeeae

Gen. **Ascyltus** Karsch 1878.

Orientalische Arten:

♀ **minahassae** Merian 1911. Celebes

A. m. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) p. 324 (D ♀).

Australische Arten:

♀ **divinus** Karsch 1878. Fidji-I.

A. d. Karsch 1878, Mitt. München. Ent. Ver. 2 p. 30 (D ♀).
A. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 815 (N).

♂ **lautus** (Keyserling) 1881. Neu-Guinea, Samoa

Hasarius l. Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1287 T. 110 F. 3 (D ♂).
Cytaea l. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1477 (N).

♀ **opulentus** (Walckenaer) 1857. Tonga-I.

Attus o. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 477 (D ♀).
A. o. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 815 (N).

♂♀ **pterygodes** (L. Koch) 1865. – * Loyalty-I., Funafuti, Samoa, Fidji-I., Tonga-I., Marquesas-I., Tahiti

Hyllus p. L. Koch 1865, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 15 p. 876 (D ♂).
Hyllus p. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1339 T. 113 F. 6, 7 (D ♂♀).
A. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 817 f. 953 (N ♀).

♂ **simplex** Karsch 1878. Queensland
A. s. Karsch 1878, Mitt. München. Ent. Ver. 2 p. 31 (D ♂).
A. s. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 304 (D).
A. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 815 (N).

Gen. **Canama** Simon 1903.

Orientalische Arten:

♂ **dorcas** (Thorell) 1881. I. Ternate
Plexippus d. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 541 (D ♂).
C. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 817 (N).

♂ **forceps** (Doleschall) 1859. – * Amboina
Salticus f. Doleschall 1859, Act. Soc. Ind. Neerl. 5 p. 14 T. 5 F. 4 (D ♂).
C. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 817 f. 954—956 (N ♂).

♀ **rutila** Peckham 1907. Borneo
C. r. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 607 (D ♀).

Australische Arten:

♂ **hinnulea** (Thorell) 1881. Queensland
Plexippus h. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 539 (D ♂).
C. h. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 815 (N).

o **inquirenda** Strand 1911. Kei-I.
C. i. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 193 (D o).

♂ **lacerans** (Thorell) 1881. I. Goram
Plexippus l. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 559 (D ♂).

♀ **xanthopus** (Keyserling) 1881. Neu-Guinea, Kei-I., Queensland
Hasarius x. Keyserling 1881, Aradın. Austral. 1 (2) p. 1297 T. 110 F. 8 (D ♀).
C. x. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 815 (N).
C. x. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 194 (N ♀).

Gen. **Cytaea** Keyserling 1882.

Orientalische Arten:

♂ **aeneomicans** Simon 1902. Lombok
C. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 393 (D ♂).
C. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 811 (N).

♀ **albolimbata** Simon 1887. Andamanen
C. a. Simon 1887, Journ. Asiat. Soc. Bengal. 56 p. 282 (D ♀).
C. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 815 (N).

♂ **guentheri** Thorell 1895. Burma
C. g. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 388 (D ♂).
C. g. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 815 (N).

♂ **haematica** Simon 1902. Java
C. h. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 393 (D ♂).
C. h. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 815 (N).

♂♀ **laticeps** (Thorell) 1878. Amboina
Plexippus l. Thorell 1879, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 247 (D ♂♀).
C. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 813 (N).

♂ **oreophila** Simon 1902. Java, Sumatra

C. o. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 302 (D ♂).
C. o. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 815 (N).

Transgredierende Arten:

♂♀ **sinuata** (Doleschall) 1859. Sumatra, Philippinen, Molukken, Neu-Guinea, Australien

Salticus s. Doleschall 1859, Act. Soc. Ind. Neerl. 5 p. 18 T. 3 F. 2 (D ♀).
Salticus floricolus Doleschall 1859, Act. Soc. Ind. Neerl. 5 p. 20 T. 5 F. 1 (D ♀).
Plexippus s. Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 240 (D ♂♀).
C. s. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 106 (C).
C. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 812 f. 957, 958 (N ♂).
C. s. (? = subsinnata) Strand 1909, Abh. Nat. Ges. Görlitz 26 p. 125 TF. 47 (D ♀).
C. s. Strand 1914, Abh. Senckenbg. Ges. 36 (2) p. 266 (D ♂).

Australische Arten:

♂♀ **albichelis** Strand 1911. Kei-I.

C. a. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 191 T. 4 F. 20; T. 6 F. 90—94 (D ♂♀).

♂ **albiventris** (Keyserling) 1881. Neu-S.-Wales

Hasarius a. Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1291 T. 100 F. 5 (D ♂).
C. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 816 (N).

♂♀ **alburna** (Keyserling) 1882. – * Queensland

C. a. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1383 T. 117 F. 3, 4 (D ♂♀).
C. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 817 (N).

♂♀ **catella** (Thorell) 1891. Neu-Guinea

Plexippus c. Thorell 1891, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 571 (D ♂♀).

♀ **clarovittata** (Keyserling) 1881. Neu-S.-Wales

Hasarius c. Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1313 T. 112 F. 1 (D ♀).
C. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 815 (N).

♀ **expectans** (Thorell) 1881. Neu-Guinea, Aru-I., Neu-Mecklenburg, Queensland

Plexippus e. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 589 (D ♀).
Canama e. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 193 (N ♀).
C. e. Strand 1914, Abh. Senckenbg. Ges. 36 (2) p. 266 T. 4 F. 31 (N ♀).

♂♀ **fibula** Berland 1938. Neue Hebriden

C. f. Berland 1938, Ann. Soc. Ent. France 107 p. 158 f. 80—84 (D ♂♀).

♂ **flavolineata** Berland 1938. Neue Hebriden

C. f. Berland 1938, Ann. Soc. Ent. France 107 p. 157 f. 76—79 (D ♂).

♂♀ **frontaligera** (Thorell) 1881. Aru-I., Queensland

Plexippus f. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 607 (D ♂).

♀ **grisea** Keyserling 1882. Queensland

C. g. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1386 T. 117 F. 5 (D ♀).

♂ **haematicoides** Strand 1911. Aru-I.

C. h. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 192 T. 4 F. 24; T. 6 F. 86 (D ♂).

♀ **infrastriata** (Keyserling) 1881. Queensland
Hasarius i. Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1279 T. 109 F. 5 (D ♀).
C. i. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 815 (N).

♂♀ **laodamia** Hogg 1918. Neu-Guinea
C. l. Hogg 1918, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 526 f. 11 (D ♂♀).

♀ **lepida** Kulczynski 1910. Salomonen
C. l. Kulczynski 1910, Denkschr. Ak. Wiss. Wien 85 p. 408 T. 17 F. 19 (D ♀).

♂ **mitellata** (Thorell) 1881. Aru-I., I. Yule, I. Ternate
Plexippus m. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 604 (D ♂).

♂ **nimbata** (Thorell) 1881. Neu-Guinea
Plexippus n. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 600 (D ♂).

♂ **piligera** Keyserling 1882. Queensland
C. p. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1381 T. 117 F. 2 (D ♂).
C. p. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 331 (D).

♂♀ **piscula** (L. Koch) 1867. Neu-S.-Wales
Attus p. L. Koch 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 224 (D ♂).
Thorellia p. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1356 T. 115 F. 3, 4 (D ♂♀).
Saitis p. Rainbow 1911, Rec. Austral. Mus. 9 (2) p. 287 (C).

♀ **piscula subsiliens** (Kulczynski) 1910. Neu-S.-Wales, Samoa
C. subsiliens Kulczynski 1910, Denkschr. Ak. Wiss. Wien 85 p. 407 T. 17 F. 17, 18 (D ♀).
C. p. s. Berland 1929, Insect. Samoa 8 (2) p. 74 (D ♀).

♀ **rubra** (Walckenaer) 1837. Neu-Guinea
Attus r. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 458 (D ♀).
Plexippus r. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 591 (D ♀).

♀ **sylvia** Hogg 1915. Neu-Guinea
C. s. Hogg 1915, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 524 f. 10 (D ♀).

Gen. **Euryattus** Thorell 1881.

Transgredierende Arten:

♂♀ **bleckeri** (Doleschall) 1859. Amboina, Neu-Guinea, Aru-I., Queensland
Salticus b. Doleschall 1859, Act. Soc. Ind. Neerl. 5 p. 17 T. 3 F. 6 (D ♂).
Plexippus b. Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 260 (D ♂).
Hasarius pauperatus Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1300 T. 111 F. 2 (D ♀).
Hasarius pumilo Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1317 T. 112 F. 3 (D ♂).
Plexippus b. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 631 (D ♂♀).
E. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 815 f. 962 (N).
E. b. Strand 1909, Abh. Nat. Ges. Görlitz 26 p. 124 (N ♂).

♂♀ **venustus** (Doleschall) 1859. Amboina, Neu-Guinea
Salticus v. Doleschall 1859, Act. Soc. Ind. Neerl. 5 p. 18 T. 5 F. 2 (D ♀).
Plexippus v. Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 253 (D ♂♀).

Australische Arten:

♀ **albescens** (Keyserling) 1881. Queensland

Hasarius a. Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1299 T. 111 F. 1 (D ♀).
E. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 815 (N).

♂♀ **myiopotami** (Thorell) 1881. Neu-Guinea

Plexippus m. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 632 (D ♂♀).
E. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 815 (N).

♀ **nigriventris** (Keyserling) 1881. Queensland

Hasarius n. Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1293 T. 110 F. 6 (D ♀).
Cytaea n. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1477 (N).
E. n. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 815 (N).

♂♀ **porcellus** Thorell 1881. – * Neu-Guinea

E. p. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 660 (D ♂♀).
E. p. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 298 (D).
E. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 817 f. 959 (N).

♂ **senex** Simon 1885. Neu-Caledonien

E. s. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. Belg. 29 C. R. p. 90 (D ♂).
E. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 812 f. 960, 961 (N ♂).

Gen. **Plotius** Simon 1902.

Orientalische Arten:

♀ **breviusculus** Simon 1902. Ceylon

P. b. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 394 (D ♀).
P. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 816 (N).

♀ **celebensis** Merian 1911. Celebes

P. c. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) p. 322 f. C 2 (D ♀).

♂ **curtus** Simon 1902. – * Ceylon

P. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 394 (D ♂).
P. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 818 (N).

Australische Arten:

♂♀ **chrysostomus** (Keyserling) 1881. Queensland

Hasarius c. Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1307 T. 111 F. 6 (D ♂♀).
P. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 818 (N).

♂♀ **leopoldi** Roewer 1938. Neu-Guinea, Aru-I.

P. l. Roewer 1938, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors Sér.) 3 (19) p. 92 f. 70—72 (D ♂♀).

5. Gr. Silereae

Gen. **Siler** Simon 1888.

♂♀ **cupreus** Simon 1888. – * Japan

S. c. Simon 1888, Ann. Soc. Ent. France (6) 8 p. 250 (D ♀).
S. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 853 f. 1004—1006 (D ♂).
S. c. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 371 T. 14 F. 389 (D ♀).

♂ **pulcher** Simon 1901. Malakka

S. p. Simon 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. (2; 4) p. 75 (D ♂).
S. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 853 (N).

Gen. **Silerella** Strand 1906.

Orientalische Arten:

♂ **barbata** Strand 1906. – * Japan

S. b. Strand 1906, in: Bösenberg & Strand, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 372 T. 14 F. 373 (D ♂).

Australische Arten:

♀ **elegans** Szombathy 1915. Neu-Guinea

S. e. Szombathy 1915, Ann. Mus. Nat. Hungar. 13 p. 486 f. 12 (D ♀).

6. Gr. Pilieae

Gen. **Bristowia** Reimoser 1934.

♂♀ **heterospinosa** Reimoser 1934. I. Krakatau

B. h. Reimoser 1934, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 17 f. 1—3 (D ♂♀).

Gen. **Ohilimia** Strand 1911.

♂ **gracilipes** Strand 1911. Kei-I.

O. g. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 196 T. 6 F. 97 (D ♂).

Gen. **Pilia** Simon 1902.

Orientalische Arten:

♂ **escheri** Reimoser 1934. Indien

P. e. Reimoser 1934, Rev. Suisse Zool. 41 (32) p. 501 f. 23 (D ♂).

♂ **saltabunda** Simon 1902. – * Indien

P. s. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 402 (D ♂).
P. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 856 f. 1007—1010 (N ♂).

Australische Arten:

♂ **albicoma** Szombathy 1915. Neu-Guinea

P. a. Szombathy 1915, Ann. Mus. Nat. Hungar. 13 p. 487 (D ♂).

Gen. **Tara** Peckham 1886.

♂ **anomala** (Keyserling) 1882. Neu-S.-Wales

Atrytone a. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1378 T. 116 F. 6 (D ♂).
T. a. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 272 (nom. nov.)
T. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 856 (N).

7. Gr. Laufeieae

Gen. **Laufeia** Simon 1888.

Orientalische Arten:

♂♀ **aenea** Simon 1888. – * Japan

L. a. Simon 1888, Ann. Soc. Ent. France (6) 8 p. 249 (D ♂).
L. a. Simon 1903, Hist Nat. Araign. 2 (4) p. 824 (N).
L. a. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 370 T. 9 F. 137; T. 13 F. 364 (D ♀).

♂♀ **eucola** (Thorell) 1890. Sumatra
Orcevia e. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 167 (D ♀).
Orcevia e. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 365 (D ♀).
L. e. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 824 (N).
L. e. Reimoser 1925, Suppl. Ent. 10 p. 91 (N ♂♀).

♂♀ **keyserlingi** (Thorell) 1890. Sumatra, Java
Orcevia k. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 166 (D ♂♀).
Orcevia k. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 361 (D ♂♀).
L. k. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 824 (N).

♂ **perakensis** (Simon) 1901. Malakka, Java
Lollianus p. Simon 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. (2; 4) p. 75 (D ♂).
L. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 823 f. 971 (N ♂).
L. p. Simon 1905, Mitt. Nat. Mus. Hambg. 22 (2) p. 73 (N).

Australische Arten:

♀ **aerihirta** (Urquhart) 1887. Neu-Seeland
Marpissa a. Urquhart 1887, Trans. N. Zeal. Inst. 20 p. 124 (D ♀).
L. a. Bryant 1935, Rec. Canterbury Mus. 4 (2) p. 89 T. 12 F. 22 (D ♀).

Gen. **Pselcis** Simon 1903.

O **latefasciatus** (Simon) 1877. Philippinen
Euophrys l. Simon 1877, Ann. Soc. Ent. France (5) 7 p. 56 (D O).
P. s. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 825 f. 969—970 (N).

8. Gr. Triteae

Gen. **Amerotritte** Mello-Leitao 1944.

♀ **lineata** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires
A. l. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 3 (24) p. 375 (D ♀).

Gen. **Opisthoncana** Strand 1913.

♂ **formidabilis** Strand 1913. Neu-Mecklenburg, I. Anir
O. f. Strand 1913, Arch. Naturg. 79 (A; 6) p. 122 (D ♂).
O. f. Strand 1914, Abh. Senckenbg. Ges. 36 (2) p. 268 T. 14 F. 27; T. 19 F. 106 (D ♂).

Gen. **Opisthoncus** L. Koch 1880.

♂♀ **abnormis** L. Koch 1881. Queensland, Neu-S.-Wales
O. a. L. Koch 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1221 T. 105 F. 1, 2 (D ♂♀).
O. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 828 (N).

♂♀ **albiventris** L. Koch 1881. Neu-S.-Wales
O. a. L. Koch 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1228 T. 105 F. 4, 5 (D ♂♀).

♂♀ **alborufescens** L. Koch 1880. Queensland, Neu-S.-Wales
O. a. L. Koch 1880, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1197 T. 103 F. 4, 5 (D ♂♀).
O. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 828 (N).

♀ **bitaeniatus** L. Koch 1880. Queensland, Neu-S.-Wales
O. b. L. Koch 1880, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1195 T. 103 F. 3 (D ♀).

♀ **clarus** Keyserling 1883. Queensland
O. c. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1460 T. 123 F. 3 (D ♀).

♂ **confinis** L. Koch 1881. Queensland
O. c. L. Koch 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1225 T. 105 F. 3 (D ♂).

♂ **delectabilis** Rainbow 1920. Lord Howe-I.
O. d. Rainbow 1920, Rec. S. Austr. Mus. 1 p. 268 T. 31 F. 120—122 (D ♂).

♂ **devexus** Simon 1909. W.-Australien
O. d. Simon 1909, Faun. S. W. Austral. 2 (12) p. 205 (D ♂).

♂ **eriognathus** (Thorell) 1881. Neu-Guinea
Marptusa e. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 447 (D ♂).
O. e. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 829 (N).

♂♀ **grassator** Keyserling 1883. Queensland
O. g. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1457 T. 123 F. 1, 2 (D ♂♀).
O. g. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 827 f. 973, 974 (N ♂).

♂ **hatamensis** (Thorell) 1881. Neu-Guinea
Marptusa h. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 444 (D ♂).
O. h. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 829 (N).

♀ **inconspicuus** (Thorell) 1881. Neu-Guinea
Marptusa i. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 449 (D ♀).
O. i. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 829 (N).

♂♀ **lineativentris** L. Koch 1880. Queensland, Neu-S.-Wales
O. l. L. Koch 1880, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1185 T. 102 F. 5, 6 (D ♂♀).
O. l. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 309 (D).

♂ **machaerodus** Simon 1909. W.-Australien
O. m. Simon 1909, Faun. S. W. Austral. 2 (12) p. 206 f. 14 (D ♂).

♂♀ **magnidens** L. Koch 1880. Queensland, Neu-S.-Wales
O. m. L. Koch 1880, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1209 T. 104 F. 3, 4 (D ♂♀).

♂♀ **mandibularis** L. Koch 1880. Neu-S.-Wales
O. m. L. Koch 1880, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1202 T. 103 F. 6 (D ♂).
O. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 827 f. 975, 977 (N ♂).
O. m. Szombathy 1915, Ann. Mus. Nat. Hungar. 13 p. 481 (D ♂♀).

♂ **mordax** L. Koch 1880. Neu-S.-Wales
O. m. L. Koch 1880, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1192 T. 103 F. 2 (D ♂).
O. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 828 (N).

♂ **necator** L. Koch 1881. Neu-Guinea, Queensland, Neu-S.-Wales
O. n. L. Koch 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1237 T. 106 F. 3 (D ♂).
O. n. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 828 (N).

♂ **nigrifemur** Strand 1911. Neu-Pommern
O. n. Strand 1911, Arch. Naturg. 77 (I; 2) p. 207 (D ♂).
O. n. Strand 1914, Abh. Senckenbg. Ges. 36 (2) p. 267 T. 14 F. 32; T. 19 F. 107 (D ♂).

♀ **pallidulus** L. Koch 1880. Neu-S.-Wales

O. p. L. Koch 1880, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1190 T. 103 F. 1 (D ♀).
O. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 828 (N).

♂♀ **parcedentatus** L. Koch 1880. Queensland, Neu-S.-Wales

O. p. L. Koch 1880, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1205 T. 104 F. 1, 2 (D ♂♀).
O. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 828 (N).

♂♀ **polyphemus** (L. Koch) 1867. – * Neu-Guinea, Queensland, Neu-S.-Wales

Attus q. L. Koch 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 227 (D ♀).
O. p. L. Koch 1880, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1215 T. 104 F. 5, 6 (D ♂♀).
O. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 828 f. 976 (N ♂).

♀ **quadratarius** (L. Koch) 1867. Queensland

Attus q. L. Koch 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 227 (D ♀).
O. q. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1337 T. 114 F. 2 (D ♀).

♀ **serratofasciatus** L. Koch 1881. Neu-S.-Wales

O. s. L. Koch 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1233 T. 106 F. 1 (D ♀).

♂ **tenuipes** (Keyserling) 1882. Queensland

Hyllus t. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1342 T. 114 F. 3 (D ♂).
O. t. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 826 (N).

♀ **unicolor** L. Koch 1881. Queensland

O. u. L. Koch 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1235 T. 106 F. 2 (D ♀).

♂ **versimilis** Peckham 1901. Victoria

O. v. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 346 (D ♂).

Gen. **Trite** Simon 1885.

§ 2 ♂, 3 ♀: Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 420—422.
§ 3 Arten: Bryant 1935, Rec. Canterbury Mus. 4 (2) p. 66—67.

♀ **albopilosa** (Keyserling) 1883. Victoria, Neu-S.-Wales

Plexippus a. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1426 T. 120 F. 6 (D ♀).
T. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 829 (N).

♂♀ **auricoma** (Urquhart) 1885. Neu-Seeland

Attus au. Urquhart 1885, Trans. N. Zeal. Inst. 18 p. 202 T. 8 F. 8 (D ♂♀).
Plexippus capillatus Urquhart 1889, Trans. N. Zeal. Inst. 22 p. 265 (D ♀).
Attus suffuscus Urquhart 1891, Trans. N. Zeal. Inst. 25 p. 186 (D ♀).
Attus kirkii Urquhart 1891, Trans. N. Zeal. Inst. 25 p. 187 (D ♂).
Attus adustus Urquhart 1891, Trans. N. Zeal. Inst. 25 p. 189 (D ♀).
T. vafra Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 424 f. 74, 75 (D ♂ o).
T. a. Bryant 1935, Rec. Canterbury Mus. 4 (2) p. 64 T. 8 F. 6, 8 (D ♂♀).

♂♀ **bimaculosa** (Urquhart) 1886. Neu-Seeland

Attus b. Urquhart 1886, Trans. N. Zeal. Inst. 19 p. 116 (D O ♀).
Attus b. Urquhart 1887, Trans. N. Zeal. Inst. 20 p. 125 T. 11 F. 9 (D ♀).
T. b. Bryant 1935, Rec. Canterbury Mus. 4 (2) p. 91 T. 10 F. 1, 5; T. 12 F. 24 (D ♂♀).

♂ **binotata** Simon 1899. Neu-Seeland

T. b. Simon 1899, Zool. Jahrb. Syst. 12 (4) p. 431 (D ♂).
T. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 829 (N).
T. b. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 423 (D ♂).

♂♀ **concinna** Rainbow 1920. Lord Howe-I., Norfolk-I.
T. c. Rainbow 1920, Rec. S. Austral. Mus. 1 p. 267 T. 31 F. 114—119 (D ♂♀).

♂ **daemelii** (Keyserling) 1883. Neu-S.-Wales
Plexippus d. Keyserling 1883, Aradin. Austral. 1 (2) p. 1427 T. 121 F. 1 (D ♂).
T. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 829 (N).

♂ **gracilipalpis** Berland 1924. Loyalty-I.
T. g. Berland 1924, Bull. Soc. Zool. France 54 (5) p. 397 f. 11—14 (D ♂).

♂♀ **herbigrada** (Urquhart) 1888. Neu-Seeland
Plexippus h. Urquhart 1888, Trans. N. Zeal. Inst. 21 p. 150 (D ♂♀).
T. lucida Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 395 (D ♂♀).
T. lucida Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 827 f. 979, 980 (N ♂).
T. lucida Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 423 f. 73, 76 (N ♂).
T. h. Bryant 1935, Rec. Canterbury Mus. 4 (2) p. 66 (N).

♂♀ **ignipilosus** Berland 1924. Neu-Caledonien
T. i. Berland 1924, Nov. Caledon.; Zool. 3 (2) p. 251 f. 207—213 (D ♂♀).

♂ **lineata** Simon 1885. Neu-Caledonien
T. l. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. Belg. 29 C. R. p. 92 (D ♂).
T. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 829 (N).

♂ **longula** (Thorell) 1881. Cap York
Marptusa l. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 454 (D ♂).
T. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 829 (N).

♀ **ornata** Rainbow 1915. S.-Australien
T. o. Rainbow 1915, Trans. Soc. S. Austral. 39 p. 792 T. 68 F. 23, 24 (D ♀).

♂ **pennata** Simon 1885. – * Neu-Caledonien
T. p. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. Belg. 29 C. R. p. 91 (D ♂).
T. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 830 (N).

♀ **planiceps** Simon 1899. Neu-Seeland
Salticus minax Powell 1873, Trans. N. Zeal. Inst. 5 p. 280 (?) (D ♂♀) (nec Blackwall 1862).
T. p. Simon 1899, Zool. Jahrb. Syst. 12 (4) p. 430 (D ♀).
T. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 827 f. 978 (N).
T. p. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 422 f. 72 (D ♀).
T. minax Bryant 1935, Rec. Canterbury Mus. 4 (2) p. 67 (N).

♂♀ **rapaensis** Berland 1942. Rapa
T. r. Berland 1942, Pap. Bishop Mus. Honolulu 17 (1) p. 8 f. 2a—g (D ♂♀).

♂ **rubriceps** (Thorell) 1881. Cap York
Marptusa r. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 437 (D ♂).
T. r. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 829 (N).

♂ **vulpecula** (Thorell) 1881. Cap York
Marptusa v. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 452 (D ♂).
T. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 829 (N).

3. Sect. Unidentati

11. Subfam. Synagelinae

1. Gr. Augustaeeae

Gen. **Augustaea** Szombathy 1915.

♂♀ **formicaria** Szombathy 1915. Singapore
A. f. Szombathy 1915, Ann. Mus. Nat. Hungar. 13 p. 478 (D ♂♀).

Gen. **Taupoa** Peckham 1907.

♀ **mira** Peckham 1907. Sarawak
T. m. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 644 (D ♀).

2. Gr. Zunigeae

Gen. **Apatita** Mello-Leitao 1933.

♂ **tristis** Mello-Leitao 1933. Brasilien
A. t. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 83 T. 3 F. 13 (D ♂).

Gen. **Cineas** Simon 1901.

♂ **cayennensis** (Taczanowski) 1871. Franz. Guiana
Janus c. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 121 (D ♂).
C. c. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 87 (N).

♀ **ruficeps** Simon 1901. – * Venezuela
C. r. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 74 (D ♀).
C. r. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 522 f. 625, 626 (N).

Gen. **Donatinus** Chickering 1946.

♀ **niger** Chickering 1946. Panama
D. n. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 440 f. 404—406 (D ♀).

Gen. **Simprulla** Simon 1901.

♀ **argentina** Mello-Leitao 1940. Argentinien
S. a. Mello-Leitao 1940, Notes Mus. La Plata 5, Zool. (43) p. 256 (D ♀).

♂ **nigricolor** Simon 1901. – * Amazonas
S. n. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 74 (D ♂).
S. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 523 f. 623, 624 (N).
S. n. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 84 (D ♂).

♂ **secunda** Soares & Camargo 1948. Süd-Brasilien
S. s. Soares & Camargo 1948, Rev. Bras. Biol. R. d. Jan. 8 p. 434 f. 21—26 (D ♂).

Gen. **Simprulloides** Mello-Leitao 1933.

♂ **exilis** Mello-Leitao 1943. Rio Grande do Sul
S. e. Mello-Leitao 1943, Arqu. Mus. Nac. R. d. Jan. 37 p. 232 TF. 59 (D ♂).

♀ **xanthurus** Mello-Leitao 1933. Parana
S. **x.** Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 85 T. 2 F. 14 (D ♀).

Gen. **Zuniga** Peckham 1892.

§ 5 Arten: Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 69.
§ 2 Arten: Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 447.

♂♀ **formosa** (Banks) 1929. Panama
Sarinda f. Banks 1929, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 69 (3) p. 73 T. 1 F. 6 (D ♂).
Z. f. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 447 f. 413—415 (D ♂♀).

♂ **furva** Chickering 1946. Panama
Z. f. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 449 f. 416—418 (D ♂).

♂ **longula** (Taczanowski) 1871. Guiana
Janus l. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 118 T. 4 F. 7 (D ♂).
Z. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 522 (N).

♂♀ **magna** Peckham 1892. Amazonas
Z. m. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 43 T. 4 F. 1 (D ♂).
Z. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 519 f. 620—622 (N).
Z. m. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 70 (D ♀).

♀ **melzeri** Mello-Leitao 1933. S.-Brasilien
Z. m. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 71 T. 3 F. 10 (D ♀).

♀ **severa** Peckham 1892. – * Venezuela, Brasilien
Z. s. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 44 T. 3 F. 7 (D ♀).
Z. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 522 (N).
Z. s. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 70 (D ♀).

♂ **wankowiczii** (Taczanowski) 1871. Guiana
Janus w. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 119 T. 3 F. 8 (D ♂).
Z. w. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 522 (N).

3. Gr. Leptorchesteae

Gen. **Araegeus** Simon 1901.

♂ **fornasinii** (Pavesi) 1881. Mozambique
Leptorchestes f. Pavesi 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 16 p. 554 (D ♂).
A. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 525 (N).

♀ **mimicus** Simon 1901. – * Transvaal
A. m. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 75 (D ♀).
A. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 526 f. 632 (N).

Gen. **Depreissia** Lessert 1942.

♂ **myrmex** Lessert 1942. Belg. Congo
D. m. Lessert 1942, Rev. Suisse Zool. 49 (2) p. 11 f. 6—10 (D ♂).

Gen. **Enoplomischus** Giltay 1931.

♂ **chattoni** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste

E. c. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 343 f. 47 (D ♂).

♂ **ghesquierei** Giltay 1931. Belg. Congo

E. g. Giltay 1931, Rev. Zool. Bot. Afr. 21 (2) p. 168 f. 1, 2 (D ♂).

Gen. **Kima** Peckham 1902.

♂ **africana** Peckham 1902. – * S.-Afrika

K. a. Peckham 1902, Psyche 9 (312) p. 334 (D ♂).
K. a. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 253 T. 29 F. 3 (D ♂).
K. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 1052 (N).

♂ **variabilis** Peckham 1903. S.-Afrika

K. v. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 253 T. 29 F. 4 (D ♂).

Gen. **Leptorchestes** Thorell 1869.

Palaearktische Arten:

§ 2 ♂, 2 ♀: Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1152—1153.

♂♀ **cinctus** (Dugès) 1836. – * S.- u. Mitteleuropa, S.-Russland

Attus c. Dugès 1836, Ann. Sci. Nat. (2) 6 p. 163 (D).
Salticus berolinensis C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 34 TF. 1103, 1104 (D ♂♀).
Attus myrmecinus Rossi 1847, Haidinger Naturw. Abh. 1 p. 5 (D ♂♀).
Salticus formicaeformis Lucas 1849, Rev. Mag. Zool. (2) 2 p. 5 T. 9 F. 1—3 (D ♀).
Salticus formicaeformis Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 708 T. 7 F. 14 (D ♂♀).
L. formicaeformis Thorell 1869, On Europ. Spid. p. 210 (N).
L. formicaeformis Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 353 (N).
L. berolinensis Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 12 (D ♂♀).
L. berolinensis Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 9 T. 4 F. 12 (D ♂♀).
L. c. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 275 (D).
L. berolinensis Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 5 (D ♂♀).
L. berolinensis Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 50 (D ♂♀).
L. berolinensis Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 526 F. 627—631 (N).
L. berolinensis Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 543 (D ♂♀).
L. c. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 33 (D ♂♀).
L. berolinensis Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1152, 1246, f. 1786, 1788 (D ♂♀).

♂o **mutilloides** (Lucas) 1846. Algier, S.-Europa

Salticus m. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 185 T. 10 F. 6 (D ♂♀).
Salticus m. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 713 (D ♂).
L. m. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 354 (N ♂).
L. chrysopogon Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 11 (D o).
L. m. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 13 (D ♂♀).
L. m. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 5 (D ♂♀).
L. chrysopogon Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 48 T. 4 F. 5 (D ♀).

L. m. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 49 (D ♂♀).
L. m. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 543 (D ♀).
L. m. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1152, 1153, 1246 f. 1787, 1789 (D ♂♀).

♂'o **peresii** (Simon) 1868. Spanien

Salticus p. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 709 (D ♂ o).
L. p. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 354 (N).

Aethiopische Arten:

♀ **reimoseri** Lessert 1927. Congo

L. r. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 428 f. 16 (D ♀).

Neotropische Arten:

♀ **semirufus** Simon 1901. Ecuador

L. s. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 74 (D ♀).

Gen. **Quekettia** Peckham 1902.

♀ **georgia** (Peckham) 1892. Madagascar

Leptorchestes g. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 52 T. 4 F. 6 (D ♀).
Q. georgii Peckham 1902, Psyche 9 (312) p. 333 (N).
Q. georgii Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 254 (N).

Gen. **Sarindoides** Mello-Leitao 1922.

♀ **violaceus** Mello-Leitao 1922. Brasilien

S. v. Mello-Leitao 1922, Ann. Soc. Ent. France 91 p. 224 (D ♀).
S. v. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 87 (D ♀).

4. Gr. Synageleae

Gen. **Bellota** Peckham 1892.

Orientalische Arten:

♀ **fusca** Dyal 1935. Panjab

B. f. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 223 T. 17 F. 173 (D ♀).

♂♀ **livida** Dyal 1935. Panjab

B. l. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 224 T. 17 F. 174, 175 (D ♂♀).

Neotropische Arten:

♂♀ **formicina** (Taczanowski) 1878. – * Peru, Venezuela

Chirothecia f. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 367 (D ♀)
B. f. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 68 T. 5 F. 5 (D ♂).
B. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 534 (N).

Nearktische Arten:

♀ **micans** Peckham 1909. W.-Texas

B. m. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 373 T. 51 F. 6 (D ♀)

♀ **wheelerii** Peckham 1909. W.-Texas

B. w. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 374 T. 51 F. 7 (D ♀)

Gen. **Chirothecia** Taczanowski 1878.

♀ **amazonica** Simon 1901. Amazonas

C. a. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 142 (D ♀).
C. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 528 f. 639 (N).
Chirotecia a. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 99 (D ♀).

♂ **bicristata** Simon 1901. Venezuela

C. b. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 142 (D ♂).
C. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 528 f. 640 (N).

♀ **cheliferoides** Taczanowski 1878. Peru

C. c. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 363 T. 4 F. 1, 2 (D ♀).
C. c. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 287 (D).

♀ **clavimana** (Taczanowski) 1871. – * Guiana

Attus c. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 115 T. 3 F. 6 (D ♀).
C. c. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) T. 4 F. 7 (♀).
C. c. Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 170 T. 16 F. 2 (N).
C. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 533 (N).

♂♀ **crassipes** Taczanowski 1878. Peru

C. c. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 364 T. 4 F. 3, 4 (D ♀).
C. c. Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 171 T. 16 F. 1 (N ♂♀).

♀ **cruciata** Mello-Leitao 1917. Brasilien

C. c. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 143 (D o).
Chirotecia c. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 100 (D ♀).

♀ **minima** Mello-Leitao 1943. Argentinien

C. m. Mello-Leitao 1943, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 3, Zool. 20 p. 119 (D ♀).

♂♀ **modesta** Chickering 1946. Panama

C. m. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 426 f. 384—391 (D ♂♀).

♂ **semiornata** Simon 1901. Süd-Brasilien

C. s. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 143 (D ♂).
Chirotecia s. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 99 (D ♂).

♂ **uncata** Soares & Camargo 1948. Süd-Brasilien

C. u. Soares & Camargo 1948, Rev. Bras. Biol. R. d. Jan. 8 (4) p. 433 f. 19—20 (D ♂).

♀ **wrzesniowskii** Taczanowski 1878. Peru

C. w. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 366 T. 4 F. 5, 6 (D ♀).

Gen. **Damoetas** Peckham 1886.

♂o **nitidus** (L. Koch) 1880. Queensland, New-S.-Wales

Scirtetes n. L. Koch 1880, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1070 T. 94 F. 2, 3 (D ♂o).
D. n. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 277 (nom. nov.).
D. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 534 (N).

Gen. **Descanso** Peckham 1892.

§ 2 Arten: Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 93.
§ 2 Arten: Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 430.

♀ **chapoda** Peckham 1892. Brasilien
D. c. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 73 T. 6 F. 1 (D ♀).
D. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 528 f. 637, 638 (N).
D. c. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 94 (D ♀).

♂♀ **formosus** Bryant 1943. Haiti, San Domingo
D. f. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 476 T. 4 F. 34, 41; T. 5 F. 53 (D ♂♀).

♂♀ **insolitus** Chickering 1946. Panama
D. i. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 430 f. 392—398 (D ♂♀).

♀ **magnus** Bryant 1943. San Domingo
D. m. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 479 T. 4 F. 36 (D ♀).

♂ **montanus** Bryant 1943. San Domingo
D. m. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 480 T. 4 F. 40 (D ♂).

♂♀ **peregrinus** Chickering 1946. Panama
D. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 435 f. 399—403 (D ♂♀).

♀ **vagus** Peckham 1892. – * Amazonas
D. v. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 72 T. 5 F. 9 (D ♀).
D. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 533 (N).
D. v. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 93 (D ♀).

Gen. **Mexcala** Peckham 1902.

♂ **agilis** Lawrence 1928. SW.-Afrika
M. a. Lawrence 1928, Ann. S. Afr. Mus. 25 (2) p. 261 T. 22 F. 42 (D ♂).

♂ **elegans** Peckham 1903. Mashonaland
M. e. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 248 T. 29 F. 2 (D ♂).

♂ **rufa** Peckham 1902. – * Capland
M. r. Peckham 1902, Psyche 9 (213) p. 333 (D ♂).
M. r. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 247 T. 29 F. 1 (D ♂).

Gen. **Osericta** Simon 1901.

♂ **cancellata** Mello-Leitao 1943. Rio Grande do Sul
O. c. Mello-Leitao 1943, Arqu. Mus. Nac. R. d. Jan. 37 p. 227 TF. 53 (D ♂).

♀ **dives** Simon 1901. – * Brasilien
O. d. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 75 (D ♀).
O. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 534 f. 643 (N).
O. d. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 98 (D ♀).

♂ **trifasciata** Mello-Leitao 1943. Rio Grande do Sul
O. t. Mello-Leitao 1943, Arqu. Mus. Nac. R. d. Jan. 37 p. 227 TF. 54 (D ♂).

Gen. **Osericops** Mello-Leitao 1941.

♂ **osericops** Mello-Leitao 1941. Santa Fe
O. o. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. 13 p. 222 f. 33 (D ♂).

Gen. **Paradescanso** Vellard 1924.

♀ **fallax** Vellard 1924. Brasilien
P. f. Vellard 1924, Arch. Inst. Vital. Brazil 2 (1) p. 34 T. 6 F. 28—32 (D ♀).
P. f. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 96 (D ♀).

Gen. **Sebastira** Simon 1901.

♂ **instrata** Simon 1901. – * Venezuela
S. i. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 76 (D ♂).
S. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 533 f. 641, 642 (N).

♂♀ **plana** Chickering 1946. Panama
S. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 442 f. 407—412 (D ♂♀).

Gen. **Semora** Peckham 1892.

♂ **albibarbis** Mello-Leitao 1947. Süd-Brasilien
S. a. Mello-Leitao 1947, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan., Zool. 80 p. 31 T. 1 F. 5—6 (D ♂).

♀ **infranotata** Mello-Leitao 1945. Argentinien
S. i. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 296 f. 89 (D ♀).

♂ **langei** Mello-Leitao 1947. Brasilien
S. l. Mello-Leitao 1947, Arqu. Mus. Paraense 6 (6) p. 302 (D ♂).

♀ **napaea** Peckham 1892. – * Brasilien
S. n. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 69 T. 5 F. 6 (D ♀).
S. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 532 (N).
S. n. Mello-Leitao 1933, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 9 (2) p. 92 (D ♀).

♂ **trochilus** Simon 1901. Venezuela
S. t. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 141 (D ♂).

Gen. **Semorina** Simon 1901.

♂♀ **brachychelyne** Crane 1949. Venezuela
S. b. Crane 1949, Zoologica, N. York 34 (2) p. 35 f. 2 (D ♂♀).
S. b. Crane 1950, Zool. Sci. Contrib. N. York Zool. Soc. 35 (1) p. 256 (D ♂♀).

♀ **iris** Simon 1901. Venezuela
S. i. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 75 (D ♀).

♀ **lineata** Mello-Leitao 1945. Argentinien
S. l. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 298 f. 90 (D ♀).

♂♀ **megachelyne** Crane 1949. Venezuela
S. m. Crane 1949, Zoologica, N. York 34 (1) p. 38 f. 3 (D ♂♀).

♀ **seminuda** Simon 1901. – * Venezuela

S. s. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 75 (D ♀).
S. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 533 f. 636 (N).

Gen. **Synageles** Simon 1876.

§ 2 ♂, 2 ♀: Roewer 1928, Tierw. Mitteleurop. 3 (6) p. 42 TF. 475.
§ 4 ♂, 4 ♀: Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1154—1155.

♀ **albotrimaculatus** (Lucas) 1846. Algier, Tunis

Salticus a. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 184 T. 10 F. 6 (D ♀).
S. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 530 (N).

♂♀ **albotrimaculatus gallicus** Simon 1937. O.-Pyrenäen

S. a. g. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1155, 1247, f. 1792, 1793 (D ♂♀).

♂♀ **dalmaticus** (Keyserling) 1863. Mittelmeergebiet

Salticus d. Keyserling 1863, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 13 p. 371 T. 10 F. 17—20 (D ♂♀).
Salticus todillus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 713 T. 3 F. 15 (D ♀).
Leptorchestes todillus Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 354 (N).
Salticus todillus Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 324 T. 14 F. 19 (N ♀).
Leptorchestes todillus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 17 T. 9 F. 2 (D ♀).
S. d. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 4 (D ♂♀).
S. d. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 60 (D ♂♀).
S. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 528 f. 633—635 (N).
S. d. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1154, 1247 f. 1790, 1791 (D ♂♀).

♂♀ **lepidus** Kulczynski 1897. Ungarn, Turkestan

S. venator Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 6 T. 1 F. 2 (D ♂♀).
S. l. Kulczynski 1897, in: Chyzer & Kulczynski, Aran. Hungar. 2 (2) p. 288 (nom. nov.).

ovatus Franganillo 1910. Portugal

S. o. Franganillo 1910, Broteria 9 p. 17 (D).

♂♀ **pulcher** Franganillo 1913. Spanien

S. p. Franganillo 1913, Broteria 11 p. 119 (D ♂).
S. p. Franganillo 1918, Bol. Soc. Ent. Espan. 1 p. 58 (D ♂♀).

♀ **repudiatus** (Cambridge) 1876. Aegypten

Salticus r. Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 625 (D ♀).
S. r. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 530 (N).

♀ **subcingulatus** (Simon) 1878. SO.-Russland

Leptorchestes s. Simon 1878, Ann. Soc. Ent. France (5) 8 p. 201 (D ♀).
S. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 530 (N).

♂♀ **venator** (Lucas) 1836. – * S.- u. Mitteleuropa, N.-Afrika, Azoren, Turkestan

Salticus v. Lucas 1836, Mag. Zool. Cl. 8 Nr. 29 T. 15 F. 1—3 (D ♂♀).
Attus v. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 471 (D ♂♀).
Salticus hilarulus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 31 TF. 1099, 1100 (D ♀).
Salticus myrmecoides Rossi 1846, Haidinger Naturw. Abh. 1 p. 5 (D ♂).

Salticus v. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 711 (D ♂♀).
Leptorchestes v. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 353 (N).
Leptorchestes v. Pavesi 1873, Atti Soc. Ital. Sc I. Nat. 16 p. 10 (C).
Leptorchestes ludibundus Simon 1876, Ann. Soc. Ent. France (5) 5, Bull. p. 94 (D ♂).
S. ludibundus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 75 T. 9 F. 4 (D ♂).
S. v. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 16 T. 9 F. 3 (D ♂♀).
Salticus hilarulus Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 460 T. 76 F. 259 (D ♂♀).
S. v. Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 11 T. 1 F. 5 (D ♂♀).
Salticus hilarulus Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 76 (D ♂♀).
S. confusus Kulczynski 1884, Consp. Attid. Galiciae p. 58 T. 8 F. 22 (D ♀).
S. v. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 275 (D).
S. hilarulus Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 6 (D ♂♀).
S. v. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 61 T. 5 F. 1 (D ♂♀).
S. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 532 (N).
S. v. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 413 T. 39 F. 608 (D ♂♀).
S. hilarulus Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 413 T. 39 F. 609 (D ♂♀).
S. v. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 544 f. 229 (D ♂♀).
S. hilarulus Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 545 f. 230 (D ♀).
S. v. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 39 f. 116—118 (D ♂♀).
S. v. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1155, 1247 f. 1794 (D ♂♀).
S. hilarulus Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1155, 1247 f. 1795, 1796 (D ♂, N ♀).
S. v. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 13 f. ... (N).
S. v. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 43 T. 4 F. 71—73 (D ♂♀).
S. v. Locket & Millidge 1951, Brit. Spid. 1 p. 239 f. 118D—F (D ♂♀).

Gen. **Synagelides** Strand 1906.

♀ **agoriformis** Strand 1906. — Japan

S. a. Strand 1906, in: Bösenberg & Strand, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 330 (D ♀).

12. Subfam. Agoriinae

Gen. **Agorius** Thorell 1877.

O♀ **cinctus** Simon 1901. — Java, Lombok

A. c. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 143 (D O♀).
A. c. Simon 1905, Mitt. Nat. Mus. Hambg. 22 (2) p. 70 (N).

♂♀ **constrictus** Simon 1901. — Singapore

A. c. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 144 (D ♂♀).
A. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 535 f. 644—648 (N).

♂ **formicinus** Simon 1903. — Sumatra

A. f. Simon 1903, Ann. Soc. Ent. France 72 p. 307 (D ♂).

♀ **gracilipes** Thorell 1877. – * — Celebes

A. g. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 557 (D ♀).
A. g. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 276 (D).
A. g. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 537 (N).
A. g. Badcock 1917, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 318 f. 12 (D ♀).

♂ **semirufus** Simon 1901. Philippinen
A. s. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 143 (D ♂).
A. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 535 f. 649 (N).

13. Subfam. Hyllinae

1. Gr. Barypheae

Gen. **Baryphas** Simon 1902.

♂♀ **ahenus** Simon 1902. – * S.- u. SO.-Afrika
B. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 42 (D ♂♀).
B. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 681 f. 807—809 (N ♂).
B. a. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 207 T. 24 F. 2 (D ♂♀)
B. a. Strand 1907, Zool. Jahrb. Syst. 25 (5—6) p. 721 (D ♀).
B. a. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 32 (21) p. 349 f. 13 (N ♂♀).

♀ **albicinctus** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea
B. a. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 313 f. 15, 16 (D ♀).

♂ **eupogon** Simon 1902. San Thomé
B. e. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 43 (D ♂).
B. e. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 681 (N).

♂ **jullieni** Simon 1902. Liberia
B. j. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 43 (D ♂).
B. j. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 681 (N).

♂ **micheli** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste
B. m. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 315 f. 17 (D ♂).

♂ **scintillans** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste, Franz. Guinea
B. s. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 316 f. 18 (D ♂).

♂ **woodii** (Peckham) 1902. Mashonaland
Jasoda w. Peckham 1902, Psyche 9 (212) p. 332 (D ♂).
Jasoda w. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 223 T. 26 F. 10 (D ♂).
B. w. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 681 (N).

Gen. **Polemus** Simon 1902.

♀ **chrysochirus** Simon 1902. – * Sierra Leone
P. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 43 (D ♀).
P. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 682 (N).

♀ **galeatus** Simon 1902. Sierra Leone
P. g. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 44 (D ♀).
P. g. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 680 f. 810 (N).

♂ **squamulatus** Simon 1902. Sierra Leone
P. s. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 44 (D ♂).
P. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 681 (N).

2. Gr. Hylleae

Gen. **Allohyllus** Strand 1911.

♂ **sexualis** Strand 1911. Aru-I.
A. s. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 185 T. 6 F. 83 (D ♂).

Gen. **Brancus** Simon 1902.

♂ **bevisi** Lessert 1925. Natal, Franz. Guinea
B. b. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 32 (21) p. 356 f. 17 (D ♂).
B. b. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 331 f. 34 C, 35 D (N ♂).

♂ **blaisei** Simon 1902. W.-Afrika
B. b. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 400 (D ♂).
B. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 699 (N).
B. b. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 332 f. 34 A (N ♂).

♀ **hemmingi** Caporiacco 1949. Kenya
B. h. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 466 f. 85 (D ♀).

♂ **muticus** Simon 1902. – * Congo, W.-Afrika
B. m. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 400 (D ♂).
B. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 709 f. 838 (N ♂).
B. m. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 332 f. 34 B (N ♂).

♂♀ **poecilus** Caporiacco 1949. Kenya
B. p. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 468 f. 86a, b (D ♂♀).

♂ **verdieri** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea
B. v. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 332 f. 35 A, B (D ♂).

♂ **viciriaeformis** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea
B. v. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 333 f. 36 (D ♂).

Gen. **Carrhotus** Thorell 1891.

Palaearktische Arten:

♂♀ **affinis** Caporiacco 1934. Cyrenaica
C. a. Caporiacco 1934, Boll. Mus. Zool. Torino (3) 44 (47) p. 19 f. 7 (D ♀).
C. a. Caporiacco 1936, Mem. Soc. Ent. Ital. 15 p. 108 f. 6 (D ♂).

♀ **detritus** Bösenberg & Strand 1906. Japan
C. d. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 358 T. 14 F. 385, 391 (D ♀).
C. d. Saito 1939, Saito Ho-on Kai Mus. Res. Bull. 18 p. 40 f. 5 (3) (N ♀).

♂♀ **xanthogramma** (Walckenaer) 1825. Europa, (außer N.-), N.-Afrika, Sibirien, Japan
Aranea bicolor Walckenaer 1802, Faun. Paris. 2 p. 247 (D ♂) (praeocc. Olivier 1789 u. Fabricius 1798).
Attus bicolor Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 24 (N).

Attus x. Walckenaer 1825, Aran. France p. 52 (D ♀).
Attus x. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 415 (D ♀).
Attus bicolor Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 417 (D ♂).
Dendryphantes mucidus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 86 TF. 1149 (D ♀).
Salticus x. Blackwall 1851, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) 7 p. 401 (D ♂).
Salticus x. Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 51 (D ♂♀).
Dendryphantes bicolor Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 315 (C).
Euophrys (Phoebe) bicolor Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 500 (C).
Attus bicolor Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 28 (D ♀).
Attus lanipes Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 189 (N).
Philaeus bicolor Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 49 (D ♂♀).
Hyctia x. Cambridge 1881, Proc. Dorset F. Cl. 2 p. 561 (N).
Philaeus bicolor Kulczynski 1891, in: Chyzer & Kulczynski, Aran. Hungar. 1 p. 18 (N).
Philaeus bicolor Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 441 T. 42 F. 648 (D ♂).
C. bicolor Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 592 (D ♂♀).
C. bicolor Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 47 f. 144, 145 (D ♂♀).
C. bicolor Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1238, 1270 f. 2008—2010 (D ♂♀).

Aethiopische Arten:

♂ **scriptus** Simon 1902. Gabun
C. s. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 393 (D ♂).

♀ **semiaurantiacus** Simon 1910. Congo
C. s. Simon 1910 (1909), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 432 (D ♀).

♀ **singularis** Simon 1902. S.-Afrika
C. s. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 395 (D ♀).

♀ **subaffinis** Caporiacco 1947. Aethiopien
C. s. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 246 (D ♀).

Orientalische Arten:

♂♀ **aeneochelis** Strand 1907. Java
C. a. Strand 1907, Zool. Jahrb. Syst. 24 (5) p. 454 (D ♂♀).

♂♀ **taprobanicus** Simon 1902. Ceylon
C. t. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 394 (D ♂♀).

♂ **tristis** Thorell 1895. Burma
C. t. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 379 (D ♂).
C. t. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 702 (N).

♂♀ **viduus** (C. L. Koch) 1846. – * Indien, Minikoi, Malakka, I. Pinang, Sumatra, Java, Sumbawa
Plexippus v. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 104 TF. 1166 (D ♂).
Plexippus albolineatus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 105 TF. 1167 (D ♀).
Attus v. Walckenaer 1847, Hist. Nat, Ins. Apt. 4 p. 426 (D ♂).
Attus albolineatus Walckenaer 1847, Hist. Nat. Ins. Apt. 4 p. 427 (D).
Hyllus morgani Simon 1885, Bull. Soc. Zool. France 10 (4—6) p. 437 (D ♂).
Plexippus cumulatus Karsch 1891, Berlin. Ent. Zeitschr. 36 (2) p. 301 T. 12 F. 28 (D ♀).
C. v. Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 142 (N ♂).
C. v. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 407 (D ♂).
C. v. Workman 1896, Malays. Spid. p. 14 TF. 14 (D ♂).

C. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 707 f. 827, 828 (N ♂) (in f. : **Corrhotus**).
C. v. Pocock 1904, Arachn. in: Faun. Geogr. Maldiv. Laccad. Archip. 2 p. 804 T. 66 F. 8 (N).

Australische Arten:

♂ **oscitans** (Pocock) 1898. Salomonen

Eustirognathus **o.** Pocock 1898, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 1 p. 473 T. 19 F. 11 (D ♂).
C. o. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 702 (N).

♂ **rufus** Caporiacco 1947. Brit. Guiana

D. r. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 31 (D ♂).
D. r. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 710 TF. 136—137 (D ♂).

Gen. **Diagondas** Simon 1902.

♀ **micans** Simon 1902. Paraguay

D. m. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 397 (D ♀).
D. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 702 (N).

♂♀ **viridiaureus** Simon 1902. – * Brasilien

D. v. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 396 (D ♂♀).
D. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 708 f. 835 (N ♂).

Gen. **Eugasmia** Simon 1902.

Palaearktische Arten:

♂♀ **occidentalis** Denis 1947. Oase Siwah

E. o. Denis 1947, Bull. Soc. Fouad I. Ent. 31 p. 82 T. 5 F. 17; T. 6 F. 14—15 (D ♂♀).

Orientalische Arten:

♂ **barbata** (Karsch) 1880. Luzon

Eris b. Karsch 1880, Zeitschr. ges. Naturw. 53 p. 397 T. 12 F. 16 (D ♂).
E. b. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 395 (D ♂).
E. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 703 (N).

♂♀ **coronata** (Simon) 1885. Burma, Java, Sumatra

Ergane **c.** Simon 1885, Ann. Soc. Ent. Belg. 29 C. R. p. 33 (D ♂).
Plexippus sannio Hasselt 1882, in: Veth, Midd. Sumatra, Aran. 4 (11, A) p. 48 T. 5 F. 15 (D ♀).
Hasarius c. Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 404 (N ♂).
E. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 679 f. 831, 832 (N ♂).

♂ **olivacea** Peckham 1907. Borneo

E. o. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 624 (D ♂).

♂ **pulchella** (Thorell) 1895. Burma

Ergane **p.** Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 391 (D ♂).

♂♀ **sannio** (Thorell) 1877. – * Indochina, Malakka, Sumatra, Java, Celebes, Philippinen

Plexippus s. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 617 (D ♂).
Hasarius virens Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 147 (D ♀).
Hasarius s. Workman 1896, Malays. Spid. p. 16 TF. 16 (D ♂♀).
E. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 708 (N).

Australische Arten:

♂ **chlorophthalma** Simon 1909. W.-Australien

E. c. Simon 1909, Faun. S. W. Austral. 2 (12) p. 203 (D ♂).

Gen. **Evarcha** Simon 1902.

Palaearktische Arten:

§ 3 ♂, 3 ♀ : Roewer 1928, Tierw. Mitteleurop. 3 (6) p. 45 TF. 507—512.
§ 4 ♂, 4 ♀ : Simon 1947, Arachn. de France 6 (5) p. 1238—1241.

♂ **albaria** (L. Koch) 1878. Japan, Szechuan

Hasarius a. L. Koch 1878, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 27 p. 780 T. 16 F. 39 (D ♂).
E. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 697 f. 837 (N ♂).
E. a. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 361 T. 9 F. 140; T. 13 F. 350, 351 (D ♂).
E. a. Strand 1918, Arch. Naturg. 82 (A; 11) p. 107 (D ♂).
E. a. Schenkel 1936, Ark. Zool. 29 (A; 1) p. 249 (N ♂).

♂♀ **albifrons** (Kulczynski) 1895. Ussuri, Japan

Ergane a. Kulczynski 1895, Dissert. Ac. Cracov. 32 p. 90 T. 2 F. 25—27 (D ♂♀).
E. a. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 359 T. 14 F. 380 (D ♀).

♂♀ **arcuata** (Clerck) 1757. Europa, Tripolis, Turkestan, Sibirien

Araneus a. Clerck 1757, Aran. Suec. p. 125 T. 6 F. 1 (D ♀).
Aranea marcgravii Scopoli 1763, Ent. Carniol. p. 401 (D).
Aranea grossipes De Geer 1778, Mém. p. s. Hist. Nat. Ins. 7 p. 290 T. 17 F. 11, 12, 14 (D ♂).
Aranea truncorum Schrank 1781, Enum. Ins. Austr. p. 531 (D).
Aranea goezenii Schrank 1781, Enum. Ins. Austr. p. 534 (D).
Aranea grossipes Olivier 1789, Encycl. Méthod. 4 p. 220 (D).
Aranea frontalis Olivier 1789, Encycl. Méthod. 4 p. 223 (D).
Salticus grossipes Latreille 1819, Nouv. Dict. Hist. Nat. (2. Ed.) p. 22 (N).
Salticus limbatus Hahn 1826, Monogr. d. Spinn. 4 p. 12 T. 12 F. C (D ♂).
Salticus grossipes Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 53 TF. 40 (D ♂♀).
Dendryphantes grossus C. L. Koch 1837, Übers. Arachn. Syst. 1 p. 32 (N).
Euophrys farinosa C. L. Koch 1837, Übers. Arachn. Syst. 1 p. 34 (N).
Attus limbatus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 408 (D ♂).
Attus grossipes Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 424 (D ♂♀).
Marpissa grossa C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 57 TF. 1125 (D ♀).
Euophrys farinosa C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 223 TF. 1268 (D ♂).
Euophrys a. C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 30 TF. 1298 (D ♂).
Euophrys paludicola C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 36 TF. 1300 (D ♀)
Maturna a. C. L. Koch 1850, Übers. Arachn. Syst. 5 p. 65 (N).
Attus viridimanus Doleschall 1852, S. B. Ak. Wiss. Wien 9 p. 645 (D).
Attus a. Westring 1862, Aran. Svec. p. 570 (D ♂♀).
Maturna grossipes Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 313 (C).
Euophrys limbata Canestrini & Pavesi 1868, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 11 p. 819 (C).
Attus a. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 35 T. 5 F. 9, 10 (D ♂♀).
Attus albociliatus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 36 (D ♂♀).
Attus farinosus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 59 (D ♀).
Dendryphantes grossus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 642 (D ♀)
Hasarius a. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 83 (D ♂, nec ♀).
Hasarius falcatus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 85 T. 9 F. 18 (D ♀, nec ♂).

Ergane a. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 90 (C).
Hasarius a. Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 33 T. 2 F. 3 (D ♂♀, part.).
Attus a. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 78 (D ♂♀).
Ergane a. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 37 (D ♂♀).
Ergane a. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 435 T. 42 F. 639 (D ♂♀).
Hasarius farinosus Sörensen 1904, Ent. Meddel. (2) 1 p. 350 (N).
E. a. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 593 (D ♂♀).
E. marcgravii Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 51 f. 158, 159 (D ♂♀).
E. a. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1238, 1241, 1270 f. 2013, 2014, 2021 (D ♂♀).
E. marcgravii Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 62 T. 6 F. 113—114 (D ♂♀).
E. a. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 235 f. 114 B, D, F (D ♂♀).

♂♀ **flammata** (Clerck) 1757. – * Europa, Tripolis, Turkestan, Sibirien

Araneus f. Clerck 1757, Aran. Suec. p. 124 T. 5 F. 18 (D ♀).
Araneus falcatus Clerck 1757, Aran. Suec. p. 125 T. 5 F. 19 (D ♀).
Aranea blancardi Scopoli 1763, Ent. Carniol. p. 402 (D).
Aranea falcata Olivier 1789, Encycl. Méthod. 4 p. 222 (D).
Aranea f. Olivier 1789, Encycl. Méthod. 4 p. 222 (D).
Aranea coronata Walckenaer 1802, Faun. Paris 2 p. 245 (D).
Attus coronatus Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 24 (N).
Attus capreolus Walckenaer 1825, Aran. Franç. p. 53 (D ♀).
Salticus abietis Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 61 TF. 46 (D ♂♀).
Salticus blancardi Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 64 TF. 48 (D ♀).
Attus falcatus Sundevall 1832, Vet. Ak. Handl. p. 213 (D ♂♀).
Euophrys falcata C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 33 (N).
Attus coronatus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 412 (D ♂♀).
Euophrys falcata C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 24 TF. 1290—1295 (D ♂♀).
Salticus coronatus Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 50 T. 3 F. 26 (D ♂♀).
Attus falcatus Westring 1862, Aran. Svec. p. 578 (D ♂♀).
Euophrys coronata Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 311 (C).
Euophrys falcata Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 158 (D ♂♀).
Attus falcatus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 54 T. 1 F. 13, 14 (D ♂♀).
Attus falcatus luteus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 55 (D ♀).
Attus falcatus punctatus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 56 (D ♀).
E. napoleon Karsch 1873, Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf. 30 p. 154 T. 1 F. 6 (D O).
Attus arcuatus Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 390 (N ♀).
Hasarius arcuatus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 83 T. 9 F. 22 (D ♀, nec ♂).
Hasarius falcatus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 85 T. 9 F. 19 (D ♂, nec ♀).
Attus falcatus Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N.F.) 4 p. 489 T. 80 F. 277 (D ♂♀).
Hasarius falcatus Cambridge 1881, Proc. Dorset F. Cl. 2 p. 412 (D ♂♀).
Hasarius falcatus Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 35 T. 2 F. 4 (D ♂).
Attus falcatus Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 77 (D ♂♀).
Attus falcatus Hansen 1885, in: Schiödte, Zool. Danica p. 161 T. 5 F. 14 (D ♂♀).
Ergane falcata Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 37 T. 1 F. 10 (D ♂♀).
Ergane falcata Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 435 T. 42 F. 640 (D ♂♀).

E. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 709 (N).
E. blancardi Smith 1908, Journ. Quek. Micr. Cl. (2) 10 p. 318 T. 25 F. 4 (N ♀).
E. falcata Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 594 (D ♂♀).
E. blancardi Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 50 f. 154, 155 (D ♂♀).
E. blancardi Reimoser 1930, Die Natur (Wien) 6 (3) p. 55 f. 10 (N ♂♀).
E. f. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1240, 1241, 1270 f. 2015, 2016, 2022 (D ♂♀).
E. falcata Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 40 f. . . . (N).
E. blancardi Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 61 T. 6 F. 111—112 (D ♂♀).
E. falcata Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 233 f. 114A, C, E (D ♂♀).

flammata nigrofusca (Strand) 1900. Norwegen

Ergane falcata n. Strand 1900, Norsk. Vid. Selsk. Skr. (2) p. 27 (D).

♂♀ **laetabunda** (C. L. Koch) 1848. Europa, Tripolis, Sibirien

Euophrys l. C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 21 TF. 1287—1289 (D ♂♀).
Attus l. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 56 (D ♂♀).
Hasarius l. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 86 T. 9 F. 20, 21 (D ♂♀).
Hasarius l. Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 39 T. 3 F. 2 (D ♂♀).
Ergane l. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p 37 T. 1 F. 9 (D ♂♀).
Ergane l. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 436 T. 42 F. 641 (D ♂♀).
E. l. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 51 f. 156, 157 (D ♂♀).
E. l. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1240, 1241, 1271 f. 2017, 2018, 2020 (D ♂♀).

♂ **longipalpis** Bösenberg & Strand 1906. Japan

E. l. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 361 T. 14 F. 384 (D ♂♀).

♂♀ **syriaca** Kulczynski 1911. Syrien, Palästina

E. s. Kulczynski 1911, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 52 T. 2 F. 62—67 (D ♂♀).

♀ **taczanowskii** (Simon) 1868. Polen, Litauen

Attus t. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 58 (D ♀).
Attus t. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 146 (D ♂).
Hasarius t. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 90 (C).

Transgredierende Arten:

♂♀ **jucunda** (Lucas) 1846. Mittelmeergebiet, Karakorum, Abessinien

Salticus j. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 146 T. 6 F. 8 (D ♀).
Attus mitratus L. Koch 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 877 (D ♂).
Phoebe j. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 312 (C).
Attus mitratus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 60 (D ♂♀).
Salticus obnixus Blackwall 1869, Journ. Linn. Soc. Lond. 10 p. 414 T. 15 F. 6 (D ♂♀).
Attus j. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 124 (N ♂♀).
Hasarius j. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 82 (D ♂♀).
Ergane j. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 37 T. 1 F. 8 (D ♂♀).
Euarcha j. Kulczynski 1911, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 53 T. 2 F. 62—64 (N ♂♀).
E. j. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1238, 1240, 1271 f. 2011, 2012, 2019 (D ♂♀).

Aethiopische Arten:

♂♀ **chappuisi** Lessert 1925. O.-Afrika

E. c. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 501 f. 81—84 (D ♂♀).

♂ **chubbi** Lessert 1925. O.-Afrika
E. c. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 498 f. 79, 80 (D ♂).

♀ **dubia** Kulczynski 1901. Erythraea
E. d. Kulczynski 1901, Bull. Ac. Sci. Cracov. 41 p. 53 T. 2 F. 50 (D ♀).

♂ **natalica** Simon 1902. Natal
E. n. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 398 (D ♂).
E. n. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 697 f. 836 (N ♂).
E. n. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 32 (21) p. 354 f. 16 (D ♂).

♂ **obscura** Caporiacco 1947. Ost-Afrika
E. o. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 245 T. 2 F. 74 (D ♂).

♀ **similis** Caporiacco 1941. Süd-Abessinien
E. s. Caporiacco 1941, Miss. Biol. Sagan-Omo 12, Zool. 6 p. 147 (D ♀).
E. s. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 245 (N ♀).

Orientalische Arten:

♂ **bicoronata** (Simon) 1901. Hongkong
Pseudamycus b. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 64 (D ♂).
E. b. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 733 (C).

♀ **gausapata** (Thorell) 1890. Sumatra, Java
Plexippus g. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 167 (D ♀).
Plexippus g. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 370 (D ♀).

♀ **gausapatella** Strand 1907. Java
E. g. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (17—18) p. 569 (D ♀).
E. g. Strand 1909, Abh. Nat. Ges. Görlitz 26 p. 116 TF. 46 (D ♀).

♂ **heteropogon** Simon 1902. Annam
E. h. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 733 (D ♂).
E. h. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 703 (N).

♀ **hyllinella** Strand 1913. Lombok
E. h. Strand 1913, Arch. Naturg. 79 (A; 6) p. 122 (D ♀).
E. h. Strand 1914, Abh. Senckenbg. Ges. 36 (2) p. 264 T. 14 F. 28; T. 19 F. 104 (D ♀).

♂ **kochi** Simon 1902. Java, Lombok
E. k. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 397 (D ♂).
E. k. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 703 (N).

Neotropische Arten:

♀ **tropica** Mello-Leitao 1934. Venezuela
E. t. Mello-Leitao 1934, Rev. Suisse Zool. 46 (2) p. 85 f. 74, 75 (D ♀).

Transgredierende Arten:

♂♀ **leucophaea** (C. L. Koch) 1846. Brasilien, U. St. Amerika, Canada, Alaska
Euophrys l. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 216 TF. 1261 (D ♂).
Salticus borealis Blackwall 1846, Ann. Mag. Nat. Hist. (1) 17 p. 35 (D ♀).
Frigga l. C. L. Koch 1850, Übers. Arachn. Syst. 5 p. 66 (C).
Attus hoyi Peckham 1883, Descr. Spid. Fam. Attid. p. 7 T. 1 F. 5 (D ♂).
Attus pinus Peckham 1883, Descr. Spid. Fam. Attid. p. 20 T. 2 F. 16 (D ♀).

Ergane taeniata Keyserling 1885, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. 507 T. 13 F. 14 (D ♂).
Euophrys l. Hasselt 1887, Tijdschr. Ent. 30 p. 242 (N ♂).
Hasarius hoyi Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 57 T. 1 F. 40; T. 4 F. 4 (D ♂♀).
Hasarius hoyi Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 243 T. 21 F. 2 (D ♂♀).
Habrocestum latens Banks 1892, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 77 T. 5 F. 34 (D ♀).
Hasarius hoyi Emerton 1902, Common Spid. p. 64 f. 161, 162 (D ♂♀).
E. hoyi Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 708 (N).
Pellenes hoyi Banks 1905, Amer. Narulist 39 p. 322 (N).
Pellene hoyi Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 557 T. 48 F. 4 (D ♂♀).
E. blancardi Bryant 1941, Psyche 48 p. 139 (N).
E. hoyi Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 146 f. 4—8 (D ♂♀).
E. hoyi Kaston 1945, Amer. Mus. Novit. 1290 p. 14 TF. 66—68 (N ♂♀).
E. hoyi Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum 47, Bull. 70 p. 469 T. 92 F. 1713—1717; T. 143 F. 2134—2136 (D ♂♀).

Nearktische Arten:

♀ **amabilis** (C. L. Koch) 1846. Pennsylvanien
Euophrys a. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 215 TF. 1260 (D ♀).
Amphirape a. C. L. Koch 1850, Übers. Arachn. Syst. 5 p. 67 (N).
E. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 708 (N).

Gen. **Gangus** Simon 1902.

♂♀ **concinnus** (Keyserling) 1881. – * Queensland
Acompse c. Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1322 T. 112 F. 6, 7 (D ♂♀).
G. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 706 (N).

♀ **decorus** Simon 1902. Queensland
G. d. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 390 (D ♀).
G. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 700 f. 823 (N).

♂♀ **longulus** Simon 1902. Queensland
G. l. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 390 (D ♂♀).
G. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 700 (N).

♀ **sexmaculatus** (C. L. Koch) 1846. W.-Australien
Plexippus s. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 119 TF. 1169 (D ♀).
G. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 700 (N).

Gen. **Hyllus** C. L. Koch 1846.

Palaearktische Arten:

♀ **fischeri** Bösenberg & Strand 1906. Japan, China
H. f. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 358 T. 14 F. 383 (D ♀).
H. f. Strand 1909, Abh. Nat. Ges. Görlitz 26 p. 113 (D ♀).

♂♀ **lamperti** Bösenberg & Strand 1906. Japan
H. l. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 356 T. 13 F. 360; T. 14 F. 369 (D ♂♀).

Aethiopische Arten:

♀ **aethiopicus** Strand 1906. Abessinien
H. a. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 666 (D ♀).
H. a. Strand 1908, Societ. Ent. 24 p. 84 (D ♀).

♂ **africanus** Lessert 1927. Congo
H. a. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 449 f. 26B (D ♂).

♀ **albofasciatus** Thorell 1899. Camerun
H. a. Thorell 1899, Bih. Svensk. Vet. Ak. Handl. 25 (4; 1) p. 94 (D ♀).

O **albomarginatus** (Lenz) 1886. Madagascar
Attus a. Lenz 1886, Zool. Jahrb. Syst. 1 (2) p. 406 (D O).
H. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 701 (N).

♀ **albooculatus** (Vinson) 1863. Madagascar
Attus a. Vinson 1863, Aran. Réun. Mauric. Madagasc. p. 49, 301 T. 10 F. 2 (D ♀).
H. a. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 349 (N).

♀ **alboplagiatus** Thorell 1899. Camerun
H. a. Thorell 1899, Bih. Svensk. Vet. Ak. Handl. 25 (4; 1) p. 93 (D ♀).
H. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 701 (N).

♀ **angustivulva** Caporiacco 1940. Abessinien
H. a. Caporiacco 1940, Atti Accad. Ital. 11 (18) p. 865 f. 56 (D ♀).

♂ **argyrotoxus** Simon 1902. Zululand
H. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 391 (D ♂).

O **atroniveus** Caporiacco 1940. Abessinien
H. a. Caporiacco 1940, Atti Accad. Ital. 11 (18) p. 866 (D O).

♀ **aubryi** (Lucas) 1858. Gabun
Salticus a. Lucas 1858, Arch. Ent. 2 p. 19 (D ♀).

♂ **aurantiacus** Simon 1902. Natal, Zululand
H. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 51 p. 392 (D ♂).
H. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 701 (N).

♂♀ **bevisi** Lessert 1925. O.-Afrika
H. b. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 495 f. 77, 78 (D ♂♀).

♂♀ **brevitarsis** Simon 1902. Natal, O.-Afrika, Somaliland
H. b. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 391 (D ♂♀).
H. b. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 32 (21) p. 350 (D ♂).

♂ **carbonarius** Lessert 1927. Congo
H. c. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 450 f. 27 (D ♂).

♂ **duplicidentatus** Caporiacco 1941. S.-Abessinien
H. d. Caporiacco 1941, Miss. Biol. Sagan-Omo 12, Zool. 6 p. 148 f. 64 (D ♂).

♂ **congoensis** Lessert 1927. Congo, Elfenbeinküste
H. c. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 447 f. 26A (D ♂).
H. c. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 334 f. 37 (N ♂).

♀ **cornutus** (Blackwall) 1866. Sambesi
Salticus c. Blackwall 1866, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 18 p. 455 (D ♀).
H. c. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 349 (N).

♂ **cothurnatus** (Gerstäcker) 1873. Sansibar
Plexippus c. Gerstäcker 1873, Gliedert. Faun. Sansibar Geb. p. 473 (D ♂).
H. c. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 349 (N).

♀ **deyrollei** (Lucas) 1858. Gabun, Elfenbeinküste
Salticus d. Lucas 1858, Arch. Ent. 2 p. 14 T. 13 F. 4 (D ♀).
? Euophrys d. Karsch 1879, Zeitschr. Ges. Naturw. 52 p. 357 (N).
H. d. Simon 1887, Ann. Soc. Ent. France (6) 7 p. 263 (D ♀).
H. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 701 (N).
H. d. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 334 f. 38 (N ♀).

♀ **erlangeri** Strand 1906. Abessinien
H. e. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 665 (D ♀).
H. e. Strand 1909, Societ. Ent. 24 p. 74 (D ♀).

♂ **flavescens** Simon 1902. Natal
H. f. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 393 (D ♂).
H. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 701 (N).

♀ **fur** Strand 1906. Abessinien
H. f. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 666 (D ♀).
H. f. Strand 1909, Societ. Ent. 24 p. 83 (D ♀).

♀ **fusciventris** Strand 1906. Abessinien
H. f. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 664 (D ♀).
H. f. Strand 1909, Societ. Ent. 24 p. 53 (D ♀).

♂ **guineensis** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea
H. g. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 335 f. 39 (D ♂).

♂ **holochalceus** Simon 1910. Fernando Poo
H. h. Simon 1910 (1909). Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 432 (D ♂).

♀ **jallae** Pavesi 1897. Sambesi
H. j. Pavesi 1897, Boll. Mus. Zool. Torino 12 (271) p. 1 (D ♀).
H. j. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 701 (N).

♂♀ **juanensis** Strand 1907. Mozambique
H. j. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (23) p. 746 (D ♂♀).
H. j. Strand 1908, Nyt. Mag. Daturvid. 46 (2) p. 200 (D ♂♀).

♂♀ **leucomelas** (Lucas) 1858. W.-Afrika
Salticus l. Lucas 1858, Arch. Ent. 2 p. 391 T. 13 F. 5 (D ♀).
H. l. Simon 1887, Ann. Soc. Ent. France (6) 7 p. 262 (D ♀).
H. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 701 (N).
H. l. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 451 f. 28 (D ♂).
H. l. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 336 f. 40 (N ♂).

♂ **lugubrellus** Strand 1908. Madagascar
H. l. Strand 1908, Nyt. Mag. Naturvid. 46 p. 214 (D ♂).

♂♀ **lugubris** (Vinson) 1863. Madagascar
Attus l. Vinson 1863, Aran. Réun. Mauric. Madagasc. p. 58, 302 T. 10 F. 7 (D ♀).
Heliophana l. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 333 (C).
H. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 689 f. 826 (N ♂).

♀ **lwoffi** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea
H. l. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 337 f. 41 (D ♀).

♂ **madagascariensis** (Vinson) 1863. Madagascar
Attus m. Vinson 1863, Aran. Réun. Mauric. Madagasc. p. 61, 302 (D).
H. m. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 349 (N).
H. m. Strand 1908, Nyt. Mag. Naturvid. 46 (2) p. 211 (D ♂).

♂ **manensis** Strand 1906. Abessinien
H. m. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 666 (D ♂).
H. m. Strand 1909, Societ. Ent. 24 p. 83 (D ♂).

♂♀ **marleyi** Lessert 1925. Natal, Portug. O.-Afrika
H. m. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 32 (21) p. 352 f. 15 (D ♂♀).

♀ **miniszechii** (Lucas) 1858. Gabun
Salticus m. Lucas 1858, Arch. Ent. 2 p. 17 (D ♀).
H. m. Simon 1887, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 349 (N).

♀ **moestus** Peckham 1903. Natal
H. m. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 208 T. 23 F. 5 (D ♀).

♂ **multiaculeatus** Caporiacco 1949. Kenya
H. m. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 465 f. 84 (D ♂).

♂♀ **natalii** Peckham 1903. Natal, W.- u. O.-Afrika bis Abessinien
H. n. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 210 T. 23 F. 4 (D ♀).
H. n. Strand 1909, Societ. Ent. 24 p. 75 (D ♂).
H. n. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 495 f. 76 (D ♀).
H. n. Caporiacco 1940, Atti Acc. Ital. 11 (18) p. 863 f. 54 (D ♂, N ♀).

♀ **natalii peckhamorum** Berland & Millot 1941. Ober-Guinea bis Dakar
H. n. p. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 338 f. 42 (D ♀).

♀ **nossibeensis** Strand 1907. Madagascar
H. n. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (23) p. 747 (D ♀).
H. n. Strand 1908, Nyt. Mag. Naturvid. 46 (2) p. 206 (D ♀).

♀ **nummularis** (Gerstäcker) 1873. Sansibar
Plexippus n. Gerstäcker 1873, Gliedert. Faun. Sansibar Geb. p. 474 T. 18 F. 3 (D ♀).
H. n. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 349 (N).
H. n. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 701 (N).

O **pachypoessus** Strand 1907. Camerun
H. p. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (17—18) p. 547 (D O).
H. p. Strand 1907, Zool. Jahrb. Syst. 25 (5—6) p. 725 (D O).

♂♀ **perspicuus** Peckham 1903. O.-Afrika, Natal, Elfenbeinküste
H. p. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 209 T. 23 F. 2 (D ♂♀).
H. p. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 492 f. 75 (D ♂♀).
H. p. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 338 f. 43 (N ♂).

♀ **plexippoides** Simon 1906. Aegypt. Sudan
H. p. Simon 1906, S. B. Ak. Wiss. Wien 115 (1) p. 1175 (D ♀).

♂ **rubrotinctus** Strand 1906. Abessinien
H. r. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 665 (D ♂).
H. r. Strand 1909, Societ. Ent. 24 p. 68 (D ♂).

♂ **sansibaricus** Roewer 1951. Sansibar
Attus gracilis Bösenberg & Lenz 1894, Jahrb. Hambg. Wiss. Anst. 12 (2) p. 30 T. 1 F. 4 (D ♂) (praeocc. Walckenaer 1837, Hentz 1946).
H. s. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 450 (nom. nov.)

♂ **senegalensis** (C. L. Koch) 1846. Senegambien
Plexippus s. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 108 TF. 1170 (D ♂).
H. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 701 (N).

o **stigmatias** (L. Koch) 1875. Abessinien
Plexippus s. L. Koch 1875, Aegypt. Abyss. Arachn. p. 92 T. 7 F. 10 (D o).
H. s. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 349 (N).

♀ **suillus** Thorell 1899. Camerun
H. s. Thorell 1899, Bih. Svensk. Vet. Ak. Handl. 25 (4; 1) p. 95 (D ♀).

♂ **thyeniformis** Strand 1906. Abessinien
H. t. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 664 (D ♂).
H. t. Strand 1908, Societ. Ent. 24 p. 62 (D ♂).
H. t. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 243 (N ♂).

♀ **treleavenii** Peckham 1902. Mashonaland
H. t. Peckham 1902, Psyche 9 (312) p. 334 (D o).
H. t. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 207 T. 23 F. 3 (D ♀).

♂♀ **ventrilineatus** Strand 1906. Abessinien, O.- u. W.-Sudan, Franz. Guinea, Elfenbeinküste
H. v. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 665 (D ♀).
H. v. Strand 1908, Arch. Naturg. 74 (I; 1) p. 63 T. 2 F. 12 (D ♀).
H. v. Strand 1909, Societ. Ent. 24 p. 75 (D ♀).
H. v. Lessert 1915, Rev. Suisse Zool. 23 (1) p. 80 T. 3 F. 64, 65, 79, 80 (D ♂♀).
H. v. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 494 (N ♂).
H. v. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 340 f. 44, 45 (N ♂♀).

♂ **viduatus** Caporiacco 1940. Abessinien
H. v. Caporiacco 1940, Atti Accad. Ital. 11 (18) p. 864 f. 55 (D ♂).

♂ **vinsonii** (Peckham) 1885. Madagascar
Philaeus v. Peckham 1885, Proc. Nat. Hist. Soc. Wiscons. p. 36 T. 1 F. 7 (D ♂).
H. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 701 (N).

o **virgillus** Strand 1907. Madagascar
H. v. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (23) p. 747 (D o).
H. v. Strand 1908, Nyt. Mag. Naturvid. 46 (2) p. 209 (D o).

Orientalische Arten:

♀ **bos** (Sundevall) 1833. Bengalen

Attus b. Sundevall 1833, Consp. Aradin. **p.** 27 (D ♀).
Attus b. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 **p.** 480 (D).
Cocala b. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) **p.** 327 (C).
H. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) **p.** 701 (N).

♀ **decoratus** Thorell 1887. Burma

H. d. Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 **p.** 400 (D ♀).

♂♀ **diardi** (Walckenaer) 1837. Indochina, Burma, Malakka, Sumatra, Java

Attus d. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 **p.** 460 (D ♀).
Plexippus mutillarius C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 **p.** 93 TF. 1155, 1156 (D ♂♀).
Phidippa d. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) **p.** 327 (C).
H. d. Simon 1886, Act. Soc. Linn. Bord. 40 **p.** 139 (D ♀).
H. mutillarius Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 **p.** 381 (C o).
H. d. Strand 1909, Abh. Nat. Ges. Görlitz 26 **p.** 115 (N ♀).

♂ **gulosus** (Simon) 1877. Philippinen

Plexippus g. Simon 1877, Ann. Soc. Ent. France (5) 7 **p.** 54 (D ♂).
H. g. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) **p.** 701 (N).

♂ **janthinus** (C. L. Koch) 1846. Burma, Malakka, Sumatra, Java, Flores

Plexippus j. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 **p.** 97 TF. 1160 (D ♂).
Plexippus succinctus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 **p.** 98 TF. 1161 (D ♂).
Attus succinctus Doleschall 1857, Naturh. Tijdschr. Nederl. Ind. 13 **p.** 431 (C).
H. j. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma **p.** 376 (N ♂).

♂♀ **keratodes** (Hasselt) 1882. Sumatra, I. Siberut

Phidippus k. Hasselt 1882, in: Veth, Midd. Sumatra 4 (11 A) **p.** 49 T. 3 F. 9 (D ♀).
Phidippus k. Hasselt 1893, Tijdschr. Ent. 36 **p.** 156 (D ♀).
H. ceratodes Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 **p.** 112 (D ♂♀).
H. ceratodes Reimoser 1929, Bull. Raffles Mus. Singapore 2 **p.** 132 (N ♂).

♂ **lacertosus** (C. L. Koch) 1846. I. Bintang, Sumatra, Java

Plexippus l. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 **p.** 94 TF. 1157, 1158 (D ♂).
H. l. Simon 1894, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 **p.** 111 (N).
H. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) **p.** 701 (N).

♂ **lacertosus borneensis** (Thorell) 1892. Borneo

Plexippus l. b. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 **p.** 384 (D ♂).

♂♀ **mimus** Chamberlin 1924. S.-China

H. m. Chamberlin 1924, Proc. U. Stat. Nat. Mus. 63 (13) **p.** 33 T. 7 F. 50 (D ♂♀).

♂♀ **minahassae** Merian 1911. Celebes

H. m. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) **p.** 314 (D ♂♀).

♀ **nebulosus** Peckham 1907. Borneo

H. n. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) **p.** 627 (D ♀).

♂♀ **pudicus** Thorell 1895. Burma, Minkoi, I. Sipora
H. p. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 373 (D ♂♀).
H. p. Pocock 1904, Arachn. in: Faun. Geogr. Maled. Laccad. Archip. 2 p. 804 T 66 F. 9 (N).

♂♀ **pulcherrimus** Peckham 1907. Borneo
H. p. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 628 (D ♂♀).

pupillatus (Fabricius) 1793. China
Aranea p. Fabricius 1793, Ent. Syst. 2 p. 422 (D).
H. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 701 (N).

♀ **robinsoni** Hogg 1919. Sumatra
H. r. Hogg 1919, Journ. Fed. Malay. Mus. 8 (3) p. 103 T. 12 F. 11 (D ♀).

♂ **thorelli** Simon 1899. Sumatra
H. t. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 113 (D ♂).
H. t. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 701 (N).

♂♀ **walckenaerii** (White) 1846. Celebes, Borneo
Deineresus w. White 1846, Ann. Mag. Nat. Hist. (1) 18 p. 179 T. 2 F. 4 (D ♀).
Deineresus (H.) w. Hasselt 1879, Tijdschr. Ent. 22 p. 223 T. 12 F. 4, 5 (D ♂).
Attus (Plexippus) cornutus Hasselt 1879, Tijdschr. Ent. 22 p. 221, 226 T. 12 F. 1—3 (D ♂).
H. w. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 349 (N).
H. w. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 380 (D ♂).
H. w. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 689 f. 823, 824 (N).

Transgredierende Arten:

♂♀ **giganteus** C. L. Koch 1846. – * Sumatra, Java, Flores, Celebes, Molukken, Australien
H. g. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 161 TF. 1216 (D ♂).
Attus alfurus Doleschall 1857, Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 13 p. 431 T. 4 F. 3 (D ♂).
Attus cornutus Doleschall 1859, Act. Soc. Ind. Neerl. 5 p. 13 T. 4 F. 5 (D ♀).
H. g. Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 264 (D ♂♀).
H. g. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 305 (D).
H. g. Workman 1896, Malays. Spid. p. 102 TF. 102 (D ♀).
H. g. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 706 f. 825 (N ♂).
H. g. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) p. 313 T. 9 F. 15 (N ♀).

♂ **giganteus whitei** Thorell 1877. Celebes
H. g. w. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 598 (D ♂).
H. g. w. Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 268 (N).

Australische Arten:

♀ **audax** Rainbow 1897. I. Funafuti
H. a. Rainbow 1897, Mem. Austral. Mus. 3 (2) p. 124 T. 5 F. 4 (D ♀).

♀ **ferox** Rainbow 1897. I. Funafuti
H. f. Rainbow 1897, Mem. Austral. Mus. 3 (2) p. 122 T. 5 F. 3 (D ♀).

Gen. **Hypoblemum** Peckham 1886.

♂ **albovittatum** (Keyserling) 1882. Queensland
Habrocestum a. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1407 T. 119 F. 3 (D ♂).
H. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 708 (N).

♂ **villosum** (Keyserling) 1883. – * Neu-S.-Wales

Acmaea v. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1421 T. 120 F. 3 (D ♂).
Drepanephora v. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1477 (N).
H. v. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 326 (D).
H. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 568 (N).
H. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 708 (N).

Gen. **Karschiola** Strand 1932.

♂ **scopifera** (Karsch) 1878. Neu-S.-Wales

Ligurinus s. Karsch 1878, Mitt. München. Ent. Ver. 2 p. 27 (D ♂).
Ligurinus s. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 303 (D).
K. s. Strand 1932, Folia Zool. Hydrobiol. 4 (2) p. 140 (nom. nov. gen.).

Gen. **Pachypoessa** Simon 1902.

♂♀ **albimana** Simon 1902. Sierra Leone, Congo, Mashonaland, Franz. Guinea

P. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 399 (D ♂).
P. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 699 (N).
Philaeus manicus Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 205 T. 24 F. 1 (D).
P. a. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 452 f. 29 (D ♂♀).

♂ **lacertosa** Simon 1902. – * Mozambique, Natal, Madagascar

P. l. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 399 (D ♂).
P. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 709 (N).

Gen. **Phiale** C. L. Koch 1846.

§ 17 ♂, 23 ♀: F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 222 (part., sub **Cyrene**).
§ 11 ♂, 15 ♀: Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 199—205.

♂ **aliceae** Chickering 1946. Panama

P. a. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 205 f. 172—173 (D ♂).

♂♀ **aprica** Peckham 1896. Brasilien, Guatemala

Cyrene a. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 66 T. 6 F. 1 (D ♂♀).
Cyrene a. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 239 T. 20 F. 12, 13 (D ♂♀).

♀ **aristochratica** Holmberg 1876. Buenos Aires

P. a. Holmberg 1876, An. Agr. Rep. Argent. 4 p. 147 (24) (D ♀).

♂ **berina** C. L. Koch 1846. Brasilien

P. b. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 198 TF. 1246 (D ♂).

♂♀ **bicuspidata** (F. Cambridge) 1901. Panama, Costa Rica, Guiana

Cyrene b. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 238 T. 20 F. 8, 9 (D ♂♀).
P. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 702 (N).
P. b. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 207 (N ♂♀).

♂ **bilobata** (F. Cambridge) 1901. Guatemala, Panama

Cyrene b. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 230 T. 18 F. 15 (D ♂).
Freya b. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 652 (C).
P. b. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 208 f. 174—177 (D ♂).

♀ **bipunctata** Mello-Leitao 1947. Süd-Brasilien

P. b. Mello-Leitao 1947, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. (Zool.) 80 p. 26 T. 6 F. 21 (D ♀).

♀ **bisignata** (F. Cambridge) 1901. Guatemala, Mexico

Cyrene b. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 236 T. 20 F. 1 (D ♀).
P. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 689 (N).

♂o **bispinosa** Banks 1931. Galapagos-I.

P. b. Banks 1931, Nyt. Mag. Naturvid. 68 p. 277 T. 1 F. 3 (D ♂ o).

♂ **bristowei** Caporiacco 1947. Brit. Guiana

P. b. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 31 (D ♂) (? sub „**pseudaprica**").
P. b. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 709 TF. 135 (D ♂).

♀ **bryantae** Roewer 1951. Antigua

Cyrene gratiosa Bryant 1923, Univ. Iowa Stud. Nat. Hist. 10 (3) p. 16 T. 2 F. 1—2 (D ♀) (praeocc. Taczanowski 1878 sub **Phyale**).
P. b. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 450 (nom. nov.)

♂ **cardinalis** Mello-Leitao 1945. Argentinien

P. c. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 291 f. 81 (D ♂).

♂ **cincta** Mello-Leitao 1942. Argentinien

P. c. Mello-Leitao 1942, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. 16 p. 420 f. 49—50 (D ♂).

♂♀ **coronigera** (C. L. Koch) 1846. Guiana, Para, Trinidad, Guatemala

Euophrys c. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 221 TF. 1266 (D ♀).
Frigga c. C. L. Koch 1850, Übers. Arachn. Syst. 5 p. 66 (N).
Attus c. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 90 (D ♂♀).
Maevia c. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 344 (N).
P. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 697 f. 834 (N).

♀ **crocea** C. L. Koch 1846. Brasilien, Argentinien

P. c. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 194 TF. 1242 (D ♀).
P. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 702 (N).
P. c. Strand 1915, Arch. Naturg. 81 (A; 9) p. 144 (D ♀).

♂♀ **cruentata** (Walckenaer) 1837. Brasilien, Guiana

Attus c. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 463 (D ♂♀).
Salticus c. Lucas 1857, Arachn. in: Castelnau, Exped. Amer. d. Sud. p. 18 T. 1 F. 5 (D ♀).
P. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 701 (N).

♂ **cubana** Roewer 1951. Cuba

Pardessus formosus Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 490 T. 21 F. 283—284 (D ♂) (praeocc. Banks 1909 sub **Cyrene**).
P. c. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 450 (nom. nov.).

♀ **decorata** (Peckham) 1893. St. Vincent

Cyrene d. Peckham 1893, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 698 T. 62 F. 6 (D ♀).
P. d. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 690 (C).

♂♀ **delecta** (Peckham) 1896. Centr. Amerika, Mexico

Cyrene d. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 p. 68 T. 6 F. 2 (D ♂♀).
Cyrene d. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 238 T. 20 F. 10, 11 (N ♂♀).
P. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 702 (N).
P. d. Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 236 f. 149 (D ♀).
P. d. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 212 f. 178 (N ♂♀).

♀ **dolosa** (Banks) 1909. Costa Rica

Cyrene d. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 222 T. 5 F. 11 (D ♀).
P. d. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mas. Nat. Hist. 29 p. 690 (C).

♂ **donaldi** Chickering 1946. Panama

P. d. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 212 f. 179—180 (D ♂).

♀ **duplocellata** Mello-Leitao 1947. Süd-Brasilien

P. d. Mello-Leitao 1947, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan., Zool. 80 p. 26 T. 5 F. 18 (D ♀).

♂♀ **dybowskii** (Taczanowski) 1871. Guiana, Columbien, Guatemala, Panama, Mexico

Attus d. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 96 (D ♂♀).
Pachomius d. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 81 T. 6 F. 7 (D ♂♀).
Cyrene d. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 239 T. 20 F. 16, 17 (N ♂♀).
P. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 702 (N).
P. lineola Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah 27 (5), Biol. 3 (5) p. 27 T. 8 F. 66 (D ♀).
Freya nannispina Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah 27 (5), Biol. 3 (5) p. 24 T. 7 F. 51—52 (D ♂).
P. d. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 215 f. 181—183 (D ♂♀).

♀ **elegans** (F. Cambridge) 1901. Panama

Cyrene e. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 238 T. 20 F. 7 (D ♀).
P. e. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 702 (N).
P. e. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 218 (C).

♀ **erythrogaster** Holmberg 1876. Buenos Aires

P. e. Holmberg 1876, An. Agr. Rep. Argent. 4 p. 147 (24) (D ♀).

♀ **ferruginea** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires

P. f. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 3 (24) p. 386 (D ♀).

♂♀ **flammea** Crane 1949. Venezuela

P. f. Crane 1949, Zoologica, N. York 34 (2) p. 47 f. 7 (D ♂♀).

♀ **flavescens** (Peckham) 1896. Panama
Pachomius f. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 82 T. 6 F. 11 (D ♀).
Cyrene f. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 239 T. 20 F. 15 (N ♀).
P. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 702 (N).
P. f. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 219 (N).

♂♀ **flavoguttata** (C. L. Koch) 1846. Brasilien
Plexippus f. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 99 TF. 1162 (D ♀).
P. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 697 f. 833 (N ♂).

♂ **formosa** (Banks) 1909. Costa Rica
Cyrene f. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 223 T. 5 F. 7 (D ♂).
P. f. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 690 (C).

♀ **fusca** (F. Cambridge) 1901. Costa Rica
Cyrene f. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 238 T. 20 F. 6 (D ♀).
P. f. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 690 (N).

♀ **geminata** (F. Cambridge) 1901. Panama
Cyrene g. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 240 T. 20 F. 20 (D ♀).
P. g. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 702 (N).
P. g. Banks 1929, Bull. Mus. Zool. Harvard 69 (3) p. 66 (N ♀).
P. g. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 219 (N ♀).

♂♀ **guianensis** (Taczanowski) 1871. Guiana, Peru
Attus g. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 61 (D ♂♀).
Amycus g. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 592 (C).
P. g. Mello-Leitao 1948, An. Ac. Bras. Ci. 20 p. 190 (N).

♀ **hastigera** (C. L. Koch) 1846. Brasilien, Argentinien
Euophrys h. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 222 TF. 1267 (D ♀).
Frigga h. C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 66 (N).
P. h. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 702 (N).

♀ **hieroglyphica** (F. Cambridge) 1901. Mexico
Cyrene h. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 236 T. 19 F. 17 (D ♀).
P. h. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 702 (N).

♂ **huadquinae** Chamberlin 1916. Peru
P. h. Chamberlin 1916, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 60 (6) p. 299 T. 25 F. 3 (D ♂).

♀ **interrupta** (F. Cambridge) 1901. Centr. Amerika
Cyrene i. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 239 T. 20 F. 14 (D ♀).
P. i. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 702 (N).
P. delecta Banks 1929, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 69 (3) p. 67 (C).
P. i. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 219 f. 184—186 (D ♂♀).

♀ **jucunda** (C. L. Koch) 1846. Uruguay
Euophrys j. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 205 TF. 1252 (D ♀).
Freya j. C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 66 (N).
P. j. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 702 (N).

♀ **laticava** (F. Cambridge) 1901. Guatemala
Cyrene l. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 237 T. 20 F. 3 (D ♀).
P. l. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 691 (C).

♂ **lehmanni** Strand 1908. Columbien
P. l. Strand 1908, Zool. Anz. 33 (1) p. 7 (D ♂).
P. l. Strand 1915, Arch. Naturg. 81 (A; 9) p. 145 (D ♂).

♀ **maculosa** Chickering 1946. Panama
P. m. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 223 f. 187 (D ♀).

♂♀ **magnifica** (Banks) 1909. Costa Rica, Panama
Cyrene m. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 223 T. 6 F. 38 (D ♀).
P. m. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 692 (C).
P. m. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 226 f. 188—191 (D ♂♀).

♀ **mediocava** (F. Cambridge) 1901. Guatemala, Mexico
Cyrene m. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 236 T. 20 F. 2 (D ♀).
P. m. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 692 (C).

♂ **melanargyra** Mello-Leitao 1946. Paraguay
P. m. Mello-Leitao 1946, Not. Mus. La Plata 11, Zool. 91 p. 27 f. 8 (D ♂).

♀ **mimica** (C. L. Koch) 1846. – * Brasilien, Peru, Panama
Plexippus m. C. L. Koch 1845, Die Arachniden 13 p. 111 TF. 1137 (D ♀).
Plexippus gratiosus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 193 TF. 1240—1241 (D ♀).
Phyale gratiosa Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 315 (N ♀).
Philia gratiosa Bertkau 1880, Mem. Class. Sci. Bruxelles 43 p. 40 (N ♀).
Pardessus m. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 36 T. 3 F. 1 (D ♀).
Pardessus gratiosus Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 36 (N).
Pardessus m. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 302 (N).
Pardessus m. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 221 T. 18 F. 10 (N o).
Pardessus gratiosus F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 221 T. 18 F. 11 (N ♀).
P. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 701 (N).
P. m. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 229 f. 192—196 (D ♀).

♂♀ **ministerialis** C. L. Koch 1846. Peru, Columbien
P. m. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 199 TF. 1247 (D ♂).
P. m. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 316 (N ♂♀).

♀ **modestissima** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
P. m. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 31 (D ♀).
P. m. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 709 (D ♀).

♀ **mutilloides** Mello-Leitao 1947. Süd-Brasilien
P. m. Mello-Leitao 1947, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. (Zool.) 80 p. 27 T. 6 F. 13 (D ♀).

♀ **nigra** (Banks) 1898. Nieder-Californien
Pachomius n. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 284 T. 17 F. 15 (D ♀).
P. n. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 692 (C).

♀ **nigrosigillata** Mello-Leitao 1947. Süd-Brasilien
P. n. Mello-Leitao 1947, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. (Zool.) 80 p. 27 T. 6 F. 22 (D ♀).

♀ **nigrotaeniata** Mello-Leitao 1945. Argentinien
P. n. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 292 f. 82 (D ♀).

♂♀ **niveoguttata** (F. Cambridge) 1901. Panama
Cyrene n. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 240 T. 20 F. 18—19 (D ♂♀).
P. n. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 702 (N).
P. n. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 233 (N ♂♀).

♀ **orvillei** Chickering 1946. Panama
P. o. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 234 f. 197 (D ♀).

♀ **pallida** (F. Cambridge) 1901. Guatemala
Cyrene p. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 237 T. 20 F. 5 (D ♀).
P. p. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 692 (C).
P. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 236 f. 198 (D ♀).

♂ **panamae** Chamberlin 1916. Panama
P. p. Chamberlin 1916, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 60 (6) p. 298 T. 25 F. 3 (D ♂).
P. panamense Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 82 (C).
P. panamense Banks 1929, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 69 (3) p. 67 (C).
P. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 239 f. 199—200 (D ♂).

♀ **pantherina** Mello-Leitao 1946. Paraguay
P. p. Mello-Leitao 1946, Notas Mus. La Plata 11, Zool. 91 p. 28 f. 9 (D ♀).

♂♀ **pratensis** (Peckham) 1885. Trinidad, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Panama
Hyllus p. Peckham 1885, Proc. Nat. Hist. Soc. Wiscons. p. 70 T. 2 F. 6 (D ♂).
Cytaea concinna Peckham 1885, Proc. Nat. Hist. Soc. Wiscons. p. 74 T. 2 F. 8 (D ♀).
Cyrene p. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 232 T. 19 F. 4, 5 (D ♂♀).
P. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 707 (N).
P. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 239 (N ♂♀).

♀ **quadrimaculata** (Walckenaer) 1837. Brasilien
Attus q. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 432 (D ♀).
Salticus q. Guérin 1838, Mag. Zool. Cl. 8 p. 167 T. 17 F. 2 (D ♀).
P. q. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 701 (N).

♂ **quintensis** Tullgren 1903. Argentinien
P. q. Tullgren 1903, Ark. Zool. 2 (19) p. 76 T. 10 F. 40 (D ♂).

♀ **rapida** (C. L. Koch) 1846. Chile
Euophrys r. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 214 TF. 1259 (D ♀).
Amphirape r. C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 67 (N).
P. r. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 702 (N).

♀ **roburifoliata** Holmberg 1875. Buenos Aires
P. r. Holmberg 1875, Period. Zool. Org. Soc. Ent. Argent. 1 p. 293 T. 6 F. 4 (D ♀).
P. r. Holmberg 1876, An. Agr. Rep. Argent. 4 p. 127 (24) (D ♀).

♀ **rubriceps** (Taczanowski) 1871. Cayenne
Attus r. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 68 (D ♀).
P. r. Mello-Leitao 1948, An. Ac. Bras. Ci. 20 p. 190 (N).

♀ **rubrosericea** Mello-Leitao 1947. Süd-Brasilien
P. r. Mello-Leitao 1947, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. (Zool.) 80 p. 28 T. 6 F. 23 (D ♀).

♀ **rufoguttata** C. L. Koch 1846. Brasilien
P. r. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 197 TF. 1245 (D ♀).
P. r. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 702 (N).

♂o **septemguttata** (Taczanowski) 1871. Brit. Guiana
Attus s. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 81 (D).
P. s. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 707 (D ♂o).

♀ **similis** (Peckham) 1896. Trinidad
Pachomius s. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 83 (D ♀).
P. s. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 693 (C).

♂ **simoni** Berland 1913. Ecuador
P. s. Berland 1913, Araign. in: Miss. Mes. Mérid. Equat. 10 (1) p. 114 T. 12 F. 119, 120 (D ♂).

♀ **simplicicava** (F. Cambridge) 1901. Mexico, Panama
Cyrene s. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 237 T. 20 F. 4 (D ♀).
P. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 702 (N).
P. s. Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 238 f. 150 (D ♀).
P. s. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 240 (N ♀).

♀ **tristis** Mello-Leitao 1945. Argentinien
P. t. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 293 (D ♀).

♀ **variegata** (Peckham) 1901. Brasilien
Palaestrina v. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 304 T. 26 F. 4 (D ♀).
P. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 707 (N).

♀ **virgo** C. L. Koch 1846. Surinam
P. v. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 196 TF. 1244 (D ♀).
P. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 702 (N).

♀ **zonata** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
P. z. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 31 (D ♀).
P. z. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 708 (D ♀).

Gen. **Philaeus** Thorell 1869.

Palaearktische Arten:

♂♀ **albovariegatus** (Simon) 1871. Spanien, Sizilien

Dendryphantes fulviventris Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 641 (D ♂♀).
Attus a. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 189 (N).
P. a. Simon 1876, Aradin. de France 3 p. 51 (C).

♂♀ **bilineatus** (Walckenaer) 1825. Frankreich, Ungarn, S.-Russland

Attus b. Walckenaer 1825 (1820), Aran. de France p. 42 (D ♂♀).
Attus b. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 405 (D ♂♀).
Philia b. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 328 (C).
Dendryphantes b. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 635 T. 2 F. 13 (D ♂♀).
P. b. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 51 (D O♀).
P. b. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 18 (D ♀).

♂♀ **chrysops** (Poda) 1761. – * Europa, Mittelmeergebiet bis Dakar, Turkestan

Aranea c. Poda 1761, Ins. Mus. Graec. (Aran.) p. 123 (D).
Aranea sloanii Scopoli 1763, Ent. Carniol. p. 401 (D).
Aranea catesbaei Scopoli 1763, Ent. Carniol. p. 401 (D).
Aranea sanguinolenta Linné 1767, Syst. Nat. (Ed. 13) 1 (2) p. 1032 (D).
Aranea sanguinolenta Olivier 1789, Encycl. Méthod. 4 p. 220 (D).
Aranea sloanii Rossi 1790, Faun. Etrusc. 2 p. 134 (D).
Aranea sanguinolenta Petagna 1792, Ins. Ent. p. 437 T. 6 F. 8 (D ♀).
Aranea catesbaei Rossi 1794, Mantiss. Ins. 2 p. 6 (D ♀).
Attus sanguinolentus Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 24 (N).
Salticus sloanii Latreille 1806, Gen. Crust. Ins. 1 p. 123 (D).
Salticus catesbaei Latreille 1819, Nouv. Dict. Hist. Nat. (2. Ed.) 22 (D).
Attus sloani Hahn 1829, Monogr. d. Spinn. 5 p. 1 T. 18 F. A (D ♀).
Salticus sanguinolentus Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 51 TF. 39 (D ♂♀).
Calliethera sanguinolenta C. L. Koch 1837, Übers. Arachn. Syst. 1 p. 30 (N).
Attus sanguinolentus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 473 (D ♂).
Philia haemorrhoica C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 54 TF. 1121—1123 (D ♂♀).
Philia sanguinolenta C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 56 TF. 1124 (D ♂).
Dendryphantes dorsatus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 84 TF. 1147 (D ♀).
Dendryphantes xanthomelas C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 85 TF. 1148 (D ♀).
Dendryphantes leucomelas C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 88 TF. 1150 (D ♀).
Salticus erythrogaster Lucas 1846, Explor. Sci. Alger.; Zool. 1 Arachn. p. 137 T. 5 F. 3 (D ♂).
Salticus cirtanus Lucas 1846, Explor. Sci. Alger.; Zool. 1 Arachn. p. 142 T. 5 F. 4 (D ♀).
Attus xanthomelas Walckenaer 1847, Hist. Nat. Ins. Apt. 4 p. 412 (D ♂).
Philia setigera Doleschall 1852, S. B. Ak. Wiss. Wien 9 p. 645 (D).
Pandora cirtana Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 312 (C).
Philia erythrogaster Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 328 (C).
Attus sanguinolentus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 26 T. 5 F. 4 (D ♂♀).
Attus haemorrhoicus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 27 (D ♂♀).
Attus xanthomelas Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 581 (D ♀).

Dendryphantes leucomelas Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 638 (D ♂♀).
Dendryphantes nigriceps Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 649 (D ♀).
P. c. Thorell 1869, On Europ. Spid. p. 217 (N).
Attus bimaculatus Canestrini & Pavesi 1870, Arch. Zool. Anat. Fisiol. (2) 2 p. 31 (C).
P. c. Thorell 1870, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 388 (N).
P. c. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 47 T. 9 F. 23 (D ♂♀).
P. c. Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 477 T. 76 F. 270 (D ♂♀).
P. c. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 76 (D ♂♀).
P. c. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 299 (D).
P. c. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 17 T. 1 F. 20 (D ♂♀).
P. c. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 298 T. 24 F. 7 (N).
P. sanguinolentus Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 299 (C).
P. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 707 f. 829 (N ♂).
P. c. Kulczynski 1903, S. B. Ak. Wiss. Wien 112 (1) p. 659 T. 1 F. 39 (N ♂).
P. c. haemorrhoicus Kulczynski 1903, S. B. Ak. Wiss. Wien 112 (1) p. 659 T. 1 F. 38 (D ♂).
P. c. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 441 T. 42 F. 647 (D ♂♀).
P. c. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 590 (D ♂♀).
P. c. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 46 f. 142, 143 (D ♂♀).
P. c. Bacelar 1929, Bull. Soc. Portug. Sci. Nat. 10 (21) p. 246 f. 1 (N ♀).
P. c. Reimoser 1931, Die Natur (Wien) 7 (3) p. 60 f. 4 (N ♂♀).
P. c. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1237, 1269 f. 2005—2007 (D ♂♀).

♀ **corrugatulus** Strand 1916. Algier
P. c. Strand 1916, Arch. Naturg. 82 (A; 2) p. 158 (D ♀).

♀ **dumicola** (Cambridge) 1872. Palästina
Salticus d. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 341 (D ♀).
P. d. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 51 (C).

♂♀ **fallax** (Lucas) 1846. Algier
Salticus f. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger.; Zool. 1 Arachn. p. 141 T. 5 F. 5 (D ♂♀).
P. f. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 51 (C).

♀ **jugatus** (L. Koch) 1856. Andalusien
Dendryphantes j. L. Koch 1856, in: Rosenhauer, Tiere Andalusiens p. 408 (D ♀).
P. j. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 51 (C).

♀ **nervosus** (Simon) 1868. S.-Frankreich
Attus n. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 59 (D ♀).
Attus n. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 189 (N).
P. n. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 51 (C).

♀ **quadrifasciatus** (Grube) 1861. Sibirien
Attus q. Grube 1861, Bull. Ac. Sci. St. Petersbg. 4 p. 175 (D ♀).

♂ **stellatus** Franganillo 1910. Portugal
P. s. Franganillo 1910, Broteria 9 p. 20 (D ♂).

♂ **superciliosus** Bertkau 1883. Deutschland (eingeschleppt)
P. s. Bertkau 1883, Verh. Nat. Ver. Rheinld. Westf. 40 p. 277 T. 3 F. 8 (D ♂).

♂ **varicus** (Simon) 1868. Spanien, Oberitalien, Bukowina, Schlesien, Transkaukasien

Attus v. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 29 T. 5 F. 7 (D ♂).
P. v. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 51 (C).

Aethiopische Arten:

♂ **mathisi** Berland & Millot 1941. Senegambien

P. m. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 341 f. 46 (D ♂).

♂ **steudeli** Strand 1906. W.-Afrika

P. s. Strand 1906, Jahresh. Ver. Nat. Württbg. 62 p. 98 (D ♂).

Neotropische Arten:

♂ **bulbosus** Karsch 1880. Mexico

P. b. Karsch 1880, Zeitschr. ges. Naturw. 53 p. 397 T. 12 F. 15 (D ♂).

♂♀ **pacificus** Banks 1902. Galapagos-I.

P. p. Banks 1902, Proc. Wash. Ac. Sci. 4 p. 67 (D ♂♀).

♂ **pallidus** Mello-Leitao 1948. Brit. Guiana

P. p. Mello-Leitao 1948, An. Ac. Bras. Ci. 20 p. 191 f. 31 (D ♂).

♂ **ruber** Peckham 1885. Guatemala

P. r. Peckham 1885, Proc. Nat. Hist. Soc. Wiscons. p. 66 T. 2 F. 4 (D ♂).

Gen. **Sandalodes** Keyserling 1883.

Orientalische Arten:

♂ **celebensis** Merian 1911. Celebes

S. c. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) p. 311 T. 9 F. 17; f. W 1 (D ♂).

♀ **minahassae** Merian 1911. Celebes

S. m. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) p. 312 T. 9 F. 16 (D ♀).

♂♀ **semicupreus** (Simon) 1885. Indien, Ceylon

Thyene s. Simon 1885, Bull. Soc. Zool. France 10 (4—6) p. 4, 48 T. 10 F. 1 (D ♂♀).
S. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 689 f. 820, 821 (N ♂).

Australische Arten:

§ 8 Arten: Simon 1900, Faun. Hawaiiens. 2 (5) p. 513.

♂♀ **albobarbatus** (Keyserling) 1882. Queensland, Centr. Australien

Mopsus a. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1333 T. 113 F. 4, 5 (D ♂♀).
S. a. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1476 (N).
S. a. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 307 (D).

♂ **albociliatus** Simon 1900. Hawai

S. a. Simon 1900, Faun. Hawaiiens. 2 (5) p. 514 T. 18 F. 8 (D ♂).
S. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 700 (N).

o **albovittatus** (Keyserling) 1883. Queensland

Icius a. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1451 T. 122 F. 6 (D ♀).
S. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 700, 705 (N).

♂ **bernsteinii** (Thorell) 1881. Neu-Guinea
Plexippus b. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 619 (D ♂).
S. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 700 (N).

♂ **bipenicillatus** (Keyserling) 1882. – * Queensland
Mopsus b. Keyserling 1882, Aradin. Austral. 1 (2) p. 1330 T. 113 F. 3 (D ♂).
S. b. Keyserling 1883, Aradin. Austral. 1 (2) p. 1476 (N).
S. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 700, 705 f. 822 (N ♂).

♂♀ **calvus** Simon 1902. Queensland, Marquesas-I., Tahiti
S. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 389 (D ♂♀).
S. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 700 (N).
S. c. Berland 1933, Pacif. Ent. Surv. Publ. 7 (3) p. 55 f. 22—26 (N ♂♀).

♀ **canosus** Simon 1900. Hawai
S. c. Simon 1900, Faun. Hawaiiens. 2 (5) p. 515 T. 18 F. 13 (D ♀).
S. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 700 (N).

♂ **cruciatus** Simon 1900. Hawai
S. c. Simon 1900, Faun. Hawaiiens. 2 (5) p. 516 T. 18 F. 11 (D ♂).
S. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 700 (N).

♀ **flavipes** Berland 1933. Marquesas-I.
S. f. Berland 1933, Pacif. Ent. Surv. Publ. 7 (3) p. 58 f. 34, 35 (D ♀).

♀ **magnus** Berland 1933. Marquesas-I.
S. m. Berland 1933, Pacif. Ent. Surv. Publ. 7 (3) p. 60 f. 39 (D ♀).

♂♀ **navatus** Simon 1900. Hawai
S. n. Simon 1900, Faun. Hawaiiens. 2 (5) p. 515 T. 18 F. 9 (D ♂♀).
S. n. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 689 f. 819 (N ♂).

♀ **nigrescens** Berland 1933. Marquesas-I.
S. n. Berland 1933, Pacif. Ent. Surv. Publ. 7 (3) p. 59 f. 36—38 (D ♀).

♀ **nigrolineatus** Berland 1933. Marquesas-I.
S. n. Berland 1933, Pacif. Ent. Surv. Publ. 7 (3) p. 58 f. 31—33 (D ♀).

♂♀ **pubens** Simon 1900. Hawai
S. p. Simon 1900, Faun. Hawaiiens. 2 (5) p. 513 T. 18 F. 7 (D ♂♀).
S. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 700 (N).

♂ **pumicatus** (Thorell) 1881. Neu-Guinea
Plexippus p. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 625 (D ♂).

♂♀ **rufescens** Berland 1934. Marquesas-I.
S. r. Berland 1934, Ann. Soc. Ent. France 103 p. 334 f. 14—17 (D ♂♀).

♂ **seniculus** Simon 1900. Hawai
S. s. Simon 1900, Faun. Hawaiiens. 2 (5) p. 517 T. 18 F. 12 (D ♂).

♂♀ **triangulifer** Berland 1933. Marquesas-I.
S. t. Berland 1933, Pacif. Ent. Surv. Publ. 7 (3) p. 56 f. 29 (D ♂♀).

♂ **validus** Simon 1900. Hawai
S. v. Simon 1900, Faun. Hawaiiens. 2 (5) p. 514 T. 18 F. 6 (D ♂).

♂ **verecundus** Simon 1900. Hawai
S. v. Simon 1900, Faun. Hawaiiens. 2 (5) p. 516 T. 18 F. 10 (D ♂).
S. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 700 (N).

3. Gr. Vicirieae

Gen. **Alcimonotus** Simon 1902.

♂ **gounellei** Simon 1902. Paraguay, S.-Brasilien
A. g. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 54 (D ♂).
A. g. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 755 (N).

Gen. **Asaracus** C. L. Koch 1846.

♀ **elegantulus** Mello-Leitao 1947. Brasilien
A. e. Mello-Leitao 1947, Arqu. Mus. Paranaense 6 (6) p. 296 T. 39 F. 43 (D ♀).

♂ **megacephalus** C. L. Koch 1846. – * Brasilien
A. m. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 188 TF. 1236 (D ♂).
A. m. C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 55 (N).
A. m. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 302 (D).
A. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 754 (N).

♀ **pauciaculeis** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
A. p. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 32 (D ♀).
A. p. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 714 TF. 144 (D ♀).

♂o **psecadiformis** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
A. p. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 32 (D ♂).
A. p. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 714 (D ♂o).

♂ **roeweri** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
A. r. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 32 (D ♂).
A. r. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 715 TF. 145—146 (D ♂).

♂ **rufociliatus** (Simon) 1902. Amazonas, Guiana
Chasidamna r. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 50 (D ♂).
A. r. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 743 f. 895 (N ♂).
A. r. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 714 (N ♂).

♂ **semifimbriatus** (Simon) 1902. Amazonas
Chasidamna s. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 51 (D ♂).
A. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 749 (N).

Gen. **Erasinus** Simon 1899.

♂ **flagellifer** Simon 1899. – * Sumatra
E. f. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 117 (D ♂).
E. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 754 (N).

♂ **flavibarbis** Simon 1902. Java
E. f. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 50 (D ♂).
E. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 743 f. 892 (N ♂).

♂ **gracilis** Peckham 1907. Borneo
E. g. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 626 (D ♂).

♂♀ **labiatus** (Thorell) 1887. Burma, Sumatra, Java
Sinis fimbriatus Hasselt 1882, in: Veth, Midd. Sumatra; Aran. 4 (11; A) p. 50 T. 5 F. 16 (D ♂).
Linus l. Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 354 (D ♀).

Linus dentipalpis Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 28 p. 35, 189 (D ♂).
E. dentipalpis Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 352 (D ♂).
E. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 754 (N).

Gen. **Poessa** Simon 1902.

♂ **argenteofrenata** Simon 1902. Madagascar

P. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 398 (D ♂).
P. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 755 (N).

Gen. **Shira** Peckham 1896.

(= **Chira** auct. alt.)

Orientalische Arten:

♂ **aculeata** Simon 1902. Lombok

Chira a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 53 (D ♂).
Chira a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 743 f. 894 (N ♂).

♂ **albiocciput** (Bösenberg & Strand) 1906. Japan, S.-China

Chira a. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 366 T. 13 F. 311 (D ♂).

Neotropische Arten:

♂ **bicirculigera** Soares & Camargo 1948. Brasilien

Chira b. Soares & Camargo 1948, Rev. Bras. Biol. R. d. Jan. 8 (4) p. 421 f. 1—3 (D ♂).
Chira b. Camargo 1953, Pap. Avuls. S. Paulo 11 (19) p. 334 (D ♂).

♂♀ **designata** Peckham 1896. – * Panama

S. d. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 86 T. 6 F. 12 (D ♀).
S. d. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 298 T. 29 F. 6 (N ♀).
Chira d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 755 (N).
Chira d. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 117 f. 109—115 (D ♂♀).

♂ **fagei** Caporiacco 1947. Brit. Guiana

Chira f. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 31 (D ♂).
Chira f. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 711 TF. 138—139 (D ♂).

♀ **flavescens** Caporiacco 1947. Brit. Guiana

Chira f. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 32 (D ♀).
Chira f. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 712 TF. 141 (D ♀).

♂ **gratiosa** Soares & Camargo 1948. Süd-Brasilien

Chira g. Soares & Camargo 1948, Rev. Bras. Biol. R. d. Jan. 8 (4) p. 425 f. 6—8 (D ♂).

♂ **kastoni** Caporiacco 1947. Brit. Guiana

Chira k. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 32 (D ♂).
Chira k. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 711 (D ♂).

♂ **lanei** Soares & Camargo 1948. San Paulo

Chira l. Soares & Camargo 1948, Rev. Bras. Biol. R. d. Jan. 8 (4) p. 123 f. 4—5 (D ♂).

♂ **lucina** Simon 1902. Brasilien
Chira l. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 53 (D ♂).

♂ **luctuosa** Simon 1902. Peru
Chira l. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 52 (D ♂).

♂ **pseudothysbe** Soares & Camargo 1948. Süd-Brasilien
Chira p. Soares & Camargo 1948, Rev. Bras. Biol. R. d. Jan. 8 (4) p. 427 f. 9—10 (D ♂).

♀ **spinosa** Mello-Leitao 1945. Argentinien
Chira s. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 279 f. 69 (D ♀).

♀ **superba** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
Chira s. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 32 (D ♀).
Chira s. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 713 TF. 142—143 (D ♀).

♂ **thysbe** Simon 1902. Brasilien
Chira th. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 53 (D ♂).

♂♀ **trivittata** (Taczanowski) 1871. Guiana, Brasilien
Attus t. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 59 (D ♂♀).
Chira t. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 51 (D ♂).
Chira t. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 743 f. 893 (N ♂).

Gen. **Viciria** Thorell 1877.

Aethiopische Arten:

♀ **alba** Peckham 1903. Mashonaland, Natal
V. a. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 234 T. 26 F. 8 (D ♀).
V. a. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 32 (21) p. 358 f. 18 (D ♀).

♂ **albocincta** Thorell 1899. Camerun
V. a. Thorell 1899, Bih. Svensk. Vet. Ak. Handl. 25 (4; 1) p. 98 (D ♂).
V. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 753 (N).

♀ **besançoni** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea
V. b. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 378 f. 76A, B (D ♀).

♂ **chabanaudi** Fage 1923. Franz. Guinea
V. c. Fage 1923, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris p. 300 f. 2 (D ♂).

♂ **chrysophaea** Simon 1902. Gabun
V. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 724 (D ♂).
V. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 752 (N).

♂ **epileuca** Simon 1902. Gabun
V. e. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 724 (D ♂).
V. e. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 752 (N).

♂ **equestris** Simon 1902. Gabun
V. e. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 723 (D ♂).
V. e. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 752 (N).
V. e. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 379 f. 77B—E, 78 (D ♂).

♂ **equestris pallida** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste
V. e. p. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 381 (D ♂).

♀ **flavipes** Peckham 1903. S.-Afrika
V. f. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 233 T. 26 F. 7 (D ♀).

♂ **flavolimbata** Simon 1910. Portug. Guinea
V. f. Simon 1910 (1909), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 439 (D ♂).

♂ **fuscimana** Simon 1903. Span. Guinea
V. f. Simon 1903, Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 1 (3) p. 118 (D ♂).
V. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 753 (N).

♂ **jeanneli** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste
V. j. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 382 f. 79, 80 (D ♂).

♂ **lawrencei** Lessert 1927. Congo, Senegal, Franz. Guinea, Elfenbeinküste
V. l. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 458 f. 31 (D ♂).
V. l. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 382 f. 81A—C (N ♂, D ♀).

♀ **longuiscula** Thorell 1899. Camerun
V. l. Thorell 1899, Bih. Svensk. Vet. Ak. Handl. 25 (4; 1) p. 96 (D ♀).

♂ **lupula** Simon 1902. W.-Afrika
V. l. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 48 (D ♂).
V. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 753 (N).

♀ **mondoni** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste
V. m. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 384 f. 76 C, D (D ♀).

♀ **monodi** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste
V. m. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 384 f. 82 (D ♀).

♂ **morigera** Peckham 1903. Natal
V. m. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 232 T. 26 F. 6 (D ♂).

♂ **mustela** Simon 1902. Natal, Portug. O.-Afrika
V. m. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 48 (D ♂).
V. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 743 f. 885, 886 (N ♂).
V. m. Lessert 1936, Rev. Suisse Zool. 43 (9) p. 297 f. 94, 95 (D ♂).

♂ **niveimana** Simon 1902. W.-Afrika
V. n. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 49 (D ♂).
V. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 752 f. 887 (N).
V. n. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 385 f. 83 (N ♂).

♂♀ **ocellata** (Thorell) 1899. W.-Afrika, Fernando Poo
Marptusa o. Thorell 1899, Bih. Svensk. Vet. Ak. Handl. 25 (4; 1) p. 91 (D ♂).
Mithion o. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 603 (N).
Mithion o. Simon 1903, Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 1 (3) p. 108 (D ♀).
Mithion o. Strand 1906, Jahrb. Nassau. Ver. Nat. 59 p. 297 (D ♀).
V. o. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 386 f. 81D—F (N ♀).

♂ **parmata** Peckham 1903. Natal
V. p. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 234 T. 26 F. 5 (D ♂).

♂♀ **peckhamorum** Lessert 1927. Congo, Franz. Guinea
V. p. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 455 f. 30 (D ♂♀).
V. p. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 378, 387 f. 76E, F (N ♀).

♂ **prenanti** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste
V. p. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 387 f. 84 (D ♂).

♂♀ **scintillans** Simon 1910. W.-Afrika
V. s. Simon 1910 (1909), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 438 (D ♂♀).

♂ **tergina** Simon 1903. Span. Guinea
V. t. Simon 1903, Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 1 (3) p. 119 (D ♂).
V. t. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 752 (N).
V. t. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 380 f. 78A (N ♂).

♀ **thoracica** Thorell 1899. Camerun
V. t. Thorell 1899, Bih. Svensk. Vet. Ak. Handl. 25 (4; 1) p. 98 (D ♀).

Orientalische Arten:

♀ **alboguttata** Thorell 1887. Burma
V. a. Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 397 (D ♀).
V. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 748 (N).

♂ **albolimbata** Simon 1885. Sumatra
V. a. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. Belg. 29 C. R. p. 32 (D ♂).
V. a. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 393 (D ♂).
V. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 753 (N).

♂♀ **arrogans** Peckham 1907. Borneo
V. a. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 646 (D ♂♀).

♂ **bombycina** Simon 1902. Borneo
V. b. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 364 (D ♂).
V. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 753 (N).

♂ **caprina** Simon 1902. Annam
V. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 734 (D ♂).
V. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 752 (N).

♂ **concolor** Peckham 1907. Borneo
V. c. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 645 (D ♂).

♂ **detrita** Strand 1922. Sumatra
V. d. Strand 1922, Arch. Naturg. 88 (A; 4) p. 148 (D ♂).

♂ **diademata** Simon 1902. Indien
V. d. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 46 (D ♂).
V. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 753 (N).

♂ **diatreta** Simon 1902. Indien
V. d. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 366 (D ♂).
V. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 753 (N).

♂ **dimidiata** Simon 1899. Indien, Sumatra
V. d. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 118 (D ♂).
V. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 753 (N).

♂♀ **elegans** Thorell 1887. Burma, Indien, Sumatra
V. e. Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 390 (D O).
V. e. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 371 (D ♂♀).
V. e. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 748 (N).

♂♀ **flavocincta** (C. L. Koch) 1848. I. Bintang
Maevia f. C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 74 TF. 1330 (D ♀).
Maevia capistrata C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 76 TF. 1331 (D ♂).

♂ **formosa** Simon 1902. Indien, Java
V. f. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 365 (D ♂).
V. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 753 (N).

♂♀ **hasseltii** (Thorell) 1878. Indien, Burma, Siam, Sumatra, Celebes, Amboina
Sinis h. Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 6, 274 (D ♀).
V. h. Hasselt 1879, Tijdschr. Ent. 22 p. 220 (D ♂).
V. scoparia Simon 1886, Act. Soc. Linn. Bord. 40 p. 138 (D ♂).
V. h. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 389 (D ♂).
V. h. Workman 1896, Malays. Spid. p. 103 T. 103 (D ♂).
V. scoparia Simon 1904, Arachn. in: Miss. Pavie Indo-Chin. 3 p. 291 (D ♂).

♀ **lucida** Peckham 1907. Borneo
V. l. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 649 (D ♀).

♂ **minima** Reimoser 1934. Indien
V. m. Reimoser 1934, Rev. Suisse Zool. 41 (32) p. 502 f. 24 (D ♂).

♂ **miranda** Peckham 1907. Borneo
V. m. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 648 (D ♂).

♀ **moesta** Peckham 1907. Borneo
V. m. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 652 (D ♀).

O **pallens** Thorell 1877. Celebes
V. p. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 579 (D O).

♂ **paludosa** Peckham 1907. Borneo
V. p. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 650 (D ♂).

♂♀ **pavesii** Thorell 1877. – * Celebes
V. p. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 574 (D ♂♀).
V. p. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 310 (D).
V. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 751 (N).

♂ **petulans** Peckham 1907. Borneo
V. p. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 650 (D ♂).

♂ **polysticta** Simon 1902. Ceylon
V. p. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 47 (D ♂).
V. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 752 (N).

♂ **rhinoceros** Hasselt 1894. Celebes
V. r. Hasselt 1894, Tijdschr. Ent. 37 p. 187 T. 4 F. 4—6 (D ♂).

♂ **semicoccinea** Simon 1902. Java
V. s. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 49 (D ♂).
V. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 753 (N).

♂ **signata** Simon 1899. Sumatra
V. s. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 118 (D ♂).

♂ **sponsa** Simon 1902. Ceylon, Indien
V. s. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 47 (D ♂).
V. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 753 (N).

♂♀ **tenera** (Simon) 1877. Burma, Sumatra, Celebes, Philippinen
Evenus t. Simon 1877, Ann. Soc. Ent. France (5) 7 p. 59 T. 3 F. 12 (D ♀).
Epeus t. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 334 (D).
V. cristata Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 393 (D ♂).
Epeus t. Peckham & Wheeler 1889, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 251 (D ♀).
V. t. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 743, 752 f. 882, 883 (N ♂).
V. t. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) p. 315 f. X 1 (N ♂♀).

♂♀ **terebrifera** Thorell 1890. Burma, Sumatra, Java, Annam
V. t. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 168 (D ♂).
V. t. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 397 (D ♂).
V. t. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 752 (N).
V. t. Reimoser 1925, Suppl. Ent. 10 p. 91 (N ♂♀).

♀ **terebrifera nigrina** Simon 1902. Annam
V. t. n. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 734 (D ♀).

Gen. **Vinnius** Simon 1902.

♂ **calcarifer** Simon 1902. Brasilien
V. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 44 (D ♂).
V. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 743 f. 890 (N ♂).

♂ **carinatus** Simon 1902. Venezuela
V. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 45 (D ♂).
V. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 743 f. 888, 889 (N ♂).

lartiguei Simon 1903. Brasilien
V. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 741 (N).

♂♀ **maculatipes** Simon 1902. – * Brasilien
V. m. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 46 (D ♂♀).
V. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 751 (N).

♀ **paranaensis** Mello-Leitao 1947. Parana
V. p. Mello-Leitao 1947, Arqu. Mus. Paranaense 6 (6) p. 303 T. 40 F. 53—54 (D ♂).

♀ **reticulatus** Mello-Leitao 1943. Rio Grande do Sul
V. r. Mello-Leitao 1943, Arqu. Mus. Nac. R. d. Jan. 37 p. 232 TF. 60 (D ♀).

♂ **subfasciatus** (C. L. Koch) 1846. Brasilien
Amycus s. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 186 TF. 1235 (D ♂).
V. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 351 (N).

♂ **uncatus** Simon 1902. Brasilien
V. u. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 45 (D ♂).
V. u. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 743 f. 891 (N).

14. Subfam. Plexippinae

1. Gr. Plexippeae

Gen. **Afiola** Peckham 1907.

♂ **benjarei** Peckham 1907. Borneo
A. b. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 619 (D ♂).

Gen. **Alfenus** Simon 1902.

Aethiopische Arten:

♂ **calamistratus** Simon 1902. – * Congo
A. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 411 (D ♂).
A. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 739 f. 868, 869 (N).

♂ **chrysophaeus** Simon 1903. Span. Guinea
A. c. Simon 1903, Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 1 (3) p. 112 (D ♂).
A. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 722 f. 870 (N).

Neotropische Arten:

♂ **aurantius** Mello-Leitao 1945. Argentinien
A. a. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 274 f. 62 (D ♂).

Gen. **Anarrhotus** Simon 1902.

♂ **fossulatus** Simon 1902. – * Malakka
A. f. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 421 (D ♂).
A. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 739 (N).

♀ **nishitakensis** Strand 1907. Japan
A. n. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (17—18) p. 570 (D ♀).
A. n. Strand 1909, Abh. Nat. Ges. Görlitz 26 p. 119 (D ♀).

Gen. **Artabrus** Simon 1902.

Orientalische Arten:

♂ **erythrocephalus** (C. L. Koch) 1846. – * Java
Plexippus e. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 102 TF. 1164 (D ♂).
A. e. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 736 f. 846, 847 (N ♂).

♂ **jolensis** Simon 1902. Philippinen (I. Jolo)
A. j. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 404 (D ♂).

Australische Arten:

♀ **planipudens** (Karsch) 1881. Gilbert-I.
Plexippus p. Karsch 1831, Berlin. Ent. Zeitschr. 25 p. 16 (D ♀).
Cyrba p. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1442 T. 122 F. 2 (D ♀).
A. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 728 (N).

Gen. **Bathippus** Thorell 1892.

Orientalische Arten:

♂ **birmanicus** Thorell 1895. Burma
B. b. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 384 (D ♂).

♂ **macilentus** Thorell 1890. Sumatra
B. m. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 169 (D ♂).
B. m. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 402 (D ♂).

♂ **manicatus** Simon 1902. Borneo
B. m. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 420 (D ♂).
B. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 726 (N).

♂ **morsitans** Pocock 1897. Borneo
B. m. Pocock 1897, Abh. Senckenbg. Ges. 23 (4) p. 625 T. 26 F. 27 (D ♂).

♂ **palabuanensis** Simon 1902. Java
B. p. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 419 (D ♂).
B. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 726 f. 876, 877 (N ♂).

♂ **schalleri** Simon 1902. I. Pinang
B. s. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 420 (D ♂).
B. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 726, 731 (N).

♂♀ **sedatus** Peckham 1907. Borneo
B. s. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 621 (D ♂♀).

♀ **serenus** Peckham 1907. Borneo
B. s. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 623 (D ♀).

♂ **shelfordii** Peckham 1907. Borneo
B. s. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 620 (D ♂).

o **trinotatus** Thorell 1895. Burma
B. t. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 386 (D o).

Australische Arten:

♂ **brocchus** (Thorell) 1881. Neu-Guinea
Plexippus b. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 565 (D ♂).

♂ **cervus** (Thorell) 1881. I. Yule
Plexippus c. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 537 (D ♂).
B. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 726 (N).

♂ **dentiferellus** Strand 1911. Aru-I.
B. d. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 187 T. 4 F. 15; T. 6 F. 81 (D ♂).

♂ **dilanians** (Thorell) 1881. Neu-Guinea, Aru-I.
Plexippus d. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 548 (D ♂, nec ♀).

♂ **elaphus** (Thorell) 1881. Neu-Guinea
Plexippus e. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 535 (D ♂).

♀ **keyensis** Strand 1911. Kei-I.
B. k. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 190 T. 6 F. 80 (D ♀).

♀ **latericius** (Thorell) 1881. Neu-Guinea
Plexippus l. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 580 (D ♀).
B. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 740 (N).

♂ **macrognathus** (Thorell) 1881. – * Neu-Guinea, Kei-I.
Plexippus m. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 531 (D ♂).
B. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 736, 741 (N).
B. m. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 187 (N).

♂ **macroprotopus** Pocock 1898. Salomonen
B. m. Pocock 1898, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 1 p. 471 T. 19 F. 10 (D ♂).

♂ **molossus** (Thorell) 1881. I. Yule
Plexippus m. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 553 (D ♂).
B. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 727 (N).

♂ **montrouzieri** (Lucas) 1869. Queensland, Neu-Caledonien
Plexippus m. Lucas 1869, Rev. Mag. Zool. p. 12 T. 2 F. 8—12 (D ♂).
B. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 726 f. 875 (N ♂).

♂ **oedonychus** (Thorell) 1881. Neu-Guinea
Plexippus oe. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 556 (D ♂).
B. o. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 727 (N).

♂ **oscitans** (Thorell) 1881. Neu-Guinea
Plexippus o. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 544 (D ♂).
B. o. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 726 (N).

♂ **papuanus** (Thorell) 1881. Neu-Guinea, Aru-I.
Plexippus montrouzieri p. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 526 (D ♂).
B. p. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 188 (N).
B. p. Roewer 1938, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors Sér.) 3 (19) p. 87 f. 67—69 (N ♂).

♂ **proboscideus** Pocock 1899. Neu-Pommern
B. p. Pocock 1899, in: Willey, Zool. Res. . . . fr. N. Brit. Salomon. Isl. 1 p. 118 T. 11 F. 15 (D ♂).

♂ **rechingeri** Kulczynski 1910. Salomonen
B. r. Kulczynski 1910, Denkschr. Ak. Wiss. Wien 85 p. 403 T. 17 F. 13, 14 (D ♂).

♂ **ringens** (Thorell) 1881. Neu-Guinea
Plexippus r. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 562 (D ♂).

♂ **seltuttensis** Strand 1911. Aru-I.
B. s. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 188 T. 6 F. 82 (D ♂).

o **semiannulifer** Strand 1911. Aru-I., Kei-I.
B. s. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 189 T. 4 F. 13 (D o).

♀ **waoranus** Strand 1911. Kei-I.
B. w. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 189 T. 6 F. 79 (D ♀).

Gen. **Capidava** Simon 1902.

♀ **annulipes** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
C. a. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 33 (D ♀).
C. a. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 720 TF. 151 (D ♀).

♂ **auriculata** Simon 1902. – * Brasilien
C. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 418 (D ♂).
C. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 740 f. 845 (N).

♂ **biuncata** Simon 1902. Amazonas
C. b. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 419 (D ♂).

♀ **dubia** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
C. d. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 33 (D ♀).
C. d. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 719 TF. 150 (D ♀).

♂ **nigropicta** (F. Cambridge) 1901. Panama, Costa Rica
Sidusa n. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 212 T. 15 F. 15 (D ♂).
C. n. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 740 (N).

♀ **rufithorax** Simon 1902. Peru
C. r. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 419 (D ♀).
C. r. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 719 (N).

♀ **saxatilis** Soares & Camargo 1948. Brasilien
C. s. Soares & Camargo 1948, Rev. Bras. Biol. R. d. Jan. 8 (4) p. 429 f. 11 (D ♀).

♂ **senescens** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires
C. s. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 3 (24) p. 380 f. 73 (D ♂).

♂♀ **spinipes** (Taczanowski) 1871. Guiana, Peru
Attus s. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 65 (D ♂♀).
Amycus s. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 593 (C).
C. s. Mello-Leitao 1944, An. Ac. Bras. Ci. 20 (2) p. 188 (N).

♀ **uniformis** Mello-Leitao 1940. Guiana
C. u. Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. Paulista 25 p. 184 TF. 17 (D ♀).

♂ **ursina** Mello-Leitao 1940. Guiana
C. u. Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. Paulista 25 p. 185 TF. 18 (D ♂).

Gen. **Colopsus** Simon 1902.

♂♀ **cancellatus** Simon 1902. Ceylon, Java
C. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 409 (D ♂♀).
C. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 738 f. 851 (N ♂).
C. c. Simon 1905, Mitt. Nat. Mus. Hambg. 22 (2) p. 71 (N).

Gen. **Colyttus** Thorell 1891.

♂♀ **bilineatus** Thorell 1891. Malakka, Sumatra
C. b. Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 132 (D ♀).
Hyllus modestus Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 113 (D ♂).
C. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 737 f. 848—850 (N ♂).
C. b. Reimoser 1925, Suppl. Ent. 10 p. 91 (N ♂♀).

Gen. **Dasycyptus** Simon 1902.

♂ **dimus** Simon 1902. – * Gabun
D. d. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 364 (D ♂).
D. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 737 f. 844, 852 (N ♂).

♀ **dubius** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste
D. d. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 359 f. 59, 60 (D ♀).

Gen. **Eustiromastix** Simon 1902.

♂ **chaperi** Simon 1902. Columbien
E. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 417 (D ♂).

♂♀ **haytiensis** (Banks) 1903. Haiti
Cybele h. Banks 1903, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 55 p. 344 T. 15 F. 1, 9, 12 (D ♂♀).
E. h. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 650 (C).

♂ **major** Simon 1902. Brasilien
E. m. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 416 (D ♂).
E. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 716 f. 816 (N ♂).

♂ **moraballi** Mello-Leitao 1940. Guiana
E. m. Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. Paulista 25 p. 185 TF. 19—20 (D ♂).

♂♀ **obscurus** (Peckham) 1893. – * St. Vincent
Cybele o. Peckham 1893, Proc. Zool. Soc. London p. 695 T. 61 F. 3 (D ♂♀).
E. o. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 740 (N).

♀ **pantherinus** Mello-Leitao 1942. Argentinien
E. p. Mello-Leitao 1942, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. 16 p. 420 f. 47—48 (D ♀).

♀ **parobscurus** Roewer 1951. Argentinien
E. obscurus Mello-Leitao 1942, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. 16 p. 419 45—46 (D ♀) (praeocc. Simon 1903).
E. p. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 450 (nom. nov.).

♂ **rufohirtus** Simon 1902. Brasilien
E. r. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 417 (D ♂).
E. r. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 712 f. 843 (N ♂).

♂ **styliferus** Simon 1902. Amazonas
E. s. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 418 (D ♂).
E. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 716 f. 858 (N ♂).

♂♀ **vincenti** (Peckham) 1893. St. Vincent
Cybele v. Peckham 1893, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 696 T. 61 F. 4 (D ♂♀).
E. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 724 (N).

Gen. **Freya** C. L. Koch 1850.

Orientalische Arten:

♀ **dyali** Roewer 1951. Panjab
F. trifasciata Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 236 T. 17 F. 180 (D ♀) (praeocc. C. L. Koch 1846 sub **Euophrys**).
F. d. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 451 (nom. nov.).

Neotropische Arten:

§ 12 ♂, 9 ♀: F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 222 (sub **Cyrene**).
§ 13 ♂, 8 ♀: Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 164—167.

♀ **albosignata** (F. Cambridge) 1901. Guatemala, Panama
Cyrene a. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 235 T. 19 F. 16 (D ♀).
F. a. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 651 (C).
F. a. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 168 (D ♀).

♂♀ **arraijanica** Chickering 1946. Panama
F. a. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 170 f. 145—148 (D ♂♀).

♂ **bella** (C. L. Koch) 1846. Brasilien
Euophrys b. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 203 TF. 1250 (D ♂).
F. b. C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 66 (N).
F. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 730 (N).

♀ **bicavata** (F. Cambridge) 1901. Panama
Cyrene b. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 235 T. 19 F. 15 (D ♀).
F. b. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 652 (C).
F. b. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 173 (N).

♂ **bifida** (F. Cambridge) 1901. Panama
Cyrene b. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 233 T. 19 F. 7 (D ♂).
F. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 730 (N).
F. b. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 173 (N).

♂ **bifurcata** (F. Cambridge) 1901. Panama
Cyrene b. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 234 T. 19 F. 11 (D ♂).
F. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 730 (N).
F. b. Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 231 f. 141, 142 (D ♂).
F. uncinella Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah 27 (5), Biol. 3 (5) p. 25 T. 7 F. 53—55 (D ♂).
F. b. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 174 (N ♂).

♂ **boeroi** Mello-Leitao 1945. Argentinien
F. b. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 281 (D ♂).

♂ **brandtii** (Taczanowski) 1871. Cayenne
Attus b. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 41 (D ♂).
F. b. Mello-Leitao 1948, An. Ac. Bras. Ci. 20 p. 190 (N).

♂ **bulbosa** (F. Cambridge) 1901. Guatemala, Panama
Cyrene b. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 231 T. 18 F. 16 (D ♂).
F. b. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 652 (C).
F. b. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 174 f. 149—150 (D ♂).

♂♀ **chionopogon** Simon 1902. Amazonas
F. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 413 (D ♂♀).

♂ **comta** (C. L. Koch) 1846. Brasilien
Euophrys c. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 204 TF. 1251 (D ♂).
F. c. C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 66 (N).
F. compta Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 730 (N).

♂ **curvispina** (F. Cambridge) 1901. Guatemala
Cyrene c. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 231 T. 19 F. 3 (D ♂).
F. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 730 (N).

♂♀ **decorata** (C. L. Koch) 1846. – * Brasilien, Guiana

Euophrys d. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 200 TF. 1248 (D ♂).
Euophrys trifasciata C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 201 TF. 1249 (D ♀).
Thore trifasciata C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 66 (N).
Thore d. C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 66 (N).
F. d. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 313 (C).
Parthenia trifasciata Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 313 (C).
Phyale d. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 315 (C).
Attus d. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 70 (N ♂).
F. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 739 (N).

♂ **decorata dyscrita** (Penther) 1900. Columbien

Euophrys d. d. Penther 1900, Zool. Anz. 23 (615) p. 285 (D ♂).

♂ **demarcata** Chamberlin & Ivie 1936. Panama

F. d. Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah 27 (5), Biol. 5 (3) p. 23 T. 7 F. 47, 48 (D ♂).
F. d. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 177 f. 151—153 (D ♂).

♀ **emarginata** (F. Cambridge) 1901. Guatemala

Cyrene e. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 235 T. 19 F. 13 (D ♀).
F. e. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 730 (N).

♂ **exculta** Simon 1902. Amazonas

F. e. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 412 (D ♂).
F. e. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 716 f. 860 (N ♂).

♀ **flava** (F. Cambridge) 1901. Guatemala, Panama

Cyrene f. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 236 T. 19 F. 18 (D ♀).
F. f. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 653 (C).
F. f. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 181 (N).

♂♀ **frontalis** Banks 1929. Panama

F. f. Banks 1929, Bull. Mus. Zool. Harvard 69 (3) p. 68 T. 1 F. 8, 9 (D ♂).
F. sagittifer Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah 27 (5), Biol. 3 (5) p. 25 T. 8 F. 64 (D ♀).
F. f. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 181 (N ♂♀).

♂ **grisea** (F. Cambridge) 1901. Panama, Guatemala

Cyrene g. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 233 T. 19 F. 6 (D ♂).
F. g. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 730 (N).
F. distincta Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 233 f. 143—145 (D ♂).
F. g. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 182 (N ♂).

♂ **guianensis** Caporiacco 1947. Brit. Guiana

F. g. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 32 (D ♂).
F. g. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 718 TF. 149 (D ♂).

♂ **haemorrhoa** Mello-Leitao 1945. Argentinien

F. h. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 282 (D ♂).

♀ **infuscata** (F. Cambridge) 1901. Panama

Cyrene i. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 235 T. 19 F. 14 (D ♀).
F. i. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 653 (C).
F. i. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 182 (N ♀).

♂ **justina** Banks 1929. Panama

F. j. Banks 1929, Bull. Mus. Zool. Harvard 69 (3) p. 67 T. 2 F. 32 (D ♂).
F. j. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 182 f. 154—156 (D ♀).

♂ **longispina** (F. Cambridge) 1901. Guatemala, Panama

Cyrene l. F. Cambridge 1901 Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 230 T. 17 F. 14 (D ♂).
F. l. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 653 (C).
F. l. Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 235 f. 146—148 (D ♂).
F. l. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 185 (N ♂).

♂ **maculatipes** (F. Cambridge) 1901. Mexico

Cyrene m. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p, 234 T. 19 F. 12 (D ♂).
F. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 730 (N).

♂ **minuta** (F. Cambridge) 1901. Panama

Cyrene m. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 233 T. 19 F. 10 (D ♂).
F. m. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 654 (C).
F. m. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 185 (N ♂).

♂ **nannispina** Chamberlin & Ivie 1936. Panama

F. n. Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah; Biol. 27 (5) p. 24 T. 7 F. 51, 52 (D ♂).

♂ **perelegans** Simon 1902. Venezuela

F. p. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 414 (D ♂).

♂ **petrunkevitchi** Chickering 1946. Panama

F. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 185 f. 157—159 (D ♂).

♂♀ **prominens** (F. Cambridge) 1901. Costa Rica, Mexico, Panama

Cyrene p. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 231 T. 19 F. 1, 2 (D ♂♀).
F. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 730 (N).
F. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 188 (N ♂♀).

♂♀ **regia** (Peckham) 1896. Guatemala, Mexico

Heraclea r. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 77 T. 3 F. 6 (D ♂♀).
Cyrene r. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 229 T. 18 F. 12, 13 (D ♂♀).
F. r. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 716 f. 859 (N ♂).

♂♀ **rustica** (Peckham) 1896. Guatemala, Panama

Heraclea r. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 79 T. 4 F. 2 (D ♂♀).
Cyrene r. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 233 T. 19 F. 8, 9 (N).
F. r. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 730 (N).

♂ **sanguinea** (Peckham) 1896. Guatemala
Heraclea s. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 78 (D ♂).
Cyrene s. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 230 (N ♂).
F. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 730 (N).

♂ **sanguinea paradoxa** (Peckham) 1896. Guatemala
Heraclea s. p. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 79 (D ♂).

♀ **strandi** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
F. s. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 32 (D ♀).
F. s. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 717 TF. 148 (D ♀).

♂♀ **striata** Chickering 1946. Panama
F. s. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 188 f. 160—162 (D ♂♀).

Gen. **Giuiria** Strand 1906.

♀ **unica** Strand 1906. Abessinien
G. u. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 666 (D ♀).
G. u. Strand 1909, Societ. Ent. 24 p. 90 (D ♀).

Gen. **Goya** Mello-Leitao 1945.

♂ **spinosa** Mello-Leitao 1945. Argentinien
G. s. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 286 f. 75 (D ♂).

Gen. **Makthalia** Badcock 1932.

♂ **cincta** Badcock 1932. Paraguay-Chaco
M. c. Badcock 1932, Journ. Linn. Soc. Zool. 38 p. 45 f. 37 (D ♂).
Corythalia c. Mello-Leitao 1939, Rev. Suisse Zool. 46 (2) p. 84 (C).

Gen. **Malloneta** Simon 1902.

♂ **guineensis** Simon 1902. – * W.-Afrika
M. g. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 405 (D ♂).
M. g. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 737 f. 878, 879 (N ♂).

♂ **interrogationis** Strand 1907. Madagascar
M. i. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (23) p. 748 (D ♂).
M. i. Strand 1908, Nyt Mag. Naturv. Christiania 46 (2) p. 215 (D ♂).

Gen. **Palpelius** Simon 1903.

Orientalische Arten:

♀ **albofasciatus** Peckham 1907. Borneo
P. a. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 634 (D ♀).

♂ **arboreus** Peckham 1907. Borneo
P. a. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 634 (D ♂).

♂ **nemoralis** Peckham 1907. Borneo
P. n. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 636 (D ♂).

Transgredierende Arten:

♂♀ **beccarii** (Thorell) 1881. – * Molukken, Neu-Guinea, Australien, Kei-I.

Plexippus b. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 582 (D ♂♀).
P. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 735 f. 842 (N ♂).

Australische Arten:

♂ **clarus** Roewer 1938. Neu-Guinea

P. c. Roewer 1938, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors Sér.) 3 (19) p. 86 f. 65, 66 (D ♂).

♀ **dearmatus** (Thorell) 1881. Aru-I., I. Yule, Cap York

Plexippus d. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 588 (D ♀).
P. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 735 (N).

♀ **discedens** Kulczynski 1910. Neu-Pommern

P. d. Kulczynski 1910, Denkschr. Ak. Wiss. Wien 85 p. 405 T. 17 F. 15, 16 (D ♀).

♀ **fuscoannulatus** (Strand) 1911. Aru-I.

Plexippus (P.) f. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 187 T. 4 F. 17; T. 6 F. 83 (D ♀).

Gen. **Pancorius** Simon 1902.

§ 4 Arten: Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 738.

♀ **animosus** Peckham 1907. Borneo

P. a. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 638 (D ♀).

♂ **borneensis** Simon 1902. Borneo

P. b. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 411 (D ♂).
P. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 716 f. 853, 854 (N ♂).

♂ **curtus** (Simon) 1877. Philippinen

Plexippus c. Simon 1877, Ann. Soc. Ent. France (5) 7 p. 55 (D ♂).
P. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 738 (N).

♂♀ **dentichelis** (Simon) 1899. – * Sumatra

Ergane d. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 115 (D ♂).
P. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 738 (N).
P. d. Reimoser 1925, Suppl. Ent. 10 p. 91 (N ♂♀).

♂ **fasciatus** Peckham 1907. Borneo

P. f. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 637 (D ♂).

♂♀ **naevius** Simon 1902. Java, I. Siberut

P. n. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 410 (D ♂).
P. n. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 738 (N).
P. n. Reimoser 1929, Bull. Raffles Mus. 2 p. 132 (N ♂♀).

♂ **protervus** (Simon) 1902. Malakka

Pseudamycus p. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 404 (D ♂).
P. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 738 (N).

♂ **relucens** (Simon) 1901. Hongkong

Pseudamycus r. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 63 (D ♂).
P. r. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 738 (N).

♂ **scoparius** Simon 1902. Java
P. s. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 410 (D ♂).
P. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 738 (N).

Gen. **Penionomus** Simon 1903.

Orientalische Arten:

♀ **dyali** Roewer 1951. Panjab
P. longipalpis Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 237 (D ♀) (praeocc. Simon 1888 sub **Evophrys**).
P. d. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 451 (nom. nov.).

Australische Arten:

♂♀ **dispar** (Simon) 1888. Neu-Caledonien
Ergane d. Simon 1888, Ann. Soc. Ent. France (6) 8 p. 238 (D ♂♀).
P. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 734 (N).

♂ **longipalpis** (Simon) 1888. – * Neu-Caledonien
Evophrys l. Simon 1888, Ann. Soc. Ent. France (6) 8 p. 237 (D ♂).
P. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 734 f. 862 (N ♂) (in f. **longimanus**).

Gen. **Pharacocerus** Simon 1902.

♂ **castaneiceps** Simon 1909. Portug. Guinea
P. c. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 434 (D ♂).

♀ **ebenauensis** Strand 1908. Madagascar
P. e. Strand 1908, Zool. Anz. 33 (1) p. 7 (D ♀).
P. e. Strand 1915, Arch. Naturg. 81 (A; 9) p. 80 (D ♀).

♂ **ephippiatus** (Thorell) 1899. Camerun, Span. Guinea
Carrhotus e. Thorell 1899, Bih. Svensk. Vet. Ak. Handl. 25 (4; 1) p. 100 (D ♂).
P. e. Simon 1903, Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 1 (3) p. 110 (D ♂).

♂ **fagei** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste
P. f. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 359 f. 61 A (D ♂).

♂ **fagei soudanensis** Berland & Millot 1941. Franz. Sudan
P. f. s. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 361 f. 62 (D ♂).

♂ **fagei verdieri** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea
P. f. v. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 361 f. 61 C (D ♂).

♂ **rubrocomatus** Simon 1909. Congo
P. r. Simon 1909, (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 434 (D ♂).

♂ **sessor** Simon 1902. – * Madagascar
P. s. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 405 (D ♂).
P. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 736 f. 871 (N ♂).

♂ **xanthopogon** Simon 1903. Span. Guinea
P. x. Simon 1903, Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 1 (3) p. 109 (D ♂).

Gen. **Phaulostylus** Simon 1902.

♂ **furcifer** Simon 1902. – * Madagascar

P. f. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 406 (D ♂).
P. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 738 f. 872 (N ♂) (in f. **furcatus**).

♂ **grammicus** Simon 1902. Madagascar

P. g. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 407 (D ♂).
P. g. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 726 f. 873, 874 (N ♂).

♂ **grandidieri** Simon 1902. Madagascar

P. g. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 407 (D ♂).

♀ **leucolophus** Simon 1902. Madagascar

P. l. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 408 (D ♀).

Gen. **Plexippus** C. L. Koch 1846.

Kosmopolitische Arten:

♂♀ **paykullii** (Audouin) 1827. – *

Attus p. Audouin 1827, Explic. Planch. Arachn. Savigny Descr. Egypt. (2) 22 p. 409 T. 7 F. 22 (D ♂).
Attus p. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 426 (D ♂).
Attus ligo Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 426 (D ♂).
P. ligo C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 107 TF. 1168, 1169 (D ♂).
Salticus vaillanttii Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 136 T. 5 F. 2 (D ♂).
Salticus culicivorus Doleschall 1859, Act. Soc. Ind. Neerl. 5 p. 14 T. 9 F. 5 (D ♀).
Attus africanus Vinson 1863, Aran. Iles Réun. Mauris. Madagasc. p. 52, 301 T. 10 F. 3 (D ♀).
Philia vaillanti Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 328 (C).
Parthenia africana Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 313 (C).
Euophrys delibuta L. Koch 1865, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 15 p. 874 (D ♂♀).
Salticus diversus Blackwall 1868, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 2 p. 403 (D ♂).
Attus p. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 601 (D ♂♀).
Attus p. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 193 (N ♂♀).
Salticus rodericensis Butler 1876, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 17 p. 440 (D ♀).
Hasarius p. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 81 (D ♂♀).
Menemerus culicivorus Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 568 (D ♀).
Salticus rodericensis Butler 1878, Trans. Phil. Soc. Lond. 168 p. 507 T. 52 F. 8 (D ♀).
Menemerus culicivorus Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 237 (D ♂♀).
Menemerus p. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 501 (D ♂♀).
Menemerus culicivorus Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1461 T. 123 F. 4 (D ♂).
P. p. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 296 (D).
P. culicivorus Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 373 (N ♂♀).
Menemerus p. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 84 T. 1 F. 63; T. 4 F. 63 (D ♂♀).
Menemerus p. Marx 1889, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 99 T. 2 F. 2 (N ♂♀).
Thotmes p. F. Cambridge 1897, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 240 T. 20 F. 21 (N ♂♀).
P. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 712, 735 f. 839—841 (N).
Thotmes p. Pocock 1904, Arachn. in: Faun. Geogr. Malediv. Laccad. Archip. 2 p. 804 T. 66 F. 7 (N).
P. p. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 362 T. 9 F. 142, 144; T. 13 F. 347, 354 (D ♂♀).

P. p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 442 (D ♂♀).
P. p. Hogg 1915, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 512 f. 5 f (N ♀).
P. p. Gravely 1922, ourn. Bombay Nat. Hist. Soc. 28 p. 1049 T. 4 F. 10, 11 (N ♂♀).
P. p. Petrunkevitch 1930, Trans. Connect Ac. Sci. 31 p. 156 f. 140—143 (D ♂♀).
P. p. Berland 1932, Les Arachnides, Encycl. Ent. 16 p. 397 f. 570, 573 (N).
P. p. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 225 T. 17 F. 165—170 (N ♂♀).
P. p. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1242, 1271 f. 2023, 2024 (D ♂♀).
P. p. Sherriffs 1939, Hong Kong Naturalist 9 (4) p. 197 f. 4; T. 24 F. 3 (D ♂♀).

Palaearktische Arten:

♀ **annulipedis** Saito 1939. Japan

P. a. Saito 1939, Saito Ho-on Kai Mus. Res. Bull. 18 p. 40 f. 5 (4); T. 1 F. 17 (D ♀).

♂ **coccineus** Simon 1902. Turkestan

P. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 403 (D ♂).

♂♀ **crassipes** Karsch 1881. Japan

P. c. Karsch 1881, Berlin. Ent. Zeitschr. 25 p. 38 (D ♂♀).
P. c. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 363 T. 9 F. 139; T. 13 F. 366 (D ♂♀).
P. c. Strand 1918, Arch. Naturg. 82 (A; 11) p. 108 (D ♂).

♀ **incognitus** Dönitz & Strand 1906. Japan

P. i. Dönitz & Strand 1906, in: Bösenberg & Strand, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 399 T. 8 F. 120 (D ♀).

♀ **niccensis** Strand 1906. Japan

P. n. Strand 1906, in: Bösenberg & Strand, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 365 (D ♀).

♀ **optabilis** Fox 1937. China

P. o. Fox 1937, Journ. Wash. Ac. Sci. 27 (1) p. 16 f. 7 (D ♀).

♀ **setipes** (Karsch) 1879. Japan

Phidippus s. Karsch 1879, Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf. 36 p. 89 (D ♀).
P. s. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 364 T. 9 F. 131; T. 13 F. 363 (D ♀).

♂♀ **strandi** Spassky 1939. Turkmenien

P. s. Spassky 1939, Fol. Zool. Hydrobiol. 9 (2) p. 299 f. 1, 2 (D ♂♀).

Aethiopische Arten:

♀ **auberti** Lessert 1925. O.-Afrika

P. a. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 503 f. 85, 86 (D ♀).

♂♀ **marginellus** (Simon) 1883. Cap Verde-I.

Salticus lepidus Blackwall 1863, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 16 p. 83 (D ♂) (praeocc. Guérin 1834).
Menemerus m. Simon 1883, Ann. Soc. Ent. France (6) 3 p. 303 T. 8 F. 21 (D ♂).
P. lepidus Berland 1936, Rev. Franc. Ent. 3 (1) p. 81 f. 26, 27 (N ♂♀).
P. lepidus Denis 1944, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 79 (1) p. 55 f. 2; T. 2 F. 30 (D ♀).

♂ **petersii** (Karsch) 1878. Mozambique

Euophrys p. Karsch 1878, Monatsber. Ak. Wiss. Berlin p. 332 T. 2 F. 7 (D ♂).
P. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 728 (N).

♀ **robustus** (Bösenberg & Lenz) 1895. O.-Afrika
Marpessa r. Bösenberg & Lenz 1895, Jahrb. Hambg. Wiss. Anst. 12 (2) p. 32 T. 1 F. 8 (D ♀).
P. r. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 728 (N).

♂ **rubrogularis** Simon 1902. Transvaal
P. r. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 403 (D ♂).

♂ **tortilis** Simon 1902. W.-Afrika
P. t. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 402 (D ♂).
P. t. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 716 f. 865 (N ♂).

Orientalische Arten:

♀ **insularis** Thorell 1881. I. Ternate
P. i. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 577 (D ♀).

♂ **kuekenthali** Pocock 1897. Molukken
P. k. Pocock 1897, Abh. Senckenbg. Ges. 23 (4) p. 623 T. 26 F. 26 (D ♂).

♂ **redimitus** Simon 1902. Indien, Ceylon
P. r. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 401 (D ♂).

Australische Arten:

♂ **aper** Thorell 1881. Neu-Guinea
P. a. Thorell 1881 Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 568 (D ♂).

♀ **argentosus** Thorell 1881. Neu-Guinea
P. a. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 594 (D ♀).

♂ **frendens** Thorell 1881. Neu-Guinea
P. f. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 575 (D ♂).

♀ **incavus** Karsch 1878. Neu-S.-Wales
P. i. Karsch 1873, Mitt. München, Ent. Ver. 2 p. 25 (D ♀).

♂ **ochropus** Thorell 1881. Neu-Guinea
P. o. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 611 (D ♂).

♀ **phyllus** Karsch 1878. Neu-S.-Wales
P. p. Karsch 1878, Mitt. München Ent. Ver. 2 p. 25 (D ♀).

♀ **pupulus** Thorell 1881. Queensland
P. p. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 622 (D ♀).

♂ **severus** Thorell 1881. Queensland
P. s. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 596 (D ♂).

♂ **stridulator** Pocock 1899. Neu-Pommern
P. s. Pocock 1899, in: Willey, Zool. Res.... N. Brit. Salomon. Isl. 1 p. 119 T. 11 T. 16 (D ♂).

♂♀ **validus** Urquhart 1893. Tasmanien
P. v. Urquhart 1893, Pap. Proc. Tasman. Soc. p. 127 (D ♂♀).

♂ **wallacei** Thorell 1881. Queensland
P. w. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 628 (D ♂).

Neotropische Arten:

♂ **albocinctus** Badcock 1932. Paraguay-Chaco
P. a. Badcock 1932, Journ. Linn. Soc. Zool. 38 p. 43 f. 35 (D ♂).

♂ **fannae** (Peckham) 1896. Columbien, Guatemala
Menemerus f. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 74 T. 6 F. 6 (D ♂).
Thotmes f. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 241 T. 20 F. 22 (N ♂).
P. f. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 695 (C).

♂♀ **luteostriatus** (Keyserling) 1877. Argentinien, Uruguay
Philaeus l. Keyserling 1877, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 27 p. 617 T. 14 F. 31, 32 (D ♂♀).
P. l. Simon 1897, Boll. Mus. Zool. Torino 12 (270) p. 1 (C).

♂ **luteus** Badcock 1932. Paraguay-Chaco
P. l. Badcock 1932, Journ. Linn. Soc. Zool. 38 p. 44 (D ♂).

♀ **musicus** Mello-Leitao 1945. Argentinien
P. m. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 294 f. 85 (D ♀).

♀ **quadriguttatus** Mello-Leitao 1946. Paraguay
P. q. Mello-Leitao 1946, Not. Mus. La Plata 11, Zool. 91 p. 29 f. 10 (D ♀).

♀ **seladonicus** C. L. Koch 1846. Mexico
P. s. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 115 TF. 1176 (D ♀).

♀ **selectus** C. L. Koch 1846. Brasilien
? Attus furtivus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 453 (D ♀).
P. s. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 100 TF. 1163 (D ♀).
Plexippa furtiva Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 325 (C).
P. s. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 695 (C).

♀ **taeniatus** C. L. Koch 1846. Mexico
P. t. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 121 TF. 1182 (D ♀).

Nearktische Arten:

♀ **albovittatus** C. L. Koch 1846. Pennsylvanien
P. a. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 118 TF. 1178 (D ♀).

Gen. **Pochyta** Simon 1901.

§ 5 ♂: Simon 1903, Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 1 (3) p. 116

♀ **albimana** Simon 1902. Madagascar
P. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 415 (D ♀).

♂ **fastibilis** Simon 1903. Span. Guinea
P. f. Simon 1903, Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 1 (3) p. 113 (D ♂).
P. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 722 f. 867 (N ♂).

♂♀ **insulana** Simon 1909. I. Principe
P. i. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 436 (D ♂♀).

♂ **major** Simon 1902. Portug. Guinea
P. m. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 414 (D ♂).
P. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 716 f. 863, 864 (N ♂).

♀ **moschensis** Caporiacco 1947. Ost-Afrika
P. m. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 249 T. 2 F. 76 (D ♀).

♂ **occidentalis** Simon 1902. Portug. Guinea
P. o. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 415 (D ♂).

♂ **pannosa** Simon 1903. Span. Guinea
P. p. Simon 1903, Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 1 (3) p. 115 (D ♂).

♀ **perezi** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea
P. (Pochytoides) p. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 362 f. 63 (D ♀).

♀ **poissoni** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea
P. (Pochytoides) p. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 363 f. 64 (D ♀).

♂ **pulchra** (Thorell) 1899. Camerun, Span. Guinea
Viciria p. Thorell 1899, Bih. Svensk. Vet. Ak. Handl. 25 (4; 1) p. 97 (D ♂).
P. p. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 725 (N).
P. p. Simon 1903, Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 1 (3) p. 114 (D ♂).

♀ **remyi** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea
P. r. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 364 f. 64 C (D ♀).

♂♀ **simoni** Lessert 1925. O.-Afrika
P. s. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 505 f. 87—91 (D ♂♀).

♂ **solers** Peckham 1903. Mashonaland
P. s. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 199 T. 22 F. 1 (D ♂).

♀ **spinosa** Simon 1901. – * Senegambien
P. s. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 69 (D ♀).
P. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 567 (N).
P. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 740 (N).

Gen. **Pseudamycus** Simon 1885.

Orientalische Arten:

§ 3 Arten: Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 737.

♂♀ **albomaculatus** (Hasselt) 1882. – * Malakka, Sumatra, Java, I. Siberut
Amycus a. Hasselt 1882, in: Veth, Midd. Sumatra; Aran. 4 (11 A) p. 52 T. 3 F. 10 (D ♂).
P. a. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. Belg. 29 C. R. p. 36 (N).
P. a. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 337 (D).
P. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 736 (N).
P. a. Reimoser 1925, Suppl. Ent. 10 p. 91 (D ♂).
P. a. Reimoser 1929, Bull. Raffles Mus. 2 p. 132 (N ♀).

♀ **amabilis** Peckham 1907. Borneo
P. a. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 633 (D ♀).

♂ **canescens** Simon 1899. Sumatra
P. c. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 116 (D ♂).
P. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 737 (N).

♂ **flavopubescens** Simon 1899. Sumatra
P. f. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 116 (D ♂).
P. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 737 (N).

♀ **sylvestris** Peckham 1907. Borneo
P. s. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 632 (D ♀).

♂ **validus** (Thorell) 1877. Celebes
Plexippus v. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 610 (D ♂).
Hasarius v. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 417 (N).

Australische Arten:

♀ **evarchanus** Strand 1914. Neu-Pommern
P. e. Strand 1914, Abh. Senckenbg. Ges. 36 (2) p. 265 T. 14 F. 30; T. 19 F. 105 (D ♀).

Gen. **Pseudoplexippus** Caporiacco 1947.

♀ **unicus** Caporiacco 1947. Kilimandjaro
P. u. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 248 T. 2 F. 75 (D ♀).

Gen. **Sigytes** Simon 1902.

Orientalische Arten:

♂ **paradisiaca** Simon 1902. – * Ceylon
S. p. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 401 (D ♂).
S. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 734 (N ♂).

Australische Arten:

♀ **albocincta** (Keyserling) 1881. Queensland
Hasarius a. Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1277 T. 109 F. 4 (D ♀).
S. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 734 (N).

♂ **dialeuca** (L. Koch) 1881. Queensland, Neu-S.-Wales
Ergane d. L. Koch 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1263 T. 108 F. 4 (D ♂).
Hasarius lineatus Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1275 T. 109 F. 3 (D ♂).
Ergane d. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1477 (N).
S. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 734 (N).

♀ **diloris** (Keyserling) 1881. Queensland, Fidji-I., Salomonen
Hasarius d. Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1302 T. 111 F. 3 (D ♀).
S. d. Rainbow 1913, Rec. Austral. Mus. 10 (1) p. 16 (N).

♂♀ **scutulata** (L. Koch) 1881. Queensland
Ergane s. L. Koch 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1268 T. 108 F. 6, 7 (D ♂♀).
S. scutata Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 734 (N).

Gen. **Taivala** Peckham 1907.

♀ **invisitata** Peckham 1907. Borneo
T. i. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 643 (D ♀).

Gen. **Thiratoscirtus** Simon 1886.
(= **Theratoscirtus** Simon 1903)

Aethiopische Arten:

♂♀ **capito** Simon 1903. W.-Afrika, Fernando Poo
T. c. Simon 1903, Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 1 (3) p. 111 (D ♂).
T. c. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 435 (D ♀).

♂♀ **cinctus** (Thorell) 1899. Camerun
Jotus c. Thorell 1899, Bih. Svensk. Vet. Ak. Handl. 25 (4; 1) p. 101 (D ♂♀).
J. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 729 (N).

♂ **fuscorufescens** Strand 1906. Camerun
T. f. Strand 1906, Jahresh. Ver. Nat. Württbg. 62 p. 100 f. 3 (D ♂).

♂ **torquatus** Simon 1903. W.-Afrika
T. t. Simon 1903, Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 1 (3) p. 112 (D ♂).

♂ **versicolor** Simon 1902. Sierra Leone
T. v. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 416 (D ♂).

Neotropische Arten:

♂ **niveimanus** Simon 1886. Ober-Amazonas
T. n. Simon 1886, Bull. Soc. Zool. France 11 p. 561 (D ♂).

♂ **patagonicus** Simon 1886. – * Patagonien
T. p. Simon 1886, Bull. Soc. Zool. France 11 p. 560 f. 1 (D ♂).
T. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 739 f. 855—857 (N ♂).

♂ **riojanus** Mello-Leitao 1941. Argentinien
T. r. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 2 p. 189 T. 12 F. 55; f. 82—83 (D ♂).

2. Gr. Saiteae

Gen. **Ilarginus** Mello-Leitao 1939.

♂ **spinosus** Mello-Leitao 1939. Paraguay
J. s. Mello-Leitao 1939, Rev. Suisse Zool. 46 (2) p. 87 f. 77, 78 (D ♂).

Gen. **Ilargus** Simon 1901.

♀ **albomaculatus** Mello-Leitao 1939. Paraguay
I. a. Mello-Leitao 1939, Rev. Suisse Zool. 46 (2) p. 86 f. 76 (D ♀).

♂ **coccineus** Simon 1901. – * S.-Brasilien
I. c. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 66 (D ♂).
I. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 566 (N).

♀ **modestus** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
I. m. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1--6) p. 33 (D ♀).
I. m. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 720 TF 152—153 (D ♀).

♀ **nitidisquamulatus** Soares & Camargo 1948. Mato Grosso
I. n. Soares & Camargo 1948, Bol. Mus. Paraens. Goeldi 10 p. 390 f. 54 (D ♀).

♂ **penicillatus** Mello-Leitao 1946. Paraguay
I. p. Mello-Leitao 1946, Not. Mus. La Plata 11, Zool. 91 p. 24 f. 6 (D ♂).

Gen. **Jotus** L. Koch 1881.

Palaearktische Arten:

♀ **abnormis** Bösenberg & Strand 1906. Japan
J. a. Bösenberg & Strand 1906 Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 336 T. 14 F. 377 (D ♀).
J. a. Saito 1939, Saito Ho-on Kai Mus. Res. Bull. 18 p. 43 f. 5 (7) (N ♀).

♀ **difficilis** Bösenberg & Strand 1906. Japan
J. d. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 336 T. 14 F. 379 (D ♀).
J. d. Saito 1939, Saito Ho-on Kai Mus. Res. Bull. 18 p. 44 f. 5 (8) (N ♀).

♂♀ **lineus** (Karsch) 1879. Japan
Evophrys l. Karsch 1879, Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf. 36 p. 90 (D ♂♀).
J. l. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 337 T. 19 F. 375 (D ♂♀).

♂♀ **munitus** Bösenberg & Strand 1906. Japan
J. m. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 334 T. 14 F. 374, 392 (D ♂♀).

♀ **munitus chinesicus** Strand 1907. China
J. m. c. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (17—18) p. 569 (D ♀).
J. m. c. Strand 1909, Abh. Nat. Ges. Görlitz 26 p. 107 (D ♀).

Australische Arten:

♂ **arci-pluvii** Peckham 1901. St. Cruz-I.
J. a. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 333 T. 25 F. 16; T. 26 F. 5 (D ♂).

♂ **auripes** L. Koch 1881. – * Neu-S.-Wales
J. a. L. Koch 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1243 T. 107 F. 1 (D ♂).
J. a. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 316 (D).
J. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 566 f. 683 (N ♂).

♂♀ **braccatus** L. Koch 1881. Queensland
J. b. L. Koch 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1254 T. 107 F. 6, 7 (D ♂♀).

♀ **debilis** L. Koch 1881. Neu-S.-Wales
J. d. L. Koch 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1252 T. 107 F. 5 (D ♀).

♂ **frostii** Peckham 1901. Victoria
J. f. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 332 T. 25 F. 12; T. 26 F. 9 (D ♂).

♂♀ **igneus** Hogg 1915. Neu-Guinea
J. i. Hogg 1915, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 510 f. 5 (D ♂♀).

♀ **insulanus** Rainbow 1920. Lord Howe-I.
J. i. Rainbow 1920, Rec. S. Austral. Mus. 1 p. 265 T. 31 F. 107—109 (D ♀).

♂ **maculiventer** Strand 1911. Kei-I.
J. m. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 181 T. 4 F. 27; T. 6 F. 95 (D ♂).

♂ **minutus** L. Koch 1881. Queensland
J. m. L. Koch 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1257 T. 108 F. 1 (D ♂).

♂ **ravus** (Urquhart) 1892. Neu-Seeland
Attus r. Urquhart 1892, Trans. N. Zeal. Inst. 25 p. 185 (D ♂).
J. r. Bryant 1935, Rec. Canterbury Mus. 4 (2) p. 67 T. 8 F. 1 (D ♂).

Gen. **Lauharulla** Keyserling 1883.

♂ **insulana** Simon 1901. Tahiti
L. i. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 68 (D ♂).
L. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 559 f. 682 (N ♂).

♀ **pretiosa** Keyserling 1883. – * Neu-S.-Wales
L. p. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1432 T. 121 F. 3 (D ♀).
Lanuarulla p. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 332 (D).
L. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 567 (N).

Gen. **Oningis** Simon 1901.

Orientalische Arten:

♀ **lahorensis** Dyal 1935. Panjab
O. l. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 227 (D ♀).

Neotropische Arten:

♂♀ **armatus** Bryant 1943. San Domingo
O. a. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 495 T. 7 F. 70, 73 (D ♂♀).

♂♀ **crassus** Bryant 1943. San Domingo
O. c. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 497 T. 6 F. 58, 60, 67 (D ♂♀).

♂♀ **minutus** Petrunkevitch 1930. Portorico
O. m. Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 31 p. 173 f. 156—160 (D ♂♀).

♂♀ **pompatus** (Peckham) 1893. St. Vincent
Neon p. Peckham 1893, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 703 T. 62 F. 11 (D ♂♀).
Neon p. Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 175 T. 16 F. 9 (N ♀).
O. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 567 f. 681 (N).

Gen. **Parajotus** Peckham 1903.

♂ **obscurofemoratus** Peckham 1903. Natal
P. o. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 201 T. 22 F. 2 (D ♂).

Gen. **Poultonia** Peckham 1900.

♂♀ **caudata** Peckham 1900. – * Brasilien
P. c. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 225 T. 2 F. 1 (D ♂).
Maeota dichura Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 567 f. 680 (N ♂).
Maeota dichura Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 1052 (N).

♂ **fusca** (Mello-Leitao) 1917. Brasilien
Maeota f. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 144 TF. 6 (D ♂).

Gen. **Saitis** Simon 1876.

Palaearktische Arten:

♂♀ **barbipes** (Simon) 1868. – * S.-Europa
Attus b. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 563 T. 6 F. 9 (D ♂♀).
Attus scriptus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 599 T. 6 F. 5 (D ♀).
Euophrys b. Canestrini & Pavesi 1868, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 11 p. 821 (C).
Salticus blandus Blackwall 1869, Journ. Linn. Soc. Lond. 10 p. 412 T. 15 F. 4 (D ♀).
Attus b. Simon 1870, Bull. Soc. Ent. Ital. 2 p. 66 (D ♂♀).
Attus scriptus Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 215 (D ♂).
S. b. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 169 T. 9 F. 6 (D ♂♀).
S. b. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 321 (D).
S. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 566 f. 675, 676 (N ♂).
Attus b. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 431 T. 41 F. 634 (D ♂♀).
S. b. Kulczynski 1904, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 544 T. 14 F. 15, 16 (N ♂♀).
S. b. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 556 (D ♀).
S. b. Berland 1927, Arch. Zool. Expér. Gén. 66, Not. & Rev. 2 p. 16 f. 8—10 (N ♂♀).
S. b. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1171, 1250 f. 1837, 1838 (D ♂♀).
S. b. Kolosvary 1938, Zool. Anz. 121 (11—12) p. 304 f. 1 (N ♂♀).
S. b. Kolosvary 1938, Festschr. Strand 4 p. 583 f. 2 a, b (N ♂♀).

♂♀ **graecus** Kulczynski 1904. Griechenland
S. g. Kulczynski 1904, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 544 T. 14 F. 12, 17 (D ♂♀).

♀ **latifrons** Caporiacco 1928. Libyen
S. l. Caporiacco 1928, Ann. Mus. Civ. Genova 53 p. 102 (D ♀).

♂ **lusitanicus** Simon 1901. Portugal
S. l. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 67 (D ♂).

♂ **nigritibiis** Caporiacco 1941. Süd-Abessinien
S. n. Caporiacco 1941, Miss. Biol. Sagan-Omo 12, Zool. 6 p. 145 f. 63 (D ♂).

♂♀ **santaeufemiae** Kolosvary 1938. Calabrien
S. s. Kolosvary 1938, Zool. Anz. 121 (11—12) p. 303 f. 2, 4, 5 (D ♂♀).
S. s. Kolosvary 1938, Festschr. Strand 4 p. 583 f. 3 (D ♂♀).

♂ **tauricus** Kulczynski 1904. Krim, Bulgarien
S. t. Kulczynski 1904, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 546 T. 14 F. 18 (D ♂).

Aethiopische Arten:

♀ **breviusculus** Simon 1901. Gabun
S. b. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 67 (D ♀).

♀ **leighii** Peckham 1903. Natal
S. l. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 197 T. 21 F. 4 (D ♀).

O **magnus** Caporiacco 1947. Aethiopien
S. m. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 247 (D O).

♂o **mundus** Peckham 1903. Mashonaland, Ost-Afrika
S. m. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 198 T. 21 F. 3 (D ♂).
S. m. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 247 (N o).

Orientalische Arten:

o **chaperi** Simon 1885. Indien, Ceylon
S. c. Simon 1885, Bull. Soc. Zool. France 10 (4—6) p. 6 (D o).

♀ **relucens** (Thorell) 1877. Celebes
Ciris r. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 623 (D ♀).
S. r. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 563 (N).

♀ **splendidus** (Walckenaer) 1837. Timor
Attus s. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 458 (D ♀).
Attus spendens Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 563 (N).

♀ **testaceus** Thorell 1877. Celebes
S. t. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 565 (D ♀).

Australische Arten:

§ ♂: Dunn 1947, Mem. Nat. Mus. Victoria, Melbourne 15 p. 83.

♂ **aranukanus** Roewer 1944. Gilbert-Ins.
S. a. Roewer 1944, Göteborgs Vet. Vitt. Samh. Handl. (B) 2 (11) p. 6 f. 2 (D ♂).

♂♀ **auberti** Berland 1938. Neue Hebriden
S. a. Berland 1938, Ann. Soc. Ent. France 107 p. 147 f. 47—51 (D ♂♀).

♂♀ **berlandi** Roewer 1951. Neue Hebriden
S. nigriceps Berland 1938, Ann. Soc. Ent. France 107 p. 149 f. 52 55 (D ♂) (praeocc. Keyserling 1882 sub **Thorellia**).
S. b. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 451 (nom. nov.).

♀ **bitaeniata** (Keyserling) 1882. Queensland
Thorellia b. Keyserling 1882, Aradın. Austral. 1 (2) p. 1363 T. 115 F. 7 (D ♀).
S. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 563 (N).

♂♀ **cupidon** (Simon) 1885. Neu-Caledonien
Habrocestum c. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. Belg. 29 C. R. p. 89 (D ♂♀).
S. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 563 (N).

♀ **heteropogon** Simon 1909. W.-Australien
S. h. Simon 1909, Faun. S. W. Austral. 2 (12) p. 198 (D ♀).

♀ **insectus** (Hogg) 1896. Centr. Australien
Prostheclina i. Hogg 1896, Aran. in: Rep. Horn Exped. 2 (Zool.) p. 334 T. 24 F. 18 (D ♀).

♂♀ **insulanus** Rainbow 1920. Lord Howe-I.
S. i. Rainbow 1920, Rec. S. Austral. Mus. 1 p. 264 T. 31 F. 103—106 (D ♂♀).

♂ **lacustris** Hickman 1944. Centr. Australien
S. l. Hickman 1944, Trans. R. Soc. S. Austral. 68 (1) p. 46 T. 3 F. 40 (D ♂).

o **magniceps** (Keyserling) 1882. Queensland
Therosa m. Keyserling 1882, Aradın. Austral. 1 (2) p. 1414 T. 199 F. 7 (D o).
Therosa m. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 328 (D).

♀ **michaelseni** Simon 1909. W.-Australien
S. m. Simon 1909, Faun. S. W. Austral. 2 (12) p. 197 (D ♀).

♀ **michaelseni obscurus** Simon 1909. W.-Australien
S. m. o. Simon 1909, Faun. S. W. Austral. 2 (12) p. 198 (D ♀).

♂♀ **nigriceps** (Keyserling) 1882. Queensland, Neu-S.-Wales
? Lycidas anomalis Karsch 1878, Mitt. München Ent. Ver. 2 p. 26 (D ♂).
Thorellia n. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1359 T. 115 F. 5, 6 (D ♂♀).
S. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 564 (N).
S. n. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 869 (N).

♂♀ **pallidus** (Keyserling) 1882. Queensland, Neu-S.-Wales, Victoria
Prostheclina p. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1368 T. 116 F. 1, 2 (D ♂♀).
Prostheclina p. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 329 (D).

♂ **pavonis** Dunn 1947. Victoria
S. p. Dunn 1947, Mem. Nat. Mus. Victoria, Melbourne 15 p. 83 f. . . (D ♂).

♂ **rainbowi** Roewer 1951. Neu-S.-Wales
Attus splendens Rainbow 1896, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 21 (4) p. 632 T. 49 F. 3 (D ♂) (praeocc. Peckham 1883).
S. splendens Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 563 (N).
S. r. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 451 (nom. nov.).

♀ **signatus** (Keyserling) 1883. Patria ?
Prostheclina s. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1464 T. 123 F. 6 (D ♀).

♂♀ **speciosus** (Cambridge) 1874. Neu-.S.-Wales
Salticus s. Cambridge 1874, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 14 p. 180 T. 17 F. 5 (D ♂).
Habrocestum s. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1468 T. 123 F. 8 (D ♀).
S. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 564 (N).

♀ **taeniatus** Keyserling 1883. Australien
S. t. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1434 T. 121 F. 4 (D ♀).

♂ **vespertilio** Simon 1901. Australien
S. v. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 68 (D ♂).

♂ **volans** (Cambridge) 1874. Queensland, Neu-S.-Wales
Salticus v. Cambridge 1874, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 14 p. 178 T. 17 F. 4 (D ♂).
Maratus amabilis Karsch 1878, Mitt. München. Ent. Ver. 2 p. 27 (D ♂).
Maratus amabilis Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 304 (D).
S. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 559, 563 f. 677—679 (N).
S. v. Butler 1933, Victorian Natural. 49 p. 291 T. 17 F. 6 (N).

Neotropische Arten:

♂ **annae** Cockerell 1894. Jamaica
S. a. Cockerell 1894, Canad. Ent. 36 p. 343 (D).

♂ **catulus** Simon 1901. Venezuela
S. c. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 66 (D ♂).
S. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 559 (N).

♂ **cyanipes** Simon 1901. Brasilien
S. c. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 67 (D ♂).

♀ **defloccatus** Peckham 1901. Jamaica
S. d. Peckham 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 11 T. 3 F. 5 (D ♀).

♂♀ **illustris** (C. L. Koch) 1846. Portorico
Eris i. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 192 TF. 1139 (D ♀).
Prostheclina i. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 696 (C).

♂ **inutilis** Peckham 1901. Jamaica
S. i. Peckham 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 10 T. 3 F. 4 (D ♂).

♂♀ **labyrintheus** Mello-Leitao 1947. Brasilien
S. l. Mello-Leitao 1947, Arqu. Mus. Paranaense 6 (6) p. 301 T. 42 F. 49, 51 (D ♂♀).

♀ **marcusi** Soares & Camargo 1948. Mato Grosso
S. m. Soares & Camargo 1948, Bol. Mus. Paraens. Goeldi 10 p. 391 f. 57 (D ♀).

♂ **morgani** (Peckham) 1901. Jamaica, Haiti
Prostheclina m. Peckham 1901, Proc. Zool. Soc. London p. 13 T. 4 F. 9 (D ♂).

♂ **nanus** Soares & Camargo 1948. Mato Grosso
S. n. Soares & Camargo 1948, Bol. Mus. Paranaens. Goeldi 10 p. 392 f. 58—59 (D ♂).

♂ **nigrimanus** Mello-Leitao 1945. Argentinien
S. n. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 295 f. 87 (D ♂).

♂ **perplexides** (Strand) 1908. Jamaica
Prostheclina p. Strand 1908, Zool. Anz. 33 (1) p. 7 (D ♂).
Prostheclina p. Strand 1915, Arch. Naturg. 81 (A; 9) p. 143 (D ♂).

♂♀ **perplexus** (Peckham) 1901. Jamaica, Haiti
Prostheclina p. Peckham 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 12 T. 3 F. 8 (D ♂♀)

♂ **tristis** Mello-Leitao 1947. Brasilien
S. t. Mello-Leitao 1947, Arqu. Mus. Paranaense 6 (6) p. 302 T. 42 F. 52 (D ♂)

♂ **uncifer** Tullgren 1905. Süd-Argentinien
S. u. Tullgren 1905, Ark. Zool. 2 (19) p. 71 T. 9 F. 36 (D ♂).

♀ **variegatus** Mello-Leitao 1941. Argentinien
S. v. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 185 T. 11 F. 52 (D ♀).

♂♀ **venatorius** (Peckham) 1901. Jamaica
Prostheclina v. Peckham 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 13 T. 4 F. 10 (D ♂♀).

♂ **viarius** (Peckham) 1901. Jamaica
Prostheclina v. Peckham 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 14 T. 4 F. 11 (D ♂).

Gen. **Saitissus** Roewer 1938.

♂o **squamosus** Roewer 1938. Neu-Guinea
S. s. Roewer 1938, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (**hors** Sér.) 3 (19) p. 84 **f.** 62 (D ♂♀).

Gen. **Salpesia** Simon 1901.

Aethiopische Arten:

♀ **soricina** Simon 1901. – * Seychellen

S. s. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 70 (D ♀).
S. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 566 (N).

Australische Arten:

♀ **bicolor** (Keyserling) 1883. Queensland

Cyrba b. Keyserling 1883, Aradn. Austral. 1 (2) p. 1441 T. 122 F. 1 (D ♀).
S. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 564 (N).

♀ **bimaculata** (Keyserling) 1883. Neu-S.-Wales

Cyrba b. Keyserling 1883, Aradn. Austral. 1 (2) p. 1439 T. 121 F. 7 (D ♀).
S. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 564 (N).

♂♀ **squalida** (Keyserling) 1883. Neu-S.-Wales

Cyrba s. Keyserling 1883, Aradn. Austral. 1 (2) p. 1436 T. 121 F. 5, 6 (D ♂♀).
S. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 564 (N).

♀ **villosa** (Keyserling) 1883. Australien

Cyrba v. Keyserling 1883, Aradn. Austral. 1 (2) p. 1444 T. 122 F. 3 (D ♀)
S. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 564 (N).

Gen. **Taeoma** Mello-Leitao 1939.

♂ **barbipes** Mello-Leitao 1939. Paraguay

T. b. Mello-Leitao 1939, Rev. Suisse Zool. 46 (2) p. 90 f. 82, 83 (D ♂).

♂ **circumflexa** Mello-Leitao 1939. – * Venezuela

T. c. Mello-Leitao 1939, Rev. Suisse Zool. 46 (2) p. 90 f. 81 (D ♂).

3. Gr. Zenodoreae

Gen. **Corythalia** C. L. Koch 1850.

§ 20 ♂, 22 ♀: F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 197—207 (sub **Sidusa** part.),
§ 7 ♂: Banks 1929, Bull. Mus. Zool. Harvard 69 (3) p. 70.
§ 18 Arten: Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 126—131.

♀ **alacris** (Peckham) 1896. Guatemala

Escambia a. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 46 T. 3 F. 5 (D ♀).
Sidusa a. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 216 T. 17 F. 8 (D ♀).
C. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).

♂♀ **albicincta** (F. Cambridge) 1901. Centr. Amerika

Sidusa a. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 215 T. 17 F. 2 (D ♂♀).
C. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).
C. a. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 132 (N).

♂ **albovittata** Mello-Leitao 1948. Brit. Guiana

C. a. Mello-Leitao 1948, An. Ac. Bras. Ci. 20 p. 188 f. 28 (D ♂).

♂♀ **arcuata** Franganillo 1930. Cuba

C. a. Franganillo 1930, Mem. Inst. Nac. Invest. Ci. Habana 1 p. 16 (sep.) (D).
C. a. Franganillo 1936, Los Aracnidos de Cuba hasta 1936 p. 137 f. 76 (D).
C. a. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 482 TF. (D ♂♀).

♀ **argyrochrysos** (Mello-Leitao) 1946. Paraguay

Dinamius a. Mello-Leitao 1946, Not. Mus. La Plata 11, Zool. 91 p. 23 f. 5 (D ♀).

♂♀ **aurata** (Hentz) 1846. S. Carolina, Georgia, Florida, Cuba

? **Attus canosus** Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 451 (D ♀).
? **Attus magus** Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 453 (D ♂♀).
Attus a. Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 362 T. 22 F. 6 (D ♀).
Prostheclina cambridgei Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 69 T. 1 F. 51; T. 5 F. 51 (D ♂♀).
Prostheclina a. Banks 1893, Journ. N. York Ent. Soc. 1 p. 126 (N).
Pellenes a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 659 f. 787 (N).
Stoidis a. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1, 5) p. 527 T. 38 F. 9; T. 43 F. 9 (D ♂♀).
C. a. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 484 (N).
Stoidis canosa Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (1), Biol. 8 (5) p. 214 (N ♀).

♂♀ **banksi** Roewer 1951. Haiti, Portorico

Prostheclina signata Banks 1901, Proc. U. St. Nat. Mus. 24 p. 225 T. 15 F. 1, 4, 6 (D ♂♀) (praeocc. Keyserling 1883).
C. signata Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 31 p. 160 f. 144—148 (D ♂♀).
C. b. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 451 (nom. nov.).

♂♀ **bicincta** Petrunkevitch 1925. Panama

C. b. Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 214 f. 132—133 (D ♂♀).
C. sitticus Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah 27 (5), Biol. 3 (5) p. 21 T. 6 F. 46 (D ♀).
Sidusa tulineba Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah 27 (5), Biol. 3 (5) p. 22 T. 5 F. 35; T. 6 F. 39—40 (D ♂).
C. b. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 132 (N).

♂ **binotata** (F. Cambridge) 1901. Mexico

Sidusa b. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 219 T. 18 F. 3 (D ♂).
C. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).

♂♀ **blanda** (Peckham) 1901. Trinidad

Dynamius b. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 338 T. 25 F. 9; T. 26 F. 1 (D ♂♀).
C. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 654 (N).

♂♀ **brevispina** (F. Cambridge) 1901. Guatemala

Sidusa b. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 217 T. 17 F. 11, 12 (D ♂♀).
C. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).

♂ **bryantae** Chickering 1946. Panama

C. b. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 132 f. 119—120 (D ♂).

♂♀ **canalis** (Chamberlin) 1925. Panama

Saitis c. Chamberlin 1925, Bull. Mus. Zool. Hawaii 67 p. 233 (D ♂).
C. c. Banks 1929, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 69 (3) p. 69 T. 2 F. 18 (D ♂).
C. c. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 136 f. 121—124 (D ♂♀).

♂♀ **chalcea** Crane 1948. Venezuela

C. c. Crane 1948, Zoologica, N. York 33 p. 14 f. . . (D ♂♀).

♀ **circumcincta** (F. Cambridge) 1901. Mexico

Sidusa c. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 216 T. 17 F. 9 (D ♀).
C. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 740 (N).

♀ **clara** Chamberlin & Ivie 1936. Panama

C. c. Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah; Biol. 27 (5) p. 20 T. 5 F. 34; T. 6 F. 41 (D ♀).
C. c. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 140 f. 125—126 (N ♀).

♂♀ **conformans** Chamberlin & Ivie 1936. Panama

C. c. Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah; Biol. 27 (5) p. 19 T. 5 F. 33; T. 6 F. 36—38 (D ♂♀).

♂♀ **conspecta** (Peckham) 1896. Costa Rica, Guatemala, Mexico, Arizona

Escambia c. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 p. 42 T. 3 F. 3 (D ♂♀).
Sidusa c. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 216 T. 17 F. 6, 7 (N ♂♀).
C. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).
Escambia c. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 446 T. 35 F. 10 (D ♂♀).

♂ **cristata** (F. Cambridge) 1901. Mexico

Sidusa c. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 213 T. 16 F. 10 (D ♂).
C. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).

♂♀ **cubana** Roewer 1951. Cuba

Prostheclina parvula Banks 1909, 2. Rep. Centr. Exper. Stat. Cuba p. 168 T. 45 F. 1 (D ♀) (praeocc. Peckham 1896 sub **Escambia**).
C. parvula Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 486 T. 21 F. 280, 282 (D ♂♀).
C. c. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 451 (nom. nov.).

♂♀ **delicatula** Gertsch & Mulaik 1936. Texas

C. d. Gertsch & Mulaik 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 14 TF. 32 (D ♀).
C. d. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 195 TF. 211, 212 (N ♂♀).

♀ **diffusa** Chamberlin & Ivie 1936. Panama

C. d. Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah; Biol. 27 (5) p. 20 T. 6 F. 45 (D ♀).

dimidiata Simon 1901. Columbien

C. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 654 (N).

♂♀ **electa** (Peckham) 1901. Columbien
Escambia e. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 336 T. 26 F. 11 (D ♂♀).
C. e. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 616 (C).

♀ **elegantissima** (Simon) 1888. San Domingo, Haiti
Dynamius e. Simon 1888, Ann. Soc. Ent. France (6) 8 p. 205 (D ♀).
C. e. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 655 (N).
C. e. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 471 T. 3 F. 27, 30; T. 4 F. 44 (D ♂♀).

♂♀ **emertoni** Bryant 1940. Cuba
C. e. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 485 T. 20 F. 270, T. 21 F. 274—279 (D ♂♀).

♂ **excavata** (F. Cambridge) 1901. Mexico
Sidusa e. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 219 T. 18 F. 4 (D ♂).
C. e. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).

♂ **fimbriata** (Peckham) 1901. Brasilien
Dynamius f. Packham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 340 T. 25 F. 10; T. 26 F. 12 (D ♂).
C. f. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 616 (C).

♂♀ **flavida** (F. Cambridge) 1901. Guatemala
Sidusa f. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 219 T. 18 F. 1, 2 (D ♂♀).
C. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).

♂♀ **fulgipeda** Crane 1948. Venezuela
C. f. Crane 1948, Zoologica, N. York 33 p. 22 f. 28 (D ♂♀).

♂♀ **gloriae** Petrunkevitch 1930. Portorico
C. g. Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 31 p. 167 f. 149—155 (D ♂♀).

♂ **grata** (Peckham) 1901. Brasilien
Dynamius g. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 342 T. 25 F. 8; T. 26 F. 10 (D ♂).
C. g. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 654 (N).

♂ **hadzii** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
C. h. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 33 (D ♂).
C. h. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 721 TF. 154—155 (D ♂).

♂ **heliophanina** (Taczanowski) 1871. Guiana
Attus h. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 109 (D ♂).
C. heliophanoides Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 655 (N).

♂♀ **iridescens** Petrunkevitch 1926. I. St. Thomas, Virgin-I.
C. i. Petrunkevitch 1926, Trans. Connect. Ac. Sci. 28 p. 69 f. 23, 24 (D ♂♀).
C. i. Bryant 1947, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 89 (7) p. 354 (N).

♂ **latipes** (C. L. Koch) 1846. – * Brasilien
Euophrys l. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 224 TF. 1269 (D ♂).
C. l. C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 67 (N).
C. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 658 (N).

♀ **locuples** (Simon) 1888. Haiti

Habrocestum l. Simon 1888, Ann. Soc. Ent. France (6) 8 p. 203 (D ♀).
C. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 655 (N).
Pellenes l. Banks 1903, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 55 p. 341 (C).
C. l. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 474 T. 4 F. 37—38; T. 4 F. 43 (D ♂♀).

major Simon 1901. Westindien

C. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 655 (N).

♂ **metallica** (Peckham) 1895. St. Vincent

Dynamius m. Peckham 1895, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 694 T. 61 F. 2 (D ♂).
C. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 654 (N).

♀ **modesta** Chickering 1946. Panama

C. m. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 141 f. 127—129 (D ♀).

♀ **murcida** (F. Cambridge) 1901. Guatemala, Panama

Sidusa m. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 214 T. 16 F. 14 (D ♀).
C. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).

♂♀ **nigriventer** (F. Cambridge) 1901. Panama

Sidusa n. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 214 T. 16 F. 12, 13 (D ♂♀).
C. n. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).
C. n. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 143 (N).

♂♀ **obsoleta** Banks 1929. Panama

C. o. Banks 1929, Bull. Mus. Zool. Harvard 69 (3) p. 69 T. 1 F. 10; T. 4 F. 69 (D ♂).
C. endigma Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah 27 (5), Biol. 3 (5) p. 5 T. 6 F. 42 (C ♀).
C. o. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 145 f. 130—132 (N ♀).

♂♀ **opima** (Peckham) 1885. Costa Rica, Guatemala, Mexico, Arizona, Panama

Jotus o. Peckham 1885, Proc. Nat. Hist. Soc. Wiscons. p. 71 T. 2 F. 7 (D ♂♀).
Dynamius o. Simon 1888, Ann. Soc. Ent. France (6) 8. p. 205 (N).
Dynamius o. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 12 (D ♀).
Dynamius o. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 283 T. 17 F. 25 (N ♀).
Sidusa fulvoguttata F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 214 T. 17 F. 1 (D ♀).
Sidusa o. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 219 T. 18 F. 5, 6 (N ♂♀).
Dynamius o. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 337 T. 25 F. 6 (N).
C. o. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 652 (N).
Sidusa o. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 222 (N).
C. o. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 144 (D ♂♀).
C. o. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 145 (N ♀).

♂o **panamana** Petrunkevitch 1925. Panama

C. p. Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 210 f. 129, 130 (D ♂).
C. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 145 f. 133 (D ♀).

♂♀ **parva** (Peckham) 1901. Brasilien
Dynamius p. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 340 T. 25 F. 14; T. 26 F. 8 (D ♂♀).
C. p. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 617 (C).

♂♀ **parvula** (Peckham) 1896. Costa Rica, Guatemala, Panama, Mexico
Escambia p. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 p. 44 T. 3 F. 4 (D ♂♀).
Sidusa p. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 215 T. 17 F. 4, 5 (D ♂♀).
Sidusa lutea F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 217 T. 17 F. 3 (D ♂).
C. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).
C. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 146 f. 134—136 (D ♂♀).

♂♀ **peckhami** Petrunkevitch 1914. Dominica
C. p. Petrunkevitch 1914, Journ. N. York Ent. Soc. 22 p. 330 T. 12 F. 15—20 (D ♂♀).

♂♀ **penicillata** (F. Cambridge) 1901. Guatemala, Mexico
Sidusa p. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 212 T. 16 F. 5, 6 (D ♂♀).
Tylogonus p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).
C. p. Caporiacco 1938, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 77 p. 261 f. 2 (D ♀).

♂♀ **placata** (Peckham) 1901. Trinidad
Dynamius p. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 339 T. 25 F. 11; T. 26 F. 6 (D ♂♀).
C. p. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 618 (C).

♂♀ **pulchra** Petrunkevitch 1925. Panama
C. p. Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 218 f. 134, 135 (D ♀).
C. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 150 f. 137—138 (D ♂♀).

♀ **quadriguttata** (F. Cambridge) 1901. Panama, Guatemala, Mexico
Sidusa q. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 216 T. 17 F. 10 (D ♀).
C. q. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).
C. q. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 153 (N).

♂ **sellata** Simon 1901. Westindien
C. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 776, 777 (N ♂).

♂♀ **serrapophysis** (Chamberlin & Ivie) 1936. Panama
Freya s. Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah 27 (5), Biol. 3 (5) p. 22 T. 7 F. 49—50 (D ♂).
C. s. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 153 f. 139—142 (D ♂♀).

♂ **spiralis** (F. Cambridge) 1901. Centr. Amerika, Mexico
Sidusa s. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 217 T. 17 F. 14 (D ♂).
C. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).

C. s. Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 212 f. 131 (D ♂).
C. s. Banks 1924, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 69 (3) p. 69 (C).
C. murcida Banks 1929, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 69 (3) p. 69 (C).
C. s. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 158 f. 143—144 (D ♂♀).

♂ **spirorbis** (F. Cambridge) 1901. Panama

Sidusa s. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Aran. 2 p. 214 T. 16 F. 11 (D ♂).
C. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).
C. s. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 162 (N ♂).

♂♀ **squamata** Bryant 1940. Cuba

C. s. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 488 T. 21 F. 227—278 (D ♂♀).

♂♀ **sulphurea** (F. Cambridge) 1901. Costa Rica, Panama

Sidusa s. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 218 T. 17 F. 16—17 (D ♂♀).
C. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).
C. s. Petrunkevitch 1925, Trans. Conect. Ac. Sci. 27 p. 204 f. 123—128 (D ♂♀).
C. s. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 162 (N ♂♀).

♂♀ **tristriata** Bryant 1942. Portorico

C. t. Bryant 1942, Journ. Agr. Univ. Portorico 26 p. 14 T. 2 F. 13, 17 (D ♂♀).

♂♀ **valida** (Peckham) 1901. Amazonas

Escambia v. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 335 T. 25 F. 13; T. 26 F. 6 (D ♂♀).
C. v. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 618 (C).

♂ **vervloeti** Soares & Camargo 1948. Brasilien

C. v. Soares & Camargo 1948, Rev. Bras. Biol. R. d. Jan. 8 (4) p. 429 f. 12—14 (D ♂).

♀ **voluta** (F. Cambridge) 1901. Panama

Sidusa v. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 218 T. 17 F. 15 (D ♀).
C. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 790 (N).
C. v. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 163 (N ♀).

♂ **waleckii** (Taczanowski) 1871. Franz. Guiana

Attus w. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 58 (D ♂).
C. w. Mello-Leitao 1947, An. Ac. Bras. Ci. 20 p. 189 (N).

xanthopa Crane 1948. Venezuela

C. x. Crane 1948, Zoologica, N. York 33 p. 29 f. . . (D).

Gen. **Margaromma** Keyserling 1882.

Orientalische Arten:

♂♀ **albertisii** (Thorell) 1881. Molukken

Attus a. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 517 (D ♂♀).
M. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 654 (N).

♂ **spatiosum** Peckham 1907. Borneo

M. s. Peckham 1907, Proc. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 629 (D ♂).

♂ **torquatum** Simon 1902. Molukken

M. t. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 36 (D ♂).

Australische Arten:

♂♀ **funestum** Keyserling 1882. – * Queensland, Neu-S.-Wales
M. f. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1347 T. 114 F. 5, 6 (D ♂♀).
M. f. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 328 (D).
M. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 657 (N).

♂♀ **imperiosum** Szombathy 1915. Neu-Guinea
M. i. Szombathy 1915, Ann. Mus. Nat. Hungar. 13 p. 480 (D ♂♀).

♂ **marginatum** Simon 1902. Queensland
M. m. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 35 (D ♂).

♀ **namukana** Roewer 1944. Fidji-Ins.
M. n. Roewer 1944, Göteborgs Vet. Vitt. Samh. Handl. (B) 2 (11) p. 5 f. 1 (D ♀).

♀ **obscurum** (Keyserling) 1882. Queensland
Hadrosoma o. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1418 T. 120 F. 2 (D ♀).
Bootes o. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 330 (D).
M. o. Simon 1901, Hist. Nat Araign. 2 (3) p. 654 (N).

♂ **semirasum** (Keyserling) 1882. Queensland
Tanypus s. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1415 T. 120 F. 1 (D ♂).
Sinnamora s. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1477 (nom. nov.).
Sinnamora s. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 331 (D).
M. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 654 (N).

♂ **soligenum** Simon 1901. Neu-Guinea
M. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 649 f. 773, 774 (N ♂).
M. s. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 35 (D ♂).

Gen. **Mollika** Peckham 1901.

(= Mollica auct.)

♂ **formosa** (Rainbow) 1899. St. Cruz-I.
Jotus f. Rainbow 1899, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 24 (2) p. 319 T. 25 F. 9 (D ♂).
M. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 654 (N).

♀ **jucunda** Rainbow 1912. Queensland
M. j. Rainbow 1912, Mem. Queensland Mus. 1 p. 207 f. 3 (D ♀).

♂♀ **metallescens** (L. Koch) 1879. – * Queensland, Neu-Guinea
Philaeus m. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1080 T. 94 F. 7, 8 (D ♂♀).
M. m. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 303 (N).
M. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 657 f. 775 (N.)
M. m. Roewer 1938, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors Sér.) 3 (19) p. 85 f. 63, 64 (N ♂♀).

♂♀ **microphthalma** (L. Koch) 1881. Loyalty-I., Neu-Caledonien, Tahiti, Hawai
Jotus m. L. Koch 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1246 T. 107 F. 2, 3 (D ♂♀).
M. m. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 303 (N).
M. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 654 (N).

♂♀ **pusilla** Strand 1913. Tahiti

M. p. Strand 1913, Arch. Naturg. 79 (A; 6) p. 123 (D ♀).
M. p. Strand 1914, Abh. Senckenbg. Ges. 36 (2) p. 263 T. 14 F. 29; T. 19 F. 103 (D ♂♀).

Gen. **Pseudocorythalia** Caporiacco 1938.

♂♀ **subinermis** Caporiacco 1938. Guatemala

P. s. Caporiacco 1938, Atti. Soc. Ital. Sci. Nat. 77 p. 276 f. 5 (D ♂♀).

Gen. **Pystira** Simon 1901.

Orientalische Arten:

♀ **ephippigera** (Simon) 1885. – * Sumatra

Hadrosoma e. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. Belg. 29 C. R. p. 36 (D ♀).
Bootes e. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 375 (D ♀).
P. e. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 656 f. 772 (N).

♂♀ **nigripalpis** (Thorell) 1877. Celebes

Attus n. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 620 (D ♂♀).
Bootes n. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 379 (N).
P. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 653 (N).

♀ **versicolor** Dyal 1935. Panjab

P. v. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 226 (D ♀).

Australische Arten:

♀ **cyanothorax** (Thorell) 1881. Neu-Guinea

Attus c. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 509 (D ♀).
P. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 653 (N).

♂♀ **karschii** (Thorell) 1881. Neu-Guinea, Aru-I.

Plexippus k. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 637 (D ♂♀).
P. k. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 653 (N).

♀ **obscurofemorata** (Keyserling) 1883. Neu-S.-Wales

Euophrys o. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1430 T. 121 F. 2 (D ♀).
P. obscurefemorate Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 653 (N).

♂♀ **orbiculata** (Keyserling) 1881. Queensland, Neu-S.-Wales

Hasarius o. Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1285 T. 110 F. 1, 2 (D ♂♀).
P. o. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 656 (N).
P. o. Rainbow 1915, Trans. Soc. S. Austral. 39 p. 790 (N).

Gen. **Stoidis** Simon 1901.

♀ **placida** Bryant 1947. Mona-Isl. (bei Haiti)

S. p. Bryant 1947, Psyche 54 (2) p. 94 T. 4 F. 4 (D ♀).

♂♀ **pygmaea** (Peckham) 1893. – * St. Vincent

Prostheclina p. Peckham 1893, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 702 T. 62 F. 10 (D ♂♀).
S. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 658 (N).

Gen. **Zenodorus** Peckham 1886.

♂♀ **danae** Hogg 1915. Neu-Guinea

Z. d. Hogg 1915, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 513 f. 6 (D ♂♀).

♂♀ **d'urvillii** (Walckenaer) 1837. – * Neu-Guinea, Aru-I., Goram, Jobi, Australien

Attus d'u. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 459 (D ♂).
Ephippus d'u. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 653 (D ♂♀).
Ephippus d'u. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1422 T. 120 F. 4, 5 (D ♂♀).
Z. d'u. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 297 (N).
Z. d'u. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 299 T. 25 F. 1 (N).
Z. u. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 656 f. 771 (N ♂).
Z. d'u. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 p. 185 (N ♂).

♂♀ **juliae** (Thorell) 1881. Neu-Guinea

Ephippus j. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 650 (D ♂♀).
Z. j. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 656 (N).

♂♀ **lepidus** (Guérin) 1834. Amboina, Neu-Guinea

Salticus l. Guérin 1834, Mag. Zool. Gl. 8 T. 7 (D ♀).
Attus l. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 478 (D ♀).
Salticus regulus Doleschall 1859, Act. Soc. Ind. Neerl. 5 p. 23 T. 5 F. 6 (D ♂).
Plexippus regulus Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 310 (D ♂).
Ephippus l. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 644 (D ♀).
Z. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 649 f. 768—770 (N ♂).

♂♀ **rhodopae** Hogg 1915. Neu-Guinea

Z. r. Hogg 1915, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 517 f. 7 (D ♂♀).

♂♀ **syrinx** Hogg 1915. Neu-Guinea

Z. s. Hogg 1915, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 519 f. 8 (D ♂♀).

♂ **variatus** Pocock 1899. Salomonen

Z. v. Pocock 1899, in: Willey, Zool. Res. . . . fr. N. Brit. Salomon. Isl. 1 p. 117 (D ♂).

♀ **wangillus** Strand 1911. Aru-I.

Z. w. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 184 T. 4 F. 19 (D ♀).

15. Subfam. Thyeninae

1. Gr. Bythocroteae

Gen. **Bythocrotus** Simon 1903.

o **cephalotes** (Simon) 1888. – * Haiti

Mogrus c. Simon 1888, Ann. Soc. Ent. France (6) 8 p. 204 (D o).
B. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 673 f. 793—795 (N).
B. c. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 464 T. 3 F. 21, 24, 25 (D ♂♀).

2. Gr. Thyeneae

Gen. **Hyllothyene** Caporiacco 1939.

♀ **univittata** Caporiacco 1939. Abessinien

H. u. Caporiacco 1939, Miss. Biol. . . .Borana p. 380 f. 27 (D ♀).

Gen. **Klamathia** Peckham 1903.

♂ **flava** Peckham 1903. Natal

K. f. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 231 T. 26 F. 4 (D ♂).

Gen. **Mopsus** Karsch 1878.

♂ **mormon** Karsch 1878. Neu-Guinea, Australien

M. m. Karsch 1878, Mitt. München. Ent. Ver. 2 p. 31 (D ♂).
M. m. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 304 (D).
M. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 687 f. 816—818 (N ♂).
M. m. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 185 (N ♂).

♂♀ **penicillatus** (Karsch) 1878. Queensland, Neu-S.-Wales

Ascyltus p. Karsch 1878, Mitt. München. Ent. Ver. 2 p. 30 (D ♂♀).
Ascyltus p. Keyserling 1881, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1319 T. 112 F. 4, 5 (D ♂♀).
M. p. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1476 (N).

Gen. **Thyene** Simon 1885.

Palaearktische Arten:

♂♀ **moreletii** (Lucas) 1846. Algier, Tunis

Salticus m. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger.; Zool. 1 Arachn. p. 147 T. 6 F. 3 (D ♀).
Attus m. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 622 (D ♀).
Attus m. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 142 (D ♂).
T. m. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 115 (C).

Transgredierende Arten:

♂♀ **imperialis** (Rossi) 1846. – * Mittelmeergebiet, O.- u. W.-Afrika, Arabien, Indien, Burma, Java, Flores

Attus i. Rossi 1846, Haidinger, Naturw. Abh. 1 p. 2 (D ♂).
Attus regillus L. Koch 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 879 (D ♂).
Attus regillus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 622 (D ♂).
Attus argenteolineatus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 620 (D ♂♀).
Attus i. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 142 (N ♂).
Attus regillus Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 611 T. 60 F. 17 (N ♂♀).
Marpessa i. Pavesi 1876, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 19 (1) p. 71 (24) (C).
Thya i. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 52 T. 11 F. 16 (D ♂♀).
Thya i. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 387 (D ♂).
Thiene i. Pavesi 1897, Ann. Mus. Civ. Genova 38 p. 183 (N ♂♀).
T. i. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 307 T. 25 F. 4 (N).
T. i. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 733 (C).
T. i. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 687 f. 811, 814 (N ♂).
T. i. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1236, 1269 f. 2003, 2004 (D ♂♀).
T. i. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 374 f. 72 B. 73 (N ♂♀).

Aethiopische Arten:

§ 6 ♂, 4 ♀: Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 223.

♂ **australis** Peckham 1903. Capland

T. a. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 230 T. 25 F. 6 (D ♂).

♀ **bilineata** Lawrence 1927. SW.-Afrika
T. b. Lawrence 1927, Ann. S. Afr. Mus. 25 (1) p. 64 T. 2 F. 51 (D ♀).

♀ **bilineata striatipes** Lawrence 1927. SW.-Afrika
T. b. s. Lawrence 1927, Ann. S. Afr. Mus. 25 (1) p. 65 (D ♀).

♂ **bucculenta** (Gerstäcker) 1873. O.-Afrika, Abessinien
Phidippus b. Gerstäcker 1873, Gliedertierfaun. Sansibar Geb. p. 475 T. 18 F. 4 (D ♂).
T. b. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 348 (N).
Thiene b. Pavesi 1895, Ann. Mus. Civ. Genova 35 p. 527 (N ♂).
T. b. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 684 f. 812 (N ♂).
T. b. (? = bucculifera) Strand 1909, Soc. Ent. 24 p. 45 (D ♂).
T. b. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 486 f. 68, 70, 72 (D ♂).

♂ **chopardi** Berland & Millot 1941. Nigergebiet
T. c. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 369 f. 68, 69 (D ♂).

o **corcula** (Pavesi) 1895. Abessinien
Thiene c. Pavesi 1895, Ann. Mus. Civ. Genova 35 p. 527 (D o).

♂ **coronata** Simon 1902. SO.-Afrika
T. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 41 (D ♂).
T. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 684 f. 815 (N ♂).

♂♀ **coccineovittata** (Simon) 1885. Franz. W.-Afrika
Hyllus c. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 348 (D ♂♀).
Hyllus c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 701 (N).
T. c. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 371, 373 f. 70, 71, 72 A (D ♂♀).

♂♀ **coccineovittata crudelis** (Peckham) 1903. Natal
T. crudelis Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 229 T. 25 F. 5 (D ♂).
T. ogdenii Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 224 T. 25 F. 4 (D ♀, nec ♂).
T. crudelis Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 32 (21) p. 349 (N ♂).
T. ogdenii Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 488 (D ♀, nec ♂).
T. c. c. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 373 (N ♂♀).

♀ **damarensis** Lawrence 1927. SW.-Afrika
T. d. Lawrence 1927, Ann. S. Afr. Mus. 25 (1) p. 63 T. 2 F. 50 (D ♀).

♂♀ **dancala** Caporiacco 1947. Aethiopien
T. d. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 241 T. 2 F. 73 (D ♂♀).

♂♀ **inflata** (Gerstäcker) 1873. Trop. Afrika
Phidippus i. Gerstäcker 1873, Gliedertierfaun. Sansibar Geb. p. 476 (D ♂).
T. squamulata Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 347 (D ♂♀).
T. i. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 348 (C).
T. i. Strand 1908, Nyt. Mag. Naturvid. 46 (2) p. 197 (D ♂♀).
T. squamulata (? = squamuloides) Strand 1909, Societ. Ent. 24 p. 37 (N o).
T. i. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 480 f. 66, 67, 69, 71 (D ♂♀).
T. i. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 374 f. 72 C, 74 (D ♂♀).

♂♀ **magdalenae** Lessert 1927. Congo
T. m. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 444 f. 25 (D ♂♀).

♂♀ **natalii** Peckham 1903. Natal, Portug. O.-Afrika
T. n. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 227 T. 25 F. 4 (D ♂♀).
T. n. Lessert 1936, Rev. Suisse Zool. 43 (9) p. 294 f. 92, 93 (D ♀).

♂ **orbicularis** (Gerstäcker) 1873. O.-Afrika
Phidippus o. Gerstäcker 1873, Gliedertierfaun. Sansibar Geb. p. 476 (D ♂).
T. o. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 348 (C).
Thiene o. Pavesi 1895, Ann. Mus. Civ. Genova 35 p. 527 (N ♂).
T. o. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 686 (N).

♂ **ogdenii** Peckham 1903. Natal
T. o. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 224 T. 25 F. 2 (D ♂, nec ♀).
T. o. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 488 f. 73 (D ♂, nec ♀).
T. o. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 371, 373 (N).

♂ **ogdenii leighii** (Peckham) 1903. Natal
T. leighii Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 225 T. 25 F. 1 (D ♂).
T. o. l. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 378 (N).

♂♀ **ogdenii nyukiensis** Lessert 1925. O.-Afrika
T. o. n. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 491 f. 74 (D ♂).
T. o. n. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 477 (N ♂♀).

♀ **pulchra** Peckham 1903. Natal
T. p. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 226 T. 25 F. 3 (D ♀).

♀ **scalarinotum** Strand 1907. Capland
T. s. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (17—18) p. 547 (D ♀).
T. s. Strand 1907, Zool. Jahrb. Syst. 25 (5—6) p. 723 (D ♀).
T. s. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 240 (N).

♂ **splendida** Caporiacco 1939. Abessinien
T. s. Caporiacco 1939, Real Accad. Ital. p. 378 f. 26 (D ♂).

o **strandi** Caporiacco 1939. Abessinien
T. s. Caporiacco 1939, Real Accad. Ital. p. 376 f. 25 (D o).

♀ **subsplendens** Caporiacco 1947. O.-Afrika
T. s. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 240 T. 2 F. 72 (D ♀).

♀ **tamatavi** (Vinson) 1863. Madagascar
Attus t. Vinson 1863, Aran. Reun. Mauric. Madagasc. p. 62, 303 T. 10 F. 6 (D ♀).
Phyale t. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 315 (C).
Phiale t. Peckham 1885, Proc. Nat. Hist. Soc. Wiscons. p. 40 T. 1 F. 10 (D ♀).
T. t. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 348 (C).
T. t. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 686 (N).

♂♀ **varians** Peckham 1901. Madagascar
T. v. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 308 (D ♂♀).
T. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 686 (N).

♂ **villiersi** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste
T. v. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 376 f. 75 (D ♂).

♂♀ **vittata** Simon 1902. Natal, Abessinien
T. v. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 40 (D ♂♀).
T. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 686 (N).
T. v. Strand 1909, Societ. Ent. 24 p. 44 (D ♂).

Gen. **Thyenillus** Simon 1909.

♂ **fernandensis** Simon 1909 (1910). Fernando Poo
T. f. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 430 (D ♂).

Gen. **Thyenula** Simon 1902.

♂ **ammonis** Denis 1947. Oase Siwah
T. a. Denis 1947, Bull. Soc. Fouad I. Ent. 31 p. 81 T. 6 F. 12—13 (D ♂).

♂ **juvenca** Simon 1902. – * S.-Afrika
T. j. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 41 (D ♂).
T. j. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 687 (N).

16. Subfam. Pelleninae

1. Gr. Aelurilleae

Gen. **Aelurillus** Simon 1884.

Palaearktische Arten:

§ 3 ♂, 3 ♀: Simon 1876, Aradın. de France 3 p. 135 (sub **Aelurops**).
§ 2 ♂, 2 ♀: Roewer 1928, Tierw. Mitteleurop. 3 (6) p. 43 TF. 482.
§ 3 ♂, 3 ♀: Simon 1937, Aradın. de France 6 (5) p. 1225—1228.

♂♀ **aeruginosus** (Simon) 1871. Andalusien, Syrien
Attus arenicolor Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 723 (N).
Attus mustellatus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 530 (D ♂♀).
Attus a. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 154 (nom. nov.).
Aelurops a. Simon 1876, Aradın. de France 3 p. 139 (N).

♂♀ **affinis** (Lucas) 1846. Spanien, Corsica, Sizilien, N.-Afrika, Syrien, Rhodos
Salticus a. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Aradın. p. 161 T. 7 F. 4 (D ♀).
Attus a. Simon 1858, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 71 (D ♀).
Attus a. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 154 (D ♂).
Aelurops a. Simon 1876, Aradın. de France 3 p. 138 T. 11 F. 7 (D ♂♀).
A. a. Denis 1937, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 1056 T. 5 F. 10 (N ♀).
A. a. Simon 1937, Aradın. de France 6 (5) p. 1228, 1268, f. 1979, 1980 (D ♂♀).
A. a. Caporiacco 1948, Redia 33 p. 71 (N ♀).

♂ **approximans** (Cambridge) 1872. Palästina
Salticus a. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 338 (D ♂).
Aelurops a. Simon 1876, Aradın. de France 3 p. 139 (C).
A. a. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 111 (C).

♂ **ater** (Kroneberg) 1875. Turkestan
Aelurops a. Kroneberg 1875, Nachr. Ges. Moskau 19 (3) p. 50 T. 5 F. 38 (D ♂).

♂ **basseletii** (Lucas) 1846. Algier, Tunis

Salticus b. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 158 T. 7 F. 1 (D ♂).
Aelurops b. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 139 (C).
Ictidops b. Pavesi 1880, Ann. Mus. Civ. Genova 15 p. 383 (C).
A. b. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 350 (C).

♂ **blandus** (Simon) 1871. Rhodos, Santorin

Attus b. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 155 (D ♂).
Aelurops b. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 139 (C).
A. b. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 314 (C).

♀ **candidus** (Simon) 1868. Andalusien, Syrien

Attus c. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 70 (D ♀).
Attus albicans Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 153 (nom. nov.).
Aelurops c. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 139 (C).
A. c. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 111 (C).

♂♀ **cervinus** (Thorell) 1875. Algier

Yllenus c. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 196 (D ♂♀).
Aelurops c. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 139 (C).
A. c. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 111 (C).

♂ **cognatus** (Cambridge) 1872. Syrien

Salticus c. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 337 (D ♂).
A. c. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 111 (C).

♀ **concolor** Kulczynski 1901. Anatolien, Kaukasien

A. c. Kulczynski 1901, in: Horvath, Zool. Erg. 3. Reis. Zichy 2 p. 349 T. 13 F. 18 (D ♀).

♂o **conveniens** (Cambridge) 1872. Palästina, Oase Siwah

Salticus c. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 336 (D ♂).
Aelurops c. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 139 (C).
A. c. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 111 (C).
A. c. Denis 1947, Bull. Soc. Fouad I. Ent. 31 p. 74 T. 6 F. 10 (D ♀).

♀ **dimorphus** Dönitz & Strand 1906. Japan

A. d. Dönitz & Strand 1906, in: Bösenberg & Strand, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 398 T. 9 F. 125, 126 (D ♀).

♀ **dorthesii** (Audouin) 1827. Aegypten

Attus d. Audouin 1827, Explic. Planch. Arachn. Savigny Descr. Egypt p. 405 T. 7 F. 9 (D ♀).
Aelurops d. Simon 1876, Arachn. de France 3 p, 139 (C).
A. d. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 111 (C).

♂♀ **festivus** (C. L. Koch) 1834. Europa, Sibirien

Euophrys f. C. L. Koch 1834, in: Herrich-Schäffer, Deutschl. Ins. 123; 5, 6 (D).
Euophrys striata C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 1 TF. 1272, 1273 (D ♂♀).
Pandora striata C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 64 (N).
Salticus melanotarsus Grube 1861, Bull. Ac. Sci. St. Petersbg. 4 p. 177 (D ♂).
Attus litteratus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 68, 532 (D ♂♀).
Yllenus f. Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 379 (N).
Aelurops f. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 137 T. 11 F. 6 (D ♂♀).
Ictidops f. Kulczynski 1884, Conspect. Attid. Galic. p. 50 (N).
A. f. Bösenberg 1903, Zooligica 14 (5—6) p. 439 T. 42 F. 644 (D ♂♀).

A. f. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 585 (D ♂♀).
A. f. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 48 f. 148, 149 (D ♂♀).
A. f. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1227, 1267, f. 1977, 1978 (D ♂♀).

♂♀ **gesticulator** (Lucas) 1846. Algier

Salticus g. Lucas 1846, Explr. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 150 T. 6 F. 9 (D ♀).
Euophrys g. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 312 (C).
Attus g. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 3 p. 640 (D ♂♀).
A. g. Denis 1937, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 1056 T. 5 F. 11 (D ♀).

♂♀ **gilvus** (Simon) 1868. Ungarn, Dalmatien, Krim, Ukraine

Attus g. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 532 (D ♂♀).
Yllenus g. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 197 (D ♂♀).
Aelurops g. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 139 (C).
Aelurops g. Herman 1879, Ungarns Spinn. Faun. 3 p. 324, 387 (N).
A. g. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 111 (C).

♂♀ **kochi** Roewer 1951. I. Tinos, I. Syra, Palästina, Syrien

Attus capreolus L. Koch 1867, Verh. Zool. Boot. Ges. Wien 17 p. 872 (D ♀) (praeocc. Walckenaer 1825).
Attus capreolus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 69 T. 1 F. 16 (♂♀).
Aelurops capreolus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 139 (C).
Yllenus capreolus Pavesi 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 11 p. 396 (C).
A. capreolus Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 314 (C).
A. k. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 451 (nom. nov.)

♀ **latebricola** Spassky 1941. Turkestan

A. l. Spassky 1941, Folia Zool. Hydrobiol. Riga 11 p. 24 f. . . (D ♀).
A. l. Spassky & Luppova 1945, Rev. Ent. U. S. S. R. 28 (1—2) p. 50 (D ♀).

♂♀ **litera v-insignitus** (Clerck) 1757. – * Europa, N.-Afrika, Syrien, Turkestan

Araneus l. Clerck 1757, Aran. Suec. p. 121 T. 5 F. 16 (D ♂).
Araneus litera v-notatus Clerck 1757, Aran. Suec. p. 123 T. 5 F. 17 (D ♀).
Aranea insignitus Olivier 1789, Encycl. Méthod. 4 p. 222 (D).
Aranea punctata Olivier 1789, Encycl. Méthod. 4 p. 222 (D).
Aranea litterata Walckenaer 1802, Faun. Paris. 2 p. 247 (D ♀).
Attus litteratus Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 24 (N ♀).
Attus quinquepartitus Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 25 (N ♂).
Attus insignitus Sundevall 1832, Vet. Ak. Handl. p. 211 (D ♂♀).
Salticus quinquepartitus Hahn 1833, Die Arachniden 2 p. 41 TF. 126 (D ♂).
Euophrys quinquepartitus C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 33 (N).
Attus quinquepartitus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 403 (D ♂♀).
Attus litteratus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 418 (D ♂♀).
Attus quinquefidus Walckenaer 1847, Hist. Nat. Ins. Apt. 4 p. 408 (N).
Euophrys quinquepartitus C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 27 TF. 1296 (D ♂, nec ♀).
Dia quinquepartita C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 64 (N).
Salticus nidicolens Cambridge 1861, Zoologist. p. 7945 (D ♀).
Attus v-insignitus Westring 1862, Aran. Svec. p. 559 (D ♂♀).
Pandora litterata Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 312 (C).
Dia quinquefida Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 312 (C).
Euophrys insignitus Ausserer 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 155 (C).
Euophrys striata Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 161 (D ♂♀).
Attus insignitus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 64 (D ♂♀).
Yllenus v-insignitus Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 378 (N).

Aelurops insignitus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 136 T. 11 F. 5 (D ♂♀)
Aelurops v-insignitus Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 474 T. 78 F. 266 (D ♂♀).
Aelurops v-insignitus Cambridge 1881, Proc. Dorset F. Cl. 2 p. 416 T. 5 F. 8 (D ♂♀).
Aelurops insignitus Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 53 T. 4 F. 6 (D ♂♀).
Yllenus v-insignitus Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 78 (D ♂♀).
Ictidops v-insignitus Kulczynski 1884, Conspect. Attid. Galic. p. 49 (N).
A. insignitus Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 314 (N).
A. insignitus Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 319 (D).
A. v-insignitus Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 29 T. 1 F. 6 (D ♂♀).
A. insignitus Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 668 f. 778—780 (N ♂).
A. v-insignitus Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 438 T. 42 F. 643 (D ♂♀).
A. insignitus Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 584 (D ♂♀).
A. litera v-insignitus Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 48 f. 146, 147 (D ♂♀).
A. v-insignitus Kratochvil 1930, Sbornik Klub. Prirod. 13 p. 1, 4 f. 2 (N ♀).
A. v-insignitus Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1227, 1267 f. 1974—1976 (D ♂♀).
A. v-insignitus Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 38 f. . . (N).
A. insignitus Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 58 T. 6 F. 105—106 (D ♂♀).
A. v-insignitus Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 237 f. 115 B, D (D ♂♀).

♂ **litera v-insignitus morula** (Simon) 1937. Frankreich

A. v-insignitus m. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1227, 1267 (D ♂).

♂♀ **litera v-insignitus obsoletus** Kulczynski 1891. Ungarn

A. i. o. Kulczynski 1891, in: Chyzer & Kulczynski, Aran. Hungar. 1 p. 29 T. 1 F. 4 (D ♂♀).
A. v-insignitus o. Kratochvil 1930, Sbornik. Klub. Prirod. 13 p. 1, 4 f. 1 (D ♀).

♀ **lucasi** Roewer 1951. Teneriffa

Attus annulipes Lucas 1838, in: Barker, Webb. Berthelot, Hist. Nat. Canar. 2 p. 30 T. 7 F. 3 (D ♀) (praeocc. Walckenaer 1825).
A. annulipes Strand 1901, Societ. Ent. 24 p. 5 (D ♀).
A. l. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 451 (nom. nov.).

♂ **luctuosus** (Lucas) 1846. Spanien, Marokko, Algier

Salticus l. Lucas 1864, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 139 T. 5 F. 7 (D ♂).
Heliophana l. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 333 (C).
Attus l. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 529 (D ♂).
Aelurops l. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 139 (C).
A. l. Simon 1909, Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 6 (1) p. 40 (N).

♀ **mallezi** Denis 1947. Oase Siwah

A. m. Denis 1947, Bull. Soc. Fouad I. Ent. 31 p. 75 T. 6 F. 11 (D ♀).

♂ **mayeti** Simon 1885. Tunis

A. m. Simon 1885, Arachn. in: Explor. Sci. Tunis. p. 3 (D ♂).

♀ **m-nigrum** Kulczynski 1891. Ungarn, Don-Gebiet

A. m. Kulczynski 1891, in: Chyzer & Kulczynski, Aran. Hungar. 1 p. 31 T. 1 F. 5 (D ♀).

♂♀ **monardi** (Lucas) 1846. Spanien, Sardinien, Italien, Algier, Tunis, Syrien

Salticus m. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 156 T. 7 F. 2 (D ♂).
Salticus nicoletii Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 160 T. 7 F. 5 (D ♀).
Attus m. Simon 1868, Ent. France (4) 8 p. 66 T. 5 F. 17 (D ♂♀).
Aelurops m. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 139 (C).
Ictidops m. Pavesi 1880, Ann. Mus. Civ. Genova 15 p. 383 (C).
A. m. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 112 (C).

♂ **ogieri** (Simon) 1868. Spanien, I. Tinos, Aegypten, Algier

Attus o. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 534 (D ♂).
Aelurops o. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 139 (C).
Yllenus o. Pavesi 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 11 p. 396 (C).
A. o. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 315 (C).

♀ **pallidemaculatus** Denis 1937. Algier

A. p. Denis 1937, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 1056 T. 5 F. 12 (D ♀).

♂ **plumipes** (Thorell) 1875. Algier

Yllenus p. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 195 (D ♂).
Aelurops p. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 139 (C).
A. p. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 112 (C).

♂ **politiventris** (Cambridge) 1872. Syrien, Palästina

Salticus p. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 337 (D ♂).
Aelurops p. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 139 (C).
A. p. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 112 (C).

♂ **pupus** (Karsch) 1879. Japan

Ictidops p. Karsch 1879, Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf. 36 p. 85 (D ♂).

♀ **ranunculus** (Thorell) 1875. Algier

Yllenus r. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 200 (D ♀).
Aelurops r. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 139 (C).
A. r. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 112 (C).

♂♀ **simonii** (Lebert) 1877. Schweiz

Aelurops s. Lebert 1877, Neue Denkschr. Schweiz. Ges. Nat. 27 p. 310 T. 6 F. 45—47 (D ♂♀).
A. s. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 112 (C).

♂ **simplex** (Herman) 1879. Ungarn

Aelurops s. Herman 1879, Ungarns Spinn. Faun. 3 p. 323, 386, T. 8 F. 189 (D ♂).
A. s. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 29—30 (N ♂).

♂♀ **spinicrus** (Simon) 1871. Marokko

Attus s. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 157 (D ♂♀).
Aelurops s. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 139 (C).
A. s. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 350 (C).

♀ **subfestivus** Saito 1934. Japan

A. s. Saito 1934, Journ. Agr. Hokkaido Univ. 33 (5) p. 295 T. 12 F. 12; T. 14 F. 50 (D ♀).

♂♀ **variegatus** (Kroneberg) 1875. Turkestan

Aelurops v. Kroneberg 1875, Nachr. Ges. Moskau 19 (3) p. 51 T. 5 F. 39 (D ♂♀).
A. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 665 (N).

Aethiopische Arten:

♂ **catus** Simon 1885. Senegal

A. c. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 350 (D ♂).
A. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 665 (N).

♂♀ **cristatopalpus** Simon 1902. S.-Afrika

A. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 36 (D ♂♀).
A. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 665 (N).

♂♀ **guttiger** Simon 1901. Transvaal

A. g. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 71 (D ♂♀).
A. g. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 665 (N).

♀ **rugatus** (Bösenberg & Lenz) 1895. Usambara

Aelurops r. Bösenberg & Lenz 1895, Jahrb. Hambg. Wiss. Anst. 12 (2) p. 28 T. 1 F. 1 (D ♀).

♀ **sahariensis** Berland & Millot 1941. Franz. Sudan (Sahara)

A. s. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 301 f. 1 (D ♀).

♀ **subaffinis** Caporiacco 1947. Aethiopien

A. s. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 236 T. 2 F. 70 (D ♀).

Orientalische Arten:

♀ **quadrimaculatus** Simon 1889. Indien, Ceylon

A. q. Simon 1889, Journ. Asiat. Soc. Bengal. 58 (2; 4) Suppl. p. 334 (D ♀).
A. q. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 665 (N).

Gen. **Habrocestum** Simon 1876.

Palaearktische Arten:

§ 4 ♂: Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 133.
§ 12 ♂: Dalmas 1920, Ann. Mus. Civ. Genova 49 p. 62.

♂ **algericum** Dalmas 1920. Algier

H. a. Dalmas 1920, Ann. Mus. Civ. Genova 49 p. 66 (D ♂).

♂♀ **bovaei** (Lucas) 1846. Algier, Marokko

Salticus b. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 179 T. 9 F. 7 (D ♀).
H. b. Simon 1909, Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 6 (1) p. 40 (N).
H. b. Dalmas 1920, Ann. Mus. Civ. Genova 49 p. 66 (D ♂♀).
H. b. Denis 1937, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 1057 T. 5 F. 13 (N ♂♀).
H. b. Kolosvary 1938, Rassegna Faunist. 3—4 p. 17 TF. p. (N ♀).

♂♀ **gestroi** Dalmas 1920. Kleinasien

H. g. Dalmas 1920, Ann. Mus. Civ. Genova 49 p. 68 (D ♂♀).

♂♀ **graecum** Dalmas 1920. Griechenland

H. g. Dalmas 1920, Ann. Mus. Civ. Genova 49 p. 67 (D ♂♀).

♂♀ **ibericum** Dalmas 1920. Spanien

H. i. Dalmas 1920, Ann. Mus. Civ. Genova 49 p. 65 (D ♂♀).

♂♀ **latifasciatum** (Simon) 1868. Corfu, Creta, Libyen, Syrien, Irak, Rhodos

Attus l. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 536 (D ♂).
H. l. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 133 (C).
H. l. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 314 (N).
H. l. Kulczynski 1903, Bull. Ac. Sci. Gracov. p. 54 T. 1 F. 17 (N ♀).
H. l. Dalmas 1920, Ann. Mus. Civ. Genova 49 p. 67 (D ♂♀).
H. l. Caporiacco 1948, Redia 33 p. 71 (N ♂♀).

♂ **lepidum** Dalmas 1920. Algier

H. l. Dalmas 1920, Ann. Mus. Civ. Genova 49 p. 66 (D ♂).

♂ **nigricans** Dalmas 1920. Tunis

H. n. Dalmas 1920, Ann. Mus. Cic. Genova 49 p. 67 (D ♂).

♀ **nigristernum** Dalmas 1920. Kleinasien

H. n. Dalmas 1920, Ann. Mus. Civ. Genova 49 p. 68 (D ♀).

♂♀ **ornaticeps** (Simon) 1868. Span. Marokko

Attus o. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 537 (D ♂).
H. o. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 133 (C).
H. o. Dalmas 1920, Ann. Mus. Civ. Genova 49 p. 66 (N ♂♀).

♂♀ **papillonaceum** (L. Koch) 1867. Griechenland

Attus p. L. Koch 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 878 (D ♂♀).
Attus p. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 535 (D ♂♀).
H. p. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 133 (C).
H. p. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 314 (C).
H. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 659 f. 790 (N).
H. p. Dalmas 1920, Ann. Mus. Civ. Genova 49 p. 68 (N).

O♀ **pullatum** Simon 1876. – * S.-Frankreich, Spanien

Attus agilis Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 539 (D O ♀).
H. p. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 132 T. 11 F. 8 (D ♀).
H. p. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 316 (D).
H. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 670 (N).
H. p. Dalmas 1920, Ann. Mus. Civ. Genova 49 p. 63 (N ♀).
H. p. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1225, 1267 f. 1972, 1973 (D ♀).

♂ **simoni** Dalmas 1920. Algier

H. s. Dalmas 1920, Ann. Mus. Civ. Genova 49 p. 66 (D ♂).

♂♀ **verattii** Caporiacco 1936. Libysche Wüste

H. v. Caporiacco 1936, Mem. Soc. Ent. Ital. 15 p. 107 f. 5 (D ♂♀).

Aethiopische Arten:

♂ **albimanum** Simon 1901. Capland

H. a. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 71 (D ♂).
H. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 665 (N).

♀ **annae** Peckham 1903. Natal

H. a. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 238 T. 27 F. 4 (D ♀).

♀ **diversipes** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste

H. d. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 301 f. 2 (D ♀).

♂♀ **dotatum** Peckham 1903. Mashonaland
H. d. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 239 T. 27 F. 6 (D ♂♀).

♂ **flavimanum** Simon 1901. Capland
H. f. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 72 (D ♂).
H. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 665 (N).

♂♀ **insignipalpe** Simon 1882. Tripolis, Yemen
H. i. Simon 1882, Ann. Mus. Civ. Genova 18 p. 214 (D ♂♀).

♀ **laurae** Peckham 1903. Natal
H. l. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 238 T. 27 F. 5 (D ♀).

♂ **luculentum** Peckham 1903. Capland
H. l. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 241 T. 27 F. 3 (D ♂).

♂ **nigritum** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea, Elfenbeinküste
H. n. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 303 f. 3 (D ♂).

♀ **penicillatum** Caporiacco 1940. Abessinien
H. p. Caporiacco 1940, Atti Accad. Ital. 11 (18) p. 861 f. 53 (D ♀).

♂♀ **rubroclypeatum** Lessert 1927. Congo
H. r. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 435 f. 19 (D ♂♀).

♂ **sapiens** (Peckham) 1903. Mashonaland
Saitis s. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 196 T. 21 F. 5 (D ♂).

♂ **schinzi** Simon 1887. S.-Afrika
H. s. Simon 1887, Ann. Soc. Ent. France (6) 7 p. 369 (D ♂).
H. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 665 (N).

♂♀ **subdotatum** Caporiacco 1940. Abessinien, Ost-Afrika
H. s. Caporiacco 1940, Atti Accad. Ital. 11 (18) p. 860 f. 52 (D ♂♀).
H. s. Caporiacco 1947, Ann. Nat. Hungar. 40 (3) p. 238 (N ♀).

♂ **subpenicillatum** Caporiacco 1941. Süd-Abessinien
H. s. Caporiacco 1941, Miss. Biol. Sagan-Omo 12, Zool. 6 p. 140 f. 61 (D ♂).

Orientalische Arten:

♀ **dyali** Roewer, nom. nov. Panjab
H. rubroclypeatum Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 229 (N ♀) (praeocc. Lessert 1927).

♀ **panjabius** Roewer 1951. Panjab
H. algericum Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 228 (D ♀) (praeocc. Dalmas 1920).
H. p. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 451 (nom. nov.).

Australische Arten:

♂ **bitaeniatum** Keyserling 1882. Queensland
H. b. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1405 T. 119 F. 2 (D ♂).

♂ **chrysomelas** Simon 1909. W.-Australien
H. c. Simon 1909, Faun. S. W. Austral. 2 (12) p. 201 (D ♂).

♂ **flavipes** Keyserling 1882. Queensland
H. f. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1403 T. 119 F. 1 (D ♂).

♂♀ **nigriceps** Keyserling 1882. Neu-S.-Wales
H. n. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1409 T. 119 F. 4, 5 (D ♂♀).

♀ **peckhami** Rainbow 1899. St. Cruz-I.
H. p. Rainbow 1899, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 24 (2) p. 320 T. 25 F. 10 (D ♀).

♀ **pilosum** Keyserling 1882. Queensland
H. p. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1401 T. 118 F. 8 (D ♀).

♀ **punctiventre** Keyserling 1882. W.-Australien
H. p. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1412 T. 119 F. 6 (D ♀).

♂ **speculiferum** Simon 1909. W.-Australien
H. s. Simon 1909, Faun. S. W. Austral. 2 (12) p. 202 (D ♂).

Nearktische Arten:

♂♀ **acerbum** Peckham 1909. Texas, Georgia
H. a. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 522 T. 44 F. 1 (D ♂♀).

♂ **belli** Gertsch 1935. Arizona
H. b. Gertsch 1935, Amer. Mus. Novit. 792 p. 30 TF. 38, 39 (D ♂).

♂♀ **bufoides** Chamberlin & Ivie 1944. Georgia
H. b. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 196 TF. 214—215 (D ♂♀).

♂♀ **inscriptum** Schenkel 1951. Californien
H. i. Schenkel 1951, Verh. Nat. Ges. Basel 62 p. 40 f. 43 (D ♂♀).

♂♀ **morosum** (Peckham) 1888. Californien, Arizona
Astia m. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 71 T. 1 F. 53; T. 5 F. 53 (D ♂♀).
Sidusa m. Banks 1904, Journ. N. York Ent. Soc. 12 p. 116 (N).
H. m. Peckham 1909, Tans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 523 T. 43 F. 2; T. 44 F 2 (D ♂♀).

♂♀ **parvulum** (Banks) 1895. New York, Illinois
Saitis p. Banks 1895, Canad. Ent. 27 p. 101 (D ♂).
H. p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 524 (N).
H. p. Jones 1946, Psyche 53 (1—2) p. 27 f. 1—4 (D ♂♀).

♂♀ **pulex** (Hentz) 1846. U. St. Amerika, Canada
Attus p. Hentz 1846, Boston. Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 361 T. 22 F. 3 (D ♀).
Euophrys offuscata C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 218 TF. 1263 (D ♀).
Amphirape offuscata C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 67 (N).
Amphirape obfuscata Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 314 (C).
Cyrba p. Keyserling 1884, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. 509 T 13 F. 15 (D ♂).
Saitis x-notata Keyserling 1884, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. 510 T. 13 F. 16 (D ♀).
Saitis p. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 67 T. 1 F 50; T. 5 F. 50 (D ♂♀).

Saitis p. Emerton 1891, Trans, Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 246 T. 20 F. 7 (D ♂♀).
Saitis p. Emerton 1902, Common Spid. p. 43 f. 120, 121 (D ♂♀).
H. p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 525 T. 42 F. 11; T. 43 F. 1 (D ♂♀).
H. p. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 149 f. 12—16 (D ♂♀).
H. p. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 461 T. 90 F. 1675—1682 (D ♂♀).

Gen. **Langona** Simon 1901.

Palaearktische Arten:

♂ **mendax** (Cambridge) 1876. Aegypten, Palästina

Attus m. Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 615 (D ♂).
L. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 665 (N).

♂♀ **redii** (Audouin) 1827. – * Aegypten, Syrien

Attus r. Audouin 1827, Explic. Planch. Arachn. Savigny Descr. Egypt. p. 408 T. 7 F. 21 (D ♂).
Salticus fasciatus Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 322 (N ♂♀).
Salticus interceptor Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 616 (D ♂).
Aelurillus r. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 350 (N).
L. r. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 669 f. 782 (N).

Aethiopische Arten:

♂ **avara** Peckham 1903. Mashonaland

L. a. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 241 T. 28 F. 5 (D ♂).

♀ **bisecta** Lawrence 1927. SW.-Afrika

L. b. Lawrence 1927, Ann. S. Afr. Mus. 25 (1) p. 60 T. 2 F. 46 (D ♀).

♂♀ **bristowei** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea

L. b. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 304 f. 4 (D ♂♀).

♀ **magna** Caporiacco 1947. Ost-Afrika

L. m. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 238 T. 2 F. 71 (D ♀).

o **maindroni** (Simon) 1885. Senegal

Aelurillus m. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 350 (D o).
L. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 665 (N).

♂ **manicata** Simon 1901. Transvaal

L. m. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 70 (D ♂).
L. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 665 (N).

♀ **minima** Caporiacco 1949. Kenya

L. m. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 473 f. 88 (D ♀).

♂ **rufa** Lessert 1925. O.-Afrika, S.-Abessinien

L. r. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 475 f. 62, 63 (D ♂).
L. r. Caporiacco 1941, Miss. Biol. Sagan-Omo 12, Zool. 6 p. 142 (N).

♀ **senegalensis** Berland & Millot 1941. Senegal

L. s. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 305 f. 5 (D ♀).

♀ **ukualuthensis** Lawrence 1927. SW.-Afrika
L. u. Lawrence 1927, Ann. S. Afr. Mus. 25 (1) p. 61 T. 2 F. 47 (D ♀).

Orientalische Arten:

♀ **tigrina** (Simon) 1885. Indien
Aelurillus t. Simon 1885, Bull. Soc. Zool. France 10 (4—6) p. 456 T. 10 F. 9 (D ♀).
L. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 665 (N).

Gen. **Mogrus** Simon 1882.

Palaearktische Arten:

♂♀ **bonnetii** (Audouin) 1827. Aegypten, Oase Siwah
Attus b. Audouin 1827, Explic. Planch. Arachn. Savigny, Descr. Egypt. p. 407 T. 7 F. 14 (D ♀).
Attus b. Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. London p. 611 (N).
Phlegra b. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 127 (C).
M. b. Denis 1947, Bull. Soc. Fouad I. Ent. 31 p. 76 T. 5 F. 10—12 (D ♂, N ♀).

♂♀ **canescens** (C. L. Koch) 1846. Griechenland, Syrien, Aegypten
Dendryphantes c. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 80 TF. 1144 (D ♀).
Attus c. Walckenaer 1847, Hist. Nat. Ins. Apt. 4 p. 412 (N ♀).
Attus c. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 586 (D ♂).
M. c. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 309 (N).
M. c. Simon 1906, S. B. Ak. Wiss. Wien 115 (I) p. 1174 (N).
M. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 659 f. 791, 792 (N ♂).
M. c. Caporiacco 1948, Redia 33 p. 71 (N ♂♀).

♀ **flavescentemaculatus** (Lucas) 1846. Algier
Salticus f. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 143 T. 5 F. 6 (D ♀).
M. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 667 (N).

♂♀ **frontosus** (Simon) 1871. Corsica
Attus f. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 166 (D ♂♀).
Hasarius f. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 88 (D ♂♀).
M. f. Simon 1881, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 309 (N).
M. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 667 (N).
M. f. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1228, 1268 f. 1981—1983 (D ♂♀).

♀ **neglectus** (Simon) 1868. Attika, Naxos, Syrien, Rhodos
Dendryphantes n. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 639 (D ♀).
Attus n. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 190 (D ♀).
Philaeus n. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 51 (C).
M. n. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 310 (N).
M. n. Hadjissarandos 1940, Araign. de l'Attique p. 103 f. 35 (D ♂♀, griechisch).
M. n. Caporiacco 1948, Redia 33 p. 72 (C).

Aethiopische Arten:

♂ **albogularis** Simon 1901. S.-Afrika
M. a. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 72 (D ♂).
M. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 667 (N).

♀ **dalmasi** Berland & Millot 1941. Franz. Sudan
M. d. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 306 f. 6, 7 (D ♀).

♀ **fulvovittatus** Simon 1882. – * Yemen, I. Perim
M. f. Simon 1882, Ann. Mus. Civ. Genova 18 p. 215 T. 8 F. 2 (D ♀)
M. flavovittatus Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 667 (N).
M. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 671 (N).

♂ **leucochelis** Pavesi 1897. Somaliland
M. l. Pavesi 1897, Ann. Mus. Civ. Genova 38 p. 182 (D ♂).
M. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 667 (N).

♀ **macrocephalus** Lawrence 1927. SW.-Afrika
M. m. Lawrence 1927, Ann. S. Afr. Mus. 25 (1) p. 62 T. 2 F. 40 (D ♀).

♂♀ **praecinctus** Simon 1890. Arabien
M. p. Simon 1890, Ann. Soc. Ent. France (6) 10 p. 117 (D ♂♀).
M. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 667 (N).

♀ **sahariensis** Berland & Millot 1941. Nigergebiet
M. s. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 307 f. 8 (D ♀).

♀ **semicanus** Simon 1910. SW.-Afrika
M. s. Simon 1910, Denkschr. Med. Nat. Ges. Jena 16 p. 217 (D ♀).

♂o **v-albus** Simon 1890. Yemen
M. v. Simon 1890, Ann. Soc. Ent. France (6) 10 p. 118 (D ♂o).
M. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 667 (N).

Orientalische Arten:

♂♀ **fabrei** Simon 1885. Indien
M. f. Simon 1885, Bull. Soc. Zool. France 10 (4—6) p. 29 (D ♂♀).
M. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 667 (N).

♀ **ornatus** Simon 1885. Malakka
M. o. Simon 1885, Bull. Soc. Zool. France 10 (4—6) p. 439 (D ♀).
M. o. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 667 (N).

Gen. **Neaetha** Simon 1884.

Palaearktische Arten:

♂♀ **aegyptiaca** Denis 1947. Oase Siwah
N. a. Denis 1947, Bull. Soc. Fouad I. Ent. 31 p. 78 T. 5 F. 14—16 (D ♂♀).

♂ **albibarbis** (Simon) 1871. Marokko
Attus a. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 225 (D ♂).
N. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 667 (N).

♂ **cerussata** (Simon) 1868. Sizilien, Corfu, I. Syra, Syrien, Aegypten
Attus c. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 615 (D ♂).
N. c. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 316 (N).
N. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 667 (N).

♀ **fulvopilosa** (Lucas) 1846. Algier, Tunis
Salticus f. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 171 T. 9 F. 1 (D ♀).
N. f. Simon 1885, Arachn. in: Explor. Sci. Tunis. p. 5 (N).
N. f. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 285 (D).

♂♀ **membrosa** (Simon) 1868. – * S.-Europa, Algier, Palästina

Attus m. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 617 (D ♂♀).
Attus m. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 225 (N).
Ballus m. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 182 (D ♂♀).
Neera m. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 200 (D ♂♀).
N. m. Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 174 T. 16 F. 7 (N ♀).
N. m. Chyzer & Kulczynski 1897, Aran. Hungar. 2 (2) p. 295 (D ♂♀).
N. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 671 f. 783 (N).
N. m. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1234, 1269 f. 2000—2002 (D ♂♀).

Transgredierende Arten:

♂♀ **oculata** (Cambridge) 1876. Aegypten, Yemen

Attus o. Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 612 T. 60 F. 90 (D ♂♀).
N. o. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 667 (N).

♂♀ **ravoisiaei** (Lucas) 1846. Algier, O.-Afrika

Salticus r. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 165 T. 8 F. 4 (D ♀).
Calliethera ruvoisoei Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 328 (C).
N. r. (? = amanicola) Strand 1907, Zool. Jahrb. Syst. 25 (5—6) p. 720 (D ♂).

Aethiopische Arten:

♂ **alborufula** Caporiacco 1949. Kenya

N. a. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 476 f. 91 (D ♂).

♂ **catula** Simon 1885. Sansibar, S.-Afrika

N. c. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 391 (D ♂).
N. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 667 (N).

♂ **catulina** Berland & Millot 1941. Franz. Sudan

N. c. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 308 f. 9, 10 (D ♂).

♂♀ **heteropogon** Simon 1910. I. Possession

N. h. Simon 1910, Denkschr. Med. Nat. Ges. Jena 16 p. 217 (D ♂♀).

♀ **quadrimaculata** Lawrence 1927. SW.-Afrika

N. q. Lawrence 1927, Ann. S. Afr. Mus. 25 (1) p. 61 T. 2 F. 48 (D ♀).

Gen. **Paraneaetha** Denis 1947.

♀ **diversa** Denis 1947. Oase Siwah

P. d. Denis 1947, Bull. Soc. Fouad I. Ent. 31 p. 77 T. 5 F. 13 (D ♀).

Gen. **Pellenes** Simon 1876.

Palaearktische Arten:

§ 6 ♂, 6 ♀: Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 91—92.
§ 4 Arten: Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 311.
§ 3 ♂, 3 ♀: Chyzer & Kulczynski 1897, Aran. Hungar. 2 (2) p. 292—293.
§ 2 ♂, 2 ♀: Roewer 1928, Tierw. Mitteleurop. 3 (6) p. 42 TF. 476—478.
§ 6 ♂, 6 ♀: Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1229—1233.

♂♀ **allegrii** Caporiacco 1935. Karakorum

P. a. Caporiacco 1935, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 213 T. 5 F. 9 (D ♂♀).

♂♀ **arcigerus** (Walckenaer) 1837. S.-Europa

Attus a. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 421 (D ♀).
Dia a. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 502 (C).
Attus semiater Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 584 (D ♀).
Attus semiater Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 151 (N).
P. a. Simon 1876, Aradin. de France 3 p. 95 T. 9 F. 15 (D ♂♀).
P. semiater Simon 1876, Aradin. de France 3 p. 97 (D ♀).
Euophrys a. Pavesi 1878, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 11 p. 820 (N).
P. a. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1233, 1268 f. 1996—1998 (D ♂♀).
P. semiater Schenkel 1938, Ark. Zool. 30 (A; 24) p. 21 f. 10 (D ♀).

♂♀ **brevis** (Simon) 1868. Frankreich, Spanien, Rhodos

Attus b. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 48 (D ♂♀).
P. b. Simon 1876, Aradin. de France 3 p. 99 (D ♂♀).
P. b. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1233, 1269 f. 1999 (D ♂♀).
P. b. Caporiacco 1948, Redia 33 p. 72 (N ♀).

♀ **campylophorus** (Thorell) 1875. Krim, Ungarn

Attus c. Thorell 1875, Hor. Soc. Ent. Ross. 11 p. 116 (D ♀).
Attus c. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 186 (D ♀).
P. c. Simon 1876, Aradin. de France 3 p. 101 (C).
P. bedeli Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 36 (D ♀, nec ♂).
P. c. Chyzer & Kulczynski 1897, Aran. Hungar. 2 (2) p. 293 T. 10 F. 60 (D ♀).

♀ **canosus** Simon 1937. O.-Pyrenäen

P. c. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1233, 1269 f. 1995 (D ♀).

♂♀ **diagonalis** (Simon) 1868. Corfu, I. Syra, Türkei, Syrien

Attus lippiens L. Koch 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 881 (D ♀, nec ♂).
Attus d. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 46 (D ♂♀).
P. d. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 313 (N).

♂ **duriaei** (Lucas) 1846. Algier

Salticus d. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 178 T. 9 F. 5 (D ♂).
P. d. Simon 1876, Aradin. de France 3 p. 101 (C).

♂ **epularis** (Cambridge) 1872. Syrien

Salticus e. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 329 (D ♂).
P. e. Simon 1876, Aradin. de France 3 p. 101 (C).

♀ **flavipalpis** (Lucas) 1853. Attika, Creta, Cypern

Salticus f. Lucas 1853, Rev. Mag. Zool. 11 p. 520 T. 16 F. 3 (D ♀).
Attus f. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 542 (D ♀).
Attus f. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 159 (N ♀).
Attus f. Pavesi 1876, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 19 (1) p. 24 (N).
P. f. Simon 1887, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 312 (D ♀).

♀ **frischii** (Audouin) 1827. Aegypten

Attus f. Audouin 1827, Explic. Planch. Arachn. Savigny Descr. Egypt. p. 406 T. 7 F. 11 (D ♀).
P. fischeri Simon 1876, Aradin. de France 3 p. 101 (C).

♀ **gemellus** (Simon) 1873. Italien

Attus g. Simon 1873, Mém. Soc. Sci. Liège (2) 5 p. 350 (166) (D ♀).
P. g. Simon 1876, Aradin. de France 3 p. 101 (C).

♂♀ **geniculatus** (Simon) 1868. Frankreich, Spanien, Corsica, Sardinien, Sizilien, Corfu, Syrien

Attus g. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 49 (P ♂).
Attus g. Simon 1870, Bull. Soc. Ent. Ital. 2 p. 64 (D ♂).
Attus g. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 152 (N).
P. g. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 97 (D ♂).
P. g. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1231, 1269 f. 1990, 1991 (D ♂♀).

O♀ **geniculatus subsultans** (Simon) 1868. S.-Frankreich

Attus subsultans Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 616 (D O).
P. subsultans Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 100 (D ♀).
P. g. s. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1231, 1269 (D ♀).

♀ **gobiensis** Schenkel 1936. Mongolei

P. g. Schenkel 1936, Ark. Zool. 29 (A; 1) p. 307 f. 108 (D ♀).

♂♀ **ignifrons** (Grube) 1861. Sibirien

Attus i. Grube 1861, Bull. Ac. Sci. St. Petersbg. 4 p. 176 (D ♀).
P. i. Kulczynski 1895, Dissert. Ac. Cracov. 32 p. 83 T. 2 F. 15—18 (D ♂♀).

♀ **kraepelinorum** Bösenberg 1895. Canaren

P. k. Bösenberg 1895, Abh. Nat. Ver. Hambg. 13 p. 11 TF. 13 (D ♀).

♂ **laevigatus** (Simon) 1868. Corfu, I. Syra, Libanon

Attus l. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 51 (D ♂).
Attus calvus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 594 (D O).
Euophrys calva Pavesi 1877, Rendic. Ist. Lombard. (2) 10 (11) p. 327 (C).
P. l. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 312 (N).

♂♀ **lapponicus** (Sundevall) 1832. Pyrenäen, Alpen, N.-Europa

Attus l. Sundevall 1832, Vet. Ak. Handl. p. 212 (D ♂).
Attus ricinatus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 37 (D ♂ o).
P. l. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 92 T. 9 F. 17 (D ♂ o).
P. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 659 f. 789 (N ♂).
P. l. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 587 f. 247, 248 (D ♂♀).
P. l. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1231, 1268 f. 1988, 1989 (D ♂).
P. l. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 39 (N).
P. l. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 60 T. 6 F. 109—110 (D ♂♀).

♀ **levaillantii** (Lucas) 1846. Algier

Salticus l. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 177 T. 8 F. 3 (D ♀).
Attus l. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 160 (N).
P. l. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 101 (C).
P. l. Denis 1939, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 1057 T. 5 F. 15 (N ♀).

♂ **limbatus** Kulczynski 1895. Sibirien

P. l. Kulczynski 1895, Rozpraw. Ak. Umiej. Krakow. (2) 12 p. 87 T. 2 F. 19—21 (D ♂).

♂♀ **maderianus** Kulczynski 1905. Madeira

P. m. Kulczynski 1905, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 457 (D ♂).
P. m. Schenkel 1938, Ark. Zool. 30 (2) p. 36 f. 12 (D ♂♀).

♂♀ **nigrociliatus** (L. Koch) 1875. Frankreich, Mitteleuropa, Balkangebiet, Ukraine, Japan

Attus n. L. Koch 1875, Abh. Nat. Ges. Görlitz 15 p. 14 T. 1 F. 9—11 (D ♂♀).
Attus bedeli Simon 1875, Ann. Soc. Ent. France (5) 5, Bull. p. 93 (D ♂♀).

P. bedeli Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 98 T. 9 F. 13, 14 (D ♂♀).
P. n. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 101 (C).
P. brassayi Herman 1879, Ungarns Spinn. Faun. 3 p. 316, 386 T. 10 F. 216 (D ♀).
P. bedeli Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 36 (D ♂, nec ♀).
P. n. Chyzer & Kulczynski 1897, Aran. Hungar. 2 (b) p. 293 T. 10 F. 57 (N).
P. n. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 423 T. 40 F. 622 (D ♂♀).
P. n. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 588 (D ♂♀).
P. n. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 49 f. 152, 155 (D ♂♀).
P. n. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1232, 1268 f. 1992—1994 (D ♂♀).

♀ **nigrociliatus bilunatus** (Simon) 1877. Frankreich

P. bilunatus Simon 1877, Ann. Soc. Ent. France (5) 7, Bull. p. 74 (D ♀).
P. n. b. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1232, 1268 (D ♀).

♂ **ostrinus** (Simon) 1868. Corfu, Syrien

Attus o. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 52 (D ♂).
P. o. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 311 (N).

♂♀ **seriatus** (Thorell) 1875. Krim, S.-Russland

Attus s. Thorell 1875, Hor. Soc. Ent. Ross. 11 p. 116 (D ♂♀).
Attus s. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 185 (D ♂♀).
P. s. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 101 (C).

♂ **simonii** (Cambridge) 1872. Syrien, Irak

Salticus s. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 329 (D ♂).
P. s. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 101 (C).

♂o **tauricus** (Thorell) 1875. Krim, Bulgarien

Attus t. Thorell 1875, Hor. Soc. Ent. Ross. 11 p. 116 (D ♂ o).
Attus t. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 187 (D ♂ o).
P. t. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 101 (C).

♂♀ **tripunctatus** (Walckenaer) 1802. – * Europa, Sibirien, Kamtschatka

Aranea t. Walckenaer 1802, Faun. Paris. 2 p. 247 (D ♀).
Attus t. Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 24 (N).
Attus crucigerus Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 25 (N).
Salticus crux Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 69 TF. 52 (D ♀).
Attus crucifer Sundevall 1832, Vet. Ak. Handl. p. 215 (D ♂♀).
Attus rufifrons Sundevall 1832, Vet. Ak. Handl. p. 216 (D ♂).
Euophrys crucifera C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 33 (N).
Attus psyllus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 407 (D ♂♀).
Attus t. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 418 (D ♀).
Attus crucigerus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 420 (D ♀).
Attus psyllus Walckenaer 1841, Hist. Nat. Ins. Apt. 2 p. 247 (N ♂♀).
Euophrys crucifera C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 226 TF. 1270, 1271 (D ♂♀).
Euophrys quinquepartita C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 27 TF. 1297 (D ♀, nec ♂).
Pales crucigera C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 65 (N).
Attus crucigerus Westring 1862, Aran, Svec. p. 571 (D ♂♀).
Pales crucifer Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 312 (C).
Ino psylla Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 312 (C).
Maturna fusca Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 313 (C).
Pales t. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 503 (C).
Euophrys crucifera Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 159 (D ♂♀).
P. t. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 94 T. 9 F. 16 (D ♂♀).

Attus crucigerus Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 488 T. 80 F. 276 (D ♂♀).
P. t. Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 41 T. 3 F. 3 (D ♂♀).
Attus crucigerus Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 77 (D ♂♀).
Attus crucigerus Hansen 1885, in: Schiödte, Zool. Danica p. 161 (D ♂♀).
P. crucigerus Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 314 (D).
P. t. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 36 T. 1 F. 11 (D ♂♀).
P. t. Kulczynski 1895, Dissert. Ac. Cracov. 32 p. 82 T. 2 F. 37—40 (N ♂♀).
P. t. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 423 T. 40 F. 623 (D ♂♀).
P. t. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 670 f. 788 (N ♂).
Hasarius cruciger Soerensen 1904, Ent. Meddel. (2) 1 p. 349 (N).
P. t. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 588 (D ♂♀).
P. t. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 49 f. 150, 151 (D ♂♀).
P. t. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1230, 1268 f. 1984—1987 (D ♂♀).
P. t. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 59 T. 6 F. 107—108 (D ♂♀).
P. t. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 243 f. 109 A, B (D ♂♀).

♂ **unipunctus** Saito 1937. Mandchoukuo
P. u. Saito 1937, Annot. Zool. Japon. 16 (2) p. 154 f. 2 (D ♂).

Aethiopische Arten:

♀ **aethiopicus** Strand 1906. Abessinien
P. a. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 663 (D ♀).
P. a. Strand 1906, Societ. Ent. 24 p. 13 (D ♀).

♂♀ **beanii** Peckham 1903. Capland
P. b. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 236 T. 27 F. 2 (D ♂♀).

♂♀ **dahli** Lessert 1915. Uganda
P. d. Lessert 1915, Rev. Suisse Zool. 23 (1) p. 76 T. 3 F. 72, 81—83 (D ♂♀).

♀ **iforhasorum** Berland & Millot 1941. Franz. Sudan
P. i. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 309 f. 11 (D ♀).

♀ **mimicus** Strand 1906. Abessinien
P. m. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 663 (D ♀).
P. m. Strand 1906, Societ. Ent. 24 p. 12 (D ♀).

o **obliquostriatus** Caporiacco 1940. Abessinien
P. o. Caporiacco 1940, Atti Accad. Ital. 11 (18) p. 859 (D o).

♀ **purcelli** Lessert 1915. Uganda
P. p. Lessert 1915, Rev. Suisse Zool. 23 (1) p. 79 T. 3 F. 73 (D ♀).

♂ **rufoclypeatus** Peckham 1903. Natal
P. r. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 235 T. 27 F. 1 (D ♂).

Orientalische Arten:

♀ **dyali** Roewer 1951. Panjab
Habrocestum coronatum Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 228 (D ♀) (praeocc. Peckham 1888).
P. d. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 452 (nom. nov.).

Neotropische Arten:

§ 4 ♂, 4 ♀: F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 242 (sub **Habronattus**).

♂ **ammophilus** Chamberlin 1924. Nieder-Californien

P. a. Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 689 f. 134, 135 (D ♂).

♀ **anepsius** Chamberlin 1924. Nieder-Californien

P. a. Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 690 f. 136 (D ♀).

♀ **angelus** Chamberlin 1924. Nieder-Californien

P. a. Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 691 f. 137 (D ♀).

♂♀ **aztecanus** (Banks) 1898. Mexico

Habrocestum a. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 287 T. 17 F. 9 (D ♂♀).
P. a. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 204 (D ♂).
Habronattus a. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 246 (N ♂).

♀ **banksi** Peckham 1901. Jamaica

P. b. Peckham 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. (2) p. 12 T. 3 F. 7 (D ♀).

♀ **belligerus** (Peckham) 1896. Guatemala

Habrocestum b. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 60 T. 5 F. 5 a (nec 5) (D ♀).
P. b. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 208 (D ♀).
Habronattus b. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 244 T. 21 F. 3 (N ♀).

♂ **cambridgei** (Bryant) 1948 Mexico

Habronattus c. Bryant 1948, Psyche 55 (2) p. 64 T. 10 F. 13, 15, 16 (D ♂).

♀ **cinctipes** (Banks) 1898. Nieder-Californien

Habrocestum c. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 288 T. 17 F. 11 (D ♀).
P. c. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 208 (D ♀).

♂♀ **conjunctus** (Banks) 1898. Nieder-Californien

Habrocestum c. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 286 T. 17 F. 8 (D ♂♀).
P. c. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 203 (D ♂).

♀ **contigens** Chamberlin 1925. Mexico

P. c. Chamberlin 1925, Proc. Calif. Ac. Sci. (4) 14 (7) p. 139 f. 61 (D ♀).

♀ **corticolens** Chamberlin 1924. Nieder-Californien

P. c. Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 692 f. 138 (D ♀).

♂♀ **divaricatus** (Banks) 1898. Nieder-Californien

Habrocestum d. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 287 T. 17 F. 7 (D ♂♀).
P. d. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 203 (D ♂).

♂ **dorsalis** (Banks) 1898. Mexico

Habrocestum d. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 287 T. 17 F. 12 (D ♂).
P. d. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Ac. Sci. Soc. 1 (4) p. 205 (D ♂).

♀ **dubitatus** (Banks) 1898. Nieder-Californien

Habrocestum d. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 288 T. 17 F. 10 (D ♀).

P. d. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 209 (D ♀).

♀ **ensenadae** Petrunkevitch 1930. Portorico

P. e. Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 31 p. 178 f. 161, 162 (D ♀).

♀ **hondurasus** Roewer 1951. Honduras

Habrocestum latens Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 60 T. 5 F. 6 (D ♀) (praeocc. Banks 1892).

P. latens Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 207 (D ♀).

Habronattus latens F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 245 T. 21 F. 7 (N ♀).

P. h. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 452 (nom. nov.).

♂♀ **mexicanus** (Peckham) 1896. Mexico, Guatemala

Habrocestum m. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 61 T. 5 F. 7 (D ♂♀).

P. m. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 203, 208 (D ♂♀).

Habronattus m. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 243 T. 21 F. 1—3 (D ♂♀).

♂ **paratus** (Peckham) 1896. Guatemala, Panama

Habrocestum p. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 63 T. 5 F. 8 (D ♂).

P. p. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 204 (D ♂).

Habronattus p. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 245 T. 21 F. 8 (N ♂).

Habronattus p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 281 f. 242—245 (D ♂♀).

♂ **perfidus** (F. Cambridge) 1901. Guatemala

Habronattus p. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 245 T. 21 F. 10 (D ♂).

♀ **placidus** Peckham 1900. Mexico

P. p. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 206, 223 T. 1 F. 18 (D ♀).

Habronattus p. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 303 (N ♀).

♀ **polius** Chamberlin 1924. Nieder-Californien

P. p. Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 692 f. 139 (D ♀).

♂♀ **pretiosus** (Bryant) 1947. Portorico

Habronattus p. Bryant 1947, Psyche 54 (3) p. 189 T. 16 F. 7, 9 (D ♂♀).

♀ **pyrithrix** Chamberlin 1924. Nieder-Californien

P. p. Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 693 f. 140 (D ♀).

♀ **simplex** Peckham 1900. Mexico

P. s. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 206, 220 T. 1 F. 12 (D ♀).

Habronattus s. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 303 (N ♀).

♂ **translatus** Peckham 1901. Jamaica

P. t. Peckham 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. (2) p. 11 T. 3 F. 6 (D ♂).

P. facetus Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 31 p. 181 f. 163—164 (D ♀).

P. t. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 492 (N ♂♀).

♂ **trimaculatus** (Bryant) 1945. Florida

Habronattus t. Bryant 1945, Psyche 52 (3—4) p. 187 T. 15 F. 11 (D ♂).

♀ **zebraneus** (F. Cambridge) 1901. Mexico

Habronattus z. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 245 T. 21 F. 9 (D ♀).

Transgredierende Arten:

♂♀ **brunneus** Peckham 1900. Utah, Colorado, Neu-Mexico, Florida

P. b. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 200, 210 T. 1 F. 2 (D ♂).
P. festus Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 202, 215 T. 1 F. 5 (D ♂).
P. klauserii Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 202, 216 T. 1 F. 6 (D ♂).
P. klauserii Banks 1904, Journ. N. York Ent. Soc. 12 p. 118 (N ♂♀).
P. b. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 542 T. 44 F. 8; T. 45 F. 4 (D ♂♀).

♂♀ **brunneus insignis** (Bryant) 1942. Haiti, San Domingo, Virgin-Isl.

Habronattus b. i. Bryant 1942, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 89 (7) p. 357 T. 3 F. 35 (D ♂♀).
Habronattus b. i. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 487 (N).

♂♀ **calcaratus** Banks 1904. Tennessee, Georgia, Florida, Connecticut

Habronattus peregrinus Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 61 T. 4 F. 44, 44 b (D ♂, part.).
P. c. Banks 1904, Journ. N. York Ent. Soc. 12 p. 117 T. 6 F. 17, 19 (D ♂♀).
P. c. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 546 T. 45 F. 7; T. 47 F. 8 (D ♂♀).
P. c. Kaston 1938, Bull. Connect. Geol. Nat. Hist. Surv. 60 p. 196 (N).
Habronattus c. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 198 (N ♂♀).
Habronattus peregrinus Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 158 f. 29—32 (D ♂, nec ♀).
Habronattus c. Kaston 1945, Amer. Mus. Novit. 1290 p. 15 TF. 46, 47, 70 (N ♂♀).
Habronattus c. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 465 T. 92 F. 1707; T. 93 F. 1725—27 (D ♂♀).

♂♀ **coecatus** (Hentz) 1846. U. St. Amerika, Mexico

Attus coronatus Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 361 T. 22 F. 1 (D ♂) (praeocc. Walckenaer 1805).
Attus c. Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 361 T. 22 F. 2 (D ♂).
Attus cristatus Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 363 T. 22 F. 8 (D ♀).
Habrocestum coronatum Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 59 (D O).
Habrocestum c. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 60 T. 1 F. 42; T. 4 F. 42 (D ♂♀).
Habrocestum cristatum Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 62 T. 1 F. 45; T. 4 F. 45 (D ♀).
P. c. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 201, 214 (D ♂).
P. cristatus Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 207 (D ♀).
Habronattus c. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 246 (N).

P. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 659 f. 784—786 (N).
P. coronatus Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 545 T. 45 F. 3 (D ♂♀).
Habronattus coronatus Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 198 (N ♂♀).
Habronattus coronatus Kaston 1945, Amer. Mus. Novit. 1290 p. 15 TF. 51—52 (N ♂♀).
Habronattus coronatus Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 466 T. 92 F. 1710; T. 93 F. 1731—32 (D ♂♀).

♂♀ **fallax** Peckham 1909. Guatemala, Mexico, Texas

Habronattus viridipes F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 244 T. 2 F. 4, 5 (D ♂♀).
P. f. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 553 T. 47 F. 5; T. 49 F. 3 (D ♂♀).

Nearktische Arten:

§ 30 ♂, 28 ♀: Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 530—534.
§ 4 ♂, 4 ♀: Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 152 (sub **Habronattus**).
§ 7 ♂, 6 ♀: Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum 47, Bull. 70 p. 463—464 (sub **Habronattus**).

♂ **altanus** Gertsch 1934. Alberta, Wyoming

P. a. Gertsch 1934, Amer. Mus. Novit. 726 p. 21 TF. 21 (D ♂).
Habronattus a. Levi 1951, Zoologica. N. York 36 (4) p. 230 f. 32, 35 (N ♀).

♂♀ **americanus** (Keyserling) 1885. Utah, Californien, Canada, Brit. Columbia, Wyoming

Ephippus a. Keyserling 1885, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. 506 T. 13 F. 13 (D ♂).
P. speciosus Banks 1904, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 3 (13) p. 359 T. 40 F. 39 (D ♂♀).
P. a. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 537 T. 46 F. 6 (D ♂♀).
Habronattus a. Levi 1951, Zoologica, N. York 36 (4) p. 232 (N).

♂ **amicus** Peckham 1909. Californien

P. a. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 539 T. 46 F. 7 (D ♂).

♂ **arizonensis** Banks 1904. Arizona

P. a. Banks 1904, Journ. N. York Ent. Soc. 12 p. 118 T. 6 F. 22 (D ♂).
P. a. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 535 T. 49 F. 5 (D ♂).

♂♀ **auratus** (Peckham) 1888. U. St. Amerika

Habrocestum a. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 63 T. 1 F. 46; T. 4 F. 46 (D ♂♀).
Habrocestum agilis Banks 1893, Journ. N. York Ent. Soc. 1 p. 126 (D ♂♀).
Habrocestum a. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 59 T. 5 F. 4 (N ♀).
P. a. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 202, 208 (D ♂♀).
P. cognatus Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 206, 224 T. 1 F. 19 (D ♀).
P. cognatus Banks 1901, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 53 p. 592 (N ♀).
Habrocestum a. Emerton 1902, Comm. Spid. p. 44 f. 122—125 (D ♂♀).
P. agilis Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 535 T. 46 F. 1 (D ♂♀).
P. agilis Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 230 T. 12 F. 3 (D ♂♀).

P. agilis Kaston 1938, Bull. Connect. Geol. Nat. Hist. Surv. 60 p. 196 (N).
Habronattus agilis Chamberlin & Ivie, 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 197 (N).
Habronattus agilis Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 48, Bull. 70 p. 467 T. 90 F. 1683—1685; T. 91 F. 1698—1700; T. 92 F. 1701—1702 (D ♂♀).

♂♀ **birgei** Peckham 1900. Texas

P. b. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 202, 217 T. 1 F. 8 (D ♂).
P. delectus Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 550 T. 47 F. 6; T. 49 F. 1 (D ♂♀).

♂♀ **borealis** (Banks) 1895. U. St. Amerika

Habrocestum b. Banks 1895, Canad. Ent. 27 p. 101 (D ♂).
P. b. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 204, 208 (D ♂♀).
P. b. Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 231 T. 12 F. 4 (D ♂♀).
P. b. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 540 T. 48 F. 3 (D ♂♀).
P. b. Kaston 1938, Bull. Connect. Geol. Nat. Hist. Surv. 60 p. 196 (N).
Habronattus b. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 154 f. 21—24 (D ♂♀).
Habronattus b. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 466 T. 92 F. 1708—1709; T. 93 F. 1728—1730 (D ♂♀).

♂ **bulbipes** Chamberlin & Ivie 1941. Californien

P. b. Chamberlin & Ivie 1941, Bull. Univ. Utah 31 (8), Biol. 6 (3) p. 34 TF. 46—48 (D ♂).

♂ **californicus** Banks 1904. Californien

P. c. Banks 1904, Journ. N. York Ent. Soc. 12 p. 117 T. 6 F. 16, 25 (D ♂).
P. c. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 544 T. 45 F. 1 (D ♂).

♀ **candidus** Peckham 1900. Utah

P. c. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 206, 221 T. 1 F. 14 (D ♀).
P. c. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 543 T. 48 F. 10 (D ♀).

♂ **captiosus** Gertsch 1934. Minnesota

P. c. Gertsch 1934, Amer. Mus. Novit. 726 p. 20 (D ♂).

♀ **carolinensis** Peckham 1900. S.-Carolina, Georgia

P. c. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 206, 219 T. 1 F. 10 (D ♀).
P. c. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 549 T. 48 F. 6 (D ♀).
Habronattus c. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 198 (N).

♂ **clypeatus** (Banks) 1895. Utah, Arizona, Colorado

Habrocestum c. Banks 1895, Canad. Ent. 27 p. 102 (D ♂).
P. c. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 205 (D ♂).
P. formosus Banks 1905, Proc. Ent. Soc. Wash. 7 p. 99 T. 2 F. 13, 19 (D ♂).
P. c. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 548 T. 44 F. 12; T. 45 F. 2 (D ♂).

♂♀ **cockerelli** Banks 1901. Neu-Mexico

P. c. Banks 1901, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 53 p. 591 T. 23 F. 16, 17 (D ♂♀).
P. c. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 550 T. 46 F. 5 (D ♂♀).

♂♀ **decorus** (Blackwall) 1846. U. St. Amerika, Canada

Salticus d. Blackwall 1846, Ann. Mag. Nat. Hist. (1) 17 p. 34 (D ♂).
Attus roseus Hentz 1846, Journ. Boston Soc. Nat. Hist. 5 p. 362 T. 22 F. 4 (D ♂).
Attus splendens Peckham 1883, Descr. Spid. Fam. Attid. p. 4 T. 1 F. 3 (D ♂♀).
P. nigriceps Keyserling 1885, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. 512 T. 13 F. 17 (D ♀).
Habrocestum splendens Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 65 T. 1 F. 48; T. 5 F. 48 (D ♂♀).
Habrocestum splendens Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 244 T. 20 F. 5 (D ♂).
P. splendens Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 204, 208, (D ♂♀).
Habrocestum splendens Emerton 1902, Common Spid. p. 46 f. 129 (D ♂♀).
P. roseus Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 229 T. 12 F. 2 (D ♂♀).
P. roseus Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 567 T. 48 F. 11 (D ♂).
P. splendens Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 569 T. 47 F. 2; T. 48 F. 8 (D ♂♀).
P. roseus Kaston 1938, Bull. Connect. Geol. Nat. Hist. Surv. 60 p. 196 (N).
Habronattus d. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 155 f. 25—28 (D ♂♀).
Habronattus d. Kaston 1946, Amer. Mus. Novit. 1290 p. 16 TF. 53, 71, 72 (N ♂♀).
Habronattus d. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 468 T. 92 F. 1711—1712; T. 93 F. 1733—1735 (D ♂♀).

♀ **dolosus** Peckham 1900. Arizona, Californien

P. d. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 207, 224, T. 1 F. 20 (D ♀).
P. d. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 551 T. 48 F. 1 (D ♀).

♂♀ **dorotheae** Gertsch & Mulaik 1936. Texas

P. d. Gertsch & Mulaik 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 16 TF. 28 (D ♂♀).

♂♀ **eleganoides** Chamberlin & Ivie 1941. Californien

P. e. Chamberlin & Ivie 1941, Bull. Univ. Utah 31 (8), Biol. 6 (3) p. 33 TF. 42—45 (D ♂♀).

♂♀ **eleganoides suranus** Chamberlin & Ivie 1941. Californien

P. e. s. Chamberlin & Ivie 1941, Bull. Univ. Utah 31 (8), Biol. 6 (3) p. 34 (D ♂♀).

♂ **elegans** Peckham 1900. Californien

P. e. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 201, 212 T. 1 F. 3 (D ♂).
P. e. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 552 T. 44 F. 9; T. 46 F. 4 (D ♂).

♂ **elegans georgiensis** Chamberlin & Ivie 1944. Georgia

P. e. g. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 198 (D ♂).

♂♀ **forticulus** Gertsch & Mulaik 1936. Texas

P. f. Gertsch & Mulaik 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 18 TF. 29, 30 (D ♂♀).

♀ **grammaticus** Chamberlin 1925. Arizona

P. g. Chamberlin 1925, Proc. Calif. Ac. Sci. (4) 14 (7) p. 140 f. 62 (D ♀).

♀ **griseus** Peckham 1900. Utah, Californien

P. g. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 206, 221 T. 1 F. 13 (D ♀).

P. g. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 554 T. 48 F. 12 (D ♀).

♂♀ **hirsutus** (Peckham) 1888. U. St. Amerika

Habrocestum h. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 64 T. 4 F. 47 (D ♂).

P. h. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 200, 205, 211 (D ♂♀).

P. h. Banks 1901, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 53 p. 591 (N).

P. h. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 555 T. 46 F. 2 (D ♂♀).

♀ **hutchinsonii** Peckham 1909. Californien, Washington-St.

P. h. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 559 T. 48 F. 13 (D ♀).

♀ **jucundus** Peckham 1909. Californien, Columbia-St., Canada

P. j. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 560 T. 48 F. 7 (D ♀).

♂ **lagganii** Peckham 1909. Columbia-St., Canada, Wyoming

P. l. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 560 T. 49 F. 2 (D ♂).

P. l. Levi 1951, Zoologica, N. York 36 (4) p. 232 f. 47, 49 (N ♀).

♀ **leuceres** Chamberlin 1925. Alabama

P. l. Chamberlin 1925, Proc. Calif. Ac. Sci. (4) 14 (7) p. 141 f. 63 (D ♀).

♂♀ **limatus** Peckham 1900. Californien, Texas

P. l. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 202, 217 T. 1 F. 7 (D ♂).

P. townsendii Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 207, 218 T. 1 F. 9 (D ♀).

P. l. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 561 T. 48 F. 2 (D ♂♀).

♂♀ **longimanus** Emerton 1913. New Jersey

P. l. Emerton 1913, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 32 p. 258 T. 48 F. 9 (D ♂♀).

P. l. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 462 T. 91 F. 1695—1697 (D ♂♀).

♀ **mimulus** Chamberlin & Gertsch 1929. Utah

P. m. Chamberlin & Gertsch 1929, Journ. Ent. Zool. Claremont 21 (3) p. 111 T. 1 F. 47 (D ♀).

♂♀ **montanus** (Emerton) 1894. Colorado, Canada

Habrocestum m. Emerton 1894, Trans. Connect. Ac. Sci. 9 (6a) p. 420 T. 1 F. 6 (D ♂♀).

P. m. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 204, 207 (D ♂♀).

P. m. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 562 T. 47 F. 9 (D ♂♀).

♂♀ **moratus** Gertsch & Mulaik 1936. Texas

P. m. Gertsch & Mulaik 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 17 TF. 26, 27 (D ♂♀).

♀ **mundus** Peckham 1909. Oregon

P. m. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 563 T. 47 F. 4 (D ♀).

♂♀ **mustaciata** Chamberlin & Ivie 1941. Californien

P. m. Chamberlin & Ivie 1941, Bull. Univ. Utah 31 (8), Biol. 6 (3) p. 37 TF. 50—55 (D ♂♀).

♀ **nemoralis** Peckham 1900. Arizona
P. n. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 205, 221 T. 1 F. 15 (D ♀).
P. n. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 564 T. 48 F. 9 (D ♀).

♀ **neomexicanus** Chamberlin 1925. Neu-Mexico
P. n. Chamberlin 1925, Proc. Calif. Ac. Sci. (4) 14 (7) p. 142 f. 64 (D ♀).

♂♀ **nigripes** Chamberlin & Ivie 1941. Californien
P. n. Chamberlin & Ivie 1941, Bull. Univ. Utah 31 (8), Biol. 6 (3) p. 35 TF. 56—60 (D ♂♀).

♂♀ **oregonensis** (Peckham) 1888. Oregon, Neu-Mexico, Californien
Habrocestum o. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 66 T. 5 F. 49 (D ♂).
P. o. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 203 (D ♂).
P. o. Banks 1901, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 53 p. 591 (N ♂).
P. o. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 564 f. p. 359 T. 45 F. 6 (D ♂♀).

♂ **pacificus** Banks 1904. Californien
P. p. Banks 1904, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 3 (13) p. 359 T. 39 F. 37 (D ♂).

♂ **peckhami** Banks 1921. Californien
P. p. Banks 1921, Proc. Calif. Ac. Sci. (4) 21 p. 102 (D ♂).

♂ **peninsulanus** Emerton 1925. Neu-Schottland
P. p. Emerton 1925, Canad. Ent. 57 p. 68 f. 6 (D ♂).

♂ **philipi** Gertsch & Jellison 1939. Montana, Wyoming
P. p. Gertsch & Jellison 1939, Amer. Mus. Novit. 1032 p. 12 f. 1, 2 (D ♂).
P. p. Chamberlin & Ivie 1941, Bull. Univ. Utah 31 (8), Biol. 6 (3) p. 32 (N ♂♀).
Habronattus p. Levi 1951, Zoologica (N. York) 36 (4) p. 232 (N).

♀ **politus** Peckham 1900. Neu-Mexico
P. p. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 205, 222 T. 1 F. 17 (D ♀).
P. p. Banks 1901, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 53 p. 592 (N ♀).
P. p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 566 T. 46 F. 10 (D ♀).

♂ **rutherfordi** Gertsch & Mulaik 1936. Texas
P. r. Gertsch & Mulaik 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 16 (D ♂).
Habronattus r. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 469 T. 93 F. 1736—1737 (D ♂).

♀ **sabulosus** Peckham 1900. Georgia
P. s. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 206, 219 T. 1 F. 5, 11 (D ♀).
P. s. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 567 T. 48 F. 5 (D ♀).
Habronattus s. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 199 (N ♀).

♂♀ **sansoni** Emerton 1915. Canada
P. s. Emerton 1915, Trans. Connect. Ac. Sci. 20 p. 154 T. 3 F. 6 (D ♂♀).

♀ **scotsdalei** Peckham 1909. Arizona
P. s. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 568 T. 49 F. 6 (D ♀).

♂ **shoshonensis** Gertsch 1934. Idaho

P. s. Gertsch 1934, Amer. Mus. Novit. 726 p. 20 TF. 15, 16 (D ♂).

♂♀ **signatus** (Banks) 1900. Californien

Habrocestum s. Banks 1900, Canad. Ent. 32 p. 101 (D ♂♀).
P. s. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 202, 208 (D ♂♀).
P. s. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 569 T. 46 F. 3; T. 47 F. 3 (D ♂♀).

♀ **superciliosus** Peckham 1900. Arizona

P. s. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 205, 221 T. 1 F. 16 (D ♀).
P. s. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 571 T. 46 F. 9 (D ♀).

♂♀ **tachypodus** (Chamberlin & Ivie) 1944. Georgia

Habronattus t. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 199 TF. 207—210 (D ♂♀).

♂ **tarsalis** Banks 1904. Californien

P. t. Banks 1904, Journ. N. York Ent. Soc. 12 p. 118 T. 5 F. 5 (D ♂).
P. t. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 571 T. 44 F. 11; T. 46 F. 8 (D ♂).

♂ **texanus** Chamberlin 1924. Texas

P. t. Chamberlin 1924, Proc. U. Stat. Nat. Mus. 63 (13) p. 35 T. 7 F. 52 (D ♂).

♂ **tranquillus** Peckham 1900. Arizona

P. t. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 201, 213 T. 1 F. 4 (D ♂).
P. t. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 572 T. 44 F. 13 (D ♂).

♂ **tuberculatus** Gertsch & Mulaik 1936. Texas

P. t. Gertsch & Mulaik 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 14 TF. 25 (D ♂).

♂ **umatillus** Peckham 1909. Washington-St.

P. u. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 573 T. 47 F. 1; T. 49 F. 4 (D ♂).

♂♀ **viridipes** (Hentz) 1846. U. St. Amerika

Attus v. Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 362 T. 22 F. 5 (D ♂).
Attus peregrinus Peckham 1883, Descr. Spid. Fam. Attid. p. 17 T. 2 F. 13 (D ♂).
Habrocestum peregrinus Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 61 T. 4 F. 44a (D ♂, part.).
Habrocestum v. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 60 T. 4 F. 43 (D ♂, nec ♀).
Habrocestum peregrinus Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 245 T. 20 F. 6 (D ♂♀).
P. howardi Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 200, 208, 209 T. 1 F. 1 (D ♂♀).
P. peregrinus Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 203, 207 (D ♂, nec ♀).
Habrocestum peregrinus Emerton 1902, Common Spiders p. 45 f. 126—128 (D ♂♀).
P. v. Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 228 T. 12 F. 5 (D ♂♀).
P. v. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 574 f. p. 360 T. 44 F. 10; T. 45 F. 8 (D ♂♀).

P. peregrinus Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) **p.** 565 T. 45 F. 5; T. 47 F. 7 (D ♂♀).
Habronattus v. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 201 (N).
Habronattus peregrinus Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 158 f. 33 (D ♀, nec ♂).
Habronattus v. Kaston 1945, Amer. Mus. Novit. 1290 p. 14 TF. 48, 49, 69 (N ♂♀).
Habronattus v. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 464 T. 92 F. 1703—1706; T. 93 F. 1723—1724 (D ♂♀).

♂o **waughi** Emerton 1926. Canada

P. w. Emerton 1926, Canad. Ent. 58 p. 118 f. 10 (D ♂o).

Gen. **Philotheroides** Strand 1934.

O **setosus** (Thorell) 1895. Burma

Philotherus s. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 381 (D O).
Philotherus s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 870 (N).
P. s. Strand 1934, Folia Zool. Hydrobiol. 6 (2) p. 275 (nom. nov. gen.).

Gen. **Phlegra** Simon 1876.

Palaearktische Arten:

§ 5 ♂, 4 ♀: Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 121—122.
§ 3 ♂, 3 ♀: Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 32—33.
§ 2 ♂, 2 ♀: Roewer 1928, Tierw. Mitteleurop. 3 (6) p. 42 TF. 479—481.
§ 6 ♂, 6 ♀: Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1221—1225.

♂♀ **bresnieri** (Lucas) 1846. Mittelmeergebiet

Salticus b. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 154 T. 7 F. 8 (D ♂♀).
Attus linearis Rossi 1846, Heidinger Naturw. Abh. 1 p. 1 (D ♂♀).
Parthenia b. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 503 (C).
Attus lippiens L. Koch 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 881 (D ♂, nec ♀).
Attus lippiens Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 558 (D ♂).
Attus b. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 559 T. 6 F. 2 (D ♂♀).
Attus lippiens Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 175 (D ♂♀).
Aelurops b. Canestrini 1876, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 19 (1) p. 72 (25) (N).
P. b. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 124 T. 11 F. 11 (D ♂♀).
P. lippiens Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 126 (D ♂♀).
Ictidops lippiens Pavesi 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 11 p. 395 (N).
Ictidops b. Pavesi 1880, Ann. Mus. Civ. Genova 15 p. 382 (N).
P. b. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 313 (N).
P. b. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 33 T. 1 F. 18 (D ♂♀).
P. b. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1222, 1224, 1266 f. 1963, 1964, 1970 (D ♂♀).

♀ **bresnieri meridionalis** Strand 1906. Abessinien

P. b. m. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 664 (D ♀).
P. b. m. Strand 1909, Societ. Ent. 24 p. 37 (D ♀).

♂♀ **cinereofasciata** (Simon) 1868. S.-Frankreich

Attus c. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 554 (D ♀).
P. c. Simon 1876, Arachn de France 3 p. 122 (D ♂♀).
P. c. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1223, 1224, 1266 f. 1965, 1966, 1968 (D ♂♀).

♂♀ **flavipes** Denis 1947. Oase Siwah
P. f. Denis 1947, Bull. Soc. Fouad I. Ent. 31 p. 72 T. 5 F. 6—8 (D ♂♀).

♀ **fulvastra** (Simon) 1868. Sizilien, Syrien
Attus f. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 556 (D ♀).
Attus f. Simon 1870, Bull. Soc. Ent. Ital. 2 p. 65 (D ♀).
Attus f. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 177 (N)
P. f. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 127 (C).

♂ **fulvotrilineata** (Lucas) 1846. Algier
Salticus f. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 155 T. 7 F. 7 (D ♂).
Parthenia f. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 313 (C).
P. f. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 127 (C).

♂♀ **fuscipes** Kulczynski 1891. Unt.-Oesterreich, Ungarn, Dalmatien
P. f. Kulczynski 1891, in: Chyzer & Kulczynski, Aran. Hungar. 1 p. 33 T. 1 F. 19 (D ♂♀).

♂ **de lesserti** Schenkel 1918. Schweiz
P. l. Schenkel 1918, Verh. Nat. Ges. Basel 29 p. 101 f. 4 (D ♂).

♂ **lineata** (C. L. Koch) 1848. S.-Europa, Syrien
Europhrys l. C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 43 TF. 1303 (D ♂).
Parthenia l. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 313 (C).
Attus l. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 555 (D C).
P. l. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 127 (C).
Ictidops l. Pavesi 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 11 p. 395 (N).
P. l. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 313 (N).

♂♀ **loripes** Simon 1876. Frankreich, Spanien, Portugal
P. l. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 125 (D ♂).
P. l. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1222, 1225, 1266 f. 1971 (D ♂♀.)

♂ **memorialis** (Cambridge) 1876. Ober-Aegypten, Oase Siwah
Attus m. Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. London p. 617 (D ♂).
P. m. Denis 1947, Bull. Soc. Fouad I. Ent. 31 p. 74 T. 6 F. 9 (N ♂).

♂ **nitidiventris** (Lucas) 1846. Algier
Salticus n. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 138 T. 5 F. 10 (D ♂).
Heliophana n. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 333 (C).
P. n. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 127 (C).
Ictidops n. Pavesi 1880, Ann. Mus. Civ. Genova 15 p. 383 (N).

♂♀ **nobilis** (L. Koch) 1876. Oberitalien
Aelurops n. L. Koch 1876, Zeitschr. Ferdinand. Tirol (3) 20 p. 348 (D ♂♀).
P. n. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 112 (C).

♂ **numidica** (Lucas) 1846. Algier
Salticus n. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 152 T. 6 F. 10 (D ♂).
P. n. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 127 (N).

♂ **particeps** (Cambridge) 1872. Palästina
Salticus p. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 330 (D ♂).
P. p. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 127 (N).

♀ **proxima** Denis 1947. Oase Siwah
P. p. Denis 1947, Bull. Soc. Fouad I. Ent. 31 p. 73 T. 5 F. 9 (D ♀).

♂ **rogenhoferii** (Simon) 1868. Unt.-Oesterreich, SW.-Frankreich
Attus r. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 551 (D ♂).
P. r. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 127 (N).
P. r. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1223, 1266 f. 1967 (D ♂).

♂ **sapphirina** (Thorell) 1875. Algier
Aelurops s. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 194 (D ♂).
P. s. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 127 (N).

♂♀ **semiglabrata** (Simon) 1868. Spanien, Nied. Pyrenäen
Attus s. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 561 (D ♂).
Attus s. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 178 (N).
P. s. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 127 (N).
P. s. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1221, 1267 f. 1957—1959 (D ♂♀).

♀ **sierrana** (Simon) 1868. Spanien
Attus s. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 557 (D ♀).
P. s. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 127 (N).

♂ **simoni** L. Koch 1882. I. Mallorca
P. s. L. Koch 1882, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 31 p. 667 T. 2 F. 37, 38 (D ♂).

♀ **thibetana** Simon 1901. Tibet
P. t. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 73 (D ♀).
P. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 666 (N).

Transgredierende Arten:

♂♀ **fasciata** (Hahn) 1826. – * Palaearktis, Nearktis
Attus f. Hahn 1826, Monogr. d. Spinn. 4 p. 1 T. 12 F. D (D ♀).
Salticus f. Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 54 TF. 41 (D ♂♀).
Attus niger Sundevall 1832, Vet. Ak. Handl. p. 204 (D ♂♀).
Attus f. Waldkenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 404 (D ♂♀).
Attus divisus Waldkenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 443 (D ♂).
Attus leopardus Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 359 T. 21 F. 21 (D ♀).
Euophrys aprica C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 4 TF. 1274 (D ♂).
Parthenia f. C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 65 (C).
Attus f. Westring 1862, Aran. Svec. p. 566 (D ♂♀).
Ino nigra Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 312 (C).
Attus f. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 552 T. 2 F. 1 (D ♂♀).
Aelurops f. Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 385 (N).
P. f. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 123 (D ♂♀).
Aelurops f. Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 475 T. 78 F. 267 (D ♂♀).
Ictidops f. Bertkau 1880, Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf. 37 p. 234 (N).
P. f. Cambridge 1881, Proc. Dorset F. Cl. 2 p. 414 (D ♂♀).
P. f. Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 51 T. 4 F. 8 (D ♂♀).
Yllenus f. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 78 (D ♂♀).
P. f. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 323 (D).
P. leoparda Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 242 T. 21 F. 1 (D ♂♀).
P. f. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 33 (D ♂♀).
P. f. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 422 T. 40 F. 621 (D ♂♀).
P. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 670 (N).

P. leopardus Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 512 T. 42 F. 6 (D ♂♀).
P. f. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 586 (D ♂♀).
P. f. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 27 f. 78—79 (D ♂♀).
P. f. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1222, 1224 f. 1960—62, 1969 (D ♂♀).
P. f. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 37 f. . . (N).
P. f. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 203 f. 122—125 (D ♂♀).
P. f. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 21 T. 1 F. 15—17 (D ♂♀).
P. f. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 213 TF. 4 (N ♂).
P. f. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 460 T. 90 F. 1669—74 (D ♂♀).
P. f. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 237 f. 117 A, B (D ♂♀).

♂ **fasciata subfasciata** (Simon) 1871. Frankreich, Polen, Russland
Attus subfasciatus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 560 (D O).
Attus luteofasciatus Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 176 (D ♂).
P. f. l. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1222, 1266 (D ♂).

Aethiopische Arten:

O♀ **abessinica** Strand 1906. Abessinien
P. a. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 664 (D O).
P. a. Strand 1909, Societ. Ent. 24 p. 22 (D O).
P. a. Caporiacco 1941, Miss. Biol. Sagan-Omo 12, Zool. 6 p. 140 (D ♀).

♂ **albostriata** Simon 1901. S.-Afrika, Portug. O.-Afrika
P. a. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 73 (D ♂).
P. a. Lessert 1936, Rev. Suisse Zool. 43 (9) p. 294 f. 91 (N ♂).

♀ **bairstowi** Simon 1885. S.-Afrika
P. b. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 389 (D ♀).
P. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 666 (N).

♂o **chrysops** Simon 1890. Yemen
P. c. Simon 1890, Ann. Soc. Ent. France (6) 10 p. 119 (D ♂ o).
P. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 666 (N).

♀ **desquamata** Strand 1906. Abessinien
P. d. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 663 (D ♀).
P. d. Strand 1909, Societ. Ent. 24 p. 21 (D ♀).

♀ **imperiosa** Peckham 1903. Capland
P. i. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 242 T. 28 F. 7 (D ♀).

♂ **lugubris** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste, Obervolta
P. l. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 310 f. 12 (D ♂).

♂ **lugubris senegalensis** Berland & Millot 1941. Senegal
P. l. s. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 310 (D ♀).

♀ **soudanica** Berland & Millot 1941. Franz. Sudan
P. s. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 311 f. 13 A, B (D ♀).

♂ **suaveolens** Simon 1885. Senegal
P. s. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 349 (D ♂).

♀ **trifoveata** Lessert 1927. Congo
P. t. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 439 f. 21 (D ♀).

♂♀ **tristis** Lessert 1927. Congo, Kenya
P. t. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 437 f. 20 (D ♂♀).
P. t. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 472 (N ♂).

♀ **tuzetae** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea
P. t. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 312 f. 13 C, D (D ♀).

Orientalische Arten:

♂ **micans** Simon 1901. Hongkong
P. m. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 64 (D ♂).
P. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 666 (N).

♂ **semipullata** Simon 1901. Hongkong
P. s. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 65 (D ♂).
P. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 666 (N).

Neotropische Arten:

♀ **didelphis** Simon 1886. Bolivien
P. d. Simon 1886, Ann. Soc. Ent. Belg. 30 C. R. p. 171 (D ♀).

Gen. **Saitidops** Simon 1901.

♂ **clathratus** Simon 1901. Venezuela
S. c. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 72 (D ♂).
S. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 669 (N).

Gen. **Stenaelurillus** Simon 1885.

Palaearktische Arten:

o **giovae** Caporiacco 1936. Fessan, Cufra
S. g. Caporiacco 1936, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 75 p. 79 (D o).

♂♀ **nigritarsis** Simon 1885. Algier, Tripolitanien
S. n. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 351 (D ♂).
S. n. Caporiacco 1936, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 75 p. 79 (N ♀).

♂ **triguttatus** Simon 1885. Tibet
S. t. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 351 (D ♂).
S. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 665 (N).

Aethiopische Arten:

♂♀ **albopunctatus** Caporiacco 1949. Kenya
S. a. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 474 f. 89 a, b (D ♂♀).

♂ **hirsutus** Lessert 1927. Congo
S. h. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 433 f. 18 (D ♂).

o **leucogrammus** Simon 1902. S.-Afrika
S. l. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 37 (D o).

♂♀ **nigricauda** Simon 1885. – * Senegal
S. n. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 351 (D ♂).
S. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 667 (N).

S. n. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 313 f. 14 (N ♂, D ♀).

♂ **strandi** Caporiacco 1939. Abessinien

S. s. Caporiacco 1939, Real Accad. Ital. p. 374 f. 24 (D ♂).

♂♀ **uniguttatus** Lessert 1925. O.-Afrika, Abessinien

S. u. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 478 f. 64, 65 (D ♂).
S. u. Caporiacco 1940, Atti Accad. Ital. 11 (18) p. 859 f. 51 (D ♀).

♂♀ **werneri** Simon 1906. Aegypt. Sudan, Uganda

S. w. Simon 1906, S. B. Ak. Wiss. Wien 115 (I) p. 1174 (D ♂♀).

Orientalische Arten:

♂♀ **lesserti** Reimoser 1934. Indien

S. l. Reimoser 1934, Rev. Suisse Zool. 41 (32) p. 504 f. 25, 26 (D ♂♀).

2. Gr. Pensacoleae

Gen. **Avakubia** Lessert 1927.

♂♀ **castanea** Lessert 1927. Congo, Abessinien

A. c. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 442 f. 22—24 (D ♂♀).
A. c. Caporiacco 1941, Miss. Biol. Sagan-Omo 12, Zool. 6 p. 143 (N ♀).

Gen. **Blaisea** Simon 1902.

♂ **bicalcarata** Simon 1909 (1910). Portug. u. Franz. Guinea

B. b. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 429 (D ♂).
B. b. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 358 f. 58 (N ♂).

♂ **lyrata** Simon 1902. – * Gabun

B. l. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 723 (D ♂).
B. l. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 679 f. 804 (N ♂).

Gen. **Compsodecta** Simon 1903.

♂ **albopalpis** (Peckham) 1901. Jamaica

Cybele a. Peckham 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. (2) p. 9 T. 2 F. 3 (D ♂).
C. albipalpis Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 677 (N).

♂♀ **grise**a (Peckham) 1901. – * Jamaica

Cybele g. Peckham 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. (2) p. 8 T. 2 F. 2 (D ♂♀).
C. g. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 678 f. 805, 806 (N ♂).

♂♀ **haitiensis** (Banks) 1903. Haiti

Cybele h. Banks 1903, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 55 p. 344 T. 15 F. 1, 9, 12 (D ♂♀).
Eustiromastix h. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 650 (C).
C. h. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 468 T. 3 F. 26, 28, 32, 33 (D ♂♀).

♂♀ **maxillosa** (F. Cambridge) 1901. Guatemala

Sidusa m. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 210 T. 15 F. 8, 9 (D ♂♀).
C. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 677 (N).

♂ **montana** Chickering 1946. Panama
C. m. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 122 f. 116—118 (D ♂).

♂ **peckhami** Bryant 1943. Haiti
C. p. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 470 T. 3 F. 29, 31; T. 4 F. 35 (D ♂).

Gen. **Pensacola** Peckham 1885.

§ 5 ♂: Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 504.

♂♀ **castanea** Simon 1902. Brasilien
P. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 39 (D ♂♀).
P. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 674 f. 802 (N ♂).

♂ **cyaneochirus** Simon 1902. Ecuador
P. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 38 (D ♂).
P. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 674 (N).

♂ **darlingtoni** Bryant 1943. San Domingo
P. d. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 504 T. 7 F. 72, 74, 76 (D ♂).

♂♀ **electa** Bryant 1943. San Domingo
P. e. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 506 T. 6 F. 59; T. 7 F. 75, 77 (D ♂♀).

♂ **gaujoni** Simon 1902. Ecuador
P. g. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 38 (D ♂).
P. g. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 674 f. 803 (N ♂).

♂♀ **maxillosa** Bryant 1943. San Domingo
P. m. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 508 T. 7 F. 78—80; T. 8 F. 84 (D ♂♀).

♂♀ **montana** Bryant 1943. San Domingo
P. m. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 510 T. 8 F. 81—82 (D ♂♀).

♂♀ **murina** Simon 1902. Brasilien, Guiana
P. m. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 40 (D ♂♀).
P. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 674 f. 796—799 (N ♂).
P. m. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 722 (N ♀).

♀ **ornata** Simon 1902. Brasilien
P. o. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 39 (D ♀).

♂♀ **peckhami** Bryant 1943. San Domingo
P. p. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 512 T. 8 F. 83, 85, 86 (D ♂♀).

♀ **radians** (Peckham) 1896. Panama
Hamillus r. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 72 T. 6 F. 4 (D ♀).
P. r. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 220 T. 18 F. 9 (N ♀).

♂♀ **signata** Peckham 1885. – * Guatemala
P. s. Peckham 1885, Proc. Nat. Hist. Soc. Wiscons. p. 84 T. 2 F. 13 (D ♂♀).
P. s. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 220 T. 18 F. 7 (N ♂).
P. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 678 f. 800, 801 (N ♂).

♂ **sylvestris** (Peckham) 1896. Guatemala, Mexico
Hamillus s. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 71 T. 6 F. 3 (D ♂).
P. s. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 220 T. 18 F. 8 (D ♂).

♀ **variegata** Mello-Leitao 1939. Paraguay
P. v. Mello-Leitao 1939, Rev. Suisse Zool. 46 (2) p. 89 f. 80 (D ♀).

17. Subfam. Itatinae

1. Gr. Itateae

Gen. **Itata** Peckham 1894.

♂♀ **completa** (Banks) 1929. Panama
Lyssomanes c. Banks 1929, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 69 (3) p. 76 T. 1 F. 3; T. 2 F. 29 (D ♂).
I. c. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 54 f. 33—35 (D ♂♀).

♂♀ **isabellina** (Taczanowski) 1878. Peru
Marpissa i. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 325 (D ♂♀).
I. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 539 (N).

♂ **leucoprocta** Mello-Leitao 1947. Brasilien
I. l. Mello-Leitao 1947, Arqu. Mus. Paranaense 6 (6) p. 299 T. 42 F. 47 (D ♂).

♂ **partita** Mello-Leitao 1930. Amazonas
I. p. Mello-Leitao 1930, Arch. Mus. Nac. R. d. Janeiro 32 p. 70 TF. 40—42 (D ♂).

♂ **tipuloides** Simon 1901. Brasilien, Bolivien, Guiana, Venezuela
I. t. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 144 (D ♂).
I. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 538 f. 650, 651 (N ♂).

♂♀ **valida** Peckham 1894. – * Columbien
I. v. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 115 T. 11 F. 5 (D ♂♀).
I. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 539 (N).

Gen. **Paranaia** Mello-Leitao 1941.

♀ **fuscimana** Mello-Leitao 1941. Brasilien
P. f. Mello-Leitao 1941, Arqu. Inst. Biol. S. Paulo 11 (30) p. 255 (D ♀).

2. Gr. Gophoeae

Gen. **Gophoa** Simon 1901.

Orientalische Arten:

♀ **splendida** Dyal 1935. Panjab
G. s. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 231 (D ♀).

Neotropische Arten:

♂ **falcigera** Simon 1901. – * Brasilien
G. f. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 155 (D ♂).
G. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 590 f. 714—717 (N ♂).

♂ **irregularis** Mello-Leitao 1945. Argentinien
G. i. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 285 f. 74 (D ♂).

♂ **rubriceps** Mello-Leitao 1947. Brasilien
G. r. Mello-Leitao 1947, Pap. Avuls. Zool. S. Paulo 8 (11) p. 133 f. 7 (D ♂).

Gen. **Monaga** Chickering 1946.

♀ **benigna** Chickering 1946. Panama
M. b. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 196 f. 168—171 (D ♀).

3. Gr. Thianieae

Gen. **Marchena** Peckham 1909.

♂♀ **minuta** (Peckham) 1888. Californien
Cytaea m. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 73 T. 1 F. 55; T. 5 F. 55 (D ♂♀).
M. m. Peckham 1909, Trans.Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 514 T. 40 F. 10; T. 42 F. 4 (D ♂♀).

♂o **sissonii** Peckham 1909. – * Californien
M. s. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 513 T. 40 F. 9; T. 42 F. 5 (D ♂).
M. s. Chamberlin & Ivie 1941, Bull. Univ. Utah 31 (8), Biol. 6 (3) p. 30 (N ♂♀).

Gen. **Micalula** Strand 1932.

♀ **longithorax** (Petrunkevitch) 1925. Panama
Mica l. Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 246 f. 155—157 (D ♀).
M. l. Strand 1932, Folia Zool. Hydrobiol. 4 (2) p. 141 (nom. nov. gen.).

Gen. **Nicylla** Thorell 1890.

♂♀ **sundevalli** Thorell 1890. Sumatra
N. s. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 171 (D ♂♀).
N. s. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 450 (D ♂♀).
N. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 870 (N).

Gen. **Thianella** Strand 1907.

♂ **disjuncta** Strand 1907. Java
T. d. Strand 1907, Zool. Jahrb. Syst. 25 (5) p. 448 (D ♂).

Gen. **Thiania** C. L. Koch 1846.

Orientalische Arten:

♂♀ **aura** Dyal 1935. Panjab
T. a. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 230 T. 17 F. 177 (D ♂♀).

♂♀ **bhamoensis** Thorell 1887. Burma, Malakka, Sumatra
T. b. Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 357 (D ♂♀).
T. b. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 341 (N ♂♀).
T. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 587 (N).

♀ **chrysogramma** Simon 1901. Hongkong

T. c. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 61 (D ♀).
T. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 587 (N).
T. c. Sherriffs 1939, Hong-Kong Natural. 9 (4) p. 198 T. 24 F. 4 (D ♀).

♂♀ **cupreonitens** (Simon) 1899. Sumatra

Philaeus c. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 114 (D ♂♀).
T. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 588 (N).

♂♀ **demissa** (Thorell) 1892. Sumatra, Krakatau

Marptusa d. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 295 (D ♂♀).
T. d. Simon 1903, Ann. Soc. Ent. France 72 p. 309 (N).
T. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 587 f. 710—713 (N ♂).
T. d. Simon 1905, Mitt. Nat. Mus. Hambg. 22 (2) p. 71 (N).

♂ **formosissima** (Thorell) 1890. Borneo

Marptusa f. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 161 (D ♂).
Marptusa f. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 303 (D ♂).
T. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 588 (N).

o **humilis** (Thorell) 1877. Celebes

Marptusa h. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 561 (D o).
T. h. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 588 (N).

♂ **jucunda** Thorell 1890. Sumatra, Nias

T. j. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 75 (D ♂).

♂♀ **oppressa** (Thorell) 1891. Nicobaren, Sumatra

Marptusa o. Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 114 (D ♂♀).
Marptusa o. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 300 (D ♂♀).
T. o. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 588 (N).
T. o. Strand 1906, Jahrb. Nassau. Nat. Ver. 59 p. 278 (N ♀).

♂ **pulcherrima** C. L. Koch 1846. – * Ceylon, Indochina, Malakka, Celebes

T. p. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 171 TF. 1223 (D ♂).
T. p. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 311 (D).
T. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 588 (N).
T. p. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) p. 310 f V 1 (N ♂).

♀ **sinuata** Thorell 1890. I. Pinang

T. s. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 336 (D ♀).
T. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 588 (N).

♂♀ **suboppressa** Strand 1907. S.-China

T. s. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (17—18) p. 569 (D ♂♀).
T. s. Strand 1909, Abh. Nat. Ges. Görlitz 26 p. 109 (D ♂♀).

♀ **subserena** Simon 1901. Malakka

T. s. Simon 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. (2; 4) p. 73 (D ♀).
T. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 588 (N).

Australische Arten:

O♀ **gazellae** (Karsch) 1878. Neu-Guinea

Attus g. Karsch 1878, Mit. München. Ent. Ver. 2 p. 24 (D ♀).
Margaromma g. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1466 T. 123 F. 7 (D O).
Plexippus g. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 654 (N).

Gen. **Thianioides** Mello-Leitao 1941.

♂ **spinimanu** Mello-Leitao 1941. Argentinien
T. s. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 190 T. 12 F. 56; f. 84 (D ♂).

Gen. **Thianitara** Simon 1903.

♂ **spectrum** Simon 1903. Sumatra
T. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 1054 f. 1122 (D ♂, nec ♀, err.).
T. s. Simon 1903, Ann. Soc. Ent. France 72 p. 309 (D ♂).
T. s. Reimoser 1925, Suppl. Ent. 10 p. 91 (N ♂).

18. Subfam. Coccorchestinae

Gen. **Coccorchestes** Thorell 1881.

♀ **blendae** Thorell 1881. Neu-Guinea
C. b. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 675 (D ♀).
C. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 646 (N).

♂ **rufipes** Thorell 1881. – * Neu-Guinea
C. r. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 672 (D ♂).
C. r. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 280 (D).
C. r. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 647 (N).
C. r. Roewer 1938, Mém. Mus. Hist. Nat. (hors Sér.) 3 (19) p. 82 f. 61 (N ♂).

♂ **subhirsutus** Thorell 1881. Neu-Guinea
C. s. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 677 (D ♂).
C. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 644 f. 758—761 (N).

♂ **tarsalis** Thorell 1881. Neu-Guinea
C. t. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 680 (D ♂).

Gen. **Omoedus** Thorell 1881.

♀ **niger** Thorell 1881. – * Neu-Guinea
O. n. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 669 (D ♀).
O. n. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 280 (D).
O. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 647 (N).

♂♀ **piceus** Simon 1902. Halmahera
O. p. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 35 (D ♂♀).
O. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 644 f. 762—764 (N ♂).

Gen. **Poecilorchestes** Simon 1901.

♂ **decoratus** Simon 1901. Neu-Guinea
P. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 648 f. 765—767 (D ♂).
P. d. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 34 (D ♂).

19. Subfam. Heliophaninae

1. Gr. Chrysilleae

Gen. **Ceglusa** Thorell 1895.

♀ **polita** Thorell 1895. Burma

C. p. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 342 (D ♀).
C. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 556 (N).

Gen. **Chrysilla** Thorell 1887.

Aethiopische Arten:

♀ **kolosvaryi** Caporiacco 1947. Ost-Afrika

C. k. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 232 T. 2 F. 65 (D ♀).

Orientalische Arten:

♂ **debilis** Thorell 1891. Burma

C. d. Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 115 (D ♂).
C. d. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 319 (D ♂).
C. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 548 (N).

♀ **delicata** Thorell 1890. – * Sumatra

C. d. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 162 (D ♀).
C. d. Thorell 1892, Ann. Mus. Cic. Genova 31 p. 316 (D ♀).
C. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 553 (N).

♂ **doriae** Thorell 1890. Sumatra

C. d. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 162 (D ♂).
C. d. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 321 (D ♂).
C. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 548 (N).

♂ **glaucochira** (Thorell) 1890. Sumatra

Maevia g. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 163 (D ♂).
Maevia g. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 325 (D ♂).
C. g. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 544 (N).

♂ **lauta** Thorell 1887. Burma

C. l. Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 387 (D ♂).
C. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 548 (N).

♂ **macrops** Simon 1901. Indien

C. m. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 147 (D ♂).
C. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 548 (N).

♂ **multimaculata** Simon 1901. Ceylon

C. m. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 147 (D ♂).
C. m. Simon 1901, Hist Nat. Araign. 2 (3) p. 548 (N).

♀ **reinhardtii** Thorell 1891. Nicobaren

C. r. Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 116 (D ♀).
C. r. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 548 (N).

♂♀ **versicolor** (C. L. Koch) 1846. Burma, Annam, Malakka, Sumatra, Java, Lombok, Celebes

Plexippus v. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 103 TF. 1165 (D ♂).
Attus v. Walckenaer 1847, Hist. Nat. Ins. Apt. 4 p. 426 (D ♂).
Maevia picta C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 72 TF. 1328 (D ♂).

C. picta Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 117 (D ♂).
C. picta Workman 1896, Malays. Spid. p. 10 T. 10 (D ♂).
C. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 544 (N).
C. v. Simon 1905, Mitt. Nat. Mus. Hambg. 22 (2) p. 71 (N).
C. v. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) p. 307 (N ♂).

Australische Arten:

♀ **pilosa** (Karsch) 1878. Neu-S.-Wales
Epiblemum p. Karsch 1878, Mitt. München. Ent. Ver. 2 p. 23 (D ♀).
C. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 601 (N).

Gen. **Cosmophasis** Simon 1901.

Palaearktische Arten:

♂♀ **cincta** Denis 1947. Oase Siwah
C. c. Denis 1947, Bull. Soc. Fouad I. Ent. 31 p. 67 T. 4 F. 9 (D ♂♀).

o **fazanica** Caporiacco 1936. Fessan
C. f. Caporiacco 1936, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 75 p. 81 (D o).

Aethiopische Arten:

♀ **albipes** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea
C. a. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 317 f. 19 (D ♀).

♂♀ **australis** Simon 1902. S.-Afrika
C. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 25 (D ♂♀).
Almota quinii Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 194 T. 20 F. 1 (D ♂).
C. a. Simon 1910, Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 419 (N).

♂ **chopardi** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste
C. c. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 318 f. 20 (D ♂).

♂ **coerulea** Simon 1901. Sierra Leone
C. c. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 148 (D ♂).
C. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 548, 549 (N).

♂ **depilata** Caporiacco 1940. Abessinien
C. d. Caporiacco 1940, Atti Accad. Ital. 11 (18) p. 856 f. 49 (D ♂).

♂♀ **fagei** Lessert 1925. O.-Afrika
C. f. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 453 f. 33—39 (D ♂♀).

♂ **lucidiventris** Simon 1909 (1910). Gabun
C. l. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 419 (D ♂).

♂♀ **natalensis** Lawrence 1942. Natal
C. n. Lawrence 1942, Ann. Natal. Mus. 10 (2) p. 184 f. 30 (D ♂♀).

♀ **nigrocyanea** (Simon) 1885. Abessinien
Cyllobelus n. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 390 (D ♀).
C. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 548, 549 (N).

♀ **pulchella** Caporiacco 1947. Abessinien
C. p. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 233 T. 2 F. 66 (D ♀).

♀ **quadrimaculata** Lawrence 1942. Nord-Transvaal
C. q. Lawrence 1942, Ann. Natal. Mus. 10 (2) p. 186 (D ♀).

♂ **strandi** Caporiacco 1947. Ost-Afrika
C. s. Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 234 T. 2 F. 67 (D ♂).

♂♀ **tricincta** Simon 1909 (1910). Portug. Guinea, Fernando Poo
C. t. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 417 (D ♂♀).

♀ **tristis** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste
C. t. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 319 f. 21 (D ♀).

Orientalische Arten:

♂ **albomaculata** Schenkel 1944. Timor
C. a. Schenkel 1944, Rev. Suisse Zool. 51 (4) p. 198 f. 12 (D ♂).

♀ **collingwoodii** (Cambridge) 1871. Indochina, Sumatra
Salticus c. Cambridge 1871, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 621 T. 49 F. 5 (D ♀).
C. collingwodi Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 549 (N).
C. c. Reimoser 1925, Suppl. Ent. 10 p. 91 (N ♀).

♀ **cypria** (Thorell) 1890. Java
Maevia c. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 164 (D ♀).
Maevia c. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 339 (D ♀).

♂ **gemmans** (Thorell) 1890. Sumatra
Maevia g. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 163 (D ♂).
Maevia g. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 329 (D ♂).

♂ **ichneumon** Simon 1901. Sumatra
C. i. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 148 (D ♂).

♀ **laticlavia** (Thorell) 1892. Sumatra
Maevia l. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 341 (D ♀).
Vellutus l. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 119 (N).
C. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 549 (N).

♂ **longiventris** Simon 1902. Annam
C. l. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 732 (D ♂).

♂ **marxii** (Thorell) 1890. Sumatra, Java
Maevia m. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 163 (D ♂).
Maevia m. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 332 (D ♂).

♂ **masarangi** Merian 1911. Celebes
C. m. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) p. 309 f. U 1 (D ♂).

♀ **miniaceomicans** (Simon) 1888. Andamanen
Cyllobelus m. Simon 1888, Journ. Asiat. Soc. Bengal. 56 p. 283 (D ♀).
C. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 549 (N).

o **psittacina** (Thorell) 1887. Burma
Maevia p. Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 382 (D o).

♀ **quadricincta** (Simon) 1885. Singapore
Maevia q. Simon 1885, Bull. Soc. Zool. France 10 (4—6) p. 453 (D ♀.
C. q. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 549 (N).

♂♀ **umbratica** Simon 1903. Sumatra, Panjab

C. u. Simon 1903, Ann. Soc. Ent. France 72 p. 308 (D ♂).
C. u. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 234 (N ♀).

♀ **weyersi** (Simon) 1899. Sumatra

Vellutus w. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 119 (D ♀).
C. w. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 549 (N).

Transgredierende Arten:

♂♀ **thalassina** (C. L. Koch) 1846. – * Malakka, Sumatra, Java, Krakatau, Neu-Guinea, Australien, Pelew-I.

Plexippus t. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 124 TF. 1184 (D ♂).
Thiania t. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 326 (C).
Amycus splendidus L. Koch 1880, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1171 T. 101 F. 6 (D ♂).
Amycus tristriatus L. Koch 1880, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1181 T. 102 F. 4 (D ♂).
Maevia t. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 468 (D ♂).
C. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 548, 558 (N).
C. (Amycus) splendens Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 549 (N).
C. t. Reimoser 1934, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 16 (N ♂♀).

♂♀ **viridifasciata** (Doleschall) 1859. Sumatra, Java, Celebes, Amboina, Neu-Guinea

Salticus v. Doleschall 1859, Act. Soc. Ind. Neerl. 5 p. 19 T. 3 F. 8 (D ♂).
Salticus fulvovittatus Doleschall 1859, Act. Soc. Ind. Neerl. 5 p. 20 T. 5 F. 3 (D ♀).
Maevia ombria Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 588 (D ♂).
Thiania albocincta Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 591 (D ♀).
Maevia v. Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 278 (D ♀).
C. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 548 f. 659, 660 (N ♂).
C. v. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) p. 307 f. R1, S1, T1 (N).
C. v. Reimoser 1925, Suppl. Ent. 10 p. 91 (N).

Australische Arten:

♂♀ **archeyi** Berland 1931. Auckland-I.

C. a. Berland 1931, Rec. Canterbury Mus. 3 p. 363 T. 50 F. 27—30 (D ♂♀).

♂♀ **bitaeniata** (Keyserling) 1882. Australien, Aru-I.

Sobara b. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1365 T. 115 F. 8, 9 (D ♂).
Selaophora rubra Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1374 T. 116 F. 5 (D ♀).
Sobara b. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 327 (D).
Selaophora rubra Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 327 (D).
C. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 549 (N).
C. rubra Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 553 (N).
C. b. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 181 (N ♂).

♂♀ **chlorophthalma** (Simon) 1897. Neue Hebriden

Maevia c. Simon 1897, Ann. Soc. Ent. France 66 p. 275 (D ♂).
C. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 541, 542 f. 661 (N ♂).
C. c. Berland 1938, Ann. Soc. Ent. France 107 p. 144 f. 36—40 (D ♀).

♂ **insultans** (Thorell) 1881. Yule-I.

Maevia i. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 484 (D ♂).

o **maculiventris** Strand 1911. Aru-I.
C. m. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 180 T. 4 F. 23 (D o).

♂ **micans** (L. Koch) 1880. Queensland
Amycus m. L. Koch 1880, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1173 T. 102 F. 1 (D ♂).
C. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 549 (N).

♂ **micarioides** (L. Koch) 1880. Queensland, Neu-Guinea, Aru-I., Kei-I., Salomonen
Amycus m. L. Koch 1880, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1178 T. 102 F. 3 (D ♂).
C. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 543 (N).
C. m. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 180 (N).

♂ **modesta** (L. Koch) 1880. Queensland
Amycus m. L. Koch 1880, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1176 T. 102 F. 2 (D ♂).
C. m. Rainbow 1911, Rec. Austral. Mus. 9 (2) p. 285 (C).

♀ **monacha** (Thorell) 1881. Neu-Guinea
Maevia m. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 474 (D ♀).

♀ **obscura** (Keyserling) 1882. Queensland
Selaophora o. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1376 T. 117 F. 1 (D ♀).
C. o. Rainbow 1911, Rec. Austral. Mus. 9 (2) p. 285 (C).

♀ **orsimoides** Strand 1911. Kei-I.
C. o. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 180 T. 4 F. 22; T. 6 F. 84 (D ♀).

♀ **risbeci** Berland 1938. Neue Hebriden
C. r. Berland 1938, Ann. Soc. Ent. France 107 p. 145 f. 41, 42 (D ♀).

♀ **squamata** Kulczynski 1910. Salomonen
C. s. Kulczynski 1910, Denkschr. Ak. Wiss. Wien 85 p. 402 T. 17 F. 12 (D ♀).

Gen. **Cyllobelus** Simon 1885.

Aethiopische Arten:

♀ **australis** Peckham 1902. S.-Afrika
C. a. Peckham 1902, Psyche 9 (312) p. 334 (D ♀).
C. a. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 194 T. 21 F. 2 (D ♀).

♂♀ **chionogaster** Simon 1901. S.-Afrika, Madagascar, Portug. Guinea
C. c. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 151 (D ♂♀).
C. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 541, 549 f. 665 (N ♂).
C. c. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 195 T. 21 F. 1 (D ♂).

♀ **ciliatus** Simon 1885. – * Abessinien
C. c. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 390 (D ♀).
C. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 549, 554 (N).

♂ **lucipeta** Simon 1885. Sansibar
C. l. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 391 (D ♂).
C. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 549 (N).

♂♀ **rufopictus** Simon 1901. San Thomé, W.-Afrika, Franz. Sudan, Natal

C. r. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 549 (N).
C. r. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. 44 p. 420 (D ♂♀).
C. r. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 320 f. 22 (N ♀).
C. r. Lawrence 1942, Ann. Natal Mus. 10 (2) p. 187 f. 32 (D ♂♀).

♀ **splendidissimus** Caporiacco 1949. Kenya

C. s. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 479 (D ♀).

♂ **tristellatus** Simon 1906. Aegypt. Sudan, Portug. O.-Afrika

C. t. Simon 1906, S. B. Ak. Wiss. Wien 115 (I) p. 1171 (D ♂).
C. t. Lessert 1936, Rev. Suisse Zool. 43 (9) p. 289 f. 84 (N ♂).

Orientalische Arten:

flavocinctus Simon 1901. Singapore

C. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 549 (N).

♂♀ **semiglaucus** Simon 1901. Ceylon, Sumatra, Annam, Philippinen

C. s. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 151 (D ♂).
C. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 549 f. 664 (N ♂).
C. s. Reimoser 1925, Suppl. Ent. 10 p. 91 (N ♀).

♂ **severus** Simon 1901. S.-China

C. s. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 151 (D ♂).
C. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 549 (N).

Gen. **Echinussa** Simon 1901.

♂ **imerinensis** Simon 1901. Madagascar

E. i. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 149 (D ♂).
E. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 549 (N).

♂ **praedatoria** (Keyserling) 1877. Madagascar

Eris p. Keyserling 1877, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 27 p. 94 T. 3 F. 4 (D ♂).
Attus bewsheri Butler 1879, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 4 p. 42 T. 1 F. 2 (D ♂).
Jotus semiater Peckham 1885, Proc. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 29 (1) p. 37 T. 1 F. 8 (D ♂).
E. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 549 (N).

♂ **vibrabunda** (Simon) 1885. – * Madagascar

Maevia v. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 388 (D ♂).
E. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 555 f. 663 (N ♂).

Gen. **Epocilla** Simon 1887.

Aethiopische Arten:

♂ **mauriciana** Simon 1901. I. Mauritius

E. m. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 150 (D ♂).
E. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).

Orientalische Arten:

♂♀ **aurantiaca** (Simon) 1885. – * Indien, Ceylon, Malakka, Burma

Opistoncus a. Simon 1885, Bull. Soc. Zool. France 10 (4—6) p. 30 (D ♀).
E. praetextata Simon 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 378 (N ♂).

Dischiropus alticinctus Karsch 1891, Berlin. Ent. Zeitschr. 36 (2) p. 300 T. 12 F. 26 (D ♂).
E. praetextata Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 310 (D ♂).
E. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 555 (N).

♂ **femoralis** Simon 1901. Sumatra

E. f. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 150 (D ♂).
E. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).

O **innotata** Thorell 1895. Burma

E. i. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 353 (D O).
E. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).

♂♀ **picturata** Simon 1901. Hongkong

E. p. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 62 (D ♂).
E. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).
E. p. Strand 1909, Abh. Nat. Ges. Görlitz 26 p. 105 (D ♂♀).

♂ **xylina** Simon 1906. Indien

E. x. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. France 75 p. 314 (D ♂).

Gen. **Heliophanus** C. L. Koch 1837.

Palaearktische Arten:

§ 20 ♂, 13 ♀: Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 141—143.
§ 12 ♂, 12 ♀: Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 6—8.
§ 9 ♂, 9 ♀: Roewer 1928, Tierw. Mitteleurop. 3 (6) p. 48—49 TF. 541—555.
§ 17 ♂, 11 ♀: Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1157—1170.
§ 5 Arten: Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 14.
§ 6 (♂, ♀): Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 51—52.

♂♀ **albescens** Denis 1947. Oase Siwah

H. a. Denis 1947, Bull. Soc. Fouad I. Ent. 31 p. 68 T. 5 F. 1—3; T. 6 F. 3 (D ♂♀).

♂♀ **albosignatus** L. Koch 1867. Oberitalien, I. Syra, I. Tinos

H. a. L. Koch 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 871 (D ♀).
H. a. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 702 (D ♂♀).

♂♀ **apiatus** Simon 1868. Frankreich, Italien, Sizilien

H. a. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 677 T. 7 F. 7 (D ♂♀),
H. a. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 341 (N).
H. a. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1160, 1248, f. 1812, 1813 (D ♂).

♂♀ **auratus** C. L. Koch 1848. Europa

H. a. C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 54 TF. 1311, 1312 (D ♂♀).
H. branickii Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 684 T. 7 F. 9 (D ♂♀).
H. a. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 707 (D ♀).
H. a. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 155 T. 10 F. 10 (D ♂♀).
H. a. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 9 (D ♂♀).
H. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).
H. a. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 552 (D ♂♀).
H. a. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 43 f. 133, 134 (D ♂♀).
H. a. Reimoser 1931, Die Natur (Wien) 7 (4) p. 86 f. 5 (N ♂♀).
H. a. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1165, 1170, 1249 f. 1824, 1825 (D ♂♀).
H. a. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 16 f. . . (N).
H. a. Tullgren 1944, Svensk. Spindelfauna (Salticid.) p. 57 f. 27f, 28a; T. 6 F. 103—104 (D ♂♀).

auratus mediocinctus Kulczynski 1898. Unt.-Oesterreich

H. a. m. Kulczynski 1898, Symb. Faun. Aran. Austr. Infer. p. 111 (D).

♀ **baicalensis** Kulczynski 1895. Sibirien

H. b. Kulczynski 1895, Rozpraw. Ak. Umiej. Krakow (2) 12 p. 54, 97 T. 2 F. 11 (D ♀).
H. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).

♂ **calcarifer** Simon 1868. Dalmatien, Corfu, I. Zante

H. c. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 701 (D ♂).

♀ **camtschadalicus** Kulczynski 1885. Kamtschatka

H. c. Kulczynski 1885, Denkschr. Ak. Wiss. Krakau 11 p. 58 T. 11 F. 35 (D ♀).
H. c. Kulczynski 1895, Rozpraw. Akt. Umiej. Krakow. (2) 12 p. 53 T. 2 F. 10 (N ♀).
H. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).

♂♀ **cernuus** Simon 1868. Spanien

H. c. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 701 (D ♂♀).
H. c. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 351 (N).

♂ **corsicus** Simon 1871. Corsica, Sardinien

H. c. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 344 (D ♂).
H. c. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 154 T. 10 F. 17 (D ♂).
H. c. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1165, 1249, f. 1822, 1823 (D ♂).

♂ **creticus** Giltay 1932. Creta

H. c. Giltay 1932, Bull. Mus. Hist. Nat. Belg. 8 (22) p. 36 f. 22 (D ♂).
H. c. Giltay 1933, Act. Faun. Flor. Univ. Bucuresti 1 (3—5) p. 8 T. 4 F. 4 (D ♂).

♂♀ **cupreus** (Walckenaer) 1802. Europa, Sibirien

Aranea c. Walckenaer 1802, Faun. Paris. 2 p. 245 (D ♂♀).
Aranea aenea Schrank 1803, Faun. Boic. 3 p. 238 (D).
Attus c. Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 24 (N).
Attus c. Hahn 1826, Monogr. d. Spinn. 4 p. 1 T. 13 F. A, B (D ♂♀).
Attus c. Audouin 1827, Explic. Planch. Arachn. Savigny Descr. Egypt. p. 407 T. 7 F. 15 (D ♂).
Attus atrovirens Sundevall 1832, Vet. Ak. Handl. p. 210 (D ♂♀).
Salticus chalybeus Hahn 1834, Die Arachniden 2 p. 42 TF. 127 (D ♂).
Salticus c. Hahn 1834, Die Arachniden 2 p. 42 TF. 128 (D ♂♀).
H. chalybeus C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 30 (N).
H. tricinctus C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 30 (D).
H. micans C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 30 (D).
Attus c. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 409 (D ♂♀).
H. c. C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 56 TF. 1313—1315 (D ♂♀).
H. metallicus C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 60 TF. 1316 (D ♀).
H. tricinctus C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 64 TF. 1323 (D ♀).
H. micans C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 68 TF. 1324 (D ♂).
Salticus c. Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 57 T. 3 F. 31 (D ♂♀).
Attus c. Westring 1862, Aran. Svec. p. 584 (D ♂♀).
H. c. Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 152 (D ♂♀).
H. tricinctus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 705 (D ♀).
H. c. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 669 (D ♂♀).
H. varians Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 682 (D ♀, nec ♂).
H. c. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 144 (D ♂, nec ♀).
H. c. Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 467 T. 77 F. 263 (D ♂♀).

H. c. Cambridge 1881, Proc. Dorset F. Cl. 2 p. 395 (D ♂♀).
H. c. Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 56 T. 3 F. 4 (D ♂♀).
H. c. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 79 (D ♂♀).
H. c. Hansen 1885, in: Schiödte, Zool. Danica p. 159 T. 5 F. 12 (D ♂♀).
H. c. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 317 (D).
H. c. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 8 T. 1 F. 21 (D ♂♀).
H. c. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 416 T. 40 F. 613 (D ♂♀).
H. c. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 546 (D ♂♀).
H. c. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 42 f. 129, 130 (D ♂♀).
H. c. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1159, 1169, 1248 f. 1806, 1807, 1835 (D ♂♀).
H. c. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 16 f. . . (N).
H. c. Tullgren 1944, Svensk. Spindelfauna (Salticid.) p. 52 f. 27a; T. 5 F. 89—92 (D ♂♀).
H. c. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 212 f. 106 A, E, G (D ♂♀).

♂♀ **cupreus cuprescens** (Simon) 1868. Spanien

H. cuprescens Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 671 (D ♂♀).
H. c. c. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1248 (N).

♂ **cupreus globifer** (Simon) 1868. Oberitalien

H. globifer Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 672 T. 7 F. 6 (D ♂).
H. c. g. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1248 (N).

♂♀ **cupreus simplex** (Simon) 1868. Ungarn, Kroatien, Dalmatien, Unt.-Oesterreich, Bessarabien

H. simplex Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 673 (D ♂).
H. simplex Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 9 T. 1 F. 26 (D ♂♀).
H. simplex Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 45 f. 139 (D ♂).
H. c. s. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1254 (N).

♂♀ **curvidens** (Cambridge) 1872. Palästina, Karakorum

Salticus c. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 345 (D ♂).
H. c. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 165 (C).
H. c. Caporiacco 1935, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 200 T. 5 F. 2 (D ♂♀).

♂♀ **dampfi** Schenkel 1923. Ostpreussen, Schweden

H. d. Schenkel 1923, Verh. Nat. Ges. Basel 34 p. 121 (D ♂♀).
H. d. Schenkel 1925, Mitt. Bad. Landesver. Nat. 1 (16—17) p. 352 f. 3 (D ♂♀).
H. d. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 45 f. 140 (D ♂).
H. mariae Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 46 f. 141 (D ♀).
H. d. Tullgren 1942, Ent. Tidskr. 63 (3—4) p. 228 (N syn.).
H. d. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 57 f. . . (N).
H. d. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 53 f. 27 b; T. 5 F. 93—96 (D ♂♀).

♂♀ **delectus** (Cambridge) 1872. Palästina

Salticus d. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 326 (D ♂♀.)
Attus d. Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 610 T. 60 F. 88 (N ♂♀).

♂ **dentatidens** (Cambridge) 1872. Syrien, Palästina

Salticus d. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 346 (D ♂).
H. d. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 165 (C).

♀ **dilutus** Denis 1937. **Algier**

H. d. Denis 1937, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 1053 T. 5 F. 3 (D ♀).

♂♀ **dubius** C. L. Koch 1848. Frankreich, O.- u. Mitteleuropa, Turkestan, Sibirien, Karakorum

H. d. C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 61 TF. 1317, 1318 (D ♂♀).
H. nitens C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 63 TF. 1319 (D ♀).
H. d. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 674 (D ♂♀).
H. karpinskii Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 679 (D ♂♀).
H. nitens Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 704 (D ♀).
H. d. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 146 T. 10 F. 4 (D ♂♀).
H. d. Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 59 T. 4 F. 9 (D ♂♀).
H. d. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 8 T. 1 F. 22 (D ♂♀).
H. d. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 415 T. 39 F. 610 (D ♂♀).
H. d. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 44 f. 137, 138 (D ♂♀).
H. d. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1159, 1248 f. 1802, 1803 (D ♂).
H. d. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 17 f. . . (N).
H. d. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 55 f. 27 d; T. 5 F. 99—100 (D ♂♀).

♂ **edentulus** Simon 1871. Corsica

H. e. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 351 (D ♂).
H. e. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 143 (D ♂).
H. e. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).
H. e. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1157, 1248 f. 1801 (D ♂).

♂ **encifer** Simon 1871. Corsica

H. e. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 342 (D ♂).
H. e. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 149 T. 10 F. 6 (D ♂).
H. e. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1160, 1248 f. 1810, 1811 (D ♂).

♂ **equester** L. Koch 1867. I Tinos, Dalmatien, Kaukasus, Armenien, Kleinasien

H. e. L. Koch 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 869 (D ♂).
H. e. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 689 (D ♂).

♂♀ **exultans** Simon 1868. Dalmatien, Griechenland, Oberitalien, Ungarn, Frankreich

H. e. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 685 (D ♂).
H. e. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 10 T. 1 F. 24 (D ♂♀).
H. e. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 346 (N).
H. e. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 553 (D ♂♀).
H. e. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1165, 1170, 1249 f. 1826, 1827, 1836 (D ♂♀).

♂ **facetus** (Cambridge) 1872. Palästina

Salticus f. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 344 (D ♂).
H. f. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 165 (C).
H. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).

filiolus Simon 1901. Algier

H. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).

O **flavimaxillis** Bösenberg & Strand 1906. Japan

H. f. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 334 T. 9 F. 15 (D O).

♂ **forcipifer** Kulczynski 1895. Kaukasus, Armenien, Syrien

H. f. Kulczynski 1895, Term. Füzet. 18 p. 5 T. 1 F. 1 (D ♂).
H. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).

♂ **furcatus** (Cambridge) 1872. Palästina
Salticus f. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 346 (D ♂).
H. f. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 165 (C).

♂♀ **furcillatus** Simon 1868. Corfu, Sizilien
H. f. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 696 (D ♂♀).
H. f. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 348 (N).

o **glaucus** Bösenberg & Lenz 1895. Unter-Aegypten
H. g. Bösenberg & Lenz 1895, Jahrb. Hambg. Wiss. Anst. 12 (2) p. 33 T. 1 F. 9 (D o).

♂ **heliophanoides** (Cambridge) 1872. Syrien
Salticus h. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 328 (D ♂).

o **kashmiricus** Caporiacco 1935. Karakorum
H. k. Caporiacco 1935, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 201 (D o).

♂ **keyserlingi** Simon 1878. Algier
H. k. Simon 1878, Ann. Soc. Ent. France (5) 8 p. 208 (D ♂).
H. k. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).

♂♀ **kochii** Simon 1868. S.-Europa
H. k. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 699 T. 7 F. 13 (D ♂♀).
H. armatus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 700 (D ♂♀).
H. k. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 350 (N).
H. armatus Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 350 (N).
H. k. Simon 1876, Arachn. de France 3p. 156 T. 10 F. 15 (D ♂♀).
H. armatus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 157 (D ♂♀).
H. k. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 9 T. 1 F. 28 (D ♂♀).
H. k. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 550 (D ♂♀).
H. k. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1163, 1167, 1250 f. 1818, 1819, 1834 (D ♂♀).

♂♀ **lacteus** Simon 1868. Griechenland, I. Naxos
H. l. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 706 (D ♀).
H. l. Simon 1878, Ann. Soc. Ent. France (5) 8 p. 210 (D ♂).

♂♀ **lineiventris** Simon 1868. S.-Europa
H. l. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 688 (D ♂♀).
H. l. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 347 (N).
H. l. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 158 T. 10 F. 11 (D ♂♀).
H. l. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 9 T. 1 F. 29 (D ♂♀).

♂♀ **lucipeta** Simon 1890. Libyen, Aegypten, Arabien
H. l. Simon 1890, Ann. Soc. Ent. France (6) 10 p. 119 (D ♀).
H. l. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 61 f. 15 (D ♂).
H. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 547 (N).

♂ **machaerodes** Simon 1909. Marokko
H. m. Simon 1909, Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 6 (1) p. 39 (D ♂).

♂♀ **melinus** L. Koch 1867. Italien, Balkanländer, Creta, Syrien, Armenien, Kaukasus, Turkestan
H. m. L. Koch 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 870 (D ♂♀).
H. m. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 696 (D ♂♀).
H. m. Chyzer & Kulczynski 1891, Oran. Hungar. 1 p. 9 T. 1 F. 25 (D ♂♀).
H. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).

♂ **miles** Simon 1878. SO.-Russland

H. m. Simon 1878, Ann. Soc. Ent. France (5) 8 p. 209 (D ♂).
H. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).

♀ **minutissimus** Simon 1871. Krim

H. m. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 352 (D ♀).

♀ **moestus** (Lucas) 1846. Algier

Salticus m. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 174 T. 9 F. 2 (D ♀).
H. m. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 165 (N).

♂♀ **mordax** (Cambridge) 1872. Palästina

Salticus m. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 344 (D ♂).
H. m. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 165 (N).
H. m. Kulczynski 1911, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 53 T. 2 F. 68—70 (D ♂♀).

♂♀ **muscorum** (Walckenaer) 1802. – * Europa, Turkestan

Aranea m. Walckenaer 1802, Faun. Paris. 2 p. 248 (D ♂♀).
Salticus aeneus Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 65 TF. 49 (D ♀).
Attus aeneus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 411 (D ♂♀).
H. truncorum C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 51 TF. 1309, 1310 (D ♂♀).
H. truncorum Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 153 (D ♂♀).
H. truncorum Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 675 (D ♂♀).
H. inornatus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 676 (D ♂♀).
H. aeneus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 147 T. 10 F. 2 (D ♂♀).
H. inornatus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 165 (C).
H. aeneus Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 60 T. 3 F. 8 (D ♂♀).
H. m. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 79 (D ♂♀).
H. aeneus Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 8 (D ♂♀).
H. aeneus Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 556 (N).
H. m. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 418 T. 40 F. 616 (D ♂♀).
H. aeneus Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 547 (D ♂♀).
H. m. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 44 f. 135, 136 (D ♂♀).
H. aeneus Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1159, 1169, 1248 f. 1804, 1805 (D ♂♀).
H. inornatus Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1249 (N).
H. m. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 56 f. 27 a, 28 b; T. 6 F. 101—102 (D ♂♀).

♂ **nigriceps** Kulczynski 1895. Kaukasus, Armenien

H. n. Kulczynski 1895, Term. Füzet. 18 p. 6 T. 1 F. 2 (D ♂).

♂ **nigritus** Thorell 1875. Dongebiet

H. n. Thorell 1875, Hor. Soc. Ent. Ross. 11 p. 114 (D ♂).
H. n. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 180 (D ♂).

♀ **nitidus** (Lucas) 1846. Algier, Sizilien

Salticus n. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1, Arachn. p. 173 T. 9 F. 10 (D ♀).
Attus n. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 705 (D ♀).
H. n. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 165 (N).

♀ **niveivestis** Simon 1889. Transcaspien

H. n. Simon 1889, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 39 p. 374 (D ♀).
H. niveiventris Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).

♂♀ **patagiatus** Thorell 1875. W.-, Mittel- u. SO.-Europa, Sibirien, Turkestan

H. metallicus Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 153 (D ♀).
H. p. Thorell 1875, Hor. Soc. Ent. Ross. 11 p. 112 (D ♂♀).
H. metallicus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 148 T. 10 F. 5 (D ♂♀).
H. p. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 9 T. 1 F. 27 (D ♂♀).
H. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 547 (N).
H. p. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 416 T. 40 F. 612 (D ♂♀).
H. p. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 549 (D ♂♀).
H. p. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 41 f. 127, 128 (D ♂♀).
H. p. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1160, 1167, 1248 f. 1808, 1809 (D ♂♀).

♀ **patagiatus albolineatus** Kulczynski 1901. Sibirien

H. p. a. Kulczynski 1901, in: Horvath, Zool. Erg. 3. Reis. Zichy 2 p. 348 (D ♀).

♂ **recurvus** Simon 1868. Sardinien, Schweiz

H. r. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 679 (D ♂).
H. r. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 150 T. 10 F. 3 (D ♂).
H. r. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1160, 1248 (D ♂).

♀ **rehobothicus** Strand 1915. Palästina

H. r. Strand 1915, Arch. Naturg. 81 (A; 2) p. 167 (D ♀).

♂♀ **ritteri** (Scopoli) 1763. Europa, Turkestan, Sibirien

Aranea r. Scopoli 1763, Ent. Carniol. p. 402 (D).
Salticus flavipes Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 66 TF. 50 (D ♂♀).
Salticus flavipes Hahn 1836, Monogr. d. Spinn. 8 p. 2 T 31 F. c (D ♀).
H. flavipes C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 64 TF. 1320—1322 (D ♂♀).
H. flavipes C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 44 (N).
Attus flavipes Westring 1862, Aran. Svec. p. 585 (D ♀).
H. flavipes Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 152 (D ♀).
H. flavipes Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 681 (D ♂♀).
H. flavipes Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 682 (D ♂).
H. varians Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 682 (D ♂. nec ♀).
H. hecticus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 685 (D ♂).
H. fulvignathus Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 345 (D ♂ o).
H. cupreus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 144 T. 10 F. 1 (D ♀, nec ♂).
H. flavipes Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 151 T. 10 F. 7 (D ♂♀).
H. fulvignathus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 152 T. 10 F. 9 (D ♂♀).
H. hecticus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 153 (D ♂).
H. flavipes Cambridge 1881, Proc. Dorset F. Cl. 2 p. 398 (D ♂♀).
H. flavipes Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 61 T. 3 F. 9 (D ♂♀).
H. flavipes Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 79 (D ♂♀).
H. flavipes Hansen 1885, in: Schiödte, Zool. Danica p. 159 (D ♂♀).
H. varians Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 9 (D ♂♀).
H. flavipes Simon 1901, Hist. Nat. Araign 2 (3) p. 547 (N).
H. flavipes Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 417 T. 40 F. 614 (D ♂♀).
H. flavipes Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 551 (D ♂♀).
H. r. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 43 f. 131, 132 (D ♂♀).
H. flavipes Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1163, 1169, 1250 f. 1820, 1821 (D ♂♀).
H. r. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 17 f... (N).
H. r. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 54 f. 27 c; 28 c; T. 5 F. 97—98 (D ♂♀).
H. r. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 214 f. 106 B, F. H (D ♂♀).

♂♀ **rufithorax** Simon 1868. Süd-Europa, Turkestan

H. r. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 693 (D ♂♀).
H. r. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 349 (N).
H. r. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 162 T. 10 F. 19 (D ♂♀).
H. r. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1162, 1167, 1249 f. 1816, 1817, 1833 (D ♂♀).

♂o **semipullatus** Denis 1953. Hoch-Pyrenäen

H. s. Denis 1953, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 88 (1—2) p. 90 f. 1—2 (D ♂ o).

♂♀ **senussus** Caporiacco 1928. Libyen

H. s. Caporiacco 1928, Ann. Mus. Civ. Genova 53 p. 101 f. 8 (D ♂♀).

♂♀ **stylifer** Simon 1878. Algier

H. s. Simon 1878, Ann. Soc. Ent. France (5) 8 p. 209 (D ♂).
H. s. Denis 1937, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 1053 T. 5 F. 1, 2 (D ♂♀).

♂♀ **tribulosus** Simon 1868. Mittel- u. S.-Europa, Kleinasien, Turkestan

H. t. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 694 (D ♂♀).
H. cambridgii Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 695 T. 7 F. 12 (D ♂♀).
H. cognatus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 692 (D ♂♀).
H. cambridgii Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 349 (N).
H. cambridgii Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 163 T. 10 F. 12 (D ♂♀).
H. cambridgii Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 63 T. 3 F. 10 (D ♂♀).
H. cambridgii Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 10 T. 1 F. 23 (D ♂♀).
H. cambridgii Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).
H. cambridgii Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 418 T. 40 F. 615 (D ♂♀).
H. cambridgii Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 554 (D ♂♀).
H. cambridgii Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 41 f. 125, 126 (D ♂♀).
H. t. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1162, 1167, 1249 f. 1814, 1815, 1832 (D ♂♀).
H. cognatus Simon 1937 Arachn. de France 6 (5) p. 1250 (N).

♂♀ **uncinatus** Simon 1868. Schweiz, Griechenland

H. u. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 691 T. 7 F. 11 (D ♂♀).
H. u. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 553 (D ♂♀).

♂♀ **ussuricus** Kulczynski 1895. Sibirien

H. u. Kulczynski 1895, Rozpraw. Ak. Umiej. Krakow. (2) 12 p. 51 T. 2 F. 6—9 (D ♂♀).
H. u. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).

♂♀ **viriatus** Simon 1868. Schweiz, Frankreich, England, Dalmatien, Bulgarien, Kleinasien

H. v. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 686 (D ♂).
H. grammicus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 687 T. 7 F. 10 (D ♂♀).
H. expers Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 698 (D ♂).
Salticus expers Cambridge 1870, Trans. Linn. Soc. Lond. 27 (3) p. 401 T. 54 F. 5 (D ♂).
H. v. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 347 (N).
H. grammicus Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 347 (N).
H. expers Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 348 (N).

H. expers Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 160 T. 10 F. 14 (D ♂♀).
H. v. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 161 T. 10 F. 13 (D ♂).
H. grammicus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 161 T. 10 F. 18 (D ♂).
H. expers Cambridge 1881, Proc. Dorset. F. Cl. 2 p. 396 (D ♂).
H. grammicus Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 547 (N).
H. v. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 554 (D ♂♀).
H. v. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1166, 1167, 1249 f. 1830, 1831 (D ♂♀).
H. expers Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 214 f. 106 C, D (D ♂♀).

Aethiopische Arten:

♂♀ **activus** (Blackwall) 1877. Seychellen
Salticus a. Blackwall 1877, Proc. Irish Ac. Sci. (2) 3 p. 4 T. 1 F. 3 (D ♂♀).
H. a. Simon 1897, Ann. Soc. Ent. France 66 p. 388 (N).
H. a. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 54 f. 5 (D ♂).

♂♀ **ambiguus** Lessert 1925. Ost-Afrika, Süd-Abessinien
H. a. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 458 f. 40—42 (D ♂♀).
H. a. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 230 (N ♂♀).

O o **anomalus** Caporiacco 1947. Ost-Afrika
H. a. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 231 (D O o).

♂♀ **aviculus** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste
H. a. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 321 f. 23 (D ♂♀).

♀ **beardii** Peckham 1903. Capland
H. b. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 189 T. 20 F. 6 (D ♀).

♀ **berlandi** Lawrence 1937. Zululand
H. b. Lawrence 1937, Ann. Natal Mus. 8 (2) p. 257 f. 24 (D ♀).

♂♀ **capicola** Simon 1901. S.-Afrika
H. c. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 52 f. 1 (D ♂♀).
H. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).

♂ **cassinicola** Simon 1909 (1910). Portug. Guinea
H. c. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 424 f. 20 (D ♂).

♀ **clarus** Peckham 1903. Mashonaland
H. c. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 190 T. 21 F. 6 (D ♀).

♂♀ **claviger** Simon 1901. S.-Afrika
H. c. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 56 f. 9 (D ♂♀).'
H. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).

♂♀ **clercki** Caporiacco 1949. Kenya
H. c. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 477 f. 92 a, b (D ♂♀).

♂ **congolensis** Giltay 1935. Belg. Congo
H. c. Giltay 1935, Bull. Mus. Hist. Nat. Belg. 11 (6) p. 10 f. 6 (D ♂).

♂♀ **crudeni** Lessert 1925. O.-Afrika
H. c. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 462 f. 46—49 (D ♂♀).

♂ **deamatus** Peckham 1903. Mashonaland
H. d. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 190 T. 20 F. 3 (D ♂).

♂ **debilis** Simon 1901. Süd- u. Ost-Afrika
H. d. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 59 f. 12 (D ♂).
H. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 547 (N).
H. d. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 232 (N).

♂ **decoloratus** Lawrence 1927. SW.-Afrika
H. d. Lawrence 1925, Ann. S. Afr. Mus. 25 (1) p. 58 T. 4 F. 83 (D ♂).

♂♀ **decoratus** L. Koch 1875. Abessinien, Aegypt. Sudan, Oase Siwah
H. d. L. Koch 1875, Aegypt. Abyss. Arachn. p. 87 T. 7 F. 8 (D ♂).
H. d. Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 624 (N ♂, D ♀).
H. d. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 56 f. 8 (N ♂).
H. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 547 (N).

♂ **deserticola** Simon 1901. S.-Afrika
H. d. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 59 f. 13 (D ♂).
H. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 547 (N).

♂ **didieri** Simon 1904. Abessinien
H. d. Simon 1904, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 10 (7) p. 447 f. 3, 4 (D ♂).

♂ **dubourgi** Simon 1904. Abessinien
H. d. Simon 1904, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 10 (7) p. 445 f. 1, 2 (D ♂).

♀ **erythropleurus** Kulczynski 1901. Erythraea
H. e. Kulczynski 1901, Bull. Ac. Sci. Cracov. 41 p. 51 T. 2 F. 49 (D ♀).

♂♀ **eucharis** Simon 1887. Elfenbeinküste
H. e. Simon 1887, Ann. Soc. Ent. France (6) 7 p. 261 (D ♂♀).
H. e. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).

♂ **ghesquieri** Giltay 1935. Belg. Congo
H. g. Giltay 1935, Bull. Mus. Hist. Nat. Belg. 11 (6) p. 7 f. 5 (D ♂).

♂♀ **giltayi** Lessert 1933. Angola
H. g. Lessert 1933, Rev. Suisse Zool. 40 (4) p. 147 f. 64—66 (D ♂♀).

♂ **hamifer** Simon 1885. Mozambique
H. h. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 388 f. 1 (D ♂).
H. h. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 53 f. 2 (N ♂).
H. h. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).

♂ **harpago** Simon 1909 (1910). Gabun
H. h. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 425 f. 21 (D ♂).

♂ **imerinensis** Simon 1901. Madagascar
H. i. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 53 f. 3 (D ♂).

♂♀ **kankanensis** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea
H. k. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Paris 12 (2) p. 322 f. 24 (D ♂♀).

♀ **macentensis** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea
H. m. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 323 f. 25 (D ♀).

♂ **marshallii** Peckham 1903. Natal
H. m. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 192 T. 20 F. 5 (D ♂).

♂ **marshii** Peckham 1903. Capland
H. m. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 189 T. 20 F. 4 (D ♂).

♂ **mauricianus** Simon 1901. I. Mauritius
H. m. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 59 f. 6 (D ♂).
H. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).

♂♀ **menemeriformis** Strand 1907. O.-Afrika
H. m. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (17—18) p. 546 (D ♂♀).
H. m. Strand 1907, Zool. Jahrb. Syst. 25 (5—6) p. 712 (D ♂♀).

♀ **modicus** Peckham 1903. S.-Afrika
H. m. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 193 T. 20 F. 2 (D ♀).

♂ **mucronatus** Simon 1901. Madagascar
H. m. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 57 f. 10 (D ♂).

♂♀ **nossibeensis** Strand 1907. Madagascar
H. n. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (23) p. 746 (D ♂♀).
H. n. Strand 1908, Nyt Mag. Naturvid. 46 (2) p. 188 (D ♂♀).

♀ **ochrichelis** Strand 1907. O.-Afrika
H. o. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (17—18) p. 546 (D ♀).
H. o. Strand 1907, Zool. Jahrb. Syst. 25 (5—6) p. 715 (D ♀).

♂ **orchesta** Simon 1885. Sansibar, S.-Afrika
H. o. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 389 f. 2 (D ♂).
H. o. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 54 f. 4 (N ♂).
H. o. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 541, 550 f. 666 (N ♂).

♂♀ **orchesticides** Lessert 1925. O.-Afrika
H. o. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 461 f. 43—45 (D ♂♀).

♂ **patellaris** Simon 1901. Capland
H. p. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 58 f. 11 (D ♂).
H. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 541, 550 f. 667 (N ♂).

♂ **peckhami** Simon 1902. S.-Afrika
H. p. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 26 (D ♂).

♂ **prattii** Peckham 1903. S.-Afrika
H. p. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 191 T. 20 F. 7 (D ♂).

♀ **redimitus** Simon 1910. SW.-Afrika
H. r. Simon 1910, Denkschr. Med. Nat. Ges. Jena 16 p. 216 (D ♀).

♂ **robustus** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste
H. r. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 323 f. 26 (D ♂).

♂ **semirasus** Lawrence 1928. SW.-Afrika
H. s. Lawrence 1928, Ann. S. Afr. Mus. 25 (2) p. 258 T. 22 F. 38, 39 (D ♂).

♂ **soudanicus** Berland & Millot 1941. Franz. Sudan
H. s. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 324 f. 27 (D ♂).

♂ **suedicola** Simon 1901. Aegypt. Sudan, Yemen
H. s. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 60 f. 14 (D ♂).
H. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 547 (N).

♀ **tessalensis** Strand 1906. Abessinien
H. t. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 662 (D ♀).
H. t. Strand 1909, Societ. Ent. 23 p. 187 (D ♀).

♂♀ **transvaalicus** Simon 1901. Transvaal, Ost-Afrika
H. t. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 55 f. 7 (D ♂♀).
H. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 541, 550 f. 668 (N ♂).
H. t. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar 40 (3) p. 231 (N).

♂ **tropicus** Simon 1910. SW.-Afrika
H. t. Simon 1910, Denkschr. Med. Nat. Ges. Jena 16 p. 215 (D ♂).

♀ **undecimmaculatus** Caporiacco 1941. Süd-Abessinien
H. u. Caporiacco 1941, Miss. Biol. Sagon-Omo 12, Zool. 6 p. 137 f. 59 (D ♀).

Orientalische Arten:

♂ **indicus** Simon 1901. Indochina
H. i. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 152 (D ♂).
H. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 547 (N).

Australische Arten:

♂ **maculatus** Karsch 1878. Neu-S.-Wales
H. m. Karsch 1878, Mitt. München. Ent. Ver. 2 p. 23 (D ♂).
H. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 550 (N).

Gen. **Iona** Peckham 1886.

♀ **nigrovittata** (Keyserling) 1882. – * Tonga-I.
Erasmia n. Keyserling 1882, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1351 T. 114 F. 7 (D ♀).
I. n. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 282 (nom. nov.).
I. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 556 (N).

Gen. **Jaluiticola** Roewer 1944.

♂♀ **hesslei** Roewer 1944. Jaluit
J. h. Roewer 1944, Göteborgs Vet. Vitt. Handl. (B) 2 (11) p. 9 f. 4 (D ♂♀).

Gen. **Maltecora** Simon 1909 (1910).

§ 3 Arten: Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 421.

♂ **chrysochlora** Simon 1909 (1910). I. Principe
M. c. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 423 (D ♂).

♀ **divina** Simon 1909 (1910). I. Principe
M. d. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 422 (D ♀).

♂ **janthina** Simon 1909 (1910). – * San Thomé
M. j. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 421 (D ♂).

Gen. **Orsima** Simon 1901.

Aethiopische Arten:

♂ **constricta** Simon 1901. – * Congo, Elfenbeinküste

O. c. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 149 (D ♂).
O. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 554 f. 662 (N ♂).
O. c. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 325 f. 28 (N ♂).

Orientalische Arten:

♂♀ **formica** Peckham 1907. Borneo

O. f. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 630 (D ♂♀).

Gen. **Phintella** Strand 1906.

♂o **micans** Caporiacco 1935. Karakorum

P. m. Caporiacco 1935, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 201 T. 3 F. 17 (D ♂o).

♀ **typica** Strand 1906. – * Japan

P. t. Strand 1906, in: Bösenberg & Strand, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 333 (D ♀).

Gen. **Phintodes** Strand 1934.

♂♀ **viridimicans** (Simon) 1901. Ecuador

Phintia v. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 146 (D ♂♀).
Phintia v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 553 f. 669 (N ♂).
P. v. Strand 1934, Folia Zool. Hydrobiol. 6 (2) p. 275 (nom. nov. gen.).

Gen. **Rhondes** Simon 1901.

♂♀ **neocaledonica** (Simon) 1888. Neu-Caledonien

Maevia n. Simon 1888, Ann. Soc. Ent. France (6) 8 p. 237 (D ♂).
R. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 552 f. 658 (N ♂).
R. n. Berland 1924, Nov. Caledon. Zool. 3 (2) p. 247 f. 204—206 (N ♂, D ♀).

Gen. **Stridulattus** Petrunkevitch 1926.

♂ **stridulans** Petrunkevitch 1926. I. St. Thomas

S. s. Petrunkevitch 1926, Trans. Connect. Ac. Sci. 28 p. 74 f. 25—28 (D ♂).
S. s. Bryant 1942, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 89 (7) p. 355 (N).

Gen. **Telamonia** Thorell 1887.

Palaearktische Arten:

♂♀ **bifurcilinea** Bösenberg & Strand 1906. Japan

T. b. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 331 T. 9 F. 153; T. 13 F. 357 (D ♂♀).

♂♀ **castriesiana** (Grube) 1861. S.-Europa, Libyen, Palästina, Kaukasus, Sibirien

Attus c. Grube 1861, Bull. Ac. Sci. St. Petersbg. 4 p. 179 (D ♀).
Attus multipunctatus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 606 (D ♀).
Attus multipunctatus Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 194 (D ♂).
Attus multipunctatus Canestrini 1874, Atti Soc. Padova 3 (2) p. 214 (11) T. 8 F. 2 (N ♂).

Attus pavesii Simon 1875, Ann. Soc. Ent. France (5) 5 Bull. p. 92 (D ♂).
Maevia pavesii Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 61 T. 11 F. 17 (D ♂).
Hasarius multipunctatus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 89 (D ♂).
Maevia multipunctata Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 38 (N).
T. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 540 f. 654 (N).
T. c. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1156, 1247 f. 1797—1800 (D ♂♀).

♀ **cylindrata** (Karsch) 1879. Japan

Maevia o. Karsch 1879, Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf. 36 p. 84 (D ♀).
T. c. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 331 (D ♀).

♂ **mellottei** (Simon) 1888. Japan

Maevia m. Simon 1888, Ann. Soc. Ent. France (6) 8 p. 248 (D ♂).
T. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 540, 548 (N).

Aethiopische Arten:

♂♀ **aequipes** Peckham 1903. Natal, O.-Afrika

T. a. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 188 T. 19 F. 3 (D ♂).

♂♀ **aequipes longirostris** Lessert 1925. O.-Afrika

T. a. l. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 448 f. 26—30 (D ♂♀).

♂ **aequipes minor** Lessert 1925. O.-Afrika

T. a. m. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 453 f. 31, 32 (D ♂).

♂ **borreyi** Berland & Millot 1941. Franz. Sudan

T. b. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 326 f. 29 (D ♂).

♀ **borreyi minor** Berland & Millot 1941. Franz. Sudan

T. b. m. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 327 f. 30 (D ♀).

♂ **comosissima** (Simon) 1886. Congo

Maevia c. Simon 1886, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 387 (D ♂).
T. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 540, 547 f. 656 (N ♂).
T. c. Giltay 1935, Bull. Mus. Hist. Nat. Belg. 11 (6) p. 4 f. 3, 4 (D ♂).

♂ **trinotata** Simon 1903. Span. Guinea

T. t. Simon 1903, Mem. Spc. Espan. Hist. Nat. 1 (3) p. 107 (D ♂).

♂ **virgata** Simon 1902. Gabun

T. v. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 721 (D ♂).

Orientalische Arten:

accentifera Simon 1901. Indien

T. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 548 (N).

♂ **annulipes** Peckham 1907. Borneo

T. a. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 641 (D ♂).

♂ **argenteola** Simon 1902. Annam

T. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 731 (D ♂).

♂♀ **clathrata** (Thorell) 1895. Burma

Maevia c. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 345 (D ♂♀).
T. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 548 (N).

♂ **coeruleostriata** (Doleschall) 1859. Amboina
Salticus c. Doleschall 1859, Act. Soc. Ind. Neerl. 5 p. 17 T. 4 F. 2 (D ♂).
Maevia c. Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 274 (D ♂).

♂ **cristata** Peckham 1907. Luzon
T. c. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 640 (D ♂).

♂ **dives** (Simon) 1899. Sumatra
Maevia d. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 119 (D ♂).
T. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 540, 548 (N).

♀ **festiva** Thorell 1887. – * Burma
T. f. Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 386 (D ♀).
T. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 552 (N).

♂ **latruncula** (Thorell) 1877. Celebes
Maevia l. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 581 (D ♂).

♂ **leucaspis** Simon 1903. Sumatra
T. l. Simon 1903, Ann. Soc. Ent. France 72 p. 307 (D ♂).

o **luteocincta** (Thorell) 1891. I. Pinang
Maevia l. Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 124 (D o).

♂ **mundula** (Thorell) 1877. Celebes
Maevia m. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 584 (D ♂).
T. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 548 (N).

♂ **mustelina** Simon 1901. Hongkong
T. m. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 61 (D ♂).
T. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 548 (N).

♂ **olorina** Simon 1901. Ceylon
T. o. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 152 (D ♂).
T. o. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 548 (N).

♂♀ **peckhami** Thorell 1891. Nicobaren
T. p. Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 125 (D ♂♀).

♀ **resplendens** Peckham 1907. Borneo
T. r. Peckham 1907, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 15 (2) p. 639 (D ♀).

♂ **scalaris** (Thorell) 1881. I. Ternate
Maevia s. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 477 (D ♂).

♂ **suavis** (Simon) 1885. Malakka
Thiania s. Simon 1885, Bull. Soc. Zool. France 10 (4—6) p. 439 (D ♂).
T. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 548 (N).

♂ **trochila** (Doleschall) 1859. Java
Salticus t. Doleschall 1859, Act. Soc. Ind. Neerl. 5 p. 19 T. 10 F. 5 (D ♂).

♂♀ **vittata** (C. L. Koch) 1846. Indien, Nicobaren, I. Pinang, Annam, Sumatra, Philippinen
Plexippus v. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 125 TF. 1185 (D o).
Hyllus alternans C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 1694 TF. 1222 (D ♂).
Thiania v. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 326 (C).
Maevia alternans Thorell 1891, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 83 (N).

Maevia v. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 335 (D O ♀).
Maevia alternans Workman 1896, Malays. Spid. p. 11 T. 11 (D ♂).
T. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 540, 541, 548 f. 655 (N ♂).
T. v. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 731 (N).

Australische Arten:

♂ **agapeta** (Thorell) 1881. Neu-Guinea
Maevia a. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 471 (D ♂).

♂♀ **doreyana** (Walckenaer) 1837. Neu-Guinea
Attus d. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 459 (D ♀).
Maevia d. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 488 (D ♂♀).

♀ **leopoldi** Roewer 1938. Neu-Guinea
T. l. Roewer 1938, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors Sér.) 3 (19) p. 81 f. 59, 60 (D ♀).

♂ **mandibulata** Hogg 1915. Neu-Guinea
T. m. Hogg 1915, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 508 f. 4 (D ♂).

♂ **trabifera** (Thorell) 1881. Neu-Guinea
Maevia t. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 480 (D ♂).

♂♀ **vidua** Hogg 1915. Neu-Guinea
T. v. Hogg 1915, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 505 f. 3 (D ♂♀).

Gen. **Tutelina** Simon 1901.

Neotropische Arten:

♂♀ **albonotata** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
T. a. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 33 (D ♂♀).
T. a. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 722 TF. 156 (D ♂♀).

♂ **purpurina** Mello-Leitao 1948. Brit. Guiana
T. p. Mello-Leitao 1948, An. Ac. Bras. Ci. 20 p. 194 f. 33 (D ♂).

♂ **rosenbergi** Simon 1901. Ecuador
T. r. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 149 (D ♂).
T. r. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 549 (N).

Nearktische Arten:

§ 4 ♂, 4 ♀: Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 210—211.

♂♀ **elegans** (Hentz) 1846. – * U. St. Amerika
Attus e. Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 353 T. 21 F. 6 (D ♀).
Attus superciliosus Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 364 T. 22 F. 11 (D ♂).
Maevia cristata C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 70 TF. 1326 (D ♂).
Maevia aurulenta C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 84 TF. 1338 (D ♀).
Attus tibialis Peckham 1883, Descr. Spid. . . . Fam. Attid. p. 11 T. 1 F. 8 (D ♂♀).
Icius e. Keyserling 1885, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. 499 T. 13 F. 8 (D ♂).
Dendryphantes e. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 37 T. 3 F. 26; T. 4 F. 26 (D ♂♀).
Icius e. Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 233 T. 18 F. 3, 4 (D ♂♀).
T. e. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 554 f. 657 (N ♀).
Icius e. Emerton 1902, Common Spid. p. 57 f. 150, 151 (D ♂♀).

Icius e. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 498 T. 41 F. 1 (D ♂♀).
T. e. Kaston 1938, Bull. Connect. Geol. Nat. Hist. Surv. 60 p. 197 (N).
T. e. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 211 f. 140—143 (D ♂♀).
Icius e. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 488 T. 97 F. 1809—11; T. 99 F. 1833—37 (D ♂♀).

2. Gr. Euophryeae

Gen. **Akela** Peckham 1896.

Orientalische Arten:

♀ **fulva** Dyal 1935. Panjab
A. f. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 235 (D ♀).

Neotropische Arten:

♀ **aurantivittata** Mello-Leitao 1945. Argentinien
A. a. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 272 f. 60 (D ♀).

♂ **campestrata** Simon 1901. Venezuela
A. c. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 145 (D ♂).
A. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 571 (N).

♂ **charlottae** Peckham 1896. – * Guatemala
A. c. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 95 T. 7 F. 7 (D ♂).
A. c. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 299 T. 29 F. 8 (N ♂).
A. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 568 f. 688 (N ♂).

♀ **ferrugineonotata** Mello-Leitao 1945. Argentinien
A. f. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 273 f. 61 (D ♂).

♂ **gladifera** Simon 1901. Argentinien
A. g. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 146 (D ♂).
A. g. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 571 (N).

♂ **longobarba** Mello-Leitao 1943. Pernambuco
A. l. Mello-Leitao 1943, Ann. Ac. Bras. Sci. 15 (3) p. 262 (D ♂).

♂ **lunata** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires
A. l. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 3 (24) p. 372 f. 67 (D ♂).

♂ **melanica** Mello-Leitao 1941. Argentinien
A. m. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 181 T. 11 F. 50; f. 73 (D ♂).

♂♀ **modesta** Mello-Leitao 1941. Argentinien
A. m. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 181 f. 74—75 (D ♂♀).

♀ **penicillium** Mello-Leitao 1941. Brasilien
A. p. Mello-Leitao 1941, Arqu. Inst. Biol. S. Paulo 11 (30) p. 255 (D ♀).

♂ **quadrataria** Simon 1901. Venezuela

A. q. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 145 (D ♂).
A. q. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 571 (N).

♀ **quinquevittata** Mello-Leitao 1947. Brasilien

A. q. Mello-Leitao 1947, Arqu. Mus. Paranaense 6 (6) p. 295 T. 39 F. 41 (D ♀).

♂ **simplex** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires

A. s. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 3 (24) p. 373 f. 68 (D ♂).

♀ **trilineata** Mello-Leitao 1941. Argentinien

A. t. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 182 f. 76 (D ♀).

Gen. **Akeloides** Mello-Leitao 1944.

♀ **quadripunctatus** Mello-Leitao 1944. Argentinien

A. q. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 3 (24) p. 374 f. 69 (D ♀).

Gen. **Apamamia** Roewer 1944.

♀ **bocki** Roewer 1944. Gilbert-Ins.

A. b. Roewer 1944, Göteborgs Vet. Vitt. Samh. Handl. (B) 2 (11) p. 7 f. 3 (D ♀).

Gen. **Euophrys** C. L. Koch 1834.

(= **Evophrys** auct. div.)

Palaearktische Arten:

§ 23 ♂, 15 ♀: Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 172—174.
§ 7 ♂, 8 ♀: Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 39—40.
§ 5 ♂, 5 ♀: Roewer 1928, Tierw. Mitteleurop. 3 (6) p. 47 TF. 534—540.
§ 22 ♂, 14 ♀: Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1171—1177.
§ 4 ♂, 4 ♀: Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 35.

♂♀ **acripes** (Simon) 1871. Corsica

Attus a. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 203 (D ♂).
E. a. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 188 (D ♂♀).
E. a. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1175, 1176, 1252 (D ♂♀).

♂♀ **aequipes** (Cambridge) 1871. England, Frankreich, Mitteleuropa, Kroatien

Salticus a. Cambridge 1871, Trans. Linn. Soc. Lond. 27 (3) p. 399 T. 54 F. 4 (D ♂).
Attus a. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 199 (D ♂).
E. a. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 195 (D ♂♀).
E. a. Cambridge 1881, Proc. Dorset F. Cl. 2 p. 404 (D ♂♀).
E. a. Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 71 T. 4 F. 3 (D ♂♀).
E. a. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 43 (D ♂♀).
E. a. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 448 T. 43 F. 656 (D ♂♀).
E. molesta Cambridge 1913, Proc. Dorset F. Cl. 33 p. 91 T. A f. 37, 38 (D).
E. a. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 37 f. 106, 107 (D ♂♀).
E. a. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1180, 1253 (D ♂♀).
E. a. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 18 f. . . (N).
E. a. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 37 f. 23 B; T. 3 F. 50-51 (D ♂♀).
E. a. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 227 f. 110 F, 111 A (D ♂♀).
E. molesta Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 223 f. 111 D (D).

♂♀ **aequipes ludio** (Simon) 1871. Corsica
Attus ludio Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 210 (D ♂♀).
E. ludio Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 194 (D ♂♀).
E. a. l. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1181, 1254 (D ♂♀).

♂♀ **albimana** Denis 1937. Algier
E. a. Denis 1937, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 1054 T. 5 F. 4, 5 (D ♂♀).

♀ **alpicola** L. Koch 1876. Tirol
E. a. L. Koch. 1876, Zeitschr. Ferdinand. Tirol (3) 20 p. 346 (D ♀).

♂♀ **altera** (Simon) 1868. Spanien, Dalmatien
Attus a. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 63 T. 5 F. 15 (D ♂♀).
Hasarius a. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 90 (C).
Attus a. Simon 1878, Ann. Soc. Ent. France (5) 8 p. 211 (D ♂).
E. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 568 f. 685, 687 (N ♂).

♂ **aninotata** Bösenberg & Strand 1906. Japan
E. a. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 338 T. 9 F. 143; T. 14 F. 367 (D ♂).

♂ **astuta** (Simon) 1871. Marokko
Attus a. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 206 (D ♂).
E. a. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 196 (C).

♂ **bacelari** Schenkel 1938. Portugal
E. b. Schenkel 1938, Ark. Zool. 30 (A; 24) p. 18 f. 7 (D ♂).

♂ **balicola** (Simon) 1871. Corsica
Attus b. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 212 (D ♂).
E. b. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 192 (D ♂).
E. b. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1172, 1251 f. 1340 (D ♂).

♂ **breviaculeis** Bösenberg & Strand 1906. Japan
E. b. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 340 T. 14 F. 387 (D ♂).

♂ **canariensis** Denis 1941. Canaren
E. c. Denis 1941, Ann. Soc. Ent. France 110 p. 125 f. 13 (D ♂).

♂ **caporiaccoi** Kolosvary 1934. Ungarn
E. c. Kolosvary 1934, Folia Zool. Hydrobiol. 6 (1) p. 16 f. 20 (D ♂).

♀ **clemens** (Cambridge) 1872. Palästina, Libyen
Salticus c. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 335 (D ♀).
E. c. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 196 (C).

♀ **concolorata** Roewer 1951. Karakorum
E. concolor Caporiacco 1935, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 205 T. 6 F. 3 (D ♀) (praeocc. Banks 1894, sub **Attus**).
E. c. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 452 (nom. nov.).

♂♀ **convergentis** Strand 1906. Libyen, Tunis, Algier
E. c. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 663 (D ♀).
E. c. Strand 1908, Arch. Naturg. 74 (I; 1) T. 2 F. 13 (N ♀).
E. c. Strand 1909, Societ. Ent. 23 p. 187 (D ♀).
E. c. Denis 1937, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 1054 T. 5 D. 6 (D ♂).

♀ **elongata** Caporiacco 1935. Karakorum
E. e. Caporiacco 1935, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 204 T. 6 F. 2 (D ♀).

♀ **fucata** (Simon) 1868. Türkei
Attus f. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 592 (D ♀).
E. f. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 197 (C).

♂♀ **fulgens** (Cambridge) 1872. Syrien, Palästina, Oase Siwah
Salticus f. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 340 T. 14 F. 17 (D ♂♀).
E. f. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 196 (C).
E. f. Denis 1947, Bull. Soc. Fouad I. Ent. 31 p. 69 T. 5 F. 4 (N ♂♀).

♂♀ **gambosa** (Simon) 1868. S.-Europa, N.-Afrika, Syrien
Attus g. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 593 T. 6 F. 7 (D ♂♀).
Attus g. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 202 (N ♂♀).
E. g. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 181 (D ♂♀).
E. g. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1175, 1177, 1252 (D ♂♀).

♂ **gambosa mediocris** Simon 1937. S.-Europa
E. g. m. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1175, 1252 (D ♂).

♂ **graeca** Bristowe 1935. Griechenland
E. g. Bristowe 1935, Proc. Zool. Soc. Lond. (1934) 4 p. 783 f. 16 (D ♂).

♀ **granulata** Denis 1947. Oase Siwah
E. g. Denis 1947, Bull. Soc. Fouad I. Ent. 31 p. 70 T. 5 F. 5 (D ♀).

♀ **heliophaniformis** Dönitz & Strand 1906. Japan
E. h. Dönitz & Strand 1906, in: Bösenberg & Strand, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 393 T. 9 F. 141 (D ♀).

♂♀ **herbigrada** (Simon) 1871. Corsica
Attus h. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 207 (D ♂♀).
E. h. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 191 (D ♂♀).
E. h. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1175, 1177, 1252 (D ♂♀).

♂♀ **imitata** (Simon) 1868. Oberitalien, Dalmatien
Attus i. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 62 (D ♀).
Attus i. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 197 (D ♂).
Hasarius i. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 90 (C).
E. i. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 43 T. 2 F. 1 (D ♂♀).

♂♀ **innotata** (Simon) 1868. S.-Frankreich, Tunis, I. Capri
Attus i. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 548 (D ♀).
Attus i. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 201 (D ♂).
E. i. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 190 (D ♂).
E. i. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1175, 1176, 1252 (D ♂♀).

♂♀ **lanigera** (Simon) 1871. W.-Europa
Attus l. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 171 (D ♂).
E. l. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 176 T. 11 F. 13 (D ♂♀).
E. l. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 559 f. 236—238 (D ♂♀).
E. l. Bristowe 1930, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 6 p. 352 f. 2 (N ♂).
E. l. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1178, 1253 f. 1844—45 (D ♂♀).
E. l. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 227 f. 110 B, C; 111 E (D ♂♀).

o **larvata** Caporiacco 1935. Karakorum
E. l. Caporiacco 1935, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 208 T. 5 F. 4 (D o).

♀ **lundbladii** Schenkel 1938. Spanien

E. l. Schenkel 1938, Ark. Zool. 30 (A; 24) p. 15 f. 6 (D ♀).

♂♀ **luridata** (Simon) 1868. Oberitalien

Attus l. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 600 (D ♂♀).
E. l. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 197 (C).

♂ **luteolineata** (Simon) 1871. Corsica

Attus l. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 217 (D ♂).
E. l. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 186 (D ♂).
E. l. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1174, 1251 (D ♂).

♂♀ **maculata** (Wider) 1834. – * Europa, Kleinasien, Sibirien

Aranea frontalis Walckenaer 1802, Faun. Paris. 2 p. 246 (D ♀) (praeocc. Olivier 1789).
Salticus m. Wider 1834, Mus. Senckenbg. 1 p. 278 T. 18 F. 10 (D ♀).
Salticus rufifrons Blackwall 1834, Research in Zool. p. 4203 (D).
E. frontalis C. L. Koch 1834, in: Herrich-Schäffer, Deutschl. Ins. 123 T. 1 F. 7, 8.
Attus frontalis Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 415 (D ♀).
Attus frontalis C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 44 TF. 1304, 1305 (D ♂♀).
Salticus frontalis Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 52 T. 3 F. 27 (D ♂♀).
Attus striolatus Westring 1862, Aran. Svec. p. 591 (D ♀).
Atta frontalis Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 311 (C).
Attus frontalis Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 597 (D ♂♀).
Attus frontalis Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 212 (N ♂).
E. frontalis Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 183 (D ♂♀).
E. frontalis Menge 1879, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 496 T. 82 F. 283 (D ♂♀).
E. frontalis Cambridge 1881, Proc. Dorset F. Cl. 2 p. 403 (D ♂♀).
E. frontalis Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 67 T. 4 F. 1 (D ♂♀).
E. frontalis Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw.-Holst. 5 (2) p. 79 (D ♂♀).
E. frontalis Hansen 1885, in: Schiödte, Zool. Danica p. 160 (D ♂♀).
E. frontalis Peckkam 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 325 (D).
E. frontalis Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 43 (D ♂♀).
E. frontalis Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 572 (N).
E. frontalis Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 450 T. 43 F. 658 (D ♂♀).
E. frontalis Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 561 (D ♂♀).
E. m. Dahl 1912, Beitr. z. Naturdenkmalpfl. 3 p. 588 (D ♂♀).
E. m. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 35 f. 104, 105 (D ♂♀).
E. frontalis Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1172, 1176, 1251 f. 1839, 1842 (D ♂♀).
E. m. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 18 f. . . . (N).
E. m. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 35 f. 23 A; T. 3 F. 45 bis 46 (D ♂♀).
E. frontalis Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 223 f. 110 A, D u. 111 B (D ♂♀).

♂♀ **manicata** (Simon) 1871. Marokko

Attus m. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 205 (D ♂♀).
E. m. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 196 (C).

♀ **marmarica** Caporiacco 1928. Libyen

E. m. Caporiacco 1928, Ann. Mus. Civ. Genova 53 p. 104 f. 9 (D ♀).

♂ **misera** (Simon) 1868. Corsica, Schweiz, Schweden

Attus m. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 608 (D ♂).
Attus m. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 171 (N).

E. m. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 178 (D ♂).
E. m. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 560 f. 239 (D ♂).

♀ **monticola** Kulczynski 1884. Tatra, Galizien

E. m. Kulczynski 1884, Conspect. Attid. Galic. p. 93 T. 8 F. 22 (D ♀).
E. m. Kulczynski 1884, in: Chyzer & Kulczynski, Aran. Hungar. 1 p. 43 (D ♀).

mottli Kolosvary 1934. Banat

E. m. Kolosvary 1934, Folia Zool. Hydrobiol. 6 (1) p. 16 f. 19 (D juv.).

♂ **nigripalpis** Simon 1937. S.-Frankreich, Corsica

E. n. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1181, 1253 (D ♂).

♂♀ **nigritarsis** (Simon) 1863. O.-Pyrenäen

Attus n. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 580 (D ♂♀).
E. n. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 180 (D ♂♀).
E. n. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1174, 1176, 1251 f. 1841 (D ♂♀).
E. n. Denis 1952, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 87 (1—2) p. 60 f. 2—5 (N ♂♀).

♀ **nigromaculatus** (Lucas) 1846. Algier

Salticus n. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 182 T. 10 F. 3 (D ♀).
E. n. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 196 (C).
Atta n. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 311 (C).

♂♀ **obsoleta** (Simon) 1868. Ungarn, Dalmatien, Corfu, Bulgarien, Österreich, Krim, Dongebiet, Turkestan

Attus o. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 595 (D ♂♀).
E. o. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 196 (C).
E. o. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 316 (N).
E. confusus Kulczynski 1891, in: Chyzer & Kulcyznski, Aran. Hungar. 1 p. 40 T. 1 F. 42 (D ♂♀).

♂♀ **petrensis** C. L. Koch 1837. W.- u. Mitteleuropa, Oberitalien, Schweden, Russland, Krim

E. p. C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 34 (D ♀).
Attus p. C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 49 TF. 1307 (D ♀).
Attus p. Westring 1851, Göteborg Vet. Handl. 2 p. 62 (D ♂).
Attus p. Westring 1862, Aran. Svec. p. 555 (D ♂).
Salticus coccociliatus Cambridge 1863, Zoologist 21 p. 8562 (D ♂♀).
Balla p. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 311 (C).
Attus coccociliatus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 609 (D ♂♀).
Attus p. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 204 (N).
E. p. Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 374 (N).
E. p. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 193 (D ♂♀).
E. p. Cambridge 1881, Proc. Dorset F. Cl. 2 p. 406 (D ♂♀).
E. p. Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 69 T. 4 F. 2 (D ♂♀).
E. p. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 78 (D ♂♀).
E. p. Kulczynski 1898, Symb. Faun. Aran. Austr. Infer. p. 112 T. 2 F. 85, 86 (N ♀).
E. p. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 449 T. 43 F. 657 (D ♂♀).
E. p. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 563 (D ♂♀).
E. p. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 37 f. 108, 109 (D ♂♀).
E. p. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1181, 1253 f. 1856 (D ♂♀).
E. p. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 18 f. . . (N).
E. p. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 36 T. 3 F. 47—49 (D ♂♀).
E. p. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 225 f. 110 E; 111 C (D ♂♀).

♂ **pexa** Simon 1937. O.-Pyrenäen
E. p. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1174, 1251 (D ♂).

♀ **plebeja** L. Koch 1875. Unter-Aegypten, Libyen
E. p. L. Koch 1875, Aegypt. Abyss, Arachn. p. 90 T. 7 F. 9 (D ♀).

♂♀ **poecilopus** Thorell 1873. Schweden
Attus laetabundus Westring 1862, Aran. Svec. p. 586 (D o).
E. p. Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. 403 (N).
E. p. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 37 f. 24 A; T. 3 F. 52—55 (D ♂♀).

♀ **prinkipona** Roewer 1951. Ins. Prinkipo
E. pulchella Nosek 1905, Ann. Nat. Hofmus. Wien 20 p. 146 (D ♀) (praeocc. Peckham 1893).
E. p. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 452 (nom. nov.).

♂♀ **pseudogambosa** Strand 1915. Palästina
E. p. Strand 1916, Arch. Naturg. 81 (A; 2) p. 168 (D ♂♀).

♀ **quadripunctata** (Lucas) 1846. Algier
Salticus q. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 177 T. 9 F. 6 (D ♀).
E. q. Simon 1880, Ann. Soc. Ent. France (5) 10, Bull. p. 108 (D ♀).

♀ **quinquenotata** Simon 1880. Sizilien
E. q. Simon 1880, Ann. Soc. Ent. France (5) 10, Bull. p. 108 (D ♀).

♂♀ **rufibarbis** (Simon) 1868. S.-Europa, Kleinasien
Attus r. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 602 T. 6 F. 8 (D ♂♀).
E. r. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 186 T. 11 F. 12 (D ♂♀).

♂♀ **rufibarbis comptula** (Simon) 1871. Corsica
Attus comptula Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 216 (D ♂♀).
E. comptulus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 187 (D ♂♀).
E. r. c. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1173, 1251 (D ♂♀).

♂♀ **rufimana** (Simon) 1875. O.-Pyrenäen
Attus r. Simon 1876, Ann. Soc. Ent. France (5) 5, Bull. p. 93 (D ♂).
E. r. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 184 (D ♂).
E. r. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1174, 1176, 1251 (D ♂♀).

O **salomonis** Caporiacco 1935. Karakorum
E. s. Caporiacco 1935, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 203 (D O).

♂ **sedula** (Simon) 1875. Franz. Voralpen
Attus s. Simon 1875, Ann. Soc. Ent. France (5) 5, Bull. p. 93 (D ♂).
E. s. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 185 (D ♂).
E. s. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1174, 1251 (D ♂).

♂ **semirufa** Simon 1884. Syrien
E. s. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 182 (D ♂).

♀ **striolata** (C. L. Koch) 1848. Böhmen, Tirol, Deutschland, Schweden
Attus s. C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 47 TF. 1306 (D ♀).
Atta s. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 311 (C).
E. s. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 196 (C).

♂♀ **sulphurea** (L. Koch) 1867. S.-Europa, Syrien

Attus s. L. Koch 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 873 (D ♂).
Attus s. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 596 (D ♂).
Attus sulphureociliatus Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 203 (D ♂♀).
E. s. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 179 (D ♂♀).
E. s. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1175, 1176, 1252 (D ♂♀).

♂♀ **terrestris** (Simon) 1871. Frankreich, Corsica, Sardinien, Italien, Schweiz

Attus t. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 209 (D ♂♀).
E. t. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 189 (D ♂♀).
E. t. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 240, 241 (D ♂♀).
E. t. Schenkel 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (14) p. 262 f. 19 (N ♀).
E. t. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1174, 1177, 1251 (D ♂♀).

♀ **testaceozonata** Caporiacco 1922. Carnische Alpen

E. t. Caporiacco 1922, Mem. Soc. Ent. Ital. 1 p. 101 f. 5 (D ♀).

♀ **thorellii** Kulczynski 1891. Ungarn, Turkestan, Schweden

E. t. Kulczynski 1891, in: Chyzer & Kulczynski, Aran. Hungar. 1 p. 44 T. 2 F. 4 (D ♀).
E. t. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 39 f. 24 B; T. 3 F. 56 (D ♀).

♂ **undulatovittata** Bösenberg & Strand 1906. Japan

E. u. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 339 T. 14 F. 376 (D ♂).

O **vittata** Caporiacco 1925. Karakorum

E. v. Caporiacco 1925, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 202 T. 5 F. 3 (D O).

♀ **westringii** (Simon) 1868. Alpen, Spanien (Polen?)

Attus w. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 605 (D ♀).

Aethiopische Arten:

♀ **alabardata** Caporiacco 1947. Aethiopien

E. a. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 236 T. 2 F. 69 (D ♀).

capicola Simon 1901. Capland

E. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 571 f. 684 (N).

♀ **infausta** Peckham 1903. Mashonaland

E. i. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 204 T. 22 F. 7 (D ♀).

♀ **kittenbergeri** Caporiacco 1947. Ost-Afrika

E. k. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 236 T. 2 F. 68 (D ♀).

♀ **leipoldtii** Peckham 1903. Capland

E. l. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 203 T. 22 F. 7 (D ♀).

♂♀ **megastylus** Caporiacco 1949. Kenya

E. m. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 480 f. 93a—d (D ♂♀).

♀ **menemerella** Strand 1909. Süd-Afrika

E. m. Strand 1909, Deutsch. S. Pol. Exped. 1901—03; Zool. 2 p. 591 (D ♀).

♂ **minutissimus** Caporiacco 1941. Süd-Abessinien
E. m. Caporiacco 1941, Miss. Biol. Sagan-Omo 12, Zool. 6 p. 139 f. 60 (D ♂).

o **nigrescens** Caporiacco 1940. Somaliland
E. n. Caporiacco 1940, Bull. Lab. Zool. Agr. Portici 31 p. 303 (D o).

♂ **purcellii** Peckham 1903. Capland
E. p. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 201 T. 22 F. 5 (D ♂).

♀ **quadrispinosa** Lawrence 1938. Natal
E. q. Lawrence 1938, Ann. Natal. Mus. 8 (3) p. 523 f. 40 (D ♀).

♂ **simonii** Peckham 1903. Capland
E. s. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 202 T. 22 F. 4 (D ♂).

♀ **valens** Bösenberg & Lenz 1895. O.-Afrika
E. v. Bösenberg & Lenz 1895, Jahrb. Hambg. Wiss. Anst. 12 (2) p. 31 T. 1 F. 6 (D ♀).

Orientalische Arten:

♂ **albopatella** Petrunkevitch 1914. Burma
E. a. Petrunkevitch 1914, Ann. Ent. Soc. Amer. 7 (3) p. 173 T. 26 F. 12, 13 (D ♂).

♂ **auricolor** Dyal 1935. Panjab
E. a. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 236 (D ♂).

♀ **rubroclypeata** Dyal 1935. Panjab
E. r. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 237 (D ♀).

o **rufa** Dyal 1935. Panjab
E. r. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 237 (D o).

Australische Arten:

♂ **parvula** Bryant 1935. Neu-Seeland
E. p. Bryant 1935, Rec. Canterbury Mus. 4 (2) p. 90 T. 10 F. 6 (D ♂).

Neotropische Arten:

♂♀ **albipalpis** Taczanowski 1878. Peru
E. a. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 291 (D ♂♀).

♀ **albocinctus** Mello-Leitao 1941. Argentinien
E. a. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 184 f. 77; T. 11 F. 51 (D ♀).

♂ **ambigua** C. L. Koch 1846. Surinam
E. a. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 206 TF. 1253 (D ♂).
Freya a. C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 66 (N).

♀ **ancilla** C. L. Koch 1846. Argentinien, Brasilien
E. a. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 208 TF. 1251 (D ♀).
Amphirape a. C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 67 (N).

♀ **andina** Taczanowski 1878. Peru
E. a. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 297 (D ♀).

♀ **A-notata** Mello-Leitao 1940. Rio Negro
E. a. Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 55 f. 54 (D ♀).

♂ **aurifrons** Taczanowski 1878. Peru
E. a. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 308 (D ♂).

♀ **banksi** Roewer 1951. Mexico
E. obscura Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 286 T. 17 F. 14 (D ♀). (praeocc. Taczanowski 1878).
E. b. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 452 (nom. nov).

♀ **bifoveolata** Tullgren 1905. S.-Argentinien
E. b. Tullgren 1905, Ark. Zool. 2 (19) p. 73 T. 9 F. 38 (D ♀).

♀ **brunnescens** C. L. Koch 1846. Brasilien
E. b. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 212 TF. 1257 (D ♀).
Amphirape b. C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 67 (N).

♂♀ **crux** Taczanowski 1878. Peru
E. c. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 284 (D ♂♀).

♀ **cruziana** Simon 1905. Patagonien
E. c. Simon 1905, Bull. Mus. Zool. Torino 20 (511) p. 17 (D ♀).

♂♀ **ferrum-equinum** Taczanowski 1878. Peru, Ecuador
E. f. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 304 (D ♂♀).

♀ **incomta** C. L. Koch 1846. Brasilien
E. i. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 213 TF. 1258 (D ♀).
Amphirape i. C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 67 (N).

♀ **keyserlingi** Taczanowski 1878. Peru
E. k. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 285 (D ♀).

♀ **laetata** Simon 1904. Chile
E. l. Simon 1904, Ann. Soc. Ent. Belg. 48 p. 114 (D ♀).

♂♀ **leucodon** Taczanowski 1878. Peru
E. l. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 294 (D ♂♀).

♂♀ **leucopalpis** Taczanowski 1878. Peru
E. l. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 301 (D ♂♀).

♀ **leucostigma** C. L. Koch 1846. Brasilien
E. l. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 210 TF. 1256 (D ♀).
Trivia l. C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 67 (N).

♂♀ **lunata** Bertkau 1880. Brasilien
E. l. Bertkau 1880, Mém. Class. Sci. 43 p. 41 (D ♂♀).

♂ **maura** Taczanowski 1878. Peru
E. m. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 287 (D ♂).

♂ **melanoleuca** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires
E. m. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 3 (24) p. 384 f. 79 (D ♂).

♀ **nanchonensis** Taczanowski 1878. Peru
E. n. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 306 (D ♀).

♀ **newtonii** Peckham 1896. Centr. Amerika
E. n. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 64 T. 5 F. 10 (D ♀).
E. n. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 300 T. 29 F. 14 (N ♀).

♂♀ **nigriceps** Taczanowski 1878. Peru
E. n. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 288 (D ♂♀).

♂ **obscura** (Taczanowski) 1871. Guiana, Peru, Mexico
Attus o. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 124 (D ♂).
E. o. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 289 (D ♂).
Akela o. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 723 (D ♀).

♀ **patagonica** Simon 1905. Patagonien
E. p. Simon 1905, Bull. Mus. Zool. Torino 20 (511) p. 16 (D ♀).

♂ **pelzelni** Taczanowski 1878. Peru
E. p. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 292 (D ♂).

♂♀ **peruviana** Taczanowski 1878. Peru
E. p. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 280 (D ♂♀).

♂ **pulchella** Peckham 1893. St. Vincent
E. p. Peckham 1893, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 699 T. 62 F. 7 (D ♂).

♀ **punctata** Tullgren 1905. Bolivien
E. p. Tullgren 1905, Ark. Zool. 2 (19) p. 74 T. 10 F. 39 (D ♀).

♀ **quadricolor** Taczanowski 1878. Peru
E. q. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 298 (D ♀).

♂♀ **quilpuensis** Simon 1901. Patagonien
E. q. Simon 1901, Rev. Chilen. Hist. Nat. 5 p. 21 (D ♀).
E. q. Berland 1924, Hist. Nat. Juan Fernandez 3 (3) p. 437 f. 38-41 (D ♂, N ♀).

♀ **quinqueradiata** Taczanowski 1878. Peru
E. q. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 282 (D ♀).

♀ **rubiginosa** C. L. Koch 1846. Brasilien
E. r. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 209 TF. 1255 (D ♀).
Trivia r. C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 67 (N).

♀ **saitiformis** Simon 1901. Chile
E. s. Simon 1901, Rev. Chilen. Hist. Nat. 5 p. 22 (D ♀).
E. s. Tullgren 1902, Bih. Svensk. Vet. Ak. Handl. 28 (4; 1) p. 73 T. 7 F. 6 (D ♀).

♀ **sancti-matei** Taczanowski 1878. Peru
E. s. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 300 (D ♀).

♂ **sima** (Chamberlin) 1916. Peru
E. s. Chamberlin 1916, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 60 (6) p. 298 T. 25 F. 1 (D ♂).

♂♀ **sinapicolor** Taczanowski 1878. Peru
E. s. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 303 (D ♂♀).

♀ **sutrix** Holmberg 1875. Argentinien
E. s. Holmberg 1875, Period. Zool. Soc. Ent. Argentin. 1 p. 296 T. 6 F. 5 (D ♀).

♀ **tristis** Mello-Leitao 1940. Süd-Argentinien
E. t. Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 56 f. 55 (D ♀).

♂♀ **vestita** Taczanowski 1878. Peru
E. v. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 293 (D ♂♀).

♀ **vetusta** C. L. Koch 1846. I. St. Thomas
E. v. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 219 TF. 1264 (D ♀).
Trivia v. C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 67 (N).

♂ **ysobolii** Peckham 1896. Guatemala
E. y. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 65 T. 5 F. 11 (D ♂).
E. ysabali F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 300 T. 29 F. 15 (N ♂).

Nearktische Arten:

♀ **concolor** (Banks) 1894. Missouri
Attus c. Banks 1894, Ent. News 6 p. 206 (D ♀).
E. c. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 646 (C).

♂ **cruciata** Emerton 1891. New Hampshire
E. c. Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 241 T. 20 F. 8 (D ♂).
E. c. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 517 T. 43 F. 7 (D ♂).

♀ **diminuta** (Banks) 1896. New York, Connecticut
Icius d. Banks 1896, Journ. N. York Ent. Soc. 4 p. 192 (D ♀).
E. d. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 647 (C).
E. d. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 456 T. 89 F. 1659 (D ♀).

♂♀ **monadnock** Emerton 1891. Californien, Columbia, New Hampshire
E. m. Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 241 T. 20 F. 2 (D ♂♀).
Attus m. Banks 1895, Ann. N. York Ac. Sci. 8 p. 431 (N).
E. m. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 515 f. p. 361; T. 43 F. 8 (D ♂♀).

♀ **nearctica** Kaston 1938. Maine
E. n. Kaston 1938, Bull. Brookl. Ent. Soc. 33 (4) p. 187 T. 9 F. 25, 26 (D ♀).

Gen. **Pseudeuophrys** Dahl 1912.

♂♀ **bimaculata** (Simon) 1868. Frankreich, Spanien, Schweiz, Italien, England
Attus b. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 585 (D ♂, nec ♀).
Attus satageus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 606 (D ♂).
Attus triangulifer Simon 1868, Ann. Soc. Ent France (4) 8 p. 607 (D ♂).
Attus triangulifer Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 169 (N).
Euophrys triangulifera Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 196 (N).

♂♀ **callida** (Walckenaer) 1802. – * Europa, Sibirien
Aranea c. Walckenaer 1802, Faun. Paris. 2 p. 246 (D ♂♀).
Attus c. Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 24 (N).
Attus erraticus Walckenaer 1825, Aran. France p. 46 (D ♂♀).
Salticus agilis Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 72 TF. 54 (D ♂♀).
Salticus gracilis Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 73 TF. 55 (D ♀).
Salticus agilis Hahn 1836, Monogr. d. Spinn. 8 p. 2 T. 31 F. d (D ♀).
Euophrys tigrina C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 33 (N).

Attus erraticus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 409 (D ♀).
Attus c. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 417 (D ♂♀).
Attus tigrinus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 419 (D ♀).
Attus gracilis Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 423 (D ♂♀).
Salticus distinctus Blackwall 1841, Trans. Linn. Soc. Lond. 18 p. 616 (D ♂♀).
Euophrys tigrina C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 6 TF. 1275—1277 (D ♂♀).
Ino tigrina C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 63 (N).
Ino gracilis C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 64 (N).
Salticus gracilis Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 56 (D ♀).
Salticus distinctus Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 54 T. 3 F. 29 (D ♂♀).
Attus tigrinus Westring 1862, Aran. Svec. p. 580 (D ♂♀).
Euophrys gracilis Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 311 (C).
Euophrys agilis Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 312 (C).
Euophrys c. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 312 (C).
Euophrys tigrina Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 162 (D ♂♀).
Attus erraticus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 588 (D ♂♀).
Attus affaber Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 170 (D ♂♀).
Euophrys erratica Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 174 T. 11 F. 14 (D ♂♀).
Attus erraticus Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 490 T. 80 F. 278 (D ♂♀).
Euophrys erratica Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 65 T. 4 F. 13 (D ♂♀).
Attus erraticus Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 77 (D ♂♀).
Euophrys erratica Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 40 T. 1 F. 41 (D ♂♀).
Euophrys erratica Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 568 f. 686 (N ♂).
Euophrys erratica Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 448 T. 43 F. 655 (D ♂♀).
Euophrys erratica Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 557 f. 231, 232 (D ♂♀).
P. c. Dahl 1912, Beitr. z. Naturdenkmalpfl. 3 p. 589 (D ♂♀).
P. c. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 38 f. 110, 111 (D ♂♀).
Euophrys erratica Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1180, 1253, f. 1853 bis 1855 (D ♂♀).
P. c. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 19 f. . . . (N).
Euophrys c. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 39 T. 3 F. 57 bis 59 (D ♂♀).
Euophrys erratica Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 226 f. 110 G; 111 f. (D ♂♀).

♂♀ **difficilis** (Simon) 1868. Corsica, Italien, Dalmatien, Griechenland, Bulgarien

Attus d. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 590 (D ♂♀).
Attus d. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 198 (N).
Euophrys d. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 182 (D ♂♀).
Euophrys d. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1179, 1252 f. 1849, 1850 (D ♂).
Euophrys d. Schenkel 1939, Ark. Zool. 30 (A, 24) p. 15 f. 6 (D ♀).

♂ **pictilis** (Simon) 1871. Corsica, Bulgarien

Attus p. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 172 (D ♂).
Euophrys p. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 178 T. 11 F. 15 (D ♂).
Euophrys p. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1180, 1253 f. 1851, 1852 (D ♂).
? Euophrys p. Schenkel 1939, Ark. Zool. 30 (A, 24) p. 18 f. 7 (D ♂).

♂♀ **vafra** (Blackwall) 1867. S.-Europa, Azoren, Madeira, Tunis, Syrien, Russland

Salticus v. Blackwall 1867, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 20 p. 205 (D ♀).
Attus finitimus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 591 (D ♂♀).
Attus finitimus Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 198 (N).
Euophrys finitima Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 175 (D ♂♀).
Euophrys finitima Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 43 T. 2 F. 3 (D ♂♀).
Attus maderianus Warburton 1892, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 10 p. 217 T. 14 F. 1 (D ♀).
Euophrys finitima Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 558 f. 233 bis 235 (D ♂♀).
Euophrys v. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1178, 1252 f. 1846—1848 (D ♂♀).

Gen. **Rhyphelia** Simon 1902.

♂ **variegata** Simon 1902. Venezuela, Guiana

R. v. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 363 (D ♂).
R. v. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 1053 f. 1120, 1121 (N ♂).

Gen. **Tullgrenella** Mello-Leitao 1941.

♂♀ **morenensis** (Tullgren) 1905. Süd-Argentinien

Euophrys m. Tullgren 1905, Ark. Zool. 2 (19) p. 72 T. 9 F. 37 (D ♂).
T. m. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 192 f. 85 (D ♀).

3. Gr. Hurieae

Gen. **Atelurius** Simon 1901.

♂♀ **incertus** Banks 1929. Panama

A. i. Banks 1929, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 69 (3) p. 71 T. 4 F. 61 (D ♀).
A. i. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 253 f. 214—218 (D ♂♀).

♂ **segmentatus** Simon 1901. – * Venezuela

A. s. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 154 (D ♂).
A. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 586 f. 709 (N ♂).

Gen. **Hurius** Simon 1901.

♀ **costulatus** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires

H. c. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 3 (24) p. 384 f. 80 (D ♀).

♂ **tristis** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires

H. t. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 3 (24) p. 385 f. 81 (D ♂).

♀ **vulpinus** Simon 1901. – * Ecuador

H. v. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 154 (D ♀).
H. v. Simon 1901, Hist. Araign. 2 (3) p. 585 f. 708 (N).

Gen. **Scoturius** Simon 1901.

♀ **taeniatus** Mello-Leitao 1917. Brasilien

S. t. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 145 (D ♀).

tigris Simon 1901. – * Paraguay, S.-Brasilien

S. t. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 154 (D).
S. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 585 f. 705—707 (N).

Gen. **Spinurius** Mello-Leitao 1941.

♂♀ **aeneus** Mello-Leitao 1941. Argentinien

S. a. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.), 2, Zool. p. 187 T. 11 F. 53; f. 80 (D ♂♀).

20. Subfam. Dendryphantinae

1. Gr. Dendryphanteae

Gen. **Admestina** Peckham 1888.

Neotropische Arten:

♂♀ **bitaeniata** Simon 1901. Chile

A. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 624 (N).
A. b. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 28 (D ♂♀).

♂ **insularis** Banks 1902. Galapagos-I.

A. i. Banks 1902, Proc. Wash. Ac. Sci. 4 p. 66 T. 2 F. 4 (D ♂).

Nearktische Arten:

♂♀ **tibialis** (C. L. Koch) 1848. – * U. St. Amerika

Maevia t. C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 78 TF. 1333 (D ♂).
A. wheelerii Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 78 T. 1 F. 58; T. 5 F. 58 (D ♂).
A. wheelerii Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 120 T. 11 F. 6 (N ♂).
A. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 629 (N).
Maevia t. Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 227 T. 11 F. 6 (N ♀).
A. t. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 510 T. 42 F. 3 (D ♂♀).
A. t. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 143 f. 1—3 (D ♂♀).
A. t. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 472 T. 94 F. 1740 bis 44 (D ♂♀).

Gen. **Ashtabula** Peckham 1894.

♂ **cuprea** Mello-Leitao 1946. Uruguay

A. c. Mello-Leitao 1946, Comm. Zool. Mus. Hist. Nat. Montevideo 2 (35) p. 9 (D ♂).

♂♀ **dentata** F. Cambridge 1901. Guatemala, Panama

A. d. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 257 T. 23 F. 1 (D ♂).
A. d. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 248 f. 206—211 (D ♂♀).

♂ **dentichelis** Simon 1901. Venezuela

A. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 614 f. 741 (N ♂).
A. d. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 31 (D ♂).

♂♀ **furcillata** Crane 1949. Venezuela

A. f. Crane 1949, Zoologica (N. York) 34 (2) p. 39 f. 4 (D ♂♀).
A. f. Crane 1950, Zool. Sci. Contrib. N. York Zool. Soc. 35 (1) p. 256 (D ♂♀)

♂♀ **glauca** Simon 1901. Mexico
A. g. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 614 f. 739—740 (N ♂).
A. g. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 31 (D ♂♀).

♀ **montana** Chickering 1946. Panama
A. m. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 212—213 (D ♀).

♂ **sexguttata** Simon 1901. Brasilien
A. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 614 f. 742 (N ♂).
A. s. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 32 (D ♂).

♂♀ **zonura** Peckham 1894. – * Columbien
A. z. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 140 T. 14 F. 4 (D ♂♀).

Gen. **Avitus** Peckham 1896.

♂ **anumbi** Mello-Leitao 1940. Brasilien
A. a. Mello-Leitao 1940, Ann. Ac. Bras. Sci. 12 (1) p. 31 (D ♂).

♀ **castaneonotatus** Mello-Leitao 1939. Argentinien
A. c. Mello-Leitao 1939, Rev. Suisse Zool. 46 (2) p. 84 f. 73 (D ♀).

♂ **diolenii** Peckham 1896. – * Panama
A. d. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 57 T. 5 F. 3 (D ♂).
A. d. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 298 T. 29 F. 7 (N ♂).
A. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 630 (N).
A. d. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 257 (N ♂).

♂ **longidens** Simon 1901. Argentinien
A. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 614 f. 731 (N ♂).
A. l. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 30 (D ♂).

♂ **variabilis** Mello-Leitao 1945. Argentinien
A. v. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 4 (29) p. 276 f. 64—66 (D ♂).

Gen. **Bagheera** Peckham 1896.

♂ **kiplingii** Peckham 1896. Guatemala
B. k. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 88 T. 7 F. 1 (D ♂).
B. k. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 298 T. 29 F. 5 (N ♂).
B. k. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 630 (N).

Gen. **Bryantella** Chickering 1946.

♂♀ **speciosa** Chickering 1946. Panama
B. s. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 390 f. 343—347 (D ♂♀).

Gen. **Cheliferoides** F. Cambridge 1901.

Neotropische Arten:

♀ **planus** Chickering 1946. Panama
C. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 275 f. 233—236 (D ♀).

♂ **segmentatus** F. Cambridge 1901. – * Guatemala
C. s. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 254 T. 22 F. 12 (D ♂).
C. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 871 (N).

Nearktische Arten:

♂♀ **longimanus** Gertsch 1936. Texas
C. l. Gertsch 1936, Amer. Mus. Novit. 852 p. 22 TF. 32 (D ♂♀).

Gen. **Crulsia** Mello-Leitao 1930.

♀ **typica** Mello-Leitao 1930. Amazonas
C. t. Mello-Leitao 1930, Arch. Mus. Nac. R. d. Janeiro 32 p. 72 TF. 45, 46 (D ♀).

Gen. **Dendryphantes** C. L. Koch 1837.

Palaearktische Arten:

§ 5 ♂, 6 ♀: Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 36—37.
§ 3 ♂, 3 ♀: Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 16.
§ 3 ♂, 4 ♀: Roewer 1928, Tierw. Mitteleurop. 3 (6) p. 46 TF. 517—518.
§ 2 ♂, 2 ♀: Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1213—1214.

♀ **caporiaccoi** Roewer 1951. Karakorum
D. variegatus Caporiacco 1935, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 211 T. 5 F. 8 (D ♀) (praeocc. Lucas 1846, sub **Salticus**).
D. c. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 452 (nom. nov.).

♂♀ **catus** (Blackwall) 1867. Madeira
Salticus c. Blackwall 1867, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 20 p. 206 (D o).
D. c. Kulczynski 1899, Rozpraw. Ak. Umiej. Krakow. (2) 16 p. 445 T. 9 F. 136—138, 142, 143, 147 (D ♂♀).
D. curtus Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).
D. c. Kulczynski 1911, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 71 T. 2 F. 95 (N ♀).

♀ **comatus** Karsch 1880. Syrien
D. c. Karsch 1880, Zeitschr. ges. Naturw. 53 p. 397 (D ♀).

♀ **flavicomis** Simon 1884. Griechenland, I. Syra, Rhodos
D. f. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 308 (D ♀).
D. f. Fage 1921, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 27 (1—3) p. 231 f. 8 B (N).
D. f. Caporiacco 1948, Redia 33 p. 69 (N ♀).

♀ **fulviventris** (Lucas) 1846. Algier
Salticus f. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 151 T. 6 F. 1 (D ♀).
Attus f. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 175 (N).
Menemerus f. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 183 (D ♀).
Phlegra f. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 127 (C).
Ictidops f. Pavesi 1884, Ann. Mus. Civ. Genova 20 p. 477 (N).
Phlegra f. Denis 1937, Proc. Zool. Soc. London p. 1057 T. 5 F. 14 (C ♀).

♀ **grantii** (Warburton) 1892. Madeira
Marpissa g. Warburton 1892, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 10 p. 217 T. 14 F. 2, 3 (D ♀).
D. g. Kulczynski 1899, Rozpraw. Ak. Umiej. Krakow. (2) 16 p. 451 T. 9 F. 127, 139, 146 (D ♀).
D. g. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).

♂♀ **hastatus** (Clerck) 1757. – * Europa, Sibirien

Araneus hastatus Clerck 1757, Aran. Suec. p. 115 T. 5 F. 11 (D ♀).
Aranea pini De Geer 1778, Mém. p. s. Hist. Nat. Ins. 7 p. 285 T. 17 F. 3—7 (D ♂♀).
Aranea pini Olivier 1789, Encycl. Méthod. 4 p. 219 (D).
Aranea lunulata Walckenaer 1802, Faun. Paris. 2 p. 246 (D).
Attus lunulatus Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 24 (N).
Salticus pini Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 59 TF. 45 (D ♂♀).
Attus rudis Sundevall 1832, Svensk. Vet. Ak. Handl. p. 205 (D ♂♀).
Attus muscosus Sundevall 1832, Svensk. Vet. Ak. Handl. p. 208 (D ♂♀).
Salticus pini Hahn 1836, Monogr. d. Spinn. 8 p. 2 T. 31 F. a, b (D ♀).
D. medius C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 32 (D).
D. minor C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 32 (D).
Attus lunulatus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 416 (D ♀).
D. medius C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 77 TF. 1141—1143 (D ♂♀).
D. h. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 81 TF. 1145, 1146 (D ♂♀).
Attus h. Westring 1851, Göteborg Vet. Handl. 2 p. 55 (N).
Attus medius Westring 1851, Göteborg Vet. Handl. 2 p. 55 (N).
Attus h. Westring 1862, Aran. Svec. p. 556 (D ♂♀).
Attus medius Westring 1862, Aran. Svec. p. 558 (D ♀).
Euophrys lunulata Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 312 (C).
D. medius Ohlert 1867, Aran. Prov. Preußen p. 156 (D ♂♀).
D. h. Ohlert 1867, Aran. Prov. Preußen p. 157 (D ♂♀).
Attus lemniscus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 549 (D ♀).
Attus bombycius Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 577 (D ♀).
Attus h. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 576 T. 2 F. 5 (D ♂♀).
Attus medius Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 578 (D ♂♀).
Attus bombycius Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 188 (N).
D. h. Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 375 (N).
D. bombycius Simon 1876, Aradın. de France 3 p. 37 (D ♂♀).
D. h. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 39 (D ♀).
D. rudis Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 40 (D ♂♀).
D. h. Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 479 T. 79 F. 271 (D ♂♀).
D. rudis Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 481 T. 79 F. 272 (D ♂♀).
D. rudis Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 20 T. 3 F. 1 (D ♂♀).
D. h. & rudis Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 78 (D ♂♀).
D. pini Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 110 (C).
D. rudis Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 16 (D ♂♀).
D. h. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 47 T. 4 F. 3 (D ♀).
D. h. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 631 (N).
D. rudis Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 440 T. 42 F. 645 (D ♂♀).
D. h. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 440 T. 42 F. 646 (D ♂♀).
D. rudis Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 581 (D ♂♀).
D. h. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 582 (D ♀).
D. pini Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) u. 110 (C).
D. rudis Fage 1921, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 27 (1—3) p. 231 f. 8 A (N ♂).
D. h. Schenkel 1923, Verh. Nat. Ges. Basel 34 p. 122 T. 7 F. 17 (N ♂).
D. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).
D. rudis Schenkel 1923, Verh. Nat. Ges. Basel 34 p. 122 T. 7 F. 18 (N ♂♀).
D. pini Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 41 f. 124 (D ♂♀).
D. h. Bogoiavlensky 1928, Bull. Stat. Biol. Bolchevo 2 p. 56 TF. 13 (N ♀).
D. pini Reimoser 1930, Die Natur (Wien) 6 (3) p. 56 f. 11 (N ♂♀).
D. rudis Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1214, 1263 f. 1943, 1944 (D ♂♀).

D. rudis Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 35 f. . . . (N).
D. pini & rudis Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 49 u. 48 f. 26a, b; T. 5 F. 84—88 (D ♂♀).

♀ **lanipes** C. L. Koch 1846. Oberitalien

D. l. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 90 TF. 1152 (D ♀).
D. l. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 636 (D ♀).

♂♀ **moebii** Bösenberg 1895. Madeira, Canaren

D. m. Bösenberg 1895, Abh. Nat. Ver. Hambg. 13 p. 10 TF. 12 (D ♂♀).
D. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).

♂♀ **nebulosus** C. L. Koch 1846. Italien

D. n. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 89 TF. 1151 (D ♀).
D. n. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 110 (C).

♂♀ **nidicolens** (Walckenaer) 1802. S. u. SO.-Europa, Algier, Syrien, Krim, Transkaukasien (Macronesien)

Aranea n. Walckenaer 1802, Faun. Paris. 2 p. 246 (D ♂♀).
Attus n. Walckenaer 1825, Aran. France p. 50 T. 5 F. 14 (D ♂♀).
Attus n. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 414 (D ♂♀).
Salticus diligens Blackwall 1867, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 20 p. 204 (D ♂).
Salticus vigilans Blackwall 1867, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 20 p. 207 (D o).
Marpissa nardoi Canestrini & Pavesi 1868, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 11 p. 868 (D ♀).
Attus castaneus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 31 T. 5 F. 8 (D ♂♀).
Attus phrygianus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 32 (D ♂♀).
Attus nitelinus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 33 (D ♀).
Attus nitelinus Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 140 (N).
Attus n. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 141 (N).
Attus nitelinus Canestrini 1874, Atti Soc. Padova 3 (2) p. 213 T. 8 F. 3 (N ♂).
Marpessa ornata Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 181 (D ♀).
D. n. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 41 (D ♂♀).
D. n. Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 22 T. 4 F. 10 (D ♂♀).
D. n. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 17 (D ♂♀).
Marpissa ornata Warburton 1892, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 10 p. 218 T. 14 F. 4—6 (N ♀).
D. diligens Kulczynski 1899, Rozpraw. Ak. Umiej. Krakow. (2) 16 p. 436 T. 9 F. 128, 132, 134, 135, 140, 141, 144, 145 (D ♂♀).
D. nitelinus Kulczynski 1911, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 71 T. 2 F. 92 (N ♀).
D. n. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1214, 1263 f. 1941, 1942 (D ♂♀).

♂ **nidicolioides** Kolosvary 1934. Ungarn

D. n. Kolosvary 1934, Folia Zool. Hydrobiol. 6 (1) p. 16 f. 17 (D ♂).

♂ **petilus** (Blackwall) 1870. Sizilien

Salticus p. Blackwall 1870, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 5 p. 395 T. 8 F. 2 (D ♂).
D. p. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 110 (C).

♂ **procus** (Karsch) 1879. Japan

Phidippus p. Karsch 1879, Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf. 36 p. 88 (D ♂).

O♀ **ravidus** (Simon) 1868. Polen, Litauen, Weissrussland

Attus r. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 571 (D O).
Attus sexpunctatus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 579 (D ♀).
Attus r. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 188 (N).
D. r. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 110 (C).

♂♀ **rubrosquamulatus** Dönitz & Strand 1906. Japan
D. r. Dönitz & Strand 1906, in: Bösenberg & Strand, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 397 T. 9 F. 130 (D ♂♀).

♂♀ **thorellii** Kulczynski 1895. Sibirien
D. t. Kulczynski 1895, Rozpraw. Ak. Umiej. Krakow. (2) 12 p. 68 T. 2 F. 30—33 (D ♂♀).

Aethiopische Arten:

♂♀ **hewitti** Lessert 1925. O.-Afrika
D. h. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 472 f. 58—61 (D ♂♀).

♂♀ **purcellii** Peckham 1903. Capland
D. p. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 206 T. 24 F. 11 (D ♂♀).

♂♀ **schultzei** Simon 1910. SW.-Afrika
D. s. Simon 1910, Denkschr. Med. Nat. Ges. Jena 16 p. 216 (D ♂♀).

O **sedulus** (Blackwall) 1865. Cap Verde-I.
Salticus s. Blackwall 1865, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 16 p. 84 (D O).

Orientalische Arten:

♀ **severus** (Thorell) 1891. I. Pinang
Megatimus s. Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 130 (D ♀).
Megatimus s. Workman 1896, Malays. Spid. p. 13 T. 13 (D ♀).
D. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).

Australische Arten:

♂ **laticeps** Strand 1911. Aru-I., Kei-I.
D. l. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 183 T. 4 F. 25; T. 6 F. 91 (D ♂).

Neotropische Arten:

§ 19 ♂, 16 ♀: F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 258 (sub **Metaphidippus).**
§ 4 ♂, 5 ♀: F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 271 (sub **Paraphidippus).**
§ 7 ♂, 8 ♀: F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 280 (sub **Phidippus).**
§ 17 ♂, 23 ♀: Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 285—288 (part.) (sub **Phidippus).**
§ 11 ♂: Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 285—287 (sub **Metaphidippus).**
§ 4 ♂, 2 ♀: Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 322—323 (sub **Paraphidippus).**

♂ **albocinctus** (Caporiacco) 1947. Brit. Guiana
Phidippus a. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 33 (D ♂).
Phidippus a. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 726 TF. 158 (D ♂).

♂♀ **aeneidens** (Taczanowski) 1878. Peru
Phidippus a. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 333 (D ♂♀).
D. a. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 622 (C).

♂♀ **albopilosus** Peckham 1901. Brasilien, Paraguay, Argentinien
D. a. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 316 T. 27 F. 2 (D ♂♀).
D. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).
Metaphidippus a. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 184 (N).

♀ **amphibolus** Chamberlin 1916. Peru
D. a. Chamberlin 1916, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 60 (6) p. 295 T. 25 F. 9 (D ♀).

♂ **andinus** Chamberlin 1916. Peru
D. a. Chamberlin 1916, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 60 (6) p. 294 T. 25 F. 5, 6 (D ♂).

♂♀ **apicalis** (F. Cambridge) 1901. Amazonas, Mexico
Metaphidippus a. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 265 T. 23 F. 15, 16 (D ♂♀).
D. a. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 622 (C).

♂ **armatus** Banks 1909. Cuba
D. a. Banks 1909, II. Rep. Centr. Exper. Stat. Republ. Cuba p. 167 T. 45 F. 5 (D ♂).

♀ **arrogans** (C. L. Koch) 1846. Brasilien
Phidippus a. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 157 TF. 1212 (D ♀).
D. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).

♀ **auropilosus** (F. Cambridge) 1901. Panama
Phidippus a. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 283 T. 26 F. 11 (D ♀).
D. a. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 624 (C).
Phidippus a. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 346 (N).

♀ **bicavatus** (F. Cambridge) 1901. Panama
Metaphidippus b. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 270 T. 24 F. 19 (D ♀).
D. b. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 626 (C).
Metaphidippus b. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 287 (N ♀).

♂ **bicuspidatus** (F. Cambridge) 1901. Guatemala
Metaphidippus b. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 269 T. 24 F. 3 (D ♂).
D. b. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 626 (C).

♂ **bidentatus** (F. Cambridge) 1901. Mexico
Phidippus b. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 286 T. 27 F. 11 (D ♂).
D. b. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 624 (C).

♂♀ **bispinosus** (F. Cambridge) 1901. Centr. Amerika
Metaphidippus b. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 266 T. 24 F. 1, 2 (D ♂♀).
D. b. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 220 (C).
Metaphidippus b. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 287 (N).

♂♀ **bisquinquepunctatus** Taczanowski 1878. Peru
D. b. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 309 (D ♂♀).

♂ **birabeni** (Mello-Leitao) 1944. Buenos Aires
Phidippus b. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 3 (24) p. 386 f. 84 (D ♂).

♂ **bisignatus** (Mello-Leitao) 1945. Argentinien
Metaphidippus b. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 288 (D ♂).

♂o **calus** Chamberlin 1916. Peru
D. c. Chamberlin 1916, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 60 (6) p. 294 T. 25 F. 7, 8 (D ♂ o).

♂ **carmenensis** Chamberlin 1924. Nieder-Californien
D. c. Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 682 f. 122, 123 (D ♂).

♀ **carneus** (Peckham) 1896. Centr. Amerika
Phidippus c. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 33 T. 2 F. 5 (D ♀).
Phidippus c. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 286 (N ♀).
Phidippus c. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 283 T. 26 F. 9 (N ♀).
D. c. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 626 (C).

♂♀ **centralis** Peckham 1896. Panama
D. c. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 49 T. 4 F. 5 (D ♂♀).
Metaphidippus c. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 269 T. 24 F. 14, 15 (D ♂♀).
Metaphidippus c. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 287 (N ♂♀).

♀ **centromaculatus** Taczanowski 1878. Peru
D. c. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 311 (D ♀).

♂ **chalcedon** (C. L. Koch) 1846. Brasilien
Phidippus ch. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 159 TF. 1214 (D ♂).
D. chalcidon Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 627 (C).

♀ **chera** Chamberlin 1924. Nieder-Californien
D. c. Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 683 (D ♀).

♀ **coccinelloides** (Mello-Leitao) 1947. Brasilien
Metaphidippus c. Mello-Leitao 1947, Arqu. Mus. Paranaense 6 (6) p. 300 T. 40 F. 48 (D ♀).

♂ **comptus** Banks 1909. Costa Rica
D. c. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 221 T. 6 F. 14 (D ♂).

♂♀ **convexus** Chickering 1946. Panama
Parnaeus c. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 335 f. 292—297 (D ♂♀).

♀ **cruentus** (F. Cambridge) 1901. Mexico
Phidippus c. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 284 T. 27 F. 4 (D ♀).
D. c. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 627 (C).

♀ **cupreus** (F. Cambridge) 1901. Panama
Metaphidippus c. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 270 T. 24 F. 20 (D ♀).

D. c. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 628 (C).
D. perplexans Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah 27 (5), Biol. 3 (5) p. 18 T. 8 F. 65 (D ♀).
Metaphidippus c. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 288 (N ♀).

♂♀ **cuprinus** Taczanowski 1878. Peru
D. c. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 313 (D ♂♀).
D. c. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 320 T. 27 F. 7 (D ♂♀).
D. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).

♂♀ **cyanidens** (C. L. Koch) 1846. Amazonas, Guatemala
Phidippus c. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 156 TF. 1211 (D ♂).
Parnaeus c. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 38 T. 3 F. 2, 9 (D ♂♀).
Parnaeus c. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 288 T. 27 F. 12, 13 (N ♂♀).
D. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 618 f. 746 (N ♂).
Parnaeus c. Crane 1945, Zoologica (N. York) 30 p. 38 f. 4H—M (D).

♂♀ **deceptus** Petrunkevitch 1911. Mexico
Phidippus brunneus F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 285 T. 27 F. 6, 7 (D ♂♀).
D. d. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 628 (nom. nov.)

♂ **dentiger** (F. Cambridge) 1901. Guatemala, Panama
Metaphidippus d. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 264 T. 23 F. 11 (D ♂).
D. d. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 628 (C).

♂ **diplacis** Chamberlin 1924. Nieder-Californien
D. d. Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 616 f. 130—132 (D ♂).

♀ **disjunctus** (Banks) 1898. Costa Rica, Mexico
Phidippus d. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 281 T. 17 F. 21 (D ♀).
Paraphidippus d. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 277 T. 26 F. 3 (D ♀).
D. d. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 628 (C).

♀ **dubitabilis** Peckham 1896. Mexico
D. d. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 52 T. 4 F. 7 (D ♀).
Metaphidippus d. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 267 T. 24 F. 6 (D ♀).

♀ **duodecempunctatus** Mello-Leitao 1943. West-Argentinien
D. d. Mello-Leitao 1943, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 3, Zool. 20 p. 120 f. 22 (D ♀).

♀ **expallidatus** (F. Cambridge) 1901. Panama
Metaphidippus e. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 270 T. 24 F. 18 (D ♀).
D. e. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 629 (C).
Metaphidippus e. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 288 (N ♀).

♂♀ **facetus** (Chickering) 1946. Panama
Metaphidippus f. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 288 f. 246—250 (D ♂♀).

♂ **fascipes** (C. L. Koch) 1846. Mexico
Phidippus f. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 153 TF. 1209 (D ♂) (in TF.: **fuscipes**).

♂♀ **fastuosus** (Chickering) 1946. Panama
Metaphidippus f. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 293 f. 251—254 (D ♂♀).

♂♀ **faustus** Peckham 1901. Brasilien
D. f. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 318 T. 27 F. 1 (D ♂♀).

♂ **felix** Peckham 1901. Mexico
D. f. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 313 T. 27 F. 6 (D ♂).
Metaphidippus f. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 273 (N ♂).

♂♀ **floridanus** Banks 1904. Florida
D. f. Banks 1904, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 56 p. 138 T. 7 F. 2, 6 (D ♂♀).
D. f. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 462 T. 37 F. 5 (D ♂♀).

♀ **fortunatus** Peckham 1901. Brasilien
D. f. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 325 T. 28 F. 8 (D ♀).

♀ **foveolatus** (F. Cambridge) 1901. Mexico
Phidippus f. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 283 T. 26 F. 10 (D ♀).
D. f. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 630 (C).

♂ **fulgidus** (C. L. Koch) 1846. Mexico
Phidippus f. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 152 TF. 1208 (D ♂).
D. f. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 630 (C).

♂♀ **funebris** (Banks) 1898. Costa Rica, Guatemala, Mexico
Phidippus f. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 280 T. 17 F. 22 (D ♂♀).
Parnaeus f. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 301 (N).
Paraphidippus f. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 275 T. 25 F. 13, 14 (D ♂♀).
D. f. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 631 (C).

♂ **furcillatus** (F. Cambridge) 1901. Mexico
Metaphidippus f. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 267 T. 24 F. 7 (D ♂).
D. f. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 631 (C).

♀ **georgii** (Peckham) 1896. Mexico
Phidippus g. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 34 T. 2 F. 6 (D ♀).
Phidippus g. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 280 T. 17 F. 23 (D ♀).
Phidippus g. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 284, 286 (N ♀)
Phidippus g. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 285 T. 27 F. 5 (N ♀).
D. g. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 631 (C).

o **gertschi** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
D. g. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 33 (D o).
D. g. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 725 (D o).

♂ **globosus** (F. Cambridge) 1901. Costa Rica
Metaphidippus g. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 265 T. 23 F. 13 (D ♂).
D. g. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 220 (N).

♂♀ **gratus** (Bryant) 1948. Mexico
Metaphidippus g. Bryant 1948, Psyche 55 (2) p. 66 T. 10 F. 8, 9, 11 (D ♂♀).

♀ **guianensis** (Caporiacco) 1947. Brit. Guiana
Phidippus g. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 33 (D ♀).
Phidippus g. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 725 TF. 157 (D ♀).

♀ **hondurensis** Peckham 1896. Honduras, Guatemala
D. h. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 48 T. 4 F. 4 (D ♀).
Metaphidippus h. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 272 T. 25 F. 8 (N ♀).

♂ **honestus** (C. L. Koch) 1846. Brasilien
Icelus h. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 175 TF. 1226 (D ♂).
Plexippa h. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 326 (C).
D. h. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 632 (C).

♂ **incontestus** (Banks) 1909. Costa Rica
Phidippus i. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 220 T. 5 F. 2 (D ♂).
D. i. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 632 (C).

♂ **inermis** (F. Cambridge) 1901. Costa Rica, Mexico
Paraphidippus i. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 275 T. 25 F. 12 (D ♂).
D. i. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 632 (C).

♀ **inflatus** (F. Cambridge) 1901. Guatemala
Metaphidippus i. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 271 T. 25 F. 3 (D ♀).
D. i. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 633 (C).

♀ **iridescens** (F. Cambridge) 1901. Panama
Metaphidippus i. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 271 T. 25 F. 2 (D ♀).
D. i. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Hist. 29 p. 633 (C).
Metaphidippus i. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 296 (N ♀).

♀ **kingstoni** (Mello-Leitao) 1948. Brit. Guiana
Phidippus k. Mello-Leitao 1948, An. Ac. Bras. Ci. 20 p. 190 f. 30 (D ♀).

♂ **laetabilis** Peckham 1896. Panama
D. l. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 51 T. 4 F. 6 (D ♂).
Metaphidippus l. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 266 T. 24 F. 3 (N ♂).
Metaphidippus l. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 297 f. 255—257 (D ♂).

♂♀ **laetificus** (Chickering) 1946. Panama

Metaphidippus l. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 299 f. 258—263 (D ♂♀).

♂ **lanceolatus** (F. Cambridge) 1901. Costa Rica, Guatemala, Mexico

Metaphidippus l. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 266 T. 24 F. 3 (D ♂).
D. l. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 221 (C).
D. l. Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 243 f. 154 (D ♂).

♂ **laniipes** (F. Cambridge) 1901. Mexico

Paraphidippus l. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 275 T. 25 F. 11 (D ♂).
D. l. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 634 (C).

♂ **latior** nom. nov. Panama

Metaphidippus l. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 304 f. 264—267 (D ♂) (praeocc. Walckenaer 1837 sub **Attus**, vergl. p. 1212).

♂♀ **laxus** (Chickering) 1946. Panama

Metaphidippus l. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 306 f. 268—271 (D ♂♀).

♂ **lepidus** (Peckham) 1901. Brasilien

Admirala l. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 330 T. 28 F. 11 (D ♂).
D. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 631 (N).

♂ **longipalpus** (F. Cambridge) 1901. Panama, Florida

Metaphidippus l. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 264 T. 23 F. 12 (D ♂).
D. l. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 634 (C).
Metaphidippus l. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 311 (N ♂).

♂ **luteus** (Peckham) 1896. Costa Rica, Honduras

Philaeus l. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 40 (D ♂).
Paraphidippus l. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 278 (N ♂).
Phidippus l. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 220 (N).
D. l. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 634 (C).

♀ **madrynensis** Mello-Leitao 1940. Süd-Argentinien

D. m. Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 56 f. 56—57 (D ♀).

♂ **mandibulatus** (F. Cambridge) 1901. Costa Rica

Metaphidippus m. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 262 T. 23 F. 4 (D ♂).
D. m. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 635 (C).

♀ **marmoratus** (F. Cambridge) 1901. Costa Rica

Paraphidippus m. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 277 T. 26 F. 4 (D ♀).
Phidippus m. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 220 (N).
D. m. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 635 (C).

♂ **melanomerus** Chamberlin 1924. Nieder-Californien

D. m. Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 684 f. 125, 126 (D ♂).

♀ **mendicus** (C. L. Koch) 1846. Westindien

Calliethera m. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 53 TF. 1120 (D ♀).
D. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 601 (N).

♀ **merus** Petrunkevitch 1911. Mexico

Philaeus mexicanus Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 28 T. 1 F. 18; T. 2 F. 18 (D ♀).
Paraphidippus mexicanus F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 279 T. 26 F. 8 (N ♀).
D. m. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 636 (nom. nov.)

♂ **metallicus** (C. L. Koch) 1846. Brasilien

Phidippus m. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 151 TF. 1207 (D ♂).
D. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).

♀ **momus** (F. Cambridge) 1901. Panama, Guatemala, Guiana

Metaphidippus m. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 271 T. 25 F. 4 (D ♀).
D. m. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 636 (C).
Metaphidippus m. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 312 (N ♀).
D. m. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 724 (N ♀).

♂ **mordax** (C. L. Koch) 1846. Uruguay

Hyllus m. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 165 TF. 1219 (D ♂).
D. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 601 (N).

♀ **nigropictus** (F. Cambridge) 1901. Mexico

Metaphidippus n. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 269 T. 24 F. 16 (D ♀).
D. n. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 637 (C).

♀ **nigropilosus** (Banks) 1898. Mexico

Phidippus n. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 280 T. 17 F. 20 (D ♀).
Paraphidippus n. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 279 (N ♀).
D. n. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 639 (C).

♂ **nitens** (C. L. Koch) 1846. Mexico

Phidippus n. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 154 TF. 1210 (D ♂).
Attus n. Walckenaer 1847, Hist. Nat. Ins. Apt. 4 p. 428 (C).
D. n. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 637 (C).

♂♀ **nitidus** Peckham 1896. Guatemala

D. n. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 53 T. 4 F. 8 (D ♂♀).
Metaphidippus n. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 263 T. 23 F. 5, 6 (N ♂♀).
D. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 614 f. 736 (N ♂).

♂ **niveornatus** Mello-Leitao 1936. Chile

D. n. Mello-Leitao 1936, Rev. Chilen. Hist. Nat. 40 p. 127 f. 9, 10 (D ♂).

♂ **nobilis** (C. L. Koch) 1846. S.-Amerika

Hyllus n. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 167 TF. 1220 (D ♂).
D. n. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 637 (C).

♂o **noxiosus** Simon 1886. Bolivien

D. n. Simon 1886, Ann. Soc. Ent. Belg. 30 C. R. p. 169 (D ♂ o).
D. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).

♀ **ochraceus** (F. Cambridge) 1901. Guatemala, Panama

Metaphidippus o. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 272 T. 25 F. 6 (D ♀).
D. o. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 638 (C).
Metaphidippus o. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 312 (N ♀).

♂♀ **octonotatus** (F. Cambridge) 1901. Costa Rica, Guatemala, Panama

Metaphidippus o. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 263 T. 23 F. 8, 9 (D ♂♀).
D. o. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 221 (N).
Metaphidippus o. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 312 (N ♂♀).

♀ **odiosus** Peckham 1901. Amazonas

D. o. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 324 T. 28 F. 6 (D ♀).
D. o. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).

♀ **ovatus** (F. Cambridge) 1901. Guatemala

Metaphidippus o. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 271 T. 25 F. 1 (D ♀).
D. o. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 639 (C).

♀ **pallens** (F. Cambridge) 1901. Costa Rica, Guatemala

Metaphidippus p. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 272 T. 25 F. 7 (D ♀).
D. p. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 221 (N).

♀ **pallidatus** (F. Cambridge) 1901. Guatemala

Metaphidippus p. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 270 T. 24 F. 17 (D ♀).
D. p. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 639 (C).

♂ **patagonicus** Simon 1905. Patagonien

D. p. Simon 1905, Bull. Mus. Zool. Torino 20 (511) p. 16 (D ♂).

♂ **perfectus** Peckham 1901. Brasilien

D. p. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 323 T. 27 F. 4 (D ♂).
Metaphidippus p. Mello-Leitao 1947, Arqu. Mus. Paranaense 6 (6) p. 301 (N).

♂ **pernotus** Petrunkevitch 1911. Guatemala

Metaphidippus pernix F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 264 T. 23 F. 10 (D ♂) (in f. **felix**).
D. p. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 639 (nom. nov.).

♂ **perpactus** (Chickering) 1946. Panama

Paraphidippus p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 324 f. 281—283 (D ♂).

♂ **perpolitus** (Chickering) 1946. Panama

Paraphidippus p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 326 f. 284—287 (D ♂).

♂ **perscitus** (Chickering) 1946. Panama

Metaphidippus p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Harvard 97 p. 313 f. 272—275 (D ♂).

♂♀ **pluripunctatus** (Mello-Leitao) 1944. Buenos Aires

Metaphidippus p. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 3 (24) p. 385 f. 82—83 (D ♂♀).

♂♀ **proximus** Peckham 1901. Cuba

D. p. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 327 T. 28 F. 3 (D ♂♀).
D. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).

♂♀ **prudens** Peckham 1901. Jamaica, Cuba, Haiti

D. p. Peckham 1901, Proc. Zool. Soc. London p. 15 T. 4 F. 13 (D ♂♀).
Metaphidippus p. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 491 T. 6 F. 56, 57, 63 (D ♂♀).
Metaphidippus p. Bryant 1950, Bull. Mus. Comp. Harvard 103 (3) p. 189 (D ♂♀).

♂ **pugnax** (C. L. Koch) 1846. Mexico

Hyllus p. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 168 TF. 1221 (D ♂).
Attus p. Walckenaer 1847, Hist. Nat. Ins. Apt. 4 p. 428 (N).
D. p. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 640 (C).

♀ **pulcherrimus** (Keyserling) 1885. Florida

Phidippus p. Keyserling 1885, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. 492 T. 13 F. 3 (D ♀).
Phidippus p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 429 (D ♀).
D. p. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 640 (C).

♂♀ **purus** (Bryant) 1948. Mexico

Metaphidippus p. Bryant 1948, Psyche 55 (2) p. 68 T. 10 F. 10, 14 (D ♂♀).

♀ **quadrinotatus** (F. Cambridge) 1901. Panama, Costa Rica

Metaphidippus q. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 271 T. 25 F. 5 (D ♀).
D. q. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 220 (N).
D. q. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 640 (C).
Metaphidippus q. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 315 (N ♀).

♂♀ **recurvus** (Chickering) 1946. Panama

Parnaeus r. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 340 f. 298—303 (D ♂♀).

♂♀ **regius** (C. L. Koch) 1846. Cuba, San Domingo

Phidippus r. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 146 TF. 1203 (D ♀).
Phidippus togatus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 129 TF. 1189 (D ♀).
Attus r. Walckenaer 1847, Hist. Nat. Ins. Apt. 4 p. 418 (N).
Salticus sagraeus Lucas 1857, Hist. Phys. Pol. Nat. Cuba p. 80 T. 4 F. 5 (D ♂).
D. r. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).
Phidippus r. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 514 T. 8 F. 87, 92 (D ♂).

♂ **reimoseri** Roewer 1951. Brasilien

Admirala regia Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 331 T. 28 F. 12 (D ♂) (praeocc. C. L. Koch 1846, sub **Phidippus**).
Admirala regia Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).
D. r. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 452 (nom. nov.).

♀ **sacci** Simon 1886. Bolivien

D. s. Simon 1886, Ann. Soc. Ent. Belg. 30 C. R. p. 170 (D ♀).
D. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).

♀ **seriatus** Taczanowski 1878. Peru
D. s. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 312 (D ♀).

♂ **smaragdus** (Crane) 1945. Brit. Guiana
Parnaeus s. Crane 1945, Zoologica (N. York) 30 p. 40 f. 5 A—G (D ♂).

♂♀ **smithii** Peckham 1901. Amazonas
D. s. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 328 T. 28 F. 4 (D ♂♀).
Metaphidippus s. Mello-Leitao 1947, Arqu. Mus. Paranaense 6 (6) p. 301 (N).

♂ **strenuus** (C. L. Koch) 1846. Mexico
Hyllus s. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 164 TF. 1218 (D ♂).
Attus s. Walckenaer 1847, Hist. Nat. Ins. Apt. 4 p. 428 (N).
D. s. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 642 (C).

♂♀ **taylori** Peckham 1901. Jamaica
D. t. Peckham 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 15 T. 4 F. 13 (D ♂♀).

♂ **tesselatus** (C. L. Koch) 1846. Brasilien
Phidippus t. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 158 TF. 1213 (D ♂).
D. t. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 642 (C).

♀ **translatus** (Peckham) 1901. Amazonas
Phidippus t. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 298 (D ♀).
D. t. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 642 (C).

♀ **tricolor** (C. L. Koch) 1846. Mexico
Plexippus t. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 116 TF. 1177 (D ♀).
Paraphidippus t. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 279 (N ♀).
D. t. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 642 (C).

♂ **tridentatus** (F. Cambridge) 1901. Mexico
Metaphidippus t. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 263 T. 23 F. 7 (D ♂).
D. t. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 643 (C).

♂♀ **trimaculatus** (Banks) 1898. Mexico
Philaeus t. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 282 T. 17 F. 18 (D ♂♀).
Paraphidippus t. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 278 (N ♀).
D. t. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 643 (C).

♂♀ **tropicus** Peckham 1901. Amazonas, N.-Argentinien, Mato Grosso
D. t. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 319 T. 27 F. 8 (D ♂♀).
D. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).
Metaphidippus t. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 184 (N).

♂ **tullgreni** (Wallace) 1950. Florida
Phidippus morsitans Tullgren 1901, Bih. Svensk. Vet. Ak. Handl. 27 (4; 1) p. 25 (D ♂, part.).
Phidippus t. Wallace 1950, Florida Entomol. 33 (2) p. 79 T. 2 F. 10—11 (D ♂).

♂♀ **validus** (Chickering) 1946. Panama
Paraphidippus v. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 330 f. 288—291 (D ♂♀).

♀ **vegetus** Peckham 1901. Mexico

D. v. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 323 T. 28 F. 7 (D ♀).
Metaphidippus v. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 273 (N ♀).
D. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).

♂ **vigens** Peckham 1901. Brasilien, N.-Argentinien

D. v. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 317 T. 27 F. 3 (D ♂).
Metaphidippus v. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 184 (N).

♀ **zebrinus** (Mello-Leitao) 1945. Argentinien

Phidippus z. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 293 f. 83—84 (D ♀).

♂♀ **zygoballoides** Chamberlin 1924. Nieder-Californien

D. z. Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 685 f. 127, 128 (D ♂♀).

Transgredierende Arten:

♂♀ **ardens** (Peckham) 1901. U. St. Amerika, Mexico

Phidippus a. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 288 T. 23 F. 7 (D ♀).
Phidippus a. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 406 T. 31 F. 4 (D ♂♀).
D. a. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 622 (C).

♂♀ **aurantius** (Lucas) 1833. U. St. Amerika, Mexico, Westindien, Centr. Amerika

Attus chrysis Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 25 (nom. nud.).
Salticus a. Lucas 1833, Ann. Soc. Ent. France (1) 2 p. 480 T. 18 F. 3 (D ♀).
Attus chrysis Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 454 (D ♂).
Attus iris Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 455 (D ♀).
Attus multicolor Hentz 1845, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 202 T. 17 F. 13 (D ♀).
Plexippus orichalceus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 113 TF. 1174 (D ♀).
Plexippus aureus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 114 TF. 1175 (D ♀).
Attus a. Walckenaer 1847, Hist. Nat. Ins. Apt. 4 p. 420 (D ♀).
Plexippa chrysis Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 325 (C).
Philaeus chrysis Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 30 T. 1 F. 20; T. 2 F. 20; T. 3 F. 20 (D ♂♀).
D. multicolor Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 40 T. 3 F. 28 (D ♀).
Phidippus orichalceus Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 7, 13, 33 T. 2 F. 8; T. 3 F. 7 (D ♂♀).
Phidippus fraternus Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 281 T. 17 F. 24 (D ♂♀).
Philaeus multicolor Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 282 (N).
Paraphidippus chrysis F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 276 T. 26 F. 1, 2 (D ♂♀).
Paraphidippus multicolor F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 278 (N ♀).
Pharaphidippus aureus F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 279 (N ♀).
D. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 617 f. 735 (N ♂).
Phidippus chrysis Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 220 (N).
Parnaeus chrysis Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 439 (D ♂♀).

D. a. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 623 (C).
Paraphidippus a. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 323 (N ♂♀).

♂♀ **capitatus** (Hentz) 1845. U. St. Amerika, Canada, Mexico

? Attus protervus Waldkenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 443 (D ♂).
? Attus felis Waldkenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 451 (D ♀).
Attus c. Hentz 1845, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 200 T. 17 F. 15 (D ♂).
Attus hebes Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 358 T. 21 F. 16 (D ♀).
Attus parvus Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 358 T. 21 F. 17 (D ♀).
Attus octavus Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 365 T. 22 F. 15 (D ♀).
Attus aestivalis Peckham 1883, Descr. Spid.... Fam. Attid. p. 2 T. 1 F. 2 (D ♂♀).
Icius crassiventer Keyserling 1885, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. 503 T. 13 F. 11 (D ♀).
D. c. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 36 T. 1 F. 25; T. 3 F. 25 (D ♂♀).
Eris octavus Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 54 T. 1 F. 37; T. 3 F. 37 (D ♀).
D. aestivalis Emerton 1891, Trans. Connect Ac. Sci. 8 (14) p. 228 T. 17 F. 2 (D ♂♀).
D. insignis Banks 1892, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 74 T. 5 F. 28 (D ♀).
D. ornatus Banks 1892, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 75 T. 4 F. 29; T. 5 F. 29 (D ♀).
D. exiguus Banks 1892, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 75 T. 5 F. 30 (D ♀).
Zygoballus parvus Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 288 (N ♀).
D. octavus Banks 1901, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 53 p. 588 (N).
Metaphidippus c. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 272 T. 25 F. 9, 10 (N ♂♀).
D. octavus Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).
D. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).
D. aestivalis Emerton 1902, Common Spid. p. 54 f. 142—144 (D ♂♀).
D. c. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 469 T. 36 F. 4; T. 38 F. 5 a (D ♂♀).
D. c. Kaston 1938, Bull. Connect. Geol. Nat. Hist. Surv. 60 p. 195 (part.).
Metaphidippus protervus Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 204 (N ♂♀).
Metaphidippus c. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 172 f. 61—65 (D ♂♀).
Metaphidippus protervus Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 474 T. 94 F. 1745—47; T. 95 F. 1751—61 (D ♂♀).

♀ **fartilis** (Peckham) 1888. Texas, Mexico

Philaeus f. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 27 T. 2 F. 17 (D ♀).
Paraphidippus f. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 278 T. 26 F. 17 (D ♀).
Parnaeus f. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 440 T. 35 F. 7 (D ♀).
D. f. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 629 (C).

♂♀ **flavus** (Peckham) 1883. New York, Florida

Attus f. Peckham 1883, Descr. Spid.... Fam. Attid. p. 9 T. 1 F. 6 (D ♂).
D. f. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 39 T. 1 F. 27; T. 3 F. 27 (D ♀).
D. f. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 473 T. 37 F. 8; T. 38 F. 1 (D ♀).

♂ **furcatus** (F. Cambridge) 1901. Mexico, Arizona

Metaphidippus f. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 267 T. 24 F. 8 (D ♂).
D. f. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 473 (D ♂).

♂♀ **galathea** (Walckenaer) 1825. U. St. Amerika

Attus g. Walckenaer 1825, Tabl. Aran. p. 23 (D).
Attus g. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 456 (D ♀).
D. capitatus Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 469 T. 36 F. 4; T. 38 F. 5 (D ♂♀).
D. capitalus Kaston 1938, Bull. Connect. Geol. Nat. Hist. Surv. 60 p. 145 (part.).
Metaphidippus g. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 203 (N ♂♀).
Metaphidippus g. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 475 T. 94 F. 1749; T. 95 F. 1761 (D ♂♀).

♂ **howardii** (Peckham) 1896. Mexico, Missouri

Phidippus h. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 34 T. 2 F. 7 (D ♂).
Phidippus h. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 285 T. 27 F. 8 (N ♂).
Phidippus h. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 391 T. 29 F. 3 (D ♂).
D. h. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 632 (C).

♂♀ **limbatus** (Banks) 1898. Mexico, Texas

Philaeus l. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 282 T. 17 F. 17 (D ♂).
Philaeus consimilis Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 283 T. 17 F. 13 (D ♂♀).
Paraphidippus l. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 278 (N ♂).
D. l. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 315 (D ♂♀).
D. l. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 458 T. 37 F. 3 (D ♂♀).

♂♀ **marginatus** (Walckenaer) 1837. U. St. Amerika, Canada, Alaska, Mexico, Cuba

Attus m. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 466 (D ♂).
Attus militaris Hentz 1845, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 201 T. 17 F. 10, 1 (D ♂♀).
Eris aurigera C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 189 TF. 1237 (D ♂).
Icius albovittatus Keyserling 1885, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. 502 T. 13 F. 10 (D ♀).
Eris m. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 281 (D).
Philaeus militaris Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 28 T. 1 F. 19; T. 2 F. 19 (D ♂♀).
D. militaris Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 230 T. 17 F. 1 (D ♂♀).
Icius moestus Banks 1892, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 77 T. 5 F. 33 (D ♂).
Paraphidippus militaris F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 279 T. 26 F. 6, 7 (N ♂♀).
D. militaris Emerton 1902, Common Spid. p. 53 f. 140, 141 (D ♂♀).
D. militaris Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 160 T. 37 F. 1 (D ♂♀).
D. militaris Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. — T. 11 F. 3e (N ♀).
D. m. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 635 (C).
D. militaris Comstock 1912, Spider Book p. 685 f. 758—759 (N).

Phidippus molinor Chamberlin 1925, Proc. Calif. Ac. Sci. (4) 14 p. 133 f. 49 (D ♀).
Paraphidippus m. Crosby & Bishop 1928, Mem. Cornell Univ. Agr. Exper. Stat. 101 p. 1072 (C).
D. m. Kaston 1938, Bull. Connect. Geol. Nat. Hist. Surv. 60 p. 195 (N).
Paraphidippus m. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 180 f. 78—82 (D ♂♀).
Paraphidippus m. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 479 T. 75 F. 1762—65; T. 96 F. 1782—84; T. 143 F. 2131—32 (D ♂♀).

♂♀ **mexicanus** (Peckham) 1888. Mexico, Nieder-Californien, Arizona

Phidippus m. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 23 T. 2 F. 7 (D ♂).
Phidippus m. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 280 (N ♀).
Phidippus m. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 286 T. 27 F. 10 (N ♂).
D. m. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 636 (C).

♀ **miniatus** (Peckham) 1883. Texas, Florida, Virginia, Cuba

Attus m. Peckham 1883, Descr. Spid.... Fam. Attid. p. 15 T. 2 F. 11 (D ♀).
Phidippus m. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 15 T. 1 F. 6 (D ♀).
Phidippus m. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 426 T. 32 F. 5 (D ♀).
D. m. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 636 (C).

♂ **prosper** Peckham 1901. Mexico, Texas

D. p. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 314 T. 27 F. 5 (D ♂).
Metaphidippus maxillosus F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 265 T. 23 F. 14 (D ♂).
D. p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 475 (D ♂).

O♀ **rauterbergii** (Peckham) 1888. Texas, Mexico, New York

Phidippus r. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 22 T. 1 F. 8; T. 2 F. 8 (D ♀).
Phidippus r. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 295 T. 24 F. 6 (D ♀).
Phidippus r. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 429 T. 34 F. 7 (D ♀).
D. r. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 641 (C).
Phidippus r. Bryant 1942, Amer. Midland Natural. 28 (3) p. 703 TF. 10, 14 (D ♂).

♂♀ **tuberculatus** (F. Cambridge) 1901. Mexico, Californien, Texas, Arizona

Attus arizonensis Peckham 1883, Descr. Spid.... Fam. Attid. p. 13 T. 2 F. 10 (D ♂).
Phidippus arizonensis Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 18 T. 1 F. 10; T. 2 F. 10 (D ♂).
Phidippus arizonensis Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 279 (N ♀).
Phidippus t. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 283 T. 27 F. 1, 2 (D ♂♀).
Phidippus arizonensis F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 284 T. 27 F. 3 (N ♂).
Phidippus arizonensis Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 419 T. 30 F. 4 (D ♂♀).
D. t. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 643 (C).

♂♀ **tyrellii** (Peckham) 1901. Canada, Neu-Mexico, Mexico

Phidippus t. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 296 T. 24 F. 4 (D ♂).
Phidippus montivagus Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 293 T. 24 F. 3 (D ♀).
Phidippus t. Banks 1901, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 53 p. 588 T. 23 F. 18 (N ♂).
Phidippus albulatus F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 285 T. 27 F. 9 (D ♂).
Phidippus t. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 410 T. 32 F. 1, 2 (D ♂♀).
D. t. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 643 (C).

♂♀ **variegatus** (Lucas) 1833. U. St. Amerika, Mexico

Salticus v. Lucas 1833, Ann. Soc. Ent. France (1) 2 p. 478 T. 18 F. 1 (D ♂).
Attus morsitans Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 432 (D ♀).
Attus morsitans Walckenaer 1847, Hist. Nat. Ins. Apt. 4 p. 417 (D ♂♀) (part.).
Phidippus v. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 125 TF. 1186 (D ♂).
Phidippus morsitans Tullgren 1901, Bih. Svensk Vet. Ak. Handl. 27 (4; 1) p. 25 (D ♀, part.).
D. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).
D. morsitans Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).
Phidippus v. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 390 T. 29 F. 1 (D ♂♀).
Phidippus v. Bryant 1942, Amer. Midland Natural. 28 (3) p. 694 TF. 15—16 (D ♂♀).
Phidippus v. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 209 TF. 29 (D ♀).
Phidippus v. Wallace 1950, Florida Entomol. 33 (2) p. 78 (D ♂♀).

♂ **vitis** Cockerell 1895. U. St. Amerika, Mexico

D. v. Cockerell 1895, The Entomologist 27 p. 207 (D).
Icius v. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 501 T. 40 F. 11; T. 41 F. 7 (D ♂♀).
D. apachecus Chamberlin 1925, Proc. Calif. Ac. Sci. (4) 14 p. 136 f. 55, 56 (D ♂).
Metaphidippus v. Gertsch 1934, Amer. Mus. Novit. 726 p. 19 (N).

Nearktische Arten:

§ 17 ♂, 23 ♀: Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 285—288 (sub **Phidippus** part.).
§ 25 ♂, 33 ♀: Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 383—388 (sub **Phidippus** part.).
§ 21 ♂: Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 455.
§ 6 ♂, 6 ♀: Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 473—474 (sub **Metaphidippus**).
§ 2 ♂, 2 ♀: Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 478 (sub **Paraphidippus**).
§ 8 ♂, 7 ♀: Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 481—482 (sub **Phidippus**).

♂ **abboti** (Chamberlin & Ivie) 1944. Georgia

Phidippus a. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 205 TF. 216 (D ♂).

♂ **adumbratus** (Gertsch) 1934. Californien

Phidippus a. Gertsch 1934, Amer. Mus. Novit. 726 p. 15 TF. 14 (D ♂).

♂♀ **aeneolus** Curtis 1892. Californien, Oregon, Washington-St., Alaska

D. a. Curtis 1892, Zoe 3 p. 332 (D ♂♀).
D. bifida Banks 1895, Canad. Ent. 27 p. 96 (D ♂♀).

D. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).
D. a. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 468 T. 36 F. 1; T. 38 F. 6 (D ♂♀).
Metaphidippus a. Chamberlin & Ivie 1941, Bull. Univ. Utah 31 (8), Biol. 6 (3) p. 26 (N).

♂♀ **albeolus** (Chamberlin & Ivie) 1941. Californien

Metaphidippus a. Chamberlin & Ivie 1941, Bull. Univ. Utah 31 (8), Biol. 6 (3) p. 27 TF. 33, 40, 41 (D ♂♀).

♂♀ **altanus** (Gertsch) 1934. Wyoming, Alberta

Phidippus a. Gertsch 1934, Amer. Mus. Novit. 726 p. 12 TF. 13 (D ♂♀).
Phidippus a. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 188 f. 88—91 (D ♂♀).
Phidippus a. Levi 1951, Zoologica, N. York 36 (4) p. 232 f. 48, 50 (N ♀).

♂♀ **apacheanus** (Chamberlin & Gertsch) 1929. Utah

Phidippus a. Chamberlin & Gertsch 1929, Journ. Ent. Zool. Claremont 21 (3) p. 109 T. 4 F. 42—49 (D ♂♀).

♂ **arizonensis** Peckham 1901. Arizona

D. a. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 326 T. 28 F. 2 (D ♂).
D. a. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 463 T. 36 F. 7 (D ♂).

♂ **asotus** (Chamberlin & Ivie) 1933. Utah

Phidippus a. Chamberlin & Ivie 1933, Bull. Univ. Utah; Biol. 23 (4) p. 50 T. 12 F. 128, 129 (D ♂).

♂ **atopodon** Chamberlin 1925. Virginia

D. a. Chamberlin 1925, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 67 p. 234 (D ♂).

♂♀ **audax** (Hentz) 1845. U. St. Amerika, Canada

Attus a. Hentz 1845, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 199 T. 17 F. 6, 7 (D ♂).
Attus tripunctatus Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 355 T. 21 F. 8 (D ♀).
Attus fasciolatus Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 356 T. 12 F. 11 (D ♂).
Phidippus purpurifer C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 127 TF. 1187 (D ♀).
Phidippus smaragdifer C. L. Koch 1946, Die Arachniden 13 p. 128 TF. 1188 (D ♀).
Phidippus alchymista C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 131 TF. 1190 (D ♀).
Phidippus rufimanus C. L. Koch 1946, Die Arachniden 13 p. 132 TF. 1191 (D ♀).
Phidippus lunulatus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 133 TF. 1192 (D ♂).
Phidippus dubiosus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 135 TF. 1193 (D O).
Phidippus mundulus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 137 TF. 1195, 1196 (D ♂).
Phidippus personatus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 141 TF. 1199 (D ♀).
Phidippus elegans C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 142 TF. 1200 (D ♀).
Phidippus concinnatus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 145 TF. 1202 (D ♂).
Attus tripunctatus Peckham 1883, Descr. Spid. . . . Fam. Attid. p. 33 T. 3 F. 25 (D ♂♀).
Phidippus a. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 298 (D).
Phidippus morsitans Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 11 T. 1 F. 1 (D ♂♀).
Phidippus tripunctatus Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 227 T. 16 F. 5 (D ♂♀).

Phidippus morsitans Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 23 T. 2 F. 4 (D ♀).
Phidippus tripunctatus Emerton 1902, Common Spid. p. 51 f. 136 (D ♂♀).
Phidippus a. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 389 T. 29 F. 2 (D ♂♀).
D. a. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 622 (C).
Phidippus a. Comstock 1912, Spider Book p. 681 f. 753 (N).
Phidippus variegatus Kaston 1938, Bull. Connect. Geol. Nat. Hist. Surv. 60 p. 197 (N).
Phidippus a. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 189 f. 92—96 (D ♂♀).
Phidippus a. Kaston 1945, Amer. Mus. Novit. 1290 p. 12 (N).
Phidippus bryantae Kaston 1945, Amer. Mus. Novit. 1290 p. 12 TF. 84—85 (D ♀).
Phidippus a. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum 47, Bull. 70 p. 482 T. 95 F. 1767—70; T. 96 F. 1785—88; T. 135 F. 2072 (D ♂♀).

♀ **basalis** (Banks) 1904. Arizona

Phidippus b. Banks 1904, Journ. N. York Ent. Soc. 12 p. 115 T. 5 F. 14 (D ♀).
Phidippus b. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 432 T. 35 F. 4 (D ♀).
D. b. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 624 (C).

♂♀ **californicus** (Peckham) 1888. Californien, Columbia

Maevia c. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 73 T. 5 F. 54 (D ♂).
D. guttatus Banks 1904, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 3 (13) p. 358 T. 41 F. 51 (D ♂♀).
D. c. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 466 T. 34 F. 5 (D ♂♀).
D. guttatus Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 631 (C).

♂♀ **canadensis** (Banks) 1897. Canada, Wisconsin, N.-Carolina, Georgia

Icius c. Banks 1897, Canad. Ent. 29 p. 196 (D ♂♀).
D. c. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 467 T. 36 F. 2 (D ♂♀).
D. castaneus Emerton 1911, Trans. Connect. Ac. Sci. 16 (4) p. 407 T. 6 F. 5 (D ♀).
Metaphidippus c. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 171 f. 57—60 (D ♂♀).
Metaphidippus c. Kaston 1945, Amer. Mus. Novit. 1290 p. 11 (N).
Metaphidippus c. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 477 T. 94 F. 1748; T. 96 F. 1779—81 (D ♂♀).

♂♀ **cardinalis** (Hentz) 1845. U. St. Amerika

Attus c. Hentz 1845, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 200 T. 17 F. 9 (D ♂).
Phidippus paludatus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 149 TF. 1205 (D ♂).
Attus c. Peckham 1883, Descr. Spid. . . . Fam. Attid. p. 31 T. 3 F. 24 (D ♂♀).
Phidippus c. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 15 T. 2 F. 4 (D ♂).
D. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).
Phidippus oaklandensis Tullgren 1901, Bih. Svensk Vet. Ak. Handl. 27 (4; 1) p. 27 T. 1 F. 16 (D ♀).
Phidippus c. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 393 T. 29 F. 5 (D ♂♀).
Phidippus c. Wallace 1950, Florida Entomol. 33 (2) p. 83 T. 2 F. 12 (N ♀).

♂♀ **carolinensis** (Peckham) 1909. N.-Carolina, Texas, Kansas

Phidippus obscurus Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 294 T. 24 F. 2 (D ♂♀).
Phidippus c. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 422 T. 32 F. 6 (D ♂♀).
D. c. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 626 (C).

♀ **carolinus** (C. L. Koch) 1846. Carolina

Phidippus c. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 136 TF. 1194 (D ♀).
D. c. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 626 (C).

♂♀ **castaneus** (Hentz) 1846. N.-Carolina, Virginia

Attus c. Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 353 T. 21 F. 4 (D ♀).
D. c. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 472 T. 36 F. 3 (D ♂♀).
D. c. Emerton 1911, Trans. Connect. Ac. Sci. 16 (4) p. 407 T. 6 F. 5 (D ♀).
Metaphidippus c. Muma 1944, Amer. Mus. Novit. 1257 p. 11 (N ♀).

♀ **cinereus** (Walckenaer) 1837. Georgia

Attus c. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 440 (D ♀).
Phidippus c. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 207 TF. 37 (D ♀).

♂♀ **clarus** (Keyserling) 1885. U. St. Amerika

? **Attus rimator** Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 446 (D ♀).
? **Phidippus castrensis** C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 140 TF. 1198 (D ♂).
Phidippus c. Keyserling 1885, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. 497 T. 13 F. 7 (D ♀).
Phidippus rufus Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 13 T. 1 F. 2a (D ♀, nec ♂).
Phidippus insolens Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 23 T. 1 F. 12; T. 11 F. 12 (D ♂♀).
Philaeus rimator Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 32 T. 1 F. 22 (D ♀).
Phidippus multiformis Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 224 T. 16 F. 1 (D ♂♀).
Philaeus princeps Banks 1892, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 74 T. 2 F. 32 (N ♂).
Phidippus minutus Banks 1892, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 74 T. 5 F. 27 (D ♀).
Philaeus rimator Banks 1899, Proc. Ent. Soc. Wash. 4 (3) p. 190 (N juv.).
Phidippus bilineatus Tullgren 1901, Bih. Svensk Vet. Ak. Handl. 27 (4; 1) p. 26 TF. 15 (D ♀).
Phidippus multiformis Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 285, 287 (N ♂♀).
D. insolens Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).
D. multiformis Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).
D. castrensis Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).
Phidippus clarconensis Tullgren 1901, Bih. Svensk Vet. Ak. Handl. 27 (4; 1) p. 28 TF. 17 (D ♀).
Phidippus multiformis Emerton 1902, Common Spid. p. 49 f. 133, 134 (D ♂♀).
Phidippus c. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 398 T. 30 F. 1 (D ♂♀).
D. bilineatus Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 624 (C).
D. c. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 627 (C).
Phidippus c. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 193 f. 102—106 (D ♂♀).
? **Phidippus rimator** Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 212 (N ♀).
Phidippus c. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 484 T. 95 F. 1771—77; T. 96 F. 1791—93; T. 109 F. 2010 (D ♂♀).
Phidippus c. Wallace 1950, Florida Entomol. 33 (2) p. 82 T. 2 F. 13 (D ♀) (incl. **Phidippus olivaceus** Tullgren in schedula).

♂♀ **clematus** (Levi) 1951. Wyoming, Alberta
Metaphidippus c. Levi 1951, Zoologica, N. York 36 (4) p. 232 f. 37, 39, 40, 42 (D ♂♀).

♂♀ **coccineus** (Peckham) 1909. Californien
Phidippus c. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 413 T. 33 F. 1 T. 34 F. 1 (D ♂♀).
D. c. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 627 (C).

♀ **coloradensis** (Thorell) 1877. Colorado
Phidippus c. Thorell 1877, Bull. U. Stat. Geol. Surv. 3 (2) p. 523 (D ♀).
Phidippus c. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 399 (D ♂♀).
D. c. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 627 (C).

♂ **concinnus** (Gertsch) 1934. Idaho
Phidippus c. Gertsch 1934, Amer. Mus. Novit. 726 p. 16 TF. 17 (D ♂).

♂ **concoloratus** Chamberlin & Gertsch 1930. Californien
D. c. Chamberlin & Gertsch 1930, Proc. Biol. Soc. Wash. 43 p. 144 (D ♂).

♂♀ **consimilis** Roewer 1951. Neu-Mexico, Nevada
Phidippus comatus Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 291 T. 23 F. 8 (D ♀, nec ♂) (praeocc. Karsch 1880, sub **Dendryphantes**).
Phidippus comatus Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 428 T. 32 F. 4 (D ♀).
D. comatus Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 627 (C).
Phidippus comatus Bryant 1942, Amer. Midland Natural. 28 (3) p. 696 TF. 2—4 (D ♂).
D. c. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 452 (nom. nov.).

♂♀ **dissimulator** (Walckenaer) 1837. Georgia
Attus d. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 453 (D ♀).
Phidippus d. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 207 TF. 19 (D ♂).

♂ **dominatus** (Chamberlin & Ivie) 1941. Californien
Metaphidippus d. Chamberlin & Ivie 1941, Bull. Univ. Utah 31 (8), Biol. 6 (3) p. 26 TF. 34—36 (D ♂).

♂♀ **dorsalis** (Bryant) 1942. N.-Carolina
Phidippus d. Bryant 1942, Amer. Midland Natural. 28 (3) p. 697 TF. 6, 9, 15 (D ♂♀).

♂♀ **excubitor** (Walckenaer) 1805. Georgia
Attus e. Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 23 (D).
Attus e. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 436 (D ♂♀).
Phidippus e. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 207 (N ♂♀).

♂♀ **exiguus** Banks 1892. U. St. Amerika
D. e. Banks 1892, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 75 T. 5 F. 30 (D ♀).
D. flavipedes Emerton 1913, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 32 p. 259 T. 48 F. 10 (D ♂).
D. virginis Chamberlin 1925, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 67 p. 233 (D ♂).
D. virginis Kaston 1938, Canad. Ent. 70 p. 16 f. 8, 12, 14 (N ♂).
D. virginis Kaston 1938, Bull. Connect. Geol. Nat. Hist. Surv. 60 p. 195 (N).
Metaphidippus virginis Muma 1944, Amer. Mus. Novit. 1257 p. 11 (N ♂).

Metaphidippus e. Kaston 1945, Amer. Mus. Novit. 1290 p. 10 (N ♂♀).
Metaphidippus e. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 477 T. 94 F. 1753—56 (D ♂♀).

♀ **farneus** (Peckham) 1888. Texas

Philaeus f. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 26 T. 3 F. 16 (D ♀).
Phidippus f. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 287 (N ♀).
Phidippus f. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 430 T. 30 F. 5 (D ♀).
D. f. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 629 (C).

♂♀ **femoratus** (Peckham) 1909. Californien, Neu-Mexico

Phidippus f. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 415 T. 33 F. 2; T. 34 F. 2 (D ♂♀).
D. f. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 629 (C).
? Phidippus f. Schenkel 1951, Verh. Nat. Ges. Basel 62 p. 37 f. 41 (D ♀).

♂♀ **flavipedes** Peckham 1888. U. St. Amerika, Canada, Labrador

D. f. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 42 T. 3 F. 29a (D ♂).
D. f. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 471 T. 38 F. 3 (D ♂♀).
D. f. Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 226 T. 11 F. 4 (D ♂).
D. f. Kaston 1938, Canad. Ent. 70 p. 16 f. 13 (N ♂).
Metaphidippus f. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 177 f. 66—69 (D ♂♀).
Metaphidippus f. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 476 T. 94 F. 1757—58 (D ♂♀).

♂♀ **formosus** (Peckham) 1883. Californien, Kansas, Iowa

Attus f. Peckham 1883, Descr. Spid. . . . Fam. Attid. p. 23 T. 2 F. 18 (D ♀).
Phidippus rimator Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 287 (N ♀).
Phidippus f. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 407 T. 31 F. 2 (D ♂♀).

♀ **franciscanus** (Schenkel) 1951. Californien

Metaphidippus f. Schenkel 1951, Verh. Nat. Ges. Basel 62 p. 39 f. 42 (D ♀).

♂ **furcifera** (Gertsch) 1936. Arizona

Metaphidippus f. Gertsch 1936, Amer. Mus. Novit. 852 p. 26 TF. 24 (D ♂).

♂♀ **glacialis** Scheffer 1905. Kansas

D. g. Scheffer 1905, Industrialist 31 (28) p. 7 (D ♂♀).
D. g. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 463 T. 37 F. 5 (D ♂♀).

♂o **graciosus** Roewer 1951. Californien, Oregon, Canada

Phidippus californicus Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 289 T. 23 F. 3 (D ♂) (praeocc. Peckham 1888 sub **Maevia**).
Phidippus californicus Peckham 1909, Trans. Wiscon. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 402 T. 31 F. 3 (D ♂ o).
D. californicus Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 624 (C).
D. g. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 453 (nom. nov.).

♂♀ **harfordii** (Peckham) 1888. Californien, Washington-St.

Pseudicius h. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 51 T. 1 F. 36; T. 3 F. 36 (D ♂♀).
D. h. Banks 1904, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 3 (13) p. 368 (N).
D. h. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 464 T. 37 F. 6; T. 38 F. 4 (♂♀).
Metaphidippus h. Chamberlin & Ivie 1941, Bull. Univ. Utah 31 (8), Biol 6 (3) p. 26 (N).

♂♀ **helenae** Banks 1921. Californien, Utah

D. h. Banks 1921, Proc. Calif. Ac. Sci. (4) 21 p. 101 f. 5 (D ♂♀).
D. sansalitanus Chamberlin 1925, Proc. Calif. Ac. Sci. (4) 14 p. 137 f. 57, 58 (D ♂).
Metaphidippus h. Gertsch 1934, Amer. Mus. Novit. 726 p. 18 (C).

♂♀ **hirsutus** (Barrows) 1919. Ohio, Connecticut

Phidippus h. Barrows 1919, Ohio Journ. Sci. 19 p. 358 T. 15 F. 6 (D ♂♀).
Phidippus h. Bryant 1942, Amer. Midland Natural. 28 (3) p. 700 TF. 3 (D ♂).
Phidippus h. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 487 T. 97 F. 1803—04 (D ♂).

♂♀ **insidiosus** (Walckenaer) 1837. Georgia, Florida

Attus i. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 440 (D ♂♀).
Phidippus i. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 208 TF. 217 (N ♂♀).

♂♀ **insignarius** (C. L. Koch) 1846. U. St. Amerika

? Attus fraudulentus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 442 (D ♀).
Phidippus i. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 150 TF. 1206 (D ♂).
Attus nuttallii Hentz 1846, Journ. Boston Soc. Nat. Hist. 5 p. 353 T. 21 F. 3 (D ♀).
Philaeus monticola Banks 1896, Trans. Amer. Ent. Soc. 23 p. 73 (D ♂).
Phidippus comatus Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 291 T. 23 F. 8a (D ♂, nec ♀).
Phidippus i. Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 225 T. 11 F. 2 (D ♀).
Phidippus i. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 412 T. 30 F. 3 (D ♂♀).
D. i. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 633 (C).
Phidippus i. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 195 f. 107—109, 126 (D ♂♀).
? Phidippus fraudulentus Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 208 (N ♀).
Phidippus i. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 486 T. 96 F. 1794—96; T. 98 F. 1817—20 (D ♂♀).

♂♀ **insolens** (Hentz) 1845. U. St. Amerika

Attus i. Hentz 1845, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 200 T. 17 F. 8 (D ♂).
Attus podagrosus Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 357 T. 21 F. 13 (D ♀).
Phidippus i. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 285 (N ♂♀).
Phidippus bardus Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 290 T. 23 F. 6 (D ♀).
D. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).
Phidippus ferrugineus Scheffer 1904, Ent. News 15 p. 258 T. 17 F. 2, 3 (D ♂).
Phidippus ferrugineus Scheffer 1904, Industrialist 30 p. 5 (D ♀).
Phidippus i. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 400 T. 30 F. 2 (D ♂♀).
D. i. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 633 (C).

♂ **investigator** (Walckenaer) 1837. Georgia

Attus i. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 445 (D ♂).
Phidippus i. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 208 TF. 18 (D ♂).

♂ **iviei** Roewer 1951. Californien

Metaphidippus tricolor Chamberlin & Ivie 1941, Bull. Univ. Utah 31 (8), Biol. 6 (3) p. 29 TF. 30—32 (D ♂) (praeocc. C. L. Koch sub **Plexippus**).
D. i. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 453 (nom. nov.).

♂♀ **johnsonii** (Peckham) 1883. U. St. Amerika, Canada

Attus j. Peckham 1883, Descr. Spid.... Fam. Attid. p. 22 T. 2 F. 17 (D ♂♀).
Phidippus bicolor Keyserling 1885, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. 496 T. 13 F. 6 (D ♂).
Phidippus j. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 20 T. 1 F. 14; T. 2 F. 14 (D ♂♀).
Phidippus j. Mc Cook 1893 Amer. Spid. 3 T. 29 F. 12 (♂♀).
Phidippus j. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 404 T. 31 F. 1 (D ♂♀).
D. j. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 634 (C).

♂ **kaibabensis** (Gertsch) 1934. Arizona

Phidippus k. Gertsch 1934, Amer. Mus. Novit. 726 p. 13 TF. 19 (D ♂).

♀ **latus** (Walckenaer) 1837. Georgia

Attus l. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 438 (D ♀).
Attus scenicoides Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 444 (D ♀).
Phidippus l. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 209 TF. 15 (D ♀).

♀ **louisianus** Chamberlin 1924. Louisiana

D. l. Chamberlin 1924, Proc. U. Stat. Nat. Mus. 63 (13) p. 34 T. 7 F. 51 (D ♀).

♂♀ **manni** Peckham 1901. Californien, Arizona, Canada

Attus imperialis Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 44 T. 3 F. 31 (D ♂) (praeocc. Rossi 1848).
D. m. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 326 T. 28 F. 1 (D ♂).
Sitticus imperialis Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 580 (N).
D. imperialis Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 459 T. 37 F. 2 (D ♂♀).
Metaphidippus imperialis Gertsch 1935, Amer. Mus. Novit. 792 p. 29 (C).

♂ **mathetes** Chamberlin 1925. Californien

D. m. Chamberlin 1925, Proc. Calif. Ac. Sci. (4) 14 (7) p. 138 f. 59—60 (D ♂).

♂♀ **mccookii** (Peckham) 1883. U. St. Amerika

Attus m. Peckham 1883, Descr. Spid.... Fam. Attid. p. 16 T. 2 F. 12 (D ♀).
Phidippus ruber Keyserling 1885, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. 493 T. 13 F. 4 (D ♂♀).
Phidippus m. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 17 T. 2 F. 9 (D ♀).
Phidippus ruber Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 226 T. 16 F. 4 (D ♂♀).
D. ruber Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).
Phidippus m. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 396 T. 29 F. 4 (D ♂♀).
D. m. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 635 (C).
Phidippus m. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 486 T. 97 F. 1797—99; T. 98 F. 1821 (D ♂♀).

♂♀ **mimus** Chamberlin 1924. Neu-Mexico

D. m. Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. (4) 14 p. 135 f. 52—54 (D ♂♀).

♀ **modestus** (C. L. Koch) 1846. Pennsylvanien

Phiale m. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 195 TF. 1243 (D ♀).
Phyale m. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 315 (C).

♂♀ **montanus** Emerton 1891. U. St. Amerika, Canada

D. m. Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 229 T. 17 F. 3 (D ♂♀).
D. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).
D. m. Peckham 1909 Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 459 T. 37 F. 4 (D ♂♀).

♂ **mylothrus** Chamberlin 1925. Utah

D. m. Chamberlin 1925, Proc. Calif. Ac. Sci. (4) 14 (7) p. 134 f. 50—51 (D ♀).

♀ **mystaceus** (Hentz) 1846. N.-Carolina, Texas, Maryland

Attus m. Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 355 T. 21 F. 9 (D ♀).
Phidippus incertus Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 292 T. 24 F. 1 (D ♀).
Phidippus m. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 435 T. 35 F. 1 (D ♀).
D. m. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 637 (C).
Phidippus incertus Bryant 1942, Amer. Midland Natural. 28 (3) p. 698 TF. 7, 8, 13, 16 (D ♂♀).
Phidippus m. Muma 1944, Amer. Mus. Novit. 1257 p. 11 (N ♂♀).

♂ **neomexicanus** (Banks) 1901. Neu-Mexico

Icius n. Banks 1901, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 53 p. 589 T. 23 F. 21 (D ♂).
D. n. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 468 T. 38 F. 2 (D ♂).

♂♀ **nigromaculatus** (Keyserling) 1885. Utah, Kansas

Icius n. Keyserling 1885, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. 500 T. 13 F. 9 (D ♂).
D. jeffersoni Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 225 T. 11 F. 3 (D ♂♀).
Icius n. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 504 T. 41 F. 9 (D ♂♀).
D. jeffersoni Chamberlin & Gertsch 1929, Journ. Ent. Zool. Claremont 21 (3) p. 110 T. 5 F. 53 (N).
Metaphidippus n. Gertsch 1934, Amer. Mus. Novit. 726 p. 18 (N).

♂♀ **nikites** Chamberlin & Ivie 1935. Californien

Phidippus n. Chamberlin & Ivie 1935, Bull. Univ. Utah 26 (4), Biol. 2 (8) p. 41 T. 11 F. 86—88 (D ♂♀).

♀ **nubilus** (Hentz) 1846. U. St. Amerika

Attus n. Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 358 T. 21 F. 15 (D ♀).
D. n. Banks 1901, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 53 p. 589 (N).
Metaphidippus n. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 272 (N ♀).
D. n. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 638 (C).

♀ **obscurus** (Peckham) 1888. Georgia, N.-Carolina, Texas

? Attus contemplator Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 457 (D).
Phidippus o. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 16 T. 1 F. 5; T. 2 F. 5 (D ♀).
Phidippus o. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 431 T. 35 F. 3 (D ♀).
D. o. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 638 (C).

♂♀ **octavus** (Hentz) 1846. U. St. Amerika

Attus o. Hentz 1846, Journ. Boston Soc. Nat. Hist. 5 p. 365 T. 22 F. 15 (D ♀).
D. insignis Banks 1892, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 74 T. 5 F. 28 (D ♀).
D. montanus Kaston 1938, Bull. Connect. Geol. Nat. Hist. Surv. 60 p. 195 (N).
Metaphidippus montanus Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 176 f. 70—73 (D ♂♀).

Metaphidippus o. Kaston 1945, Amer. Mus. Novit. 1290 p. 10 (N).
Metaphidippus insignis Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 471 T. 94 F. 1750—52 (D ♂♀).

♂ **octopunctatus** (Peckham) 1883. Missouri

Attus o. Peckham 1883, Descr. Spid. . . . Fam. Attid. p. 6 T. 1 F. 4 (D ♂).
Phidippus o. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 21 T. 2 F. 15 (D ♂).
Phidippus o. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 421 T. 34 F. 4 (D ♂).
D. o. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 638 (C).

♀ **opifex** (McCook) 1883. Californien, Neu-Mexico, Colorado

Attus o. McCook 1883, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 276 (D ♀).
Phidippus o. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 20 T. 2 F. 11 (D ♀).
Phidippus o. Mc Cook 1893, Amer. Spid. 3 T. 29 F. 11 (♀).
Parnaeus griseus Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 301 T. 26 F. 7 (D ♂).
Phidippus o. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 392 T. 29 F. 7 (D ♂♀).
D. o. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 639 (C).

♂♀ **otiosus** (Hentz) 1846. U. St. Amerika

Attus o. Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 356 T. 21 F. 10 (D ♀).
Phidippus o. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 25 T. 1 F. 15; T. 2 F. 15 (D ♀).
Phidippus o. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 425 T. 34 F. 6 (D ♂♀).
D. o. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 639 (C).

♂ **paiutus** (Gertsch) 1934. Utah

Metaphidippus p. Gertsch 1934, Amer. Mus. Novit. 726 p. 18 TF. 22 (D ♂).

♂ **peritus** (Gertsch) 1934. Texas

Phidippus p. Gertsch 1934, Amer. Mus. Novit. 726 p. 14 TF. 18 (D ♂).

♀ **pervagus** Peckham 1909. Kansas

D. p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. 16 (1; 5) p. 474 T. 37 F. 9 (D ♀).

♀ **pileatus** (Walckenaer) 1837. Georgia

Attus p. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 450 (D).
Phidippus p. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 210 TF. 17 (D ♀).

♂ **pilosus** (Walckenaer) 1837. Georgia

Attus p. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 447 (D ♂).
Phidippus p. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 211 TF. 33 (D ♂).

♂♀ **pineus** (Kaston) 1945. U. St. Amerika

Paraphidippus p. Kaston 1945, Amer. Mus. Novit. 1290 p. 11 TF. 54—58 (D ♂♀).
Paraphidippus p. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 479 T. 95 F. 1766; T. 96 F. 1778; T. 143 F. 2128—30 (D ♂♀).

♂♀ **pius** (Scheffer) 1905. Kansas

Phidippus p. Scheffer 1905, Industrialist 31 p. 6 (D ♂♀).
Phidippus p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 397 T. 29 F. 8 (D ♂♀).
Phidippus p. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 197 f. 110—112 (D ♂♀).

♂ **pogonopus** (Chamberlin) 1925. Utah

Phidippus p. Chamberlin 1925, Proc. Calif. Ac. Sci. (4) 14 p. 132 f. 47—48 (D ♂).

♀ **princeps** (Peckham) 1883. U. St. Amerika

Attus p. Peckham 1883, Descr. Spid. . . Fam. Attid. p. 18 T. 2 F. 14 (D ♀).
Philaeus p. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 31 T. 3 F. 21 (D ♀).
Phidippus brunneus Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (4) p. 225 T. 16 F. 2 (D ♀).
Phidippus p. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 288 (N ♀).
Phidippus brunneus Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 409 T. 32 F. 3 (D ♂♀).
Phidippus p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 433 T. 31 F. 5 (D ♀).
Phidippus brunneus Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 224 T. 11 F. 1 (D ♂).
D. p. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 640 (C).
D. brunneus Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 624 (C.).
Phidippus p. Bryant 1912, Amer. Midland Natural. 28 p. 701 (N).
Phidippus brunneus Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 191 f. 97—101 (D ♂♀).
Phidippus p. Kaston 1945, Amer. Mus. Novit. 1290 p. 13 TF. 82—83 (N ♂♀).
Phidippus p. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 484 T. 96 F. 1789—90 (D ♂♀).

♀ **pruinosus** (Peckham) 1909. Texas

Phidippus p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 433 T. 35 F. 2 (D ♀).
D. p. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 640 (C).

♂♀ **pulcher** (Walckenaer) 1837. Georgia

Attus p. Walckenaer 1837 Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 439 (D ♀).
Attus p. pallidus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 439 (D ♀).
Attus peregrinus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 445 (D ♂).
Phidippus p. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 211 (N ♂♀).

♀ **purpurarius** (Walckenaer) 1837. Georgia

Attus p. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 446 (D ♀).
Phidippus p. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 211 TF. 36 (D ♀).

♂♀ **purpuratus** (Keyserling) 1885. U. St. Amerika

? Phidippus asinarius C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 139 TF. 1197 (D ♀).
? Phidippus electus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 144 TF. 1201 (D ♀).
Phidippus p. Keyserling 1885, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. 489 T. 13 F. 1 (D ♂).
Phidippus albomaculatus Keyserling 1885, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. 491 T. 13 F. 2 (D ♀).
Phidippus galathea Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 14 T. 1 F. 3 (D ♀).
Phidippus mystaceus Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 227 T. 16 F. 3 (D ♂♀).
Phidippus borealis Banks 1895, Canad. Ent. 27 p. 96 (D ♀).
Phidippus galathea Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 286, 288 (N ♂♀).
Phidippus mystaceus Emerton 1902, Common Spid. p. 50 f. 118, 135 (D ♀).

Phidippus p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 423 T. 34 F. 5 (D ♂♀).
D. p. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 641 (C).
Phidippus p. Comstock 1912, Spider Book p. 683 f. 755 (N).
Phidippus p. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 199 f. 113—116 (D ♂♀).
Phidippus p. Muma 1944, Amer. Mus. Novit. 1257 p. 11 (N ♂♀).

♂♀ **putnamii** (Peckham) 1883. U. St. Amerika

Attus p. Peckham 1883, Descr. Spid.... Fam. Attid. p. 1 T. 1 F. 1 (D ♂).
Phidippus gracilis Keyserling 1885, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. 495 T. 13 F. 5 (D ♂).
Plexippus p. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 35 T. 3 F. 24 (D ♂).
Phidippus p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 417 T. 33 F. 3; T. 34 F. 3 (D ♂).
D. p. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 641 (C).
Phidippus p. Bryant 1942, Amer. Midland Natural. 28 (3) p. 702 TF. 17 (D ♂, N ♀).
Phidippus p. Muma 1944, Amer. Mus. Novit. 1257 p. 11 (N ♂♀).

♀ **sagax** (Walckenaer) 1837. Georgia

Attus s. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 449 (D ♀).
Phidippus s. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9); Biol. 8 (5) p. 212 TF. 38 (D ♀).

♀ **texanus** (Banks) 1905. Texas, Kansas

Phidippus albomaculatus Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 19 T. 1 F. 13; T. 2 F. 13 (D ♀).
Phidippus t. Banks 1905, Proc. Ent. Soc. Wash. 7 p. 98 (D ♀).
Phidippus t. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 437 T. 35 F. 6 (D ♀).
D. t. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 642 (C).
Phidippus t. Bryant 1942, Amer. Midland Natural. 28 (3) p. 703 TF. 11—12 (D ♂).

♀ **tridentiger** (Walckenaer) 1837. Georgia

Attus t. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 449 (D ♀).
Phidippus t. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 212 TF. 10 (D ♀).

♂ **unicus** Chamberlin & Gertsch 1930. Utah

D. u. Chamberlin & Gertsch 1930, Proc. Biol. Soc. Wash. 43 p. 143 (D ♂).

♂ **uteanus** Chamberlin & Gertsch 1929. Utah

D. u. Chamberlin & Gertsch 1929, Journ. Ent. Zool. Claremont 21 (3) p. 110 T. 4 F. 50; T. 5 F. 51 (D ♂).

♂ **verecundus** Chamberlin & Gertsch 1930. Utah

D. v. Chamberlin & Gertsch 1930, Proc. Biol. Soc. Wash. 43 p. 144 (D ♂).

♀ **versicolor** Peckham 1909. Oregon

D. v. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 475 T. 36 F. 6 (D ♀).
Metaphidippus v. Chamberlin & Ivie 1941, Bull. Univ. Utah 31 (8), Biol. 6 (3) p. 26 (N).

♂♀ **watonus** (Chamberlin & Ivie) 1941. Californien

Metaphidippus w. Chamberlin & Ivie 1941, Bull. Univ. Utah 31 (8), Biol. 6 (3) p. 28 TF. 37—39 (D ♂♀).

♂♀ **whitmani** (Peckham) 1909. U. St. Amerika, Canada

Phidippus rufus Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 13 T. 2 F. 2 (D ♂, nec ♀).
D. rufus Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).
Phidippus w. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 394 T. 29 F. 6 (D ♂♀).
Phidippus w. Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 224 T. 11 F. 5; T. 12 F. 1 (D ♂).
D. w. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 644 (C).
Phidippus insolens Kaston 1938, Canad. Ent. 70 p. 16 (N).
Phidippus insolens Kaston 1938, Bull. Connect. Geol. Nat. Hist. Surv. 60 p. 196 (N).
Phidippus w. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 200 f. 117—121 (D ♂♀).
Phidippus w. Kaston 1945, Amer. Mus. Novit. 1290 p. 13 TF. 80—81 (N ♂♀).
Phidippus w. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 485 T. 97 F. 1805—08; T. 98 F. 1823 (D ♂♀).

♀ **workmanii** (Peckham) 1901. Arizona

Phidippus w. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 297 T. 24 F. 5 (D ♀).
Phidippus w. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 434 T. 35 F. 5 (D ♀).
D. workmanni Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 644 (C).

Gen. **Hentzia** Marx 1883.

Neotropische Arten:

§ 5 ♂: Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 31 p. 138—139 (sub **Wala**).

♂♀ **antillana** Bryant 1940. Antigua, Cuba, Haiti, San Domingo, Virgin.-Isl.

H. a. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 494 T. 22 F. 285, 289, 294 (D ♂♀).
H. a. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 487 (N).

♂♀ **audax** Bryant 1940. Cuba

H. a. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 496 T. 22 F. 286, 290, 292 (D ♂♀).

♂ **fimbriata** (F. Cambridge) 1901. Guatemala

Anoka f. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 256 T. 22 F. 16 (D ♂).
Wala f. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 716 (C).

♂♀ **footei** (Petrunkevitch) 1914. Dominica

Wala f. Petrunkevitch 1914, Journ. N. York Ent. Soc. 22 p. 330 T. 12 F. 10—14 (D ♂♀).

♂ **grenada** (Peckham) 1894. Columbien, Guatemala, Florida

Anoka g. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 126 T. 12 F. 8 (D ♂).
Anoka g. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 256 T. 22 F. 15 (N ♂).
Wala g. Banks 1904, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 138 (N).
Wala g. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 507 T. 40 F. 12; T. 41 F. 11 (D ♂).

♀ **noda** (Chamberlin) 1916. Peru

Wala n. Chamberlin 1916, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 60 (6) p. 296 T. 25 F. 2 (D ♀).

♂ **parallela** (Peckham) 1894. I. Trinidad

Anoka p. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 129 T. 13 F. 2 (D ♂).
Anoka p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 624 (N).
Wala p. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 717 (C).

♂♀ **peckhamii** (Cockerell) 1893. Cuba, Jamaica, Haiti, San Domingo

Anoka p. Cockerell 1893, Journ. Inst. Jamaica 1 p. 221 (D).
Anoka moneagua Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 127 T. 12 F. 9 (D ♂♀).
Anoka moneaga Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 624 (N).
Wala p. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 717 (C).
H. p. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 488 (D ♂, N ♀).

♂ **poenitens** (Chamberlin) 1924. Nieder-Californien

Wala p. Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 680 f. 120—121 (D ♂).

♂♀ **squamata** (Petrunkevitch) 1930. Portorico, Mona-Isl.

Wala s. Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 31 p. 146 f. 130—134 (D ♂♀).
H. s. Bryant 1947, Psyche 54 (2) p. 93 (N ♀).

♂♀ **tibialis** Bryant 1940. Cuba

H. t. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 498 T. 22 F. 291, 295 (D ♂♀).

♂♀ **vernalis** (Peckham) 1893. Westindien, Bermudas

Anoka v. Peckham 1893, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 701 T. 62 F. 9 (D ♂♀).
Anoka v. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. 2 (2) p. 125 T. 13 F. 3 (N ♀).
Wala v. Banks 1901, Proc. U. Stat. Nat. Mus. 24 p. 224 (N).
Anoka v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 630 (N).
Wala v. Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 31 p. 139 f. 120—129 (D ♂♀).

Transgredierende Arten:

§ 2 Arten: Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 159.

♂♀ **mitrata** (Hentz) 1846. U. St. Amerika, Cuba

Attus m. Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 363 T. 22 F. 9 (D ♂).
Attus morigerus Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 365 T. 22 F. 12 (D ♀).
Maevia sulphurea C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 71 TF. 1327 (D ♂).
Maevia pallida C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 79 TF. 1334 (D ♀).
Icius m. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 48 T. 1 F. 34; T. 3 F. 34; T. 4 F. 34 (D ♂♀).
Icius m. Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 232 T. 18 F. 2 (D ♂♀).
Anoka m. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 125 (N).
Icius m. Emerton 1902, Common Spiders p. 57 f. 149 (D ♂♀).
Wala m. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 507 T. 41 F. 12; T. 42 F. 2 (D ♂♀).
H. m. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 159 f. 34—37 (D ♂♀).
H. m. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 492 T. 97 F. 1815; T. 99 F. 1848—1849 (D ♂♀).

♂♀ **palmarum** (Hentz) 1832. – * U. St. Amerika, Cuba

Epiblemum p. Hentz 1832, Sillimans Journ. Sci. Arts 21 p. 108 (D ♂).
? Attus ambiguus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 467 (D).
Epiblemum p. Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 366 T. 22 F. 16 (D ♂).
Epiblemum p. Peckham 1883, Descr. Spid. . . . Fam. Attid. p. 28 T. 3 F. 22 (D ♂♀).
H. p. Marx 1883, Marx 1883, in: Howard, List Invert. S. Carolina 11 p. 26 (N).
Icius vittatus Keyserling 1885, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. 504 T. 13 F. 12 (D ♀).
Wala albovittata Keyserling 1885, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. 517 T. 13 F. 20 (D ♂).
Wala albovittata Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 339 (D).
Icius p. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 46 T. 1 F. 33; T. 3 F. 33 (D ♂♀).
Icius albovittatus Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 50 T. 1 F. 35a; T. 4 F. 35d (D ♂).
Icius p. Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 232 T. 18 F. 1 (D ♂♀).
Anoka p. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. 2 (2) p. 126 (N).
Anoka p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 614 f. 732 (N ♂).
Icius p. Emerton 1902, Common Spid. p. 56 f. 145—148 (D ♂♀).
Wala p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 508 T. 42 F. 1 (D ♂♀).
Wala p. Comstock 1912, Spider Book p. 680 f. 752 (N).
H. p. Kaston 1938, Ent. News 49 p. 258 (N).
H. p. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 161 f. 38—43 (D ♂♀).
H. ambiguus Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 201 (N ♂♀).
H. p. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum 47, Bull. 70 p. 491 T. 97 F. 1814; T. 99 F. 1841—1847 (D ♂♀).

Gen. **Icidella** Bösenberg & Strand 1906.

♂ **interrogationis** Bösenberg & Strand 1906. Japan

I. i. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 351 T. 9 F. 148; T. 13 F. 365 (D ♂).

Gen. **Icius** Simon 1876.

Palaearktische Arten:

§ 3 ♂, 3 ♀: Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1215—1217.

♀ **cervinus** Simon 1878. S.-Russland

I. c. Simon 1878, Ann. Soc. Ent. France (5) 8 p. 204 (D ♀).

♂o **crassipes** (Simon) 1868. Spanien, Algier

Attus c. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 574 (D ♂o).
Attus c. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 185 (N).
I. c. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 56 (N).

♀ **daisetsuzanus** Saito 1934. Japan

I. d. Saito 1934, Journ. Agr. Hokkaido Univ. 33 (5) p. 297 T. 12 F. 13; T. 14 F. 51 (D ♀).

♂♀ **elongatus** Karsch 1879. Japan

I. e. Karsch 1879, Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf. 36 p. 83 (D ♂).
I. e. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 353 T. 8 F. 124; T. 14 F. 388 (D ♂♀).
I. e. Strand 1918, Arch. Naturg. 82 (A; 11) p. 103 (N).

♀ **flavipes** Caporiacco 1935. Karakorum
I. f. Caporiacco 1935, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 209 T. 5 F. 7 (D ♀).

o **guyonii** (Lucas) 1846. Algier
Salticus g. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 156 T. 7 F. 6 (Do).
I. g. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1264 (N).

♂♀ **hamatus** (C. L. Koch) 1846. Mittelmeergebiet
Marpissa h. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 67 TF. 1132 (D ♀).
Icelus notabilis C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 174 TF. 1225 (D ♂).
Salticus erraticus Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 149 T. 6 F. 5 (D o).
Salticus boryi Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 157 T. 7 F. 3 (D ♀).
Dendryphantes h. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 314 (C).
Dendryphantes erratica Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 315 (C).
Attus striatus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 566 T. 6 F. 3 (D ♂♀).
Attus lucasii Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 568 (D ♂♀).
Attus vicinus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 569 (D ♂♀).
Attus h. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 183 (N).
I. striatus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 59 (D ♂♀).
I. h. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 306 (D).
I. striatus Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 14 (D ♂).
I. striatus Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 614 f. 738 (N ♂).
I. h. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1216, 1217, 1264 f. 1946 (D ♂♀).

♀ **magister** Karsch 1879. Japan
I. m. Karsch 1879, Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf. 36 p. 83 (D ♀).
I. m. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 353 T. 9 F. 133; T. 13 F. 353 (D ♀).
I. m. Strand 1918, Arch. Naturg. 82 (A; 11) p. 104 (D ♀).

♀ **minianus** Franganillo 1910. Portugal
I. m. Franganillo 1910, Broteria 9 p. 19 (D ♀).

♂ **minimus** Caporiacco 1933. Libyen
I. m. Caporiacco 1933, Ann. Mus. Civ. Genova 56 p. 334 f. 12 (D ♂).

♂♀ **nebulosus** (Simon) 1868. Westl. Mittelmeergebiet
Attus n. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 572 (D ♂♀).
Attus congener Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 184 (D ♂).
I. congener Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 58 (D ♂♀).
I. congener Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1216, 1217, 1264 f. 1948 (D ♂♀).

♂♀ **niger** Peele & Saito 1933. Kurilen
I. n. Peele & Saito 1933, Journ. Fac. Sci. Hokkaido Zool. (6) 2 (2) p. 119 f. 7 (D ♂♀).

♂♀ **notabilis** Simon 1871. – * S.-Europa, Algier
Attus n. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 183 (N).
Plexippa n. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 326 (C).
I. n. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 57 T. 9 F. 7 (D ♂♀).
I. n. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Wiscons. 2 (2) p. 108 T. 10 F. 7 (N ♀).
I. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 629 (N).
I. subinermis Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1216, 1217, 1264 f. 1945, 1947 (D ♂♀).

♂♀ **pseudoicioides** Caporiacco 1935. Karakorum
I. p. Caporiacco 1935, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 210 T. 5 F. 6 (D ♂♀).

♀ **testaceolineatus** (Lucas) 1846. Algier
Salticus t. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Aradın. p. 183 T. 10 F. 4 (D ♀).
Atta t. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 311 (C).
I. t. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 109 (C).

Aethiopische Arten:

♂ **brunellii** Caporiacco 1940. Abessinien
I. b. Caporiacco 1940, Atti Accad. Ital. 11 (18) p. 857 f. 50 (D ♂).

♀ **decempunctatus** Caporiacco 1941. Süd-Abessinien
I. d. Caporiacco 1941, Miss. Biol. Sagan-Omo 12, Zool. 6 p. 152 f. 67 (D ♀).

♀ **dendryphantoides** Strand 1909. Süd-Afrika
I. d. Strand 1909, Deutsch. S. Pol. Exped. 1901—1903; 10 (5) Zool. 2 p. 592 (D ♀).

♀ **desertorum** Simon 1901. Süd-Afrika
I. d. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 161 (D ♀).

♂♀ **ocellatus** Pavesi 1883. Abessinien, Kenya
I. o. Pavesi 1883, Ann. Mus. Civ. Genova 20 p. 85 (D o).
I. o. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 483 f. 94a, b (D ♂♀).

♀ **pseudocellatus** Strand 1907. Capland
I. p. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (17—18) p. 547 (D ♀).
I. p. Strand 1907, Zool. Jahrb. Syst. 25 (5—6) p. 718 (D ♀).

Orientalische Arten:

♀ **icioides** (Simon) 1889. Indien
Phlegra i. Simon 1889, Journ. Asiat. Soc. Bengal. 58 (2; 4) Suppl. p. 334 (D ♀).
I. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 629 (N).

Neotropische Arten:

§ 7 ♂, 6 ♀: Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 497 (part.).

♀ **ildefonsus** Chamberlin 1924. Nieder-Californien
I. i. Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 679 f. 119 (D ♀).

♀ **inhonestus** Keyserling 1877. Uruguay
I. i. Keyserling 1877, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 27 p. 621 T. 14 F. 23 (D ♀).

♀ **pleuralis** Banks 1896. Florida
I. p. Banks 1896, Trans. Amer. Ent. Soc. 23 p. 73 (D ♀).

♀ **separatus** Banks 1903. Haiti
I. s. Banks 1903, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 55 p. 344 T. 15 F. 5, 11 (D ♀).

♂ **wickhamii** Peckham 1894. Florida, Bahamas
I. w. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 109 T. 10 F. 8 (D ♂).
I. floridanus Banks 1895, Canad. Ent. 27 p. 99 (D ♂).

I. w. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 502 T. 41 F. 8 (D ♂).
I. w. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 500 T. 22 F. 296 (D ♂♀).

Transgredierende Arten:

♀ **cinctipes** Banks 1900. Florida, Louisiana

I. c. Banks 1900, Canad. Ent. 32 p. 101 (D ♀).
I. c. Bryant 1933, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 74 (6) p. 193 T. 4 F. 42, 47 (D ♀).

Nearktische Arten:

§ 7 ♂, 6 ♀: Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 497 (part.).
§ 4 ♂, 4 ♀: Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 488.

♂♀ **annectens** Chamberlin & Gertsch 1929. Utah

I. a. Chamberlin & Gertsch 1929, Journ. Ent. Zool. Claremont 21 (3) p. 110 T. 5 F. 52, 55, 57 (D ♂♀).

♀ **exornatus** Peckham 1909. Texas

I. e. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 505 T. 41 F. 6 (D ♀).

♂ **fontanus** Levi 1951. Wisconsin

I. f. Levi 1951, Amer. Mus. Novit. 1501 p. 33 TF. 43—45 (D ♂).

♂♀ **formicarius** Emerton 1891. Massachusets, Connecticut, Long Island

I. f. Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 235 T. 18 F. 6 (D ♀).
I. f. Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 13 (3) p. 227 T. 11 F. 8 (D ♂♀).
I. f. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 500 T. 40 F. 7; T. 41 F. 3 (D ♂♀).
Tutelina f. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 213 f. 144—146 (D ♂♀).
I. f. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 490 T. 98 F. 1824—1827 (D ♂♀).

♂♀ **hartii** Emerton 1891. U. St. Amerika, Canada

I. h. Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 235 T. 18 F. 5 (D ♂♀).
I. h. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 500 T. 41 F. 5 (D ♂♀).
Tutelina h. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 214 f. 147—150 (D ♂♀).
I. h. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 490 T. 98 F. 1828—1832 (D ♂♀).

♂ **sexmaculatus** Banks 1895. Columbia District, Louisiana

I. s. Banks 1895, Canad. Ent. 27 p. 100 (D ♂).
I. s. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 503 T. 40 F. 6; T. 41 F. 10 (D ♂).

♂♀ **similis** Banks 1895. U. St. Amerika, Canada

I. s. Banks 1895, Canad. Ent. 27 p. 100 (D ♂♀).
I. s. Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 227 (N).
I. s. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 498 T. 41 F. 2 (D ♂♀).
Tutelina s. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 216 f. 151—154 (D ♂♀).
I. s. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 489 T. 92 F. 1812—1813; T. 99 F. 1838—1840 (D ♂♀).

♂♀ **texanus** Banks 1904. Texas

I. t. Banks 1904, Journ. N. York Ent. Soc. 12 p. 116 T. 5 F. 10 (D ♂♀).

♀ **versicolor** Peckham 1909. Maine
I. v. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 503 T. 41 F. 4 (D ♀).

Gen. **Lurio** Simon 1901.

♀ **conspicuus** Mello-Leitao 1930. Amazonas
L. c. Mello-Leitao 1930, Arch. Mus. Nac. R. d. Janeiro 32 p. 71 TF. 43, 44 (D ♀).

♂ **crassichelis** Berland 1913. Ecuador
L. c. Berland 1913, Araign. in: Miss. Mes. Mér. Ecuador 10 (1) p. 113 T. 12 F. 116—118 (D ♂).

♂ **cuspidatus** (F. Cambridge) 1901. Guatemala
Parnaeus c. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 288 T. 27 F. 14 (D ♂).
Dendryphantes c. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 628 (C).

♂ **fimbriatus** (F. Cambridge) 1901. Guatemala
Parnaeus f. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 288 T. 27 F. 15 (D ♂).
Dendryphantes f. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 630 (C).

♂♀ **solennis** (C. L. Koch) 1846. – * Columbien, Venezuela, Guiana
Hyllus s. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 163 TF. 1217 (D ♂).
L. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 631 f. 733, 734 (N ♂).
L. s. Crane 1945, Zoologica, N. York 30 p. 38 f. 4A—G (D ♂♀).
L. s. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 724 (D ♂♀).

Gen. **Modunda** Simon 1901.

Palaearktische Arten:

♀ **orientalis** Dönitz & Strand 1906. Japan
M. o. Dönitz & Strand 1906, in: Bösenberg & Strand, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 396 T. 8 F. 123 (D ♀).

♂♀ **phragmitis** Simon 1901. – * Aegypten
M. p. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 160 (D ♂♀).
M. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 629 (N).

Aethiopische Arten:

♂ **aperta** Peckham 1903. Mashonaland
M. a. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 210 T. 26 F. 9 (D ♂).

O♀ **ghigii** Caporiacco 1949. Kenya
M. g. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 484 f. 96 (D O ♀).

Orientalische Arten:

♀ **aeneiceps** Simon 1901. Ceylon
M. ae. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 161 (D ♀).

Gen. **Paradamoetas** Peckham 1885.

♂♀ **formicinus** Peckham 1885. Panama, Guatemala, Texas
P. f. Peckham 1885, Proc. Nat. Hist. Soc. Wiscons. p. 79 T. 2 F. 10 (D ♂).
P. f. Peckham 1892, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (1) p. 74 T. 6 F. 2 (D ♂♀).

P. f. F. Cambridge 1900, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 177 T. 12 F. 5, 6 (N ♀).
P. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 632 f. 743 (N ♀).
P. f. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 375, T. 51, F. 4; T. 51 F. 2b (D ♂♀).
P. f. Chickering 1947, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 459 (N ♂♀).

Gen. **Parahentzia** Bryant 1943.

♂♀ **insignita** Chickering 1946. Panama

P. i. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 316 f. 276—280 (D ♂♀).

♂ **mandibularis** Bryant 1943. – * San Domingo, Haiti

P. m. Bryant 1943, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 92 (9) p. 500 T. 6 F. 68, 69; T. 7 F. 71 (D ♂).

Gen. **Pseudicius** Simon 1884.

Palaearktische Arten:

§ 3 ♂, 2 ♀: Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 11—12.
§ 2 ♂, 2 ♀: Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1217—1218.

♂♀ **badius** (Simon) 1868. Corsica, Italien, Sizilien, Griechenland

Marpissus b. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 23 (D ♀).
Marpissus b. Simon 1870, Bull. Soc. Ent. Ital. 2 p. 64 (D ♀).
Attus b. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 181 (D ♂♀).
Marpessa b. Pavesi 1873, Ann. Mus. Civ. Genova 4 p. 215 (N).
Dendryphantes b. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 44 (D ♂ o).
P. b. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 309 (N).
P. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 623 (N).
P. b. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1218, 1265 (D ♂).
P. b. Schenkel 1938, Ark. Zool. 30 (A; 24) p. 19 f. 8 (D ♀).

♀ **cognatus** Peckham 1894. Japan

P. c. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 112 T. 11 F. 3 (D ♀).
P. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 623 (N).

♂ **courtauldi** Bristowe 1935. I. Patmos

P. c. Bristowe 1935, Proc. Zool. Soc. Lond. (4) p. 786 f. 21—24 (D ♂).

♂ **cultrifer** Caporiacco 1948. Rhodos

P. c. Caporiacco 1948, Redia 33 p. 69 f. 11 (D ♂).

♂♀ **encarpatus** (Walckenaer) 1802. – * Mittel- u. S.-Europa, S.-Russland, Turkestan

Aranea e. Walckenaer 1802, Faun. Paris. 2 p. 241 (D ♂♀).
Salticus leucogramma Latreille 1819, Nouv. Dict. Hist. Nat. (2. Ed.) (D).
Attus e. Walckenaer 1925, Faun. Franç. Aran. p. 60 T. 5 F. 7 (D ♂♀).
Attus pulchellus Hahn 1829, Monogr. d. Spinn. 5 p. 2 T. 18 F. C (D ♀).
Salticus tigrinus Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 62 TF. 47 (D ♀).
Attus maculatus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 421 (D ♂).
Attus e. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 471 (D ♂♀).
Calliethera pulchella C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 47 TF. 1115 (D ♀).
Calliethera ambigua C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 48 TF. 1116 (D ♀).
Dendryphantes quadripunctata Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 314 (C).
Calliethera maculata Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 328 (C).

Dendryphantes medius Canestrini & Pavesi 1868, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 11 p. 817 (N).
Attus pulchellus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 565 (D ♂♀).
Attus e. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 583 (D ♂).
Marpessa e. Pavesi 1873, Ann. Mus. Civ. Genova 4 **p.** 215 (N).
Dendryphantes e. Simon 1876, Aradın. de France 3 p. 42 T. 9 F. 12 (D ♂♀).
Epiblemum ambiguus L. Koch 1877, Abh. Nat. Ges. Nürnberg 6 p. 173 (N).
Dendryphantes e. Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 24 T. 4 F. 11 (D ♂♀).
Marpessa pulchella Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) **p.** 80 (D ♂♀).
P. e. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 336 (D).
P. e. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 12 (D ♂♀).
P. e. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 109 T. 11 F. 1 (N ♀).
P. e. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 628 (N).
P. e. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 421 T. 40 F. 620 (D ♂♀).
P. e. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 580 (D ♂♀).
P. e. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 39 f. 119, 120 (D ♂♀).
P. e. Simon 1937, Aradın. de France 6 (5) p. 1217, 1264, f. 1949, 1950, 1951 (D ♂♀).
P. e. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 33 f. . . (N).
P. e. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 44 T. 4 F. 74—76 (D ♂♀).

♂♀ **epiblemoides** Chyzer 1891. Kroatien, Macedonien

P. e. Chyzer 1891, in: Chyzer & Kulczynski, Aran. Hungar. 1 p. 12 T. 1 F. 16 (D ♂♀).

♀ **espereyi** Fage 1921. Griechenland

P. e. Fage 1921, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 27 **p.** 229 f. 6, 7 (D ♀).
P. e. Hadjissarandos 1940, Araign. de l'Attique p. 108 f. 36 (D ♂, griech.).

♂♀ **kulczynskii** Nosek 1903. Kleinasien

P. k. Nosek 1903, Ann. Nat. Hofmus. Wien 20 p. 145 T. 5 F. 26 (D ♂♀).

♂♀ **orientalis** Kulczynski 1895. Sibirien

P. o. Kulczynski 1895, Dissert. Ac. Sci. Cracov. 32 p. 59 T. 2 F. 12—14 (D ♂♀).
P. o. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) **p.** 623 (N).

♂ **picaceus** (Simon) 1868. Italien, Dalmatien, Tunis, Rhodos

Attus p. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 573 T. 7 F. 4 (D ♂).
Attus p. Simon 1870, Bull. Soc. Ent. Ital. 2 p. 67 (D ♂).
P. p. Simon 1885, Aradın. in: Explor. Sci. Tunis. **p.** 3 (D ♂).
P. p. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 12 T. 1 F. 17 (D ♂).
P. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 623 (N).
P. p. Caporiacco 1948, Redia 33 **p.** 71 (N ♀).

♂ **picaceus palaestinensis** Strand 1915. Palästina

P. p. p. Strand 1915, Arch. Naturg. 81 (A; 2) p. 169 (D ♂).

♂♀ **punctatus** Denis 1947. Oase Siwah

P. p. Denis 1947, Bull. Soc. Fouad I. Ent. 31 **p.** 70 T. 6 F. 4—6 (D ♂♀).

♂♀ **tamaricis** Simon 1885. Marokko bis Libyen

P. t. Simon 1885, Aradın. in: Explor. Sci. Tunis. **p.** 2 (D ♂♀).
P. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 614 f. 737 (N).

♂♀ **vittatus** Simon 1889. Transcaspien

P. v. Simon 1889, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 39 **p.** 374 (D ♂♀).

Transgredierende Arten:

♀ **musculus** Simon 1901. Natal, Algier
P. m. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 160 (D ♀).
P. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 623 (N).

♂♀ **spiniger** (Cambridge) 1872. Syrien, Aegypten, Nil-Sudan
Salticus s. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 339 (D ♂♀).
P. s. Simon 1907, Rés. Sved. Zool. Expéd. Egypt. White Nile 21 p. 9 (N).
P. s. Caporiacco 1941, Miss. Biol. Sagan-Omo 12, Zool. 6 p. 151 f. 66 (D ♂).

Aethiopische Arten:

♀ **africanus** Peckham 1903. Capland
P. a. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 212 T. 26 F. 2 (D ♀).

♂♀ **asoroticus** Simon 1890. Yemen
P. a. Simon 1890, Ann. Soc. Ent. France (6) 10 p. 116 (D ♂♀).
P. azoroticus Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 623 (N).

♀ **bipunctatus** Peckham 1903. Capland
P. b. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 212 T. 26 F. 3 (D ♀).

♂♀ **braunsii** Peckham 1903. Capland
P. b. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 211 T. 26 F. 1 (D ♂♀).

♀ **elmenteitae** Caporiacco 1949. Kenya
P. e. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 483 f. 95 (D ♀).

♀ **histrionicus** Simon 1902. S.-Afrika
P. h. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 27 (D ♀).

♀ **icioides** (Simon) 1884. Nil-Sudan
Calliethera i. Simon 1884, Bull. Soc. Zool. France 9 p. 2 T. 1 F. 1 (D ♀).
P. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 623 (N).

♂ **unicus** (Peckham) 1894. Madagascar
Spadera u. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 118 T. 12 F. 1 (D ♂).
P. u. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 613, 623 (N).

♂♀ **zebra** Simon 1902. S.-Afrika
P. z. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 27 (D ♂♀).

Orientalische Arten:

♀ **decemnotatus** Simon 1885. Singapore
P. d. Simon 1885, Bull. Soc. Zool. France 10 (4—6) p. 452 (D ♀).
P. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 623 (N).

♀ **modestus** Simon 1885. Dekan
P. m. Simon 1885, Bull. Soc. Zool. France 10 (4—6) p. 28 T. 10 F. 2 (D ♀).
P. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 623 (N).

Neotropische Arten:

lecontei Barrows 1940. Tennessee
P. l. Barrows 1940, Journ. Ohio Sci. 40 (2) p. 138 f. . . (D).

♀ **oblongus** Peckham 1894. Amazonas

P. o. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 110 T. 11 F. 2 (D ♀).
P. o. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 623 (N).

Nearktische Arten:

♂ **monticola** (Banks) 1895. Colorado

Icius m. Banks 1895, Canad. ent. 27 p. 98 (D ♂).
P. m. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 493 T. 40 F. 5 (D ♂).

♂♀ **piraticus** (Peckham) 1888. U. St. Amerika, Mexico

Icius p. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 49 T. 1 F. 35; T. 4 F. 35 (D ♂).
P. p. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 110 (N ♂).
Icius p. Banks 1901, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 53 p. 590 (N ♂).
Paramarpissa tibialis F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 252 T. 22 F. 11 (D ♂).
P. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 623 (N).
Marpissa albopilosa Banks 1902, Proc. U. St. Nat. Mus. 25 p. 219 T. 7 F. 2, 3, 9 (D ♂).
Erematttus albopilosus Banks 1904, Journ. N. York Ent. Soc. 12 p. 117 (N).
P. p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 494 T. 39 F. 10 (D ♂♀).

♀ **siticulosus** Peckham 1909. Californien

P. s. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 495 T. 39 F. 11 (D ♀).

Gen. **Sassacus** Peckham 1895.

Neotropische Arten:

♂ **alboguttatus** (F. Cambridge) 1901. Mexico

Homalattoides a. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 294 T. 28 F. 13 (D ♂).
S. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).

♂ **arcuatus** Simon 1901. Amazonas

S. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 626 (N).
S. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 28 (D ♂).

♀ **aurantiacus** Simon 1901. Brasilien

S. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 626 (N).
S. a. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 29 (D ♀).

♀ **biaccentuatus** Simon 1901. Paraguay

S. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 626 (N).
S. b. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 29 (D ♀).

bicinctus Simon 1901. Brasilien

S. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 626 (N).

♂♀ **dissimilis** Mello-Leitao 1941. Argentinien

S. d. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 186 f. 79 (D ♂♀).

♂♀ **flavicinctus** Crane 1949. Venezuela

S. f. Crane 1949, Zoologica, N. York 34 (2) p. 41 f. 5 (D ♂♀).
S. f. Crane 1950, Zool. Sci. Contrib. N. York Zool. Soc. 35 (1) p. 257 (D ♂♀).

♀ **marginellus** Simon 1901. Brasilien

S. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 626 (N).
S. m. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 30 (D ♀).

♂♀ **ocellatus** Crane 1949. Venezuela

S. o. Crane 1949, Zoologica, N. York 34 (2) p. 44 f. 6 (D ♂♀).
S. o. Crane 1950, Zool. Sci. Contrib. N. York Zool. Soc. 35 (1) p. 257 (D ♂♀).

♀ **poecilopus** Caporiacco 1947. Brit. Guiana

S. p. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 34 (D ♀).
S. p. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 727 TF. 159 (D ♀).

♂ **resplendens** Simon 1901. Venezuela

S. r. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 626 (N).
S. r. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 30 (D ♂).

♂ **trochilus** Simon 1901. Brasilien

S. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 626 (N).
S. t. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 29 (D ♂).

♀ **vanduzeei** Chamberlin 1924. Nieder-Californien

S. v. Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 687 f. 133 (D ♀).

Transgredierende Arten:

♂♀ **barbipes** (Peckham) 1888. Costa Rica, Guatemala, Mexico, Californien

Eris b. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 55 T. 4 F. 38 (D ♀).
Ashtabula nigricans F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 257 T. 23 F. 2 (D ♂♀).
Eris b. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 300 T. 29 F. 11 (N ♀).
S. b. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 592 T. 50 F. 6 (D ♂♀).

Nearktische Arten:

♂ **aemulus** Gertsch 1934. Minnesota, Wisconsin

S. a. Gertsch 1934, Amer. Mus. Novit. 726 p. 22 TF. 20 (D ♂).

♂♀ **papenhoei** Peckham 1895. – * Californien, Texas, Arizona, Kansas, Wisconsin, Maryland, Neu-Mexico

S. p. Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 177 T. 16 F. 11 (D ♂♀).
S. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 632 (N).
S. p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 592 T. 49 F. 11 (D ♂♀).
S. p. Muma 1944, Amer. Mus. Novit. 1257 p. 12 (N ♂).

♀ **smaragdinus** Barrows 1919. Ohio

S. s. Barrows 1919, Journ. Ohio Sci. 19 p. 359 T. 15 F. 9 (D ♀).

♂♀ **uteanus** Chamberlin & Gertsch 1929. Utah

S. u. Chamberlin & Gertsch 1929, Journ. Ent. Zool. Claremont 21 (3) p. 111 T. 5 F. 54, 56 (D ♂♀).

Gen. **Selimus** Peckham 1901.

♂ **venustus** Peckham 1901. Brasilien

S. v. Peckham 1901, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 13 p. 329 T. 28 F. 10 (D ♂).
S. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 625 (N).

Gen. **Talavera** Peckham 1909.

♂♀ **minuta** (Banks) 1895. U. St. Amerika

Icius m. Banks 1895, Canad. Ent. 27 p. 99 (D ♀).
Saitis minusculus Banks 1896, Journ. N. York Ent. Soc. 4 p. 193 (D ♂♀).
T. m. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 576 T. 42 F. 7 (D ♂♀).
T. m. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 470 T. 94 F. 1738—39 (D ♂♀).

Gen. **Thammaca** Simon 1901.

♂♀ **coriacea** Simon 1901. Amazonas

T. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 614 f. 744, 745 (N).
T. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 33 (D ♂).

♀ **nigritarsis** Simon 1902. – * Amazonas

T. n. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 32 (D ♀).

Gen. **Tulpius** Peckham 1896.

♂♀ **hilarus** Peckham 1896. Guatemala

T. h. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 87 T. 6 F. 10; T. 7 F. 10 (D ♂♀).
T. h. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 299 T. 29 F. 9 (N ♂♀).
T. h. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 632 (N).

2. Gr. Rheneae

Gen. **Agassa** Simon 1901.

♂♀ **cyanea** (Hentz) 1846. U. St. Amerika

? Attus cerulea Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 448 (D ♀).
? Attus quaternus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 452 (D ♂♀, part.).
Attus c. Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 365 T. 22 F. 13 (D ♀).
Maevia chrysea C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 83 TF. 1337 (D ♀).
Homalattus septentrionalis Keyserling 1885, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. T. 13 F. 19 (D ♀).
Homalattus c. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 86 T. 1 F. 64; T. 6 F. 64 (D ♂♀).
Rhene c. Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 161 T. 15 F. 3 (N ♀).
A. georgiana Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 643 f. 752 (N).
Homalattus c. Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 232 T. 11 F. 9 (D ♀).
A. c. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 590 T. 49 F. 12; T. 51 F. 9 (D ♂♀).
A. cerulea Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 189 (N ♀).
A. c. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 471 T. 92 F. 1721—22 (D ♂♀).

Gen. **Alcmena** C. L. Koch 1846.

Australische Arten:

♀ **superba** Karsch 1878. N.-Australien

A. s. Karsch 1878, Mitt. München. Ent. Ver. 2 p. 29 (D ♀).
? A. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 638 (N).
? A. s. Rainbow 1911, Rec. Austral. Mus. 9 (2) p. 293, 294 (N).

Neotropische Arten:

♀ **amabilis** C. L. Koch 1846. Mexico

A. a. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 178 TF. 1228 (D ♀).
Attus a. Walckenaer 1847, Hist. Nat. Ins. Apt. 4 p. 428 (N).
Dendryphantes a. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 315 (C).
A. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 638 (N).

♀ **psittacina** C. L. Koch 1846. – * Brasilien

A. p. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 176 TF. 1227 (D ♀).
Dendryphantes p. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 315 (C).
A. p. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 326 (D).
A. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 640 (N).

♀ **tristis** Mello-Leitao 1945. Argentinien

A. t. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 274 (D ♀).

♀ **vittata** Karsch 1880. Venezuela

A. v. Karsch 1880, Zeitschr. ges. Naturw. 53 p. 397 (D ♀).
? A. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 638 (N).

Gen. **Bianor** Peckham 1886.

Palaearktische Arten:

§ 2 ♂, 3 ♀: Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1218—1219.

♂♀ **aurocinctus** (Ohlert) 1865. Europa, Sibirien, Turkestan, Kaukasus

Attus heterophthalmus Westring 1862, Aran. Svec. p. 590 (D ♀).
Heliophanus a. Ohlert 1865, Progr. Realschule Königsberg p. 11 (D ♀).
Heliophanus a. Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 154 (D ♀).
Attus aenescens Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 628 (D ♂).
Ballus aenescens Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 405 (N).
Ballus aenescens Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 206 (D ♂♀).
Oedipus aenescens Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 482 T. 79 F. 273 (D ♂♀).
Ballus aenescens Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 80 (D ♂♀).
Oedipus a. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 323 (D).
Oedipus aenescens Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 46 (D ♂♀).
B. aenescens Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 638 (N).
Oedipus aenescens Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 445 T. 43 F. 652 (D ♂♀).
B. aenescens Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 583 (D ♂).
B. a. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 34 f. 101, 103 (D ♂♀).
B. aenescens Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1219, 1265 f. 1254, 1256 (D ♂♀).
B. a. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 36 f. . . (N).
B. a. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 33 f. 22; T. 3 F. 42—44 (D ♂♀).
B. aenescens Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 217 f. 108 F, G, H, I (D ♂♀).

♂♀ **aurocinctus tantulus** (Simon) 1868. Frankreich, Corsica, Spanien

Attus tantulus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 629 (D ♂♀).
Attus decipiens Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 630 (D ♀).
Attus tantulus Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 228 (N).

Ballus tantulus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 207 (D ♂♀).
B. aenescens t. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1219, 1265 (D ♂♀).

♀ **pullus** Bösenberg & Strand 1906. Japan

B. p. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 354 T. 14 F. 378 (D ♀).

♂ **putus** (Cambridge) 1872. Syrien

Salticus p. Cambridge 1872 Proc. Zool. Soc. Lond. p. 326 (D ♂).
B. p. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 110 (C).

Transgredierende Arten:

♂♀ **albobimaculatus** (Lucas) 1846. Mittelmeergebiet, Cap Verde-I., Franz. Sudan

Salticus a. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger. Zool. 1 Arachn. p. 170 T. 8 F. 10 (D ♀).
Plexippa a. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 326 (C).
Attus parcus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 582 (D ♂♀).
Eris a. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 198 (D ♂♀).
Attus a. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 223 (D ♂♀).
Ericulus a. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. Belg. 29 C. R. p. 88 (C).
Eris a. Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 178 T. 16 F. 12 (N ♂♀).
B. a. Simon 1906, S. B. Ak. Wiss. Wien 115 (I) p. 1173 (C).
Dendryphantes a. Strand 1909, Societ. Ent. 24 p. 4 (D ♀).
B. a. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1218, 1265 f. 1952, 1953 (D ♂♀).
B. a. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 365 (N ♀).

Aethiopische Arten:

♀ **rusticulus** Peckham 1903. Capland

B. r. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 215 T. 24 F. 12 (D ♀).

♂ **simplex** (Blackwall) 1865. Cap Verde-I.

Salticus s. Blackwall 1865, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 16 p. 82 (D ♂).
B. s. Berland 1936, Rev. France Ent. 3 (1) p. 80 f. 24, 25 (N ♂).

Orientalische Arten:

♀ **carli** Reimoser 1934. Dekan

B. c. Reimoser 1934, Rev. Suisse Zool. 41 (32) p. 506 f. 27 (D ♀).

♀ **diversipes** Simon 1901. Malakka

B. d. Simon 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. (2; 4) p. 73 (D ♀).

♀ **trepidans** Thorell 1895. Burma

B. t. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 334 (D ♀).
B. t. Simon 1901 Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 638 (N).

Australische Arten:

♂ **bellus** (Karsch) 1878. Neu-S.-Wales

Eris b. Karsch 1878, Mitt. München. Ent. Ver. 2 p. 22 (D ♂).
? B. b. Rainbow 1911, Rec. Austral. Mus. 9 (2) p. 294 (C).

♂♀ **compactus** (Urquhart) 1884. Neu-Seeland

Salticus c. Urquhart 1884, Trans. N. Zeal. Inst. 17 p. 50 T. 11 F. 18 (D ♀).
Ballus c. Urquhart 1891, Trans. N. Zeal. Inst. 24 p. 229 (N).
B. c. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 419 (D ♂).
B. c. Bryant 1935, Rec. Canterbury Mus. 4 (2) p. 68 T. 8 F. 3, 4 (D ♂).

♀ **concolor** (Keyserling) 1882. Neu-S.-Wales

Ballus c. Keyserling 1882, Aradın. Austral. 1 (2) p. 1335 T. 114 F. 1 (D ♀).
B. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 638 (N).

♂♀ **maculatus** (Keyserling) 1883. – * Neu-S.-Wales, Queensland, Samoa

Scythropa m. Keyserling 1883, Aradın. Austral. 1 (2) p. 1447 T. 122 F. 4 (D ♂♀).
Ericulus m. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. Belg. 29 C. R. p. 88 (N).
B. m. Peckham 1886, Trans. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 284 (D).
B. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (2) p. 638, 641 (N).

Neotropische Arten:

♂ **aeneus** Mello-Leitao 1945. Argentinien

B. a. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 279 f. 68 (D ♂).

♂♀ **biocellosus** Simon 1901. Brasilien

B. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 638 (N).
B. b. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 33 (D ♂♀).

♀ **fasciatus** Mello-Leitao 1922. Brasilien

B. f. Mello-Leitao 1922, Ann. Soc. Ent. France 91 p. 226 (D ♀).

♀ **fimbriatus** Mello-Leitao 1917. Brasilien

B. f. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 146 (D ♀).

♀ **fulvipes** Mello-Leitao 1943. Chile

B. f. Mello-Leitao 1943, Rev. Brasil. Biol. R. d. Jan. 3 (4) p. 409 (D ♀).

Gen. **Dryphias** Simon 1901.

♂♀ **maccuni** (Peckham) 1895. Brasilien, Amazonas, Panama

Homalattus m. Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 160 T. 15 F. 1 (D ♀).
Homalattus rusticus Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 161 T. 15 F. 2 (D ♂).
D. rusticus Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 635 f. 751 (N).
D. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 642 (N).
Homalattus roseus F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 294 T. 28 F. 10—11 (D ♂♀).
Partona rosea Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 838 (N).
Homalattus roseus Banks 1929, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 69 (3) p. 66 (C).
Beata magna Banks 1929, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 69 (3) p. 66 (C ♀).
D. m. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 400 f. 357 (N ♂♀).

Gen. **Homalattus** White 1841.

♀ **coriaceus** Simon 1902. Sierra Leone, S.-Afrika

H. c. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 34 (D ♀).

♂♀ **marshalli** Peckham 1903. Mashonaland

H. m. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 218 T. 24 F. 6 (D ♂♀).

♀ **obscurus** Peckham 1903. Capland
H. o. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 219 T. 24 F. 8 (D ♀).

♀ **punctatus** Peckham 1903. Natal
H. p. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 219 T. 24 F. 5 (D ♀).

O♀ **pustulatus** (White) 1841. – * Sierra Leone
Salticus p. White 1841, Ann. Mag. Nat. Hist. (1) 7 p. 476 (D ♀).
H. p. White 1846, Ann. Mag. Nat. Hist. (1) 18 p. 180 T. 2 F. 6 (N).
H. p. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 352 (D O).
H. p. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 281 (D).
H. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 643 (N).

♀ **similis** Peckham 1903. Mashonaland
H. s. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 219 T. 24 F. 7 (D ♀).

Gen. **Napoca** Simon 1901.

♂ **insignis** (Cambridge) 1872. Syrien
Salticus i. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 324 (D ♂).
N. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 642 f. 753, 754 (N ♂).

Gen. **Rhene** Thorell 1869.

Palaearktische Arten:

♂♀ **atrata** (Karsch) 1881. Japan
Homalattus a. Karsch 1881, Berlin. Ent. Zeitschr. 25 p. 39 (D ♂♀).
R. a. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 355 T. 9 F. 132, 145; T. 13 F. 348 (D ♂♀).
R. a. Strand 1918, Arch. Naturg. 82 (A; 11) p. 105 f. 2—4 (D ♂♀).

♂ **candida** Fox 1937. China
R. c. Fox 1937, Journ. Wash. Ac. Sci. 27 (1) p. 18 f. 13 (D ♂).

♂ **ipis** Fox 1937. China
R. i. Fox 1937, Journ. Wash. Ac. Sci. 27 (1) p. 18 f. 15 (D ♂).

Aethiopische Arten:

♂ **banksii** Peckham 1902. Capland
R. b. Peckham 1902, Psyche 9 (312) p. 335 (D ♂).
R. b. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 220 T. 24 F. 4 (D ♂).

♂ **biguttata** Peckham 1903. Capland
R. b. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 221 T. 24 F. 3 (D ♂).

♀ **capensis** Strand 1909. Capland
R. c. Strand 1909, Deutsch. S. Pol. Exped. 1901—03; 10 (5) Zool. 2 p. 592 (D ♂).

♀ **cooperi** Lessert 1925. Natal
R. c. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 32 (21) p. 347 f. 12 (D ♀).

O **foai** Simon 1902. Capland
R. f. Simon 1902, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 8 p. 514 (D O).
R. f. Simon 1908, Aran. in: Rés. Sci. Voy. Afric. Foa p. 583 (D O).

♀ **lesserti** Berland & Millot 1941. Senegal
R. l. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 368 f. 67 (D ♀).

♂♀ **machadoi** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea
R. m. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 366 f. 66 (D ♂♀).

♀ **modesta** Caporiacco 1941. Süd-Abessinien
R. m. Caporiacco 1941, Miss. Biol. Sagan-Omo 12, Zool. 6 p. 153 f. 68 (D ♀).

♂ **parvula** Caporiacco 1939. Abessinien
R. p. Caporiacco 1939, Real Accad. Ital. p. 373 f. 23 (D ♂).

♂ **sulfurea** (Simon) 1885. Senegal
Homalattus s. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 352 (D ♂).
R. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 635, 638 f. 747, 748 (N).

Orientalische Arten:

♂ **albigera** (C. L. Koch) 1848. I. Bintang
Rhanis a. C. L. Koch 1848, Die Arachniden 114 p. 87 TF. 1341 (D ♂).
Homalattus a. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 353 (C).
R. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 635, 639 f. 749 (N ♂).

♀ **brevipes** (Thorell) 1891. Sumatra
Homalattus b. Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 107 (D ♀).

♂♀ **bufo** (Doleschall) 1859. Sumatra, Amboina, Krakatau, Burma
Salticus b. Doleschall 1859, Act. Soc. Ind. Neerl. 5 p. 25 T. 4 F. 7 (D ♂).
Homalattus b. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. Belg. 29 C. R. p. 36 (N).
Homalattus b. Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 346 (D ♂).
Homalattus b. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 275 (D ♂).
R. b. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 111 (N).
R. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 639 (N).
R. b. Strand 1909, Abh. Nat. Ges. Görlitz 26 p. 112 (N ♂).
R. b. Reimoser 1925, Suppl. Ent. 10 p. 91 (N ♀).

♀ **callida** Peckham 1895. Indien
R. p. Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 162 T. 15 F. 4 (D ♀).

♀ **callosa** (Peckham) 1895. Indien
Anamosa c. Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 165 T. 15 F. 6 (D ♀).
R. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 641 (N).

♂ **flavicomans** Simon 1902. Indien, Ceylon
R. f. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 33 (D ♂).

♂ **flavigera** (C. L. Koch) 1848. – * I. Bintang
Rhanis f. C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 86 TF. 1340 (D ♂).
R. f. Thorell 1869, On Europ. Spid. p. 37 (N).
R. f. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. Belg. 43 p. 111 (N).
R. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 642 (N).

o **hirsuta** (Thorell) 1877. Celebes
Homalattus h. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 632 (D o).
R. h. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 639 (N).

♂ **leucomelas** (Thorell) 1891. Luzon
Homalattus l. Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 102 (D ♂).

o **margarops** (Thorell) 1877. Celebes
Homalattus m. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 629 (D o).
R. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 639 (N).

♂♀ **mordax** (Thorell) 1890. Java
Homalattus m. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 159 (D ♂♀).
Homalattus m. Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 268 (D ♂♀).

♀ **mus** (Simon) 1889. Indien
Homalattus m. Simon 1889, Journ. Asiat. Soc. Bengal. 58 (2; 4) Suppl. p. 335 (D ♀).

♀ **nigrita** (C. L. Koch) 1848. I. Bintang
Rhanis n. C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 88 TF. 1342 (D ♀).
R. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 841 (N).

♂♀ **rubrigera** (Thorell) 1887. Indien, Burma, Annam, Sumatra
Homallattus hirsutus Hasselt 1882, in: Veth, Midd. Sumatra, Aran. 4 (11; A) p. 53 (D ♀).
Homalattus r. Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 347 (D ♂).
Homalattus analis Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 350 (D ♀).
R. analis Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 639 (N).
R. r. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 733 (N).

saeva (Giebel) 1863. Java
Attus (Rhanis) s. Giebel 1863, Zeitschr. ges. Naturw. 21 p. 326 (D).

♀ **spuridens** Strand 1907. Java
R. s. Strand 1907, Zool. Jahrb. Syst. 24 (5) p. 451 (D ♀).

Australische Arten:

♂♀ **aurata** (L. Koch) 1879. Queensland
Homalattus a. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1087 T. 95 F. 4, 5 (D ♂♀).
R. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 641 (N).

♂ **opulenta** (L. Koch) 1879. Queensland
Homalattus o. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1083 T. 95 F. 1 (D ♂).
R. o. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 641 (N).

Neotropische Arten:

♀ **inconcinna** (Peckham) 1895. I. Trinidad
Anamosa i. Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 165 T. 15 F. 7 (D ♀).
R. i. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 698 (C).

♂♀ **jelskii** (Taczanowski) 1871. Guiana, Peru
Rhanis j. Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 34 T. 3 F. 1 (D ♂).
Rhanis j. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 279 (N ♂♀).
R. j. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 698 (C).

♂♀ **phoenicea** (Simon) 1888. Mexico
Homalattus p. Simon 1888, Ann. Soc. Ent. France (6) 8 p. 203 (D ♂♀).
Homalattoides p. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 295 (N ♂♀).
R. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 635, 638 f. 750 (N ♂).

♂♀ **sexmaculata** Mello-Leitao 1947. Süd-Brasilien
R. s. Mello-Leitao 1947, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. (Zool.) 80 p. 28 T. 2 F. 9—10; T. 5 F. 15 (D ♂♀).

♂♀ **vaga** Peckham 1895. Brasilien
R. v. Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 163 T. 15 F. 5 (D ♂♀).

Gen. **Romitia** Caporiacco 1947.

♂ **nigra** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
R. n. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 32 (D ♂).
R. n. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 716 TF. 147 (D ♂).

Gen. **Tacuna** Peckham 1900.

Aethiopische Arten:

♂ **africana** (Simon) 1904. Abessinien
Partona a. Simon 1904, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 10 (7) p. 447 (D ♂).

♀ **duboscqi** (Berland & Millot) 1941. Elfenbeinküste
Partona d. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 365 f. 65 (D ♀).

Neotropische Arten:

♂ **delecta** Peckham 1900. Brasilien
T. d. Peckham 1900, Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. 1 (4) p. 228 T. 2 F. 4 (D ♂).
Partona d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 1055 (N).

♂♀ **euchira** Simon 1901. – * Brasilien
Partona e. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 643 f. 755—757 (N ♂).
Partona e. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 34 (D ♀).

♂ **modesta** (Mello-Leitao) 1943. Rio Grande do Sul
Partona m. Mello-Leitao 1943, Arqu. Mus. Nac. R. d. Jan. 37 p. 228 TF. 55 (D ♂).

Gen. **Valloa** Peckham 1903.

(Peckham 1903 in gen. **Valloa,** in spec. **Velloa.**)

♂♀ **biancoriformis** Strand 1907. Madagascar, Portug. O.-Afrika, Abessinien
V. b. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (23) p. 746 (D ♂♀).
V. b. Strand 1908, Nyt Mag. Naturvid. 46 (2) p. 192 (D ♂♀).
V. b. Lessert 1936, Rev. Suisse Zool. 43 (9) p. 291 f. 87—90 (D ♂♀).
V. b. Caporiacco 1940, Atti Accad. Ital. 11 (18) p. 862 (N ♀).

♀ **elongata** Peckham 1903. Capland
V. e. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 218 T. 24 F. 10 (D ♀).

♂ **modesta** Peckham 1903. – * Capland
V. m. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 217 T. 24 F. 9 (D ♂).

Gen. **Zeuxippus** Thorell 1891.

♂ **atellanus** Thorell 1895. Burma
Z. a. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 331 (D ♂).

♂ **histrio** Thorell 1891. – * Indien

Z. h. Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 110 (D ♂).
Z. h. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 643 (N).

♀ **pallidus** Thorell 1895. Burma

Z. p. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 333 (D ♀).

21. Subfam. Sitticinae

1. Gr. Chalcoscirteae

Gen. **Chalcoscirtus** Bertkau 1883.

Palaearktische Arten:

O♀ **fulvus** Saito 1939. Japan

C. f. Saito 1939, Saito Ho-on Kai Mus. Res. Bull. 18 p. 37 f. 5 (2); **T.** 1 **F.** 8 (D O♀).

♂♀ **glacialis** Caporiacco 1935. Karakorum

C. g. Caporiacco 1935, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 197 T. 5 F. 1 (D ♂♀).

♂♀ **infimus** (Simon) 1868. – * Mittel- u. S.-Europa, N.-Afrika, Syrien, Azoren

Calliethera i. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 661 T. 7 F. 2 (D ♂♀).
Heliophanus atratus Thorell 1875, Tijdschr. Ent. 18 p. 107 (D ♂♀).
Heliophanus atratus Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 180 (D ♂♀).
Calliethera i. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 75 (D ♂♀).
C. i. Bertkau 1883 in: Förster & Bertkau, Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf. 40 p. 207 u. 258 (N).
C. i. Chyzer & Kulczynski 1897, Aran. Hungar. 2 (b) p. 294 (D ♂♀).
C. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 577 f. 691 (N ♂).
C. i. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 414 T. 39 F. 609 (D ♂♀).
C. i. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 34 (D ♂♀).
C. i. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1184, 1254 f. 1867, 1868 (D ♂♀).
C. a. Denis 1952, Vie et Milieu 3 (2) p. 302 f. 1—4 (N ♂♀).

♀ **infimus flavipes** Caporiacco 1935. Karakorum

C. i. f. Caporiacco 1935, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 197 (D ♀).

♀ **insularis** Denis 1937. Frankreich

C. i. Denis 1937, Ann. Soc. Hist. Nat. Toulon 21 p. 4 TF. (D ♀).

♂♀ **sublestus** (Blackwall) 1867. Madeira

Salticus s. Blackwall 1867, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 20 p. 207 (D ♂♀).
Euophrys s. Kulczynski 1899, Rozpraw. Ak. Umiej. Krakow. 2 (16) p. 455 T. 9 F. 124, 125, 133 (D ♀).
C. s. Kulczynski 1905, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 455 T. 12 F. 23, 24 (N ♂♀).

Nearktische Arten:

♂♀ **carbonarius** Emerton 1917. Canada

C. c. Emerton 1917, Canad. Ent. 49 p. 271 f. 23 (D ♂♀).

♂ **montanus** (Banks) 1896. New Hampshire

Icius (Scius) m. Banks 1896, Canad. Ent. 28 p. 62 (D ♂).
C. m. Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 231 (N ♂, D ♀).
C. m. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 587 T. 43 F. 6 (D ♂).

Gen. **Dolichoneon** Caporiacco 1935.

♀ **typicus** Caporiacco 1935. Karakorum

D. t. Caporiacco 1935, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 199 T. 5 F. 10 (D ♀).

Gen. **Jollas** Simon 1901.

♂ **geniculatus** Simon 1901. – * Venezuela

J. g. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 153 (D ♂).
J. g. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 577 f. 689, 690 (N ♂).

♂♀ **minutus** Chickering 1946. Panama

J. m. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 241 f. 201—205 (D ♂♀).

♀ **peritas** Banks 1929. Panama

J. p. Banks 1929, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 69 (3) p. 72 T. 4 F. 81 (D ♀).
J. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 246 (N ♀).

Gen. **Neon** Simon 1876.

Palaearktische Arten:

§ 3 (♂♀) : Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 209.
§ 2 ♂, 3 ♀ : Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 45.
§ 1 ♂, 2 ♀ : Roewer 1928, Tierw. Mitteleurop. 3 (6) p. 45 TF. 505—506.
§ 5 ♂, 3 ♀ : Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1181—1184.

♂ **convolutus** Denis 1937. Algier

N. c. Denis 1937, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 1055 T. 5 F. 7—9 (D ♂).

♀ **kratochvili** Miller 1943. Mähren

N. k. Miller 1943, Ent. Listy, Brno 6 p. 28 f. . . . (D ♀).

♂♀ **levis** (Simon) 1871. S.-, SO.- u. Mitteleuropa, Krim

Attus l. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 221 (D ♀).
N. l. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 211 (D ♀).
N. pictus Kulczynski 1891, in: Chyzer & Kulczynski, Aran. Hungar. 1 p. 45 T. 1 F. 3 (D ♀).
N. pictus Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 447 T. 43 F. 654 (D ♀).
N. l. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 38 f. 112, 113 (D ♂♀).
N. laevis Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1183. 1254 f. 1860—1862 (D ♂♀).
N. pictus Denis 1939, Rev. Franc. Ent. 6 p. 77 f. 6—9 (D ♂).
N. (Dicroneon) l. Lohmander 1944, Ark. Zool. 35 (A; 16) p. 7 (N ♀).
N. l. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 42 f. 25; T. 4 F. 67—70 (D ♂♀).
N. (Dicroneon) l. Lohmander 1945, Meddel. Göteborg. Mus. Zool. 111 p. 66 f. 63—68 (D ♂♀).

♂ **muticus** (Simon) 1871. Corsica

Attus m. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 220 (D ♂).
N. m. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 211 (D ♂).
N. m. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1184, 1254 f. 1866 (D ♂).

♂ **pusio** Simon 1937. SO.-Frankreich

N. p. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1183, 1254 (D ♂).

♂♀ **rayi** (Simon) 1875. S.-Europa, Krim, Euboea

Attus r. Simon 1875, Ann. Soc. Ent. France (5) 5, Bull. p. 94 (D ♂♀).

N. r. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 212 T. 11 F. 20 (D ♂♀).
N. r. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 45 (D ♂♀).
N. r. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 573 f. 696 (N ♂).
N. r. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1183, 1254 f. 1857—1859 (D ♂♀).

♂♀ **robustus** Lohmander 1945. Süd-Schweden

N. r. Lohmander 1945, Meddel. Göteborg. Mus. Zool. 111 p. 48 f. 47—56 (D ♂♀).
N. r. Tullgren 1946, Svensk Spindelfauna 3, Aran. 5.—7. Fam. p. 130 f. 38B, 39C (N ♂♀).

♂♀ **valentulus** Falconer 1912. England, Schweden

N. v. Falconer 1912, Naturalist London p. 321 TF. . . . (D ♀).
N. v. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 41 T. 4 F. 65—66 (D ♂).
N. v. Lohmander 1945, Meddel. Göteborg. Mus. Zool. 111 p. 59 f. 57, 62 (D ♂♀).
N. v. Holm 1945, Ark. Zool. 35 (B; 4) p. 2 (N ♂).
N. v. Tullgren 1946, Svensk Spindelfauna 3, Aran. 5.—7. Fam. p. 130 f. 38C (N ♀).
N. v. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 221 f. 109D, G (D ♂♀).

Transgredierende Arten:

♂♀ **reticulatus** (Blackwall) 1853. – * Europa, Sibirien, N.-Amerika

Salticus r. Blackwall 1853, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) 11 p. 14 (D ♀).
Salticus r. Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 60 T. 3 F. 33 (D ♂♀).
Attus frontalis Westring 1862, Aran. Svec. p. 587 (D ♀).
Attus frontalis Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 156 (D ♂♀).
Attus r. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 604 (D ♂♀).
N. r. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 210 (D ♂♀).
Euophrys frontalis L. Koch 1877, Abh. Nat. Ges. Nürnberg 6 p. 175 (N).
Euophrys r. Menge 1879, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 497 T. 82 F. 284 (D ♂♀).
N. r. Cambridge 1881, Proc. Dorset F. Cl. 2 p. 401 (D ♂♀).
N. r. Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 76 T. 4 F. 5 (D ♂♀).
Euophrys r. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 79 (D ♂♀).
N. r. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 282 (D).
N. r. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 45 (D ♂♀).
N. r. Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 175 (N).
N. r. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 577 f. 695 (N).
N. r. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 446 T. 43 F. 653 (D ♂♀).
N. r. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 564 (D ♂♀).
N. r. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 38 f. 114, 115 (D ♂♀).
N. r. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1184, 1254 f. 1863—1865 (D ♂♀).
N. r. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 20 f. . . (N).
N. r. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 40 T. 3 F. 60—62; T. 4 F. 63 (D ♂♀).
N. r. Lohmander 1945, Meddel. Göteborg. Mus. Zool. 111 p. 40 f. 40—46 (D ♂♀).
N. r. Holm 1945, Ark. Zool. 35 (B; 4) p. 3 f. . . (N ♂).
N. r. Tullgren 1946, Svensk. Spindelfauna 3, Aran. 5.—7. Fam. p. 130 f. 38 A, 39 A, B (N ♂♀).
N. r. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 221 f. 109 C, F (D ♂♀).

Neotropische Arten:

♂ **armatus** Caporiacco 1947. Brit. Guiana

N. a. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 34 (D ♂).
N. a. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 728 TF. 160—161 (D ♂).

♂♀ **nigriceps** Bryant 1940. Cuba
N. n. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 504 T. 22 F. 293, 297 (D ♂♀).

♂ **punctulatus** Karsch 1880. Bolivien
N. p. Karsch 1880, Zeitschr. ges. Naturw. 53 p. 397 (D ♂).

Nearktische Arten:

♂♀ **nellii** Peckham 1888. U. St. Amerika, Canada, Alaska
N. n. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 88 T. 1 F. 65; T. 4 F. 65 (D ♂♀).
N. n. Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 240 T. 20 F. 1 (D ♂♀).
Icius obliquus Banks 1895, Canad. Ent. 27 p. 98 (D ♂ o).
N. n. Peckham 1895, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (3) p. 175 T. 16 F. 8 (N ♀).
N. n. Emerton 1902, Common Spid. p. 47 f. 130, 131 (D ♂♀).
N. n. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 588 T. 50 F. 5 (D ♂♀).
N. n. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 179 f. 74—77 (D ♂♀).
N. n. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 457 T. 90 F. 1663—66 (D ♂♀).

Gen. **Neonella** Gertsch 1936.

♂♀ **vinnula** Gertsch 1936. Florida, Georgia
N. v. Gertsch 1936, Amer. Mus. Novit. 852 p. 24 TF. 28, 29 (D ♂♀).

Gen. **Semiopyla** Simon 1901.

biimpressa Simon 1901. Venezuela
S. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 575 (N).

♂ **cataphracta** Simon 1901. – * Venezuela
S. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 577 f. 692—694 (D ♂).

2. Gr. Sitticeae

Gen. **Attinella** Banks 1905.

♀ **dorsata** (Banks) 1895. Californien
Attus d. Banks 1895, Canad. Ent. 27 p. 97 (D ♀).
A. d. Banks 1905, Amer. Natural. 39 p. 322 (N).

Gen. **Attulus** Simon 1889.

§ 3 ♂, 3 ♀: Roewer 1928, Tierw. Mitteleurop. 3 (6) p. 45 TF. 502—504.
§ 3 ♂, 3 ♀: Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1196—1199.

O♀ **albifrons** (Lucas) 1846. Spanien, Algier, Tunis, Libyen
Salticus a. Lucas 1846, Explor. Sci. Algér. Zool. 1 Arachn. p. 172 T. 9 F. 9 (D ♀).
Attus a. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 618 (D O).
Attus a. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 165 (N O).
A. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 591 (N).

♂♀ **auspex** (Cambridge) 1885. Yarkand
Attus a. Cambridge 1885, Sci. Res. Sec. Yarkand Miss.; Aran. p. 104 (D ♂♀).
A. a. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 193 (C).

♂ **avocator** (Cambridge) 1885. Yarkand

Attus a. Cambridge 1885, Sci. Res. Sec. Yarkand Miss.; Aran. p. 106 (D ♂).
A. a. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 193 (C).

♂♀ **helveolus** (Simon) 1871. – * N.- u. Mitteleuropa, Tirol, Frankreich, Russland

Attus cinereus Westring 1862, Aran. Svec. p. 583 (D ♀) (praeocc. Waldkenaer 1837).
Euophrys cinereus Ausserer 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 155 (C).
Attus h. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 164 (D ♂♀).
Attus cinereus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 117 (D ♀).
Attus solaris Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 486 T. 80 F. 275 (D ♂♀).
Attus cinereus Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 77 (D ♂♀).
A. cinereus Simon 1889, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 39 p. 374 (N).
A. cinereus Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 581 (N).
Attus cinereus Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 431 T. 41 F. 633 (D ♂♀).
A. cinereus Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 29 (D ♂♀).
A. cinereus Ermolajev 1937, Festschr. Strand 3 p. 605 f. 7 (N ♀).
A. h. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1198, 1258 f. 1896—1898 (D ♂♀).
A. cinereus Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 26 f. . . (N).
A. cinereus Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 23 f. 18; T. 1 F. 20—21 (D ♂♀).

♂♀ **histrio** (Simon) 1875. S.-Frankreich, Schweiz, Italien, I. Leros

Attus h. Simon 1875, Ann. Soc. Ent. France (5) 5 Bull. p. 92 (D ♂♀).
Attus h. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 118 (D ♂♀).
A. h. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 580 (N).
A. h. Lessert 1904, Rev. Suisse Zool. 12 (2) p. 437 T. 6 F. 47, 48 (N ♂♀).
A. h. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 572 (D ♂♀).
A. h. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1198, 1258 f. 1894, 1895 (D ♂♀).

♀ **illibatus** (Simon) 1868. Ukraine

Attus i. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 541 (D ♀).
Attus i. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 161 (N).
A. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 580 (N).

♀ **inaequalipes** (Simon) 1868. Tirol

Attus i. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 614 (D ♀).
Attus inaequipes Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 119 (C).
A. i. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 105 (C).

♂♀ **niveosignatus** (Simon) 1880. N.-China

Attus n. Simon 1880, Ann. Soc. Ent. France (5) 10 p. 100 (D ♂♀).
A. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 580 (N).

♀ **pusio** (Simon) 1871. Spanien, Portugal

Attus pulex Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 613 (D ♀).
Attus p. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 161 (nom. nov.).
A. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 581 (N).

♂ **ruficarpus** (Simon) 1884. Griechenland

Attus r. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 313 (D ♂).
A. r. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 580 (N).

♂♀ **saliens** (Cambridge) 1876. **N.-Afrika**

Yllenus s. Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 620 T. 60 F. 92 (D ♂♀).
Attus s. Simon 1885, Explor. Sci. Tunis.; Arachn. p. 4 (N ♂♀).
A. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 581 (N).
A. s. Simon 1909, Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 6 (1) p. 40 (N).

♂♀ **salsicola** Simon 1937. Frankreich, Spanien, Algier, Tunis

A. s. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1196, 1258 f. 1891—1893 (D ♂♀).

♂♀ **squamifer** (Simon) 1881. Spanien, Portugal

Eris s. Simon 1881, An. Soc. Espan. Hist. Nat. 10 p. 134 (D ♂♀).
Ericulus s. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. Belg. 29 C. R. p. 88 (N).
A. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 581 (N).

♀ **tschoni** Caporiacco 1936. Libysche Wüste

A. t. Caporiacco 1936, Mem. Soc. Ent. Ital. 15 p. 104 f. 4 (D ♀).

♂ **validus** Simon 1889. Transcaspien, Turkestan

A. v. Simon 1889, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 39 p. 375 (D ♂).
A. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 581 (N).

Gen. **Camponia** Badcock 1932.

♂ **lineata** Badcock 1932. Paraguay-Chaco

C. l. Badcock 1932, Journ. Linn. Soc. Lond. 38 p. 40 f. 32 (D ♂).

Gen. **Pseudattulus** Caporiacco 1947.

♂♀ **kratochvili** Caporiacco 1947. Brit. Guiana

P. k. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 34 (D ♂♀).
P. k. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 729 TF. 162—163 (D ♂♀).

Gen. **Pseudomogrus** Simon 1937.

♂♀ **univittatus** (Simon) 1871. Frankreich, Sardinien

Attus u. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 156 (D ♀).
Yllenus u. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 139 (D ♀).
Attulus u. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 580 (N).
P. u. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1195, 1257 f. 1887—1890 (D ♂♀).

Gen. **Sitticulus** Dahl 1926.

§ 2 ♂, 2 ♀: Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 19 (sub **Attus**, part.).
§ 2 ♂, 2 ♀: Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1196—1199 (sub **Attulus**, part.).

♂♀ **penicillatus** (Simon) 1875. – * W.- u. Mitteleuropa, Ungarn, Dalmatien

Attus p. Simon 1875, Ann. Soc. Ent. France (5) 5, Bull. p. 92 (D ♂).
Attus p. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 117 T. 11 F. 1 (D ♂).
Attus p. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 26 T. 1 F. 36 (D ♂♀).
Attulus p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 580 (N).
Attus guttatus Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 428 T. 41 F. 627 (D ♂♀).
Attulus guttatus Lessert 1904, Rev. Suisse Zool. 12 (2) p. 438 (N ♂♀).

Attulus p. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 572 (D ♂♀).
S. p. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 29 f. 81—84 (D ♂♀).
Attulus p. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1198, 1258 f. 1899, 1900 (D ♂♀).
Sitticus p. Kolosvary 1938, Rassegna Faunist. 3—4 p. 17 TF. o (N ♀).

♀ **penicillatus adriaticus** (Kolosvary) 1938. Dalmatien

Sitticus p. a. Kolosvary 1938, Rassegna Faunist. 3—4 p. 16 TF. m, n (D ♀).

♂♀ **saltator** (Simon) 1868. W.- u. Mitteleuropa, Finnland, Bulgarien

Salticus floricola Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 55 T. 3 F. 30 (D ♀).
Attus s. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 611 (D ♂♀).
Salticus s. Cambridge 1878, Trans. Linn. Soc. Lond. 27 (3) p. 401 T. 54 F. 6 (N ♂).
Yllenus s. Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 422 (N).
Attus s. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 115 (D ♂♀).
Attus s. Cambridge 1881, Proc. Dorset F. Cl. 2 p. 410 (D ♂♀).
Attus s. Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 49 T. 3. F. 6 (D ♂♀).
Attus s. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 26 T. 1 F. 40 (D ♂♀).
Attus s. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 429 T. 41 F. 630 (D ♂♀).
Attulus s. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1199, 1258 f. 1901—1903 (D ♂♀).
S. s. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 25 f. . . . (N).
S. s. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 22 T. 1 F. 18—19 (D ♂♀).
Attulus s. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 233 f. 112B, 113E (D ♂♀).

Gen. Sitticus Simon 1901.

Palaearktische Arten:

§ 12 ♂, 11 ♀: Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 18—21 (sub **Attus**, part.).
§ 14 ♂, 12 ♀: Roewer 1928, Tierw. Mitteleurop. 3 (6) p. 43—45 TF. 487—501.
§ 12 ♂, 8 ♀: Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1185—1194.
§ 5 Arten: Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 20.
§ 7 ♂, 7 ♀: Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 24—25.

♂♀ **alpicola** (Kulczynski) 1887. Tirol, Ungarn, Kroatien

Attus a. Kulczynski 1887, Symb. Faun. Arachn. Tirol p. 285 T. 5 F. 1—3 (D ♂♀).
Attus a. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 22 T. 1 F. 39 (D ♂♀).
S. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 580 (N).

♂♀ **ammophilus** (Thorell) 1875. S.-Russland, Bessarabien, Moldau

Attus a. Thorell 1875, Hor. Soc. Ent. Ross. 11 p. 119 (D ♂♀).
Attus a. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 192 (D ♂♀).
S. a. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 103 (C).

♂♀ **appolinis** Bristowe 1935. N.-Griechenland

S. a. Bristowe 1935, Proc. Zool. Soc. Lond. (4) p. 784 f. 17—20 (D ♂♀).

♂♀ **atricapillus** (Simon) 1882. S.-Italien

Attus a. Simon 1882, Bull. Soc. Ent. Ital. 14 p. 39 (D ♂♀).
S. a. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1189 (N).

♀ **basalis** (Karsch) 1879. Japan

Attus b. Karsch 1879, Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf. 36 p. 90 (D ♀).

♂ **bilineatus** Saito 1939. Japan

S. b. Saito 1939, Saito Ho-on Kai Mus. Res. Bull. 18 p. 42 f. 5 (6); T. 1 F. 18 (D ♂).

♂♀ **caricis** (Westring) 1862. Europa, Kamtschatka

? **Euophrys atellana** C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 41 TF. 1302 (D ♀).
Attus c. Westring 1862, Aran. Svec. p. 576 (D ♂♀).
Dia atellana Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 312 (C).
Attus riparius Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 43 (D ♂♀).
Dia atellana Barta 1869, Arch. Landesdurchf. Böhmens 1 p. 139 (C).
Attus atellanus Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 150 (N).
Attus atellanus Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 114 (D ♂♀).
Attus c. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 77 (D ♂♀).
Attus c. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 23 (D ♂♀).
S. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 580 (N).
Attus c. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 433 T. 41 F. 636 (D ♂♀).
Attus c. Cambridge 1910, Proc. Dorset F. Cl. 31 p. 64 T. A F. 29—33 (N ♂♀).
S. c. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 571 f. 244 (D ♂♀).
Attus c. Hull 1911, Trans. N. Castle Nat. Hist. Soc. (3) 4 p. 43 T. 2 F. 16, 17 (N ♂♀).
S. c. Dahl 1912, Beitr. z. Naturdenkmalpfl. 3 p. 589 (D ♂♀).
S. c. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 29 f. 85, 86 (D ♂♀).
S. c. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1190, 1193, 1255 f. 1883 (D ♂♀).
S. c. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 22 f. . . . (N).
S. (Calositticus) c. Lohmander 1944, Ark. Zool. 35 (A; 16) p. 5 (N ♀).
S. c. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 26 f. 20B; T. 2 F. 28—29 (D ♂♀).
S. c. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 230 f. 113B (D ♂♀).

♂ **cingulatus** (Simon) 1868. Frankreich, Schweiz

Attus c. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 50 (D ♂).
Attus c. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 152 (N).
Attus c. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 111 (D ♂).
S. c. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1189, 1256 f. 1876, 1877 (D ♂).

♂ **clavator** Schenkel 1936. S.-Kansu

S. c. Schenkel 1936, Ark. Zool. 29 (A; 1) p. 247 f. 81 (D ♂).

♂ **daminii** (Chyzer) 1891. Dalmatien

Attus d. Chyzer 1891, in: Chyzer & Kulczynski, Aran. Hungar. 1 p. 21 T. 1 F. 38 (D ♂).
Attus d. Chyzer & Kulczynski 1897, Aran. Hungar. 2 (b) p. 290 T. 10 F. 56 (D ♀).
S. d. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 103 (C).

♀ **decorus** (Thorell) 1875. S.-Russland, Krim

Attus d. Thorell 1875, Hor. Soc. Ent. Ross. 11 p. 118 (D ♀).
Attus d. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 189 (D ♀).
S. d. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 103 (C).

♂♀ **distinguendus** (Simon) 1868. SO.-Europa, Russland, Galizien

Attus d. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 540 (D O♀).
Attus d. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 23 (D ♂♀).
Attus d. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 430 T. 41 F. 632 (D ♂♀).
S. d. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 104 (C).
S. d. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1256 (N).

♂♀ **diductus** (Cambridge) 1885. Karakorum

Attus d. Cambridge 1885, Sci. Res. Sec. Yarkand. Miss.; Aran. p. 32 (D ♂♀).

♂♀ **dzieduszyckii** (L. Koch) 1870. Mittel- u. O.-Europa

Attus d. L. Koch 1870, Jahrb. Gel. Ges. Krakau 41 p. 50 (D ♂♀).
Attus wagae Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 148 (D ♂♀).

Attus lestus Thorell 1875, Hor. Soc. Ent. Ross. 11 p. 117 (D ♂).
Attus lectus Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 188 (D ♂).
Attus d. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 23 T. 1 F. 35 (D ♂♀).
Attus d. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 432 T. 41 F. 635 (D ♂♀).
S. d. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1192, 1193, 1256 f. 1880, 1881, 1884 (D ♂♀).

♂♀ **exiguus** (Bösenberg) 1903. Schwaben

Attus e. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 427 T. 41 F. 625 (D ♂♀).
S. exiquus Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 104 (C. nom. err.).

♂♀ **fasciger** (Simon) 1880. N.-China

Attus f. Simon 1880, Ann. Soc. Ent. France (5) 10 p. 99 T. 3 F. 1 (D ♂♀).
S. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 580 (N).

♂o **finschii** (L. Koch) 1878. Sibirien, transgred.? Wyoming

Attus f. L. Koch 1878, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 28 p. 489 f. 4 (D ♂).
S. f. Kulczynski 1908, Mém. Ac. Sci. St. Petersbg. (8) 18 (7) p. 95 T. 3 F. 112 (D ♂).
S. f. Levi 1951, Zoologica. N. York 36 (4) p. 232 f. 38, 41, 44 (N ♂♀).

♂ **frigidus** (Simon) 1875. Franz. Hochalpen

Attus f. Simon 1875, Ann. Soc. Ent. France (5) 5 Bull. p. 93 (D ♂).
Attus f. Simon 1876, Aradın. de France 3 p. 106 (D ♂).
S. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 580 (N).
S. f. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1188, 1256 f. 1872 (D ♂).

♀ **godlewskii** (Kulczynski) 1898. Transbaikalien

Attus g. Kulczynski 1895, Dissert. Ac. Sci. Cracov. 32 p. 74 T. 2 F. 34 (D ♀).
S. g. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 580 (N).

♂ **guttatus** (Thorell) 1875. Krim, Balkanländer

Attus g. Thorell 1875, Hor. Soc. Ent. Ross. 11 p. 119 (D ♂).
Attus g. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 193 (D ♂).
S. g. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 104 C.

♂♀ **hungaricus** (Kulczynski) 1891. Ungarn

Attus h. Kulczynski 1891, in: Chyzer & Kulczynski, Aran. Hungar. 1 p. 23 T. 1 F. 37 (D ♂♀).
S. h. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 104 (C).

♂ **kulczynskii** Roewer 1951. Sibirien

Attus albolineatus Kulczynski 1895, Dissert. Ac. Sci. Cracov. 32 p. 77 T. 2 F 35 (D ♂) (praeocc. Walckenaer 1847).
S. albolineatus Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 580 (N).
S. k. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 453 (nom. nov.).

♀ **lineatus** Denis 1950. Hoch-Pyrenäen

S. l. Denis 1950, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 85 (1—2) p. 86 f. 10—12 (D ♀).

♂♀ **littoralis** (Hahn) 1831. Europa, W.-Sibirien

Salticus l. Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 70 TF. 53 (D ♂♀).
Attus pubescens Sundevall 1832, Vet. Ak. Handl. p. 206 (D ♀).
Salticus l. Hahn 1836, Monogr. d. Spinn. 8 p. 2 T. 31 F. e (D ♂).
Euophrys floricola C. L. Koch 1937, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 34 (N).
Euophrys saxicola C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 17 TF. 1284, 1285 (D ♂♀).

Euophrys floricola C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 34 (N).
Phoebe floricola C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 63 (N).
Maturna litoralis C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 65 (N).
Attus floricola Westring 1862, Aran. Svec. p. 573 (D ♂♀).
Phoebe floricola Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 312 (C).
Phoebe saxicola Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 312 (C).
Euophrys pratincola Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 160 (D ♂♀).
Attus saxicola Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 42 (D ♀).
Attus floricola Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 111 T. 11 F. 4 (D ♂♀).
Attus floricola Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 493 T. 81 F. 281 (D ♂♀).
Attus floricola Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 47 T. 3 F. 5 (D ♂♀).
Attus floricola Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 77 (D ♂♀).
Attus floricola Hansen 1885, in: Schiödte, Zool. Danica p. 161 T. 5 F. 15 (D ♂♀).
Attus floricola Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 22 (D ♂♀).
S. floricola Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 580 (N).
Attus floricola Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 426 T. 41 F. 624 (D ♂♀).
Attus saxicola Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 430 T. 41 F. 631 (D ♂♀).
S. floricola Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 569 (D ♂♀).
S. l. Dahl 1912, Beitr. z. Naturdenkmalpfl. 3 p. 589 (D ♂♀).
S. l. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 33 f. 95—98 (D ♂♀).
S. floricola Ermolajew 1928, Arch. Naturg. 92 (A; 7) p. 107 f. 8 (D ♀).
S. floricola Bogoiavlensky 1928, Bull. Stat. Biol. Bolchewo 2 p. 55 TF. 12 (N ♀).
S. floricola Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1191, 1194, 1256 f. 1878, 1879, 1885 (D ♂♀).
S. l. + **saxicola** Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 23 f. . . . (N).
S. saxicola Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 31 f. 19A; T. 2 F. 36—38 (D ♂♀).
S. l. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 30 f. 20A; T. 2 F. 33—34 (D ♂♀).
S. floricola Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 230 f. 112D, 113C (D ♂♀).

♀ **littoralis orientalis** (Strand) 1906. Japan

S. floricola o. Strand 1906, in: Bösenberg & Strand, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 343 (D ♀).

♂♀ **longipes** (Canestrini) 1873. Frankreich, Schweiz, Tirol

Attus l. Canestrini 1873, Atti Soc. Veneto Trent. 2 (1) p. 49 (4) (D ♂).
Attus l. Canestrini 1874, Atti Soc. Padova 3 (2) p. 214 (11) T. 8 F. 1 (N ♀).
Attus l. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 105 (D ♂♀).
S. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 580 (N).
S. l. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 242—243 (D ♂♀).
S. muralis Schenkel 1925, Rev. Suisse Zool. 32 (19) p. 316 (D ♀).
S. muralis Schenkel 1926, Rev. Suisse Zool. 33 (5) p. 310 (N).
S. l. Schenkel 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (14) p. 263 (N).
S. l. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1188, 1256 f. 1873—1875 (D ♂♀).

♂ **mancus** (Thorell) 1873. England, Schweden

Attus m. Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 393 (D ♂).
Salticus floricola Cambridge 1873, Trans. Linn. Soc. Lond. 28 (4) p. 528 (N).

Attus floricola Cambridge 1881, Proc. Dorset F. Cl. 2 p. 564 (D ♂♀).
S. m. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 104 (C).
Attus naucus Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1257 (N; nom. err.).
S. m. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 31 T. 2 F. 35 (D ♂).

♂ **mannii** (Doleschall) 1852. Dalmatien

Attus m. Doleschall 1852, S. B. Ak. Wiss. Wien 9 p. 646 (D ♂).
Attus m. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 52 (N).
S. m. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 104 (C).

♂ **montigenus** (Thorell) 1875. Riesengebirge, Serbien

Attus m. Thorell 1875, Tijdschr. Ent. 18 p. 108 (D ♂).
Attus m. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 184 (D ♂).
Attus m. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 434 T. 42 F. 638 (D ♂).
S. m. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 104 (C).
S. m. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 33 f. 99, 100 (D ♂).

♂♀ **numeratus** Bösenberg & Strand 1906. Japan

S. n. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 342 T. 9 F. 138; T. 13 F. 359 (D ♂♀).

♀ **pallicolor** Bösenberg & Strand 1906. Japan

S. p. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 341 T. 9 F. 152 (D ♀).

♂ **patellidens** Bösenberg & Strand 1906. Japan

S. p. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 342 T. 9 F. 135; T. 13 F. 358 (D ♂).

♂♀ **psammodes** (Thorell) 1875. Russland

Attus p. Thorell 1875, Hor. Soc. Ent. Ross. 11 p. 118 (D ♂).
Attus p. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 190 (D ♂♀).
S. p. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 104 (C).

♀ **rapax** (Thorell) 1873. Oesterreich?

Attus r. Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 382 (D ♀).
S. r. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 104 (C).

♂♀ **rivalis** Simon 1937. Frankreich

S. r. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1190, 1193, 1256 (D ♂♀).

♂♀ **rupicola** (C. L. Koch) 1837. Europa

Euophrys r. C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 34 (D).
Euophrys r. C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 19 TF. 1286 (D ♂).
Phoebe r. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 312 (C).
Attus floricola Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 39 T. 5 F. 11 (D ♂♀).
Attus r. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 147 (N).
Attus r. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 113 (D ♂♀).
Attus r. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 23 (D ♂♀).
S. r. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 580 (N).
Attus r. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 427 T. 41 F. 625 (D ♂♀).
S. r. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 570 (D ♂♀).
S. r. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 31 f. 91—93 (D ♂♀).
S. r. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1192, 1194, 1256 f. 1886 (D ♂♀).
S. r. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 28 f. 21A; T. 2 F. 30—31 (D ♂♀).
S. r. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 232 f. 112C, 113D (D ♂♀).

♀ **saevus** Dönitz & Strand 1906. Japan
S. s. Dönitz & Strand 1906, in: Bösenberg & Strand, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 395 T. 8 F. 121 (D ♀).

♀ **saganus** Dönitz & Strand 1906. Japan
S. s. Dönitz & Strand 1906, in: Bösenberg & Strand, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 394 T. 9 F. 127 (D ♀).

♂ **semivittatus** Simon 1937. Frankreich
S. s. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1193, 1257 f. 1882 (D ♂).
S. s. Denis 1953, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 88 (1—2) p. 91 f. 3—4 (N ♂).

♀ **sexsignatus** (Franganillo) 1910. Portugal
Attus s. Franganillo 1910, Broteria 9 p. 18 TF. 8 (D ♀).
Attus s. Franganillo 1925, Bol. Soc. Ent. Espan. 8 p. 32 (D ♀).

♂ **sibiricus** Roewer 1951. Sibirien
Attus viduus Kulczynski 1895, Dissert. Ac. Sci. Cracov. 32 p. 79 T. 2 F. 28, 29 (D ♂) (praeocc. Walckenaer 1847).
S. viduus Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 193 (C).
S. s. Roewer 1951. Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 453 (nom. nov.).

♂ **strandi** Kolosvary 1934. Ungarn
S. s. Kolosvary 1934, Folia Zool. Hydrobiol. 6 (1) p. 16 f. 18 (D ♂).

o **subadultus** Dönitz & Strand 1906. Japan
S. s. Dönitz & Strand 1906, in: Bösenberg & Strand, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 395 T. 9 F. 129 (D o).

♂♀ **terebratus** (Clerck) 1757. – * Europa, Sibirien, Turkestan
Araneus t. Clerck 1757, Aran. Svec. p. 120 T. 5 F. 15 (D ♀).
Aranea t. Olivier 1789, Encycl. Méthod. 4 p. 222 (D).
Attus t. Sundevall 1832, Vet. Ak. Handl. p. 215 (D ♀).
Euophrys t. C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 12 TF. 1280, 1281 (D ♂♀).
Ino t. C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 63 (N).
Attus t. Westring 1862, Aran. Svec. p. 564 (D ♂♀).
Attus t. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 545 T. 5 F. 22 (D ♂♀).
Attus t. Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 383 (N).
Attus t. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 109 (D ♂♀).
Attus t. Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 492 T. 81 F. 280 (D ♂♀).
Attus t. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 77 (D ♂♀).
Attus t. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 21 T. 1 F. 34 (D ♂♀).
S. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 580, 582 (N).
Attus t. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 429 T. 41 F. 629 (D ♂♀).
S. t. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 31 f. 89, 90 (D ♂♀).
S. t. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1187, 1255 (D ♂♀).
S. t. Palmgren 1943, Act. Zool. Faun. 36 p. 24 f. . . . (N).
S. t. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 26 f. 19B; T. 2 F. 25—27 (D ♂♀).

♀ **tullgreni** Holm 1945. Schweden
S. t. Holm 1945, Ark. Zool. 35 (B; 4) p. 3 f. . . . (D ♀).
S. t. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 29 f. 21B; T. 2 F. 32 (D ♀).

♂♀ **vilis** (Kulczynski) 1895. Armenien
Attus v. Kulczynski 1895, Term. Füzet. 18 p. 8 T. 1 F. 3, 4 (D ♂♀).
S. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 580 (N).

♀ **walckenaeri** Roewer 1951. Frankreich, Schweden

Aranea nigra Walckenaer 1802, Faun. Paris. 2 p. 127 (D ♀) (praeocc. Petagna 1787).
Attus niger Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 412 (D ♀).
Attus niger Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 168 (D ♀).
Attus niger Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 110 (D ♀).
S. niger Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 104 (C).
S. w. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 453 (nom. nov.).

♂ **zimmermannii** (Simon) 1877. England, Frankreich, Schlesien

Attus z. Simon 1877, Ann. Soc. Ent. France (5) 7, Bull. p. 74 (D ♂).
Attus z. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 23 (D ♂).
Attus z. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 433 T. 41 F. 637 (D ♂).
S. z. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1192, 1257 (D ♂).

Transgredierende Arten:

♂♀ **truncorum** (Linné) 1758. Europa, Karakorum, U. St. Amerika, (Massachusets, Connecticut)

Aranea t. Linné 1758, Syst. Nat. (10. Ed.) p. 623 (D).
Aranea pubescens Fabricius 1775, Syst. Ent. p. 438 (D).
Aranea t. Olivier 1789, Encycl. Méthod. 4 p. 221 (D).
Aranea pubescens Olivier 1789, Encycl. Méthod. 4 p. 234 (D).
Aranea pugnax Rossi 1790, Faun. Etrusc. 2 p. 135 (D).
Attus pubescens Hahn 1826, Monogr. d. Spinn. 4 p. 1 T. 13 T. D (D ♂).
Salticus pubescens Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 68 TF. 51 (D ♂♀).
Salticus sparsus Blackwall 1834, Research in Zool. p. 417 (D ♂♀).
Salticus scolopax Wider 1834, Mus. Senckenbg. 1 (3) p. 276 T. 18 F. 9 (D ♀).
Attus pubescens Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 405 (D ♂♀).
Euophrys pubescens C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 9 TF. 1278, 1279 (D ♂♀).
Euophrys pratincola C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 32 TF. 1299 (D ♂♀).
Ino pubescens C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 63 (N).
Salticus sparsus Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 49 T. 3 F. 25 (D ♂♀).
Attus pubescens Westring 1862, Aran. Svec. p. 561 (D ♂♀).
Salticus t. Cambridge 1863, Zoologist 21 p. 8598 (N).
Maturna pratincola Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 313 (C).
Euophrys pubescens Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 159 (D ♂♀).
Attus pubescens Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 543 (D ♂♀).
Attus pratincola Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 544 T. 5 F. 20 (D ♂♀).
Salticus pratincola Cambridge 1870, Trans. Linn. Soc. Lond. 27 (3) p. 403 (C).
Attus pubescens Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 381 (N).
Attus pubescens Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 107 T. 11 F. 2 (D ♂♀).
Attus pubescens Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 491 T. 81 F. 279 (D ♂♀).
Attus pubescens Cambridge 1881, Proc. Dorset F. Cl. 2 p. 408 (D ♂♀).
Attus pubescens Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 44 T. 3 F. 4 (D ♂♀).
Attus pubescens Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 77 (D ♂♀).
Attus pubescens Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 21 T. 1 F. 33 (D ♂♀).
S. pubescens Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 578 f. 699, 700 (N ♂).
Attus pubescens Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 428 T. 41 F. 628 (D ♂♀).
S. pubescens Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 567 (D ♂♀).
S. pubescens Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 30 f. 87, 88 (D ♂♀).

S. pubescens Simon 1937, Aradın. de France 6 (5) p. 1186, 1255 f. 1869—1871 (D ♂♀).
S. pubescens Bryant 1941, Psyche 48 p. 143 f. 2 (D ♂♀).
S. t. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 24 f. . . (N).
S. (Hypositticus) pubescens Lohmander 1944, Ark. Zool. 35 (A; 16) p. 5 (N ♀).
S. t. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 25 f. 19 C; T. 1 F. 22; T. 2 F. 23—24 (D ♂♀).
S. pubescens Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 460 T. 91 F. 1692—94 (D ♂♀).
S. pubescens Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 228 f. 112 A, 113 A (D ♂♀).

Aethiopische Arten:

♀ **designatus** (Peckham) 1903. Capland
Sittacus d. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 213 T. 22 F. 3 (D ♀).

♂ **uphamii** (Peckham) 1903. Capland
Sittacus u. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 214 T. 23 F. 1 (D ♂).

Orientalische Arten:

♀ **dyali** Roewer 1951. Panjab
S. niger Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 241 (D ♀) (praeocc. Reimoser 1919).
S. d. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 453 (nom. nov.).

Neotropische Arten:

♂ **brutus** Badcock 1932. Paraguay-Chaco
S. b. Badcock 1932, Journ. Linn. Soc. Zool. 38 p. 40 f. 31 (D ♂).

O **cautus** (Peckham) 1888. Mexico
Attus c. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 92 (D O).
S. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 580 (N).

♂ **mazorcanus** Chamberlin 1920. Peru
S. m. Chamberlin 1920, Brooklyn Mus. Sci. Bull. 3 (2) p. 42 T. 4 F. 9 (D ♂).

♂ o **peninsulanus** (Banks) 1898. Nieder-Californien
Attus p. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 285 T. 17 F. 16 (D ♂ o).
S. p. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 709 (C).

♀ **syropticus** Chamberlin 1925. Nieder-Californien
S. s. Chamberlin 1925, Proc. Calif. Ac. Sci. (4) 14 p. 130 f. 44 (D ♀).

Transgredierende Arten:

♂♀ **floridanus** Gertsch & Mulaik 1936. Florida, Georgia, Connecticut
S. f. Gertsch & Mulaik 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 20 TF. 21 (D ♂).
S. f. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 213 (N ♂♀).
S. f. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 459 T. 91 F. 1686—88 (D ♂♀).

Nearktische Arten:

§ 4 (♂, ♀): Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum 47, Bull. 70 p. 458.

♂♀ **absolutus** Gertsch & Mulaik 1936. Texas
S. a. Gertsch & Mulaik 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 19 TF. 19, 20 (D ♂♀).

♂♀ **callidus** Gertsch & Mulaik 1936. Texas
S. c. Gertsch & Mulaik 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 20 TF. 17, 18 (D ♂♀).

♀ **claremonti** (Peckham) 1909. Californien
Sittacus c. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 518 T. 43 F. 4; T. 44 F. 3 (D ♀).
S. c. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 709 (C).

♂♀ **cursor** Barrows 1919. Ohio
S. c. Barrows 1919, Ohio Journ. Sci. 19 p. 359 T. 15 F. 8 (D ♂♀).

♂ **hansii** Schenkel 1951. Californien
S. h. Schenkel 1951, Verh. Nat. Ges. Basel 62 p. 44 f. 44 (D ♂).

♂ **haydeni** Levi 1951. Wyoming
S. h. Levi 1951, Zoologica, N. York 36 (4) p. 232 f. 36, 45, 46 (D ♂).

♀ **magnus** Chamberlin & Ivie 1944. Georgia
S. m. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 214 TF. 213 (D ♀).

♀ **mazamae** Schenkel 1951. Oregon
S. m. Schenkel 1951, Abh. Nat. Ges. Basel 62 p. 45 f. 45 (D ♀).

♀ **morosus** (Banks) 1895. Washington-St.
Attus m. Banks 1895, Canad. Ent. 27 p. 97 (D ♀).
S. m. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 709 (C).

♂♀ **palustris** (Peckham) 1883. U. St. Amerika, Canada
Attus p. Peckham 1883, Descr. Spid.... Fam. Attid. p. 25 T. 3 F. 20 (D ♂♀).
Attus p. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 43 T. 1 F. 30; T. 3 F. 30 (D ♂♀).
Attus p. Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 247 T. 20 F. 2 (D ♂♀).
Attus sylvestris Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 247 T. 20 F. 4 (D ♂).
S. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 580 (N).
Attus p. Emerton 1902, Common Spid. p. 42 f. 119 (D ♂♀).
Sittacus p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 519 T. 43 F. 3; T. 44 F. 4 (D ♂♀).
S. p. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 207 f. 131—135 (D ♂♀).
S. p. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 458 T. 89 F. 1660—62; T. 90 F. 1667—68 (D ♂♀).

♂♀ **ranieri** (Peckham) 1909. Colorado, Washington-St., Canada
Sittacus r. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 520 T. 43 F. 5 (D ♂♀).
S. r. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 709 (C).
S. r. Levi 1951, Zoologica, N. York 36 (4) p. 232 f. 43 (N ♂).

♂♀ **striatus** Emerton 1911. New Haven, Wisconsin, Connecticut, Alaska
S. s. Emerton 1911, Trans. Connect. Ac. Sci. 16 (4) p. 407 T. 6 F. 6 (D ♂♀).
S. s. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 459 T. 91 F. 1689—91 (D ♂♀).

♀ **welchi** Gertsch & Mulaik 1936. Texas
S. w. Gertsch & Mulaik 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 21 TF. 31 (D ♀).

Gen. **Tomis** F. Cambridge 1901.

♂ **jonesi** Bryant 1948. Mexico
T. j. Bryant 1948, Psyche 55 (2) p. 71 T. 10 F. 17 (D ♂).

♂ **palpalis** F. Cambridge 1901. – * Mexico
T. p. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 296 T. 29 F. 1 (D ♂).

Gen. **Yllenus** Simon 1868.

♂o **albocinctus** (Kroneberg) 1875. Turkestan, Armenien
Attus a. Kroneberg 1875, Nachr. Ges. Moskau 19 (3) p. 49 T. 5 F. 36 (D ♂o).
Attulus a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 581 (N).
Y. a. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 193 (C).

♂♀ **arenarius** Simon 1868. – * SO.- u. Mitteleuropa, Jehol
Y. a. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 633 T. 7 F. 11 (D ♂♀).
Y. a. Simon 1876, Aradın. de France 3 p. 129 T. 9 F. 5 (D ♂♀).
Marpesia arenicola Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 472 T. 77 F. 265 (D ♂♀).
Y. a. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 320 (D).
Y. a. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 27 T. 1 F. 32 (D ♂♀).
Y. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 582 f. 701—703 (N).
Illenus a. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 437 T. 42 F. 642 (D ♂♀).
Y. a. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 26 f. 75—77 (D ♂♀).
Marpissa a. Saito 1936, Rep. 1. Sci. Exped. Manschoukuo (5) 1 (3; 11) p. 88 T. 31 (N ♂).

♂♀ **baltistanus** Caporiacco 1925. Karakorum
Y. b. Caporiacco 1925, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 207 T. 5 F. 5 (D ♂♀).

♂♀ **baltistanus shaksgamica** Caporiacco 1935. Karakorum
Y. b. s. Caporiacco 1935, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 209 (D ♂♀).

♂♀ **flavociliatus** Simon 1895. Mongolei
Y. f. Simon 1895, Bull. Ac. Sci. St. Petersbg. 5 (2) p. 343 (D ♂♀).
Y. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 531 (N).

♂♀ **hamifer** Simon 1895. Mongolei
Y. h. Simon 1895, Bull. Ac. Sci. St. Petersbg. 5 (2) p. 342 (D ♂♀).
Y. h. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 578 f. 704 (N ♂).
Y. h. Schenkel 1936, Ark. Zool. 29 (A; 1) p. 309 f. 109 (D ♀).

♂♀ **horvathii** Chyzer 1891. Ungarn
Y. h. Chyzer 1891, in: Chyzer & Kulczynski, Aran. Hungar. 1 p. 27 T. 1 F. 31 (D ♀).
Y. h. Kolosvary 1934, Acta Biolog. 3 (2) p. 18 f. 1—4 (D ♂, N ♀).

♂ **kronebergi** Roewer 1951. Turkestan
Attus elegans Kroneberg 1875, Nachr. Ges. Moskau 19 (3) p. 50 T. 5 F. 37 (D ♂) (praeocc. Hentz 1846).
Y. e. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 581 (N).
Y. k. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 453 (nom. nov.).

♂♀ **vittatus** Thorell 1875. S.-Russland, Ungarn
Y. v. Thorell 1875, Hor. Soc. Ent. Ross. 11 p. 121 (D ♂♀).
Y. v. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 198 (D ♂♀).
Y. v. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 27 (D ♀).
Attulus v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 581 (N).

22. *Subfam. Marpissinae*

1. Gr. Flacilluleae

Gen. **Afraflacilla** Berland & Millot 1941.

♂ **bamakoi** Berland & Millot 1941. – * Franz. Sudan
A. b. Berland & Millot 1941; Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 329 f. 31 (D ♂).

♀ **risbeci** Berland & Millot 1941. Senegal
A. r. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 331 f. 33 (D ♀).

♂ **similis** Berland & Millot 1941. Senegal
A. s. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 33 f. 32 (D ♂).

Gen. **Flacillula** Strand 1932.

Orientalische Arten:

♀ **albofrenata** (Simon) 1905. Java
Flacilla a. Simon 1905, Mitt. Nat. Mus. Hambg. 22 (2) p. 71 (D ♀).

♂ **lubrica** (Simon) 1901. – * Ceylon
Flacilla l. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 153 (D ♂).
Flacilla l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 558 f. 570—574 (N ♂).
F. l. Strand 1932, Folia Zool. Hydrobiol. 4 (2) p. 137 (nom. nov. gen.).

o **purpurea** (Dyal) 1935. Panjab
Flacilla p. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 238 (D o).

Australische Arten:

♀ **minuta** (Berland) 1929. Samoa
Flacilla m. Berland 1929, Insects Samoa 8 (2) p. 70 f. 69—72 (D ♀).

2. Gr. Marpisseae

Gen. **Breda** Peckham 1894.

Palaearktische Arten:

♂♀ **λ-insignita** Bösenberg & Strand 1906. Japan
B. λ. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 345 T. 9 F. 136 T. 13 F. 352 (D ♂♀).

Australische Arten:

♂♀ **jovialis** (L. Koch) 1879. Australien
Marptusa j. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1109 T. 97 F. 1, 2 (D ♂♀).
B. j. Simon 1909, Faun. S. W. Austral. 2 (12) p. 198 (N).

Neotropische Arten:

§ 3 Arten: Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 37.

♂♀ **apicalis** Simon 1901. Amazonas
B. a. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 156 (D ♂♀).
B. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 602 (N).

♂ **bistriata** (C. L. Koch) 1846. S.-Brasilien

Marpissa b. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 72 TF. 1137 (D ♂).
Dendryphantes b. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 314 (C).
B. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 602 (N).

♂ **flavostriata** Simon 1901. Brasilien

B. f. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 156 (D ♂).
B. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 602 (N).

♀ **leucoprocta** Mello-Leitao 1940. Guiana

B. l. Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. Paulista 25 p. 184 TF. 15—16 (D ♀).

♀ **lubomirskii** (Taczanowski) 1878. Peru

Marpissa l. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 319 T. 4 F. 8 (D ♀).
B. l. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 94 (N).

♂♀ **milvina** (C. L. Koch) 1846. – * Brasilien, I. Trinidad, Guiana, Panama

Marpissa m. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 65 TF. 1131 (D ♀).
Dendryphantes m. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 314 (C).
B. m. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 93 T. 8 F. 7 (D ♀).
B. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 608 (N).
B. m. Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 228 f. 140 (D ♀).
B. m. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 37 f. 16—19 (D ♂).

♀ **nigrotaeniata** Mello-Leitao 1947. Brasilien

B. n. Mello-Leitao 1947, Arqu. Mus. Paranaense 6 (6) p. 297 T. 39 F. 44; T. 40 F. 45 (D ♀).

♂♀ **notata** Chickering 1946. Panama

B. n. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 39 f. 20—22 (D ♂♀).

♂♀ **punctata** (Peckham) 1894. Centr.-Amerika, Panama

Balmaceda p. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 102 T. 8 F. 8 (D ♂♀).
Balmaceda p. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 297 T. 29 F. 2—3 (D ♂♀).
Balmaceda p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 848 (C).
Balmaceda p. Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 79 (C).
Fuentes p. Banks 1929, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 69 (3) p. 63 (N ♀).
B. p. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 44 (N).

♀ **quinquedentata** Badcock 1932. Paraguay-Chaco

B. q. Badcock 1932, Journ. Linn. Soc. London (Zool.) 38 (257) p. 42 f. 33 (D ♀).

♂ **recta** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires

B. r. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.) Zool. 3 (24) p. 376 f. 70 (D ♂).

♀ **tristis** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires

B. t. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.) Zool. 3 (24) p. 377 f. 71 (D ♀).

♂ **variolosa** Simon 1901. Brasilien

B. v. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 157 (D ♂).
B. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 602 (N).

Gen. **Bredana** Gertsch 1936.

♀ **alternata** Gertsch 1936. Texas
B. a. Gertsch 1936, Amer. Mus. Novit. 852 p. 21 TF. 30 (D ♀).

♂♀ **complicata** Gertsch 1936. – * Texas
B. c. Gertsch 1936, Amer. Mus. Novit. 852 p. 21 TF. 33—35 (D ♂♀).

Gen. **Bredops** Mello-Leitao 1944.

♂ **extraordinarius** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires
B. e. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.) Zool. 3 (24) p. 378 f. 72 (D ♂).

Gen. **Cerionesta** Simon 1901.

♂ **aurantia** Mello-Leitao 1940. Brasilien
C. a. Mello-Leitao 1940, Ann. Ac. Brasil. Sci. 12 (1) p. 32 (D ♂).

♂♀ **cribrata** Simon 1901. Paraguay
C. c. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 158 (D ♂♀).
C. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 601 (N).

♂ **leucomystax** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
C. l. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 34 (D ♂).
C. l. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 730 TF. 164 (D ♂).

♂ **leucoprocta** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires
C. l. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.) Zool. 3 (24) p. 380 f. 74 (D ♂).

♂♀ **luteola** (Peckham) 1893. – * St. Vincent
Cydonia l. Peckham 1893, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 700 T. 62 F. 8 (D ♂♀).
C. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 607 (N).

Gen. **Clynotis** Simon 1901.

♂♀ **albobarbatus** (L. Koch) 1879. Neu-S.-Wales
Icius a. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1138 T. 99 F. 2, 3 (D ♂♀).
C. a. Rainbow 1911, Rec. Austral. Mus. 9 (2) p. 293 (C).

♀ **albopictus** Simon 1909. W.-Australien
C. a. Simon 1909, Faun. S. W. Austral. 2 (12) p. 201 (D ♀).

♂♀ **barresis** Hogg 1909. Neu-Seeland
C. b. Hogg 1909, Spiders in: Subantarct. Isl. N. Zeal. p. 176 T. 8 F. 6 (D ♂♀).

♀ **gratiosus** Rainbow 1920. Lord Howe-I.
C. g. Rainbow 1920, Rec. S. Austral. Mus. 1 p. 266 T. 31 F. 110—113 (D ♀).

♀ **parvulus** (Keyserling) 1883. Neu-S.-Wales
Icius p. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1449 T. 122 F. 5 (D ♀).
C. p. Rainbow 1911, Rec. Austral. Mus. 9 (2) p. 293 (C).

♀ **saxatilis** (Urquhart) 1885. Neu-Seeland
Attus s. Urquhart 1885, Trans. N. Zeal. Inst. 18 p. 204 T. 8 F. 10 (D ♀).
C. s. Bryant 1935, Rec. Canterbury Mus. 4 (2) p. 88 T. 12 F. 26 (D ♀).

♂ **semiater** (L. Koch) 1879. Queensland
Icius s. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1133 T. 98 F. 6 (D ♂).
C. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 611 (N).

♂ **semiferrugineus** (L. Koch) 1879. Queensland
Icius s. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1135 T. 99 F. 1 (D ♂).
C. s. Rainbow 1911, Rec. Austral. Mus. 9 (2) p. 293 (C).

♀ **severus** (L. Koch) 1879. Australien
Icius s. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1128 T. 98 F. 3 (D ♀).
C. s. Rainbow 1911, Rec. Austral. Mus. 9 (2) p. 293 (C).

♂♀ **viduus** (L. Koch) 1879. – * Neu-S.-Wales, Queensland
Icius v. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1129 T. 98 F. 4, 5 (D ♂♀).
C. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 600, 612 (N).
C. v. Simon 1909, Faun. S. W. Austral. 2 (12) p. 201 (N).

Gen. **Clynotoides** Mello-Leitao 1944.

♀ **dorae** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires
C. d. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.) Zool. 3 (24) p. 381 f. 75 (D ♀).

Gen. **Corambis** Simon 1901.

♂♀ **insignipes** (Simon) 1880. Neu-Caledonien, Loyalty-I.
Hyctia i. Simon 1880, Ann. Soc. Ent. Belg. 23 C. R. p. 165 (D ♀).
C. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 609 f. 728 (N).
C. i. Berland 1924, Nov. Caledon. Zool. 3 (2) p. 247 f. 200—203 (D ♂, N ♀).

Gen. **Deloripa** Simon 1901.

♂♀ **canescens** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires
D. c. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.) Zool. 3 (24) p. 383 f. 78 (D ♂♀).

♀ **quadrifasciata** Mello-Leitao 1944. Buenos Aires
D. q. Mello-Leitao 1944, Rev. Mus. La Plata (N. S.) Zool. 3 (24) p. 280 f. 71 (D ♀).

♀ **semialba** Simon 1901. – * Brasilien
D. s. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 157 (D ♀).
D. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 607 (N).

Gen. **Dexippus** Thorell 1891.

♂ **kleinii** Thorell 1891. Sumatra
D. k. Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 112 (D ♂).
D. k. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 612 (N).

Gen. **Festucula** Simon 1901.

♂♀ **australis** Lawrence 1927. SW.-Afrika, Angola
F. a. Lawrence 1927, Ann. S. Afr. Mus. 25 (1) p. 59 T. 2 F. 44 (D ♀).
F. a. Lessert 1933, Rev. Suisse Zool. 40 (4) p. 149 f. 67—69, 71 (D ♂♀).

♂ **festuculaeformis** (Lessert) 1925. O.-Afrika, Congo, Angola
Pseudicius f. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 465 f. 50—54 (D ♂).
F. f. Lessert 1933, Rev. Suisse Zool. 40 (4) p. 149 (N).

♂♀ **lawrencei** Lessert 1935. Angola
F. l. Lessert 1935, Rev. Suisse Zool. 40 (4) p. 152 f. 72 (D ♂♀).

♂♀ **lineata** Simon 1901. Senegal
F. l. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 155 (D ♀).
F. l. Fage 1923, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 29 p. 299 f. 1 (D ♂).

♀ **monticola** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea
F. m. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 345 f. 48 (D ♀).

♀ **vermiformis** Simon 1901. – * Aegypt. Sudan, W.-Afrika
F. v. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 155 (D ♀).
F. v. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 607 f. 718 (N).
F. v. Lessert 1933, Rev. Suisse Zool. 40 (4) p. 149 f. 70 (N ♀).

Gen. **Helvetia** Peckham 1894.

♀ **albovittata** Simon 1901. Paraguay
H. a. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 157 (D ♀).
H. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 601 (N).

♀ **santarema** Peckham 1894. – * Amazonas
H. s. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 119 T. 12 F. 2 (D ♀).
H. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 607 (N).

♀ **zebrina** Simon 1901. Mato Grosso
H. z. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 158 (D ♀).
H. z. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 601 (N).

♀ **zonata** (Simon) 1897. Brasilien
Selabis z. Simon 1897, Boll. Mus. Zool. Torino 12 (270) p. 2 (N).
H. z. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 158 (D ♀).
H. z. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 601 (N).

Gen. **Holoplatys** Simon 1885.

Transgredierende Arten:

♂♀ **planissima** (L. Koch) 1879. – * Malakka, Australien, Neu-Caledonien, Neu-Seeland
Marptusa p. L. Koch 1879, Aradın. Austral. 1 (2) p. 1100 T. 96 F. 4, 5 (D ♂♀).
H. p. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. Belg. 29 C. R. p. 89 (N).
H. p. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 124 T. 12 F. 6 (N ♀).
H. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 602, 608 f. 719—721 (N).
H. p. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 417 f. 67, 68 (N ♂♀).

o **planissima occidentalis** Thorell 1890. Nias
H. p. o. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 74 (D o).

Australische Arten:

o **bicolor** Simon 1901. Queensland
H. b. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 159 (D o).
H. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 602 (N).

♂♀ **caledonica** Berland 1932. Neu-Caledonien
H. c. Berland 1932, Rec. Austral. Mus. 18 (6) p. 297 f. 4—6 (D ♂♀).

♀ **fractivittata** Simon 1909. W.-Australien
H. f. Simon 1909, Faun. S. W. Austral. 2 (12) p. 199 f. 13 (D ♀).

♀ **quinquecingulata** Simon 1909. W.-Australien
H. q. Simon 1909, Faun. S. W. Austral. 2 (12) p. 199 f. 12 (D ♀).

♂♀ **senilis** Dalmas 1917. Neu-Seeland
H. s. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 416 f. 66, 69 (D ♂♀).

♀ **urvillei** Dalmas 1917. Neu-Seeland
H. u. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 417 f. 70, 71 (D ♀).

Gen. **Hyctia** Simon 1876.

Palaearktische Arten:

♀ **congenera** (Cambridge) 1872. Palästina
Salticus c. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 332 (D ♀).
H. c. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 107 (C).

♂♀ **gridellii** Caporiacco 1934. Venetien
H. g. Caporiacco 1934, Ann. Mus. Civ. Trieste 12 p. 119 f. 1 (D ♂♀).

♂♀ **nivoyi** (Lucas) 1846. – * Europa, N.-Afrika, Krim
Salticus n. Lucas 1846, Explor Sci. Algér. Zool. 1 Aradın. p. 183 T. 10 F. 5 (D ♀).
Dendryphantes nevoys Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 315 (C).
Marpissus n. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 132 (D ♂♀).
Marpessa n. Thorell 1875, Hor. Soc. Ent. Ross. 11 p. 115 (N).
H. n. Simon 1876, Aradın. de France 3 p. 20 (D ♂♀).
H. n. Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 15 T. 1 F. 2 (D ♂♀).
H. n. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 289 (D).
H. n. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 15 (D ♂♀).
H. n. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 116 T. 11 F. 8 (N ♀).
H. n. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 609 (N).
H. n. Berland 1927, Arch. Zool. Expér. Gén. 66 (Not. & Rev. 2) p. 15 f. 7, 11 (N ♂♀).
H. n. Simon 1937, Aradın. de France 6 (5) p. 1212, 1262 f. 1937, 1938 (D ♂♀).
H. n. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 218 f. 108 A, B (D ♂♀).

♂ **staintonii** (Cambridge) 1872. Palästina
Salticus s. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 331 T. 14 F. 20 (D ♂).
H. s. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 107 (C).

Orientalische Arten:

♀ **formicis** Dyal 1935. Panjab
H. f. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 239 T. 17 F. 178 (D ♀).

Nearktische Arten:

♂♀ **bina** (Hentz) 1846. U. St. Amerika
Attus b. Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 352 T. 21 F. 2 (D ♀).
Menemerus b. Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 239 T. 19 F. 4 (D ♀).
Icius formosus Banks 1892, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 76 T. 5 F. 31 (D ♂).
Pseudicius b. Peckham 1894 Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 110 (N).
H. b. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 489 T. 39 F. 8 (D ♂♀).

H. b. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 163 f. 44—49 (D ♂♀).
H. b. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 456 T. 88 F. 1644—45; T. 89 F. 1658 (D ♂♀).

♂♀ **bryantae** Jones 1945. Texas

H. b. Jones 1945, Field and Labor, Dallas 13 (1) p. 39 f. 1 (D ♂♀).

♂ **grata** Gertsch 1936. Minnesota

H. g. Gertsch 1936, Amer. Mus. Novit. 852 p. 25 TF. 38, 39 (D ♂).

♂♀ **pikei** Peckham 1888. Neu-Mexico, Georgia, Wisconsin, Connecticut

H. p. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 79 T. 1 F. 59; T. 4 F. 59; T. 5, F. 59 (D ♂♀).
H p. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 117 T. 11 F. 7 (N ♀).
H. p. Emerton 1902, Common Spid. p. 62 f. 158 (D ♂♀).
H. p. Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 228 T. 11 F. 7 (D ♂♀).
H. p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 488 T. 39 F. 7; T. 40 F. 8 (D ♂♀).
H. p. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 455 T. 88 F. 1640—43; T. 89 F. 1057 (D ♂♀).

♀ **robusta** Banks 1905. Californien, Arizona

H. r. Banks 1905, Proc. Ent. Soc. Wash. 7 p. 99 T. 2 F. 5 (D ♀).
H. r. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 489 T. 39 F. 6 (D ♀).

Gen. **Hyctiota** Strand 1911.

o **banda** Strand 1911. Banda-I.

H. b. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 181 T. 6 F. 89 (D o).

Gen. **Marpissa** C. L. Koch 1846.

Palaearktische Arten:

§ 3 ♂, 3 ♀: Simon 1876, Aradın. de France 3 p. 24.
§ 3 ♂, 3 ♀: Roewer 1928, Tierw. Mitteleurop. 3 (6) p. 47 TF. 527—530.
§ 3 ♂, 3 ♀: Simon 1937, Aradın. de France 6 (5) p. 1207—1208.

♂♀ **dybowskii** (Kulczynski) 1895. Sibirien

Marptusa d. Kulczynski 1895, Dissert. Ac. Sci. Cracov. 32 p. 63 T. 2 F. 36, 41, 42 (D ♂♀).
M. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 603 (N).

o **longiuscula** (Simon) 1871. Ukraine, Italien

Marpissus l. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 131 (D o).
Marpissus l. Canestrini 1874, Atti Soc. Padova 3 (2) p. 213 T. 8 F. 5 (N o).

♂♀ **millerii** (Peckham) 1894. Japan

Marptusa m. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 91 T. 8 F. 6 (D ♂♀).
M. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 603 (N).

♂♀ **muscosa** (Clerck) 1757. – * Europa, Japan

Araneus m. Clerck 1757, Aran. Suec. p. 116 T. 5 F. 12 (D ♀).
Aranea rumpfii Scopoli 1763, Ent. Carniol. p. 401 (D).
Aranea m. Olivier 1789, Encycl. Méthod. 4 p. 222 (D).
Aranea tardigrada Walckenaer 1802, Faun. Paris 2 p. 244 (D ♂♀).

Attus tardigradus Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 25 (N).
Salticus rumpfii Latreille 1806, Gen. Crust. Ins. 1 p. 124 (D).
Salticus rumpfii Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 56 TF. 42 (D ♂♀).
Attus striatus Sundevall 1832, Vet. Ak. Handl. p. 204 (D ♂♀).
Dendryphantes m. C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 31 (N).
Attus tardigradus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 461 (D ♂♀).
M. m. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 63 TF. 1129, 1130 (D ♂♀).
Attus m. Westring 1851, Göteborg Vet. Handl. 2 p. 55 (N).
Salticus tardigradus Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 63 T. 3 F. 35 (D ♂♀).
Attus m. Westring 1862, Aran. Svec. p. 549 (D ♂♀).
M. m. Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 155 (D ♂♀).
Marpissus m. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 17 T. 5 F. 2, 3 (D ♂♀).
Dendryphantes tardigradus Sordelli 1868, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 11 p. 775 (N).
M. tardigrada Ninni 1869, Catal. d. Aran. Trevigiani p. 8 (N).
Marpessa m. Thorell 1869, On Europ. Spid. p. 213 (N).
Marpessa m. Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 367 (N).
M. m. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 25 (D ♂♀).
Marpessa m. Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 470 T. 77 F. 264 (D ♂♀).
M. m. Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 14 T. 1 F. 3 (D ♂♀).
Marpessa m. Hansen 1885, in: Schiödte, Zool. Danica p. 160 T. 5 F. 13 (D ♂♀).
Marptusa m. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 291 (D).
Marptusa m. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 15 T. 1 F. 15 (D ♂♀).
M. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 610 f. 725 (N ♂).
Marptusa m. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 444 T. 43 F. 650 (D ♂♀).
M. m. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 577 (D ♂♀).
M. rumpfii Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 40 f. 121, 122 (D ♂♀).
M. m. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1207, 1261 f. 1924, 1925 (D ♂♀).
M. rumpfii Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 32 f. . . (N).
M. rumpfii Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 45 T. 4 F. 77—79 (D ♂♀).
M. m. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 215 f. 107 B, D (D ♂♀).

♂♀ **pomatia** (Walckenaer) 1802. Europa, Sibirien, Turkestan

Aranea p. Walckenaer 1802, Faun. Paris. 2 p. 244 (D ♂♀).
Attus p. Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 25 (N).
Salticus xanthogramma Latreille 1819, Nouv. Dict. Hist. Nat. (2. Ed.) 30 p. 103 (D ♂).
Attus p. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 461 (D ♂♀).
Salticus promptus Blackwall 1854, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) 13 p. 173 (D o).
Salticus blackwalli Clarck 1855, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) 16 p. 329 (D ♀).
Salticus promptus Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 59 T. 3 F. 32 (D o).
Salticus blackwallii Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 62 T. 3 F. 34 (D ♀).
Marpissus p. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 19 T. 5 F. 1 (D ♂).
Marpissus monachus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 23 (D ♀).
Marpissus blackwalli Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 24 (C).
Marpissus p. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 128 (N).
Marpissus monachus Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 130 (N).
Attus promptus Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 213 (N).
Marpessa p. Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 368 (N).
Euophrys prompta Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 423 (N).
Marpessa blackwallii Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 423 (N).
M. p. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 26 (D ♂♀).
M. p. Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 17 T. 4 F. 7 (D ♂♀).

Marptusa p. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 16 (D ♂♀).
M. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 595 f. 723, 724 (N ♂).
M. p. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 578 f. 245, 246 (D ♂♀).
M. p. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1208, 1261 f. 1926, 1927 (D ♂♀).
M. p. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 216 f. 103, 107 A, E (D ♂♀).

♂♀ **radiata** (Grube) 1859. Europa, Sibirien, Kamtschatka

Attus r. Grube 1859, Arch. Naturk. Livland (2) 1 p. 471 (D ♀).
Attus strigipes Westring 1862, Aran. Svec. p. 551 (D ♀).
Euophrys r. Ohlert 1865, Progr. Realschule Königsberg p. 10 (D ♂♀).
Euophrys r. Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 162 (D ♂♀).
Marpissus hamatus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 20 (D ♂♀).
Marpissus strigipes Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 24 (C).
Marpessa r. Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 387 (N).
M. r. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 28 (D ♂♀).
M. r. Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 18 T. 1 F. 4 (D ♂♀).
Marpessa r. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 80 (D ♂♀).
Marpessa r. Hansen 1885, in: Schiödte, Zool. Danica p. 160 (D ♂♀).
Marptusa r. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 16 (D ♂♀).
Marptusa r. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 443 T. 42 F. 649 (D ♂♀).
M. r. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 40 f. 123 (D ♂♀).
M. r. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1208, 1261 f. 1928 (D ♂♀).
M. r. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 32 f. . . (N).
M. r. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 46 T. 5 F. 80—83 (D ♂♀).

♀ **römeri** Strand 1906. Japan

M. r. Strand 1906, in: Bösenberg & Strand, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 346 (D ♀).

♂♀ **vittata** (Karsch) 1879. Japan

Marptusa v. Karsch 1879, Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf. 36 p. 87 (D).
M. v. Strand 1918, Arch. Naturg. 82 (A; 11) p. 102 (D ♂♀).
M. v. Bösenberg & Strand 1930, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 346 T. 8 F. 118; T. 14 F. 368 (D ♂♀).

Australische Arten:

♂♀ **armifera** Urquhart 1891. Neu-Seeland

M. a. Urquhart 1891, Trans. N. Zeal. Inst. 24 p. 248 (D ♂♀).
M. a. Bryant 1935, Rec. Canterbury Mus. 4 (2) p. 69 T. 9 F. 14 (D ♀).

Neotropische Arten:

♂♀ **agricola** (Peckham) 1894. Amazonas

Marptusa a. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 89 T. 8 F. 4 (D ♂♀).
M. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 603 (N).

♂♀ **broadwayi** (Peckham) 1894. I. Trinidad

Marptusa b. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 89 T. 8 F. 5 (D ♂♀).
M. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 603 (N).

♀ **civilis** Holmberg 1876. Argentinien

M. c. Holmberg 1876, An. Agr. Rep. Argentin. 4 p. 147 (24) (D ♀).

♀ **hieroglyphica** Taczanowski 1878. Peru

M. h. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 321 (D ♀).

O♀ **magna** (Peckham) 1894. Amazonas, Costa Rica, Guatemala, Panama, Mexico

Marptusa m. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 87 T. 8 F. 3 (D ♀).
M. m. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 250 T. 22 F. 3, 4 (D O♀).
M. m. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 224 (N).
Menemerus delus Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah 27 (5), Biol. 3 (5) p. 30 T. 8 F. 63 (D ♀).
M. m. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 44 f. 23—26 (D ♂♀).

♀ **mystacina** Taczanowski 1878. Peru

M. m. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 322 (D ♀).

♀ **raimondii** Taczanowski 1878. Peru

M. r. Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 317 (D ♀).

♂ **rubriceps** Mello-Leitao 1922. Brasilien

M. r. Mello-Leitao 1922, Ann. Soc. Ent. France 91 p. 225 f. 23 (D ♂).

Transgredierende Arten:

♂♀ **californica** (Peckham) 1888. Costa Rica, Guatemala, Mexico, U. St. Amerika

Marptusa c. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 81 T. 1 F. 61; T. 5 F. 61; T. 6 F. 61 (D ♂♀).
M. minor F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 250 T. 22 F. 5, 6 (D ♂♀).
M. melanura F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 251 T. 22 F. 7 (D ♀).
M. c. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 482 T. 39 F. 2; T. 40 F. 2 (D ♂♀).

♂♀ **undata** (De Geer) 1778. U. St. Amerika, Canada, Mexico, Guatemala, Alabama

Aranea u. De Geer 1778, Mém. p. s. Hist. Nat. Ins. 7 p. 320 T. 39 F. 8 (D).
Attus cunctator Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 433 (D ♀).
Attus milberti Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 433 (D ♀).
Attus u. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 463 (D ♀).
Attus lentus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 466 (D ♀).
Salticus sundevalli Blackwall 1846, Ann. Mag. Nat. Hist. (1) 17 p. 37 (D ♂♀).
Attus familiaris Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 354 T. 21 F. 7 (D ♀).
Attus rupicola Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 357 T. 21 F. 14 (D ♀).
M. u. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 60 TF. 1127 (D ♀).
M. conspersa C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 61 TF. 1128 (D ♂).
M. varia C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 69 TF. 1134 (D ♀).
Dendryphantes u. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 314 (C).
Dendryphantes conspersa Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 314 (C).
Dendryphantes varia Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 315 (C).
Marptusa familiaris Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 80 T. 1 F. 60 T. 4 F. 60; T. 5 F. 60 (D ♂♀).
Marptusa familiaris Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 237 T. 19 F. 3 (D ♂♀).

Marptusa rupicola Banks 1892, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 79 T. 4 F. 49 (D ♀).
M. familiaris F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 250 T. 22 F. 1, 2 (N ♂♀).
M. u. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 595, 603 f. 722 (N).
Marptusa familiaris Emerton 1902, Common Spid. p. 61 f. 157 (D ♀).
M. u. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 481 T. 39 F. 1; T. 40 F. 1 (D ♂♀).
M. u. Comstock 1912, Spider Book p. 678 f. 749 (N).
M. u. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 167 f. 53—56 (D ♂♀).
M. rupicola Bryant 1945, Psyche 52 (3—4) p. 189 T. 15 F. 2 (D ♀).
M. u. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 454 T. 88 F. 1636—39; T. 89 F. 1655—56 (D ♂♀).

Gen. **Menemerus** Simon 1868.

Kosmopolitische Arten:

♂♀ **bivittatus** (Dufour) 1831.

Salticus b. Dufour 1831, Ann. Sci. Nat. 22 p. 369 T. 11 F. 5 (D ♀).
Attus cinctus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 430 (D ♀).
Attus melanognathus Lucas 1838, Hist. Nat. Canar.; Aradın. p. 29 T. 7 F. 4 (D ♀).
Marpissa balteata C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 68 TF. 1133 (D ♂).
Marpissa dissimilis C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 70 TF. 1135, 1136 (D ♂♀).
Marpissa incerta C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 73 TF. 1138 (D ♀).
Marpissa discoloria C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 74 TF. 1139 (D ♂).
Salticus convergens Doleschall 1859, Act. Soc. Ind. Neerl. 5 p. 15 T. 9 F. 4 (D ♀).
Attus muscivorus Vinson 1863, Aradın. Iles Réun. Mauric. Madagasc. p. 47, 300 T. 10 F. 1 (D ♀).
Dendryphantes balteata Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 314 (C).
Dendryphantes discoloria Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 314 (C).
Dendryphantes dissimilis Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 314 (C).
Dendryphantes incerta Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 314 (C).
Attus foliatus L. Koch 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 226 (D ♀).
Salticus nigrolimbatus Cambridge 1869, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 542 T. 42 F. 10 (D ♀).
Attus planus Taczanowski 1871, Hor. Soc. Ent. Ross. 8 p. 80 (D ♂♀).
Salticus nigrolimbatus Cambridge 1873, Trans. Linn. Soc. Lond. 28 (3) p. 527 (D ♂).
Marpessa nigrolimbata Cambridge 1875, Trans. Linn. Soc. Lond. 30 (2) p. 333 (C).
Marpissa nigrolimbata Simon 1876, Aradın. de France 3 p. 29 (D ♀).
M. vittatus Simon 1877, Ann. Soc. Ent. France (5) 7 p. 59 (D ♂).
Icius convergens Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 232 (D ♂♀).
Marpissa plana Taczanowski 1878, Bull. Soc. Nat. Moscou 53 (2) p. 324 (N ♂♀).
Marptusa marita Karsch 1879, Zeitschr. ges. Naturw. 52 p. 358 (D ♂♀).
M. foliatus L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1123 T. 98 F. 1, 2 (D ♂♀).
Icius dissimilis Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 461 (N).
Attus mannii Peckham 1883, Descr. Spid. . . . Fam. Attid. p. 27 T. 3 F. 21 (D ♂).
Icius maritus Karsch 1884, S. B. Nat. Ges. Marburg (2) p. 64 f. 4 (N).
M. b. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 292 (D).
Tapinattus melanognathus Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 362 (N ♀).

M. melanognathus Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 82 T. 1 F. 62; T. 6 F. 62 (D ♂♀).
M. melanognathus Marx 1889, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 99 T. 4 F. 3 (D ♂).
Tapinattus melanognathus Thorell 1892, Ann. Mus. Civ. Genova 31 p. 307 (N ♂).
Marptusa melanognatha Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 285 (N).
Marpissa melanognatha F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 250 T. 21 F. 18, 19 (N ♂♀).
M. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 603 (N).
Marpissa melanognatha Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 483 T. 39 F. 3; T. 40 F. 3 (D ♂♀).
M. b. Strand 1909, Societ. Ent. 23 p. 188 (N).
M. b. Kulczynski 1910, Denkschr. Ak. Wiss. Wien 85 p. 403 (N ♀).
M. b. Petrunkevitch 1923, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 241 f. 152, 153 (D ♂).
M. b. Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 31 p. 184 f. 165—168 (D ♂♀).
M. b. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1210, 1262 f. 1932, 1933 (D ♂♀).
M. b. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 346 f. 49, 50 A—C (N ♂♀).
M. b. Crane 1950, Zool. Sci. Contrib. N. York Zool. Soc. 35 (1) p. 255 (D ♂♀).

Palaearktische Arten:

§ 6 ♂, 6 ♀: Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 31—32.
§ 4 ♂, 4 ♀: Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1208—1210.

♂ **cinctus** Cambridge 1885. Yarkand

M. c. Cambridge 1885, Sci. Res. Sec. Yarkand. Miss.; Aran. p. 99 (D ♂).

♂♀ **confusus** Bösenberg & Strand 1906. Japan

M. c. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 350 T. 9 F. 146; T. 14 F. 370 (D ♂♀).
M. c. Strand 1918, Arch. Naturg. 82 (A; 11) p. 86 T. 1 F. 23 (D ♀).

♀ **delectus** Cambridge 1885. Yarkand

M. d. Cambridge 1885, Sci. Res. Sec. Yarkand Miss.; Aran. p. 101 (D ♀).

♂♀ **falsificus** Simon 1868. S.-Europa

M. f. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 664 T. 7 F. 5 (D ♂♀).
M. f. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 337 (N).
Marpessa f. Pavesi 1873, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 193 (N).
M. f. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 34 T. 11 F. 9 (D ♂♀).
M. f. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 580 (D ♀).
M. f. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1210, 1262 (D ♂♀).

♀ **flavescens** (Cambridge) 1872. Syrien

Salticus f. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 343 (D ♀).
M. f. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 34 (C).

♀ **gesneri** (Audouin) 1827. Aegypten

Attus g. Audouin 1827, Explic. Planch. Arachn. Savigny Descr. Egypt. p. 406 T. 7 F. 12 (D ♀).
M. g. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 108 (C).

♂♀ **heydenii** Simon 1868. Marokko, Spanien

M. h. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 665 (D ♂♀).

♂♀ **himeshimensis** Dönitz & Strand 1906. Japan

M. h. Dönitz & Strand 1906, in: Bösenberg & Strand, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 395 T. 8 F. 116; T. 14 F. 309 (D ♂♀).

♀ **hunterii** (Audouin) 1827. Aegypten

Attus h. Audouin 1827, Explic. Planch. Arachn. Savigny Descr. Egypt. p. 408 T. 7 F. 19 (D ♀).
M. h. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 108 (C).

♀ **incertus** Cambridge 1885. Yarkand

M. i. Cambridge 1885, Sci. Res. Sec. Yarkand Miss.; Aran. p. 100 (D ♀).

♂ **indistinctus** (Cambridge) 1872. Palästina, Turkestan

Salticus i. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 342 (D ♂).
M. i. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 34 (N).

♀ **interemptor** Cambridge 1876. Aegypten

M. i. Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 623 (D ♀).

♂♀ **marginatus** (Kroneberg) 1875. Turkestan

Marpessa m. Kroneberg 1875, Nachr. Ges. Moskau 19 (3) p. 47 T. 5 F. 34 (D ♂♀).
M. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 604 (N).

♂♀ **parietinus** Spassky 1934. Transkaukasien

M. p. Spassky 1934, Rev. franç. Ent. Paris 1 (2) p. 135 f. 1—3 (D ♂♀).

♂♀ **pullus** (Karsch) 1879. Japan

Marptusa p. Karsch 1879, Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf. 36 p. 87 (D ♂).
M. p. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 348 T. 9 F. 150; T. 13 F. 349 (D ♂♀).
M. p. Strand 1918, Arch. Naturg. 82 (A; 11) p. 88, 103 f. 1; T. 2 F. 3, 4 (D ♀).

♂♀ **semilimbatus** (Hahn) 1829. – * Mittelmeergebiet, Canaren, Turkestan

Attus s. Hahn 1829, Monogr. d. Spinn. 5 T. 18 F. B. (D ♀).
Attus s. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 408 (D ♀).
Attus agilis Walckenaer 1841, Hist. Nat. Ins. Apt. 2 p. 464 (D).
Salticus mauritanicus Lucas 1846, Explor. Sci. Algér.; Zool. 1 Arachn. p. 140 T. 5 F. 9 (D ♂♀).
Euophrys vigorata C. L. Koch 1848, Die Arachniden 14 p. 14 TF. 1282, 1283 (D ♂♀).
M. vigoratus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 663 T. 7 F. 4 (D ♂♀).
Salticus intentus Blackwall 1869, Journ. Linn. Soc. Lond. 10 p. 413 T. 15 F. 5 (D ♀).
M. s. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 337 (N).
M. s. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 32 T. 11 F. 10 (D ♂♀).
M. s. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 106 T. 10 F. 5 (D ♀).
M. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 603, 611 f. 729 (N ♂).
M. s. Bacelar 1929, Bull. Soc. Portug. Sci. Nat. 10 (21) p. 255 f. 8, 9 (N ♂♀).
M. s. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1209, 1261 f. 1929—1931 (D ♂♀).

♂♀ **soldanii** (Audouin) 1827. Aegypten, Algier, Oase Siwah

Attus s. Audouin 1827, Explic. Planch. Arachn. Savigny Descr. Egypt. p. 407 T. 7 F. 17 (D ♂).
Salticus rufolimbatus Lucas 1846, Explor. Sci. Algér.; Zool. 1 Arachn. p. 176 T. 6 F. 4 (D ♀).
M. s. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 34 (C).
M. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 603 (N).
M. s. Denis 1947, Bull. Soc. Fouad I. Ent. 31 p. 71 T. 6 F. 7—8 (N ♂♀).

♂♀ **taeniatus** (L. Koch) 1867. S.-Europa

Attus t. L. Koch 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 875 (D).
Marpissus t. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 22 (D ♀).
Marpissus cinereo-taeniatus Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 131 (N).
Philaeus t. Pavesi 1877, Rendic. Ist. Lombard. (2) 10 (11) p. 327 (N).
M. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 603 (N).
M. t. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1210, 1262 f. 1934—1936 (D ♂♀).

Transgredierende Arten:

♂♀ **animatus** Cambridge 1876. N.-Afrika, Attika, Kleinasien, Irak, Yemen, Senegal

M. a. Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 622 T. 60 F. 89 (D ♂♀).
M. a. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 308 (N ♂♀).
M. a. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 603 (N).
M. a. Strand 1909, Societ. Ent. 23 p. 188 (N ♀).
M. a. Denis 1947, Bull. Soc. Fouad I. Ent. 31 p. 71 T. 4 F. 16 (N ♀).

brevibulbis (Thorell) 1887. Yemen, Indien, Senegal

M. balteatus Simon 1882, Ann. Mus. Civ. Genova 18 p. 212 (N).
M. balteatus Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 346 (N).
Tapinattus b. Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 372 (nom. nov.).
M. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 604 (N).

♀ **illigerii** (Audouin) 1827. N.-Afrika, Nil-Sudan, St. Helena

Attus i. Audouin 1827, Explic. Planch. Arachn. Savigny Descr. Egypt. p. 408 T. 7 F. 20 (D ♀).
M. i. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 34 (N).
M. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 603 (N).
M. i. Simon 1906, S. B. Ak. Wiss. Wien 115 (I) p. 1173 (N).

Aethiopische Arten:

♂ **congoensis** Lessert 1927. Congo, Senegal

M. c. Lessert 1927, Rev. Suisse Zool. 34 (17) p. 430 f. 17 (D ♂).
M. c. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 348 f. 50 D—G (N ♂).
M. c. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) 486 (N ♂).

♀ **dubius** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea

M. d. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 348 f. 51 (D ♀).

♀ **duvali** Berland & Millot 1941. Senegal

M. d. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 349 f. 52 A (D ♀).

♀ **eburnensis** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste

M. e. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 349 f. 52 B (D ♀).

♀ **fagei** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste, Obervolta

M. f. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 350 f. 53 (D ♀).

♀ **hottentotus** Strand 1907. Capland

M. h. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (17—18) p. 547 (D ♀).
M. h. Strand 1907, Zool. Jahrb. Syst. 25 (5—6) p. 716 (D ♀).

♂ **hypenetes** Lawrence 1928. SW.-Afrika
M. h. Lawrence 1928, Ann. S. Afr. Mus. 25 (2) p. 259 T. 22 F. 40 (D ♂).

♂ **le galli** Berland & Millot 1941. Franz. Sudan
M. l. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 350 f. 57 (D ♂).

♂ **lesnei** Lessert 1936. Portug. O.-Afrika
M. l. Lessert 1936, Rev. Suisse Zool. 43 (9) p. 290 f. 85, 86 (D ♂).

♀ **lesserti** Lawrence 1927. SW.-Afrika
M. l. Lawrence 1927, Ann. S. Afr. Mus. 25 (1) p. 60 T. 2 F. 45 (D ♀).

♀ **niger** Caporiacco 1949. Kenya
M. n. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 486 (D ♀).

♂ **rabaudi** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea
M. r. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 352 f. 55 A—C (D ♂).

♀ **rubicundus** Lawrence 1928. SW.-Afrika
M. r. Lawrence 1928, Ann. S. Afr. Mus. 25 (2) p. 259 T. 22 F. 41 (D ♀).

♀ **tetralineatus** Caporiacco 1939. Abessinien
M. t. Caporiacco 1939, Real Accad. Ital. p. 370 f. 21 (D ♀).

♂ **vernei** Berland & Millot 1941. Franz. Guinea
M. v. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 353 f. 55 D—G (D ♂).

Orientalische Arten:

♂♀ **albocinctus** Keyserling 1889. Nicobaren
M. a. Keyserling 1889, Aradın. Austral 2 p. 265 T. 24 F. 7 (D ♂♀).

♂♀ **brachygnathus** (Thorell) 1887. Burma, Annam, Sumatra, Japan
Tapinattus b. Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 364 (D ♂♀).
M. b. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 604, 606 (N).
M. b. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 p. 733 (N).
M. b. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 349 T. 14 F. 381, 386 (D ♂♀).

♀ **crassus** Hogg 1922. Annam
M. c. Hogg 1922, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 307 f. 9 a, e (D ♀).

♂ **dabanis** Hogg 1922. Annam
M. d. Hogg 1922, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 307 f. 10 (D ♂).

♂♀ **felix** Hogg 1922. Annam
M. f. Hogg. 1922, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 305 f. 9 b—d (D ♂♀).

♀ **frigidus** Cambridge 1885. NW.-Indien
M. f. Cambridge 1885, Sci. Res. Sec. Yardand Miss.; Aran. p. 102 (D ♀).

♀ **rayi** Dyal 1935. Panjab
M. r. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 240 T. 17 F. 172 (D ♀).

o **trivialis** Thorell 1877. Celebes
M. t. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 571 (D o).

Australische Arten:

♀ **acuminatus** Rainbow 1912. Queensland

M. a. Rainbow 1912, Mem. Queensland Mus. 1 p. 201 f. 15, 16 (D ♀).

♂♀ **bracteatus** (L. Koch) 1879. Queensland

Marptusa b. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1105 T. 96 F. 7, 8 (D ♂♀).

♀ **ridens** (Hogg) 1914. Montebello-I.

Marpissa r. Hogg 1914, Proc. Zool. Soc. Lond. (1) p. 90 T. 2 F. 12 (D ♀).

Neotropische Arten:

♂ **bicolor** Peckham 1896. Guatemala

M. b. Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 75 (D ♂).
Thotmes b. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amar. Aran. 2 p. 241 (N ♂).

♂ **bicruciatus** Mello-Leitao 1943. Rio Grande do Sul

M. b. Mello-Leitao 1943, Arqu. Mus. Nac. R. d. Jan. 37 p. 226 TF. 52 (D ♂).

♀ **kochi** Bryant 1942. Virgin-Isl.

M. k. Bryant 1942, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 89 (7) p. 355 T. 3 F. 30 (D ♀).

♀ **quadriguttatus** Mello-Leitao 1939. Paraguay

M. q. Mello-Leitao 1939, Rev. Suisse Zool. 46 (2) p. 88 f. 79 (D ♀).

♀ **ursinus** Mello-Leitao 1945. Argentinien

M. u. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 288 f. 78 (D ♀).

Nearktische Arten:

♀ **banksi** Roewer 1951. Neu-Mexico

Fuentes vittatus Banks 1901, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 53 p. 590 T. 23 F. 20 (D ♀) (praeocc. Simon 1877, sub **Menemerus**).
M. vittatus Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 484 T. 39 F. 4 (D ♀).
M. b. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 453 (nom. nov.)

♀ **cruciferus** Keyserling 1885. S.-Carolina

M. c. Keyserling 1885, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 34 p. 513 T. 13 F. 17 (D ♀).

fraternus Banks, Newport & Bird 1932. Oklahoma

M. f. Banks, Newport & Bird 1932, Publ. Univ. Oklahoma 4 (1) p. 17 f. (sec Zool. Rec. 1932).

Gen. **Mithion** Simon 1884.

Palaearktische Arten:

♂♀ **canestrinii** (Canstrini & Pavesi) 1868. Europ. S.-Europa, Krim, Kaukasus, Turkestan

Marpissa c. Canestrini & Pavesi 1868, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 11 p. 866 (D ♀).
Marpissus c. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 129 (D ♀).
Marpessa obscura Kroneberg 1875, Nachr. Ges. Moskau 19 (3) p. 46 T. 5 F. 33 (D ♂♀).
Hyctia c. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 21 (D ♂♀).
Hyctia c. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 19 T. 1 F. 14 (D ♂♀).
M. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 603 (N).
M. obscurus Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 603 (N).
M. c. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1213, 1263 f. 1939, 1940 (D ♂♀).

♂♀ **memorabilis** (Cambridge) 1876. Aegypten, Libyen

Attus m. Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 618 T. 60 F. 110 (D ♂♀).
Mendoza m. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 105 (D ♀).
M. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 603 (N).
M. m. Simon 1906, S. B. Ak. Wiss. Wien 115 (8) p. 1172 (D ♂).
M. m. Caporiacco 1936, Mem. Soc. Ent. Ital. 15 p. 106 f. 3 (D ♂♀).

Aethiopische Arten:

♂♀ **carlinii** (Peckham) 1903. Mashonaland

Mendoza c. Peckham 1903, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 14 (1) p. 204 T. 23 F. 6 (D ♂♀).

O♀ **dakarensis** Berland & Millot 1941. Senegal

M. d. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 354 f. 56 A—D (D O ♀).

♀ **grassei** Berland & Millot 1941. Franz. W.-Afrika

M. g. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 356 f. 56 E—H (D ♀).

♂♀ **hesperius** Simon 1909 (1910). I. Annobom

M. h. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 427 (D ♂♀).

♂♀ **semiargenteus** Simon 1884. – * Nil-Sudan

M. s. Simon 1884, Bull. Soc. Zool. France 9 p. 5 T. 1 F. 2 (D ♀).
M. s. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 290 (D).
M. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 610 (N).
M. s. Simon 1906, S. B. Ak. Wiss. Wien 115 (I) p. 1172 (D ♂).

♂ **sexplagiatus** Simon 1909 (1910). San Thomé

M. s. Simon 1909 (1910), Ann. Mus. Civ. Genova 44 p. 426 (D ♂).

Australische Arten:

o **rubricoronatus** Strand 1911. Kei-I.

M. r. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 182 T. 4 F. 14 (D o).

Gen. **Muziris** Simon 1901.

Orientalische Arten:

♂♀ **doleschallii** (Thorell) 1878. – * Amboina

Marptusa d. Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 229 (D ♂♀).
M. d. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 611 (N).

Australische Arten:

♀ **calvipalpis** (L. Koch) 1867. Samoa

Attus c. L. Koch 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 228 (D ♀).
Acompse c. Keyserling 1883, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1453 T. 122 F. 7 (D ♀).
M. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 603, 611 (N).

♀ **carinatus** Simon 1909. W.-Australien

M. c. Simon 1909, Faun. S. W. Austral 2 (12) p. 200 (D ♀).

♀ **epigynatus** Strand 1911. Aru-I.

M. e. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 183 T. 6 F. 96 (D ♀).

♂ **gracilipalpis** Strand 1911. Aru-I.
M. g. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 183 T. 4 F. 28; T. 6 F. 99 (D ♂).

♂o **leptochirus** (Thorell) 1881. Neu-Guinea
Marptusa l. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 440 (D ♂ o).

♂♀ **wiehlei** Berland 1938. Neue Hebriden
M. w. Berland 1938, Ann. Soc. Ent. France 107 p. 146 f. 43—46 (D ♂♀).

Gen. **Naubolus** Simon 1901.

♀ **albopunctatus** Mello-Leitao 1943. Brasilien
N. a. Mello-Leitao 1943, Ann. Ac. Bras. Sci. 15 (3) p. 264 (D ♀).

♀ **aureocomosus** Mello-Leitao 1943. Pernambuco
N. a. Mello-Leitao 1943, Ann. Ac. Bras. Sci. 15 (3) p. 264 (D ♀).

♂ **melloleitaoi** Caporiacco 1947. Brit. Guiana
N. m. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 34 (D ♂).
N. m. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 730 (D ♂).

♀ **micans** Simon 1901. – * Mato Grosso
N. m. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 159 (D ♀).
N. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 602 (N).

♀ **pallidus** Mello-Leitao 1945. Argentinien
N. p. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool. 4 (29) p. 289 (D ♀).

♀ **posticatus** Simon 1901. Mato Grosso
N. p. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 159 (D ♀).
N. p. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 602 (N).

♀ **roeweri** Soares & Camargo 1948. Mato Grosso
N. r. Soares & Camargo 1948, Bol. Mus. Paraense E. Göldi 10 p. 393 f. 60 (D ♀).

♂♀ **sawayai** Soares & Camargo 1948. Süd-Brasilien
N. s. Soares & Camargo 1948, Rev. Bras. Biol. R. d. Jan. 8 p. 431 f. 15—18 (D ♂♀).

♂♀ **simplex** Mello-Leitao 1946. Paraguay
N. s. Mello-Leitao 1946, Notas Mus. La Plata 11 (Zool. 91) p. 25 f. 7 (D ♂♀).

♂ **trifasciatus** Mello-Leitao 1927. Süd-Brasilien
N. t. Mello-Leitao 1927, Rev. Mus. Paulista 15 p. 408 T. 15 F. 4—6 (D ♂).

♀ **tristis** Mello-Leitao 1922. Brasilien
N. t. Mello-Leitao 1922, Ann. Soc. Ent. France 91 p. 224 (D ♀).

Gen. **Ocrisiona** Simon 1901.

Orientalische Arten:

♂ **frenata** Simon 1901. Hongkong
O. f. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. France 70 p. 63 (D ♂).
O. f. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 595 f. 730 (N ♂).

Australische Arten:

♀ **aerata** (L. Koch) 1879. Queensland

Marptusa a. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1117 T. 97 F. 6 (D ♀).
O. a. Rainbow 1911, Rec. Austral. Mus. 9 (2) p. 291 (C).

♀ **cinerea** (L. Koch) 1879. Neu-Seeland

Marptusa c. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1112 T. 97 F. 3 (D ♀).
O. c. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 419 (N).

♂♀ **complanata** (L. Koch) 1879. Australien, Neu-Caledonien

Marptusa c. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1093 T. 95 F. 7, 8 (D ♂♀).
O. c. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 602 (N).

♀ **elegans** (L. Koch) 1879. Queensland

Marptusa e. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1119 T. 97 F. 7 (D ♀).
O. e. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 602 (N).

♂♀ **fusca** (Karsch) 1878. Neu-S.-Wales

Marpissa f. Karsch 1878, Mitt. München. Ent. Ver. 2 p. 28 (D ♂♀).
O. f. Rainbow 1911, Rec. Austral. Mus. 9 (2) p. 28 (C).

♀ **invenusta** (L. Koch) 1879. Queensland, Neu-S.-Wales

Marptusa i. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1099 T. 96 F. 3 (D ♀).
O. i. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 602 (N).

♂♀ **leucocomis** (L. Koch) 1879. – * Australien, Neu-Seeland

Marptusa l. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1096 T. 96 F. 1, 2 (D ♂♀).
O. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 602, 609 (N).
O. l. Simon 1909, Faun. S. W. Austral. 1 (12) p. 200 (N).
O. l. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 418 (N).

♀ **liturata** (L. Koch) 1879. Queensland

Marptusa l. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1103 T. 96 F. 6 (D ♀).
O. l. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 602 (N).

♀ **melancholica** (L. Koch) 1879. Neu-S.-Wales

Marptusa m. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1113 T. 97 F. 4 (D ♀).
O. m. Rainbow 1911, Rec. Austral. Mus. 9 (2) p. 292 (C).

♂ **melanopyga** Simon 1901. Tasmanien

O. m. Simon 1901, Ann. Soc. Ent. Belg. 45 p. 160 (D ♀).
O. m. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 602 (N).

♂ **parallelestriata** (L. Koch) 1879. Queensland

Marptusa p. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1121 T. 97 F. 8 (D ♂).
O. p. Rainbow 1911, Rec. Austral. Mus. 9 (2) p. 292 (C).

Gen. **Paramodunda** Lessert 1925.

♀ **nigriceps** Caporiacco 1949. Kenya

P. n. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 470 f. 87 (D ♀).

♂♀ **striatipes** Caporiacco 1939. Abessinien, Ost-Afrika

P. s. Caporiacco 1939, Real. Accad. Ital. p. 371 f. 22 (D ♀).
P. s. Caporiacco 1941, Miss. Biol. Sagan-Omo 12, Zool. 6 p. 143 f. 62 (D ♂♀).
P. s. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 243 (N ♂♀).

♂♀ **thyenioides** Lessert 1925. – * Ost-Afrika, Franz. Guinea
P. t. Lessert 1925, Rev. Suisse Zool. 31 (13) p. 471 f. 55—57 (D ♂♀).
P. t. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 328 (N ♂).
P. thyeniformis Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 243 (N ♂).

Gen. **Parkella** Chickering 1946.

♀ **fusca** Chickering 1946. Panama
P. f. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 51 f. 31—32 (D ♀).

♂ **venusta** Chickering 1946. – * Panama
P. v. Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 49 f. 27—30 (D ♂).

Gen. **Phanias** F. Cambridge 1901.

♂ **distans** Banks 1924. Galapagos-I.
P. d. Banks 1924, Zoologica N. York p. 98 f. 18 (D ♂).

♀ **flavostriatus** F. Cambridge 1901. – * Mexico
P. f. F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 251 T. 22 F. 8 (D ♀).
P. f. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 871 (N).

♂ **marginalis** Banks 1909. Costa Rica
P. m. Banks 1909, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 61 p. 224 T. 5 F. 9 (D ♂).

Gen. **Salticus** Latreille 1804.

Palaearktische Arten:

§ 11 ♂, 6 ♀: Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 63—64 (sub **Calliethera**).
§ 4 ♂, 4 ♀: Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 10 (sub **Epiblemum**).
§ 4 ♂, 4 ♀: Roewer 1928, Tierw. Mitteleurop. 3(6) p. 46—47 TF. 519—526.
§ 12 ♂, 8 ♀: Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1200—1207.

♀ **angustatus** Lucas 1846. Algier
S. a. Lucas 1846, Explor. Sci. Alger.; Zool. 1 Arachn. p. 167 T. 8 F. 6 (D ♀).
Calliethera a. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 76 (C).

♂♀ **cingulatus** (Panzer) 1797. Europa, Sibirien
Aranea c. Panzer 1797, Faun. Ins. Germ. 40 T. 22.
Attus cordicalis Hahn 1826, Monogr. d. Spinn. 4 T. 13 F. C (D ♀).
Attus lineolatus Sundevall 1832, Vet. Ak. Handl. p. 203 (D ♂♀).
S. scenicus Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 47 T. 3 F. 24 (D ♂♀).
Calliethera scenicus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 617 T. 6 F. 15 (D ♂♀).
Epiblemum c. Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 367 (N).
Calliethera c. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 68 T. 9 F. 29 (D ♂♀).
Epiblemum scenicum cingulatum Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 464 T. 76 F. 264 (D ♂♀).
Epiblemum c. Cambridge 1881, Proc. Dorset F. Cl. 2 p. 393 T. 5 F. 6 (D ♂♀).
Calliethera c. Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 28 T. 2 F. 1 (D ♂♀).
Epiblemum c. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 79 (D ♂♀).
Epiblemum c. Hansen 1885, in: Schiödte, Zool. Danica p. 158 (D ♂♀).

Epiblemum c. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 11 T. 1 F. 13 (D ♂♀).
Epiblemum c. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 420 T. 40 F. 619 (D ♂♀).
S. c. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 575 ((D ♂♀).
S. c. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 24 f. 71, 72 (D ♂♀).
S. c. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1202, 1206, 1259 f. 1910, 1911, 1921 (D ♂♀).
Epiblemum c. Kolosvary 1943, Fragm. Faun. Hungar. 6 (2) p. 65 f. . . (N).
S. c. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 37 f. . . (N).
S. c. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 19 f. 17; T. 1 F. 8—12 (D ♂♀).
S. c. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 210 f. 104 B, 105 C, D (D ♂♀).

♂♀ **confusus** Lucas 1846. Algier, Spanien, Corsica, Bulgarien

S. c. Lucas 1846, Explor. Sci. Algér.; Zool. 1 Arachn. p. 163 T. 8 F. 2 (D ♂♀).
Calliethera c. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 656 (D ♂).
Calliethera c. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 336 (N).
Calliethera c. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 66 (D ♂♀).
S. conjunctus Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1202, 1259, f. 1906, 1907 (D ♂).

♂♀ **conjonctus** (Simon) 1868. Oberitalien, Frankreich

Calliethera c. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 657 (D ♂).
Calliethera c. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 69 (D ♂).
Calliethera notia Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 67 (D ♂).
S. conjunctus Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1203, 1205, 1260 f. 1914, 1915, 1920 (D ♂♀).

♂♀ **dispar** (Simon) 1868. Spanien

Calliethera d. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 653 (D ♂♀).
Calliethera d. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 76 (N).
S. d. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1203 (N).

♂♀ **inexcultus** Cambridge 1873. St. Helena

S. i. Cambridge 1873, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 225 (D ♂♀).

♂ **latidentatus** Roewer 1951. Sibirien

Epiblemum latidens Kulczynski 1895, Dissert. Ac. Sci. Cracov. 32 p. 56 T. 2 F. 22—24 (D ♂) (praeocc. Doleschall 1889, sub. **Salticus).**
S. latidens Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 601 (N).
S. l. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 454 (nom. nov.).

♂o **major** (Simon) 1868. Spanien, Portugal, Frankreich

Calliethera m. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 651 (D o).
S. m. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1200, 1259 f. 1904 (D ♂).

♂ **mandibularis** (Simon) 1868. Corfu

Calliethera m. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 658 T. 7 F. 1 (D ♂).
Epiblemum m. Pavesi 1877, Rendic. Ist. Lombard. (2) 10 (11) p. 327 (7) (C).
Calliethera m. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 76 (N).
S. m. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 106 (C).

♂♀ **marenzelleri** Nosek 1905. Kleinasien

S. m. Nosek 1905, Ann. Nat. Hofmus. Wien 20 p. 143 T. 3 F. 25 (D ♂♀).

♀ **meticulosus** Lucas 1846. Algier

S. m. Lucas 1846, Explor. Sci. Algér.; Zool. 1 Arachn. p. 169 T. 8 F. 9 (D ♀).
Calliethera m. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 76 (N).

♂ **modicus** (Simon) 1875. Frankreich

Calliethera m. Simon 1875, Ann. Soc. Ent. France (5) 5, Bull. p. 94 (D ♂).
S. m. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1200, 1259 f. 1905 (D ♂).

♂♀ **mutabilis** Lucas 1846. Mittelmeergebiet, Kleinasien, Azoren

S. m. Lucas 1846, Explor. Sci. Algér.; Zool. 1 Arachn. p. 168 T. 8 F. 8 (D ♀).
Callietherus zebraneus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 652 (D ♂, nec. ♀).
Callietherus terenus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 654 (D ♂♀).
Callietherus m. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 333 (N).
S. m. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 178 (D ♂♀).
Calliethera m. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 70 T. 9 F. 27 (D ♂♀).
Epiblemum m. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 11 T. 1 F. 12 (D ♂♀).
Epiblemum terenum Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 420 T. 40 F. 618 (D ♂♀).
S. m. Kulczynski 1907, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 583 T. 21 F. 25 (N ♀).
S. m. Simon 1937, Arachn. de France 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1203, 1206, 1260 f. 1917, 1918, 1922 (D ♂♀).

♂♀ **olearii** (Scopoli) 1763. Mittel- u. S.-Europa, Russland

Aranea o. Scopoli 1763, Ent. Carniol. p. 402 (D).
Calliethera zebranea C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 31 (D).
Calliethera varia C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 31 (D ♀).
Calliethera zebranea C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 40 TF. 1108, 1109 (D ♂♀).
Calliethera tenera C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 43 TF. 1112, 1113 (D ♂♀).
Calliethera varia C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 46 TF. 1114 (D ♀).
Attus scenicus Westring 1862, Aran. Svec. p. 546 (part.).
Callietherus similatus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 657 (D ♀).
S. affinitatus Cambridge 1870, Trans. Linn. Soc. Lond. 27 (3) p. 399 (D ♂).
Calliethera affinitata Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 335 (N).
Callietherus zebraneus Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 334 (D ♂♀).
Epiblemum tenerum Thorell 1873, Rem. Sym. Europ. Spid. p. 367 (N).
Calliethera zebranea Simon 1876, Arachn. de Franc 3 p. 72 T. 9 F. 25, 26 (D ♂♀).
Epiblemum scenicum tenerum Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 465 T. 77 F. 262 (D ♂♀).
Epiblemum affinitatum Cambridge 1881, Proc. Dorset F. Cl. 2 p. 394 (D ♂).
Calliethera zebrana Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 30 T. 2 F. 2 (D ♂♀).
Epiblemum tenerum Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 79 (D ♂♀).
Epiblemum zebraneum Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 11 (D ♂♀).
Epiblemum affinitatum Cambridge 1908, Proc. Dorset F. Cl. 29 p. 143 T. A F. 37—39 (N).
Epiblemum affinitatum Jackson 1908, Trans. N. Castle Nat. Hist. Soc. 3 (1) T. 4 F. 4—6, 30 (N).
S. zebraneus Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 576 (D ♂♀).
S. o. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 24 f. 69, 70 (D ♂♀).
S. zebraneus Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1202, 1207, 1260 f. 1912, 1913, 1923 (D ♂♀).
S. o. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 20 T. 1 F. 13—14 (D ♂♀).
S. zebraneus Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 212 f. 104C, 105E, F (D ♂♀).

♂♀ **olivaceus** (L. Koch) 1867. I. Tinos, Syra, Corfu

Calliethera o. L. Koch 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 868 (D ♂♀).
Calliethera o. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 649 (D ♂♀).
Calliethera o. Simon 1876, Arachn. de France p. 76 (N).
Epiblemum o. Pavesi 1877, Rendic. Ist. Lombard. (2) 10 (11) p. 327 (N).
S. o. Schenkel 1938, Ark. Zool. 30 (A; 24) p. 20 f. 9 (D ♀).

♀ **paludivagus** Lucas 1846. Algier

S. p. Lucas 1846, Explor. Sci. Algér.; Zool. 1 Arachn. p. 167 T. 8 F. 7 (D ♀).
Epiblemum p. Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 624 (N ♀).
Calliethera p. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 76 (N).

♂♀ **propinquus** Lucas 1846. Algier, Spanien, Portugal, Frankreich, Rhodos

S. p. Lucas 1846, Explor. Sci. Algér.; Zool. 1 Arachn. p. 162 T. 8 F. 1 (D ♂♀).
S. p. Caporiacco 1948, Redia 33 p. 69 (N ♀).
Calliethera p. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 76 (N).
S. p. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1203, 1204, 1259 (D ♂♀).

♂ **scitulus** (Simon) 1868. Corsica, Sizilien

Calliethera s. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 659 (D ♂).
Calliethera s. Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 335 (N ♂).
S. s. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1203, 1260 f. 1916 (D ♂).

♂♀ **simonii** Kulczynski 1907. Italien, Frankreich

S. s. Kulczynski 1907, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 578 T. 21 F. 14, 15, 21, 24, 28 (D ♂♀).
S. s. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1203, 1260 (D ♂).

♂ **subinstructus** Cambridge 1873. St. Helena

S. s. Cambridge 1873, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 226 (D ♂).

♂ **tenuimanus** (Simon) 1889. Turkestan

Calliethera t. Simon 1889, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 39 p. 373 (D ♂).
S. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 601 (N).

♂♀ **tricinctus** (C. L. Koch) 1846. Turkestan

Calliethera t. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 50 TF. 1117 (D ♂♀).
Epiblemum t. Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 624 (N ♀).
S. t. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 601 (N).

♂ **truncatus** Simon 1937. Frankreich

S. t. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1202, 1260 (D ♂).

♂♀ **uncigerus** (Simon) 1868. Tirol

Calliethera u. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 660 (D ♂♀).
Calliethera u. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 76 (N).
S. u. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 107 (C).

♂ **unicolor** (Simon) 1868. Corfu

Calliethera u. Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 p. 661 (D ♂).
Calliethera u. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 76 (N).
Epiblemum u. Pavesi 1877, Rendic. Ist. Lombard (2) 10 (11) p. 327 (7) (C).
S. u. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 107 (C).

♂ **unispina** (Franganillo) 1910. Portugal

Calliethera u. Franganillo 1910, Broteria 9 p. 19 TF. 10 (D ♂).

Transgredierende Arten:

♂♀ **scenicus** (Clerck) 1757. – * Europa, N.-Afrika, Sibirien, N.-Amerika

Araneus s. Clerck 1757, Aran. Svec. p. 117 T. 5 F. 13 (D ♀).
Aranea s. Linné 1758, Syst. Nat. (10. Ed.) p. 623 (D).
Aranea s. Fabricius 1775, Syst. Ent. p. 438 (D).
Aranea albofasciata De Geer 1778, Mém. p, s. Hist. Nat. Ins. 7 p. 287 **T.** 17 F. 9 (D ♂♀).
Aranea fulvata Fabricius 1787, Mant. Ins. 1 p. 345 (D).
Aranea s. Olivier 1789, Encycl. Méthod. 4 p. 220 (D).
Aranea fulvata Olivier 1789, Encycl. Méthod. 4 p. 220 (D).
Aranea fulvata Fabricius 1793, Ent. Syst. 2 p. 422 (D).
Attus s. Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 24 T. 3 F. 27, 28 (N).
Attus s. Hahn 1826, Monogr. d. Spinn. 4 p. 1 T. 12 F. A, B (D ♂♀).
S. s. Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 57 TF. 43, 44 (D ♂♀).
Epiblemum faustum Hentz 1832, Sillimans Journ. Sci. Arts 21 p. 108 (D ♂).
Attus s. Sundevall 1832, Vet. Ak. Handl. p. 202 (D ♂♀).
Calliethera histrionica C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 31 (D).
Attus s. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 406 (D ♂♀).
Calliethera s. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 37 TF. 1106—1107 (D ♂♀).
Epiblemum faustum Hentz 1846, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 367 **T.** 22 F. 17 (D ♂).
Calliethera histrionica C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 42 TF. 1110, 1111 (D ♂♀).
Calliethera aulica C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 51 TF. 1118, 1119 (D ♂♀).
S. albovittatus Lucas 1846, Explor. Sci. Algér.; Zool. 1 Arachn. p. 164 **T.** 8 F. 3 (D ♂♀).
Attus histrionicus Westring 1862, Aran. Svec. p. 545 (D ♂♀).
Attus niger Westring 1862, Aran. Svec. p. 592 (D ♂).
S. s. Cambridge 1863, Zoologist 21 p. 8597 (N).
Calliethera histrionicus Simon 1868, Ann. Soc. Ent. France (4) 8 **p.** 650 **T.** 6 F. 14 (D ♂♀).
Epiblemum histrionicus Thorell 1869, On Europ. Spid. p. 211 (N).
Calliethera s. L. Koch 1870, Jahrb. Gel. Ges. Krakau 41 p. 9 (N).
S. histrionicus Cambridge 1870, Trans. Linn. Soc. Lond. 27 (3) p. 402 (N).
Calliethera histrionicus Simon 1871, Ann. Soc. Ent. France (5) 1 p. 332 (N).
Epiblemum s. Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 360 (N).
Calliethera goberti Simon 1875, Ann. Soc. Ent. France (5) 5 Bull. p. 94 (D ♂).
Calliethera s. Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 64 T. 9 F. 31 (D ♂♀).
Calliethera goberti Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 67 (D ♂).
Calliethera albovittata Simon 1876, Arachn. de France 3 p. 76 (N).
Epiblemum s. Menge 1877, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 4 p. 463 **T.** 76 F. 260 (D ♂♀).
Calliethera s. Becker 1882, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 10 p. 26 **T.** 1 **F.** 6 (D ♂♀).
Epiblemum s. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 79 (D ♂♀).
Epiblemum s. Hansen 1885, in: Schiödte, Zool. Danica p. 158 **T.** 5 F. 11 (D ♂♀).
Epiblemum s. Peckham 1886, Proc. Ac. Sci. Wiscons. 4 p. 311 (D).
Epiblemum s. Peckham 1888, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 7 p. 76 T. 1 F. 57; T. 6 F. 57 (D ♂♀).
Epiblemum s. Emerton 1891, Trans. Connect. Ac. Sci. 8 (14) p. 238 **T.** 19 F. 2 (D ♂♀).
Epiblemum s. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 11 (D ♂♀).

Epiblemum s. Peckham 1894, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 2 (2) p. 107 T. 10 F. 6 (D ♀).
S. s. Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 606 f. 726, 727 (N).
Epiblemum s. Emerton 1902, Common Spid. p. 60 f. 155, 156 (D ♂♀).
Epiblemum s. Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 419 T. 40 F. 617 (D ♂♀).
S. s. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 477 T. 42 F. 8 (D ♂♀.)
S. s. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 574 (D ♂♀).
S. s. Comstock 1912, Spider Book p. 676 f. 748 (N; sub **senicus**).
S. s. Dahl 1926, Tierw. Deutschl. 3 p. 25 f. 73, 74 (D ♂♀).
S. s. Reimoser 1929, Die Natur (Wien) 5 (3) p. 65 f. 11 (N ♂♀).
S. s. Simon 1937, Arachn. de France 6 (5) p. 1202, 1204, 1259 f. 1908, 1909, 1919 (D ♂♀).
S. s. Palmgren 1943, Act. Zool. Fenn. 36 p. 30 f... (N).
S. s. Chickering 1944, Pap. Michig. Ac. Sci. 29 p. 204 f. 127—130 (D ♂♀).
S. s. Tullgren 1944, Svensk Spindelfauna (Salticid.) p. 19 T. 1 F. 4—7 (D ♂♀).
S. s. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 453 T. 88 F. 1634—35; T. 89 F. 1650—54 (D ♂♀).
S. s. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders 1 p. 209 f. 104 A, D; 105 A, B (D ♂♀).

Australische Arten:

♀ **flavicruris** (Rainbow) 1897. Neu-S.-Wales
Attus f. Rainbow 1897, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 22 (3) p. 526 T. 18 F. 2 (D ♀).
S. f. Rainbow 1911, Rec. Austral Mus. 9 (2) p. 290 (C).

♂ **jugularis** Simon 1900. Queensland
S. j. Simon 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44 p. 404 (D ♂).

Neotropische Arten:

♀ **brasiliensis** Lucas 1833. Brasilien
S. b. Lucas 1833, Ann. Soc. Ent. France (1) 2 p. 479 T. 18 F. A 2 (D ♀).

o **radians** Blackwall 1862. Brasilien
S. r. Blackwall 1862, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 10 p. 352 (D o).

Transgredierende Arten:

♀ **austinensis** Gertsch 1936. Centr. Amerika, Mexico, Texas
Epiblemum albocinctus Peckham 1896, Occ. Pap. Nat. Hist. Soc. Wiscons. 3 (1) p. 84 T. 6 F. 8 (D ♀).
Epiblemum albocinctus F. Cambridge 1901, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 300 T. 29 F. 13 (N ♀).
S. albocinctus Simon 1901, Hist. Nat. Araign. 2 (3) p. 601 (N).
S. albocinctus Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 479 T. 44 F. 5 (D ♀).
S. a. Gertsch 1936, Amer. Mus. Novit. 852 p. 20 (nom. nov.).

Nearktische Arten:

§ 4 Arten: Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 476.

♂♀ **palpalis** (Banks) 1904. Californien
Epiblemum p. Banks 1904, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 3 (13) p. 360 T. 39 F. 31 (D ♀).
S. p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 477 T. 52 F. 10; T. 54 F. 7 (D ♂♀).

♂♀ **peckhamae** (Cockerell) 1897. Neu-Mexico, Utah

Icius p. Cockerell 1897, Canad. Ent. 29 p. 223 (D ♂).
S. p. Peckham 1909, Trans. Wiscons. Ac. Sci. 16 (1; 5) p. 478 T. 42 F. 9; T. 44 F. 6 (D ♂♀).

Gen. **Trapezocephalus** Berland & Millot 1941.

♀ **aelurilliformis** Berland & Millot 1941. Elfenbeinküste

T. a. Berland & Millot 1941, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 12 (2) p. 358 f. 57 (D ♀).

2. *Legio CRIBELLATAE*

1. Cohors **Palaeocribellatae**

53. Fam. HYPOCHILIDAE

Gen. **Ectatosticta** Simon 1892.

Palaearktische Arten:

♀ **davidi** (Simon) 1888. – * Peking

Hypochilus d. Simon 1888, Ann. Soc. Ent. France (6) 8, Bull. p. 208 (D ♀).
E. d. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 204 f. 143—146, 148, 149 (N ♂♀).

Australische Arten:

♂♀ **troglodytes** (Higgins & Petterd) 1883. Tasmanien

Theridion t. Higgins & Petterd 1883, Proc. Soc. Tasman. p. 191 (D).
E. australis Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 Bull. p. 240 (D o).
E. t. Rainbow 1904, Rec. Austral. Mus. 5 (5) p. 327 T. 46 F. 1—4 (D ♀).
E. t. Hickman 1928, Pap. Proc. Soc. Tasman. (1927) p. 169 T. 24; f. 6, 7 (D ♂).

Gen. **Hypochilus** Marx 1888.

♂♀ **thorellii** Marx 1888. Südl. U. St. Amerika

H. t. Marx 1888, Ent. Amer. 4 p. 160 f. 1—3 (D ♂♀).
H. t. Marx 1889, Proc. Ent. Soc. Wash. 1 (3) p. 166 (D ♂♀).
H. t. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 202 f. 147, 150 (N ♂♀).
H. t. Comstock 1912, Spider Book p. 259 f. 231—234 (N).
H. t. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 520 (D ♂♀).

2. Cohors **Neocribellatae**

1. Superfam. FILISTATAEFORMIA

54. Fam. FILISTATIDAE

Gen. **Filistata** Latreille 1810.

Palaearktische Arten:

§ 3 ♂, 2 ♀: Chyzer & Kulczynski 1897, Aran. Hungar. 2 (b) p. 277.
§ 6 Arten: Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 299.

♂♀ **albimaculata** Cambridge 1872. Palästina

F. a. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 216 T 13 F. 1 (D ♂♀).

♀ **annulipes** Kulczynski 1908. Cypern

F. a. Kulczynski 1908, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 49 (D ♀).

♀ **chiardolae** Caporiacco 1934. Karakorum
F. c. Caporiacco 1934, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 117 T. 1 F. 3 (D ♀).

♂o **condita** Cambridge 1873. Azoren, St. Helena
F. c. Cambridge 1873, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 211 T. 24 F. 1 (D o).
F. c. Simon 1883, Ann. Soc. Ent. France (6) 3 p. 278 T. 8 F. 11 (D ♂).

♂♀ **crosbyi** Spassky 1938. Usbekistan
F. c. Spassky 1938, Festschr. Strand 4 p. 575 f. 2 (D ♂♀).

♂♀ **debilis** Simon 1910. Algier
F. d. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 301 (D ♂♀).

♀ **delimbata** Strand 1914. Palästina
F. d. Strand 1914, Arch. Naturg. 80 (A; 3) p. 177 (D ♀).

♀ **hebraea** Strand 1914. Palästina
F. h. Strand 1914, Arch. Naturg. 80 (A; 3) p. 175 (D ♀).

♀ **hebraea limbomaculata** Strand 1914. Palästina
F. h. l. Strand 1914, Arch. Naturg. 80 (A; 3) p. 176 (D ♀).

o **hirsuta** Cambridge 1872. Libanon
F. h. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 217 (D o).

♀ **monticola** Spassky 1941. Turkestan
F. m. Spassky 1941, Folia Zool. Hydrobiol. 11 p. 12 (D ♀).
F. m. Spassky 1945, Rev. Ent. U. R. S. S. 28 (1—2) p. 44 (D ♀).

♂♀ **nana** Simon 1868. Süd-Europa
F. n. Simon 1868, Rev. Mag. Zool. (2) 20 p. 455 (D ♂♀).
F. n. Chyzer & Kulczynski 1897, Aran. Hungar. 2 (b) p. 278 (D ♂♀).
F. n. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 34 (D ♀).
F. n. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 72 (D ♂♀).

♂ **pallida** Kulczynski 1897. Dalmatien, Madeira, Portugal
F. p. Kulczynski 1897, in: Chyzer & Kulczynski, Aran. Hungar. 2 (b) p. 277 T. 10 F. 54 (D ♂).
F. p. Kulczynski 1899, Rozpraw. Ak. Umiej. Krakow (2) 16 p. 324 T. 6 F. 1, 2 (N).
F. p. Machado 1941, Mem. Mus. Zool. Univ. Coimbra (1) 117 p. 1 f... (N).

♀ **puta** Cambridge 1876. Nord-Afrika, Syrien
F. p. Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 514 (D ♀).
F. p. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 71 (N).

♀ **rufa** Caporiacco 1934. Karakorum
F. r. Caporiacco 1934, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 117 T. 1 F. 4 (D ♀).

♂♀ **schmitzii** Kulczynski 1911. Palästina
F. s. Kulczynski 1911, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 13 T. 1 F. 3 (D ♂♀).

♂♀ **seclusa** Cambridge 1885. Turkestan, Karakorum
F. r. Cambridge 1885, Sci. Res. Sec. Yarkand Miss.; Aran. p. 5 T. 1 F. 3 (D ♀) (im Text: **seclusa**, in Fig.: **reclusa**).
F. seclusa Caporiacco 1934, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 116 T. 1 F. 2 (N ♂♀).

♂ **tenuispina** Strand 1914. Palästina
F. t. Strand 1914, Arch. Naturg. 80 (A; 3) p. 178 (D ♂).

♂♀ **vestita** Simon 1873. Corsica, Algier

F. v. Simon 1873, Mém. Soc. Sci. Liège (2) 5 p. 220 (36) (D ♀).
F. v. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 254 f. 211 (N).
F. v. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 72 (D ♂♀).

Transgredierende Arten:

♂♀ **insidiatrix** (Forskal) 1775. – * Mittelmeergebiet, Kaukasus, Azoren, Canaren, Senegal, Yemen

Aranea i. Forskal 1775, Descr. Anim. p. 86 (D).
Aranea i. Forskal 1776, Icon. rer. nat. p. 7 F. G (N).
F. testacea Latreille 1810, Consid. Gen. Crust. Ins. 35 p. 121 (D).
F. bicolor Latreille 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat. 2 p. 468 (D).
F. bicolor Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 254 T. 6 F. 1 (D ♀).
Teratodes attalicus C. L. Koch 1839, Die Arachniden 5 p. 6 TF. 343 (D ♀).
F. bicolor Lucas 1846, Explor. Sci. Alger.; Zool. 1 Arachn. p. 97 T. 1 F. 6 (D ♂♀).
Oecobius nigripalpis Dufour 1863, Ann. Soc. Ent. France (4) 3 p. 6 T. 1 F. 2 (D ♀).
Ariadna i. Gasperini 1892, Prilog. K. Dalmat. Faun. (N).
F. testacea Simon 1893, Hist. Nat. Araign. 1 (2) p. 258 (N).
F. i. Chyzer & Kulczynski 1897, Aran. Hungar. 2 (b) p. 277 (D ♂♀).
F. i. Berland 1911, Arch. Zool. Expér. Gén. 49 (Not. & Rev.) p. 50 f. 2—4 (N ♂♀).
F. i. Berland 1913, Arch. Zool. Expér. Gén. 51 (Not. & Rev. 2) p. 36 f. 31—37 (N ♂♀).
F. i. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 71, 72 (D ♂♀).
F. i. Drenski 1938, Bull. Inst. R. Hist. Nat. Sofia 11 p. 88 f . . . (N).

♀ **nigra** Simon 1897. Madeira, Abessinien, Nord- u. Ost-Afrika, Oman, Indien

F. n. Simon 1897, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 3 (3) p. 97 (D ♀).
F. n. Simon 1909, Ann. Soc. Ent. Belg. 53 p. 31 (N).
F. n. Berland 1922, Voy. Rothschild Ethiop. Res. Sci. Anim. Artic. 1 p. 46 T. A 1 F. 4 (N).
F. n. Berland & Millot 1940, Ann. Soc. Ent. France 108 p. 149 (N).

Aethiopische Arten:

♂♀ **decaryi** Fage 1945. Madagascar

F. d. Fage 1945, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris (2) 17 (4) p. 301 f. 1 (D ♂♀).
F. d. Fage 1946, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris (2) 18 (3) p. 266 (N).

♂♀ **fradei** Berland & Millot 1940. Franz. Sudan

F. f. Berland & Millot 1940, Ann. Soc. Ent. France 108 p. 150 f. 1, 2 (D ♂♀) (in f. 2: **gerhardti**).

♀ **grandidieri** Simon 1901. Madagascar

F. g. Simon 1901, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 7 p. 67 (D ♀).
F. g. Fage 1946, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris (2) 18 (3) p. 267 (N).

♀ **infuscata** Kulczynski 1901. Erythraea

F. i. Kulczynski 1901, Bull. Ac. Sci. Cracov. 41 p. 5 (D ♀).

Orientalische Arten:

♂♀ **garciai** Simon 1892. Philippinen

F. g. Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 37 (D ♂♀).

o **hasselti** Simon 1906. Sumatra, Java, Celebes
F. h. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 308 (D o).

o **insularis** Thorell 1881. Nicobaren
F. i. Thorell 1881, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 17 (D o).

♂♀ **pulchella** Simon 1893. Philippinen
F. p. Simon 1893, Ann. Soc. Ent. France 63 p. 66 (D ♂♀).

♀ **sundaica** Kulczynski 1908. Java
F. s. Kulczynski 1908, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 579 (D ♀).

o **zebrata** Thorell 1895. Burma
F. z. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 14 (D o).

Australische Arten:

♀ **australiensis** L. Koch 1873. Queensland
F. a. L. Koch 1873, Arachn. Austral. 1 (1) p. 451 T. 35 F. 4 (D ♀).

♀ **bakeri** Berland 1938. Neue Hebriden, Austral-Ins.
F. b. Berland 1938, Ann. Soc. Ent. France 107 p. 187 f. 159—162 (D ♂♀).

♀ **gibsonhilli** Savory 1943. Christmas-Isl.
F. g. Savory 1943, Ann. Mag. Nat. Hist. (11) 10 p. 355 (D ♀).

♀ **littoralis** Roewer 1938. Neu-Guinea
F. l. Roewer 1938, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors Sér.) 3 (19) p. 8 f. 3 (D ♀).

Neotropische Arten:

♀ **brevipes** Keyserling 1882. Peru
F. b. Keyserling 1882, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 32 p. 221 (D ♀).

♀ **fasciata** Banks 1902. Galapagos-I.
F. f. Banks 1902, Proc. Wash. Ac. Sci. 4 p. 55 T. 1 F. 15 (D ♀).

♂♀ **insignis** Cambridge 1896. Guatemala
F. i. Cambridge 1896, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 211 T. 26 F. 12; T. 28 F. 8 (D ♂♀).
Filistatoides i. F. Cambridge 1899, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 47 T. 3 F. 10 (N ♂♀).
F. i. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 1 (2) p. 951 (N).
Filistatoides i. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harward 86 (7) p. 263 (D ♂♀).

♀ **metamerica** Mello-Leitao 1940. Brasilien
F. m. Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 7 T. 1 F. 1 (D ♀).

♂♀ **tractans** Cambridge 1896. Mexico
F. t. Cambridge 1896, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 183 T. 23 F. 4 (D ♂).
F. capillosa Cambridge 1899, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 289 T. 32 F. 1 (D ♀).
F. t. F. Cambridge 1899, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 47 T. 3 F. 9 (N ♂♀).

Transgredierende Arten:

♂♀ **hibernalis** Hentz 1842. Argentinien bis U. St. Amerika
F. h. Hentz 1842, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 4 p. 227 T. 8 F. 6 (D ♂).
F. capitata Hentz 1842, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 4 p. 228 T. 8 F. 7 (D ♀).

Teratodes depressa C. L. Koch 1842, Die Arachniden 9 p. 103 TF. 755 (D ♂).
F. cubaecola Lucas 1857, in: Sagra, Hist. Phys. Polit. Nat. Cuba p. 74 T. 4 F. 2 (D ♀).
F. distincta Blackwall 1867, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 20 p. 202 (D ♂o).
F. depressa Blackwall 1868, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 2 p. 403 (N).
F. bicolor Taczanowski 1873, Hor. Soc. Ent. Ross. 10 p. 72 (N).
F. capitata Keyserling 1879, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 29 p. 345 T. 4 F. 33 (D ♂♀).
F. (Teratodes) capitata Hasselt 1888, Tijdschr. Ent. 31 (3) p. 171 (D ♀).
F. tractans Cambridge 1899, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 290 (D ♀).
F. capitata Simon 1891, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 553 (C).
F. capitata Simon 1893, Hist. Nat. Araign. 1 (2) p. 257 f. 212—215, 218, 219 (N).
F. h. F. Cambridge 1899, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 47 T. 3 F. 8 (N ♂♀).
F. h. Emerton 1902, Common Spid. p. 220 f. 501 (D ♀).
F. capitata & h. Strand 1915, Arch. Naturg. 81 (A; 9) p. 92, 93 (D ♀).
F. h. Petrunkevitch 1929, Trans. Connect. Ac. Sci. 30 p. 56 f. 36—40 (N ♂♀).

Nearktische Arten:

♂♀ **arizonica** Chamberlin & Ivie 1935. Arizona
F. a. Chamberlin & Ivie 1935, Bull. Utah Univ. 26 (4) Biol. 2 (8) p. 4 T. 4 F. 24, 25 (D ♂♀).

♂♀ **geophila** Chamberlin & Ivie 1935. Californien
F. g. Chamberlin & Ivie 1935, Bull. Utah Univ. 26 (4) Biol. 2 (8) p. 6 T. 4 F. 22, 23 (D ♂♀).

♀ **geophila wawona** Chamberlin & Ivie 1942. Californien
F. g. w. Chamberlin & Ivie 1942, Bull. Univ. Utah 32 (13), Biol. 7 (1) p. 4 (D ♀).

♀ **hurca** Chamberlin & Ivie 1942. Californien
F. h. Chamberlin & Ivie 1942, Bull. Univ. Utah 32 (13), Biol. 7 (1) p. 3 (D ♀).

♂♀ **utahana** Chamberlin & Ivie 1935. Utah
F. u. Chamberlin & Ivie 1935, Bull. Utah Univ. 26 (4) Biol. 2 (8) p. 5 T. 4 F. 26, 27 (D ♂♀).

Gen. **Filistatinella** Gertsch & Ivie 1936.

♂♀ **crassipalpus** (Gertsch) 1935. Texas
Filistata c. Gertsch 1935, Amer. Mus. Novit. 792 p. 5 TF. 4—6 (D ♂♀).
F. c. Gertsch & Ivie 1936, Amer. Mus. Novit. 858 p. 1 (N).

Gen. **Malalistata** Mello-Leitao 1946.

♀ **patagonica** (Mello-Leitao) 1938. Argentinien
Filistata p. Mello-Leitao 1938, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 1, Zool. 4 p. 90 (D ♀).
M. p. Mello-Leitao 1946, An. Ac. Bras. Ci. 18 (1) p. 47 (D gen. nov.).

Gen. **Pikeliana** Mello-Leitao 1946.

♂ **tambilloi** (Mello-Leitao) 1941. Argentinien
Filistata t. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. 12 p. 106 (D ♂).
P. t. Mello-Leitao 1946, An. Ac. Bras. Ci. 18 (1) p. 47 (D gen. nov.).

2. *Superfam. ZOROPSIDIFORMIA*

55. Fam. ZOROPSIDAE

Gen. **Raecius** Simon 1892.

aculeatus Dahl 1901. Congo

R. a. Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 188, 247 (D juv.).

♀ **crassipes** (L. Koch) 1875. – * Abessinien

Amaurobius c. L. Koch 1875, Aegypt. Abyss. Arachn. Jickeli p. 32 T. 3 F. 4 (D ♀).

R. c. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 230 (N).

Gen. **Uduba** Simon 1880.

§ 3 ♀: Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 292.

♂♀ **dahli** Simon 1903. Madagascar

Marussenca madagascariensis Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 248 (D ♂♀).

U. d. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 975 (N).

♀ **funerea** Simon 1906. Madagascar

U. f. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 293 (D ♀).

♀ **inhonesta** Simon 1906. Madagascar

U. i. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 294 (D ♀).

♂♀ **madagascariensis** (Vinson) 1863. – * Madagascar

Olios m. Vinson 1863, Aran. Réun. Mauric. Madagasc. p. 100, 305 (D ♂).
U. m. Simon 1880, Act. Soc. Linn. Bord. 34 p. 343 (D ♂).
Uliodon m. Simon 1887, Ann. Soc. Ent. France (6) 7 Bull. p. 158 (N).
U. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 974 (N).
U. m. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 293 (D ♀).

Gen. **Zorocrates** Simon 1888.

§ 4 Arten: Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 250.

Neotropische Arten:

♀ **badius** Simon 1895. Mexico

Z. b. Simon 1895, Bull. Soc. Zool. France 20 p. 134 (D ♀).
Z. b. Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 250 (D ♀).

♂♀ **fuscus** Simon 1888. – * Mexico, Guatemala, Panama

Z. f. Simon 1888, Ann. Soc. Ent. France (6) 8 p. 212 (D ♀).
Satricum gnaphosoides Cambridge 1892, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 99 T. 13 F. 4, 5 (D ♂♀).
Z. f. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 230 (N).
Z. f. Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 250 (D ♀).
Z. f. F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 354 T. 33 F. 8, 9 (N ♂♀).

♂♀ **guerrerensis** Gertsch & Davis 1940. Mexico

Z. g. Gertsch & Davis 1940, Amer. Mus. Novit. 1069 p. 2 TF. 9—11 (D ♂♀).

♀ **pictus** Simon 1895. Nieder-Californien

Z. p. Simon 1895, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1 (3) p. 107 (D ♀).
Z. p. Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 251 (D ♀).

Transgredierende Arten:

♂♀ **mistus** Cambridge 1896. Mexico, Arizona

Z. m. Cambridge 1896, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 176 T. 21 F. 9, 10 (D ♂♀).
Rubrius mordax Cambridge 1898, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 279 T. 37 F. 1 (D ♀).
Z. m. Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 251 (D ♀).
Z. m. F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 354 T. 33 F. 10, 11 (N ♂♀).

Nearktische Arten:

♂♀ **aemulus** Gertsch 1935. Texas

Z. a. Gertsch 1935, Amer. Mus. Novit. 792 p. 23 TF. 31, 32 (D ♂♀).

♂♀ **alternatus** Gertsch & Davis 1936. Texas

Z. a. Gertsch & Davis 1936, Amer. Mus. Novit. 881 p. 14 TF. 18, 19 (D ♂♀).

♀ **isolatus** Gertsch & Davis 1936. Texas

Z. i. Gertsch & Davis 1936, Amer. Mus. Novit. 881 p. 16 (D ♀).

Gen. **Zorodictyna** Strand 1907.

♀ **intermedia** Strand 1907. Madagascar

Z. i. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (23) p. 725 (D ♀).
Z. i. Strand 1907, Nyt. Mag. Naturvid. 46 (1) p. 3 (D ♀).

Gen. **Zoropsis** Simon 1878.

§ 11 ♀: Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 191—195.
§ 4 Arten: Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 272.

o **beccarii** Caporiacco 1935. Anatolien

Z. b. Caporiacco 1935, Monit. Zool. Ital. 46 (9) p. 285 (D o).

♂♀ **bilineata** Dahl 1901. Algier

Z. b. Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 194 (D ♀).
? **Z. b.** Kulczynski 1909, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 447 T. 22 F. 31 (N ♂).

♂♀ **lutea** (Thorell) 1875. Balkanländer, Creta, Krim

Zora l. Thorell 1875, Hor. Soc. Ent. Ross. 11 p. 76 (D ♂♀).
Zora l. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 84 (D ♂♀).
Z. l. Simon 1884, Ann. Soc. Ent. France (6) 4 p. 343 (N).
Z. l. Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 191 (D ♀).
Z. l. Kulczynski 1911, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 12 T. 1 F. 2 (N ♀).

♀ **lutea asiatica** Kulczynski 1911. Anatolien, Syrien, Cypern

Z. l. a. Kulczynski 1911, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 12 T. 1 F. 1 (D ♀).

♀ **maculosa** Cambridge 1907. Canaren

Z. m. Cambridge 1907, Proc. Zool. Soc. Lond. (2) p. 822 T. 50 F. 18—21 (D ♀).

♂♀ **media** Simon 1878. W.-Mittelmeergebiet

Z. m. Simon 1878, Arachn. de France 4 p. 328 T. 16 F. 12 (D ♂♀).
Z. m. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 272 f. 1 C (N ♀).
Z. m. Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 191 (D ♀).
Z. m. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 32, 33 f. 57—59 (D ♂♀).

♀ **oertzeni** Dahl 1901. Albanien

Z. o. Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 192 (D ♀).

♂ **pluridentata** Franganillo 1925. Andalusien

Z. p. Franganillo 1925, Bol. Soc. Ent. Espan. 8 p. 40 (D ♂).
Z. p. Franganillo 1926, Bol. Soc. Ent. Espan. 9 p. 77 (D ♂).

♀ **quedenfeldti** Dahl 1901. Marokko

Z. p. Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 192 (D ♀).

♂♀ **rufipes** (Lucas) 1838. Canaren

Olios r. Lucas 1838, Arachn. in: Barker, Webb, Berthelot, Hist. Nat. Canar. 2 (2) p. 32 T. 6 F. 13 (D ♂).
Z. r. Simon 1880, Act. Soc. Linn. Bord. 34 p. 344 (D ♂♀).
Z. r. Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 191 (D ♀).
Z. r. Cambridge 1907, Proc. Zool. Soc. Lond. (2) p. 820 T. 50 F. 18—21 (D ♀).
Z. r. Strand 1915, Arch. Naturg. 81 (A; 9) p. 23 (D ♂♀).

♂♀ **spinimana** (Dufour) 1820. – * Süd-Europa, Nord-Afrika

Dolomedes s. Dufour 1820, Ann. Gen. Sci. Phys. 5 p. 204 T. 76 F. 3 (D ♀).
Dolomedes dufourii Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 358 (D ♀).
Dolomedes ocreatus C. L. Koch 1841, in: Wagner, Reis. Regent. Algier 3 p. 212 T. 10 (D ♀).
Dolomedes dufourii Walckenaer 1841, Hist. Nat. Ins. Apt. 2 p. 455 (D ♂♀).
Lycosa ocreata Lucas 1846, Explor. Sci Algér.; Zool. 1 Arachn. p. 107 (C).
Lycosoides algirica Lucas 1846, Explor. Sci. Algér.; Zool. 1 Arachn. p. 122 T 2 F. 10 (D ♂♀).
Zora ocreata C. L. Koch 1848, Die Arachniden 16 p. 105 TF. 1345 (D ♀).
Zora algeriensis Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 372 (C).
Zora dufourii Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 372 (C).
Hecaerge wrightii Blackwall 1869, Trans. Linn. Soc. Lond. 10 p. 407 T. 15 F. 2 (D ♀).
Zora ocreata Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 534 (N).
Z. ocreata Simon 1878, Arachn. de France 4 p. 327 (D ♂♀).
Z. albertisii Pavesi 1880, Ann. Mus. Civ. Genova 15 p. 338 (D ♂).
Z. ocreata Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 230 f. 176—180 (N ♂).
Z. ocreata Chyzer & Kulczynski 1897, Aran. Hungar. 2 (b) p. 261 T. 10 F. 37 (D ♂♀).
Z. albertisii Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 191 (D ♀).
Z. wrighti Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 192 (D ♀).
Z. ocreata Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 193 (D ♀).
Z. s. Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 195 (D ♀).
Z. ocreata Kulczynski 1909, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 444 T. 22 F. 26 (N ♂♀).
Z. s. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 273 f. 1 A (N ♀).
Z. ocreata Berland 1913, Arch. Zool. Expér. Gén. 51 (Not. & Rev. 2) p. 29, 30 f. 10—15 (N ♀).
Z. s. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 32, 33 f. 54—56 (D ♂♀).
Z. s. Bacelar 1929, Bull. Soc. Portug. Sci. Nat. 10 (21) p. 250 f. 4, 5 (N ♂♀).

♀ **triangularis** Dahl 1901. Tanger

Z. t. Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 194 (D ♀).

♀ **xylina** Simon 1909. Marokko

Z. x. Simon 1909, Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 6 (1) p. 15 (D ♀).
Z. x. Simon 1914, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 274 f. 1B (D ♀).

xylina viberti Simon 1910. Algier

Z. x. v. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 275 (D).

56. Fam. ACANTHOCTENIDAE

Gen. **Acanthoctenus** Keyserling 1876.

§ 5 Arten: Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 186—188.
§ 2 ♂, 3 ♀: Cambridge 1897, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 19 p. 102.
§ 11 ♂, 18 ♀: Mello-Leitao 1936, Ann. Ac. Brasil. Sci. 8 (3) p. 182—187.

♂♀ **andicola** Simon 1906. Bolivien

A. a. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 291 f. 2D, E (D ♂♀).
A. a. Mello-Leitao 1936, Ann. Ac. Brasil. Sci. 8 (3) p. 195 (D ♂♀).

♀ **bahiensis** Strand 1910. Brasilien

A. b. Strand 1910, Zool. Jahrb. Syst. 28 (4) p. 407 (D ♀).
A. b. Mello-Leitao 1936, Ann. Ac. Brasil. Sci. 8 (3) p. 202 (D ♀).

♀ **dumicola** Simon 1906. Venezuela

A. d. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 289 (D ♀).
A. d. Mello-Leitao 1936, Ann. Ac. Brasil. Sci. 8 (3) p. 201 (D ♀).

♂♀ **exilis** Mello-Leitao 1936. Brasilien

A. e. Mello-Leitao 1936, Ann. Ac. Brasil. Sci. 8 (3) p. 198 TF. 14, 15 (D ♂♀).

♂♀ **gaujoni** Simon 1906. Ecuador

Ctenus spinipes Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 430 (D ♂).
A. g. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 290 f. 2B (D ♂♀).
A. g. Mello-Leitao 1936, Ann. Ac. Brasil. Sci. 8 (3) p. 194 (D ♂♀).

♀ **hingstoni** Mello-Leitao 1948. Brit. Guiana

A. h. Mello-Leitao 1948, An. Ac. Bras. Ci. 20 p. 172 f. 15 (D ♀).

♂♀ **impar** Dahl 1901. Paraguay, Mato Grosso

A. i. Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 188 (D ♀).
A. i. Mello-Leitao 1936, Ann. Ac. Brasil. Sci. 8 (3) p. 197 TF. 13 (D ♂♀).

♂♀ **impar pygmaeus** Strand 1909. Mato Grosso

A. i. p. Strand 1909, Zool. Jahrb. Syst. 28 (4) p. 404 (D ♂♀).

♂♀ **lineatus** Tullgren 1905. Bolivien

A. l. Tullgren 1905, Ark. Zool. 2 (19) p. 19 T. 2 F. 4 (D ♂♀).
A. l. Mello-Leitao 1936, Ann. Ac. Brasil. Sci. 8 (3) p. 191 TF. 8, 9 (D ♂♀).

O o **maculatus** Petrunkevitch 1925. Panama

A. m. Petrunkevitch 1925, Trans. Connect. Ac. Sci. 27 p. 95 (D O o).
A. m. Mello-Leitao 1936, Ann. Ac. Brasil. Sci. 8 (3) p. 203 (D O o).

♀ **mammiferus** Mello-Leitao 1939. Süd-Brasilien

A. m. Mello-Leitao 1939, Mem. Inst. Butantan 12 p. 528 TF. 11—13 (D ♀).

♂♀ **marshii** F. Cambridge 1897. Brasilien

A. m. F. Cambridge 1897, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 19 p. 103 T. 4 F. 3a, c (D ♀).
A. m. Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 186 (N).
A. m. Petrunkevitch 1910, Ann. N. York Ac. Sci. 19 (9; 2) p. 206 T. 21 F. 1 (D ♀).
A. m. Mello-Leitao 1936, Ann. Ac. Brasil. Sci. 8 (3) p. 189 TF. 4, 5 (D ♂♀).

♀ **misionesicus** Mello-Leitao 1945. Argentinien

A. m. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 4, Zool. 29 p. 256 f. 40 (D ♀).

♀ **obauratus** Simon 1906. Brasilien

A. o. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 289 f. 2C (D ♀).
A. o. Mello-Leitao 1936, Ann. Ac. Brasil. Sci. 8 (3) p. 200 (D ♀).

♂♀ **omega** (Mello-Leitao) 1929. Pernambuco

Mesoctenus o. Mello-Leitao 1929, Ann. Ac. Brasil. Sci. 1 (2) p. 101 TF. 13 (D ♀).
A. o. Mello-Leitao 1936, Ann. Ac. Brasil. Sci. 8 (3) p. 190 TF. 6, 7 (D ♂♀).

♀ **paraguayensis** Strand 1909. Paraguay

A. p. Strand 1909, Zool. Jahrb. Syst. 28 (4) p. 406 (D ♀).
A. p. Mello-Leitao 1936, Ann. Ac. Brasil. Sci. 8 (3) p. 202 (D ♀).

♀ **plebejus** Simon 1906. Amazonas, Venezuela, Peru

A. p. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 291 f. 2A (D ♀).
A. p. Mello-Leitao 1936, Ann. Ac. Brasil. Sci. 8 (3) p. 201 (D ♀).

♀ **ridleyi** F. Cambridge 1897. Pernambuco

A. r. F. Cambridge 1897, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 19 p. 103 T. 4 F. 3e (D ♀).
A. r. Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 186 (N).
A. r. Mello-Leitao 1936, Ann. Ac. Brasil. Sci. 8 (3) p. 199 TF. 17 (D ♀).

♀ **rubrotaeniatus** Mello-Leitao 1947. Brasilien

A. r. Mello-Leitao 1947, Arqu. Mus. Paranaense 6 (6) p. 268 T. 37 F. 23 (D ♀).

♂♀ **saraensis** Strand 1910. Bolivien

A. s. Strand 1910, Zool. Jahrb. Syst. 28 (4) p. 408 (D ♂♀).
A. s. Mello-Leitao 1936, Ann. Ac. Brasil. Sci. 8 (3) p. 196 (D ♂♀).

♀ **sericeus** (Mello-Leitao) 1929. Pernambuco

Mesoctenus s. Mello-Leitao 1929, Ann. Ac. Brasil. Sci. 1 (2) p. 100 TF. 11 (D ♀).
A. s. Mello-Leitao 1936, Ann. Ac. Brasil. Sci. 8 (3) p. 200 TF. 18 (D ♀).

♀ **silvicola** Soares 1946. Brasilien

A. s. Soares 1946, Pap. Avuls. S. Paulo 7 (3) p. 53 f. 1—2 (D ♀).

♂♀ **spinigerus** Keyserling 1876. – * Columbien, Guatemala, Mexico

A. s. Keyserling 1876, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 26 p. 693 T. 8 F. 60 (D ♂).
A. spiniger Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 229 (N).
A. s. F. Cambridge 1897, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 19 p. 102 T. 4 F. 3b (N ♂).
A. s. Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 187 (N).
A. s. F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 356 T. 33 F. 12, 13 (N ♂♀).
A. s. Mello-Leitao 1936, Ann. Ac. Brasil. Sci. 8 (3) p. 192 TF. 12 (D ♂♀).

♂♀ **spinipes** Keyserling 1876. Paraguay, Columbien, Venezuela, Panama, Costa Rica, Guatemala

A. s. Keyserling 1876, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 26 p. 695 T. 8 F. 61 (D ♀).
A. s. F. Cambridge 1897, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 19 p. 103 T. 4 F. 3d (D ♂).
A. s. Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 187 (N).
A. s. F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 356 T. 33 F. 14, 15 (N ♂♀).

A. s. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 290 (N ♀).
A. s. Mello-Leitao 1936, Ann. Ac. Brasil. Sci. 8 (3) p. 195 (D ♂♀).

♂♀ **spinulosus** (Mello-Leitao) 1929. Pernambuco

Mesoctenus s. Mello-Leitao 1929, Ann. Ac. Brasil. Sci. 1 (2) p. 101 TF. 12 (D ♂).
Mesoctenus s. Mello-Leitao 1936, Festschr. Strand 1 p. 25 (D ♂♀).
A. s. Mello-Leitao 1936, Ann. Ac. Brasil. Sci. 8 (3) p. 191 TF. 10, 11 (D ♂♀).
Leitanoctenus s. Soares & Camargo 1948, Bol. Mus. Paran. Goeldi 10 p. 384 (D gen. nov.).

3. Superfam. OECOBIIFORMIA

57. Fam. OECOBIIDAE

Gen. **Oecobius** Lucas 1846.

Kosmopolitische Arten:

♂♀ **annulipes** Lucas 1846. Warme Gebiete der Erde

O. a. Lucas 1846, Explor. Sci. Algér.; Zool. 1 Arachn. p. 102 T. 2 F. 2 (D ♀).
O. navus Blackwall 1859, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 4 p. 266 (D o).
O. teliger Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 221 T. 13 F. 8 (D ♂♀).
O. affinis Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 221 (D ♂♀).
O. albipunctatus Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 222 (D ♀).
O. a. Simon 1875, Arachn. de France 2 p. 9 (D ♂♀).
O. navus Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 435 T. 9 F. 1 (N).
O. a. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 247 f. 197 (N).
O. navus Kulczynski 1899, Rozpraw. Ak. Umiej. Krakow (2) 16 p. 333 T. 6 F. 12—14, 17, 18 (N ♂♀).
O. a. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 67 (D ♂♀).
O. navus Butler 1929, Proc. Soc. Victoria 24 (1) p. 49 T. 2 F. 6—10 (D ♂♀).
O. a. Berland & Millot 1940, Ann. Soc. Ent. France 108 p. 151 (N ♀).
O. navus Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 106 (N).

♂♀ **annulipes maculatus** Simon 1870. Corsica, Sizilien, Syrien, Attika, Portugal

O. a. m. Simon 1870, Mém. Soc. Sci. Liège (2) 3 p. 346 (D ♀).
O. trimaculatus Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 219 T. 13 F. 7 (D ♂♀).
O. maculatus Simon 1875, Arachn. de France 2 p. 11 T. 4 F. 20 (D ♂♀).
O. maculatus Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 244 f. 192—196 (N ♂).
O. a. m. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 67 (D ♀).
O. maculatus Machado 1949, Publ. Inst. Zool. Porto 38 p. 4 f. 1 (N ♂).

Palaearktische Arten:

§ 3 ♂, 3 ♀: Simon 1875, Arachn. de France 2 p. 7.

♂♀ **cellariorum** (Dugès) 1836. – * Mittelmeergebiet

Clotho c. Dugès 1836, Ann. Sci. Nat. (2) 6 p. 161 (D).
O. domesticus Lucas 1846, Explor. Sci. Algér.; Zool. 1 Arachn. p. 101 T. 2 F. 1 (D ♂♀).
O. jonicus Cambridge 1873, Journ. Linn. Soc. Lond. 11 (Zool.) p. 531 T. 14 F. 1 (D ♂).
O. c. Simon 1875, Arachn. de France 2 p. 7 (D ♂♀).
O. c. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 247 (N).
O. c. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 66, 67 (D ♂♀).

♂♀ **minor** Kulczynski 1909. Madeira
O. m. Kulczynski 1909, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 452 T. 22 F. 33, 36 (D ♂♀).

♂♀ **paivani** (Blackwall) 1868. Teneriffa
Clotho p. Blackwall 1868, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 2 p. 409 (D ♂♀).
O. p. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 201 (C).

♀ **sapporensis** Saito 1934. Japan
O. sapporense Saito 1934, Journ. Agr. Hokkaido Univ. 33 (5) p. 271 T. 12 F. 1; T. 14 F. 33 (D ♀).

♂♀ **similis** Kulczynski 1909. Madeira
O. s. Kulczynski 1909, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 450 T. 22 F. 34, 35 (D ♂♀).

♂♀ **templi** Cambridge 1876. Aegypten
O. t. Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 545 T. 58 F. 2 (D ♂♀).
O. t. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 286 (N).

Transgredierende Arten:

♂♀ **putus** Cambridge 1876. Aegypten, Yemen, Perim
O. p. Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 544 T. 58 F. 1 (D ♂♀).
O. p. Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 435 T. 9 F. 4 (N).
O. p. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 247 f. 200 (N).

Aethiopische Arten:

♂♀ **hortensis** Lawrence 1952. Natal
O. h. Lawrence 1952, Ann. Natal Mus. 12 (2) p. 185 u. 225 f. 5, 6, 77, 78 (D ♂♀).

♂♀ **pasteuri** Berland & Millot 1940. Senegal
O. p. Berland & Millot 1940, Ann. Soc. Ent. France 108 p. 151 f. 3 (D ♂♀).

♂♀ **petronius** Simon 1890. Yemen
O. p. Simon 1890, Ann. Soc. Ent. France (6) 10 p. 85 (D ♂♀).
O. petionius Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 435 T. 9 F. 3 (N).
O. p. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 247 f. 199 (N).

Neotropische Arten:

♂♀ **audanti** Bryant 1948. Haiti
O. a. Bryant 1948, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 100 (4) p. 344 T. 1 F. 4; T. 2 F. 10, 12 (D ♂♀).

♂♀ **beatus** Gertsch & Davis 1937. Mexico
O. b. Gertsch & Davis 1937, Amer. Mus. Novit. 961 p. 2 f. 1, 2 (D ♀).
O. b. Bryant 1948, Psyche 55 (2) p. 57 T. 9 F. 1—2 (D ♂).

O♀ **benneri** Petrunkevitch 1929. Portorico, St. Thomas, Guadeloupe, Cuba
O. b. Petrunkevitch 1929, Trans. Connect. Ac. Sci. 30 p. 75 f. 64—66 (D O ♀).
O. b. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 273 (N ♀).

♂♀ **concinnus** Simon 1892. Venezuela
O. c. Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 435 T. 9 F. 2 (D ♂♀).
O. c. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 247 f. 198 (N).

♀ **fluminensis** Mello-Leitao 1917. Brasilien
O. f. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 9, 10 (D ♀).
O. f. Mello-Leitao 1925, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 1 (6) p. 458 (N).

♀ **hammondi** Mello-Leitao 1915. Süd-Brasilien

O. h. Mello-Leitao 1915, Broteria 13 p. 131 (D ♀).
O. h. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 10 (N).

♀ **isolatus** Chamberlin 1924. Nieder-Californien

O. i. Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 584 (D ♀).
O. i. Chamberlin & Ivie 1935, Ann. Ent. Soc. Amer. 28 (2) p. 270 T. 1 F. 2 (N).

♀ **keyserlingi** Roewer 1951. Süd-Brasilien, Argentinien

Omanus maculatus Keyserling 1891, Spinn. Amer. 3 (Bras. Spinn.) p. 160 T. 5 F. 112 (D ♀) (praeocc. Simon 1875 sub **Oecobius**).
O. maculatus Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 114 (C).
O. maculatus Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 10 (N).
O. k. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 454 (nom. nov.).

♂♀ **nieborowskii** Kulczynski 1909. Costa Rica

O. n. Kulczynski 1909, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 454 T. 22 F. 30 (D ♀).
Thalamia n. Banks 1931, Nyt Mag. Naturvid. 30 p. 272 T. 2 F. 7, 8 (D ♂ o).

♂♀ **variabilis** Mello-Leitao 1917. Süd-Brasilien

O. v. Mello-Leitao 1917. Broteria 15 p. 78 (D ♂♀).
O. v. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 10 (N).

♀ **vokesi** Gertsch & Davis 1942. Mexico

O. v. Gertsch & Davis 1942, Amer. Mus. Novit. 1158 p. 19 TF. 40 (D ♀).

Transgredierende Arten:

♂♀ **parietalis** (Hentz) 1850. U. St. Amerika, Mexico, Nieder-Californien

Thalamia p. Hentz 1850, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 6 p. 35 T. 4 F. 16 (D ♀).
O. p. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 247 (N).
O. p. Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 212 T. 8 F. 1 (D ♀).
O. p. Comstock 1912, Spider Book p. 288 f. 273—275 (N).
O. p. Chamberlin & Ivie 1935, Ann. Ent. Soc. Amer. 28 (2) p. 267 T. 1 F. 1; T. 2 F. 3—10; T. 3 F. 11—21 (D ♂♀).
O. p. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 499 T. 100 F. 1865—1866; T. 101 F. 1878—1881 (D ♂♀).

Nearktische Arten:

parvus Chamberlin & Ivie 1942. Arizona

O. p. Chamberlin & Ivie 1942, Bull. Univ. Utah 32 (13), Biol. 7 (1) p. 13 (D juv.).

♂♀ **texanus** Bryant 1936. Texas, Maryland

O. t. Bryant 1936, Psyche 43 (4) p. 87 f. 1a—e (D ♂♀).
O. t. Muma 1944, Amer. Mus. Novit. 1257 p. 1 (N ♀).

Gen. **Platoecobius** Chamberlin & Ivie 1935.

♀ **floridanus** (Banks) 1896. Florida

Thalamia f. Banks 1896, Trans. Amer. Ent. Soc. 23 p. 58 (D ♀).
Oecobius f. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 114 (C).
P. f. Chamberlin & Ivie 1935, Ann. Ent. Soc. Amer. 28 (2) p. 270 T. 4 F. 22—32 (D ♀).

4. Superfam. ERESIFORMIA

58. Fam. ERESIDAE

1. Subfam. Eresinae

Gen. **Adonea** Simon 1873.

Palaearktische Arten:

♂♀ **fimbriata** Simon 1873. – * Algier, Tunis

A. f. Simon 1873, Mém. Soc. Sci. Liège (2) 5 p. 342 (158) T. 3 F. 24, 25 (D ♂).
A. capitata Simon 1876, Ann. Soc. Ent. France (5) 6 Bull. p. 86 (D ♀).
A. f. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 253 f. 202, 207 (N).
A. f. Kratochvil & Miller 1940, Vestnik 8 p. 92 f. 1, 3 (N).

Aethiopische Arten:

♂ **parva** Tucker 1920. Süd-Afrika

A. p. Tucker 1920, Ann. S. Afr. Mus. 17 (5) p. 451 T. 28 F. 2 (D ♂).

♂ **splendens** Lawrence 1936. Kalahari

A. s. Lawrence 1936, Ann. Transvaal Mus. 17 (2) p. 146 (D ♂).

♀ **variegata** Purcell 1904. Capland

A. v. Purcell 1904, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 15 (3) p. 137 T. 10 F. 7 (D ♀).
A. v. Tucker 1920, Ann. S. Afr. Mus. 17 (5) p. 451 (N ♀).

Gen. **Dorceus** C. L. Koch 1846.

Palaearktische Arten:

§ 6 Arten: Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 290.

♂♀ **albolunulatus** (Simon) 1876. Algier

Eresus a. Simon 1876, Ann. Soc. Ent. France (5) 6 Bull. p. 86 (D ♀).
D. a. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 293 (D ♂).

♂♀ **eburneus** (Simon) 1876. Algier, Tunis

Eresus e. Simon 1876, Ann. Soc. Ent. France (5) 6 Bull. p. 86 (D ♂).
D. e. Simon 1885, Arachn. in: Explor. Sci. Tunis. p. 20 (D ♂♀).
D. e. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 249 f. 205 (N).
D. e. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 292 (D ♂).

♀ **latifrons** Simon 1873. Algier

D. l. Simon 1873, Mém. Soc. Sci. Liège (2) 5 p. 344 (160) T. 3 F. 26, 27 (D ♀).

♂ **quadrispilotus** Simon 1908. Nord-Aegypten

D. q. Simon 1908, Bull. Soc. Ent. Egypt. (3) p. 82 (D ♂).
D. q. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. p. 293 (D ♂).

♂ **trianguliceps** Simon 1910. Tunis

D. t. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 292 (D ♂).

♂ **viberti** Simon 1910. Tunis

D. v. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 292 (D ♂).

Aethiopische Arten:

♂ **canicipiti** Simon 1910. West-Afrika

D. c. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 294 (D ♂).

♂ **fastuosus** C. L. Koch 1846. – * Senegal
D. f. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 15 TF. 1088 (D ♂).
D. f. C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 70 (D gen.).
Erythrophora f. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 300 (C).
D. f. Simon 1885, Ann. Soc. Ent. France (6) 5 p. 366 (D ♂).
D. f. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 254 f. 205 (N).

Gen. **Dresserus** Simon 1876.

♀ **aethiopicus** Simon 1909. Abessinien
D. a. Simon 1909, Ann. Soc. Ent. Belg. 53 p. 30 (D ♀).
D. a. Berland 1922, Voy. Rothschild Ethiop.; Rés. Sci. Anim. Artic. 1 p. 45 T. A1 F. 5 (D ♀).

♀ **angusticeps** Purcell 1904. Capland
D. a. Purcell 1904, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 15 (3) p. 139 T. 10 F. 9 (D ♀).

♂ **armatus** Pocock 1901. Uganda
D. a. Pocock 1901, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 7 p. 287 (D ♂).

♀ **bilineatus** Tullgren 1910. Ost-Afrika
D. b. Tullgren 1910, Aran. in: Sjöstedt, Kilimandj. Exped. 3 (20; 6) p. 99 T. 1 F. 9 (D ♀).

♀ **collinus** Pocock 1900. Capland
D. c. Pocock 1900, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 6 p. 323 (D ♀).

♀ **colsoni** Tucker 1920. Süd-Afrika
D. c. Tucker 1920, Ann. S. Afr. Mus. 17 (5) p. 453 T. 29 F. 4 (D ♀).

♀ **darlingi** Pocock 1900. Mashonaland
D. d. Pocock 1900, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 6 p. 322 (D ♀).

♀ **elongatus** Tullgren 1910. Ost-Afrika
D. e. Tullgren 1910, Aran. in: Sjöstedt Kilimandj. Exped. 3 (20; 6) p. 100 T. 1 F. 10 (D ♀).

♀ **fontensis** Lawrence 1928. Südwest-Afrika
D. f. Lawrence 1928, Ann. S. Afr. Mus. 25 (2) p. 221 T. 21 F. 1 (D ♀).

♀ **fuscus** Simon 1876. – * Sansibar, Ost-Afrika
D. f. Simon 1876, Ann. Soc. Ent. France (5) 6 Bull. p. 87 (D ♀).
D. f. Karsch 1886, Jahrb. Hambg. Wiss. Anst. 2 p. 134 (N ♀).
D. f. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 253 f. 206, 210 (N).
D. f. Tullgren 1910, Aran. in: Sjöstedt, Kilimandj. Exped. 3 (20; 6) p. 99 T. 1 F. 8 (N ♀).

♂♀ **inconspicuus** Strand 1906. Abessinien
D. i. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 668 (D ♂).
D. i. Strand 1908, Arch. Naturg. 74 (I; 1) p. 72 (D ♀).

♂♀ **kannemeyeri** Tucker 1920. Süd-Afrika
D. k. Tucker 1920, Ann. S. Afr. Mus. 17 (5) p. 454 T. 29 F. 5, 7c (D ♂♀).

♀ **laticeps** Purcell 1904. Capland
D. l. Purcell 1904, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 15 (3) p. 140 T. 10 F. 10 (D ♀).

o **murinus** Lawrence 1927. Südwest-Afrika
D. m. Lawrence 1927, Ann. S. Afr. Mus. 25 (1) p. 6 (D o).

♀ **namaquensis** Purcell 1908. Süd-Afrika
D. n. Purcell 1908, Denkschr. Med. Nat. Ges. Jena 13 p. 219 T. 11 F. 6 (D ♀).

♀ **nasivulva** Strand 1907. Ost-Afrika
D. n. Strand 1907, Zool. Anz. 31 (17—18) p. 526 (D ♀).
D. n. Strand 1907, Zool. Jahrb. Syst. 25 (5—6) p. 562 (D ♀).

♀ **nigellus** Tucker 1920. Süd-Afrika
D. n. Tucker 1920, Ann. S. Afr. Mus. 17 (5) p. 456 T. 29 F. 6 (D ♀).

♀ **obscurus** Pocock 1898. Natal
D. o. Pocock 1898, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 2 p. 203 T. 8 F. 8 (D ♀).

♀ **olivaceus** Pocock 1900. Capland
D. o. Pocock 1900, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 6 p. 322 (D ♀).

♂ **rostratus** Purcell 1908. Süd-Afrika
D. r. Purcell 1908, Denkschr. Med. Nat. Ges. Jena 13 p. 220 T. 11 F. 8 (D ♂).

♂♀ **schreineri** Tucker 1920. Süd-Afrika
D. s. Tucker 1920, Ann. S. Afr. Mus. 17 (5) p. 457 T. 29 F. 7A, B (D ♂♀).

♀ **schultzei** Purcell 1908. Süd-Afrika
D. s. Purcell 1908, Denkschr. Med. Nat. Ges. Jena 13 p. 220 T. 11 F. 7 (D ♀).

♀ **sericatus** Tucker 1920. Süd-Afrika
D. s. Tucker 1920, Ann. S. Afr. Mus. 17 (5) p. 459 T. 29 F. 8 (D ♀).

♂♀ **subarmatus** Tullgren 1910. Ost-Afrika, Kalahari
D. s. Tullgren 1910, Aran. in: Sjöstedt, Kilimandj. Exped. 3 (20; 6) p. 98 T. 1 F. 7 (D ♂♀).
D. s. Lawrence 1936, Ann. Transv. Mus. 17 (2) p. 146 (N ♀).

♀ **tripartitus** Lawrence 1938. Natal
D. t. Lawrence 1938, Ann. Natal Mus. 8 (3) p. 468 f. 6 (D ♀).

Gen. **Eresus** Walckenaer 1805.

Palaearktische Arten:
§ 6 ♂, 8 ♀: Simon 1873, Ann. Soc. Ent. France (5) 3 p. 340, 346.

♂♀ **albopictus** Simon 1873. Algier, Marokko
E. a. Simon 1873, Ann. Soc. Ent. France (5) 3 p. 352 T. 10 F. 12 (D ♀).
E. lucasi Simon 1873, Ann. Soc. Ent. France (5) 3 p. 353 T. 10 F. 8, 9 (D ♂♀).
E. lucasi Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 251 (N).
E. a. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 295 (D ♂).

♂ **arenarius** Kroneberg 1875. Turkestan
E. a. Kroneberg 1875, Nachr. Ges. Moskau 19 (3) p. 44 T. 5 F. 32 (D ♂).

♂♀ **cinnaberinus** (Olivier) 1789. – * Palaearktis
Aranea nigra Petagna 1787, Spec. Ins. Calabr. p. 34 (D) (praeocc. Fabricius 1775).
Aranea c. Olivier 1789, Encycl. Méthod. 4 p. 221 (D).
Aranea moniligera Villers 1789, C. Linn. Ent. Faun. Suec. 4 p. 128 T. 11 F. 8 (D ♀).

Aranea quatuorguttata Rossi 1790, Faun. Etrusc. 2 p. 135 T. 1 F. 8, 9 (D ♂).
Aranea nigra Petagna 1792, Instit. Entom. p. 437 (D ♀).
Aranea c. Walckenaer 1802, Faun. Paris. 2 p. 249 (D).
Aranea quatuorguttata Coquebert 1804, Ill. Iconogr. Ins. Decas III p. 122 T. 27 F. 12 (N ♂).
Aranea purpurata Panzer 1804, in: Schaeffer. Icon. Ins. T. 32 F. 20 (♂).
E. c. Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 21 (N).
E. ater Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 21 T. 3 F. 25, 26 (N).
E. annulatus Hahn 1820, Monogr. d. Spinn. 2 p. 1 T. B F. 5 (D ♂).
E. c. Hahn 1820, Monogr. d. Spinn. 2 p. 1 T. 5 F. A (D ♂).
E. quatuorguttatus Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 45 TF. 35 (D ♀).
E. annulatus Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 47 TF. 36 (D ♀).
Chersis dubius Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 392 (D).
E. c. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 395 (D ♂♀).
E. 4-guttatus C. L. Koch 1838, Die Arachniden 4 p. 104 TF. 316 (D ♂).
E. c. C. L. Koch 1838, Die Arachniden 4 p. 106 TF. 318 (D ♂).
E. annulatus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 14 TF. 1087 (D ♂).
E. guerinii Lucas 1846, Explor. Sci. Algér.; Zool. 1 Arachn. p. 133 T. 4 F. 10 (D ♂).
E. fulvus Rossi 1846, Haidinger Naturw. Abh. 1 p. 7 (D ♂).
E. kollari Rossi 1846, Haidinger Naturw. Abh. 1 p. 7 (D ♀).
Erythrophorus annulatus C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 71 (N).
Erythrophorus 4-guttatus C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 71 (N)
Erythrophorus c. C. L. Koch, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 71 (N).
E. c. Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 46 T. 3 F. 23 (D ♂♀).
Chersis niger Canestrini & Pavesi 1868, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 11 p. 812 (N).
E. c. Simon 1873, Ann. Soc. Ent. France (5) 3 p. 343 (D ♂).
E. c. Cambridge 1879, Proc. Dorset F. Cl. 1 p. 45 (D ♂♀).
E. ruficapillus Herman 1879, Ungarns Spinn. Faun. 3 p. 293 (D ♂).
E. c. Hansen 1885, in: Schiödte, Zool. Danica p. 130 T. 3 F. 9 (D ♂♀).
E. niger Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 152 T. 6 F. 22 (D ♂♀).
E. niger Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 251, 254 f. 203, 204, 209 (N ♂♀).
E. c. Becker 1896, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 12 p. 2 T. 1 F. 1 (D ♂♀).
E. niger Bösenberg 1903, Zoologica 14 (5—6) p. 411 T. 39 F. 606 (D ♂♀).
E. niger Kulczynski 1903, S. B. Ak. Wiss. Wien 112 (1) p. 637 T. 1 F. 1, 2 (N ♂).
E. niger Strand 1908, Arch. Naturg. 74 (I; 1) p. 73 (N ♀).
E. niger Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 32 (D ♂♀).
E. niger (typicus) Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 296 (D ♂).
E. niger Berland 1913, Arch. Zool. Expér. Gén. 51 (Not. & Rev. 2) p. 39 f. 38—41 (N).
E. niger Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 69 (D ♂♀).
E. niger Reimoser 1931, Die Natur (Wien) 7 (3) p. 59 f. 2 (N ♂♀).
E. niger Giltay 1932, Bull. Mus. Hist. Nat. Belg. 8 (22) p. 11 f. 5 (N ♂).
E. niger Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders I p. 50 f. 15 A, 19 (D ♂♀).
E. niger Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 71 f. 155—162 (D ♂♀).

♂ **cinnaberinus bifasciatus** (Ermolajew) 1937. Altai-Gebirge

E. niger b. Ermolajew 1937, Festschr. Strand 3 p. 599, 606 f. 1 (D ♂).

♀ **cinnaberinus frontalis** (Latreille) 1819. Spanien

E. niger f. Latreille 1819, Nouv. Dict. Hist. Nat. 10 p. 393 (D).
E. imperialis Dufour 1820, Ann. Gén. Sci. Phys. 4 p. 357 T. 69 F. 2 (D ♀).
E. frontalis Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 396 (D ♀).
E. imperialis Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 397 (D ♀).
E. frontalis Simon 1873, Ann. Soc. Ent. France (5) 3 p. 349 (D ♀).
E. niger f. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 297 (D ♀).
E. niger f. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 70 (N ♀).
E. frontalis Bacelar 1936, Bull. Portug. Sci. Nat. 12 (24) p. 180 f. 1 (D ♀).

♀ **cinnaberinus ignicomus** (Simon) 1914. Corsica
E. ruficapillus Simon 1873, Ann. Soc. Ent. France (5) 3 p. 351 T. 10 F. 13 (D ♀).
E. niger i. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 70, 71 (D ♀).

♂ **cinnaberinus illustris** (C. L. Koch) 1838. Ungarn
E. illustris C. L. Koch 1838, Die Arachniden 4 p. 105 TF. 317 (D ♂).
Erythrophorus illustris C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 71 (N).
E. niger i. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 297 (D ♂).

♂ **cinnaberinus latefasciatus** Simon 1910. Algier
E. niger l. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 297 (D ♂).

♀ **cinnaberinus tricolor** (Simon) 1873. Corsica
E. tricolor Simon 1873, Ann. Soc. Ent. France (5) 3 p. 348 T. 10 F. 10, 11 (D ♀).
E. niger t. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 69 (D ♀).

♂ **granosus** Simon 1895. Peking, Sibirien
E. g. Simon 1895, Bull. Ac. Sci. St. Petersbg. 5 (2) p. 331 (D ♂).
E. g. Ermolajew 1928, Arch. Naturg. 92 (A; 7) p. 100 f. 3 (D ♂).

♂ **lautus** Simon 1873. Syrien, Ins. Rhodos
E. l. Simon 1873, Mém. Soc. Sci. Liège (2) 5 p. 340 (156) (D ♂).

♀ **petagnae** Audouin 1827. Aegypten, Syrien
E. p. Audouin 1827, Explic. Planch. Arachn. Savigny Descr. Egypt. p. 374 T. 4 F. 11 (D ♀).

♀ **pharaonis** Walckenaer 1837. Aegypten
E. p. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 396 (D ♀).
Erythrophora p. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 300 (C).
E. p. Simon 1908, Bull. Soc. Ent. Egypt. (3) 83 (D ♀).
E. p. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 298 (D ♀).

♀ **robustus** Franganillo 1918. Spanien
E. r. Franganillo 1918, Bol. Soc. Ent. Espan. 1 p. 122 (D ♀).

♂ **rotundiceps** Simon 1873. Ukraine, Turkestan
E. r. Simon 1873, Ann. Soc. Ent. France (5) 3 p. 344 (D ♂).

♀ **ruficapillus** C. L. Koch 1846. Istrien, Dalmatien, Sizilien
E. r. C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 4 TF. 1080 (D ♀).

♂ **sedilloti** Simon 1881. Spanien, Portugal
E. s. Simon 1881, An. Soc. Espan. Hist. Nat. 10 p. 133 (D ♂).
E. s. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 251 (N).
E. s. Bacelar 1936, Bull. Portug. Sci. Nat. 12 (24) p. 181 f. 2, 3 (D ♂).

♂ **semicanus** Simon 1908. Algier, Tunis
E. s. Simon 1908, Bull. Soc. Ent. Egypt. (3) p. 83 (D ♂).
E. s. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 294 f. 5 (D ♂).

♂ **solitarius** Simon 1873. Algier, Portugal
E. s. Simon 1873, Mém. Soc. Sci. Liège (2) 5 p. 338 (154) (D ♂).
E. s. Bacelar 1936, Bull. Portug. Sci. Nat. 12 (24) p. 182 f. 4 (D ♂).

♂ **tristis** Kroneberg 1875. Turkestan
E. t. Kroneberg 1875, Nachr. Ges. Moskau 19 (3) p. 44 T. 4 F. 31 (D ♂).

♂♀ **walckenaeri** Brullé 1832. Östl. Mittelmeergebiet, Turkestan

E. w. Brullé 1832, Expéd. Sci. Morée 3 p. 54 T. 28 F. 4 (D ♀).
E. audouinii Brullé 1832, Expéd. Sci. Morée 3 p. 54 T. 28 F. 10 (D ♂).
E. theis Brullé 1832, Expéd. Sci. Morée 3 p. 54 T. 28 F. 11 (D ♀).
E. ctenizoides C. L. Koch 1836, Die Arachniden 3 p. 19 TF. 176 (D ♀).
E. luridus C. L. Koch 1836, Die Arachniden 3 p. 200 TF. 177 (D ♀).
E. w. Waldkenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 398 (D ♂♀).
E. puniceus C. L. Koch 1838, Die Arachniden 4 p. 102 TF. 315 (D ♂).
E. moerens C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 1 TF. 1078 (D ♀).
E. pruinosus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 3 TF. 1079 (D ♀).
E. siculus Lucas 1864, Ann. Soc. Ent. France (4) 4, Bull. p. 28 (D ♀).
Erythrophora punicea Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 300 (C).
E. puniceus Simon 1873, Ann. Soc. Ent. France (5) 3 p. 345 (D ♀).
E. w. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 248 f. 201 (N ♂).
E. w. Kulczynski 1903, S. B. Ak. Wiss. Wien 112 (1) p. 636 T. 1 F. 2 (N ♂).
E. w. Giltay 1932, Bull. Mus. Hist. Nat. Belg. 8 (22) p. 12 f. 6 (N ♂).

Aethiopische Arten:

§ 4 Arten: Tucker 1920, Ann. S. Afr. Mus. 17 (5) p. 450.

♂ **albomarginatus** Lucas 1864. Senegal

E. a. Lucas 1864, Ann. Soc. Ent. France (4) 4, Bull. p. 29 (D ♂).

♂ **bicolor** Cambridge 1869. Damaraland

E. b. Cambridge 1869, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 3 p. 70 T. 6 F. 66—69 (D ♂).

♂♀ **depressus** Tucker 1920. Süd-Afrika

E. d. Tucker 1920, Ann. S. Afr. Mus. 17 (5) p. 445 T. 29 F. 2 (D ♂♀).

♀ **echinatus** Purcell 1908. Süd-Afrika

E. e. Purcell 1908, Denkschr. Med. Nat. Ges. Jena 13 p. 223 (D ♀).
E. e. Tucker 1920, Ann. S. Afr. Mus. 17 (5) p. 447 (N ♀).

♂♀ **fumosus** C. L. Koch 1838. Capland

E. f. C. L. Koch 1838, Die Arachniden 4 p. 100 TF. 314 (D ♀).
E. bubo L. Koch 1865, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 15 p. 878 (D ♀).
E. bubo L. Koch 1878, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1028 T. 90 F. 4 (D ♀).
E. bubo Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 252 (N) (nec: Austral.).
E. bubo Strand 1907, Zool. Jahrb. Syst. 24 (5) p. 404 (D ♀).
E. f. Tucker 1920, Ann. S. Afr. Mus. 17 (5) p. 448 T. 29 F. 2c, 3 (D ♂♀).

♀ **inornatus** Pocock 1898. Ost-Afrika

E. i. Pocock 1898, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 2 p. 433 T. 13 F. 1 (D ♀).

♀ **namaquensis** Purcell 1908. Süd-Afrika

E. n. Purcell 1908, Denkschr. Med. Nat. Ges. Jena 13 p. 221 T. 11 F. 9 (D ♀).

♀ **pulchellus** Lucas 1864. Nubien

E. p. Lucas 1864, Ann. Soc. Ent. France (4) 4, Bull. p. 29 (D ♀).

♀ **purcelli** Tucker 1920. Süd-Afrika

E. p. Tucker 1920, Ann. S. Afr. Mus. 17 (5) p. 445 T. 29 F. 1 (D ♀).

♀ **spenceri** Pocock 1900. Capland

E. s. Pocock 1900, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 6 p. 322 (D ♀).

Neotropische Arten:

♂ **annulipes** Lucas 1856. Brasilien

E. a. Lucas 1856, Arachn. in: Castelnau, Expéd. Amer. d. Sud. p. 21 (D ♂).

Gen. **Seothyra** Purcell 1903.

♀ **fasciata** Purcell 1904. Capland

S. f. Purcell 1904, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 15 (3) p. 138 T. 10 F. 8 (D ♀).

♂ **perelegans** Simon 1906. Süd-Afrika

S. p. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 307 (D ♂).

♂♀ **schreineri** Purcell 1903. – * Capland

S. s. Purcell 1903, Ann. S. Afr. Mus. 3 (1) p. 32 T. 1 F. 5—7 (D ♂♀).
S. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (2) p. 979 (N).

♂ **semicoccinea** Simon 1906. Süd-Afrika

S. s. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 307 (D ♂).

Gen. **Stegodyphus** Simon 1873.

Palaearktische Arten:

♂♀ **lineatus** (Latreille) 1817. Mittelmeergebiet, Mesopotamien, Turkestan

Eresus l. Latreille 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat. 10 p. 393 (D ♀).
Eresus acanthophilus Dufour 1820, Ann. Gén. Sci. Phys. 6 p. 302 T. 95 F. 3, 4 (D ♂♀).
Eresus acanthophilus Waldkenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 399 T. 11 F. 1 (D ♂♀).
Eresus unifasciatus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 5 TF. 1081 (D ♀).
Eresus adspersus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 8 TF. 1083 (D ♀) (in TF. **fuscifrons**).
Eresus lituratus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 11 TF. 1085 (D ♀).
S. **adspersus** Simon 1873, Ann. Soc. Ent. France (5) 3 p. 337 (N).
S. **molitor** Simon 1873, Ann. Soc. Ent. France (5) 3 p. 338 (N).
S. **l.** Pavesi 1876, Ann. Mus. Civ. Genova 8 p. 443 (N).
S. **l.** Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 253 f. 208 (N).
S. **l.** Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 286 f. 4 A (N ♂).
S. **l.** Bacelar 1929, Bull. Portug. Sci. Nat. 10 (21) p. 252 f. 6, 7 (N ♂♀).

♀ **lineatus deserticola** Simon 1908. Nord-Afrika

S. **l. d.** Simon 1908, Bull. Soc. Ent. Egypt. (3) p. 79 (D).
S. **l. d.** Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 287 (D ♀).

quadrioculatus Franganillo 1925. Andalusien

S. **q.** Franganillo 1925, Bol. Soc. Ent. Espan. 8 p. 38 (D).
S. **q.** Franganillo 1926, Bol. Soc. Ent. Espan. 9 p. 75 (D).

Transgredierende Arten:

♂♀ **dufourii** (Audouin) 1827. Nord-Afrika, Abessinien, Arabien

Eresus d. Audouin 1827, Explic. Planch. Arachn. Savigny Descr. Egypt. p. 376 T. 4 F. 12 (D ♀).
Eresus d. Waldkenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 400 (D ♀).
Eresus molitor C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 7 TF. 1082 (D ♀).
Eresus fuscifrons C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 9 TF. 1084 (D ♀) (in TF. **adspersus**).
Eresus semicinctus C. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 12 TF. 1086 (D ♂).
S. **d.** Simon 1885, Arachn. in: Explor. Sci. Tunis. p. 19 (D ♀).
S. **semicinctus** Strand 1906, Jahresh. Ver. Nat. Württbg. 62 p. 37 (D ♂).
S. **molitor** Strand 1908, Arch. Naturg. 74 (I; 1) p. 69 (N ♀).
S. **d.** Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 287 f. 4 A (N ♂).

♀ **niloticus** Simon 1908. Aegypten, West-Afrika
S. n. Simon 1908, Bull. Soc. Ent. Egypt. (3) p. 80 (D ♀).
S. n. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 288 (D ♀).

Aethiopische Arten:

♀ **affinis** Tullgren 1910. Ost-Afrika
S. a. Tullgren 1910, Aran. in: Sjöstedt, Kilimandj. Exped. 3 (20; 6) p. 97 (D ♀).

♀ **africanus** (Blackwall) 1866. Abessinien, Ost-Afrika
Eresus a. Blackwall 1866, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 18 p. 453 (D ♀).
S. lineifrons Pocock 1898, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 516 T. 42 F. 13 (D ♀).
S. a. Strand 1908, Arch. Naturg. 74 (I; 1) p. 69 (D ♀).

♂♀ **assomptioni** Berland & Millot 1940. Elfenbeinküste, Franz. Sudan
S. a. Berland & Millot 1940, Ann. Soc. Ent. France 108 p. 159 f. 11, 12 (D ♂♀).

o **bettoni** Pocock 1898. Ost-Afrika
S. b. Pocock 1898, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 517 (D o).

♀ **canus** Purcell 1904. Capland
S. c. Purcell 1904, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 15 (3) p. 134 T. 10 F. 5 (D ♀).

♂ **corallipes** Simon 1906. Madagascar
S. c. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 305 (D ♂).

♂♀ **deserticola** Purcell 1908. Kalahari
S. d. Purcell 1908, Denkschr. Med. Nat. Ges. Jena 13 p. 217 T. 11 F. 5 (D ♂♀).
S. d. Tucker 1920, Ann. S. Afr. Mus. 17 (5) p. 452 (N ♂♀).

♂♀ **dumicola** Pocock 1898. Natal, Capland, Portug. Ost-Afrika
S. d. Pocock 1898, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 2 p. 201 T. 8 F. 7 (D ♂♀).
S. d. Pocock 1902, Proc. Zool. Soc. Lond. (2) p. 144 (N).
S. d. (?=**annulipes**) Strand 1907, Zool. Jahrb. Syst. 25 (5—6) p. 559 (D ♀).
S. d. Lawrence 1927, Ann. S. Afr. Mus. 25 (1) p. 4 T. 1 F. 1 (N ♀).

♀ **duodimidiavittatus** Strand 1906. Abessinien
S. d. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 667 (D ♀).
S. d. Strand 1908, Arch. Naturg. 74 (I; 1) p. 70 T. 2 F. 5a (D ♀).

♂ **filimaculatus** Lawrence 1927. Südwest-Afrika
S. f. Lawrence 1927, Ann. S. Afr. Mus. 25 (1) p. 4 T. 3 F. 56 (D ♂).

♂♀ **hildebrandti** (Karsch) 1878. Ost-Afrika
Eresus h. Karsch 1878, Zeitschr. ges. Naturw. 51 p. 319 T. 8 F. 7 (D ♀).
E. h. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 251 (N).
S. h. Pavesi 1897, Ann. Mus. Civ. Genova 38 p. 180 (N ♀).
S. h. Tullgren 1910, Aran. in: Sjöstedt, Kilimandj. Exped. 3 (20; 6) p. 95 T. 1 F. 5 (D ♂♀).
S. h. Strand 1913, Arachn. I. in: Wiss. Erg. Dt. Zentr. Afr. Exped. 4 (Zool. 2) (11) p. 329 (N).
S. h. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 101 (N ♀).

♂ **luctuosus** Simon 1906. Mashonaland
S. l. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 306 (D ♂).

♂♀ **manicatus** Simon 1876. Abessinien, Centr.-Afrika, Senegal, Franz. Sudan

S. m. Simon 1876, Ann. Soc. Ent. France (5) 6 Bull. p. 87 (D ♀).
S. m. Simon 1908, Bull. Soc. Ent. Egypt. (3) p. 79 (D ♂).
S. m. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 288 f. 4 C (D ♂♀).
S. m. Berland & Millot 1940, Ann. Soc. Ent. France 108 p. 158 f. 10 (N ♂♀).

♂♀ **mimosarum** Pavesi 1883. Abessinien, Ost-Afrika, Natal

S. m. Pavesi 1883, Ann. Mus. Civ. Genova 20 p. 81 (D ♂♀).
S. **gregarius** Cambridge 1889, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 42 T. 2 F. 4, 5 (D ♂♀).
S. gregarius Pocock 1898, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 1 p. 312 (N).
S. gregarius Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 251 (N).
S. m. Simon 1909, Ann. Soc. Ent. Belg. 53 p. 30 (N).
S. m. Strand 1913, Arachn. I. in: Wiss. Erg. Dt. Zentr. Afr. Exped. 4 (Zool. 2) (11) p. 329 (N ♂♀).

♀ **sabulosus** Tullgren 1910. Ost-Afrika

S. s. Tullgren 1910, Aran. in: Sjöstedt, Kilimandj. Exped. 3 (20; 6) p. 97 T. 1 F. 6 (D ♀).

♂♀ **simoni** Giltay 1927. Belg. Congo

S. s. Giltay 1927, Rev. Zool. Bot. Afr. 15 (1) p. 105 f. 1—6 (D ♂♀).

♀ **simplicifrons** Simon 1906. Madagascar

S. s. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 306 (D ♀).
S. **gregarius simplicifrons** Strand 1907, Nyt. Mag. Naturvid. 46 (1) p. 8 (D ♀).
S. **gregarius simplicifrons** Strand 1908, Zool. Jahrb. Syst. 26 (4) p. 457 f. C (N ♀).

♂♀ **tentoriicola** Purcell 1904. Capland

S. t. Purcell 1904, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 15 (3) p. 135 T. 10 F. 6 (D ♂♀).

♂ **tibifer** Strand 1906. Ost-Afrika

S. t. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 687 (D ♂).
S. t. Strand 1907, Societ. Ent. 22 p. 65 (D ♂).

Orientalische Arten:

♂♀ **mirandus** Pocock 1899. Indien

S. m. Pocock 1899, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 12 p. 750 (D ♂♀).
S. m. Pocock 1900, Faun. Brit. Ind. Arachn. p. 209 (D ♂♀).

♂♀ **pacificus** Pocock 1900. Indien

S. p. Pocock 1900, Faun. Brit. Ind. Arachn. p. 209 (D ♂♀).
S. p. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 131 T. 11 F. 2 (N).

♀ **sarasinorum** Karsch 1891. Ceylon, Indien

S. s. Karsch 1891, Berlin. Ent. Zeitschr. 36 (2) p. 275 T. 10 F. 4 (D ♀).
S. s. Pocock 1900, Faun. Brit. Ind. Arachn. p. 209 f. 65 (D ♀).

♀ **socialis** Pocock 1900. Indien

S. s. Pocock 1900, Faun. Brit. Ind. Arachn. p. 209 (D ♀).

♂ **tibialis** (Cambridge) 1869. Indien, Burma

Eresus t. Cambridge 1869, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 3 p. 71 T. 6 F. 70, 71 (D ♂).
S. t. Simon 1884, Ann. Mus. Civ. Genova 20 p. 343 (N ♂).
S. t. Pocock 1900, Faun. Brit. Ind. Arachn. p. 210 (D ♂).

Gen. **Storkaniella** Kratochvil & Miller 1940.

♀ **janinensis** Kratochvil & Miller 1940. N.-Griechenland
S. j. Kratochvil & Miller 1940, Vestnik 8 p. 93 f. 2, 4 (D ♀).

2. *Subfam. Penestominae*

Gen. **Penestomus** Simon 1902.

♀ **planus** Simon 1902. S.-Afrika
P. p. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 Bull. p. 241 (D ♀).
P. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 980 (N).

5. *Superfam. DICTYNAEFORMIA*

59. Fam. DICTYNIDAE

Nota: Die nearktischen Dictynidae sind hier nach einer von GERTSCH brieflich mitgeteilten, erneut an den Typen erfolgten Revision ihrer Genera, Species und Synonyma gruppiert, wie sie später in einer besonderen Publikation durch „Chamberlin & Gertsch" in dem „Bull. Amer. Mus. Nat. Hist." bekanntgegeben und begründet werden sollen. Die von GERTSCH revidierten Arten sind hier mit „(G. revid.)" bezeichnet.

§ 8 Gen.: Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 34—35.
§ 13 neotrop. Gen.: Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 14.
§ 17 nearkt. Gen.: Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 5—6.
§ 4 palaearkt. Gen.: Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 76.

Gen. **Aebutina** Simon 1892.

♀ **binotata** Simon 1892. – * Brasilien
A. b. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 222 f. 165—167 (D ♀).

♀ **nigra** Mello-Leitao 1917. Brasilien
A. n. Mello-Leitao 1917, Broteria 15 p. 77 f. 22—23 (D ♀).

Gen. **Aebutinoides** Mello-Leitao 1943.

♀ **tigrinus** Mello-Leitao 1943. Cordoba
A. t. Mello-Leitao 1943, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 3, Zool. 20 p. 101 f. 1 (D ♀).

Gen. **Ajmonia** Caporiacco 1934.

♂♀ **patellaris** Caporiacco 1934. Karakorum
A. p. Caporiacco 1934, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 125 T. 1 F. 7 (D ♂♀).

Gen. **Altella** Simon 1884.

Palaearktische Arten:
§ 4 Arten: Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 280.

desertorum Simon 1910. Algier
A. d. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 280 (D).

♂ **lathysoides** Denis 1937. Algier
A. l. Denis 1937, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 1031 T. 1 F. 1 b, c (D ♂).

♀ **libyca** Denis 1947. Oase Siwah

A. l. Denis 1947, Bull. Soc. Fouad I. Ent. 31 p. 29 T. 1 F. 1 (D ♀).

♂♀ **lucida** (Simon) 1874. – * England, Frankreich, Mitteleuropa

Lethia l. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 203 (D ♀).
Lethia spinigera Cambridge 1881, Proc. Dorset. F. Cl. 2 p. 468 (D ♂).
A. spinigera Bertkau 1884, Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf. 41 p. 354 (N ♂♀).
Amphissa spinigera Cambridge 1882, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 9 p. 3 T. 1 F. 1 (D ♂).
A. spinigera Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 242 (N).
? Argenna l. Kulczynski 1898, Symbol. Faun. Aran. Austr. Infer. p. 54 T. 1 F. 4 (N ♀).
A. spinigera Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 246 T. 22 F. 354 (D ♂♀).
A. l. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 49, 62 (D ♂♀).
A. l. Denis 1947, Rev. Franç. Ent. Paris 14 (2) p. 149 f. 4 (N ♀).
A. l. Locket & Millidge 1951, Brit. Spid. I. p. 61 f. 30A, B (D ♂♀).
A. l. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 112 f. 239—241 (D ♂♀).

♀ **nielseni** Schenkel 1932. I. Oeland

A. n. Schenkel 1932, Ent. Tidskr. 53 (4) p. 206 f. 1 (D ♀).

opaca Simon 1910. Algier

A. o. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 280 (D).

♀ **rupicola** Simon 1884. Algier

A. r. Simon 1884, Bull. Soc. Zool. France 9 p. 322 (D ♀).
A. r. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 233 f. 189 (N).

♂♀ **uncata** Simon 1884. Algier

A. u. Simon 1884, Bull. Soc. Zool. 9 p. 322 (D ♂♀).

Orientalische Arten:

♀ **conglobata** Dyal 1935. Panjab

A. c. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 156 T. 14 F. 74—76, 78 (D ♀).

Gen. **Altellela** Miller 1949.

♂♀ **biuncata** Miller 1949. Mähren

A. b. Millier 1949, Rnt. Listy, Brno 12 p. 90 f. . . . (D ♂♀).

Gen. **Altellopsis** Simon 1906.

♀ **helvola** Simon 1905. Patagonien

A. h. Simon 1905, Boll. Mus. Zool. Torino 20 (511) p. 3 (D ♀).

Gen. **Analtella** Denis 1947.

♀ **brevitarsis** Denis 1947. Ost-Pyrenäen

A. b. Denis 1947, Rev. Franç. Ent. Paris 14 (2) p. 148 f. 3 (D ♀).

♀ **jubata** Denis 1947. – * Frankreich (Vendée)

A. j. Denis 1947, Rev. Franç. Ent. Paris 14 (2) p. 146 f. 1—2 (D ♀).

Gen. **Anaxibia** Thorell 1898.

♀ **caudiculata** Thorell 1898. Burma

A. c. Thorell 1898, Ann. Mus. Civ. Genova 39 p. 272 (D ♀).
A. c. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 978 (N).

Gen. **Anisacate** Mello-Leitao 1941.

♀ **fragile** Mello-Leitao 1941. Argentinien

A. f. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 114 f. 12 (D ♀).

Gen. **Archaeodictyna** Caporiacco 1928.

♂♀ **anguiniceps** (Simon) 1899. N.-Afrika

Dictyna a. Simon 1899, Ann. Soc. Ent. France 68 Bull. p. 244 f. 1—3 (D ♂♀).
Dictyna a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 974 f. 1112 (N).
A. a. Caporiacco 1928, Ann. Mus. Civ. Genova 53 p. 79 (N ♂♀).

Gen. **Argenna** Thorell 1869.

Palaearktische Arten:

§ 2 Arten: Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 159.
§ 3 ♂, 2 ♀: Roewer 1928, Tierw. Mitteleurop. 3 (6) p. 53 TF. 609—612.

♂♀ **albopunctata** (Menge) 1869. Ostpreussen

Dictyna a. Menge 1869, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 2 p. 248 T. 48 F. 148 (D ♂♀).
A. a. Bertkau 1883, Arch. Naturg. 49 (1) p. 378 (N ♀).

♀ **pallida** L. Koch 1881. Deutschland

A. p. L. Koch 1881, Abh. Nat. Ges. Görlitz 17 p. 56 T. 2 F. 8 (D ♀).
A. p. Bertkau 1883, Arch. Naturg. 49 (1) p. 377 T. 11 F. 3, 6, 7 (N).
A. p. Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 245 T. 12 F. 351 (D ♂♀).

♂♀ **patula** (Simon) 1874. (G. revid.) Europa, Nord-Afrika, Karakorum

Dictyna p. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 197 (D ♀).
Lethia p. Cambridge 1878, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 1 p. 108 (D ♀).
Dictyna crassipalpis Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 54 (D ♂♀).
A. p. Bertkau 1883, Arch. Naturg. 49 (1) p. 379 (N ♀).
A. lendlii Kulczynski 1891, in: Chyzer & Kulczynski, Aran. Hungar. 1 p. 160 T. 6 F. 30 (D ♂♀).
Protadia p. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 240 (N).
Protadia p. Jackson 1913, Trans. Nottingh. Nat. p. 20 T. 1 F. 5—7, 9 (D ♂).
Protadia p. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 48, 62 (D ♂♀).
A. crassipalpis Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 25 (C).
Protadia p. Locket & Millidge 1951, Brit. Spid. I. p. 68 f. 21 C; 29 C, D, F (D ♂♀).
A. p. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 110 f. 234—238 (D ♂♀).

♂♀ **prominula** Tullgren 1948. Lappland

A. p. Tullgren 1948, Ent. Tidskr. 69 p. 159 f. . . (D ♀).
A. p. Hackman 1950, Ent. Tidskr. 71 (3—4) p. 165 f. 1 a—g (D ♂, N ♀).

♂♀ **subnigra** (Cambridge) 1861. – * Europa

Drassus s. Cambridge 1861, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 7 p. 430 (D ♂).
A. mengei Thorell 1869, On Europ. Spid. p. 123 (D ♂♀).
Drassus s. Cambridge 1873, Trans. Linn. Soc. Lond. 28 (3) p. 439 T. 33 F. 3 (N ♂).
Ciniflo mengei Cambridge 1873, Trans. Linn. Soc. Lond. 28 (3) p. 441 T. 33 F. 7 (D ♂).
Lethia mengei Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 206 (D ♂).
Lethia s. Cambridge 1875, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 16 p. 246 (N).
Lethia albispiraculis Cambridge 1878, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 1 p. 109 T. 11 F. 1 (D ♀).

Lethia mengei Cambridge 1879, Proc. Dorset F. Cl. 1 p. 52 (D ♂).
Lethia albispiraculis Cambridge 1879, Proc. Dorset F. Cl. 1 p. 53 (D ♀).
Lethia s. Cambridge 1881, Proc. Dorset F. Cl. 2 p. 467 (D ♂).
A. albispiralis Bertkau 1883, Arch. Naturg. 49 (1) p. 378 (N ♀).
A. testacea Bertkau 1883, Arch. Naturg. 49 (1) p. 378 T. 11 F. 1, 2, 4, 5 (D ♀).
A. minima Kulczynski 1891, in: Chyzer & Kulczynski, Aran. Hungar. 1 p. 159 T. 6 F. 31 (D ♀).
A. mengei Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 242 (N).
Protadia s. Kulczynski 1898, Symbol. Faun. Aran. Austr. Infer. p. 54 T. 1 F. 5—8 (N ♂♀).
A. s. Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 245 T. 22 F. 352 (D ♂♀).
A. mengei Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 246 T. 22 F. 353 (D ♀).
Protadia s. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 25 (D ♀).
A. s. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 48, 62 (D ♂♀).
Argena s. Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 183 (N).
A. s. Casemir 1951, Deutsch. Zool. Zeitschr. 1 (1) p. 70 (N).
A. s. Locket & Millidge 1951, Brit. Spid. I. p. 67 f. 21D; 29A, B, E (D ♂♀).
A. s. Wiehle 1953, in: Dahl. Tierw. Deutschl. 42 p. 107 f. 230—233 (D ♂♀).

Neotropische Arten:

♀ **polita** (Banks) 1898. Mexico

Altella p. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 233 T. 14 F. 20 (D ♀) (G. revid.).

Nearktische Arten:

♂♀ **obesa** Emerton 1911 (G. revid.). New York, Connecticut, Utah

A. o. Emerton 1911, Trans. Connect. Ac. Sci. 16 (4) p. 399 T. 4 F. 4 (D ♂♀).
A. aktia Chamberlin & Ivie 1935, Bull. Univ. Utah 26 (4), Biol. 2 (8) p. 25 T. 12 F. 97—98 (D ♂♀) (G. revid.).
Lathys hesperus Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. p. 14 (D ♂♀) (G. revid.).
A. o. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 503 T. 102 F. 1888—90 (D ♂♀).

♀ **saphes** Chamberlin 1948. Utah

A. s. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 6 T. 1 F. 1 (D ♀) (G. revid.).

Gen. **Argennina** Gertsch & Mulaik 1936.

♀ **unica** Gertsch & Mulaik 1936. Texas

A. u. Gertsch & Mulaik 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 2 TF. 5 (D ♀) (G. revid.).

Gen. **Arushina** Caporiacco 1947.

♂ **dentichelis** Caporiacco 1947. Ost-Afrika

A. d. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 102 T. 1 F. 2 (D ♂).

Gen. **Atelolathys** Simon 1892.

♀ **varia** Simon 1892. Ceylon

A. v. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 243 (D ♀).

Gen. **Chaerea** Simon 1884.

♂♀ **maritima** Simon 1884. Algier

C. m. Simon 1884, Bull. Soc. Zool. France 9 p. 324 (D ♂♀).
C. m. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 242 (N).

Gen. **Ciniflella** Mello-Leitao 1920.

♀ **lutea** Mello-Leitao 1920. Brasilien

C. l. Mello-Leitao 1920, Rev. Soc. Brasil. Sci. 4 p. 179 (D ♀).
Altellopsis l. Mello-Leitao 1924, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 1 (4) p. 275 (D ♀).
Paraltellopsis l. Mello-Leitao 1925, Bol. Mus. Nac. R. d. Janeiro 1 (6) p. 455 (nom. nov. gen.).

Gen. **Devade** Simon 1884.

♀ **dubia** Caporiacco 1934. Karakorum

D. d. Caporiacco 1934, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 123 (D ♀).

♂♀ **hirsutissima** (Simon) 1880. Spanien, S.-Frankreich, Ungarn, N.-Afrika, Arabien

Diotima h. Simon 1880, Ann. Soc. Ent. France (5) 10, Bull. p. 55 (D ♂♀).
D. h. Simon 1884, Bull. Soc. Zool. France 9 p. 323 (N).
D. h. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 240 (N).
D. h. Chyzer & Kulczynski 1897, Aran. Hungar. 2 (b) p. 314 (D ♂♀).
D. h. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 279 (D ♂♀).
D. h. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 44, 61 (D ♂♀).

♂ **pusilla** Simon 1910. Algier

D. p. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 279 (D ♂).

Gen. **Dictyna** Sundevall 1833.

Palaearktische Arten:

§ 14 Arten: Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 177.
§ 8 nordafr. Arten: Simon 1885, Arachn. in: Explor. Sci. Tunis. p. 34.
§ 9 ♂, 8 ♀: Chyzer & Kulczynski 1892, Aran. Hungar. 1 p. 154—156.
§ 17 ♂, 18 ♀: Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 49—58.
§ 9 ♂, 10 ♀: Roewer 1928, Tierw. Mitteleurop. 3 (6) p. 51—52 TF. 580—603.
§ 8 ♂, 8 ♀: Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 76, u. 84 u. 102.

♀ **aharonii** Strand 1914. Palästina

D. a. Strand 1914, Arch. Naturg. 80 (A; 3) p. 174 (D ♀).

♂♀ **ammophila** Menge 1871. Ostpreussen, Frankreich, Balkanländer, Dongebiet

D. a. Menge 1871, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 2 p. 265 T. 50 F. 157 (D ♂♀).
D. a. L. Koch 1881, Abh. Nat. Ges. Görlitz 17 p. 57 (D ♀).
D. a. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1), p. 53, 66 f. 106 (D ♂♀).
D. amophila Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 180 f. 13 (N ♂♀).
D. a. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 86 f. 184—186 (D ♂♀).

♀ **annulata** Kulczynski 1895. Ungarn, Dalmatien, Bessarabien

D. a. Kulczynski 1895, Term. Füzet. 18 p. 32 T. 1 F. 20, 21 (D ♀).

♂♀ **armata** Thorell 1875. S.-Russland, Kaukasus, Transkaukasien

D. a. Thorell 1875, Hor. Soc. Ent. Ross. 11 p. 72 (D ♂).
D. a. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 74 (D ♂♀).

♂♀ **bicolor** Simon 1870. S.-Europa, N.-Afrika, Deutschland

D. b. Simon 1870, Mém. Soc. Liège (2) 3 p. 298 (30) (D ♀).
D. scalaris Canestrini 1873, Atti Soc. Venet. Trent. 2 (1) p. 48 (D ♂♀).
D. b. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 184 (D ♀).

D. scalaris Canestrini 1874, Atti Soc. Venet. Trent. 3 (2) p. 213 T. 8 F. 1 (N ♂).
D. b. Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 244 T. 22 F. 350 (D ♂♀).
D. b. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 52, 64 f. 102, 103 (D ♂♀).
D. b. Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 182 f. 8, 11 (N ♂♀).
D. b. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 84 f. 179—183 (D ♂♀).

♀ **bipunctata** Reimoser 1935. Kashmir

D. b. Reimoser 1935, Wiss. Erg. Niederl. Exped. Karakorum (Zool.) p. 172 f. 2 (D ♀).

♂♀ **boiorum** Simon 1881. S.-Frankreich

D. b. Simon 1881, Bull. Soc. Zool. France 6 p. 82 (D ♂♀).
D. b. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 54, 65 f. 106, 125 (D ♂♀).

♂♀ **brevidens** Kulczynski 1897. Ungarn, Frankreich, Riesengebirge, Kamtschatka

D. b. Kulczynski 1897, in: Chyzer & Kulczynski, Aran. Hungar. 2 (b) p. 312 T. 10 F. 65 (D ♂).
D. b. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 55, 57, 65 f. 112, 120 (D ♂♀).
D. b. Schenkel 1929, Ent. Meddel. 16 (6) p. 335 f. 1 (N ♀).
D. b. Schenkel 1930, Ark. Zool. 21 (15) p. 4 F. 1 (N ♂).

♂♀ **capucina** Schenkel 1936. S.-Kansu

D. c. Schenkel 1936, Ark. Zool. 29 (A; 1) p. 22 f. 5 (D ♂♀).

♂♀ **condocta** Cambridge 1876. Aegypten, Tunis

D. c. Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 556 T. 58 F. 4 (D ♂♀).
D. c. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 283 (D ♂).

♂♀ **conducens** Cambridge 1876. N.-Afrika, Obok, Erythraea

D. c. Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 556 T. 58 F. 3 (D ♂).
D. palmarum Simon 1886, Arachn. in: Explor. Sci. Tunis. p. 33 (D ♂♀).

♂♀ **consecuta** Cambridge 1872. Palästina, Turkestan, Karakorum

D. c. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 261 (D ♂).
D. c. Caporiacco 1934, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 124 T. 2 F. 1 (D ♂♀).

♀ **cronebergi** Simon 1889. Transcaspien

D. c. Simon 1889, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 39 p. 385 (D ♀).

♂♀ **cyrenaica** Caporiacco 1933. Cyrenaica

D. c. Caporiacco 1933, Ann. Mus. Civ. Genova 56 p. 314 f. 1 (D ♂♀).

♂♀ **felis** Bösenberg & Strand 1906. Japan

D. f. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 111 T. 16 F. 476 (D ♂♀).
D. f. Strand 1907, Abh. Naturf. Ges. Görlitz 25 p. 8 (N ♀).
D. f. Saito 1936, Rep. 1. Sci. Exp. Manchoukuo (5) 1 (3) p. 19, 77 f. 4; T. 4 F. 12 (N ♂♀).

♂♀ **flavescens** (Walckenaer) 1825. Europa, Palästina

Drassus f. Walckenaer 1825, Faun. Franç.; Aran. p. 179 (D ♂♀).
Theridion viride Wider 1834, Mus. Senckenbg. 1 p. 246 T. 16 F. 11 (D ♂♀).
D. variabilis C. L. Koch 1836, Die Arachniden 3 p. 29 TF. 187 (D ♀).
Drassus f. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 632 (D ♂♀).
Ergatis f. Blackwall 1841, Trans. Linn. Soc. Lond. 18 p. 608 (D ♀).
Argus f. Walckenaer 1847, Hist. Nat. Ins. Apt. 4 p. 501 (N).
Ergatis pallens Blackwall 1859, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 3 p. 94 (D ♀).

Ergatis pallens Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 145 T. 10 F. 94 (D ♀).
D. variabilis Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 42 (D ♂♀).
D. variabilis Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 54 (D ♂♀).
D. f. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 158 (D ♂♀).
D. f. Kulczynski 1899, Rozpraw. Ak. Umiej. Krakow (2) 16 p. 330 T. 6 F. 8, 9 (N ♂).
D. f. Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 241 T. 22 F. 344 (D ♂♀).
D. f. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 27 (D ♂♀).
D. f. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 51, 63 f. 101 (D ♂♀).
D. f. Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 181 f. 9b, 10 (N ♂♀).
D. f. Locket & Millidge 1951, Brit. Spid. I. p. 64 f. 28C, D, G; 27C (D ♂♀).
D. (Ergatis) f. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 83 f. 175—178 (D ♂♀).

♂♀ **foliicola** Bösenberg & Strand 1906. Japan
D. f. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 112 T. 6 F. 67; T. 16 F. 470, 471 (D ♂♀).
D. f. Strand 1918, Arch. Naturg. 82 (A; 11) p. 91 T. 2 F. 34 (N ♂).

♂♀ **gratiosa** Simon 1881. Portugal, Spanien, N.-Afrika
D. g. Simon 1881, An. Soc. Espan. Hist. Nat. 10 p. 135 (D ♀).
D. g. Simon 1885, Arachn. in: Explor. Sci. Tunis. p. 31 (D ♂♀).

♂♀ **hedini** Schenkel 1936. S.-Kansu
D. h. Schenkel 1936, Ark. Zool. 29 (A; 1) p. 14 f. 2 (D ♂♀).

♂♀ **hortensis** Simon 1870. Spanien, Frankreich, Algier
D. h. Simon 1870, Mém. Soc. Sci. Liège (2) 3 p. 296 (28) (D ♂♀).
D. viridissima Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 434, 513 (N).
D. flavecens Simon 1874, Aran. de France 1 p. 181 (D ♂♀).
D. flavescens Becker 1896, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 12 (2) p. 214 T. 14 F. 2 (D ♂♀).
D. h. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 50, 63 f. 97, 99 (D ♂♀).

♂♀ **hummeli** Schenkel 1936. S.-Kansu
D. h. Schenkel 1936, Ark. Zool. 29 (A; 1) p. 17 f. 3 (D ♂♀).

♀ **ignobilis** Kulczynski 1895. Bessarabien, Kaukasus, Armenien
D. i. Kulczynski 1895, Term. Füzet. 18 p. 31 T. 1 F. 19 (D ♀).

♂♀ **innocens** Cambridge 1872. Palästina, Syrien, Aegypten
D. i. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 262 (D ♀).
D. i. Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 555 (D ♂).
D. i. Kulczynski 1911, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 13 T. 1 F. 3 (D ♀).

♀ **jacksoni** Bristowe 1935. Griechenland, I. Delos, Patmos, Rhodos
D. j. Bristowe 1935, Proc. Zool. Soc. Lond. (4) p. 778 f. 1—3 (D ♀).
D. j. Hadjissarandos 1940, Araign. Attique p. 49 f. 16—17 (D ♂♀, griech.).

♂♀ **koziorowiczi** Simon 1873. Spanien, S.-Frankreich, Corsica, Algier
D. k. Simon 1873, Mém. Soc. Sci. Liège (2) 5 p. 330 (146) (D ♂♀).
D. k. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 188 (D ♂♀).
D. k. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 53, 64 f. 105, 124 (D ♂♀).

♂ **laeviceps** Simon 1910. Algier
D. l. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 284 (D ♂).

♂♀ **latens** (Fabricius) 1775. Europa, Mittelmeergebiet, Turkestan

Aranea l. Fabricius 1775, Syst. Ent. p. 432 (D).
Aranea l. Olivier 1789, Encycl. Méthod. 4 p. 233 (D).
D. l. C. L. Koch 1836, Die Arachniden 3 p. 29 TF. 186 (D ♀).
Ergatis l. Blackwall 1841, Trans. Linn. Soc. Lond. 18 p. 608 (D ♀).
Theridion l. Walckenaer 1841, Hist. Nat. Ins. Apt. 2 p. 340 (D ♂♀).
Argus l. Walckenaer 1847, Hist. Nat. Ins. Apt. 4 p. 501 (N).
Ergatis l. Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 149 T. 9 F. 95 (D ♀).
D. l. Westring 1862, Aran. Svec. p. 386 (D ♂♀).
D. l. Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 42 (D ♂♀).
D. globiceps Simon 1870, Mém. Soc. Sci. Liège (2) 3 p. 300 (32) T. 1 F. 24, 25 (D ♂♀).
D. lugubris Cambridge 1873, Journ. Linn. Soc. Lond. 11 (Zool.) p. 535 T. 14 F. 4 (D ♂♀).
D. l. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 192 (D ♂♀).
D. scabra Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 195 (D ♂♀).
D. l. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 54 (D ♂♀).
D. l. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 158 (D ♂♀).
D. globiceps Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 231 f. 182, 183 (N ♂).
D. l. Becker 1896, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 12 (2) p. 222 T. 14 F. 7 (D ♂♀).
D. ammophila Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 242 T. 22 F. 346 (D ♂♀).
D. koziorowiczi Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 242 T. 22 F. 347 (D ♂).
D. l. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 31 (D ♂♀).
D. l. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 52, 64 f. 104 (D ♂♀).
D. l. Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 180 f. 12 (N ♂♀).
D. l. Locket & Millidge 1951, Brit. Spid. I. p. 62 f. 25A, C (D ♂♀).
D. l. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 91 f. 198—203 (D ♂♀).

♀ **maculosa** Karsch 1879. Japan

D. m. Karsch 1879, Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf. 36 p. 96 (D ♀).

♂ **mandibulosa** Canestrini & Pavesi 1868. Venetien

D. m. Canestrini & Pavesi 1868, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 11 p. 861 (D ♂).

♂♀ **numidica** Denis 1937. Algier

D. n. Denis 1937, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 1032 T. 1 F. 1d, e (D ♂♀).

♂♀ **olivacea** Simon 1886. Algier, Tunis

D. o. Simon 1886, Arachn. in: Explor. Sci. Tunis. p. 32 (D ♂♀).

♀ **orientalis** Kulczynski 1895. Kaukasus, Armenien

D. o. Kulczynski 1895, Term. Füzet. 18 p. 34 T. 1 F. 22, 23 (D ♀).

♂ **patellaris** Simon 1910. Algier

D. p. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 281 f. 3 (D ♂).

♀ **pectita** (Sundevall) 1831. Schweden

Theridion p. Sundevall 1831, Vet. Ak. Handl. p. 124 (D ♀).
D. p. Sundevall 1833, Consp. Arachn. p. 16 (D ♀).

♀ **procera** Kulczynski 1901. China

D. p. Kulczynski 1901, in: Horvath. Zool. Erg. 3 Reis. Zichy 2 p. 322 (D ♀).

♀ **procerula** Bösenberg & Strand 1906. Japan

D. p. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 112 T. 16 F. 462 (D ♀).

♂ **psittacea** Schenkel 1936. S.-Kansu

D. p. Schenkel 1936, Ark. Zool. 29 (A; 1) p. 20 f. 4 (D ♂).

♂♀ **puella** Simon 1870. W.-Mittelmeergebiet, Madeira, Canaren, England

D. p. Simon 1870, Mém. Soc. Sci. Liège (2) 3 p. 299 (31) (D ♀).
D. p. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 180 T. 3 F. 4 (D ♀).
D. p. Kulczynski 1899, Rozpraw. Ak. Umiej. Krakow. (2) 16 p. 330 T. 6 F. 7, 10 (D ♂♀).
D. p. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 51, 64 f. 98, 99 (D ♂♀).
D. p. Locket & Millidge 1951, Brit. Spid. I. p. 64 f. 23B; 26A, B, E; 27A (D ♂♀).

♂♀ **pusilla** Thorell 1856. Europa, Madeira, Kamtschatka

D. p. Thorell 1856, Rec. Crit. Aran. Suec. Clerck p. 82 (D ♂).
D. p. Westring 1862, Aran. Svec. p. 385 (D ♂).
D. p. Thorell 1870, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 211 (N ♂).
D. p. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 187 (D ♂♀).
D. p. Cambridge 1881, Proc. Dorset F. Cl. 2 p. 426 (N).
D. p. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 158 T. 6 F. 26 (D ♂).
D. p. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 233 f. 191 (N ♂).
D. p. Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 243 T. 22 F. 348 (D ♂♀).
D. p. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 54, 58, 65 f. 107, 123 (D ♂♀).
D. p. Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 181 f. 14 (N ♂♀).
D. p. Locket & Millidge 1951, Brit. Spid. I. p. 59 f. 23D; 24C, D; 25 E (D ♂♀).
D. p. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 88 f. 187—190 (D ♂♀).

♂o **puta** Cambridge 1872. Syrien, Palästina

D. p. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 261 (D ♂o).

♂ **pygmaca** Thorell 1875. Russland

D. p. Thorell 1875, Hor. Soc. Ent. Ross. 11 p. 72 (D ♂).
D. p. Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 73 (D ♂).

♂ **schmidti** Kulczynski 1926. Kamtschatka

D. s. Kulczynski 1926, Ann. Mus. Zool. Leningrad 27 p. 37 T. 2 F. 1—3 (D ♂).

♂♀ **sedilloti** Simon 1875. Spanien, S.-Frankreich, (Bayern?)

D. s. Simon 1875, Ann. Soc. Ent. France (5) 5 Bull. p. 150 (D ♂).
D. latens Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 240 T. 22 F. 343 (D ♂♀).
D. s. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 55, 56, 65 f. 113, 117 (D ♂♀).
D. s. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 94 (N).

sedilloti deserta Simon 1910. Algier, Libyen

D. s. d. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 284 (D).

♀ **sibirica** Kulczynski 1908. Sibirien

D. s. Kulczynski 1908, Mem. Ac. Sci. St. Petersbg. (8) 18 (7) p. 6 T. 1 F. 1, 2 (D ♀).

♀ **sibirica simulans** Kulczynski 1916. Sibirien

D. s. s. Kulczynski 1916, Mem. Ac. Sci. Petrograd 28 (11) p. 1 (D ♀).

♂♀ **szaboi** Kulczynski 1891. Ungarn

D. sz. Kulczynski 1891, in: Chyzer & Kulczynski, Aran. Hungar. 1 p. 156 T. 6 F. 24 (D ♂♀).

♂♀ **terricola** Holm 1945. Lappland

D. t. Holm 1946, Ark. Zool. 36 (A; 15) p. 76 f. 25c, d; 26 (D ♂♀).

♂♀ **uncinata** Thorell 1856. Europa, Sibirien, Amurgebiet, Kamtschatka

D. u. Thorell 1856, Rec. Crit. Aran. Svec. Clerck p. 82 (D).
Ergatis arborea Cambridge 1862, Zoologist 20 p. 7960 (D ♂♀).
D. u. Westring 1862, Aran. Svec. p. 385 (D ♂♀).
D. u. Menge 1869, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 2 p. 246 T. 47 F. 144 (D ♂♀).
Ergatis u. Cambridge 1870, Trans. Linn. Soc. Lond. 27 (3) p. 414 (N).
D. u. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 191 (D ♂♀).
D. u. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 54 (D ♂♀).
D. u. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 157 T. 6 F. 25 (D ♂♀).
D. u. Becker 1896, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 12 (2) p. 217 T. 14 F. 4 (D ♂♀).
D. u. Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 241 T. 22 F. 345 (D ♂♀).
D. u. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 29 (D ♂♀).
D. u. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 55, 56, 65 f. 115, 116 (D ♂♀).
D. u. Charitonow 1925, Ann. Mus. Zool. Ac. Sci. URSS. p. 105 T. 5 F. 2 (N ♂).
D. u. Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 182 f. 16 (D ♂♀).
D. u. Locket & Millidge 1951, Brit. Spid. I. p. 61 f. 24E, F; 25E (D ♂♀).
D. u. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 98 f. 212—217 (D ♂♀).

♂♀ **vicina** Simon 1873. Süd-Europa, Ungarn

D. v. Simon 1873, Mém. Soc. Sci. Liège (2) 5 p. 332 (148) (D ♂♀).
D. v. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 192 (D ♂♀).
D. v. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 157 T. 6 F. 27 (D ♂♀).
D. v. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 55, 57, 64 f. 110, 118 (D ♂♀).
D. v. Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 182 f. 17 (N ♂♀).

♂♀ **walckenaeri** Roewer 1951. – * Europa, Nord-Afrika

Aranea viridissima Walckenaer 1802, Faun. Paris 2 p. 212 (D ♂♀) (praeocc. De Geer 1778).
Drassus viridissimus Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 46 (N).
Drassus viridissimus Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 631 (D ♂♀).
Ergatis viridissimus Blackwall 1841, Trans. Linn. Soc. Lond. 18 p. 608 (N).
Argus viridissimus Walckenaer 1847, Hist. Nat. Ins. Apt. 4 p. 501 (N).
D. viridissima Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 183 (D ♂♀).
D. viridissima Bertkau 1883, Arch. Naturg. 49 (1) p. 379 T. 11 F. 8 (N ♀).
D. viridissima Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 158 (D ♂♀).
D. viridissima Becker 1896, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 12 (2) p. 216 T. 14 F. 3 (D ♂♀).
D. viridissima Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 28 (D ♂♀).
D. viridissima Berland 1913, Arch. Zool. Expér. Gén. 51 (Not. & Rev. 2) p. 34 f. 23—26 (N ♂♀).
D. viridissima Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 51, 63 f. 100 (D ♂♀).
D. viridissima Reimoser 1932, Die Natur (Wien) 8 (3) p. 60 f. 5 (N ♂♀).
D. viridissima Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 181 f. 7, 9a (N ♂♀).
D. viridissima Locket & Millidge 1951, Brit. Spid. I. p. 64 f. 26C, D, F; 27 B (D ♂♀).
D. w. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 454 (nom. nov.)
D. w. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 77 f. 163—174 (D ♂♀).

♀ **walckenaeri vulnerata** (Simon) 1914. Niedere Pyrenäen, Bulgarien

D. viridissima v. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 51, 63 (D ♀).
D. viridissima v. Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 181 (N).

Transgredierende Arten:

♀ **albida** Cambridge 1885. Kashmir, Panjab

D. a. Cambridge 1885, Sci. Res. Sec. Yarkand Miss.; Aran. p. 29 (D ♀).
D. a. Dyal 1935, Bul. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 157 T. 14 F. 79 (D ♀).

♂♀ **annulipes** (Blackwall) 1846. Palaearktis, Nearktis

Ergatis a. Blackwall 1846, Ann. Mag. Nat. Hist. (1) 17 p. 42 (D ♂♀) (G. revid.).
Ergatis diligens Blackwall 1871, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 8 p. 434 (D ♀) (G. revid.).
D. mitis Thorell 1875, Hor. Soc. Ent. Ross. 11 p. 72 (D ♂) (G. revid.).
D. mitis Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 72 (D ♂) (G. revid.).
D. arundinaceoides Keyserling 1884, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 33 p. 665 T. 21 F. 14 (D ♀) (G. revid.).
D. muraria Emerton 1888, Trans. Connect. Ac. Sci. 7 p. 445 T. 9 F. 1 (D ♂♀) (G. revid.).
D. sublata Banks 1891, Ent. News 2 p. 85 (N) (G. revid.).
D. mitis Chyzer & Kulczynski 1897, Aran. Hungar. 2 (b) p. 312 T. 10 F. 67 (N ♂).
D. mitis Kulczynski 1898, Symbol. Faun. Aran. Austr. Infer. p. 50 T. 1 F. 1—2 (N ♀).
D. arundinaceoides Banks 1901, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 53 p. 577 (N ♂♀) (G. revid.).
D. muraria Emerton 1902, Common Spiders p. 210 f. 487 (G. revid.).
D. sublata Comstock 1912, Spider Book p. 281 f. 263—266 (N).
D. a. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 107 (C).
D. diligens Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 108 (C).
D. vigilans Gertsch & Ivie 1936, Amer. Mus. Novit. 858 p. 8 TF. 26 (D ♂) (G. revid.).
D. semota Gertsch & Ivie 1936, Amer. Mus. Novit 858 p. 11 TF. 25 (D ♂) (G. revid.).
D. muraria Kaston 1945, Amer. Mus. Novit. 1292 p. 2 TF. 7—9 (D ♂♀) (G. revid.).
D. mitis Holm 1945, Ark. Zool. 36 (A; 15) p. 73 f. 24, 25 a, b (D ♂♀).
D. emertoni Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 15 TF. 38—41 (D ♂♀) (G. revid.).
D. arundinaceoides Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 21 TF. 57—61 (D ♂♀) (G. revid.).
Emblyna mitis Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 3, 10 (N) (G. revid.).
Emblyna eugenia Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 10 T. 5 F. 47 (D ♀) (G. revid.).
D. muraria Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 506 T. 102 F. 1893; T. 103 F. 1919—26; T. 136 F. 2073—74 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **arundinacea** (Linné) 1758. Europa, Syrien, Turkestan, Sibirien, Kamtschatka, U. St. Amerika

Aranea a. Linné 1758, Syst. Nat. (10. Ed.) p. 620 (D).
Aranea a. Olivier 1789, Encycl. Méthod. 4 p. 231 (D).
Aranea benigna Walckenaer 1802, Faun. Paris. 2 p. 209 (D).
Theridion benignum Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 77 (N).
Theridion benignum Sundevall 1830, Vet. Ak. Handl. p. 122 (D ♂♀).
Clubiona parvula Blackwall 1833, Lond. Edinbg. Phil. Mag. (3) 3 p. 437 (D ♂♀).
D. benigna Sundevall 1833, Consp. Arachn. p. 16 (D ♂♀).
Drassus parvulus Blackwall 1834, Research in Zool. p. 337 (N).
D. benigna C. L. Koch 1837, Die Arachniden 3 p. 27 TF. 184, 185 (D ♂♀).
Ergatis benigna Blackwall 1841, Trans. Linn. Soc. Lond. (Zool.) 18 p. 608 (D).

Theridion benignum Walckenaer 1841, Hist. Nat. Ins. Apt. 2 p. 337 (D ♂♀).
Argus benignus Walckenaer 1847, Hist. Nat. Ins. Apt. 4 p. 500 (D).
Ergatis benigna Blackwall 1861 Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 146 T. 9 F. 93 (D ♂♀).
D. a. Westring 1862, Aran. Svec. p. 383 (D ♂♀).
D. benigna Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 42 (D ♂♀).
D. a. Menge 1869, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 2 p. 245 T. 47 F. 143 (D ♂♀).
D. a. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 191 (D ♂♀).
D. a. Cambridge 1879, Proc. Dorset F. Cl. 1 p. 49 T. 6 F. 5 (D ♂♀).
D. a. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 54 (D ♂♀).
D. a. Hansen 1885, in: Schiödte, Zool. Danica p. 120 T. 2 F. 14 (D ♂♀).
D. a. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 158 T. 6 F. 23 (D ♂♀).
D. a. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 241 (N).
D. a. Becker 1896, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 12 (2) p. 220 T. 14 F. 6 (D ♂♀).
D. a. Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 243 T. 22 F. 349 (D ♂♀).
D. a. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 30 (D ♂♀).
D. a. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 55, 58, 65 f. 108, 122 (D ♂♀).
D. a. Charitonow 1925, Annu. Mus. Zool. Ac. Sci. URSS p. 104 T. 5 F. 1 (D ♂).
D. a. Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 181 f. 15 (N ♂♀).
D. voluta Gertsch & Ivie 1936, Amer. Mus. Novit. 858 p. 10 TF. 28 (D ♂♀) (G. revid.).
D. a. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 11 (N ♂♀) (G. revid.).
D. a. Locket & Millidge 1951, Brit. Spid. I. p. 58 f. 23 A, C; 24 A; 25 D (D ♂♀).
D. a. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 89 f. 191—197 (D ♂♀).

♂♀ **civica** (Lucas) 1850. Europa, Nord-Afrika, Nord-Amerika, Macronesien

Theridion c. Lucas 1850, Ann. Soc. Ent. France (2) 8 p. 181 T. 6 F. 5 (D ♀).
Eucharium civile Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 168 (C).
D. c. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 189 (D ♂♀).
D. putetorum Simon 1885, Arachn. in: Explor. Sci. Tunis. p. 32 (D ♂).
D. c. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 157 T. 6 F. 28 (D ♂♀).
D. c. Becker 1896, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 12 (2) p. 219 T. 14 F. 5 (D ♂♀).
D. c. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 29 (D ♂♀).
D. c. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 55, 57, 64 f. 111, 119 (D ♂♀).
D. c. Schenkel 1927, Rev. Suisse Zool 34 (14) p. 234 f. 1 (N ♀).
D. c. Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 183 f. 18 (N ♂♀).
D. c. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 94 f. 204—211 (D ♂♀).

♂♀ **major** Menge 1869. Nord- u. Mittel-Europa, Kamtschatka, Grönland, Alaska, Canada, nördl. U. St. Amerika

D. m. Menge 1869, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 2 p. 247 T. 48 F. 147 (D ♂).
D. hamifera Thorell 1872, Oefers. Vet. Ak. Förhandl. 29 (2) p. 156 (D ♂♀).
D. cognata Cambridge 1885, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 16 p. 237 T. 9 F. A (D ♂).
D. arenicola Cambridge 1894, Proc. Phys. Soc. Edinbg. 12 p. 589 T. 12 F. 1—2 (D ♂♀).
D. hamifera Soerensen 1898, Vidensk. Meddel. 1 p. 218 (N).
D. m. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 55, 57, 65 f. 114, 121 (D ♂♀) (G. revid.).
D. hamifera Emerton 1918, Vid. Meddel. Dansk. Nat. Foren. 70 p. 144 f. 3—6 (N ♂) (G. revid.).
D. vincens Chamberlin 1919, Ann. Soc. Ent. Amer. 12 p. 243 T. 15 F. 1—2 (D ♂♀).
D. m. Schenkel 1930, Ark. Zool. 21 (15) p. 5 (N ♀).
D. m. Jackson 1934, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 14 p. 612 T. 18 F. 1 (N ♀).
D. m. u. **hamifera** Braendegaard 1940, Meddel. Grönland 125 (8) p. 7—8 f. 1—6 (N ♂♀).

D. m. Chamberlin & Ivie 1947, Bull. Univ. Utah 37 (10), Biol. 10 (3) p. 15 (N ♂♀) (G. revid.).
D. chenea Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 7 T. 1 F. 2 (D ♀) (G. revid.).
D. clackamas Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (10), Biol. 10 (6) p. 7 T. 6 F. 66 (D ♀) (G. revid.).
D. m. Locket & Millidge 1951, Brit. Spid. I. p. 60 f. 23 E; 25 B, F (D ♂♀).
D. m. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 100 f. 218—221 (D ♂♀).

Aethiopische Arten:

♀ **abyssinica** Strand 1906. Abessinien
D. a. Strand 1906, Zool. Anz. 30 (19—20) p. 667 (D ♀).
D. a. Strand Arch. Naturg. 74 (1; 1) p. 15 T. 2 F. 14, 15; p. 67 T. 2 F. 7 a (D ♀).

O♀ **capicola** Strand 1909. Capland
D. c. Strand 1909, Dt. Südpol. Exp. 1901—03, 10 (5) Zool. 2 p. 548 (D O ♀).

♂♀ **gertschi** Berland & Millot 1940. Senegal
D. g. Berland & Millot 1940, Ann. Soc. Ent. France 108 p. 152 f. 4 (D ♂♀).

♂♀ **longipes** Berland 1914. Ost-Afrika
D. l. Berland 1914, Aran. I. in: Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Orient. p. 55 f. 12—18 (D ♂♀).
D. l. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 325 f. 4 (N ♂♀).

♂♀ **montana** Tullgren 1910. Ost-Afrika
D. m. Tullgren 1910, Aran. in: Sjöstedt, Kilimandj. Exped. 3 (20; 6) p. 94 T. 1 F. 4 (D ♂).
D. m. Caporiacco 1949, Comment, Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 324 (N ♂♀).

♂♀ **peteri** Lessert 1933. Angola
D. p. Lessert 1933, Rev. Suisse Zool. 40 (4) p. 89 f. 2—4 (D ♂♀).

♂♀ **sexnotata** Simon 1890. Yemen
D. s. Simon 1890, Ann. Soc. Ent. France (6) 10 p. 86 (D ♂♀).

♂♀ **suedicola** Simon 1890. Yemen
D. s. Simon 1890, Ann. Soc. Ent. France (6) 10 p. 86 (D ♂♀).

♂ **tullgreni** Caporiacco 1949. Kenya
D. t. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 324 f. 3 (D ♂).

Orientalische Arten:

♂ **bispinosa** Simon 1906. Burma
D. b. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 304 (D ♂).

♀ **grammica** Simon 1893. Luzon
D. g. Simon 1893, Ann. Soc. Ent. France 62 p. 70 (D ♀).

♀ **grossa** Simon 1906. Indien
D. g. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 306 (D ♀).

♀ **kandiana** Simon 1906. Ceylon
D. k. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 304 (D ♀).

♂♀ **marakata** Sherriffs 1927. Indien
D. m. Sherriffs 1927, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 19 p. 536 f. 1, 2 (D ♂♀).

♂♀ **nigricauda** Simon 1905. Ceylon
D. n. Simon 1905, Ann. Soc. Ent. France 74 p. 165 f. 1 (D ♂♀).

♂♀ **pictithorax** Kulczynski 1908. Java
D. p. Kulczynski 1908, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 575 T. 23 F. 27—29 (D ♂♀).

♂♀ **smaragdula** Simon 1905. Ceylon
D. s. Simon 1905, Ann. Soc. Ent. France 74 p. 166 f. 2 (D ♂♀).

♀ **turbida** Simon 1905. Indien
D. t. Simon 1905, Ann. Soc. Ent. France 74 p. 165 (D ♀).

♂♀ **velifera** Simon 1906. Indien
D. v. Simon 1906, Am. Soc. Ent. Belg. 50 p. 304 (D ♂♀).

Australische Arten:

♂ **anaulax** Simon 1908. West-Australien
D. a. Simon 1908, Faun. S. W. Austral. 1 (12) p. 379 (D ♂).

♂♀ **bifasciata** L. Koch 1872. Samoa
D. b. L. Koch 1872, Arachn. Austral. 1 (1) p. 323 T. 26 F. 1 (D ♂).
D. b. Berland 1929, Insect. Samoa 8 (2) p. 42 f. 1 (D ♀).

♀ **colona** Simon 1906. Neu-Caledonien
D. c. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 303 (D ♀).

♂♀ **cornigera** Dalmas 1917. Neu-Seeland
D. c. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 336 f. 9—12 (D ♂♀).
D. c. Chamberlain 1946, Rec. Auckl. Inst. Mus. 3 (2) p. 92 (D ♀).

♀ **nigella** Dalmas 1917. Neu-Seeland
D. n. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 338 f. 13 (D ♀).

♀ **urquharti** Roewer 1951. Neu-Seeland
Linyphia decolora Urquhart 1893, Trans. N. Zeal. Inst. 26 p. 208 (D ♀) (praeocc. Westring 1862).
D. decolora Bryant 1933, Rec. Canterbury Mus. 4 (1) p. 2 (D ♀).
D. decolora Chamberlain 1946, Rec. Auckl. Inst. Mus. 3 (2) p. 92 (N).
D. u. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 454 (nom. nov).

Neotropische Arten:

♂♀ **albicoma** Simon 1892. Venezuela
D. a. Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 432 (D ♂♀).

♀ **albovittata** Keyserling 1880. Peru
D. a. Keyserling 1880, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 30 p. 570 T. 16 F. 17 (D ♀).

♂♀ **alyceae** Chickering 1950. Panama
D. a. Chickering 1950, Pap. Michig. Ac. Sci. 34 p. 85 f. 1—5 (D ♂♀) (G. revid.).

♂ **andesiana** Berland 1913. Ecuador
D. a. Berland 1913, Araign. in: Miss. Mes. Mérid. Equat. 10 (1) p. 84 T. 7 F. 7—10 (D ♀).

♂ **cafayate** Mello-Leitao 1941. Nord-Argentinien
D. c. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 113 T. 3 F. 8; f. 11 (D ♀).

♂♀ **cambridgei** Gertsch & Ivie 1936. Mexico
D. c. Gertsch & Ivie 1936, Amer. Mus. Novit. 858 p. 10 TF. 22—24 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **capens** (Chamberlin) 1948. Florida
Emblyna c. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 9 T. 5 F. 58; T. 6 F. 65 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **cavata** Jones 1947. Cuba, Florida
D. c. Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 17 TF. 42—46 (D ♂♀).

♂♀ **columbiana** Becker 1886. Columbien, Venezuela
D. c. Becker 1886, Ann. Soc. Ent. Belg. 30 C. R. p. 34 (D ♀).
D. c. Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 432 (D ♂♀).

♂♀ **donaldi** Chickering 1950. Panama
D. d. Chickering 1950, Pap. Michig. Ac. Sci. 34 p. 90 f. 6—9 (D ♂♀) (G. revid.).

♂ **estebanensis** Simon 1906. Venezuela
D. e. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 305 (D ♂).

♀ **flavovittata** Keyserling 1880. Peru
D. f. Keyserling 1880, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 30 p. 571 T. 16 F. 18 (D ♀).

♀ **fluminensis** Mello-Leitao 1924. Brasilien
D. f. Mello-Leitao 1924, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 1 (4) p. 276 (D ♀).

♂♀ **fuegiana** Simon 1895. Feuerland, Patagonien
D. f. Simon 1895, An. Mus. Buenos Aires 4 p. 168 (D ♀).
D. f. Simon 1904, Ann. Soc. Ent. Belg. 48 p. 84 (D ♂♀).

♀ **guanica** Gertsch 1946. Portorico, Haiti
D. parietalis Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 30 p. 163 f. 1—3 (D ♀) (G. revid.).
D. g. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 12 (D ♀).
D. g. Bryant 1948, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 100 (4) p. 372 T. 7 F. 61 (D ♀) (G. revid.).

♂ **guerrerensis** Gertsch & Davis 1937. Mexico
D. g. Gertsch & Davis 1937, Amer. Mus. Novit. 961 p. 12 TF. 10—11 (D ♂) (G. revid.).

♂♀ **incredula** Gertsch & Davis 1937. Mexico
D. i. Gertsch & Davis 1937, Amer. Mus. Novit. 961 p. 13 TF. 12—14 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **jacalana** Gertsch & Davis 1937. Mexico
D. j. Gertsch & Davis 1937, Amer. Mus. Novit. 961 p. 18 TF. 22—24 (D ♂♀) (G. revid.).
D. chilapa Gertsch & Davis 1942, Amer. Mus. Novit. 1158 p. 15 TF. 30 (D ♀) (G. revid.).

♂♀ **latifemur** Soares & Camargo 1948. Brasilien
D. l. Soares & Camargo 1948, Bol. Mus. Paran. Goeldi 10 p. 357 f. 5—6 (D ♂♀).

♂ **lecta** Chickering 1951. Panama
D. l. Chickering 1951, Psyche 58 (4) p. 150 f. 1 (D ♂) (G. revid.).

♀ **mandibularis** Taczanowski 1874. Guiana, Brasilien

D. m. Taczanowski 1874, Hor. Soc. Ent. Ross. 10 p. 62 (D ♀).
D. m. Keyserling 1880, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 30 p. 574 T. 16 F. 21 (D ♀).

♂♀ **meditata** Gertsch 1936. Mexico, Honduras, Costa Rica, Panama, Cuba

D. m. Gertsch 1936, Amer. Mus. Novit. 852 p. 5 TF. 8 (D ♂) (G. revid.).
D. flavipedes Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 299 T. 4 F. 59; T. 5 F. 60—61 (D ♂) (G. revid.).
D. m. Chickering 1950, Pap. Michig. Ac. Sci. 34 p. 93 (N ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **micro** Chamberlin & Ivie 1944. Florida

D. m. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 119 TF. 175—177 (D ♂♀) (G. revid.).
Phantyna m. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 15 T. 4 F. 39—41 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **miniata** Banks 1898. Mexico, Nieder-Californien

D. m. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 233 T. 14 F. 25 (D ♂) (G. revid.).
D. parcita Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 583 f. 11 (D ♀) (G. revid.).

♀ **montezuma** Gertsch & Davis 1942. Mexico

D. m. Gertsch & Davis 1942, Amer. Mus. Novit. 1158 p. 14 TF. 32 (D ♀) (G. revid.).

♀ **navajoa** Gertsch & Davis 1942. Mexico

D. n. Gertsch & Davis 1942, Amer. Mus. Novit. 1158 p. 16 TF. 38 (D ♀) (G. revid.).

♀ **novempunctata** Simon 1892. Venezuela

D. n. Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 433 (D ♀).

♂♀ **parietalis** Cambridge 1896. Mexico, Costa Rica, Galapagos-Ins.

D. p. Cambridge 1896, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 171 T. 21 F. 5—6 (D ♂♀) (G. revid.).
D. p. F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 358 T. 33 F. 18—19 (N ♂♀) (G. revid.).
Varyna p. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 17 (N) (G. revid.).

♂ **puebla** Gertsch & Davis 1937. Mexico

D. p. Gertsch & Davis 1937, Amer. Mus. Novit. 961 p. 19 TF. 21 (D ♂) (G. revid.).

♂♀ **remota** Banks 1924. Galapagos-Ins.

D. r. Banks 1924, Zoologica, N. York p. 97 f. 17 (D ♂♀) (G. revid.).

♀ **similis** Keyserling 1877. Uruguay

D. s. Keyserling 1877, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 27 p. 589 T. 14 F. 14 (D ♀).

♀ **simoni** Petrunkevitch 1911. Venezuela

D. cruciata Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 433 (D ♀).
D. s. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 111 (nom. nov.).

♀ **sinaloa** Gertsch & Davis 1942. Mexico

D. s. Gertsch & Davis 1942, Amer. Mus. Novit. 1158 p. 14 TF. 46 (D ♀) (G. revid.).

♂♀ **sonora** Gertsch & Davis 1942. Mexico
D. s. Gertsch & Davis 1942, Amer. Mus. Novit. 1158 p. 12 TF. 33—36 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **spatula** Gertsch & Davis 1937. Mexico, Cuba
D. s. Gertsch & Davis 1937, Amer. Mus. Novit. 961 p. 14 TF. 17—18 (D ♀) (G. revid.).
D. cubana Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 298 T. 4 F. 58; T. 5 F. 62—63 (D ♂) (G. revid.).

♂ **sublatoides** Ivie & Barrows 1935. Florida
D. s. Ivie & Barrows 1935, Bull. Univ. Utah 26 (6), Biol. 3 (2) p. 4 T. 2 F. 8 (D ♂) (G. revid.).

♂ **suprenans** Chamberlin & Ivie 1935. Florida
D. s. Chamberlin & Ivie 1935, Bull. Univ. Utah 26 (4), Biol. 2 (8) p. 29 T. 12 F. 92 (D ♂) (G. revid.).

♀ **togata** Simon 1904. Chile
D. t. Simon 1904, Ann. Soc. Ent. Belg. 48 p. 84 (D ♀).

♀ **trivirgata** Mello-Leitao 1943. Chile
D. t. Mello-Leitao 1943, Rev. Brasil. Biol. R. d. Jan. 3 (4) p. 404 f. 2 (D ♀).

♀ **vittata** Keyserling 1883. Peru
D. v. Keyserling 1883, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 32 p. 215 T. 15 F. 14 (D ♀).

♂♀ **volucripoides** Ivie 1947. Florida
D. v. Ivie 1947, Publ. Privat. N. York p. 4 (D ♂♀) (G. revid.).

♀ **vultuosa** Keyserling 1880. Peru
D. v. Keyserling 1880, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 30 p. 572 T. 16 F. 19 (D ♀).

Transgredierende Arten:

♂♀ **altamira** Gertsch & Davis 1942. Mexico, Georgia, Maryland, Massachusets
D. a. Gertsch & Davis 1942, Amer. Mus. Novit. 1158 p. 15 TF. 29 (D ♀) (G. revid.).
D. savanna Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 121 TF. 161—169 (D ♂♀) (G. revid.).
D. bryantae Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 13 TF. 31—34 (D ♂) (G. revid.).

♂♀ **cholla** Gertsch & Davis 1942. Mexico, Texas, Arizona
D. c. Gertsch & Davis 1942, Amer. Mus. Novit. 1158 p. 12 TF. 31, 39 (D ♀) (G. revid.).
D. hardyi Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 17 TF. 19—20 (D ♂♀) (G. revid.).
Tosyna c. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 16 (N) (G. revid.).

♂♀ **florens** Ivie & Barrows 1935. Florida, Mexico
D. f. Ivie & Barrows 1935, Bull. Univ. Utah 26 (6), Biol. 3 (2) p. 4 T. 1 F. 1—5 (D ♂♀) (G. revid.).
D. f. Gertsch & Davis 1937, Amer. Mus. Novit. 961 p. 17 (N) (G. revid.).

♂♀ **formidolosa** Gertsch & Ivie 1936. Florida, Nord-Carolina, Texas, Maryland, Connecticut

D. armata Banks 1911, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 63 p. 444 T. 34 F. 9 (D ♂♀) (G. revid.).
D. armata Emerton 1915, Trans. Connect. Ac. Sci. 20 p. 141 (3, f. im Text) (D ♀) (G. revid.).
D. f. Gertsch & Ivie 1936, Amer. Mus. Novit. 858 p. 10 (nom. nov.).
D. f. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 511 T. 102 F. 1907—08 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **mulegensis** Chamberlin 1924. Nieder-Californien, Mexico, Texas

D. m. Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 582 f. 7—9 (D ♂) (G. revid.).
D. m. Gertsch & Davis 1937, Amer. Mus. Novit. 961 p. 12 (N ♂♀) (G. revid.).
Varyna m. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 17 T. 4 F. 44—45 (N ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **pallida** Keyserling 1887. Nördl. U. St. Amerika bis Florida

D. p. Keyserling 1887, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 37 p. 472 T. 2 F. 33 (D ♀) (G. revid.).
D. floridana Banks 1904, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 56 p. 125 T. 7 F. 10 (D ♂♀) (G. revid.).
D. p. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 18 (N ♀) (N: **„pallidula"**, G. revid.).
Tivyna floridana Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 4 F. 42—43 (N) (G. revid.).
Tivyna pallidula Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 26 T. 4, 46 (N ♀) (G. revid.).

♂♀ **roscida** (Hentz) 1850. Nord-Amerika: Florida bis Canada und Alaska

Theridion r. Hentz 1850, Journ. Boston Soc. Nat. Hist. 6 p. 277 T. 6 F. 15—16 (D ♂♀) (G. revid.).
D. borealis Keyserling 1887, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 37 p. 473 T. 6 F. 34 (D ♂) (G. revid.).
D. rubra Emerton 1888, Trans. Connect. Ac. Sci. 7 p. 448 T. 9 F. 7 (D ♂♀) (G. revid.).
D. keyserlingi Marx 1891, Proc. Ent. Soc. Wash. 2 p. 186 (nom. nov.).
D. keyserlingi Banks 1910, Bull. U. St. Nat. Mus. 72 p. 17 (nom. nov.).
D. r. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 120 (N ♂♀) (G. revid.).
D. r. Kaston 1945, Amer. Mus. Novit. 1292 p. 2 TF. (N ♂♀) (G. revid.).
D. keyserlingi Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 18 (N) (G. revid.).
D. r. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 508 T. 102 F. 1902—03; T. 104 F. 1940—41 (D ♂♀) (G. revid.).

♀ **secuta** Chamberlin 1924. Nieder-Californien, Texas, Mexico

D. s. Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 583 f. 10 (D ♀) (G. revid.).
D. bishopi Gertsch & Mulaik 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 77 (6) p. 328 TF. 30, 32 (D ♀) (G. revid.).
D. s. Gertsch & Davis 1924, Amer. Mus. Novit. 1158 p. 16 TF. 37 (N ♀) (G. revid.).

♂♀ **segregata** Gertsch & Mulaik 1936. Texas, Mexico

D. s. Gertsch & Mulaik 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 4 TF. 13—14 (D ♀) (G. revid.).

D. s. Gertsch & Mulaik 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 77 (6) p. 327 (D ♂♀) (G. revid.).
D. patellaris Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 1 TF. 1—4 (D ♂) (G. revid.).
Varyna s. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 17 (N) (G. revid.).

♂♀ **suwanea** Gertsch 1946. Florida, Georgia
D. s. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 122 (nom. nud.).
D. s. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 14 TF. 25—27 (D ♂♀) (G. revid.).

Nearktische Arten:

♂♀ **abundans** Chamberlin & Ivie 1941. Nevada, Arizona
D. a. Chamberlin & Ivie 1941, Bull. Univ. Utah 31 (8), Biol. 6 (3) p. 5 TF. 2—4 (D ♂♀) (G. revid.).
D. tucsona Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (5), Biol. 10 (6) p. 8 T. 1 F. 4 (D ♀) (G. revid.).

♂♀ **agressa** Ivie 1947. Californien
D. a. Ivie 1947, Publ. Privat. N. York p. 2 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **alaskae** Chamberlin & Ivie 1947. Alaska
D. a. Chamberlin & Ivie 1947, Bull. Univ. Utah 37 (10), Biol. 10 (3) p. 13 T. 1 F. 2—3 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **angulata** Emerton 1915. Östl. U. St. Amerika
D. a. Emerton 1915, Trans. Connect. Ac. Sci. 20 p. 140 (3. f. im Text) (D ♂♀) (G. revid.).
D. demores Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 117 TF. 170 (D ♀) (G. revid.).
D. a. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. f. 1319 p. 15 (N ♂♀) (G. revid.).
D. a. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 511 T. 102 F. 1900—01 (D ♂) (G. revid.).

♂ **annexa** Gertsch & Mulaik 1936. Texas
D. a. Gertsch & Mulaik 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 6 TF. 8 (D ♂) (G. revid.).

♂♀ **apacheca** Chamberlin & Ivie 1935. Arizona
D. a. Chamberlin & Ivie 1935, Bull. Univ. Utah 26 (4), Biol. 2 (8) p. 28 T. 12 F. 95—96 (D ♂♀) (G. revid.).
Tosyna a. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 16 (N) (G. revid.).

♂♀ **artemisia** Ivie 1947. Utah
D. a. Ivie 1947, Publ. Privat. (N. York) p. 1 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **bellans** Chamberlin 1919. U. St. Amerika
D. b. Chamberlin 1919, Ann. Ent. Soc. Amer. 12 p. 242 T. 15 F. 3—5 (D ♂♀) (G. revid.).
D. hatchi Jones 1948, Field & Laboratory Dallas 16 (1) p. 43 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **bicornis** Emerton 1915. U. St. Amerika
D. b. Emerton 1915, Trans. Connect. Ac. Sci. 20 p. 141 (2. f. im Text) (D ♂) (G. revid.).
D. b. Gertsch & Ivie 1936, Amer. Mus. Novit. 858 p. 13 (N ♂♀) (G. revid.).
D. annamae Gertsch & Mulaik 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 77 (6) p. 330 TF. 24—25 (D ♂) (G. revid.).

D. b. Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 27 TF. 69 (D ♀) (G. revid.).
D. b. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum 47, Bull. 70 p. 509 T. 105 F. 1952; T. 106 F. 1975 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **borealis** Cambridge 1877. Grönland, Canada

D. b. Cambridge 1877, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20 p. 270 T. 8 F. 1 (D ♀) (G. revid.).
D. groenlandica Lenz 1897, Biblioth. Zool. 20 (3) p. 75 f. 7 (D ♀) (G. revid.).
D. b. Jackson 1934, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 14 p. 611 T. 18 F. 2 (N ♀) (G. revid.).
D. b. Holm 1939, Ann. Mag. Nat. Hist. (11) 3 (13) p. 72 f. 1 (N ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **bostoniensis** Emerton 1888. U. St. Amerika, Canada

D. b. Emerton 1888, Trans. Connect. Ac. Sci. 9 p. 447 T. 9 F. 3 (D ♂♀) (G. revid.).
D. sociella Chamberlin 1919, Ann. Ent. Soc. Amer. 12 p. 242 T. 15 F. 8 (D ♀) (G. revid.).
D. b. Gertsch & Mulaik 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 77 (6) p. 332 (N ♂) (G. revid.).
D. b. Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 28 TF. 71 (D ♀) (G. revid.).
D. b. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 509 T. 102 F. 1894; T. 104 F. 1947—50 (D ♂♀) (G. revid.).
Emblyna b. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 22 T. 2 F. 15 (N ♂) (G. revid.).

♂♀ **brevitarsus** Emerton 1915. Nordöstl. U. St. Amerika, Canada, Alaska

D. b. Emerton 1915, Trans. Connect. Ac. Sci. 20 p. 140 (D ♂) (G. revid.).
D. b. Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 26 TF. 68 (D ♀) (G. revid.).
D. b. Kaston 1948, State Connect Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 510 T. 102 F. 1897; T. 104 F. 1937 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **calcarata** Banks 1904. Californien, Texas

D. c. Banks 1904, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 3 (13) p. 342 T. 40 F. 42 (D ♂) (G. revid.).
D. c. Gertsch & Davis 1937, Amer. Mus. Novit. 961 p. 17 (N ♂♀) (G. revid.).
D. c. Gertsch & Mulaik 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 77 (6) p. 330 (N ♂♀) (G. revid.).
D. c. Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 25 TF. 67 (D ♀) (G. revid.).
Tosyna c. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 30 T. 6 F. 68—69 (N ♂♀) (G. revid.).

♂ **callida** Gertsch & Ivie 1936. Texas

D. c. Gertsch & Ivie 1936, Amer. Mus. Novit. 858 p. 4 TF. 6—8 (D ♂) (G. revid.).

♂ **cavernosa** Jones 1947. Washington St.

D. c. Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 12 TF. 28—30 (D ♂) (G. revid.).

♂♀ **cebolla** Ivie 1947. Colorado

D. c. Ivie 1947, Publ. Privat. (N. York) p. 3 (D ♂♀) (G. revid.).

♀ **chamberlini** nom. nov. Arizona

Emblyna cognata Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 9 T. 5 F. 51 (D ♀) (G. revid.: **Dictyna**) (praeocc. Cambridge 1885 sub **Dictyna**).

♂♀ **coloradensis** Chamberlin 1919. Colorado, Vermont, New Jersey

D. c. Chamberlin 1919, Ann. Ent. Soc. Amer. 12 p. 241 T. 14 F. 6—8 (D ♂♀) (G. revid.).
D. arundinaceoides Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 124 (N) (G. revid.).
D. marxi Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 33 TF. 82—85, 87 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **completa** Chamberlin & Gertsch 1929. Utah, Arizona, Neu-Mexico

D. c. Chamberlin & Gertsch 1929, Journ. Ent. Zool. Claremont 21 (3) p. 101 T. 1 F. 1 (D ♀) (G. revid.).
D. c. Gertsch 1935, Amer. Mus. Novit. 792 p. 15 (N ♂♀).
D. c. Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 20 TF. 49—52 (D ♂) (G. revid.).
Emblyna c. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 3, 9, 10 T. 2 F. 17—18 (N ♂♀) (G. revid.).

♂ **completoides** Ivie 1947. Colorado

D. c. Ivie 1947, Publ. Privat. (N. York) p. 1 (D ♂) (G. revid.).

♂♀ **consulta** Gertsch & Ivie 1936. Texas, Minnesota

D. c. Gertsch & Ivie 1936, Amer. Mus. Novit. 858 p. 6 TF. 12—13 (D ♂) (G. revid.).
D. montgomeryi Gertsch & Mulaik 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 77 (6) p. 328 TF. 31 (D ♀) (G. revid.).
D. c. Gertsch & Davis 1942, Amer. Mus. Novit. 1158 p. 16 (N ♂) (G. revid.).

♂ **cornupeta** Bishop & Ruderman 1946. Arizona, Wyoming

D. c. Bishop & Ruderman 1946, Proc. Biol. Soc. Wash. 59 p. 1 f. 1—2 (D ♂) (G. revid.).

♂♀ **cronana** (Chamberlin) 1948. Californien

Emblyna c. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 10 T. 5 F. 52—54 (D ♂♀) (G. revid.: **Dictyna**).

♀ **crosbyi** Gertsch & Mulaik 1940. Texas, Colorado

D. c. Gertsch & Mulaik 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 77 (6) p. 331 TF. 29 (D ♀) (G. revid.).
Emblyna newina Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 11 T. 5 F. 57 (D ♀) (G. revid.).

♂♀ **cruciata** Emerton 1888. U. St. Amerika

D. c. Emerton 1888, Trans. Connect. Ac. Sci. 7 p. 448 T. 9 F. 6 (D ♂♀) (G. revid.).
D. c. Emerton 1902, Common Spiders p. 210 f. 482—483 (D ♂♀) (G. revid.).
D. c. Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 27 TF. 70 (D ♀) (G. revid.).
D. c. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 508 T. 102 F. 1896; T. 104 F. 1934—36 (D ♂♀) (G. revid.).

♀ **decaprini** Kaston 1945. Connecticut

D. d. Kaston 1945, Amer. Mus. Novit. 1292 p. 3 TF. 10 (D ♀) (G. revid.).
D. d. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 512 T. 105 F. 1955 (D ♀).

♂ **evicta** Gertsch & Mulaik 1940. Texas

D. e. Gertsch & Mulaik 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 77 (6) p. 332 TF. 18 (D ♂) (G. revid.).

♂♀ **foliacea** (Hentz) 1850. U. St. Amerika, Canada

Theridion f. Hentz 1850, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 6 p. 277 T. 9 F. 14 (D ♀) (G. revid.).
Theridion morologum Hentz 1850, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 6 p. 277 T. 9 F. 13 (D ♀) (G. revid.).
D. vittata Keyserling 1884, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 33 p. 663 T. 21 F. 12 (D ♂♀) (G. revid.).
D. frondea Emerton 1888, Trans. Connect. Ac. Sci. 7 p. 449 T. 9 F. 9 (D ♂♀) (G. revid.).
D. frondea Emerton 1902, Common Spiders p. 209 f. 481 (D ♂♀) (G. revid.).
D. f. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 109 (C).
D. f. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 507 T. 105 F. 1951; T. 106 F. 1972—74 (D ♂♀) (G. revid.).

♀ **foliata** Keyserling 1883. Colorado

D. f. Keyserling 1883, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 32 p. 216 T. 15 F. 15 (D ♀) (G. revid.).

♂♀ **francisca** Bishop & Ruderman 1946. Californien

D. f. Bishop & Ruderman 1946, Proc. Biol. Soc. Wash. 59 p. 4 f. 9—11 (D ♂♀) (G. revid.).

♀ **gloria** Chamberlin & Ivie 1944. Georgia

D. g. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 118 TF. 171 (D ♀) (G. revid.).

♂♀ **hentzi** Kaston 1945. Nordöstl. U. St. Amerika

D. h. Kaston 1945, Amer. Mus. Novit. 1292 p. 1 TF. 4—6 (D ♂♀) (G. revid.).
D. h. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 507 T. 102 F. 1892; T. 103 F. 1917—18 (D ♂♀) (G. revid.).
D. curvata Jones 1948, Field & Laboratory 16 (1) p. 34 f. . . (D ♂♀) (G. revid.).
Emblyna tosa Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 13 T. 3 F. 30 (D ♀) (G. revid.).

♂♀ **horta** Gertsch & Ivie 1936. Idaho, Minnesota

D. h. Gertsch & Ivie 1936, Amer. Mus. Novit. 858 p. 4 TF. 10—11 (D ♂♀) (G. revid.).

♂ **hoya** Chamberlin & Ivie 1941. Californien

D. h. Chamberlin & Ivie 1941, Bull. Univ. Utah 31 (8), Biol. 6 (3) p. 7 TF. 8 (D ♂) (G. revid.).
Emblyna h. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 3, 12 (N) (G. revid.).

♂♀ **idahoana** Chamberlin & Ivie 1933. Idaho, Texas

D. i. Chamberlin & Ivie 1933, Bull. Univ. Utah 23 (4), Biol. 2 (2) p. 4 T. 1 F. 1—3 (D ♂) (G. revid.).
D. i. Gertsch & Davis 1937, Amer. Mus. Novit. 961 p. 17 (N ♀) (G. revid.).
D. i. Gertsch & Mulaik 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 77 (6) p. 332 TF. 19 (D ♂) (G. revid.).

♂ **ingenuata** Gertsch & Mulaik 1940. Texas

D. i. Gertsch & Mulaik 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 77 (6) p. 332 TF. 19 (D ♂) (G. revid.).

♂ **insolens** Chamberlin 1919. Washington State

D. i. Chamberlin 1919, Ann. Ent. Soc. Amer. 12 p. 242 T. 15 F. 6 (D ♂) (G. revid.).

♂♀ **iviei** Gertsch & Mulaik 1936. Texas

D. i. Gertsch & Mulaik 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 7 TF. 6—7 (D ♂) (G. revid.).

D. i. Gertsch & Mulaik 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 77 (6) p. 327 (N ♂♀) (G. revid.).

D. texana Jones 1948, Field & Laboratory 16 (1) p. 42 f. . . . (D ♂) (G. revid.).

♂ **jonesae** nom. nov. Montana

D. montana Jones 1948, Field & Laboratory 16 (1) p. 37 f. . . . (D ♂) (G. revid.) (praeocc. Tullgren 1910).

♂♀ **juno** Ivie 1947. Utah

D. j. Ivie 1947, Publ. Privat. (N. York) p. 4 (D ♂♀) (G. revid.).

♂ **lina** Gertsch 1946. Arizona

D. l. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 16 TF. 24 (D ♂) (G. revid.).

♂♀ **littoricolens** Chamberlin & Ivie 1936. Utah, Washington State

D. l. Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah 26 (4), Biol. 2 (8) p. 30 T. 3 F. 19—20 (D ♂♀) (G. revid.).

D. acuta Jones 1948, Field & Laboratory 16 (1) p. 33 f. . . . (D ♂) (G. revid.).

♂♀ **longispina** Emerton 1888. Östl. U. St. Amerika

D. l. Emerton 1888, Trans. Connect. Ac. Sci. 9 p. 446 T. 9 F. 4 (D ♂♀) (G. revid.).

D. l. Gertsch & Mulaik 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 77 (6) p. 329 (N ♂♀) (G. revid.).

D. extensa Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 2 TF. 5—9 (D ♂♀) (G. revid.).

D. l. Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 29 TF. 72 (D ♀) (G. revid.).

D. l. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 510 T. 102 F. 1906; T. 106 F. 1971 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **manitoba** Ivie 1947. Canada, Minnesota

D. m. Ivie 1947, Publ. Privat. (N. York) p. 3 (D ♂♀) (G. revid.).

Emblyna siwa Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 12 T 2 F. 25 (D ♀) (G. revid.).

♂ **mariae** (Chamberlin) 1948. Colorado, Wyoming

Emblyna m. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 10 T. 3 F. 26 (D ♂) (G. revid.).

Emblyna ampla Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 9 T. 5 F. 55—56 (D ♂) (G. revid.).

♀ **marilina** Chamberlin 1948. Arizona

D. m. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 7 T. 1 F. 8 (D ♀) (G. revid.).

♂♀ **maxima** Banks 1892. New York, Connecticut

D. m. Banks 1892, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 28 T. 1 F. 79; T. 4 F. 79 (D ♀) (G. revid.).

D. m. Banks 1916, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 68 p. 71 T. 10 F. 15 (D ♂) (G. revid.).

D. m. Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 23 TF. 62—66 (D ♂♀) (G. revid.).

D. m. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 509 T. 102 F. 1895; T. 104 F. 1932—33 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **minuta** Emerton 1888. Nördl. U. St. Amerika, Canada

D. m. Emerton 1888, Trans. Connect. Ac. Sci. 9 p. 447 T. 9 F. 5 (D ♂♀) (G. revid.).

D. m. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 11 (N ♂♀) (G. revid.)
D. m. Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 18 TF. 47 (D ♀) (G. revid.).
D. m. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 510 T. 102 F. 1898—99; T. 104 F. 1938—39 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **moaba** Ivie 1947. Californien

D. m. Ivie 1947, Publ. Privat. (N. York) p. 2 (D ♂♀) (G. revid.).

♂ **nebraska** Gertsch 1946. Nebraska

D. n. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 16 TF. 17—18 (D ♂) (G. revid.).

♂♀ **oasa** Ivie 1947. Californien

D. o. Ivie 1947, Publ. Privat. (N. York) p. 1 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **olympiana** Chamberlin 1919. Washington State

D. o. Chamberlin 1919, Ann. Ent. Soc. Amer. 12 p. 243 T. 15 F. 7 (D ♂) (G. revid.).
Emblyna o. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 3, 10 (N).
D. exlineana Jones 1948, Field & Laboratory 16 (1) p. 36 f. . . (D ♂♀) (G. revid.).

♂ **orbiculata** Jones 1947. Texas

D. o. Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 5 TF. 10—13 (D ♂) (G. revid.).

♂♀ **oregona** Gertsch 1946. Oregon

D. o. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 11 TF. 9—10 (D ♂) (G. revid.).
D. rotunda Jones 1948, Field & Laboratory 16 (1) p. 40 f. . . (D ♂♀) (G. revid.).

♀ **palomara** (Chamberlin) 1948. Californien

Emblyna p. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 11 T. 2 F. 23 (D ♀) (G. revid.).

♂♀ **peragrata** Bishop & Ruderman 1946. Californien, Canada, Alaska

D. p. Bishop & Ruderman 1946, Proc. Biol. Soc. Wash. 59 p. 3 f. 5—8 (D ♂♀) (G. revid.).
D. dyea Chamberlin & Ivie 1947, Bull. Univ. Utah 37 (10), Biol. 10 (3) p. 14 T. 1 F. 4—6 (D ♂♀) (G. revid.).
D. bifida Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 8 TF. 19—23 (D ♂♀) (G. revid.).
Emblyna bifida Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 3, 10 (N) (G. revid.).

♂♀ **personata** Gertsch & Mulaik 1936. Texas, Utah, Nevada, Arizona

D. p. Gertsch & Mulaik 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 9 TF. 3 (D ♀) (G. revid.).
D. p. Gertsch & Mulaik 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 77 (6) p. 329 (N ♂♀) (G. revid.).
D. p. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 14 (N ♂) (G. revid.).
Tosyna pior Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 16 (D ♀) (G. revid.).

♀ **petrunkevitchi** Gertsch & Mulaik 1940. Texas

D. p. Gertsch & Mulaik 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 77 (6) p. 330 TF. 22—23 (D ♀) (G. revid.).

♀ **phoenix** Chamberlin 1948. Arizona

D. p. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 8 T. 1 F. 3 (D ♀) (G. revid.).

♂♀ **phylax** Gertsch & Ivie 1936. Minnesota, Alberta, New Hampshire

D. p. Gertsch & Ivie 1936, Amer. Mus. Novit. 858 p. 7 TF. 29—30 (D ♂) (G. revid.).
D. contorta Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 6 TF. 14—18 (D ♂♀) (G. revid.).

♀ **piratica** Ivie 1947. Utah, Californien

D. p. Ivie 1947, Publ. Privat. (N. York) p. 3 (D ♀) (G. revid.).
Emblyna monoca Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 10 T. 2 F. 24 (D ♀) (G. revid.).

♀ **provida** Gertsch & Mulaik 1936. Texas

D. p. Gertsch & Mulaik 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 8 TF. 10 (D ♀) (G. revid.).

♂ **quadrispinosa** Emerton 1919. New York

D. q. Emerton 1919, Canad. Ent. 51 p. 106 T. 7 F. 5 (D ♂) (G. revid.).

♀ **querida** Chamberlin & Ivie 1944. Georgia

D. q. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 120 (D ♀) (G. revid.).

♂♀ **rena** (Chamberlin) 1948. Nevada

Emblyna r. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 11 T. F. 21—22 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **reticulata** Gertsch & Ivie 1936. U. St. Amerika

D. r. Gertsch & Ivie 1936, Amer. Mus. Novit. 858 p. 7 TF. 27 (D ♂) (G. revid.).
D. declarata Gertsch & Mulaik 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 9 TF. 11 (D ♀) (G. revid.).
D. r. Gertsch & Davis 1937, Amer. Mus. Novit. 961 p. 17 (N ♂♀) (G. revid.).
D. r. Gertsch & Mulaik 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 77 (6) p. 329 (N ♂♀) (G. revid.).
D. californica Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 11 TF. 24—27 (D ♂) (G. revid.).
Emblyna r. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 3, 10, 11 (N) (G. revid.).
Emblyna rosana Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 12 T. 3 F. 29 (D ♂) (G. revid.).

♂♀ **rita** Gertsch 1948. Arizona

D. r. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 12 TF. 28—30 (D ♂♀) (G. revid.).

♂ **saepei** Chamberlin & Ivie 1941. Californien

D. s. Chamberlin & Ivie 1941, Bull. Univ. Utah 31 (8), Biol. 6 (3) p. 6 TF. 5—7 (D ♂) (G. revid.).

♂♀ **sancta** Gertsch 1946. Colorado, Nevada, Manitoba

D. s. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 13 TF. 21—22 (D ♂♀) (G. revid.).
D. alias Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 7 T. 1 F. 7; T. 6 F. 67 (D ♂♀) (G. revid.).
Emblyna religens Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 11 T. 6 F. 64 (D ♀) (G. revid.).

♂ **saylori** Chamberlin & Ivie 1941. Californien

D. s. Chamberlin & Ivie 1941, Bull. Univ. Utah 31 (8), Biol. 6 (3) p. 6 TF. 5—7 (D ♂) (G. revid.).

♀ **scotta** (Chamberlin) 1948. Arizona

Emblyna s. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 12 T. 5 F. 49 (D ♀) (G. revid.).

♂ **sierra** Chamberlin 1948. Californien

D. s. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 8 T. 2 F. 13 (D ♂) (G. revid.).

♂♀ **stulta** Gertsch & Mulaik 1936. Texas, Utah, Arizona

D. s. Gertsch & Mulaik 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 7 TF. 9 (D ♂) (G. revid.).
D. s. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 14 (N ♂) (G. revid.).
Emblyna safrana Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 12 T. 5 F. 60 (D ♀) (G. revid.).

♂♀ **sublata** (Hentz) 1850. U. St. Amerika

Theridion s. Hentz 1850, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 6 p. 276 T. 9 F. 10 (D ♀) (G. revid.).
Theridion hypophyllum Fitch 1869, Trans. N. York Agr. Soc. 29 p. 564 (D) (G. revid.).
Tegenaria philoteichos Mac Cook 1876, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 201 (N) (G. revid).
D. sedentaria Keyserling 1880, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 30 p. 573 T. 16 F. 20 (D ♀) (G. revid.).
D. volupis Keyserling 1882, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 31 p. 285 T. 8 F. 10 (D ♀) (G. revid.).
D. volupis Keyserling 1884, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 33 p. 664 T. 21 F. 13 (D ♂) (G. revid.).
D. volupis Emerton 1888, Trans. Connect. Ac. Sci. 7 p. 448 T. 9 F. 8 (D ♂♀) (G. revid.).
D. dubia Banks 1892, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 29 T. 1 F. 86 (D ♀) (G. revid.).
D. s. Banks 1892, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 27 (N) (G. revid.).
D. decorata Banks 1892, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 28 T. 1 F. 81; T. 4 F. 81 (D ♀) (G. revid.).
D. philoteichos Mac Cook 1893, Amer. Spid. T. 29 F. 4—5 (G. revid.).
D. volupis Emerton 1902, Common Spiders p. 208 f. 474 (D ♂♀) (G. revid.).
D. s. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 122 (N) (G. revid.).
D. s. Kaston 1945, Amer. Mus. Novit. 1298 TF. 7—9 (N ♂♀) (G. revid.).
D. s. Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 31 TF. 78—81 (D ♂♀) (G. revid.).
D. s. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 504 T. 102 F. 1891; T. 103 F. 1909—12, 1914—16 (D ♂♀) (G. revid.).
Emblyna s. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 3, 9 T. 3 F. 27—28 (N ♂♀) (G. revid.).

♂ **subspinicola** Ivie 1947. Idaho

D. s. Ivie 1947, Publ. Privat. (N. York) p. 2 (D ♂) (G. revid.).

♂ **sylvania** Chamberlin & Ivie 1944. Georgia

D. s. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 122 TF. 173—174 (D ♂) (G. revid.).

♂♀ **terranea** Ivie 1947. Idaho, Washington State

D. t. Ivie 1947, Publ. Privat. (N. York) p. 2 (D ♂♀) (G. revid.).
D. pacifica Jones 1948, Field & Laboratory 16 (1) p. 39 f. . . . (D ♂) (G. revid.).

♂♀ **terrestris** Emerton 1911. Östl. U. St. Amerika

D. t. Emerton 1911, Trans. Connect. Ac. Sci. 16 (4) p. 399 T. 4 F. 3 (D ♂) (G. revid.).

D. t. Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 19 TF. 48 (D ♀) (G. revid.).
D. t. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 511 T. 105 F. 1953—54 (D ♂♀) (G. revid.).
Tosyna t. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 16 (N) (G. revid.).

♂♀ **tridentata** Bishop & Ruderman 1946. Wyoming, Colorado
D. t. Bishop & Ruderman 1946, Proc. Biol. Soc. Wash. 59 p. 3 f. 3—4 (D ♂) (G. revid.).
D. banksi Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 14 TF. 35—37 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **uintana** Chamberlin 1919. Westl. U. St. Amerika
D. u. Chamberlin 1919, Ann. Ent. Soc. Amer. 12 p. 240 T. 14 F. 3—5 (D ♂♀) (G. revid.).
D. socarnia Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 8 T. 1 F. 4 (D ♀) (G. revid.).
D. u. Chamberlin 1919, Ann. Ent. Soc. Amer. 12 p. 240 T. 14 F. 3—5 (D ♂♀) (G. revid.).
D. socarnia Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 8 T. 1 F. 4 (D ♀) (G. revid.).
D. u. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 13 TF. 23 (D Oo) (G. revid.).

♂♀ **utesca** (Chamberlin) 1948. Utah
Emblyna u. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 13 T. 2 F. 19—20 (D ♂♀) (G. revid.).

♀ **utona** (Chamberlin) 1948. Arizona
Emblyna u. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 13 T. 5 F. 48 (D ♀) (G. revid.).

♂♀ **volucripes** Keyserling 1882. U. St. Amerika, Canada
D. v. Keyserling 1882, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 31 p. 286 T. 11 F. 11 (D ♀) (G. revid.).
D. v. Emerton 1888, Trans. Connect. Ac. Sci. 7 p. 446 T. 9 F. 2; T. 11 F. 3 (D ♂♀) (G. revid.).
D. v. Banks 1892, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 27 (N) (G. revid.).
D. v. Emerton 1902, Common Spiders p. 210 f. 484—485 (D ♂♀) (G. revid.).
D. v. Comstock 1912, Spider Book p. 284 f. 267, 269, 270 (N, part.?).
D. v. Jones 1947, Field & Laboratory 15 (1) p. 21 TF. 53—56 (D ♂) (G. revid.).
D. v. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 505 T. 102 F. 1904—05; T. 104 F. 1942—46; T. 137 F. 2075; T. 144 F. 2143—44 (D ♀♂) (G. revid.).

♂♀ **zaba** Barrows & Ivie 1942. Ohio, Georgia
D. z. Barrows & Ivie 1942, Ohio Journ. Sci. 42 (1) p. 21 T. 1 F. 10 (D ♂) (G. revid.).
D. toccoa Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 123 TF. 172 (D ♀) (G. revid.).

Gen. **Dictynomorpha** Spassky 1939.

♂♀ **strandi** 1939. Turkmenien
D. s. Spassky 1939, Festschr. Strand 5 p. 138 f. 1—3 (D ♂♀).

Gen. **Hoplolathys** Caporiacco 1947.

♀ **aethiopica** Caporiacco 1947. Abessinien
H. a. Caporiacco 1947, Ann. Mus. Nat. Hungar. 40 (3) p. 102 (D ♀).

Gen. **Lathyarcha** Simon 1908.

♀ **tetrica** Simon 1908. West-Australien
L. t. Simon 1908, Faun. SW.-Austral. 1 (12) p. 377 (D ♀).

Gen. **Lathys** Simon 1884.

Palaearktische Arten:

§ 4 ♂, 5 ♀: Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 191.
§ 2 ♂, 3 ♀: Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 161.
§ 4 ♂, 6 ♀: Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 44—47.
§ 2 ♂, 2 ♀: Roewer 1928, Tierw. Mitteleurop. 3 (6) p. 53 TF. 606—608.
§ 2 ♂, 2 ♀: Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 102.

♀ **affinis** (Blackwall) 1862. Madeira
Ciniflo a. Blackwall 1862, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 9 p. 371 (D ♀).
L. a. Kulczynski 1899, Rozpraw. Ak. Umiej. Krakow. (2) 16 p. 327 T. 6 F. 3—5 (D ♀).

♀ **annulata** Bösenberg & Strand 1906. Japan
L. a. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 110 T. 16 F. 468 (D ♀).

♂♀ **arabs** Simon 1910. Algier, Tunis
L. a. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 278 (D ♂♀).

♂♀ **balestrerii** Caporiacco 1934. Karakorum
L. b. Caporiacco 1934, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 121 T. 2 F. 2 (D ♂♀).

♀ **cambridgii** (Simon) 1874. Palästina
Dictyna puta Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. London p. 262 (D ♀).
Lethia c. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 205 (nom. nov.).

♀ **decolor** Kulczynski 1899. Madeira
L. d. Kulczynski 1899, Rozpraw. Ak. Umiej. Krakow. (2) 16 p. 328 T. 6 F. 11 (D ♀).

♂♀ **humilis** (Blackwall) 1855. – * Europa (außer Nord-)
Ciniflo h. Blackwall 1855, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) 16 p. 120 (D ♀).
Ciniflo h. Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 145 T. 9 F. 92 (D ♀).
Lethia varia Menge 1869, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 2 p. 249 T. 47 F. 145 (D ♂♀).
Lethia h. Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 433 (N).
Lethia h. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 201 (D ♂♀).
Lethia h. Cambridge 1879, Proc. Dorset F. Cl. 1 p. 11 (D ♂♀).
Lethia h. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 54 (D).
Lethia h. Hansen 1885, in: Schiödte, Zool. Danica p. 120 (D ♂♀).
L. h. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 161 (D ♂♀).
L. h. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 240 (N).
Lethia h. Becker 1896, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 12 (2) p. 224 T. 14 F. 8 (D ♂♀).
L. h. Kulczynski 1899, Rozpraw. Ak. Umiej. Krakow. (2) 16 p. 327 T. 6 F. 6 (N).
Lethia h. Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 247 T. 23 F. 356 (D ♂♀).
L. h. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 25 (D ♂♀).
L. h. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 45, 46, 61 f. 89, 93 (D ♂♀).
L. h. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders I. p. 65 f. 28 A, C (D ♂♀).
L. h. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 102 f. 222—227 (D ♂♀).

♂♀ **humilis meridionalis** (Simon) 1874. Spanien, Süd-Frankreich, Corsica, Nord-Afrika

Lethia meridionalis Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 202 (D ♂♀).
L. meridionalis Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 278 (N).
L. h. m. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 46, 61 f. 94 (D ♀).

♂♀ **heterophthalma** Kulczynski 1891. Frankreich, Kroatien

L. h. Kulczynski 1891, in: Chyzer & Kulczynski, Aran. Hungar. 1 p. 161 (D ♀).
L. h. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 231 (N).
Scotolathys h. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 977 (N).
L. h. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 62 (D ♀).
L. h. Schenkel 1929, Rev. Suisse Zool. 36 (1) p. 14 (D ♂♀).

♀ **incerta** Miller 1943. Mähren

L. i. Miller 1943, Ent. Listy, Brno 6 p. 11 f. . . . (D ♀).

♀ **lutulenta** Simon 1914. Süd-Frankreich

L. l. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 46, 62 (D ♀).

♂♀ **narbonensis** (Simon) 1876. Süd-Frankreich

Lethia n. Simon 1876, Ann. Soc. Ent. France (5) 6, Bull. p. 182 (D ♂).
Auximus pristinus Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 278 (D ♂).
L. n. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 45, 47, 61, f. 91, 92, 96 (D ♂♀).

♀ **novembris** Dönitz & Strand 1906. Japan

L. n. Dönitz & Strand 1906, in: Bösenberg & Strand, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) 375 T. 3 F. 4 (D ♀).

♀ **ocellata** Bösenberg & Strand 1906. Japan

L. o. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 109 T. 16 F. 465 (D ♀).

♀ **orientalis** Bösenberg & Strand 1906. Japan

L. o. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 110 T. 16 F. 475 (D ♀).

♂♀ **prominens** Miller 1949. Mähren

L. p. Miller 1949, Ent. Listy, Brno 12 p. 92 f. . . (D ♂♀).

♂♀ **puta** (Cambridge) 1863. England, Mittel- u. Ost-Europa, Algier

Ciniflo p. Cambridge 1863, Zoologist 21 p. 8570 (D ♀).
Lethia stigmatisata Menge 1869, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 2 p. 250 T. 48 F. 46 (D ♂♀).
Lethia p. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 204 (D ♂♀).
Lethia p. Cambridge 1879, Proc. Dorset F. Cl. 1 p. 53 (D ♂).
Lethia p. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 54 (D ♂♀).
L. p. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 162 T. 6 F. 29 (D ♂♀).
Lethia p. Becker 1896, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 12 (2) p. 225 T. 14 F. 9 (D ♂♀).
L. stigmatisata Kulczynski 1898, Symbol. Faun. Aran. Austr. Infer. p. 48 (N).
Lethia p. Bösenberg 1902, Zoologica 14 (1—2) p. 247 T. 22 F. 355 (D ♀).
L. stigmatisata Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 26 (D ♂♀).
L. p. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 45, 46, 62 f. 90 (D ♂♀).
L. p. Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 183 (N).
L. stigmatisata Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders I. p. 65 f. 28B, D (D ♂♀).
L. stigmatisata Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 105 f. 228—229 (D ♂♀).

♂♀ **sexpustulata** (Simon) 1878. Südwest-Frankreich

Lethia s. Simon 1878, Ann. Soc. Ent. France (5) 8, Bull. p. 98 (D ♂).
L. s. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 44, 47, 61 f. 88, 95 (D ♂♀).

♀ **simplex** (Simon) 1884. Algier

Scotolathys s. Simon 1884, Bull. Soc. Zool. France 9 p. 321 (D ♀).
Scotolathys s. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 243 f. 184 (N).
Scotolathys s. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 16 (N).

♀ **simplicior** (Dalmas) 1916. Algier

Scotolathys s. Dalmas 1916, Ann. Soc. Ent. France 85 p. 253 (D ♀).

♀ **subviridis** Denis 1937. Algier

L. s. Denis 1937, Proc. Zool. Soc. London p. 1031 T. 1 F. 1a (D ♀).

♂ **taczanowskii** (Cambridge) 1873. Sibirien

Lethia t. Cambridge 1873, Proc. Zool. Soc. London p. 435 T. 40 F. 1 (D ♂).
L. t. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 233, 234 f. 190 (N ♂).

Australische Arten:

♀ **maculata** Keyserling 1889. Neu-Süd-Wales

L. m. Keyserling 1889, Arachn. Austral. 2 p. 251 T. 23 F. 3 (D ♀).

Neotropische Arten:

♂ **coralynae** Gertsch & Davis 1942. Mexico

L. c. Gertsch & Davis 1942, Amer. Mus. Novit. 1158 p. 10 TF. 44 (D ♂) (G. revid.).
L. c. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 3 (N) (G. revid.).

Transgredierende Arten:

♂♀ **alba** (Chamberlin & Ivie) 1944. Florida, Georgia

Scotolathys a. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 126 TF. 178—179 (D ♂♀) (G. revid.).
L. albida Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 4 (N ♂♀) (G. revid.).

♀ **dixiana** Ivie & Barrows 1935. Louisiana, Florida, Georgia

L. d. Ivie & Barrows 1935, Bull. Univ. Utah 26 (6), Biol. 3 (2) p. 3 T. 1 F. 6—7 (D ♀) (G. revid.).
L. d. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 124 (N ♀) (G. revid.).
L. d. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 3 TF. 12 (N ♀) (G. revid.).

Nearktische Arten:

♂♀ **alberta** Gertsch 1946. Canada, Alaska

L. pallida Emerton 1894, Trans. Connect. Ac. Sci. 9 (a) p. 410 T. 1 F. 5 (D ♂) (G. revid.).
L. a. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 3 TF. 11 (N ♀) (G. revid.).
Argenna matanuska Chamberlin & Ivie 1947, Bull. Univ. Utah 37 (10), Biol. 10 (3) p. 12 T. 1 F. 1 (D ♀) (G. revid.).
L. a. Schenkel 1950, Verh. Nat. Ges. Basel 61 p. 34 f. 3 (D ♀) (G. revid.).

♀ **apachea** (Chamberlin) 1948. Arizona

Scotolathys a. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 4 F. 37 (D ♀) (G. revid.).

♂♀ **delicatula** (Gertsch & Mulaik) 1936. Texas

Scotolathys d. Gertsch & Mulaik 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 4 TF. 4 (D ♀) (G. revid.).

Scotolathys d. Gertsch & Mulaik 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 77 (6) p. 326 (N ♂♀) (G. revid.).
L. d. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 3 TF. 14 (N ♀) (G. revid.).

♂♀ **foxii** (Marx) 1891. New Jersey, Tennessee, Georgia

Prodalia f. Marx 1891, Proc. Ent. Soc. Wash. 2 (1) p. 35 T. 1 F. 5 (D ♀) (G. revid.).
L. f. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 240 (N).
Dictyna f. Banks 1892, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 28 T. 1 F. 78 (D ♀) (G. revid.).
L. f. Emerton 1911, Trans. Connect. Ac. Sci. 16 (4) p. 400 T. 4 F. 5 (D ♂♀) (G. revid.).
L. f. Comstock 1912, Spider Book p. 279 f. 260a—d (N) (G. revid.).
L. f. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 2 TF. 13 (N ♂♀) (G. revid.).
L. f. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 501 T. 100 F. 1868—1870 (D ♂♀) (G. revid.).
Prodalia f. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 15 (N) (G. revid.).

♂♀ **immaculata** (Chamberlin & Ivie) 1944. Georgia, Maryland

Scotolathys maculata i. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 126 (D ♂♀) (G. revid.).
Lathys i. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 4 (N ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **maculata** (Banks) 1900. Südöstl. U. St. Amerika

Dictyolathys m. Banks 1900, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 52 p. 534 (D ♀) (G. revid.).
Lathys m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 977 (N).
Scotolathys m. Emerton 1913, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 32 p. 257 T. 48 F. 5 (D ♂♀) (G. revid.).
Scotolathys m. Bishop & Crosby 1926, Journ. Elisha Mitch. Soc. 41 p. 173 (N) (G. revid.).
Dictyolathys m. Bryant 1943, Psyche 50 (3—4) p. 84 f. 1 (D ♀) (G. revid.).
Scotolathys m. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 126 (N) (G. revid.).
Lathys maculina Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 4 TF. 15 (N ♂♀) (G. revid.).
Scotolathys m. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 502 T. 100 F. 1867; T. 101 f. 1887 (D ♂♀) (G. revid.).
Scotolathys m. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 16 (N) (G. revid.).

♀ **moabana** (Chamberlin) 1948. Utah

Zanomys m. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 18 (D ♀) (G. revid.).

♂♀ **pallida** (Marx) 1891. Östl. U. St. Amerika

Neophanes p. Marx 1891, Proc. Ent. Soc. Wash. 2 (1) p. 34 T. 1 F. 4 (D ♀) (G. revid.).
Neophanes p. Banks 1892, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 44 p. 29 T. 3 F. 86—87 (D ♂♀) (G. revid.).
Scotolathys p. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 243 (N).
Scotolathys p. Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 213 T. 8 F. 2 (D ♂♀) (G. revid.).
Scotolathys p. Comstock 1912, Spider Book p. 287 f. 272a, b (N).
L. p. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 4 (N ♂♀) (G. revid.).
Scotolathys p. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 502 T. 100 F. 1882—86 (D ♂♀) (G. revid.).

Gen. **Mallos** Cambridge 1902.

Neotropische Arten:

♀ **avara** (Banks) 1898. Mexico

Dictyna a. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 232 T. 14 F. 19 (D ♀) (G. revid.).

Dictyna grandis F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 359 T. 33 F. 22 (N ♀) (G. revid.: **Mallos**).

♀ **ghigii** (Caporiacco) 1938. Guatemala, Mexico

Dictyna g. Caporiacco 1938, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 77 p. 257 f. 1 (D ♀) (G. revid.: **Mallos**).

♂♀ **grandis** (Cambridge) 1902. Mexico

Dictyna g. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 172 T. 21 F. 4 (D ♀) (G. revid.).

M. g. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 9 (N ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **gregalis** (Simon) 1909. Mexico

Coenothele g. Simon 1909, C. R. Ac. Sci. Paris 148 p. 736 (D ♂♀) (G. revid.).

Coenothele g. Berland 1913, Arch. Zool. Expér. Gén. 51 (Not. & Rev. 2) p. 27 f. 27—30 (D ♂♀) (G. revid.: **Mallos**).

♂♀ **hesperius** (Chamberlin) 1916. Peru, Paraguay

Dictyna h. Chamberlin 1916, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 60 (6) p. 212 T. 8 F. 8 (D ♀) (G. revid.).

M. apanus Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 8 TF. 5—6 (D ♂♀) (G. revid.).

♀ **kraussi** Gertsch 1946. Mexico

M. k. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 6 TF. 1 (D ♀) (G. revid.).

♀ **margaretae** Gertsch 1946. Panama

M. m. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 8 TF. 4 (D ♀) (G. revid.).

Transgredierende Arten:

♂♀ **dugesi** (Becker) 1886. Mexico, Arizona

Dictyna d. Becker 1886, Ann. Soc. Ent. Belg. 30 C. R. p. 23 (D ♀) (G. revid.).

Dictynoides arizonensis Chamberlin 1919, Ann. Ent. Soc. Amer. 12 p. 244 T. 16 F. 1 (D ♂♀) (G. revid.).

M. arizonensis Gertsch & Davis 1942, Amer. Mus. Novit. 1158 p. 17 (N ♀) (G. revid.).

M. arizonensis Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 5 (N ♀) (G. revid.).

♂♀ **niveus** Cambridge 1902. – * Guatemala, Mexico, Arizona, Colorado, Utah

M. n. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 308 T. 35 F. 1 (D ♂) (G. revid.).

Dictyna n. F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 358 T. 33 F. 20 bis 21 (D ♂♀) (G. revid.).

Dictyna n. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 977 (N).

M. n. Gertsch & Davis 1942, Amer. Mus. Novit. 1158 p. 17 (N) (G. revid.).

M. n. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 7 (N ♂♀) (G. revid.).

Nearktische Arten:

♂♀ **alpheus** Chamberlin 1948. Utah

M. a. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 14 T. 3 F. 31—32 (D ♂♀) (G. revid.).

Emblyna urica Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 13 T. 6 F. 63 (D ♀) (G. revid.).

♂♀ **bryantae** Gertsch 1946. Arizona

M. b. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 6 TF. 2—3 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **eutypus** (Chamberlin & Gertsch) 1929. Westl. U. St. Amerika

Dictyna e. Chamberlin & Gertsch 1929, Journ. Ent. Zool. Claremont 21 (3) p. 101 T. 1 F. 2 (D ♂) (G. revid.).
Dictynina e. Gertsch 1936, Amer. Mus. Novit. 726 p. 14 (N ♂♀) (G. revid.).
M. e. Gertsch & Mulaik 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 77 (6) p. 327 (N ♀) (G. revid.).
M. e. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 8 (N ♂♀) (G. revid.).
M. e. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 14 T. 3 F. 33 (N ♂♀) (G. revid.).

♀ **halli** Chamberlin & Ivie 1941. Californien

M. h. Chamberlin & Ivie 1941, Bull. Univ. Utah 31 (8), Biol. 6 (3) p. 4 TF. 1 (D ♀) (G. revid.).

♀ **mians** (Chamberlin) 1920. Californien

Dictyna m. Chamberlin 1920, Journ. Ent. Zool. Claremont 12 p. 4 T. 3 F. 8 (D ♀) (G. revid.: **Mallos**).

♂♀ **pallidus** (Banks) 1904. Californien, Arizona

Dictynina p. Banks 1904, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 3 (13) p. 342 T. 39 F. 22 (D ♀) (G. revid.).
Heterodictyna p. Dahl 1904, S. B. Ges. Naturf. Fr. Berlin p. 118 (N) (G. revid.).
Heterodictyna p. Dahl 1907, Zool. Anz. 31 (2—3) p. 64 (N) (G. revid.).
M. p. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 7 TF. 8 (N ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **trivittatus** (Banks) 1901. U. St. Amerika

Lethia t. Banks 1901, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 53 p. 577 T. 23 F. 9—10 (D ♂♀) (G. revid.).
Lathys t. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist 29 p. 112 (C).
Dictyna t. Gertsch 1935, Amer. Mus. Novit. 792 p. 15 (N) (G. revid.).
M. t. Gertsch & Mulaik 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 77 (6) p. 327 (N ♂♀) (G. revid.).
M. t. Gertsch 1946, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 9 (N ♂♀) (G. revid.).
M. t. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 15 (N) (G. revid.).
M. zionis Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 15 (D ♀) (G. revid.).

Gen. **Megadictyna** Dahl 1907.

♀ **thilenii** Dahl 1907. Neu-Seeland

M. t. Dahl 1907, Zool. Anz. 31 (2—3) p. 62 (D ♀).

Gen. **Metaltella** Mello-Leitao 1931.

♀ **argentinensis** Mello-Leitao 1931. Argentinien

M. a. Mello-Leitao 1931, Ann. Ac. Bras. Sci. 3 (2) p. 94 (D ♀).

Gen. **Neuquenia** Mello-Leitao 1940.

♀ **pallida** Mello-Leitao 1940. Argentinien

N. p. Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 13 f. 14 (D ♀).

Gen. **Notolathys** Mello-Leitao 1926.

difficilis (Mello-Leitao) 1919. – * Brasilien

Lathys (N.) d. Mello-Leitao 1919, Rev. Soc. Bras. Sci. 3 p. (?: 169—173) (lit. non vidi).

N. d. Mello-Leitao 1926, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 2 (6) p. 15 (D. gen.).

♀ **minensis** Mello-Leitao 1926. Brasilien

N. m. Mello-Leitao 1926, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 2 (6) p. 16 f. 18 (D ♀).

♂ **spinosus** Mello-Leitao 1926. Brasilien

N. s. Mello-Leitao 1926, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 2 (6) p. 17 f. 19—20 (D ♂).

Gen. **Opsaltella** Mello-Leitao 1941.

♀ **diffusa** Mello-Leitao 1941. – * Nord-Argentinien

O. d. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 115 T. 3 F. 9; f. 13 (D ♀).

♂♀ **tigrina** Mello-Leitao 1941. Argentinien

O. t. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 116 f. 14 (D ♂♀).

Gen. **Pagomys** Chamberlin 1948.

Palaearktische Arten:

♂ **notabilis** (Tullgren) 1948. Schweden

Brommella n. Tullgren 1948, Ent. Tidskr. 69 p. 156 f.... (D ♂) (G. revid.: **Pagomys**).

Nearktische Arten:

♂♀ **monticola** (Gertsch & Ivie) 1936. – * Neu-Mexico, Utah

Argenna m. Gertsch & Ivie 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 2 TF. 2 (D ♀) (G. revid.).

P. uinta Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 15 T. 3 F. 34 bis 36 (D ♂♀) (G. revid.).

Gen. **Pseudauximus** Simon 1902.

♂ **annulatus** Purcell 1908. Capland

P. a. Purcell 1908, Denkschr. Med. Nat. Ges. Jena 13 p. 217 T. 11 F. 4 (D ♂).

♀ **pallidus** Purcell 1903. Capland

P. p. Purcell 1903, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 15 (3) p. 133 T. 10 F. 4 (D ♀).

♀ **reticulatus** Simon 1902. – * Capland

P. r. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71, Bull. p. 243 (D ♀).

P. r. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 977 (N).

Gen. **Retiro** Mello-Leitao 1915.

♀ **maculatus** Mello-Leitao 1915. – * Brasilien

R. m. Mello-Leitao 1915, Broteria 13 p. 131 (D ♀).

♀ **nigronotatus** Mello-Leitao 1947. Brasilien

R. n. Mello-Leitao 1947, Arqu. Mus. Paranaense 6 (6) p. 235 T. 33 F. 2—3 (D ♀).

Gen. **Rhion** Cambridge 1870.

♂ **pallidus** Cambridge 1870. Ceylon

R. p. Cambridge 1870, Proc. Zool. Soc. London p. 741 **T.** 44 F. 8 (D ♂).
R. p. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 241 (N).

Gen. **Tandil** Mello-Leitao 1940.

♀ **nostalgicus** Mello-Leitao 1940. Buenos Aires

T. n. Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 12 f. 13 (D ♀).

Gen. **Temecula** Cambridge 1896.

♂♀ **mexicana** Cambridge 1896. Mexico

T. m. Cambridge 1896, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 170 **T.** 22 F. 8 (D ♂).
T. m. F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 359 T. 83 F. 23—24 (D ♂♀).
T. m. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 978 (N).

Gen. **Thallumetus** Simon 1892.

Neotropische Arten:

♂ **acanthochirus** Simon 1904. Chile

T. a. Simon 1904, Ann. Soc. Ent. Belg. 48 p. 85 (D ♂).

♀ **caelatus** Simon 1904. Chile

T. c. Simon 1904, Ann. Soc. Ent. Belg. 48 **p.** 85 (D ♀).

♀ **dulcineus** Gertsch 1946. Panama

T. d. Gertsch 1945, Amer. Mus. Novit. 1319 p. 10 **TF.** 7 (D ♀) (G. revid.).

♀ **octomaculatus** (Gertsch & Davis) 1937. Mexico

Dictyna o. Gertsch & Davis 1937, Amer. Mus. Novit. 961 p. 16 **TF.** 19—20 (D ♀) (G. revid.).

♂♀ **parvulus** Bryant 1942. Virgin-Isl.

T. p. Bryant 1942, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 89 (7) **p.** 326 **T.** 2 F. 20, 22, 23 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **pullus** Chickering 1951. Panama

T. p. Chickering 1951, Psyche 58 (4) p. 152 f. 2—5 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **pusillus** Chickering 1953. Panama

T. p. Chickering 1953, Pap. Michig. Ac. Sci. 34 **p.** 93 f. 10—12 (D ♂♀) (G. revid.).

♂ **salax** Simon 1892. – * Venezuela

T. s. Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 434 **T.** 9 F. 7 (D ♂).
T. s. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 241 (N).

♂ **simoni** Gertsch 1945. Brit. Guiana

T. s. Gertsch 1945, Trans. Connect. Ac. Sci. 36 **p.** 194 **T.** 1 F. 4—6 (D ♂).

Transgredierende Arten:

♂♀ **pineus** (Chamberlin & Ivie) 1944. Georgia, Florida

Lathys p. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) **p.** 125 **TF.** 182 (D ♀) (G. revid.).
T. petrunkevitchinus Gertsch 1945, Trans. Connect. Ac. Sci. 36 **p.** 192 **T.** 1 F. 1—3 (D ♂) (G. revid.).
Dixomys p. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) **p.** 8 (D gen.).

Gen. **Tricholathys** Chamberlin & Ivie 1935.

Palaearktische Arten:

♂♀ **lapponica** (Holm) 1945. Lappland

Arctella l. Holm 1945, Ark. Zool. 36 (A; 15) p. 71 f. 23 (D ♂♀) (G. revid.: **Tricholathys**).

Nearktische Arten:

♂ **hansi** (Schenkel) 1950. Californien

Argennina h. Schenkel 1950, Verh. Naturf. Ges. Basel 61 p. 35 f. 4 (D ♂) (G. revid.).

♂ **hirsutipes** (Banks) 1921. Californien

Lathys h. Banks 1921, Proc. Calif. Ac. Sci. (4) 21 p. 100 f. 2 (D ♂) (G. revid.).

♀ **knulli** Gertsch & Mulaik 1936. Texas

T. k. Gertsch & Mulaik 1936, Amer. Mus. Novit. 851 p. 1 TF. 1 (D ♀) (G. revid.).

♂ **ohioensis** (Chamberlin & Ivie) 1935. Ohio

Argenna o. Chamberlin & Ivie 1935, Bull. Univ. Utah 26 (4), Biol. 2 (8) p. 26 T. 12 F. 92—94 (D ♂) (G. revid.).

Argenna o. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 503 (D ♂) (G. revid.).

T. o. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 17 (N) (G. revid.).

♀ **reclusa** (Gertsch & Ivie) 1936. Utah

Argennina r. Gertsch & Ivie 1936, Amer. Mus. Novit. 858 p. 3 TF. 19—20 (D ♀) (G. revid.).

♂♀ **saltona** Chamberlin 1948. Californien

T. s. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 17 T. 4 F. 38 (D ♂♀) (G. revid.).

♂♀ **spiralis** Chamberlin & Ivie 1935. – * Utah, Wyoming

T. s. Chamberlin & Ivie 1935, Bull. Univ. Utah 26 (4), Biol. 2 (8) p. 28 T. 3 F. 21; T. 12 F. 99; T. 13 F. 100—105 (D ♂♀) (G. revid.).

T. s. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 17 (N) (G. revid.).

60. Fam. ULOBORIDAE

1. Subfam. Uloborinae

Gen. **Ariston** Cambridge 1896.

♀ **albicans** Cambridge 1896. – * Mexico, Panama

A. a. Cambridge 1896, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 216 T. 27 F. 9 (D ♀).

A. a. F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 364 (N).

Uloborus a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 973 (N).

♂ **reticeus** Gertsch & Davis 1942. Mexico

A. r. Gertsch & Davis 1942, Amer. Mus. Novit. 1158 p. 17 TF. 43 (D ♂).

Gen. **Avellopsis** Purcell 1904.

♂♀ **capensis** Purcell 1904. Capland

A. c. Purcell 1904, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 15 (3) p. 128 (D ♂♀).

Gen. **Orinomana** Strand 1934.

♀ **lampra** (Chamberlin) 1916. Peru

Orinomus l. Chamberlin 1916, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 60 (6) p. 207 T. 8 F. 1—4 (D ♀).
O. l. Strand 1934, Folia Zool. Hydrobiol. 6 (2) p. 273 (nom. nov. gen.).

Gen. **Petrunkevitchia** Mello-Leitao 1915.

♂ **pusilla** Mello-Leitao 1917. Brasilien

P. p. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 8 (D ♂).

♂ **venusta** Mello-Leitao 1915. – * Brasilien

P. v. Mello-Leitao 1915, Broteria 13 p. 130 (D ♂).
P. v. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 9 (N).

Gen. **Sybota** Simon 1892.

Palaearktische Arten:

♀ **producta** (Simon) 1873. Spanien, Corsica, N.-Afrika, Syrien

Uloborus p. Simon 1873, Mém. Soc. Sci. Liège (2) 5 p. 333 (149) (D ♀).
Uloborus p. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 169 T. 3 F. 1 (D ♀).
S. p. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 212, 216 (N).
S. p. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 28, 30 (D ♀).

Neotropische Arten:

♀ **abdominalis** (Nicolet) 1849. – * Chile

Sylvia a. Nicolet 1849, in: Gay, Hist. Chili 10 (3) p. 466 T. 5 F. 2 (D ♀).
Sylvia similis Nicolet 1849, in: Gay, Hist. Chili 10 (3) p. 467 (D ♀).
Sylvia atra Nicolet 1849, in: Gay, Hist. Chili 10 (3) p. 467 (D ♀).
Sylvia rubiginosa Nicolet 1849, in: Gay, Hist. Chili 10 (3) p. 468 (D ♀).
Sylvia vittata Nicolet 1849, in: Gay, Hist. Chili 10 (3) p. 468 (D ♀).
Uloborus abdominalis, alboabdominalis, ater, eruginosus, vittatus Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 245 (C).
S. a. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 216 (N).

Gen. **Uloborella** Caporiacco 1940.

o **strandi** Caporiacco 1940. Abessinien

U. s. Caporiacco 1940, Atti Accard. Ital. 11 (18) p. 779 (D o).

Gen. **Uloborus** Latreille 1806.

Kosmopoliten:

♂♀ **geniculatus** (Olivier) 1789. Tropische Gebiete

Aranea g. Olivier 1789, Encycl. Méthod. 4 p. 214 (D).
U. zosis Walckenaer 1841, Hist. Nat. Ins. Apt. 2 p. 231 (D ♂).
Zosis caraibe Walckenaer 1841, Hist. Nat. Ins. Apt. 2 p. 231 T. 20 F. 2 (D ♂).
Orithya williamsii Blackwall 1858, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 2 p. 331 (D ♀).
U. latreilleii Thorell 1858, Oefv. Vet. Ak. Förhandl. 15 p. 197 (D ♀).
U. domesticus Doleschall 1859, Act. Soc. Sci. Ind. Neerl. 5 p. 46 T. 7 F. 2 (D ♀).
Orithya williamsii Blackwall 1861, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 8 p. 443 (D ♂).
U. borbonicus Vinson 1863, Aran. Réun. Mauric. Madagasc. p. 316 T. 1 F. 3 (D ♀).
U. zosis L. Koch 1872, Arachn. Austral. 1 (1) p. 221 T. 19 F. 3 (D ♀).
Zosis caraiba Taczanowski 1872, Hor. Soc. Ent. Ross. 9 p. 110 (N ♂♀).
U. zosis Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 129 (D ♂♀).
U. zosis Marx 1889, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 99 T. 4 F. 1 (N ♂♀).

U. g. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 211 (N).
U. g. Mac Cook 1893, Amer. Spid. 3 p. 273 T. 27 F. 1—2 (D ♂♀).
U. g. F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 362 T. 34 F. 9—10 (N ♂♀).
U. (Zosis) g. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 7 (N).
U. g. Berland 1924, Nov. Caledon. Zool. 3 (2) p. 176 f. 16—17 (N ♂♀).
U. g. Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 30 p. 228 f. 75—76 (N ♂♀).
U. g. Berland & Millot 1940, Ann. Soc. Ent. France 108 p. 152 f. 5 (N ♂♀).

♂♀ **geniculatus fuscus** Caporiacco 1948. Brit. Guiana

U. g. f. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 624 (D ♂♀).

♀ **U. geniculatus timorensis** Schenkel 1944. Ins. Timor

U. g. t. Schenkel 1944, Rev. Suisse Zool. 51 (4) p. 173 f. 1 (D ♀).

Palaearktische Arten:

♀ **defectus** Bösenberg & Strand 1906. Japan

U. d. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 103 T. 15 F. 427 (D ♀).

♀ **dubius** Bösenberg & Strand 1906. Japan

U. d. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 105 T. 15 F. 430 (D ♀).

♀ **gilvus** (Blackwall) 1869. Italien, Attika

Veleda g. Blackwall 1869, Journ. Linn. Soc. Lond. 10 p. 422 (D ♀).
U. g. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 17 (C).

o **incognitus** Dönitz & Strand 1906. Japan, China

U. i. Dönitz & Strand 1906, in: Bösenberg & Strand, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 374 T. 3 F. 17 (D o).

♂♀ **prominens** Bösenberg & Strand 1906. Japan, China

U. p. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 106 T. 15 F. 410 (D ♂♀).
U. p. Strand 1907, Abh. Naturf. Ges. Görlitz 25 p. 1 (N ♂).

♀ **pseudacanthus** Franganillo 1910. Portugal

U. p. Franganillo 1910, Broteria 9 (1) p. 21 TF. 11 (D ♀).

♂♀ **sinensis** Simon 1880. Peking

U. s. Simon 1880, Ann. Soc. Ent. France (5) 10 p. 111 T. 3 F. 8, 9 (D ♂♀).

♂♀ **sybotides** Bösenberg & Strand 1906. Japan

U. s. Bösenberg & Strand 1906, Abg. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 104 T. 15 F. 428, 431 (D ♂♀).

♀ **varians** Bösenberg & Strand 1906. Japan

U. v. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 102 T. 3 F. 1; T. 15 F. 429 (D ♀).

♂♀ **walckenaerius** Latreille 1806. – * Europa, Turkestan, Transbaikalien (Macronesien)

U. w. Latreille 1806, Gen. Crust. Ins. 1 p. 110 (D).
U. w. Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 122 TF. 92 (D ♂♀).
U. w. Walckenaer 1841, Hist. Nat. Ins. Apt. 2 p. 228 T. 20 F. 1 (D ♂♀).
U. w. C. L. Koch 1845, Die Arachniden 11 p. 161 TF. 955, 956 (D ♂♀).
Veleda lineata Blackwall 1859, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 3 p. 96 (D ♀).

Veleda lineata Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 150 T. 10 F. 96 (D ♀).
Veleda pallens Blackwall 1862, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 9 p. 372 (D ♂).
U. w. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 170 (D ♂♀).
U. w. Cambridge 1881, Proc. Dorset F. Cl. 2 p. 285 T. 6 F. 2 (D ♂♀).
U. walckenaerii Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 147 T. 6 F. 16 (D ♂♀).
U. w. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 214 f. 157, 159 (N ♂).
U. w. Becker 1896, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 12 (1) p. 70 T. 14 F. 3 (D ♂♀).
U. w. Bösenberg 1901, Zoologica 13 (1) p. 54 T. 4 F. 48 (D ♂♀).
U. w. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 13 (D ♂♀).
U. w. Berland 1913, Arch. Zool. Expér. Gén. 51 (Not. & Rev. 2) p. 28 f. 6—9 (N ♀).
U. w. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 27, 30 (D ♂♀).
U. w. Drenski 1939, Mitt. Nat. Inst. Sofia 12 p. 242 f. 17—19 (N ♂♀).
U. w. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders I. p. 71 f. 15B; 32A, B (D ♂♀).
U. w. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 114 f. 242—251 (D ♂♀).

Transgredierende Arten:

♂♀ **plumipes** Lucas 1846. Mittelmeergebiet, Mesopotamien, S.-Asien, Afrika, Neu-Guinea

U. p. Lucas 1846, Explor. Sci. Algér.; Zool. 1 Arachn. p. 252 T. 15 F. 8 (D ♀).
U. costae Thorell 1358, Oefv. Vet. Ak. Förhandl. 15 p. 195 (D ♀).
U. p. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 166 (D ♂♀).
U. signatus Cambridge 1876, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 579 (D ♂).
U. niloticus Simon 1884, Bull. Soc. Zool. France 9 p. 20 (D ♀).
U. p. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 212, 214 f. 158 (N).
U. americanus Kulczynski 1908, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 549 (N).
U. p. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 28, 30 (D ♂♀).
U. (Phillyra) p. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 7 (N).
U. p. Berland 1922, Voy. Rothschild Ethiop.; Rés. Sci. Anim. Artic. 1 p. 44 N ♂).
U. p. Schenkel 1936, Ark. Zool. 29 (A; 1) p. 11 (D ♀).
U. p. Dyal 1935, Bull. Dep. Zool. Panjab Univ. 1 p. 172 T. 15 F. 104—110 (D ♀).
U. p. Berland & Millot 1940, Ann. Soc. Ent. France 108 p. 153 f. 6 (N ♂♀).

♀ **plumipes javanus** Kulczynski 1908. Java

U. p. j. Kulczynski 1908, Ann. Mus. Nat. Hungar. 6 p. 471 (D ♀).

Aethiopische Arten:

♂ **angolensis** Lessert 1933. Angola

U. a. Lessert 1933, Rev. Suisse Zool. 40 (4) p. 87 f. 1 (D ♂).

♂ **angolensis remyi** Berland & Millot 1940. Elfenbeinküste

U. a. r. Berland & Millot 1940, Ann. Soc. Ent. France 108 p. 154 f. 7 (D ♂).

♀ **aureus** Vinson 1863. Madagascar

U. a. Vinson 1863, Aran. Réun. Mauric. Madagasc. p. 316 (D ♀).

♀ **berlandi** Roewer 1951. Franz. Guinea

U. lugubris Berland & Millot 1940, Ann. Soc. Ent. France 108 p. 154 (D ♀) (praeocc. Thorell 1895 sub **Philoponus**).
U. b. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 454 (nom. nov.).

♂♀ **gnavus** (Blackwall) 1865. Cap Verde-I.

Orithya g. Blackwall 1865, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 16 p. 90 (D ♀).
Orithya g. Blackwall 1877, Proc. Irish Ac. Sci. (2) 3 p. 12 (D ♂).

♀ **jarrei** Berland & Millot 1940. Franz. Guinea
U. j. Berland & Millot 1940, Ann. Soc. Ent. France 108 p. 156 f. 8 (D ♀).

♀ **luteolus** (Blackwall 1865. Cap Verde-I.
Orithya l. Blackwall 1865, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 16 p. 89 (D ♀).

♀ **operosus** Simon 1896. Capland
U. o. Simon 1896, Bull. Soc. Zool. France 21 p. 221 (D ♀).

♀ **pictiventris** Simon 1890. Yemen
U. p. Simon 1890, Ann. Soc. Ent. France (6) 10 p. 84 (D ♀).

♀ **planipedius** Simon 1896. Capland, Ost-Afrika
U. p. Simon 1896, Bull. Soc. Zool. France 21 p. 221 (D ♀).
U. p. (= ? **planipedellus**) Strand 1907, Zool. Jahrb. Syst. 25 (5—6) p. 558 (D ♀).

♀ **vanillarum** Vinson 1863. Madagascar
U. v. Vinson 1863, Aran. Réun. Mauric. Madagasc. p. 317 (D ♀).

♀ **velutinus** Butler 1882. Madagascar
U. v. Butler 1882, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 767 T. 57 F. 6 (D ♀).

Orientalische Arten:

§ 6 Arten: Simon 1893, Ann. Soc. Ent. France 62 p. 69.

♀ **albescens** Cambridge 1885. Nordwest-Indien
U. a. Cambridge 1885, Sci. Res. Sec. Yarkand Miss.; Aran. p. 55 (D ♀).

♀ **bigibbosus** Simon 1905. Indien
U. b. Simon 1905, Ann. Soc. Ent. France 74 p. 163 (D ♀).

♀ **crucifaciens** Hingston 1927. Burma
U. c. Hingston 1927, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 292 (D ♀).

♀ **cubicus** (Thorell) 1898. Burma
Philoponus c. Thorell 1898, Ann. Mus. Civ. Genova 39 p. 324 (D ♀).

♀ **emarginatus** Kulczynski 1908. Java
U. e. Kulczynski 1908, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 558 T. 23 F. 10 (D ♀).

♀ **filifaciens** Hingston 1927. Andamanen
U. f. Hingston 1927, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 291 (D ♀).

♀ **furunculus** Simon 1906. Indien
U. f. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 285 (D ♀).

♀ **gibberosus** Kulczynski 1908. Java, I. Simalur
U. g. Kulczynski 1908, Ann. Mus. Nat. Hungar. 6 p. 472 (D ♀).

♂ **grammicus** Simon 1893. Luzon
U. g. Simon 1893, Ann. Soc. Ent. France 62 p. 68 (D ♂).

♀ **hilaris** Simon 1906. Indien
U. h. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 286 (D ♀).

♂♀ **humeralis** Hasselt 1882. Sumatra, Java, Burma
U. h. Hasselt 1882, in: Veth, Midden Sumatra 4 (11; A) p. 29 (D o).
U. manicatus Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 127 (D ♂).
U. omoedus Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 129 (D ♀).
U. h. Kulczynski 1908, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 549 (N ♂♀).

♀ **humeralis marginatus** Kulczynski 1908. Java
U. h. marginata Kulczynski 1908, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 550 (D ♀).

♀ **leucosagma** Thorell 1895. Burma
U. l. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 135 (D ♀).

♀ **limbatus** Thorell 1895. Burma
U. l. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 131 (D ♀).

♀ **lugubris** (Thorell) 1895. Burma
Philoponus l. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 125 (D ♀).

♀ **modestus** Thorell 1891. Nicobaren
U. m. Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 36 (D ♀).

♀ **mollis** Thorell 1895. Burma
U. m. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 134 (D ♀).

♀ **niveivestis** Simon 1893. Philippinen
U. n. Simon 1893, Ann. Soc. Ent. France 62 p. 67 (D ♀).

♂ **oculatus** Kulczynski 1908. Malakka
U. o. Kulczynski 1908, Ann. Mus. Nat. Hungar. 6 p. 469 T. 9 F. 2, 3 (D ♂).

♀ **pictus** Thorell 1898. Burma
U. p. Thorell 1898, Ann. Mus. Civ. Genova 39 p. 323 (D ♀).

o **pinnipes** Thorell 1877. Celebes
U. p. Thorell 1877, Ann. Mus. Civ. Genova 10 p. 452 (D o).
Philoponus p. Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 127 (N).
U. p. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 212, 215 (N).

♂♀ **pteropus** (Thorell) 1887. Burma
Philoponus p. Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 128 (D o).
Philoponus p. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 125 (D o).
U. p. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 215 (N).
U. p. Kulczynski 1908, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 543 T. 23 F. 16, 19 (D ♂♀).
U. p. Simon 1909, Bull. Sci. France Belg. 42 p. 74 (N).

♀ **quadrituberculatus** Thorell 1892. Malakka, Java
U. q. Thorell 1892, Bull. Soc. Ent. Ital. 24 p. 221 (D ♀).
U. q. Kulczynski 1908, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 551 T. 23 F. 15, 24 (D ♀).

♀ **raffrayi** Simon 1891. Malakka
U. r. Simon 1891, Ann. Soc. Ent. France 60 p. 13 (D ♀).
U. r. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 212 (N).

♀ **scutifaciens** Hingston 1927. Burma
U. s. Hingston 1927, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 291 (D ♀).

♀ **sexfasciatus** Simon 1892. Philippinen
U. s. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 215 (N).
U. s. Simon 1893, Ann. Soc. Ent. France 62 p. 67 (D ♀).

♀ **sexmucronatus** Simon 1893. Philippinen
U. s. Simon 1893, Ann. Soc. Ent. France 62 p. 68 (D ♀).

♀ **trifasciatus** Thorell 1890. Nias
U. t. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 30 p. 12 (D ♀).

♀ **tristis** Kulczynski 1908. Malakka, Java
U. t. Kulczynski 1908, Ann. Mus. Nat. Hungar. 6 p. 46 T. 9 F. 32 (D ♀).
U. t. Kulczynski 1908, Bull. Ac. Sci. Crascov. p. 560 (N).

♂♀ **truncatus** Thorell 1895. Burma, Java
U. t. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 133 (D ♀).
U. nasutus Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 136 (D ♂).
U. t. Kulczynski 1908, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 553 T. 13 F. 9, 13, 14, 17 (D ♂♀).

♀ **umboniger** Kulczynski 1908. Ceylon
U. u. Kulczynski 1908, Ann. Mus. Nat. Hungar. 6 p. 474 (D ♀).

♀ **viridimicans** Simon 1892. Philippinen
U. v. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 215 (N).
U. v. Simon 1893, Ann. Soc. Ent. France 62 p. 66 (D ♀).

Transgredierende Arten:

♂♀ **undulatus** Thorell 1878. Malakka, Java, Kei-I., Neu-Guinea
U. u. Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 133 (D ♂♀).

♀ **undulatus indicus** Kulczynski 1908. Malakka
U. u. i. Kulczynski 1908, Ann. Mus. Nat. Hungar. 6 p. 467 T. 9 F. 14 (D ♀).

♀ **undulatus obscurior** Kulczynski 1908. Neu-Guinea
U. u. o. Kulczynski 1908, Ann. Mus. Nat. Hungar. 6 p. 465 T. 9 F. 9 (D ♀).

♀ **undulatus pallidior** Kulczynski 1908. Java, Aru-I., Kei-I., Neu-Guinea
U. u. p. Kulczynski 1908, Ann. Mus. Nat. Hungar. 6 p. 465 T. 9 F. 5, 13 (D ♀).
U. u. p. Hogg 1915, Trans. Zool. Soc. Lond. 20 (14) p. 433 (N ♀).
U. u. p. Roewer 1938, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors Sér.) 3 (19) p. 28 f. 17 (N ♀).

Australische Arten:

♀ **barbipes** L. Koch 1871. Queensland
U. b. L. Koch 1871, Arachn. Austral. 1 (1) p. 229 T. 19 F. 9 (D ♂♀).
U. b. Simon 1892, Hist. Nat. Araogn. 1 (1) p. 215 (N).

♂♀ **bistriatus** L. Koch 1871. Fidji-I., Neue Hebriden
U. b. L. Koch 1871, Arachn. Austral. 1 (1) p. 224 T. 19 F. 4 (D ♂♀).

canus Mac Leay 1827. Australien
U. c. Mac Leay 1827, King. Surv. Intertrop. a. West. Coast of Austral. 2 p. 468.
U. c. Walckenaer 1841, Hist. Nat. Ins. Apt. 2 p. 503 (N).

♂♀ **congregabilis** Rainbow 1916. Neu-Süd-Wales
U. c. Rainbow 1916, Austral. Zoologist 1 (3) p. 59 f. 1, 2 (D ♂♀).

♂o **dissimilis** Berland 1924. Neu-Caledonien
U. d. Berland 1924, Nov. Caledon.; Zool. 3 (2) p. 176 f. 18—20 (D ♂♀).

♀ **flavolineatus** Rainbow 1898. Neu-Guinea
U. f. Rainbow 1898, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 23 (3) p. 333 T. 7 F. 3 (D ♀).

♀ **gibbosus** L. Koch 1871. Samoa
U. g. L. Koch 1871, Arachn. Austral. 1 (1) p. 228 T. 19 F. 8 (D ♀).
U. g. Berland 1938, Ann. Soc. Ent. France 107 p. 186 f. 157—158 (D ♂).

♂ **inaequalis** Kulczynski 1908. Neu-Guinea
U. i. Kulczynski 1908, Ann. Mus. Nat. Hungar. 6 p. 476 T. 9 F. 4 (D ♂).

♀ **pantherinus** Keyserling 1887. Neu-Süd-Wales
U. p. Keyserling 1887, Arachn. Austral. 2 p. 234 T. 21 F. 2 (D ♀).

♂ **spinitarsis** Keyserling 1887. Neu-Süd-Wales
U. s. Keyserling 1887, Arachn. Austral. 2 p. 231 T. 20 F. 9 (D ♂).

♂♀ **tahitiensis** Berland 1934. Tahiti, Rapa
U. t. Berland 1934, Ann. Soc. Ent. France 103 p. 323 f. 1—6 (D ♂♀).

♀ **tenellus** L. Koch 1871. Samoa
U. t. L. Koch 1871, Arachn. Austral. 1 (1) p. 220 T. 17 F. 5 (D ♀).

♂♀ **tenuissimus** L. Koch 1871. Samoa
U. t. L. Koch 1871, Arachn. Austral. 1 (1) p. 226 T. 19 F. 6, 7 (D ♂♀).

♀ **variabilis** Keyserling 1887. Queensland, Neu-Süd-Wales
U. v. Keyserling 1887, Arachn. Austral. 2 p. 229 T. 20 F. 8 (D ♀).

♀ **waitakerensis** Chamberlain 1946. Neu-Seeland
U. w. Chamberlain 1945, Rec. Auckl. Inst. Mus. 3 (2) p. 90 TF. 1—4 (D ♀).

Neotropische Arten:

§ 6 Arten: Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 424.
§ 2 ♂, 7 ♀: F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 361.
§ 9 Arten: Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 6—7.

♂♀ **abstrusus** Gertsch & Davis 1942. Mexico
U. a. Gertsch & Davis 1942, Amer. Mus. Novit. 1158 p. 18 TF. 41—42 (D ♂♀).

♀ **aegrotus** Simon 1892. Venezuela, Panama
U. a. Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 425 (D ♀).

♀ **albineus** Banks 1898. Mexico
U. a. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 235 T. 15 F. 18 (D ♀).

♂ **albolineatus** Mello-Leitao 1941. Argentinien
U. a. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 111 (D ♂).

♀ **amazonicus** Mello-Leitao 1949. Brasilien
U. a. Mello-Leitao 1949, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 92, Zool. p. 2 (D ♀).

♀ **ater** Mello-Leitao 1917. Brasilien
U. a. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 4 u. 7 (D ♀).

♀ **bituberculatus** Keyserling 1882. Peru
U. b. Keyserling 1882, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 31 p. 282 T. 11 F. 8 (D ♀).

♀ **bucki** Mello-Leitao 1943. Rio Grande do Sul
U. b. Mello-Leitao 1943, Arqu. Mus. Nac. R. d. Jan. 37 p. 157 TF. 3 (D ♀).

♂♀ **campestratus** Simon 1892. Venezuela
U. c. Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 425 (D ♂♀).

♀ **canescens** C. L. Koch 1845. Columbien
U. c. C. L. Koch 1845, Die Arachniden 11 p. 164 TF. 957 (D ♀).

♀ **cinereus** Cambridge 1898. Mexico
U. c. Cambridge 1898, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 265 T. 33 F. 13 (D ♀).
U. c. F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 362 T. 34 F. 11 (N ♀).

♀ **collinus** Keyserling 1882. Peru
U. c. Keyserling 1882, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 32 p. 212 T. 15 F. 12 (D ♀).

communalis Franganillo 1935. Cuba
U. c. Franganillo 1935, Belem Habana Cuba 9 (51—52) p. 46 (D).

♂♀ **costa-limae** Mello-Leitao 1917. Brasilien
U. c. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 5, 7 (D ♂♀).

♀ **crepidinis** Chamberlin 1924. Nieder-Californien
U. c. Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 580 f. 5 (D ♀).

♀ **cuminamensis** Mello-Leitao 1930. Amazonas
U. c. Mello-Leitao 1930, Arch. Mus. Nac. R. d. Jan. 32 p. 61 TF. 14, 15 (D ♀).

♀ **diversus** Banks 1898. Mexico
U. d. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 234 T. 14 F. 17 (D ♀).

♀ **fasciatus** Mello-Leitao 1917. Brasilien
U. f. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 4, 7 (D ♀).

♀ **festivus** Mello-Leitao 1917. Brasilien
U. (Philoponella) f. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 3, 7 (D ♀).

filidentatus Hingston 1932. Brit. Guiana
U. f. Hingston 1932, Naturalist in Guiana Forest p. 374 (D).

filinodatus Hingston 1932. Brit. Guiana
U. f. Hingston 1932, Naturalist in Guiana Forest p. 375 (D).

♀ **formosus** Banks 1898. Mexico
U. f. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 234 T. 14 F. 31 (D ♀).

♂♀ **lactescens** Mello-Leitao 1947. Süd-Brasilien
U. l. Mello-Leitao 1947, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 80, Zool. p. 4 T. 4 F. 35; T. 6 F. 491 (D ♂♀).

♀ **lunaris** (C. L. Koch) 1839. Brasilien
Tetragnatha l. C. L. Koch 1839, Die Arachniden 6 p. 151 TF. 540 (D ♀).

♀ **manicatus** Simon 1893. Amazonas
U. m. Simon 1893, Ann. Soc. Ent. France 62 p. 299 (D ♀).
U. (Phillyra) m. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 7 (N).

♀ **minutus** Mello-Leitao 1915. S.-Brasilien
U. m. Mello-Leitao 1915, Broteria 13 p. 130 (D ♀).
U. (Phillyra) m. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 6 (N).

♂♀ **mundior** Chamberlin & Ivie 1936. Panama
U. m. Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah; Biol. 27 (5) p. 11 T. 1 F. 8, 9 (D ♂♀).

♀ **niger** Mello-Leitao 1917. Brasilien
U. n. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 5, 7 (D ♀).

♀ **oweni** Chamberlin 1924. Nieder-Californien
U. **o.** Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 579 f. 4 (D ♀).

♂♀ **penicillatus** Simon 1891. St. Vincent
U. **p.** Simon 1891, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 554 (D ♂♀).

♀ **peruanus** Keyserling 1882. Peru
U. p. Keyserling 1882, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 31 p. 283 T. 11 F. 9 (D ♀).

♂♀ **plumipedatus** Roewer 1951. Süd-Brasilien
U. plumipes Mello-Leitao 1947, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 80, Zool. p. 6 T. 4 F. 30—31; T. 6 F. 41 (D ♂♀) (praeocc. Lucas 1846).
U. p. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 154 (nom. nov.).

♀ **rana** Mello-Leitao 1941. Nord-Argentinien
U. r. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 112 f. 10 (D ♀).

♂♀ **republicanus** Simon 1891. Venezuela, Brit. Guiana
U. r. Simon 1891, Ann. Soc. Ent. France 60 p. 12 T. 3 F. 1; T. 4 F. 1 (D ♂♀).
U. r. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 212 (N).
U. (Philoponella) r. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 7 (D).
U. r. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 624 TF. 14 (N ♀).

♀ **saphes** Chamberlin 1924. Nieder-Californien
U. s. Chamberlin 1924, Proc. Calif. Ac. Sci. 12 p. 581 f. 6 (D ♀).

♀ **semiargenteus** Simon 1893. Brasilien
U. s. Simon 1893, Ann. Soc. Ent. France 62 p. 299 (D ♀).
U. (Philoponella) s. Mello-Leitao 1917, Arch. Escol. Sup. Agr. 1 p. 7 (N).

♀ **semiplumosus** Simon 1892. Venezuela
U. s. Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 426 (D ♀).

♀ **servulus** Simon 1892. Venezuela
U. s. Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 427 (D ♀).
U. s. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 213 (N).

♂♀ **signatellus** Roewer 1951. Centr.-Amerika, Mexico
U. signatus Cambridge 1898, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 264 T. 38 F. 9, 10 (D ♂♀) (praeocc. Cambridge 1876).
U. signatus F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 362 T. 34 F. 5, 6 (N ♂♀).
U. signatus Chamberlin 1938, Carnegie Inst. Wash. Publ. 491 p. 130 f. 10 (N ♀).
U. s. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 454 (nom. nov.).

socialis Hingston 1932. Brit. Guiana
U. s. Hington 1932, Naturalist in Guiana Forest p. 374 (D).

♀ **spernax** Cambridge 1898. Costa Rica, Mexico
U. s. Cambridge 1898, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 265 T. 33 F. 12 (D ♀).
U. s. F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 363 T. 34 F. 12 (N ♀).

♀ **tetramaculatus** Mello-Leitao 1940. Brasilien
U. t. Mello-Leitao 1940, Ann. Ac. Brasil. Sci. 12 (1) p. 22 (D ♀).

♀ **tingens** Chamberlin & Ivie 1936. Panama
U. t. Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah; Biol. 27 (5) p. 10 T. 2 F. 10 (D ♀).

♂ **trilineatus** Keyserling 1882. Peru

U. t. Keyserling 1882, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 32 p. 214 T. 15 F. 13 (D ♂).

♀ **ursinus** Mello-Leitao 1947. Süd-Brasilien

U. u. Mello-Leitao 1947, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 80, Zool. p. 7 T. 6 F. 51 (D ♀).

♀ **variegatus** Cambridge 1898. Mexico, Panama, Portorico, Cuba, Texas

U. v. Cambridge 1898, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 266 T. 38 F. 11 (D ♀).
U. v. F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 362 T. 34 F. 8 (N ♀).
U. v. Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 30 p. 229 f. 77, 78 (D ♀).
U. v. Gertsch & Mulaik 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 77 (6) p. 334 (N ♂♀).
U. v. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 328 T. 7 F. 95 (D ♂).

♀ **vicinus** Cambridge 1899. Mexico

U. v. Cambridge 1899, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 266 T. 38 F. 12 (D ♀).
U. v. F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 362 T. 34 F. 7 (N ♀).

♀ **villosus** Keyserling 1882. Columbien

U. v. Keyserling 1882, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 31 p. 278 T. 11 F. 6 (D ♀).

♀ **zenzesi** Mello-Leitao 1945. Argentinien

U. z. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 4, Zool. p. 231 (D ♀).

Nearktische Arten:

♂ **arizonensis** Gertsch 1936. Arizona

U. a. Gertsch 1936, Amer. Mus. Novit. 852 p. 2 TF. 3 (D ♂).

♀ **californicus** Banks 1904. Californien

U. c. Banks 1904, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 3 (13) p. 351 T. 39 F. 35 (D ♀).

♂♀ **glomosus** (Walckenaer) 1841. Östl. U. St. Amerika

Epeira g. Walckenaer 1841, Hist. Nat. Ins. Apt. 2 p. 143 (D ♀).
Phillyra mammeata Hentz 1850, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 6 p. 25 T. 3 F. 16 (D ♀).
Phillyra riparia Hentz 1850, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 6 p. 26 T. 3 F. 17 (D ♂).
U. plumipes Emerton 1888, Trans. Connect. Ac. Sci. 7 p. 454 T. 11 F. 1 (D ♂♀).
U. plumipes Mc Cook 1893, Amer. Spiders 3 p. 274 T. 27 F. 3—4; T. 28 F. 6 (N ♂♀).
U. plumipes Emerton 1902, Common Spiders p. 216 f. 494—497 (D ♂♀).
U. americanus Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 294 (C).
U. g. Chamberlin & Ivie 1944, Bull. Univ. Utah 35 (9), Biol. 8 (5) p. 34 (N).
U. americanus Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 515 T. 105 F. 1956—58; T. 106 F. 1976—79; T. 137 F. 2076—77 (D ♂♀).

♂♀ **octonarius** Muma 1945. Maryland

U. o. Muma 1945, Proc. Biol. Soc. Wash. 58 p. 91 T. 9 F. 1—2 (D ♂♀).

♂♀ **segregatus** Gertsch 1936. Texas

U. s. Gertsch 1936, Amer. Mus. Novit. 852 p. 4 TF. 7 (D ♂♀).

♀ **utahensis** Chamberlin 1919. Utah

U. u. Chamberlin 1919, Ann. Ent. Soc. Amer. 12 p. 244 (D ♀).

2. *Subfam. Uptiotinae*

(Hyptiotinae)

Gen. **Uptiotes** Walckenaer 1833.

(Hyptiotes auct. sequ.)

Palaearktische Arten:

♀ **affinis** (Bösenberg & Strand) 1906. Japan

Hyptiotes a. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) p. 108 T. 15 F. 393 (D ♀).
Hyptiotes a. Strand 1918, Arch. Naturg. 82 (A; 11) p. 90 T. 2 F. 10 (N ♀).

♂♀ **flavidus** (Blackwall) 1862. Mittelmeergebiet, Ungarn, Madeira

Mithras f. Blackwall 1862, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 9 p. 373 (D ♂).
Mithras dubius Blackwall 1862, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 9 p. 375 (D ♀).
Hyptiotes anceps Chyzer & Kulczynski 1897, Aran. Hungar. 2 (b) p. 310 (N).
Hyptiotes anceps Thorell 1897, Feuille Jeun. Natural. 17 p. 110 (N).
Hyptiotes f. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 29, 31 f. 52, 53 (D ♂♀).
Hyptiotes f. Wiehle 1929, Zeitschr. Morphol. Oekolog. d. Tiere 15 p. 295 f. 17, 20 (N ♀).

♀ **gerhardti** (Wiehle) 1929. Griechenland

Hyptiotes g. Wiehle 1929, Zeitschr. Morphol. Oekolog. d. Tiere 15 (1—2) p. 295 f. 19 (D ♀).

♂♀ **paradoxus** (C. L. Koch) 1837. – * Europa, Madeira

U. Walckenaer 1833, Ann. Soc. Ent. France 2 p. 438 (D gen.).
Mithras p. C. L. Koch 1837, in: Herrich-Schäffer, Deutschl. Crust. Myriop. Arachn. p. 123 f. 9 (D).
Scytodes Mithras Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 275 (D).
U. anceps Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 277 (D ♀).
U. anceps schreberi Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 278 (D ♂).
Mithras p. C. L. Koch 1845, Die Arachniden 12 p. 94 TF. 1023, 1024 (D ♂♀).
Mithras undulatus C. L. Koch 1845, Die Arachniden 12 p. 96 TF. 1025 (D ♀).
Mithras p. Westring 1862, Aran. Svec. p. 88 (D ♂♀).
Uptiota mithras Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 184 (C).
Mithras p. Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 125 (D ♂♀).
Hyptiotes p. Thorell 1869, On Europ. Spid. p. 50, 67 (nom. nov. gen.).
Hyptiotes alpinus C. Koch 1874, Jahrb. Nassau. Ver. Nat. 22 p. 135 (D).
Hyptiotes p. Lebert 1877, Neu. Denkschr. Schweiz. Ges. Nat. 26 p. 144 f. 26 (D ♂♀).
Hyptiotes alpinus Lebert 1877, Neu. Denkschr. Schweiz. Ges. Nat. 26 p. 147 (N).
Hyptiotes p. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 34 (D ♂♀).
Hyptiotes p. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 148 T. 6 F. 17 (D ♂♀).
Hyptiotes p. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 219 f. 162, 163 (N ♂).
Hyptiotes p. Chyzer & Kulczynski 1897, Aran. Hungar. 2 (b) p. 309 T. 10 F. 71 (N).
Hyptiotes p. Bösenberg 1901, Zoologica 13 (1) p. 55 T. 4 F. 49 (D ♂♀).
Hyptiotes p. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 15 f. 9, 10 (D ♂♀).
Hyptiotes p. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 29, 31 f. 50, 51 (D ♂♀).
Hyptiotes p. Wiehle 1929, Zeitschr. Morphol. Oekolog. d. Tiere 15 p. 296 f. 16, 18, 21 (N ♀).
Hyptiotes p. Reimoser 1930, Die Natur (Wien) 6 (1) p. 15 f. 5 (N ♂♀).
Hyptiotes p. Drenski 1939, Mitt. Nat. Inst. Sofia 12 p. 243 f. 20—21 (N ♂♀).
Hyptiotes p. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders I. p. 71 f. 31—32C—F (D ♂♀).

Hyptiotes p. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 **p.** 119 f. 252—261 (D ♂♀).

Orientalische Arten:

O **analis** (Simon) 1892. Ceylon

Hyptiotes a. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) **p.** 219 (D O).

♀ **indicus** (Simon) 1905. Indien

Hyptiotes i. Simon 1905, Ann. Soc. Ent. France 74 p. 163 (D ♀).

Neotropische Arten:

♂ **zenzesi** (Mello-Leitao) 1945. Argentinien

Hyptiotes z. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 4, Zool. p. 229 f. 5 (D ♂).

Nearktische Arten:

♂♀ **cavatus** (Hentz) 1847. Östl. U. St. Amerika, Canada

Cyllopodia c. Hentz 1847, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. 5 p. 466 T. 30 F. 3 (D ♀).
Hyptiotes americanus Wilder 1875, Popul. Sci. Monthl. **p.** 2 (D).
Hyptiotes c. Mc Cook 1881, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. **p.** 168 f. 6—9 (N ♀).
Hyptiotes c. Emerton 1888, Trans. Connect. Ac. Sci. 9 **p.** 456 T. 11 F. 2 (D ♂♀).
Hyptiotes c. Mc Cook 1893, Amer. Spid. p. 276 T. 27 F. 7 (D ♂♀).
Hyptiotes c. Emerton 1902, Common Spid. **p.** 218 f. 498—500 (D ♂♀).
Hyptiotes c. Comstock 1912, Spider Book **p.** 270 f. 245—248 (N).
Hyptiotes c. Wiehle 1929, Zeitschr. Morphol. Oekolog. d. Tiere 15 p. 300 f. 22—23 (N ♀).
Hyptiotes c. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 **p.** 514 T. 105 F. 1959—1963; T. 106 F. 1980—1984; T. 138 F. 2078 (D ♂♀).

♀ **gertschi** (Chamberlin & Ivie) 1935. Utah, Alaska

Hyptiotes g. Chamberlin & Ivie 1935, Bull. Univ. Utah 26 (4), Biol. 2 (8) p. 12 T 6 F. 38—39 (D ♀).
Hyptiotes g. Chamberlin & Ivie 1947, Bull. Univ. Utah 37 (10); Biol. 10 (3) p. 25 (N ♀).

3. Subfam. Miagrammopinae

Gen. **Miagrammopes** Cambridge 1869.

Palaearktische Arten:

♂ **orientalis** Bösenberg & Strand 1906. Japan

M. o. Bösenberg & Strand 1906, Abh. Senckenbg. Ges. 30 (1—2) **p.** 109 T. 15 F. 422 (D ♂).

Aethiopische Arten:

♀ **brevicauda** Cambridge 1882. Süd-Afrika

M. b. Cambridge 1882, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 437 T. 31 F. 12A (D ♀).
M. b. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 220 (N).

♀ **constrictus** Purcell 1904. Natal

M. c. Purcell 1904, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 15 (3) p. 130 (D ♀).

♀ **gulliveri** Butler 1876. I. Rodriguez

M. g. Butler 1876, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 17 p. 443 (D ♀).
M. g. Butler 1878, Trans. Phil. Soc. Lond. 168 p. 505 T. 52 F. 5 (D ♀).

♀ **longicauda** Cambridge 1882. Süd-Afrika
M. l. Cambridge 1882, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 436 T. 31 F. 12 (D ♀).
M. l. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 220 (N).

♀ **raffrayi** Simon 1881. Sansibar, Ost-Afrika
M. r. Simon 1881, Bull. Soc. Zool. France 6 p. 5 (D ♀).
M. r. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 220 (N).
M. r. Berland 1914, Aran. I. in: Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Orient. p. 54 f. 11 (N ♀).

Orientalische Arten:

o **albomaculatus** Thorell 1891. Nicobaren
M. a. Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 38 (D o).

♀ **cambridgei** Thorell 1887. Burma, Sumatra
M. c. Thorell 1887, Ann. Mus. Civ. Genova 25 p. 122 (D ♀).

O♀ **extensus** Simon 1889. Indien
M. e. Simon 1889, Journ. Asiat. Soc. Bengal. 58 (2; 4) Suppl. p. 342 (D O ♀).

♀ **ferdinandi** Cambridge 1869. Ceylon
M. f. Cambridge 1869, Journ. Linn. Soc. Lond. 10 Zool. p. 404 T. 14 F. 13—15 (D ♀).
M. f. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 220 (N).

♀ **rimosus** Simon 1886. Indochina, Siam
M. r. Simon 1886, Act. Soc. Linn. Bord. 40 p. 155 (D ♀).
M. rimatus Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 220 f. 160 (N).
M. r. Simon 1904, Arachn. in: Miss. Pavie Indochin. 3 p. 273 (D ♀).

♀ **sexpunctatus** Simon 1906. Indien
M. s. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. France 75 p. 306 (D ♀).

♀ **singaporensis** Kulczynski 1908. Singapore
M. s. Kulczynski 1908, Ann. Mus. Nat. Hungar. 6 p. 49 T. 9 F. 24, 26 (D ♀).

♀ **thwaitesii** Cambridge 1869. – * Ceylon, Dekan
M. t. Cambridge 1869, Journ. Linn. Soc. Lond. 10 Zool. p. 401 T. 14 F. 1—12 (D ♀).
M. t. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 220 (N).
M. t. Reimoser 1934, Rev. Suisse Zool. 41 (32) p. 478 (N ♀).

Australische Arten:

♂♀ **biroi** Kulczynski 1908. Neu-Guinea
M. b. Kulczynski 1908, Ann. Mus. Nat. Hungar. 6 p. 478 T. 9 F. 10—12, 23, 27, 28 (D ♂♀).
M. b. Hogg 1915, Trans. Zool. Soc. Lond. 20 (14) p. 433 (N ♀).

♀ **bradleyi** Cambridge 1874. Neu-Süd-Wales
M. b. Cambridge 1874, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 14 p. 177 (D ♀).

♂♀ **brevior** Kulczynski 1908. Neu-Guinea
M. b. Kulczynski 1908, Ann. Mus. Nat. Hungar. 6 p. 486 T. 9 F. 16 17, 19, 21, 25, 30 (D ♂♀).

o **caudatus** Keyserling 1889. Queensland
M. c. Keyserling 1889, Arachn. Austral. 2 p. 253 T. 23 F. 5 (D o).
M. c. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 220 (N).

♀ **fasciatus** Rainbow 1916. Queensland
M. f. Rainbow 1916, Rec. Austral. Mus. 11 (3) p. 36 T. 14 F. 1 (D ♀).

♀ **plumipes** Kulczynski 1911. Neu-Guinea
M. p. Kulczynski 1911, Res. Exped. Sci. Wichmann; N. Guinea 5 (Zool. 3) p. 427 T. 19 F. 5 (D ♀).

♂ **similis** Kulczynski 1908. Neu-Guinea
M. s. Kulczynski 1908, Ann. Mus. Nat. Hungar. 6 p. 484 T. 9 F. 15, 18, 20, 29 (D ♂).

♀ **viridiventris** Strand 1911. Kei-Ins.
M. v. Strand 1911, Abh. Senckenbg. Ges. 34 (2) p. 130 T. 5 F. 42 (D ♀).

Neotropische Arten:

♀ **albocinctus** Simon 1892. Venezuela
M. a. Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 429 (D ♀).
M. a. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 220 f. 161 (N).

♀ **alboguttatus** F. Cambridge 1902. Guatemala, Panama
M. a. F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 365 T. 34 F. 14 (D ♀).

♂♀ **bambusicola** Simon 1892. Venezuela
M. b. Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 428 (D ♂♀).
M. b. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 217 (N).

♂ **birabeni** Mello-Leitao 1945. Argentinien
M. b. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 4, Zool. p. 231 f. 6 (D ♂).

♀ **brasiliensis** Roewer 1951. Rio Grande do Sul
M. albomaculatus Mello-Leitao 1943, Arqu. Mus. Nac. R. d. Jan. 37 p. 156 TF. 2 (D ♀) (praeocc. Thorell 1891).
M. b. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 454 (nom. nov.).

♀ **ciliatus** Petrunkevitch 1926. Portorico, St. Thomas
M. c. Petrunkevitch 1926, Trans. Connect. Ac. Sci. 28 p. 47 f. 7 (D ♀).
M. c. Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 30 p. 232 f. 79—82 (D ♀).

♂♀ **correai** Piza 1944. San Paulo
M. c. Piza 1944, Arqu. (Piracicaba) S. Paulo 19 (6—7) p. 263 f. 1—2 (D ♂♀).

♂♀ **corticeus** Simon 1892. Venezuela
M. c. Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 427 (D ♂♀).
M. c. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 220 (N).

♀ **cubanus** Banks 1909. Cuba
M. c. Banks 1909, II. Rep. Centr. Exper. Stat. Rep. Cuba p. 159 (D).
M. c. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 329 T. 6 F. 86 (D ♀).

♂ **guttatus** Mello-Leitao 1937. Süd-Brasilien
M. g. Mello-Leitao 1937, Ann. Ac. Brasil. Sci. 11 (1) p. 5 f. 6—11 (D ♂).

♂♀ **lacteovittatus** Mello-Leitao 1947. Süd-Brasilien
M. l. Mello-Leitao 1947, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 80, Zool. p. 3 T. 4 F. 38—39; T. 6 F. 24 (D ♂♀).

♂♀ **latens** Bryant 1936. Cuba, San Domingo

M. l. Bryant 1936, Mem. Soc. Cuban. Hist. Nat. 10 (5) p. 326 T. 23 F. 4 (D ♂).
M. l. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 330 T. 7 F. 98 (D ♀).
M. l. Bryant 1948, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 100 (4) p. 393 (N ♂♀).

♀ **luederwaldti** Mello-Leitao 1925. Süd-Brasilien

M. l. Mello-Leitao 1925, Revista Chil. 29 p. 280 f. 34 (D ♀).

♀ **mexicanus** Cambridge 1893. Mexico

M. m. Cambridge 1893, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 116 T. 15 F. 7 (D ♀).
M. b. F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 264 T. 34 F. 13 (N ♀).

♀ **nevermanni** Reimoser 1939. Costa Rica

M. n. Reimoser 1939, Ann. Naturh. Mus. Wien 50 p. 336 f. 2 (D ♀).

♀ **romitii** Caporiacco 1947. Brit. Guiana

M. r. Caporiacco 1947, Monit. Zool. Ital. 56 (1—6) p. 21 (D ♀).
M. r. Caporiacco 1948, Proc. Zool. Soc. London 118 (3) p. 624 TF. 15—16 (D ♀).

♀ **rubripes** Mello-Leitao 1949. Brasilien

M. r. Mello-Leitao 1949, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 92, Zool. p. 3 (D ♀).

♂♀ **scoparius** Simon 1891. St. Vincent

M. s. Simon 1891, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 555 (D ♂♀).
M. s. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 220 f. 164 (N ♂).

♀ **simus** Chamberlin & Ivie 1936. Panama

M. s. Chamberlin & Ivie 1936, Bull. Univ. Utah, Biol. 27 (5) p. 12 T. 2 F. 11, 12 (D ♀).

♀ **traillii** Cambridge 1882. Amazonas

M. t. Cambridge 1882, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 435 T. 31 F. 11 (D ♀).
M. t. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 220 (N).

Transgredierende Arten:

o **lineatus** Cambridge 1894. Mexico, Texas

M. l. Cambridge 1894, Biol. Centr. Amer. Aran. 1 p. 137 U. 17 F. 12 (D o).
M. l. F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 365 (N o).

61. Fam. DEINOPIDAE

Gen. **Deinopis** Mac Leay 1839.

(= **Dinopis** auct. sequ.)

Aethiopische Arten:

§ 7 (♂, ♀): Pocock 1902, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 10 p. 324.
§ 4 Arten: Strand 1913, Arachn. I. in: Wiss. Erg. Dt. Zentr. Afr. Exped. 4 (Zool. 2) (11) p. 327.

♂♀ **anchietae** Brito Capello 1867. West-Afrika, Angola

D. a. Brito Capello 1867, Mem. Ac. Sci. Lisboa (3) 4 (1) p. 16 T. 2 F. 2 (D ♀).
D. bubo Brito Capello 1867, Mem. Ac. Sci. Lisboa (3) 4 (1) p. 15 T. 2 F. 3 (D ♂).
D. bubo Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 203 f. 151—154 (N ♀).
D. bubo Berland 1913, Arch. Zool. Expér. Gén. 51 (Not. & Rev. 2) p. 27 f. 1—5 (N ♀).

♀ **aspectans** Pocock 1899. Camerun, Congo
D. a. Pocock 1899, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 847 (D ♀).

♂♀ **cornigera** Gerstäcker 1873. Ost-Afrika
D. c. Gerstäcker 1873, Gliedertier-Faun. Sansibar-Geb. p. 478 T. 18 F. 5 (D ♂).
D. bubalus Simon 1890, Ann. Soc. Ent. France (6) 10 p. 126 (D ♀).
D. c. Simon 1909, Ann. Soc. Ent. Belg. 53 p. 29 (N).
D. ruandanus Strand 1913, Arachn. I. in: Wiss. Erg. Dt. Zentr. Afr. Exped. 4 (Zool. 2) (11) p. 327 (D ♀).

♂♀ **cylindrica** Pocock 1898. Natal
D. c. Pocock 1898, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 2 p. 204 (D ♂).
D. stauntoni Pocock 1902, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 10 p. 323 (D ♀).

♀ **giltayi** Lessert 1929. Congo
D. g. Lessert 1929, Rev. Suisse Zool. 37 (22) p. 618 f. 2 (D ♀).

♂ **guineensis** Berland & Millot 1940. Franz. Guinea
D. g. Berland & Millot 1940, Ann. Soc. Ent. France 108 p. 157 f. 9 (D ♂).

♂ **longipalpus** Strand 1913. Centr.-Afrika
D. l. Strand 1913, Arachn. I. in: Wiss. Erg. Dt. Zentr. Afr. Exped. 4 (Zool. 2) (11) p. 326 (D ♂).

♂♀ **madagascariensis** Lenz 1886. Madagascar
D. m. Lenz 1886, Zool. Jahrb. Syst. 1 (2) p. 405 T. 10 F. 9 (D ♂).
D. m. Strand 1907, Nyt. Mag. Naturvid. 46 (1) p. 2 (D ♀).

♀ **ornata** Pocock 1902. Abessinien
D. o. Pocock 1902, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 10 p. 325 (D ♀).

♀ **schoutedeni** Giltay 1929. Congo
D. s. Giltay 1929, Rev. Zool. Bot. Afr. 18 (1) p. 23 f. 1, 2 (D ♀).

Orientalische Arten:

♂♀ **celebensis** Merian 1911. Celebes
D. c. Merian 1911, Zool. Jahrb. Syst. 31 (2) p. 167 f. A, B (D ♂♀).

♀ **fasciculigera** Simon 1909. Tonking
D. f. Simon 1909, Bull. Sci. France Belg. 42 p. 73 (D ♀).

♂ **kollari** Doleschall 1859. Amboina, Burma
D. k. Doleschall 1859, Act. Soc. Ind.-Neerl. 5 p. 10 T. 8 F. 7 (D ♂).
D. k. Thorell 1879, Ann. Mus. Civ. Genova 37 p. 265 (D ♂).

Australische Arten:

♀ **aruensis** Roewer 1938. Aru-Ins.
D. a. Roewer 1938, Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. (hors Sér.) 3 (19) p. 29 F. 18, 19 (D ♀).

♂ **bicornis** L. Koch 1879. Neu-Süd-Wales, Neu-Guinea
D. b. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1049 T. 91 F. 4 (D ♂).
D. b. Strand 1906, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. 59 p. 259 (D ♂).

♀ **camela** Thorell 1881. Neu-Guinea
D. c. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 194 (D ♀).

O♀ **fasciata** L. Koch 1879. Queensland
D. f. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1045 T. 92 F. 1, 2 (D O ♀).

♂o **insularis** Rainbow 1920. Lord Howe-Ins.
D. i. Rainbow 1920, Rec. S. Austral. Mus. 1 p. 229 T. 28 F. 1, 2 (D ♂ o).

♂ **mediocris** Kulczynski 1908. Neu-Guinea
D. m. Kulczynski 1908, Ann. Mus. Nat. Hungar. 6 p. 461 T. 9 F. 6, 7 (D ♂).

♀ **ravida** L. Koch 1879. Queensland
D. r. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1041 T. 91 F. 3 (D ♀).

♀ **schomburgki** Karsch 1878. Süd-Australien
D. s. Karsch 1878, Zeitschr. ges. Naturw. 51 p. 333 (D ♀).

♀ **subrufa** L. Koch 1879. Queensland, Neu-Süd-Wales
D. s. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1039 T. 91 F. 2 (D ♀).

♀ **tabida** L. Koch 1879. Queensland
D. t. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1047 T. 92 F. 3 (D ♀).

♀ **unicolor** L. Koch 1879. Centr.- u. West-Australien
D. u. L. Koch 1879, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1043 T. 91 F. 4 (D ♀).
D. u. Hickman 1944, Trans. R. Soc. S. Austral. 68 (1) p. 23 (N ♀).

Neotropische Arten:

♀ **armaticeps** Mello-Leitao 1925. Süd-Brasilien
D. a. Mello-Leitao 1925, Rev. Chilen. 29 p. 284 (D ♀).

♂♀ **aurita** F. Cambridge 1902. Mexico
D. a. F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 360 T. 34 F. 3, 4 (D ♂♀).

♀ **biaculeata** Simon 1906. Brasilien
D. b. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 284 (D ♀).

♀ **cylindracea** C. L. Koch 1846. Columbien
D. c. L. Koch 1846, Die Arachniden 13 p. 17 TF. 1089 (D ♀).

♀ **fastigata** Simon 1906. Brasilien
D. f. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 284 (D ♀).

♂♀ **granadensis** Keyserling 1879. Columbien
D. g. Keyserling 1879, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 29 p. 343 T. 4 F. 32 (D ♂♀).

♀ **guasca** Mello-Leitao 1943. Rio Grande do Sul
D. g. Mello-Leitao 1943, Arqu. Mus. Nat. R. d. Jan. 37 p. 158 TF. 4 (D ♀).

♂♀ **guianensis** Taczanowski 1874. Guiana
D. g. Taczanowski 1874, Hor. Soc. Ent. Ross. 10 p. 98 (D ♂♀).

♂♀ **lamia** Mac Leay 1839. – * Cuba, Portorico
D. l. Mac Leay 1839, Ann. Mag. Nat. Hist. (1) 2 p. 9 T. 2 F. 3 (D ♀).
D. l. Walckenaer 1841, Hist. Nat. Ins. Apt. 2 p. 458 (D ♀).
D. l. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 210 (N).
D. l. Petrunkevitch 1930, Trans. Connect. Ac. Sci. 30 p. 234 f. 83—86 (D ♀).
D. l. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 331 T. 7 F. 99, 101 (D ♂♀).

♂♀ **longipes** F. Cambridge 1902. Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama

D. l. F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 360 T. 34 F. 1, 2 (D ♂♀).

♀ **pallida** Mello-Leitao 1939. Süd-Brasilien

D. p. Mello-Leitao 1939, Mem. Inst. Butantan 12 p. 524 TF. 4 (D ♀).

♀ **pardalis** Simon 1906. Brasilien

D. p. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 285 (D ♀).

♀ **plurituberculata** Mello-Leitao 1925. Brasilien

D. p. Mello-Leitao 1925, Rev. Chilen. 29 p. 282 T. 5 F. 1—3 (D ♀).

♀ **rodophthalmus** Mello-Leitao 1940. Süd-Amerika (Loc.?)

D. r. Mello-Leitao 1940, Rev. Chil. Hist. Nat. 43 p. 173 (D ♀).

♀ **seriata** Simon 1906. Brasilien

D. s. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 284 (D ♀).

♀ **spinosa** Marx 1889. Venezuela, St. Vincent, Florida, Alabama

D. s. Marx 1889, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. p. 341 T. 11 a—m (D ♀).
D. s. Simon 1891, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 552 (N).

suboculata Franganillo 1935. Cuba

D. s. Franganillo 1935, Belen Habana Cuba 9 (51—52) p. 47 (D).

Gen. **Menneus** Simon 1876.

Aethiopische Arten:

♂ **affinis** Tullgren 1910. Ost-Afrika

M. a. Tullgren 1910, Aran. in: Sjöstedt Kilimandj. Exped. 3 (20; 6) p. 91 T. 1 F. 2 (D ♂).

♀ **camelus** Pocock 1902. Natal

M. c. Pocock 1902, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 10 p. 325 (D ♀).

♀ **dromedarius** Purcell 1904. Capland

M. d. Purcell 1904, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 15 (3) p. 127 (D ♀).

♂ **tetragnathoides** Simon 1876. – * Congo

M. t. Simon 1876, Bull. Soc. Zool. France 1 p. 219 (D ♂).
M. t. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 210 f. 155, 156 (N ♂).

Australische Arten:

♀ **angulatus** (L. Koch) 1878. Queensland

Avella a. L. Koch 1878, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1037 T. 91 F. 1 (D ♀).
M. a. Rainbow 1911, Rec. Austral. Mus. 9 (2) p. 123 (C).

♀ **decipiens** (Cambridge) 1877. Queensland, Neu-Süd-Wales

Avella d. Cambridge 1877, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 574 T. 57 F. 10 (D ♀).
Avella d. L. Koch 1878, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1033 (D ♀).
M. d. Rainbow 1911, Rec. Austral Mus. 9 (2) p. 124 (C).

♂o **neocaledonicus** (Simon) 1888. Neu-Caledonien

Avella n. Simon 1888, Ann. Soc. Ent. France (6) 8 p. 242 (D o).
M. n. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 210 (N).
M. n. Berland 1924, Nov. Caledon. Zool. 3 (2) p. 174 f. 11—15 (D ♂).

♀ **reticulatus** Rainbow 1899. Neu-Guinea
M. r. Rainbow 1899, Rec. Austral. Mus. 3 (5) p. 109 f. 1 (D ♀).

♀ **superciliosus** (Thorell) 1881. Queensland
Avella s. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 200 (D ♀).
M. s. Rainbow 1911, Rec. Austral. Mus. 9 (2) p. 124 (C).

♀ **trinodosus** Rainbow 1920. Lord Howe-Ins.
M. t. Rainbow 1920, Rec. S. Austral. Mus. 1 p. 230 T. 28 F. 3, 4 (D ♀).

♂ **unifasciatus** (L. Koch) 1878. Neu-Süd-Wales
Avella u. L. Koch 1878, Arachn. Austral. 1 (2) p. 1035 T. 90 F. 6 (D ♂).
M. u. Rainbow 1911, Rec. Austral. Mus. 9 (2) p. 124 (C).

6. Superfam. AMAUROBIIFORMIA

62. Fam. AMAUROBIIDAE

§ 6 gen. nearct.: Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (3) p. 5.

Gen. **Alauximus** Bryant 1948.

♀ **crassus** Bryant 1948. San Domingo
A. c. Bryant 1948, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 100 (4) p. 346 T. 2 F. 13 (D ♀).

♀ **infumatus** Bryant 1948. – * San Domingo
A. i. Bryant 1948, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 100 (4) p. 347 T. 2 F. 14 (D ♀).

Gen. **Amaurobius** C. L. Koch 1837.

Palaearktische Arten:

§ 5 ♂, 6 ♀: Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 163—164.
§ 8 ♂, 8 ♀: Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 35—40.
§ 7 ♂, 7 ♀: Roewer 1928, Tierw. Mitteleurop. 3 (6) p. 118—119 TF. 1335—1347.
§ 6 Arten: Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 124 u. 141.

♀ **aculeatus** Franganillo 1926. Andalusien
A. a. Franganillo 1926, Bol. Soc. Ent. Espan. 9 p. 78 (D ♀).

♀ **annulatus** (Kulczynski) 1906. Dalmatien
Ciniflo a. Kulczynski 1906, Ann. Mus. Nat. Hungar. 4 p. 157 f. 1 (D ♀).
A. a. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 22 (C).

♂♀ **barbarus** Simon 1910. Algier
A. b. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 275 (D ♂♀).
A. b. Denis 1944, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 79 (1) p. 43 T. 1 F. 3 (N ♀).

♂ **cerberus** Fage 1931. Spanien
A. c. Fage 1931, Arch. Zool. Expér. Gén. 71 (2) p. 126 f. 1 (D ♂).

♀ **chinesicus** Strand 1907. China
A. c. Strand 1907, Abh. Naturf. Ges. Görlitz 25 p. 7 TF. 50 a (D ♀).

♂♀ **claustrarius** (Hahn) 1831. Frankreich, Mitteleuropa, Mittelmeergebiet, Japan
Clubiona c. Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 114 TF. 86 (D ♂♀).
A. c. C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 15 (D).

A. montanus C. L. Koch 1837, Uebers. Arachn. Syst. 1 p. 15 (D).
A. montanus C. L. Koch 1839, Die Arachniden 6 p. 48 TF. 465 (D ♀).
A. c. C. L. Koch 1843, Die Arachniden 10 p. 114 TF. 830 (D ♀).
A. c. L. Koch 1855, Correspondenzblatt Zool. Ver. Regensbg. 9 (11) p. 167 TF. 6 (D ♂♀).
A. c. Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 91 (D ♂♀).
A. c. L. Koch 1868, Abh. Nat. Ges. Nürnbg. 4 p. 5 TF. 7, 8 (N ♂♀).
Cybaeus tetricus Menge 1871, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 2 p. 287 T. 52 F. 166 (D ♂♀).
A. c. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 55 (D ♂♀).
A. c. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 164 (D ♂♀).
A. c. Becker 1896, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 12 (2) p. 229 T. 14 F. 11 (D ♂♀).
A. c. Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 251 T. 23 F. 363 (D ♂♀).
Ciniflo c. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 16 (D ♂♀).
A. c. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 37, 38, 59 f. 67, 73 (D ♂♀).
A. c. Reimoser 1931, Die Natur (Wien) 7 (2) p. 39 f. 1 (N ♂♀).
A. c. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 131 f. 272—276 (D ♂♀).

♂♀ **claustrarius balcanicus** Drenski 1940. Bulgarien

A. c. b. Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 187, 193 f. 24—26 (D ♂♀).

♀ **drenskii** Kratochvil 1934. Serbien

A. d. Kratochvil 1934, Prirod. Razpr. 2 (4) p. 172 f. 1 (D ♀).

♂♀ **erberii** (Keyserling) 1863. Südl. Mitteleuropa, Mittelmeergebiet, Krim

Ciniflo e. Keyserling 1863, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 13 p. 373 T. 10 F. 5, 6 (D ♂♀).
A. e. L. Koch 1868, Abh. Nat. Ges. Nürnbg. 4 p. 21 TF. 9, 10 (D ♂♀).
A. cyrtilli Thorell 1871, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 206 (D ♂).
A. e. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 165 T. 6 F. 39 (D ♂♀).
A. e. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 237 f. 186 (N ♂).
A. e. Becker 1896, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 12 (2) p. 230 T. 14 F. 12 (D ♂♀).
Ciniflo e. Lessert 1910, Catal. Infert. Suisse; Araign. p. 21 (D ♂♀).
A. e. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 37, 39, 59 f. 68, 77 (D ♂♀).
A. e. Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 189 f. 21 (N ♂♀).

♂♀ **fenestralis** (Stroem) 1768. – * Europa

Aranea f. Stroem 1768, Trondh. Selsk. Skrift. 4 p. 362 T. 16 F. 23 (D ♂).
Aranea atrox De Geer 1778, Mém. p. s. Hist. Ins. 7 p. 253 T. 14 F. 24, 25 (D ♂♀).
Aranea atrox Olivier 1789, Encycl. Méthod. 4 p. 208 (D).
Clubiona atrox Sundevall 1831, Vet. Ak. Handl. p. 144 (D ♂♀).
Clubiona atrox Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 115 TF. 87 (D ♀).
Ciniflo atrox Blackwall 1841, Trans. Linn. Soc. Lond. 18 Zool. p. 607 (D ♂♀).
A. atrox C. L. Koch 1843, Die Arachniden 10 p. 116 TF. 831 (D ♂♀).
A. atrox L. Koch 1855, Correspondenzbl. Zool. Ver. Regensbg. 9 (11) p. 166 TF. 5 (D ♂♀).
Ciniflo atrox Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 140 T. 9 F. 88 (D ♂♀).
A. atrox Westring 1862, Aran. Svec. p. 377 (D ♂♀).
A. atrox Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 92 (D ♂♀).
A. atrox L. Koch 1868, Abh. Nat. Ges. Nürnbg. 4 p. 7 TF. 1, 2 (D ♂♀).
A. f. Menge 1870, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 2 p. 290 (D ♂♀).
A. f. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 55 (D ♂♀).
A. f. Hansen 1885; in: Schiödte, Zool. Danica p. 121 T. 3 F. 1 (D ♂♀).
A. f. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hunger 1 p. 165 T. 6 F. 36 (D ♂♀).
A. f. F. Cambridge 1892, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 10 p. 389 T. 21 F. 11 (N ♀).
A. f. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 238 (N).

A. f. Becker 1896, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 12 (2) p. 231 T. 14 F. 13 (D ♂♀).
A. f. Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 252 T. 23 F. 365 (D ♂♀).
Ciniflo f. Smith 1908, Journ. Quekett Micr. Cl. (2) 10 p. 314 T. 25 F. 2 (N ♀).
Ciniflo f. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 19 (D ♂♀).
A. f. Berland 1913, Arch. Zool. Expér. Gén. 51 (Not. & Rev. 2) p. 33 f. 17, 20 (N ♂♀).
A. f. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 37, 40, 60 f. 69, 70, 79 (D ♂♀).
A. f. Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 187 f. 20B, 23a (N ♂♀).
Ciniflo f. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders I. p. 54 f. 22C, F (D ♂♀).
A. f. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 136 f, 282—286 (D ♂♀).

♂ **festae** Caporiacco 1934. Cyrenaica

A. f. Caporiacco 1934, Boll. Mus. Zool. Torino (3) 44 (47) p. 7 f. 1 (D ♂).

♀ **flavovittatus** (Grube) 1861. Amurgebiet

Ciniflo f. Grube 1861, Bull. Ac. Sci. St. Petersbg. 4 p. 171 (D ♀).
A. f. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 189 (C).

♀ **franganilloi** Roewer 1951. Portugal

A. inermis Franganillo 1920, Bull. Soc. Portug. Sci. Nat. 8 p. 139 (D ♀) (praeocc. L. Koch 1855).
A. f. Roewer 1951, Abh. Nat. Ver. Bremen 32 (2) p. 455 (nom. nov.).

♂♀ **hercegovinensis** Kulczynski 1915. Hercegovina

A. h. Kulczynski 1915, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 901 T. 66 F. 1—5 (D ♂♀).

♀ **indistinctus** Cambridge 1872. Palästina

A. i. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 264 (D ♀).

♂♀ **jugorum** L. Koch 1868. Süd-Europa

A. j. L. Koch 1868, Abh. Nat. Ges. Nürnbg. 4 p. 24 TF. 11 (D ♀).
A. crassipalpis Canestrini & Pavesi 1870, Arch. Zool. Anat. Fis. Bologna p. 61 (41) T. 4 F. 2 (D ♂).
A. j. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 230 (D ♀).
A. crassipalpis Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 234 (D ♂).
A. torvus Thorell 1875, Tijdschr. Ent. 18 p. 93 (D ♂).
A. torvus Thorell 1875, Svensk. Vet. Ak. Handl. 13 (5) p. 75 (D ♂).
A. j. L. Koch 1876, Zeitschr. Ferdinand. Tirol (3) 20 p. 295 (D ♂).
Ciniflo j. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 18 f. 22, 24 (D ♂♀).
A. j. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 36, 38, 59 f. 65, 66 (D ♂♀).

♀ **kratochvili** Miller 1938. Dalmatin. Höhlen

A. k. Miller 1938, Festschr. Strand 4 p. 680 f. 1 (D ♀).

♂ **latebrosus** Simon 1874. Corsica

A. l. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 224 (D ♂).
A. l. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 36, 59 f. 60 (D ♂).

♂ **lunigerus** (Grube) 1861. Amurgebiet

Ciniflo l. Grube 1861, Bull. Ac. Sci. St. Petersbg. 4 p. 171 (D ♂).
A. l. Reimoser 1919, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 10 (2) p. 189 (C).

♀ **minor** Kulczynski 1915. Kroatien

A. m. Kulczynski 1915, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 904 T. 66 F. 6 (D ♀).

♂♀ **obustus** L. Koch 1868. Tirol, Kroatien, Deutschland

A. o. L. Koch 1868, Abh. Nat. Ges. Nürnbg. 4 p. 28 TF. 13, 14 (D ♂♀).
A. o. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 165 T. 6 F. 38 (D ♀).
A. o. Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 250 T. 23 F. 360 (D ♂♀).

A. o. Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 187 f. 20 s, 22 b (N ♂♀).
A. o. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 139 f. 287—290 (D ♂♀).

♂♀ **occidentalis** Simon 1892. Süd-Frankreich, Spanien, Portugal

A. o. Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61, Bull. p. 194 (D ♀).
A. o. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 39, 59 f. 75 (D ♀).
A. o. Bacelar 1929, Bull. Soc. Portug. Sci. Nat. 10 (21) p. 256 f. 10—12 (D ♂, N ♀).

♂♀ **pallidus** L. Koch 1868. Mittel- u. Südost-Europa, Russland

A. p. L. Koch 1868, Abh. Nat. Ges. Nürnbg. 4 p. 26 TF. 12 (D ♀).
A. p. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 165 T. 6 F. 40 (D ♂♀).
A. p. Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 250 T. 23 F. 361 (D ♂♀).
Ciniflo p. Kulczynski 1903, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 33 (C).
A. p. Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 187 f. 20 r, 22 a (N ♂♀).
A. p. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 129 f. 269—271 (D ♂♀).

♀ **pallidus strandi** Charitonow 1937. Krim

A. p. s. Charitonow 1937, Festschr. Strand 3 p. 134 T. 12 F. 1 (D ♀).

♂ **provisorius** Kolosvary 1939. Dalmatien

A. p. Kolosvary 1939, Festschr. Strand 5 p. 135 f. 4 (D ♂).

♂ **ruficeps** Cambridge 1872. Syrien

A. r. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 264 (D ♂).

♂♀ **scopolii** Thorell 1871. Süd-Frankreich, Lombardei, Macedonien

A. s. Thorell 1871, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 206 (D ♂♀).
A. s. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 229 (D ♂♀).
A. s. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 36, 39, 59 f. 61, 62, 76 (D ♂♀).

♂♀ **similis** (Blackwall) 1861. Europa

Aranea atrox Walckenaer 1802, Faun. Paris. 2 p. 218 (D).
Clubiona atrox Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 44 (N).
Clubiona atrox Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 605 (D ♂♀).
Ciniflo s. Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 141 T. 19 F. 116 (D ♂♀).
A. s. L. Koch 1868, Abh. Nat. Ges. Nürnbg. 4 p. 14 TF. 5, 6 (D ♂♀).
A. s. Cambridge 1879, Proc. Dorset F. Cl. 1 p. 54 T. 1 F. 9, 10 (D ♂♀).
A. s. Hansen 1885, in: Schiödte, Zool. Danica p. 121 (D ♂♀).
A. s. F. Cambridge 1892, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 10 p. 389 T. 21 F. 10 (N ♀).
A. s. Becker 1896, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 12 (2) p. 233 T. 14 F. 14 (D ♂♀).
A. s. Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 251 T. 23 F. 362 (D ♂♀).
Ciniflo s. Smith 1908, Journ. Quekett Micr. Cl. (2) 10 p. 314 T. 25 F. 1 (N ♀).
Ciniflo s. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 20 (D ♂♀).
A. s. Berland 1913, Arch. Zool. Expér. Gén. 51 (Not. & Rev. 2) p. 32 f. 18, 21, 22 (N ♂).
A. s. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 38, 40, 60 f. 71, 72, 80 (D ♂♀).
Ciniflo s. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders I. p. 55 f. 20, 22 B, E (D ♂♀).
A. s. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 133 f. 277—281 (D ♂♀).

♂o **simplex** Cambridge 1872. Palästina

A. s. Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 262 (D ♂o).

Transgredierende Arten:

♂♀ **ferox** (Walckenaer) 1825. Europa, U. St. Amerika, Canada

Clubiona f. Walckenaer 1825, Faun. Franç; Aran. p. 150 f. 12 T. 7 F. 7 (D).
A. cryptarum C. L. Koch 1837, Übers. Arachn. Syst. 1 p. 15 Tf. 3, 4 (D).
Clubiona f. Walckenaer 1837, Hist. Nat. Ins. Apt. 1 p. 606 (D ♂♀).
A. f. C. L. Koch 1839, Die Arachniden 6 p. 41 TF. 460, 461 (D ♂♀).

A. f. L. Koch 1855, Correspondenzbl. Zool. Ver. Regensbg. 9 (11) p. 165 TF. 4 (D ♂).
Ciniflo f. Blackwall 1859, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 3 p. 93 (D ♀).
Ciniflo mordax Blackwall 1859, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 3 p. 93 (D ♀).
Ciniflo mordax Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 144 T. 9 F. 91 (D ♀).
Ciniflo f. Blackwall 1861, Spid. Gr. Brit. Irel. 1 p. 142 T. 9 F. 90 (D ♂♀).
A. f. Westring 1862, Aran. Svec. p. 374 (D ♂♀).
A. f. Ohlert 1867, Aran. Prov. Preussen p. 91 (D ♂♀).
A. f. L. Koch 1868, Abh. Nat. Ges. Nürnbg. 4 p. 11 T. 1 F. 3, 4 (D ♂♀).
A. mordax Canestrini & Pavesi 1870, Arch. Zool. Anat. Fis. Bologna (2) 2 p. 40 (20) (C).
A. f. Menge 1870, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) 2 p. 289 T. 55 F. 167 (D ♂♀).
A. corsicus Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 232 (D ♀).
A. f. Dahl 1883, Schrift. Nat. Ver. Schlesw. Holst. 5 (2) p. 55 (D ♂♀).
A. f. Hansen 1885, in: Schiödte, Zool. Danica p. 121 (D ♂♀).
A. f. Emerton 1888, Trans. Connect. Ac. Sci. 9 p. 451 T. 10 F. 3 (D ♂♀).
A. f. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 165 T. 6 F. 37 (D ♂♀).
A. f. Becker 1896, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 12 (2) p. 234 T. 14 F. 15 (D ♂♀).
A. f. Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 252 T. 23 F. 364 (D ♂♀).
A. f. Emerton 1902, Common Spid. p. 215 f. 492 (D ♂♀).
Ciniflo f. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 16, f. 21, 23 (D ♂♀).
A. f. Comstock 1912, Spider Book p. 278 f. 258—259 (N).
A. f. Berland 1913, Arch. Zool. Expér. Gén. 51 (Not. & Rev. 2) p. 32 f. 16, 19 (N ♂♀).
A. f. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 36, 39, 59 f. 63, 64, 78 (D ♂♀).
A. f. Reimoser 1929, Die Natur (Wien) 5 (3) p. 64 f. 10 (N ♂♀).
A. f. Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 186 f. 20 a, b, 23 b (N ♂♀).
A. f. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 6 T. 1 F. 1—2 (N ♂♀).
A. f. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 517 T. 107 F. 1988—91 (D ♂♀).
Ciniflo f. Locket & Millidge 1951, Brit. Spiders I. p. 55 f. 22 A, D (D ♂♀).
A. f. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 42 p. 124 f. 262—267 (D ♂♀).

Aethiopische Arten:

♀ **promontorii** Simon 1906. Capland
A. p. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 294 (D ♀).

Orientalische Arten:

♂ **castaneiceps** Simon 1893. Philippinen
A. c. Simon 1893, Ann. Soc. Ent. France 62 p. 69 f. 1 (D ♂).

♂ **laminatus** Thorell 1878. Amboina
A. l. Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 168 (D ♂).

♂♀ **taprobanicola** Strand 1907. Ceylon
A. t. Strand 1907, Abh. Naturf. Ges. Görlitz 25 p. 4 TF. 49, 50 b (D ♂♀).

Neotropische Arten:

♀ **arcoiris** Mello-Leitao 1943. Chile
A. a. Mello-Leitao 1943, Rev. Bras. Biol. R. d. Jan. 3 (4) p. 403 f. 1 (D ♀).

♀ **arnozoi** Mello-Leitao 1924. Brasilien
A. a. Mello-Leitao 1924, Bol. Mus. Nac. R. d. Jan. 1 (4) p. 276 (D ♀).

♀ **asuncionis** Mello-Leitao 1946. Paraguay
A. a. Mello-Leitao 1946, Notas Mus. La Plata, Zool. 11 (91) p. 17 f. 1 (D ♀).

♀ **brevis** Taczanowski 1874. Guiana
A. b. Taczanowski 1874, Hor. Soc. Ent. Ross. 10 p. 81 (D ♀).

♀ **cayanus** Taczanowski 1874. Guiana
A. c. Taczanowski 1874, Hor. Soc. Ent. Ross. 10 p. 79 (D ♀).

♂ **cothurnatus** Mello-Leitao 1943. Argentinien
A. c. Mello-Leitao 1943, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 3, Zool. 20 p. 102 f. 2 (D ♂).

♀ **granadensis** Keyserling 1877. Columbien
A. g. Keyserling 1877, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 27 p. 587 T. 14 F. 13 (D ♀).

♀ **hirtus** Taczanowski 1874. Guiana
A. h. Taczanowski 1874, Hor. Soc. Ent. Ross. 10 p. 83 (D ♀).

♂♀ **iheringii** Keyserling 1891. Süd-Brasilien
A. i. Keyserling 1891, Spinn. Amer. 3 (Bras. Spinn.) p. 154 T. 4 F. 107 (D ♂♀).

♂ **illudens** Mello-Leitao 1940. Argentinien
A. i. Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 17 f. 17 (D ♂).

♂ **imitans** Mello-Leitao 1940. Argentinien
A. i. Mello-Leitao 1940, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 15 f. 15—16 (D ♂).

♂♀ **peninsulanus** Banks 1898. Nieder-Californien
A. p. Banks 1898, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 1 (7) p. 232 T. 14 F. 23 (D ♂♀).
A. p. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 24 T. 1 F. 3—4 (N ♂).

♂ **platei** F. Cambridge 1899. Peru
A. p. F. Cambridge 1899, Journ. Linn. Soc. Lond. 27 (Zool.) p. 18 T. 2 F. 3 (D ♂).

♂♀ **rorulentus** (Nicolet) 1849. Chile
Clubiona r. Nicolet 1849, in: Gay, Hist. Chili 10 (3) p. 437 (D ♀).
A. r. Simon 1902, Erg. Hambg. Magalh. Sammelreise 2 Aran. p. 10 (D ♂♀).
A. r. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 237 (N).

♂♀ **rufipes** Taczanowski 1874. Guiana
A. r. Taczanowski 1874, Hor. Soc. Ent. Ross. 10 p. 80 (D ♂♀).

♀ **sinister** (Nicolet) 1849. Chile
Clubiona s. Nicolet 1849, in: Gay, Hist. Chili 10 (3) p. 439 (D ♀).
A. s. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 237 (N).

O **thoracicus** Mello-Leitao 1945. Argentinien
A. t. Mello-Leitao 1945, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 4, Zool. p. 232 (D O).

♂♀ **tristissimus** Holmberg 1876. Argentinien, Brasilien, Uruguay
A. t. Holmberg 1876, An. Agr. Rep. Argentin. 4 p. 134 (11) f. 11 (D ♀).
A. simoni Keyserling 1877, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 27 p. 385 T. 14 F. 11, 12 (D ♂♀).

Nearktische Arten:

♂ **tacoma** Chamberlin & Ivie 1947. Washington St.
A. t. Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 54 T. 5 F. 32 (D ♂).

Gen. **Amphigyriodes** Strand 1913.

♂♀ **bifoveata** Strand 1913. Ruanda
A. b. Strand 1913, Aradın. I. in: Wiss. Erg. Dt. Zentr. Afr. Exped. 4 (Zool. 2) (11) p. 327 (D ♂♀).

Gen. **Aphyctoschaema** Simon 1902.

Orientalische Arten:

♀ **javana** Strand 1907. Java
A. j. Strand 1907, Zool. Jahrb. Syst. 24 (5) p. 409 (D ♀).

Australische Arten:

§ 4 ♂: Simon 1908, Faun. S. W. Austral. 1 (12) p. 369.

♂ **alacris** Berland 1924. Neu-Caledonien
A. a. Berland 1924, Nov. Caledon. Zool. 3 (2) p. 183 f. 35—37 (D ♂).

♀ **albicauda** Simon 1908. West-Australien
A. a. Simon 1908, Faun. S. W. Austral. 1 (12) p. 374 (D ♀).

♂♀ **armigera** Simon 1908. West-Australien
A. a. Simon 1908, Faun. S. W. Austral. 1 (12) p. 370 f. 2 B (D ♂♀).

♀ **bivittata** Simon 1908. West-Australien
A. b. Simon 1908, Faun. S. W. Austral. 1 (12) p. 374 (D ♀).

♂♀ **cryphoeciformis** Simon 1908. West-Australien
A. c. Simon 1908, Faun. S. W. Austral. 1 (12) p. 374 f. 2 C, D (D ♂♀).

♀ **guttipes** Simon 1906. Tasmanien
A. g. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 297 (D ♀).

♂♀ **hygrophila** Simon 1902. – * Queensland
A. h. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71, Bull. p. 242 (D ♂♀).
A. h. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 977 (N).

♀ **maculata** Rainbow 1916. Queensland
A. m. Rainbow 1916, Rec. Austral. Mus. 11 (3) p. 37 T. 14 F. 2—4 (D ♀).

♂ **pilosa** (Hogg) 1900. Victoria
Amaurobius p. Hogg 1900, Proc. Soc. Victoria (N. S.) 13 (1) p. 80 T. 13 F. 1 (D ♂).

♀ **sedula** Simon 1906. Victoria
A. s. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 298 (D ♀).

♀ **socialis** (Rainbow) 1905. Neu-Süd-Wales
Amaurobius s. Rainbow 1905, Rec. Austral. Mus. 6 (1) p. 9 f. 1 (D ♀).

♀ **storeniformis** Simon 1908. West-Australien
A. s. Simon 1908, Faun. S. W. Austral. 1 (12) p. 371 (D ♀).

♂ **velifera** Simon 1908. West-Australien
A. v. Simon 1908, Faun. S. W. Austral. 1 (12) p. 372 f. 3 (D ♂).

♂♀ **virgosa** Simon 1908. West-Australien
A. v. Simon 1908, Faun. S. W. Austral. 1 (12) p. 369 f. 2 A (D ♂♀).

♀ **vultuosa** Simon 1908. West-Australien
A. v. Simon 1908, Faun. S. W. Austral. 1 (12) p. 373 (D ♀).

Gen. **Auximella** Strand 1908.

♀ **typica** Strand 1908. Peru
A. t. Strand 1908, Jahrb. Nassau. Ver. Nat. 61 p. 224 (D ♀).

Gen. **Auximus** Simon 1892.

Palaearktische Arten:

♂♀ **dentichelis** (Simon) 1883. – * Azoren
Amaurobius d. Simon 1883, Ann. Soc. Ent. France (6) 3 p. 268 T. 8 F. 3, 4 (D ♂♀).
A. d. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 239 f. 185 (N ♂).

♂♀ **maurus** Simon 1910. Algier
A. m. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 279 f. 2 (D ♂♀).

♂ **sindi** Caporiacco 1934. Karakorum
A. s. Caporiacco 1934, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 120 (D ♂).

Aethiopische Arten:

♀ **capensis** Pocock 1900. Capland
A. c. Pocock 1900, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 6 p. 323 (D ♀).
A. c. Strand 1909, Deutsch. S. Pol. Exped. 1901—03; 10 (5) Zool. 2 p. 548 (N ♀).

♀ **crucifer** (Cambridge) 1873. St. Helena
Amaurobius c. Cambridge 1873, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 216 T. 24 F. 6 (D ♀).
A. c. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 239 (N).

♂♀ **hottentottus** Pocock 1900. Namaqualand
A. h. Pocock 1900, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 6 p. 323 (D ♀).
A. h. Purcell 1908, Denkschr. Med. Nat. Ges. Jena 13 p. 216 (D ♂).

♂♀ **longipes** Purcell 1904. Capland
A. l. Purcell 1904, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 15 (3) p. 132 T. 10 F. 3 (D ♂♀).

♂♀ **schreineri** Purcell 1904. Capland
A. s. Purcell 1904, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 15 (3) p. 131 T. 10 F. 1 (D ♂♀).

♀ **silvaticus** Purcell 1904. Capland
A. s. Purcell 1904, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 15 (3) p. 132 T. 10 F. 2 (D ♀).

Neotropische Arten:

♀ **biseriatus** Tullgren 1905. Bolivien
A. b. Tullgren 1905, Ark. Zool. 2 (19) p. 22 T. 2 F. 5 (D ♀).

♀ **crinitus** Simon 1892. Venezuela
A. c. Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 431 T. 9 F. 6 (D ♀).

♂♀ **crispus** Mello-Leitao 1941. Nord-Argentinien
A. c. Mello-Leitao 1941, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 2, Zool. p. 117 T. 3 F. 10; T. 15—16 (D ♂♀).

♀ **fuegianus** (Simon) 1884. Feuerland, Patagonien
Amaurobius f. Simon 1884, Bull. Soc. Zool. France 9 p. 128 T. 3 F. 12, 13 (D ♀).
Amaurobius f. Simon 1887, Miss. Sci. du Cap Horn; Zool. 6 p. E 20 T. 2 F. 5 (D ♀).
A. f. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 239 (N).
A. f. Tullgren 1901, Svensk. Exped. Magell. 2 (10) p. 186 T. 15 F. 1 (N ♀).

♀ **fulvipes** Simon 1906. Ecuador
A. f. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 301 (D ♀).

♀ **funestus** (Keyserling) 1883. Peru
Titanoeca f. Keyserling 1883, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 32 p. 217 T. 15 F. 16 (D ♀).
A. f. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 106 (C).

♀ **gratus** Bryant 1948. San Domingo
A. g. Bryant 1948, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 100 (4) p. 348 T. 2 F. 15 (D ♀).

♂♀ **harpagulus** Simon 1906. Ecuador
A. h. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 301 (D ♂♀).

♀ **lanceolatus** Vellard 1924. Brasilien
A. l. Vellard 1924, Arch. Inst. Vital Brezil 2 (2) p. 161 T. 12 F. 46 (D ♀).

♂♀ **luteipes** (Keyserling) 1891. Süd-Brasilien
Titanoeca l. Keyserling 1891, Spinn. Arachn. 3 (Bras. Spinn.) p. 156 T. 4 F. 108 (D ♂♀).
A. l. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 106 (C).

♀ **plagiatus** Simon 1892. Venezuela
A. p. Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 430 T. 9 F. 5 (D ♀).

♂♀ **procerulus** Simon 1906. Ecuador
A. p. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 301 (D ♂♀).

♀ **productus** Chamberlin 1916. Peru
A. p. Chamberlin 1916, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 60 (6) p. 211 T. 8 F. 5—7 (D ♀).

♀ **quitensis** Simon 1906. Ecuador
A. q. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 301 (D ♀).

♀ **roberti** Reimoser 1939. Costa Rica
A. r. Reimoser 1939, Ann. Naturh. Mus. Wien 50 p. 337 f. 3 (D ♀).

♀ **rhombifer** Simon 1906. Ecuador
A. r. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 300 (D ♀).

♂ **segmentatus** Mello-Leitao 1943. Argentinien
A. s. Mello-Leitao 1943, Rev. Mus. La Plata (N. S.) 3, Zool. 20 p. 103 f. 3 (D ♂).

Gen. **Aymarella** Chamberlin 1916.

♀ **munda** Chamberlin 1916. Peru
A. m. Chamberlin 1916, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 60 (6) p. 209 T. 9 F. 1—5 (D ♀).

Gen. **Badumna** Thorell 1890.

Orientalische Arten:

♂ **exilis** Thorell 1890. Java
B. e. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 28 p. 327 (D ♂).

♂♀ **hirsuta** Thorell 1890. – * Java

B. h. Thorell 1890, Ann. Mus. Civ. Genova 28 p. 323 (D ♀).
B. h. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 238 (N).
B. h. Kulczynski 1908, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 571 T. 23 F. 22, 23, 25, 28 (D ♂♀).

Australische Arten:

♀ **cinctipes** Simon 1906. Victoria

B. c. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 297 (D ♀).

♀ **inornata** (L. Koch) 1872. Victoria, Neu-Guinea

Amaurobius i. L. Koch 1872, Arachn. Austral. 1 (1) p. 325 T. 26 F. 2 (D ♀).
B. i. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 238 (N).

♀ **varia** Simon 1906. Victoria

B. v. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 296 (D ♀).

Gen. **Calleva** Simon 1892.

♀ **paupercula** Simon 1892. Argentinien

C. p. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 239 (D ♀).

Gen. **Callevophthalmus** Simon 1906.

♀ **albus** (Keyserling) 1890. – * Australien, Lord Howe-I.

Lathys a. Keyserling 1890, Arachn. Austral. 2 p. 250 T. 23 F. 2 (D ♀).
C. a. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 303 (N).

♂ **lividus** Simon 1908. West-Australien

C. l. Simon 1908, Faun. S. W. Austral. 1 (12) p. 378 (D ♂).

Gen. **Callevopsis** Tullgren 1902.

♀ **striata** Tullgren 1902. Süd-Chile

C. s. Tullgren 1902, Bih. Svensk. Vet. Ak. Handl. 28 (4; 1) p. 7 T. 1 F. 1 (D ♀).
C. s. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 976 (N).

Gen. **Callioplus** Bishop & Crosby 1935.

♂♀ **armipotens** (Bishop & Crosby) 1926. Nord-Carolina.

Amaurobius a. Bishop & Crosby 1926, Journ. Elisha Mitch. Sci. Soc. 41 (3—4) p. 170 T. 21 F. 9—11 (D ♂♀).
C. a. Bishop & Crosby 1935, Proc. Biol. Soc. Wash. 48 p. 45 (N).

♂♀ **euoplus** Bishop & Crosby 1935. Maine, Canada

C. e. Bishop & Crosby 1935, Proc. Biol. Soc. Wash. 48 p. 45 f. 1—3 (D ♂♀).

♂♀ **hoplites** (Bishop & Crosby) 1926. – * Nord-Carolina

Amaurobius h. Bishop & Crosby 1926, Journ. Elisha Mitch. Sci. Soc. 41 (3—4) p. 171 T. 21 F. 12, 13 (D ♂♀).
C. h. Bishop & Crosby 1935, Proc. Biol. Soc. Wash. 48 p. 45 (N).

♂♀ **hoplomachus** (Bishop & Crosby) 1926. Nord-Carolina

Amaurobius h. Bishop & Crosby 1926, Journ. Elisha Mitch. Sci. Soc. 41 (3—4) p. 172 T. 21 F. 15—17 (D ♂♀).
C. h. Bishop & Crosby 1935, Proc. Biol. Soc. Wash. 48 p. 45 (N).

♂♀ **macarius** Chamberlin 1947. Washington St.
C. m. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 17 T. 3 F. 26—27 (D ♂♀).

♂♀ **pantoplus** Bishop & Crosby 1935. Tennessee
C. p. Bishop & Crosby 1935, Proc. Biol. Soc. Wash. 48 p. 46 f. 4—6 (D ♂♀).

♂♀ **tibialis** (Emerton) 1838. New Hampshire
Amaurobius t. Emerton 1888, Trans. Connect. Ac. Sci. 9 p. 452 T. 10 F. 2 (D ♂♀).
Amaurobius t. Bishop & Crosby 1926, Journ. Elisha Mitch. Sci. Soc. 41 (3—4) p. 170 T. 22 F. 18—20 (N ♂♀).
C. t. Chamberlin & Ivie 1947, Bull. Univ. Utah 37 (10), Biol. 10 (3) p. 12 (N ♀).
C. t. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 519 T. 105 F. 1969; T. 107 F. 1995—96 (D ♂♀).

Gen. **Callobius** Chamberlin 1947.

§ 8 ♂, 17 ♀: Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 31—33 (sub **Amaurobius**).

♂ **alaskanus** (Chamberlin & Ivie) 1947. Alaska
Amaurobius a. Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 33 T. 5 F. 31 (D ♂).
C. a. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 6 (N).

♂ **angelus** (Chamberlin & Ivie) 1947. Californien
Amaurobius a. Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 33 T. 5 F. 29 (D ♂).
C. a. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 6 (N).

♀ **arizonicus** (Chamberlin & Ivie) 1947. Arizona
Amaurobius a. Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 34 T. 5 F. 33 (D ♀).
C. a. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 6 (N).

♂o **bennetti** (Blackwall) 1848. – * U. St. Amerika, Canada, Anticosti
Ciniflo b. Blackwall 1848, Ann. Mag. Nat. Hist. (1) 17 p. 41 (D ♀).
Amaurobius sylvestris Emerton 1888, Trans. Connect. Ac. Sci. 9 p. 451 T. 10 F. 1 (D ♂♀).
Amaurobius sylvestris Banks 1892, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 44 p. 29 (N).
Amaurobius b. Banks 1895, Journ. N. York Ent. Soc. 3 p. 82 (N).
Amaurobius sylvestris Emerton 1902, Common Spiders p. 213 f. 489—491 (D ♂♀).
Amaurobius b. Comstock 1912, Spider Book p. 277 f. 255—257 (N).
Amaurobius b. Bishop & Crosby 1926, Journ. Elisha Mitch. Sci. Soc. 41 (3—4) p. 170 (N).
Amaurobius b. Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 35 T. 3 F. 13; T. 4 F. 22 (D ♂♀).
C. b. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 7 (N).
Amaurobius b. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 516 T. 105 F. 1964—67, T. 107 F. 1985—87 (D ♂♀).

♂♀ **canada** (Chamberlin & Ivie) 1947. Brit. Columbia, Oregon
Amaurobius c. Chamberlin & Ivie, 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 36 T. 5 F. 28, 34 (D ♂♀).
C. c. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 7 (N).

♀ **catalinus** (Chamberlin & Ivie) 1947. Arizona

Amaurobius c. Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 38 T. 5 F. 35 (D ♀).
C. c. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 7 (N).

♂♀ **deces** (Chamberlin & Ivie) 1947. Oregon

Amaurobius d. Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 40 T. 4 F. 24; T. 5 F. 30 (D ♂♀).

♂♀ **enus** (Chamberlin & Ivie) 1947. Idaho

Amaurobius e. Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 42 T. 3 F. 14; T, 4 F. 23 (D ♂♀).
C. e. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 7 (N).

♀ **kamelus** (Chamberlin & Ivie) 1947. Oregon

Amaurobius k. Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 44 T. 4 F. 21 (D ♀).
C. k. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 8 (N).

o **melanus** (Chamberlin & Ivie) 1947. Californien

Amaurobius m. Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 46 (D o).
C. m. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 8 (N).

♂♀ **nevadensis** (Simon) 1884. Nevada, Californien, Utah, Oregon

Amaurobius n. Simon 1884, Bull. Soc. Zool. France 9 p. 318 f. 1 (D ♂♀).
Amaurobius n. Banks 1904, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 3 (13) p. 341 (N).
Amaurobius n. Banks 1913, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 65 p. 181 T. 12 F. 20 (N ♂♀).
Amaurobius utahensis Chamberlin 1919, Ann. Ent. Soc. Amer. 12 p. 239 (D ♂).
Amaurobius n. Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 46 T. 3 F. 16; T. 4 F. 26 (D ♂♀).
C. n. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 8 (N).

♂♀ **nomeus** (Chamberlin) 1919. Utah, Montana, Colorado, Wyoming

Amaurobius n. Chamberlin 1919, Ann. Ent. Soc. Amer. 12 p. 240 T. 14 F. 1—2 (D ♂♀).
Amaurobius n. Gertsch & Jellison 1939, Amer. Mus. Novit. 1032 p. 2 (N ♀).
Amaurobius n. Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 48 T. 3 F. 11; T. 4 F. 18 (D ♂♀).
C. n. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 8 (N).

♂♀ **olympus** (Chamberlin & Ivie) 1947. Californien, Oregon

Amaurobius o. Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 49 T. 3 F. 15; T. 4 F. 25; T. 5 F. 37 (D ♂♀).
C. o. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 8 (N).

♀ **pallescens** (Chamberlin) 1920. Californien

Auximus p. Chamberlin 1920, Journ. Ent. Zool. Claremont 12 p. 3 T. 1 F. 3 (D ♀).
Amaurobius p. Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 49 (N).
C. p. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 8 (N).

♂♀ **pictus** (Simon) 1884. Californien, Washington St., Oregon, Alaska, Canada

Amaurobius p. Simon 1884, Bull. Soc. Zool. France 9 p. 320 f. 3 (D ♂♀).
Amaurobius p. Banks 1900, Proc. Wash. Ac. Sci. 2 p. 482 (N).
Amaurobius p. Banks 1910, Bull. U. St. Nat. Mus. 72 p. 19 (N).

Amaurobius p. Banks 1913, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 65 p. 181 T. 12 F. 24 (N ♀).
Amaurobius p. Emerton 1919, Trans. R. Inst. Toronto 12 p. 325 (N).
Amaurobius p. Chamberlin & Ivie 1947, Bull. Univ. Utah 37 (10), Biol. 10 (3) p. 12 (N).
Amaurobius p. Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 50 T. 3 F. 12; T. 4 F. 20 (D ♂♀).
C. p. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 9 (N).

♀ **severinus** (Chamberlin & Ivie) 1947. Californien
Amaurobius s. Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 51 T. 4 F. 26 (D ♀).
C. s. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 9 (N).

♂♀ **severus** (Simon) 1884. Canada, Washington St., Brit. Columbia, Oregon, Californien
Amaurobius s. Simon 1884, Ann. Soc. Zool. France 9 p. 319 f. 2 (D ♂♀).
Amaurobius s. Banks 1913, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 65 p. 181 T. 12 F. 27 (N ♀).
Amaurobius s. Emerton 1919, Trans. R. Inst. Toronto 12 p. 325 (N).
Amaurobius s. Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 51 T. 3 F. 17; T. 4 F. 27 (D ♂♀).
C. s. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 9 (N).

♀ **shastus** (Chamberlin & Ivie) 1947. Californien
Amaurobius s. Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 53 (D ♀).
C. s. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 9 (N).

♀ **subnomeus** (Chamberlin & Ivie) 1947. Californien
Amaurobius s. Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 53 (D ♀).
C. s. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 9 (N).

♂♀ **tamarus** (Chamberlin & Ivie) 1947. Idaho, Washington St.
Amaurobius t. Chamberlin & Ivie 1947, Ann. Ent. Soc. Amer. 40 (1) p. 54 T. 2 F. 6—8; T. 3 F. 9; T. 4 F. 19 (D ♂♀).
C. t. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 9 (N).

Gen. **Derxema** Simon 1906.

♀ **arguta** Simon 1906. Queensland
D. a. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 303 (D ♀).

Gen. **Epimecinus** Simon 1908.

§ 4 Arten: Berland 1924, Nov. Caledon. Zool. 3 (2) p. 182.

♀ **humilis** Berland 1924. Neu-Caledonien
E. h. Berland 1924, Nov. Caledon. Zool. 3 (2) p. 180 f. 31, 32 (D ♀).

♀ **longipes** Berland 1924. Neu-Caledonien
E. l. Berland 1924, Nov. Caledon. Zool. 3 (2) p. 178 f. 23—25 (D ♀).

♂♀ **magnus** Berland 1924. Neu-Caledonien
E. m. Berland 1924, Nov. Caledon. Zool. 3 (2) p. 179 f. 26—30 (D ♂♀).

♀ **nexibilis** (Simon) 1906. – * Neu-Caledonien
Aphytoschaema n. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 299 (D ♀).
E. n. Simon 1908, Faun. S. W. Austral. 1 (12) p. 376 (N).
E. n. Berland 1924, Nov. Caledon. Zool. 3 (2) p. 178 f. 21, 22 (N ♀).

♀ **pullatus** (Simon) 1906. Neu-Caledonien
Aphytoschaema p. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 299 (D ♀).

o **tegenarioides** Simon 1908. West-Australien
E. t. Simon 1908, Faun. S. W. Austral 1 (12) p. 376 (D o).

o **volucripes** Simon 1908. West-Australien
E. v. Simon 1908, Faun. S. W. Austral. 1 (12) p. 377 (D o).

Gen. **Haemilla** Simon 1909.

§ 8 ♂, 6 ♀: Lawrence 1939, Ann. Natal Mus. 9 (2) p. 280—281.

♂♀ **australis** Lawrence 1937. Zululand
H. a. Lawrence 1937, Ann. Natal Mus. 8 (2) p. 217 f. 2 (D ♂♀).

♂♀ **cavernicola** Lawrence 1939. Natal
H. c. Lawrence 1939, Ann. Natal Mus. 9 (2) p. 274 f. 4 (D ♂♀).

♂♀ **mirabilis** (L. Koch) 1875. – * Abessinien
Tegenaria m. L. Koch 1875, Aegypt. Abyss. Arachn. Jickeli p. 34 T. 4 F. 2 (D ♂).
Tegenaria m. Simon 1897, Hist. Nat. Araign. 2 (1) p. 253 f. 245 (N ♂).
H. m. Simon 1909, Ann. Soc. Ent. Belg. 53 p. 29 (D ♂♀).
H. m. Berland 1914, Aran. 1 in: Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Orient. p. 59 f. 19, 20 (N ♀).
H. m. Berland 1922, Voy. Rothschild Ethiop.; Rés. Sci. Anim. Artic. 1 p. 45 T. A 1 F. 2 (N).
H. m. Simon & Fage 1922, Arch. Zool. Expér. Gén. 60 (7) p. 527 f. 1 (2, 4) (N ♂).

♂ **monticola** Lawrence 1939. Natal
H. m. Lawrence 1939, Ann. Natal Mus. 9 (2) p. 273 f. 3 (D ♂).

♂♀ **nebulosa** (Tullgren) 1910. Ost-Afrika
Amphigyrum n. Tullgren 1910, Aran. in: Sjöstedt Kilimandj. Exped. 3 (20; 6) p. 93 T. 1 F. 3 (D ♀).
H. n. Berland 1914, Arach. I. in: Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Orient. p. 59 (N).
H. n. Simon & Fage 1922, Arch. Zool. Expér. Gén. 60 (7) p. 527 (N).
H. n. Lawrence 1939, Ann. Natal Mus. 9 (2) p. 271 (C).
H. n. Caporiacco 1949, Comment. Pontific. Ac. Sci. 13 (6) p. 323 f. 2 (D ♂♀).

♂♀ **silvicola** Lawrence 1938. Natal
H. s. Lawrence 1938, Ann. Natal Mus. 8 (3) p. 466 f. 5 (D ♂).
H. s. Lawrence 1939, Ann. Natal Mus. 9 (2) p. 272 f. 2 (D ♀).

♂♀ **tanganensis** Simon & Fage 1922. Ost-Afrika
H. t. Simon & Fage 1922, Arch. Zool. Expér. Gén. 60 (7) p. 526 f. 1 (D ♂♀).

♂♀ **tuberculata** Lawrence 1939. Zululand
H. t. Lawrence 1939, Ann. Natal Mus. 9 (2) p. 276 f. 5 (D ♀).

♂ **zuluana** Lawrence 1939. Zululand
H. z. Lawrence 1939, Ann. Natal Mus. 9 (2) p. 278 f. 6 (D ♂).

Gen. **Hesperauximus** Gertsch 1937.

♀ **agelenoides** (Emerton) 1919. Canada
Amaurobius a. Emerton 1919, Canad. Ent. 51 p. 106 T. 7 F. 1 (D ♂♀).
Amaurobius a. Chamberlin & Ivie 1947, Bull. Univ. Utah 37 (10), Biol. 10 (3) p. 7 u. 9 (N).
H. a. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 180 T. 2 F. 28 (N ♂♀).
H. a. Bishop 1949, Canad. Ent. 81 (4) p. 104 f. . . (N).

♂♀ **sternitzkii** Gertsch 1937. – * Californien
H. s. Gertsch 1937, Amer. Mus. Novit, 936 p. 4 f. 104 (D ♂♀).

Gen. **Ixeuticus** Dalmas 1917.

♂♀ **annulipes** (L. Koch) 1872. Queensland, Neu-Süd-Wales, Lord Howe-I.
Amaurobius a. L. Koch 1872, Arach. Austral. 1 (1) p. 341 T. 27 F. 3, 4 (D ♂♀).

♀ **australiensis** (Strand) 1913. Centr.-Australien
Amaurobius au. Strand 1913, Zool. Jahrb. Syst. 35 (5—6) p. 603 (D ♀).

♀ **bimetallicus** (Hogg) 1896. Centr.-Australien
Amaurobius b. Hogg 1896, Aran. in: Rep. Horn. Exped. 2 (Zool.) p. 322 T. 24 F. 6, 7 (D ♀).

O **blochmanni** (Strand) 1907. Neu-Süd-Wales
Amaurobius b. Strand 1907, Zool. Jahrb. Syst. 24 (5) p. 459 (D O).

♀ **candidus** (L. Koch) 1872. Queensland, West-Australien, Norfolk-I.
Amaurobius c. L. Koch 1872, Arachn. Austral. 1 (1) p. 333 T. 26 F. 6 (D ♀).

♀ **chalybeius** (L. Koch) 1872. Queensland, Victoria
Amaurobius c. L. Koch 1872, Arachn. Austral. 1 (1) p. 328 T. 26 F. 4 (D ♀).

♂ **charybdis** (Hogg) 1910. Neu-Seeland
Amaurobius c. Hogg 1910, Trans. N. Zeal. Inst. 42 p. 273 f. 1 (D ♂).
I. c. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 334 (N ♂).

♀ **chatamensis** (Simon) 1899. Chatham-Ins.
Amaurobius c. Simon 1899, Zool. Jahrb. Syst. 12 (4) p. 433 (D ♀).
Amaurobius c. Simon 1905, Zool. Jahrb. Syst. 21 p. 416 (D ♀).
I. c. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 334 (N).

♀ **exsiccatus** (Strand) 1913. Australien
Amaurobius e. Strand 1913, Zool. Jahrb. Syst. 35 (5—6) p. 604 (D ♀).

♂ **finschii** (L. Koch) 1872. Neu-Seeland
Amaurobius f. L. Koch 1872, Arachn. Austral. 1 (1) p. 339 T. 27 F. 2 (D ♂).
I. f. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 333 (N).

♀ **frequens** (Rainbow) 1920. Lord Howe-I.
Amaurobius f. Rainbow 1920, Rec. S. Austral. Mus. 1 p. 231 T. 28 F. 5, 6 (D ♀).

♂ **helsoni** Bryant 1935. Neu-Seeland
I. h. Bryant 1935, Rec. Canterbury Mus. 4 (2) p. 73 T. 10 F. 9; T. 13 F. 32 (D ♂).

♀ **insignis** (L. Koch) 1872. Australien, Neu-Guinea
Amaurobius i. L. Koch 1872, Arachn. Austral. 1 (1) p. 330 (D ♀).

♀ **janus** Bryant 1935. Neu-Seeland
I. j. Bryant 1935, Rec. Canterbury Mus. 4 (2) p. 72 T. 12 F. 19 (D ♀).

o **longinquus** (L. Koch) 1867. Queensland, Neu-Süd-Wales
Amaurobius l. L. Koch 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 196 (D o).
Amaurobius l. L. Koch 1872, Arachn. Austral. 1 (1) p. 336 (D o).
I. l. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 335 (N).

♂♀ **martius** (Simon) 1899. – * Neu-Seeland
Amaurobius m. Simon 1899, Zool. Jahrb. Syst. 12 (4) p. 421 (D ♂♀).
I. m. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 330 f. 5, 6, 8 (D ♂♀).

♀ **microps** (Simon) 1908. West-Australien
Amaurobius m. Simon 1908, Faun. S. W. Austral. 1 (12) p. 366 (D ♀).

♂♀ **praecalvus** (Simon) 1906. Tasmanien
Amaurobius p. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 295 (D ♂♀).

♀ **robustus** (L. Koch) 1872. Queensland, West-Australien, Ruverby-Isl.
Amaurobius r. L. Koch 1872, Arachn. Austral. 1 (1) p. 331 T. 26 F. 5 (D ♀).
Amaurobius r. Strand 1907, Jahrb. Nassau. Ver. Nat. 60 p. 199 (D ♀).
I. r. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 333 (N).
I. r. Hickman 1950, Proc. Soc. Victoria 60 (N.S.) p. 1 (N ♀).

♂♀ **rubrioides** (Hogg) 1909. Australien, Neu-Seeland
Amaurobius r. Hogg 1909, Spiders in: Subantarct. Isl. of. N. Zeal. p. 159 T. 7 F. 2 (D ♂).
Badumna scylla Hogg 1909, Spiders in: Subantarct. Isl. of N. Zeal. p. 160 T. 7 F. 3 (D ♀).
I. r. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 334 (N ♂♀).
I. r. Berland 1931, Rec. Canterbury Mus. 3 p. 359 T. 47 F. 1—3 (D ♀).

♀ **scalaris** (L. Koch) 1872. Queensland, Centr.-Australien
Amaurobius s. L. Koch 1872, Arachn. Austral. 1 (1) p. 334 T. 26 F. 7 (D ♀).

♀ **segestrinus** (L. Koch) 1872. Neu-Süd-Wales
Amaurobius s. L. Koch 1872, Arachn. Austral. 1 (1) p. 343 T. 27 F. 5 (D ♀).

♀ **senilellus** (Strand) 1907. Australien
Amaurobius s. Strand 1907, Jahrb. Nassau. Ver. Nat. 60 p. 200 (D ♀).

♂♀ **senilis** (L. Koch) 1872. Queensland
Amaurobius s. L. Koch 1872, Arachn. Austral. 1 (1) p. 326 T. 26 F. 3 (D ♀).
I. s. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 333 (N).
I. s. Hickman 1944, Trans. R. Soc. S. Austral. 68 (1) p. 24 (N ♂♀).

♀ **setosus** Bryant 1935. Neu-Seeland
I. s. Bryant 1935, Rec. Canterbury Mus. 4 (2) p. 73 T. 11 F. 16; T. 12 F. 23 (D ♀).

♀ **silvanus** (L. Koch) 1872. Queensland
Amaurobius s. L. Koch 1872, Arachn. Austral. 1 (1) p. 337 T. 27 F. 1 (D ♀).

♂♀ **subfasciatus** (Simon) 1899. Neu-Seeland
Badumna s. Simon 1899, Zool. Jahrb. Syst. 12 (4) p. 422 (D o).
I. s. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 332 (N ♂♀).
I. s. Bryant 1935, Rec. Canterbury Mus. 4 (2) p. 74 T. 13 F. 34 (D ♀).

Gen. **Macrobunus** Tullgren 1901.

♂♀ **backhauseni** (Simon) 1896. – * Patagonien, Feuerland
Myro b. Simon 1896, An. Mus. Nat. B. Aires 5 p. 142 (D ♂♀).
Myropsis b. Simon 1898, Hist. Nat. Araign. 2 (1) p. 233 (N).
M. spinifer Tullgren 1901, Svensk. Exped. Magell. 2 (10) p. 249 T. 5 F. 5 (D ♂).
Myropsis b. Simon 1902, Erg. Hambg. Magalh. Sammelreise 2 Arachn. p. 9 (D ♂).

♂ **chilensis** (Simon) 1888. Chile
Myro c. Simon 1888, Ann. Sof. Ent. France (6) 8 p. 218 (D ♂).
Myropsis c. Simon 1898, Hist. Nat. Araign. 2 (1) p. 238 (N).
Charitonowia c. Strand 1934, Folia Zool. Hydrobiol. 6 (2) p. 272 (nom. nov. gen.).

♀ **pauperculus** (Simon) 1905. Patagonien
Myropsis p. Simon 1905, Boll. Mus. Zool. Torino 20 (511) p. 3 (D ♀).

Gen. **Nurscia** Simon 1874.

♂♀ **albosignata** Simon 1874. Krim, Kaukasus, Armenien, Turkestan, Mesopotamien
N. a. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 235 (D ♂).
Amaurobius longipalpus Kroneberg 1875, Nachr. Ges. Moskau 19 (3) p. 14 T. 4 F. 30 (D ♂♀).
N. a. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 238 (N).

♂ **flavipes** Simon 1874. Cypern
N. f. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 235 (D ♂).
N. f. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 238 f. 188 (N ♂).

Gen. **Phryganoporus** Simon 1908.

♀ **gausapatus** (Simon) 1906. – * Victoria
Amaurobius g. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 295 (D ♀).
P. g. Simon 1908, Faun. S. W. Austral. 1 (12) p. 367 (N).

♀ **gausapatus occidentalis** Simon 1908. West-Australien
P. g. o. Simon 1908, Faun. S. W. Austral. 1 (12) p. 367 (D ♀).

♀ **nigrinus** Simon 1908. West-Australien
P. n. Simon 1908, Faun. S. W. Austral. 1 (12) p. 368 (D ♀).

♂♀ **tubicola** Simon 1908. West-Australien
P. t. Simon 1908, Faun. S. W. Austral. 1 (12) p. 367 f. 1 (D ♂♀).

Gen. **Phyxelida** Simon 1894.

♂♀ **makapanensis** Simon 1894. Transvaal
P. m. Simon 1894, Ann. Soc. Ent. France 63 p. 64 f. 1, 2 (D ♂♀).
P. m. Simon 1895, Hist. Nat. Araign. 1 (4) p. 1067 (N).

Gen. **Pimus** Chamberlin 1947.

§ 4 Arten: Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 19.

♀ **fractus** (Chamberlin) 1920. Californien

Amaurobius f. Chamberlin 1920, Ent. News 31 p. 293 f. 1 (D ♀).
P. f. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 19 T. F. 29 (D ♀).

♀ **hesperellus** Chamberlin 1947. Californien(?)

P. h. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 19 T. 4 F. 30 (D ♀).

♀ **leucus** Chamberlin 1947. Californien

P. l. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 20 T. 4 F. 31 (D ♀).

♂♀ **pictus** Chamberlin 1947. – * Californien

P. p. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 20 T. 4 F. 32—34 (D ♂♀).

Gen. **Syrorisa** Simon 1908.

♀ **alticola** Berland 1924. Neu-Caledonien

S. a. Berland 1924, Nov. Caledon. Zool. 3 (2) p. 182 f. 33, 34 (D ♀).

♀ **misella** (Simon) 1906. – * Neu-Caledonien

Aphytoschaema m. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 298 (D ♀).
S. m. Berland 1924, Nov. Caledon. Zool. 3 (2) p. 183 (N).

♀ **mumfordi** Berland 1933. Marquesas-I.

S. m. Berland 1933, Pcif. Ent. Surv. Publ. 7 (3) p. 69 f. 60—62 (D ♀).

♀ **seriata** Simon 1908. West-Australien

S. s. Simon 1908, Faun. S. W. Austral. 1 (12) p. 376 (D ♀).

Gen. **Taurongia** Hogg 1901.

♀ **divergens** (Hogg) 1900. – * Victoria

Hylobius d. Hogg 1900, Proc. Soc. Victoria (N. S.) 13 (1) p. 82 T. 13 F. 2 (D ♀).
T. d. Hogg 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 279 (N).
Hylobihoggia d. Strand 1933, Folia Zool. Hydrobiol. 7 (2) p. 304 (nom. nov. superfl.).

♂♀ **punctata** (Hogg) 1900. Victoria

Hylobius p. Hogg 1900, Proc. Soc. Victoria (N. S.) 13 (1) p. 84 T. 13 F. 3 (D ♂♀).
T. p. Hogg 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 279 (N).
Hylobihoggia p. Strand 1935, Folia Zool. Hydrobiol. 7 (2) p. 304 (nom. nov. superfl.).

Gen. **Titanoeca** Thorell 1869.

Palaearktische Arten:

§ 4 ♂, 4 ♀: Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 162—163.
§ 9 ♂, 5 ♀: Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 40—43.
§ 3 ♂, 3 ♀: Roewer 1928, Tierw. Mitteleurop. 3 (6) p. 120 TF. 1349—1352.
§ 3 ♂, 3 ♀: Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 142.

♂♀ **albomaculata** (Lucas) 1846. Mittelmeergebiet, Krim

Epeira a. Lucas 1846, Explor. Sci. Algér. Zool. 1 Arachn. p. 250 T. 15 F. 6 (D ♀).
Singa a. Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 256 (C).
Amaurobius XII-maculatus Canestrini 1868, Ann. Soc. Nat. Modena 3 p. 204 (D ♂).
Amaurobius XII-maculatus Canestrini & Pavesi 1868, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 11 p. 862 (D ♂).
Amaurobius distinctus Cambridge 1872, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 263 (D ♂♀).
Amaurobius a. Canestrini 1874, Atti Soc. Padova (3) 2 p. 213 (N).
T. **a.** Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 218 T. 3 F. 7 (D ♂♀).
Amaurobius a. Simon 1891, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 237 (N).
Amaurobius a. Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 248 T. 23 F. 358 (D ♀).
T. **a.** Simon 1914, Arachn de France 6 (1) p. 42, 43, 60 (D ♂♀).
Amaurobis distinctus Strand 1914, Arch. Naturg. 80 (A; 3) p. 174 (D ♀).
T. **a.** Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 191, f. 27a (N ♀).
T. **a.** Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 142 f. 291—296 (D ♂♀).

♂♀ **flavicoma** L. Koch 1872. Italien, Istrien, Corsica

T. **f.** L. Koch 1872, Abh. Nat. Ges. Nürnbg. 5 p. 163 (D ♂♀).
T. **f.** Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 209 (D ♂♀).
T. **f.** Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 42, 43, 60 f. 83 (D ♂♀).

♂♀ **incerta** (Nosek) 1905. Kleinasien, Bulgarien

Amaurobius (T.) i. Nosek 1905, Ann. Nat. Hofmus. Wien 20 p. 120 T. 4 F. 1 (D ♀).

T. **i.** Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 192 f. 27b (N ♂).

♂♀ **intermedia** Caporiacco 1934. Karakorum

T. **i.** Caporiacco 1934, Mem. Soc. Ent. Ital. 13 p. 119 T. 1 F. 5 (D ♂♀).

♂ **kochi** (Ausserer) 1867. Tirol, Dalmatien

Amaurobius k. 1867, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 17 p. 162 T. 7 F. 5 (D ♂).
T. **kochii** L. Koch 1872, Abh. Nat. Ges. Nürnbg. 5 p. 170 (N).

♂♀ **monticola** (Simon) 1870. Süd-Frankreich, Spanien

Dictyna m. Simon 1870, Mém. Soc. Sci. Liège (2) 3 p. 304 (36) T. 1 F. 27 (D ♂).
T. **m.** Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 214 T. 3 F. 10 (D ♂♀).
Amaurobius m. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 233 f. 187 (N ♂).
T. **m.** Simon 1914, Hist. Nat. Araign. 6 (1) p. 42, 60 f. 85 (D ♂).

♂♀ **nivalis** (Simon) 1874. Wallis, Pyrenäen

T. **n.** Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 210 (D ♂♀).
Ciniflo n. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 23 f. 25, 27, 29 (D ♂♀).
T. **n.** Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 43, 61 f. 87 (D ♂).

♂♀ **praefica** (Simon) 1870. Ost-Pyrenäen, Spanien, Algier

Dictyna p. Simon 1870, Mém. Soc. Sci. Liège (2) 3 p. 303 (35) T. 1 F. 26 (D ♂).
T. **p.** Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 217 (D ♂).
Amaurobius p. Simon 1910, Ann. Soc. Ent. France 79 p. 276 (N).
T. **p.** Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 42, 60 f. 82 (D ♂).

♂♀ **quadriguttata** (Hahn) 1831. – * Europa

Aranea obscura Walckenaer 1802, Faun. Paris. 2 p. 209 (D ♂♀) (praeocc. Olivier 1789, Fabricius 1793).
Theridion obscurum Walckenaer 1805, Tabl. Aran. p. 76 (N).
Theridion obscurum Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 83 TF. 62 (D ♂♀).
Theridion IV-guttatum Hahn 1831, Die Arachniden 1 p. 89 TF. 63, 64 (D ♂♀).

Theridion IV-guttatum Hahn 1836, Monogr. d. Spinn. 8 p. 1 T. 29 F. a, b (D ♂♀).
Theridion notatum Walckenaer 1841, Hist. Nat. Ins. Apt. 2 p. 334 (D ♂).
Theridion obscurum Walckenaer 1841, Hist. Nat. Ins. Apt. 2 p. 335 (D ♂♀).
Latrodectus IV-guttatus C. L. Koch 1850, Uebers. Arachn. Syst. 5 p. 23 (N).
Theridion ardesiacum Dufour 1855, Ann. Soc. Ent. France (3) 3 p. 10 T. 5 F. 8—14 (D ♂♀).
Euchariom obscurum Simon 1864, Hist. Nat. Araign. (1. Ed.) p. 168 (C).
T. q. Thorell 1869, On Europ. Spid. p. 124 (gen. nov.).
T. q. L. Koch 1872, Abh. Nat. Ges. Nürnbg. 5 p. 155 (D ♂♀).
T. q. Thorell 1873, Rem. Syn. Europ. Spid. p. 506 (N).
T. IV-guttata Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 215 (D ♂♀).
T. IV-guttata Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 163 T. 6 F. 34 (D ♂♀).
Amaurobius q. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 237 (N).
T. q. Becker 1896, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 12 (2) p. 227 T. 14 F. 10 (D ♂♀).
T. q. Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 248 T. 23 F. 357 (D ♂♀).
Ciniflo IV-guttatus Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 22 f. 26—29 (D ♂♀).
T. obscura Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 43, 61 (D ♂♀) (praeocc. Keyserling 1877).
T. obscura Kratochvil 1932, Zvlastn. ot. Sbornik. Prirod. Spol. Morav. Ostr. 7 p. 14, 24 f. 1, 2, 3 a, b (N ♂♀).
T. obscura Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 192 f. 30 (N ♂♀).
T. obscura Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 144 f. 297—303 (D ♂♀).

♂♀ **schineri** L. Koch 1872. Süd-Frankreich, Südost-Europa, Russland

T. s. L. Koch 1872, Abh. Nat. Ges. Nürnbg. 5 p. 159 (D ♂♀).
T. s. Simon 1874, Arachn. de France 1 p. 212 (D ♂♀).
T. s. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 163 T. 6 F. 35 (D ♂♀).
T. s. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 42, 43, 80 f. 84 (D ♂♀).
T. s. Kratochvil 1932, Zvlastn. ot. Sbornik. Prirod. Spol. Morav. Ostr. 7 p. 17, 24 f. 3 c, 4, 5 (N ♂♀).
T. s. Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 192 f. 29 (N ♂♀).

♂♀ **sequerai** Simon 1892. Frankreich, Portugal

T. s. Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61, Bull. p. 194 (D ♂♀).
T. seguerai Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 41, 43, 60 f. 81 (D ♂♀).

♀ **sibirica** L. Koch 1879. West-Sibirien

T. s. L. Koch 1879, Svensk. Vet. Ak. Handl. 16 (5) p. 84 T. 3 F. 4 (D ♀).

♂♀ **tristis** L. Koch 1872. Süd-Europa, Russland, Aegypten

? Latrodectus t. Canestrini & Pavesi 1870, Arch. Zool. Anat. Fis. Bologna 2 p. 32 T. 3 F. 9 (C) (nom. nud.).
T. t. L. Koch 1872, Abh. Nat. Ges. Nürnbg. 5 p. 167 (D ♂♀).
Amaurobius t. L. Koch. 1875, Aegypt. Abyss. Arachn. Jickeli p. 31 T. 3 F. 3 (D ♀).
T. t. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 163 T. 6 F. 32 (D ♂♀).
T. t. Bösenberg 1902, Zoologica 14 (2—4) p. 249 T. 23 F. 359 (D ♂♀).
Ciniflo t. Lessert 1910, Catal. Invert. Suisse; Araign. p. 24 (D ♂♀).
T. t. Simon 1914, Arachn. de France 6 (1) p. 43, 60 f. 86 (D ♂).
T. t. Kratochvil 1932, Zvlastn. ot. Sbornik. Prirod. Spol. Morav. Ostr. 7 p. 17, 24 f. 3 d, 6, 7 (N ♂♀).
T. t. Drenski 1940, Mitt. Nat. Inst. Sofia 13 p. 192 f. 27 b, 28 (N ♂♀).
T. t. Wiehle 1953, in: Dahl, Tierw. Deutschl. 42 p. 148 f. 304—305 (D ♂♀).

♂♀ **veteranica** Herman 1879. Ungarn, Dongebiet, Ural

T. v. Herman 1879, Ungarns Spinn. Faun. 3 p. 351 T. 7 F. 155 (D ♂♀).
T. v. Chyzer & Kulczynski 1891, Aran. Hungar. 1 p. 163 T. 6 F. 33 (D ♂♀).
T. v. Kratochvil 1932, Zvlastn. ot. Sbornik. Prirod. Spol. Morav. Ostr. 7 p. 19, 24 f. 3 d, 8, 9 (N ♂♀).

Orientalische Arten:

♂ **albofasciata** Strand 1907. Süd-China

T. a. Strand 1907, Abh. Naturf. Ges. Görlitz 25 p. 1 (D ♂).

♂♀ **birmanica** Thorell 1895. Burma

T. b. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 62 (D ♀).
T. b. Thorell 1897, Ann. Mus. Civ. Genova 37 p. 261 (N ♂♀).

♀ **escheri** Reimoser 1934. Dekan

T. e. Reimoser 1934, Rev. Suisse Zool. 41 (32) p. 436 f. 7 (D ♀).

♀ **fulmeki** Reimoser 1927. Sumatra

T. f. Reimoser 1927, Misc. Zool. Sumatra 13 p. 1 f. 1 (D ♀).

Neotropische Arten:

♀ **obscura** Keyserling 1877. Columbien

T. o. Keyserling 1877, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 27 p. 591 T. 14 F. 15 (D ♀). (nec Simon 1914).
Amaurobius o. Petrunkevitch 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 29 p. 105 (C).

♂♀ **patellaris** (Simon) 1892. Brasilien, Chile, Venezuela

Amaurobius p. Simon 1892, Ann. Soc. Ent. France 61 p. 434 T. 9 F. 8 (D ♂♀).
Göldia obscura Keyserling 1891, Spinn. Amer. 3 (Bras. Spinn.) p. 45 T. 1 F. 20 (D ♂).
Goldia obscura Simon 1897, Hist. Nat. Araign. 2 (1) p. 176 (N).

♀ **tizamina** Chamberlin & Ivie 1938. Yucatan (Höhlen)

T. t. Chamberlin & Ivie 1938, Carnegie Inst. Wash. Publ. 491 p. 129 f. 8, 9 (D ♀).

Nearktische Arten:

♂♀ **americana** Emerton 1888. U. St. Amerika, Canada

T. a. Emerton 1888, Trans. Connect. Ac. Sci. 9 p. 453 T. 10 F. 4 (D ♂♀).
Amaurobius a. Crosby & Bishop 1928, Mem. Cornell. Univ. Agr. Exp. Stat. 101 p. 1034 (C).
Amaurobius (T.) a. Emerton 1902, Common Spid. p. 215 f. 493 (D ♂♀).
T. a. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum. 47, Bull. 70 p. 518 T. 105 F. 1970; T. 107 F. 1997—2003 (D ♂♀).

♀ **americana anopla** Chamberlin 1947. Texas

T. a. a. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 21 T. 4 F. 35 (D ♀).

♀ **brunnea** (Emerton) 1888. Östl. U. St. Amerika

T. b. Emerton 1888, Trans. Connect. Ac. Sci. 7 p. 453 T. 10 F. 5 (D ♀).
T. b. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 21 (N).

♂♀ **nigrella** (Chamberlin) 1920. Westl. U. St. Amerika

Amaurobius n. Chamberlin 1920, Journ. Ent. Zool. Claremont 12 p. 2 (D ♀).

T. silvicola Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 37 (10), Biol. 10 (3) p. 15 T. 1 F. 7—8 (D ♂♀).
T. silvicola Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 22 T. 4 F. 36 (N ♂).

Gen. **Tugana** Chamberlin 1948.

♀ **cavatica** (Bryant) 1940. Cuba
Scotolathys c. Bryant 1940, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 86 (7) p. 300 T. 5 F. 64 u. 67 (D ♀) (G. revid.: **Amaurobiidae!**).
T. c. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 17 (N) (G. revid.).

Gen. **Walmus** Chamberlin 1947.

§ 11 ♂, 6 ♀: Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 10—11.

♀ **agastus** Chamberlin 1947. Californien
W. a. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 11 T. 2 F. 12 (D ♀).

♀ **barbarus** Chamberlin 1947. – * Californien
W. b. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 11 T. 1 F. 5—8 (D ♀).

♂♀ **borealis** (Emerton) 1909. Nordöstl. U. St. Amerika
Amaurobius b. Emerton 1909, Trans. Connect. Ac. Sci. 14 (3) p. 214 T. 8 F. 3 (D ♂♀).
W. b. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 12 T. 1 F. 9—10 (D ♀).
Callioplus b. Kaston 1948, State Connect. Publ. Docum 47, Bull. 70 p. 519 T. 105 F. 1968; T. 107 F. 1992—94 (D ♀).

♀ **dorothea** Chamberlin 1947. Californien
W. d. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 13 T. 1 F. 11 (D ♀).

♀ **hagiellus** Chamberlin 1947. Californien
W. h. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 13 T. 2 F. 13 (D ♀).

♂♀ **heathi** Chamberlin 1947. Californien
W. h. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 13 T. 2 F. 14—15 (D ♂♀).

♀ **hermosus** Chamberlin 1947. Californien
W. h. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 14 T. 2 F. 16 (D ♀).

♂♀ **latescens** (Chamberlin) 1919. Californien
Auximus l. Chamberlin 1919, Journ. Ent. Zool. Claremont 12 p. 3 T. 1 F. 4—5 (D ♂♀).
W. l. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah. 38 (8), Biol. 10 (5) p. 14 T. 2 F. 17—18 (D ♂♀).

♂♀ **mathetes** Chamberlin 1947. Californien
W. m. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 15 T. 2 F. 19—20; T. 3 F. 21 (D ♂♀).

♀ **mephisto** Chamberlin 1947. Californien
W. m. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 15 T. 3 F. 22 (D ♀).

♀ **oblitus** Chamberlin 1947. Californien
W. o. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 16 T. 3 F. 23 (D ♀).

♀ **varus** Chamberlin 1947. Californien
W. v. Chamberlin 1947, Bull. Univ. Utah 38 (8), Biol. 10 (5) p. 16 T. 3 F. 24 (D ♀).

Gen. **Zanomys** Chamberlin 1948.

♂♀ **californica** (Banks) 1904. Californien
Dictyolathys c. Banks 1904, Proc. Calif. Ac. Sci. (3) 3 (13) p. 343 T. 38 F. 7; T. 40 F. 40, 46 (D ♀) (G. revid.: **Amaurobiidae!**).
Z. c. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 17 T. 6 F. 59—60 (N ♂♀) (G. revid.: **Amaurobiidae!**).

♂♀ **kaiba** Chamberlin 1948. – * Utah
Z. k. Chamberlin 1948, Bull. Univ. Utah 38 (15), Biol. 10 (6) p. 18 T. 6 F. 61—62 (D ♂♀) (G. revid.: **Amaurobiidae!**).

63. Fam. PSECHRIDAE

1. Subfam. Psechrinae

Gen. **Fecenia** Simon 1887.

Orientalische Arten:

♂♀ **buruana** Reimoser 1936. Molukken (I. Buru)
F. b. Reimoser 1936, Treubia 7 (Suppl.) p. 406 f. 1 (D ♂♀).

♂♀ **cylindrata** Thorell 1895. Burma
F. c. Thorell 1895, Descr. Catal. Spid. Burma p. 64 (D ♂ o).
F. c. Thorell 1897, Ann. Mus. Civ. Genova 37 p. 263 (N ♂♀).
S. c. Pocock 1900, Faun. Brit. Ind.; Aracbn. p. 212 (D ♀).

♂ **macilenta** (Simon) 1885. Malakka
Mezentia m. Simon 1885, Bull. Soc. Zool. France 10 (4—6) p. 451 T. 10 F. 17 (D ♂).
F. m. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 225 f. 171, 172 (N).

♀ **ochracea** (Doleschall) 1859. Amboina
Tegenaria o. Doleschall 1859, Act. Soc. Ind. Neerl. 5 p. 50 T. 8 F. 8 (D ♀).
F. o. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 287 f. 1 B (N ♀).

o **protensa** Thorell 1891. Nicobaren
F. p. Thorell 1891, Svensk. Vet. Ak. Handl. 24 (2) p. 31 (D o).

♀ **sumatrana** Kulczynski 1908. Sumatra
F. s. Kulczynski 1908, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 568 T. 23 F. 20 (D ♀).
F. s. Reimoser 1928, Bull. Raffles Mus. 2 p. 132 (N ♀).

♀ **travancoria** Pocock 1899. Dekan
F. t. Pocock 1899, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 12 p. 750 (D).
F. t. Pocock 1900, Faun. Brit. Ind.; Arachn. p. 212 (D ♀).

Transgredierende Arten:

♀ **angustata** (Thorell) 1881. – * Ternate, Neu-Pommern
Mezentia a. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 204 (D ♀).
F. a. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 226 (N).

Australische Arten:

♀ **cinerea** Hogg 1914. Neu-Guinea
F. c. Hogg 1914, Proc. Zool. Soc. Lond. (4) Remarks p. 56 (D ♀).
F. c. Hogg 1915, Trans. Zool. Soc. Lond. 20 (14) p. 437 f. 23 (D ♀).

♀ **maforensis** Simon 1906. I. Mafor bei Neu-Guinea
F. m. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 287 f. 1 A (D ♀).
F. m. Strand 1914, Abh. Senckenbg. Ges. 36 (2) p. 191 (C ♀).

♀ **montana** Kulczynski 1910. Neu-Pommern
F. m. Kulczynski 1910, Denkschr. Ak. Wiss. Wien 85 p. 389 T. 17 F. 1 (D ♀).

♀ **oblonga** Rainbow 1913. Salomonen
F. o. Rainbow 1913, Rec. Austral. Mus. 10 (1) p. 7 f. 5 (D ♀).

Gen. **Metafecenia** F. Cambridge 1902.

♂♀ **albolineata** F. Cambridge 1902. – * Mexico, Costa Rica
M. a. F. Cambridge 1902, Biol. Centr. Amer. Aran. 2 p. 357 T. 33 F. 16, 17 (D ♂♀).
M. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 974 (N).

♀ **radiata** Kulczynski 1909. Costa Rica
M. r. Kulczynski 1909, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 447 T. 22 F. 18 (D ♀).

Gen. **Psechrus** Thorell 1878.

Orientalische Arten:

§ 4 ♂: Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 286.

♀ **alticeps** Pocock 1899. Indien
P. a. Pocock 1899, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 12 p. 751 (D ♀).
P. a. Pocock 1900, Faun. Brit. Ind.; Arachn. p. 211 (D ♀).

♀ **annulatus** Kulczynski 1908. Java
P. a. Kulczynski 1908, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 565 T. 23 F. 21 (D ♀).

♂♀ **curvipalpis** Fage 1929. Malakka
P. c. Fage 1929, Journ. Fed. Malay. Mus. 14 (3—4) p. 358 f. 1—4 (D ♂♀).

♀ **ghecuanus** Thorell 1897. Burma
P. g. Thorell 1897, Ann. Mus. Civ. Genova 37 p. 261 (D ♀).

♂♀ **himalayanus** Simon 1906. Himalaya
P. h. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 287 (D ♂).

♀ **libeltii** Kulczynski 1908. Sumatra
P. l. Kulczynski 1908, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 561 T. 23 F. 31 (D ♀).

mimus Chamberlin 1924. Süd-China

P. m. Chamberlin 1924, Proc. U. Stat. Nat. Mus. 63 (13) p. 2 (D).

♂ **sinensis** Berland 1914. Süd-China

P. s. Berland 1914, Ann. Soc. Ent. France 83, Bull. p. 131 f. 1—3 (D ♂).

♀ **singaporensis** Thorell 1894. Malakka, Sumatra

P. s. Thorell 1894, Bull. Soc. Ent. Ital. 26 (3) p. 321 (D ♀).
P. s. Workman 1896, Malays. Spid. p. 73 T. 78 (D ♀).

♂♀ **torvus** (Cambridge) 1869. Singapore, Java

Tegenaria t. Cambridge 1869, Journ. Linn. Soc. Lond. 10 p. 376 T. 11 F. 10—12, 14—20 (D ♂).
P. t. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 234 f. 173, 175 (N ♂).
P. t. Pocock 1900, Faun. Brit. Ind.; Arachn. p. 211 f. 66 (D ♂♀).

Transgredierende Arten:

♂♀ **argentatus** (Doleschall) 1859. – * Malakka, Celebes, Neu-Guinea, Kei-I., Neu-Pommern

Tegenaria a. Doleschall 1859, Act. Soc. Ind. Neerl. 5 p. 49 T. 8 F. 9 (D ♀).
P. a. Thorell 1878, Ann. Mus. Civ. Genova 13 p. 171 (D ♀).
P. a. Thorell 1881, Ann. Mus. Civ. Genova 17 p. 207 (N ♂).
P. a. Simon 1892, Hist. Nat. Araign. 1 (1) p. 226 f. 168—170, 174 (N ♂).
P. a. Kulczynski 1908, Bull. Ac. Sci. Cracov. p. 561 T. 23 F. 30 (N ♀).
P. a. Strand 1910, Abh. Ber. Mus. Dresden 13 (5) p. 7 (N ♂♀).

Australische Arten:

♀ **castaneus** Hogg 1914. Neu-Guinea

P. c. Hogg 1914, Proc. Zool. Soc. Lond. (4) Remarks p. 56 (D).
P. c. Hogg 1915, Trans. Zool. Soc. Lond. 20 (14) p. 434 f. 22 (D ♀).

2. *Subfam. Stiphidiinae*

Gen. **Stiphidiellum** Dalmas 1918.

♀ **minutissimum** (Hogg) 1909. Neu-Seeland

Stiphidion m. Hogg 1909, Spiders in: The Subantarct. Isl. of N.-Zeal. p. 157 T. 7 F. 1 (D ♀).
S. m. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 325 (nom. nov. gen.).

Gen. **Stiphidion** Simon 1902.

O **facetum** Simon 1902. Tasmanien

S. f. Simon 1902, Ann. Soc. Ent. France 71 Bull. p. 242 (D O).
S. f. Simon 1903 Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 974 (N).

3. *Subfam. Matachiinae*

Gen. **Matachia** Dalmas 1917.

♀ **ramulicola** Dalmas 1917. – * Neu-Seeland

M. r. Dalmas 1917, Ann. Soc. Ent. France 86 p. 328 f. 1—4 (D ♀).
M. r. Chamberlain 1946, Rec. Auckl. Inst. Mus. 3 (2) p. 94 (D).

♂♀ **rufoflava** Chamberlain 1946. Neu-Seeland

M. r. Chamberlain 1946, Rec. Auckl. Inst. Mus. 3 (2) p. 94 TF. 5—10 (D ♂♀).

Gen. **Neomatachia** Hickman 1950.

♀ **tubicola** Hickman 1950. Ruvesby-Isl.
N. t. Hickman 1950, Proc. R. Soc. Victoria 60 (N. S.) p. 2 TF. 1—5 (D ♀).

Gen. **Paramatachia** Dalmas 1918.

♂♀ **decorata** Dalmas 1918. Queensland
P. d. Dalmas 1918, Ann. Soc. Ent. France 87, Bull. p. 350 (D ♂♀).

64. Fam. TENGELLIDAE

1. Subfam. Tengellinae

Gen. **Tengella** Dahl 1901.

♀ **perfuga** Dahl 1901. Süd-Amerika
T. p. Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 252 (D ♀).
T. p. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 976 (N).

Gen. **Themarcys** Simon 1906.

♂♀ **irrorata** Simon 1906. – * Natal
T. i. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 288 (D ♂♀).

♂ **stolida** Simon 1906. Zululand
T. s. Simon 1906, Ann. Soc. Ent. Belg. 50 p. 283 (D ♂).

2. Subfam. Calamistrulinae

Gen. **Calamistrula** Dahl 1901.

♀ **evanescens** Dahl 1901. Madagascar
C. e. Dahl 1901, S. B. Ges. Naturf. Freunde Berlin (9) p. 196 f. 1—5 (D ♀).
C. e. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 976 (N).

Gen. **Mnesitheus** Thorell 1899.

♀ **asper** Thorell 1899. – * Camerun
M. a. Thorell 1899, Bih. Svensk. Vet. Ak. Handl. 25 (4; 1) p. 18 (D ♀).
M. a. Simon 1903, Hist. Nat. Araign. 2 (4) p. 975 (N).

o **vittatus** Simon 1907. Fernando Poo
M. v. Simon 1907, Ann. Mus. Civ. Genova 43 p. 227 (D o).

♂ **zoropsides** Strand 1915. Camerun
M. z. Strand 1915, Arch. Naturg. 81 (A; 11) p. 140 (D ♂).

Verzeichnis der Synonyma und der Namen der nicht zu deutenden Arten.

Das Schrifttum der im folgenden Verzeichnis aufgeführten Arten findet sich bei den hinter dem Zeichen = genannten Arten (vergl. auch Vorwort).

Abbotia:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Mangora**
Abuzaida:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Gayenna**
Acacesia:
„ foliata Simon 1895, Tullgren 1901, F. Cambridge 1904, etc. = Acacesia folifera (Marx) 1889
„ lanceolata Badcock 1932 = Acacesia folifera (Marx) 1889
„ vegeta Simon 1895 = Eustala vegeta (Keyserling) 1865
Acantharachne:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Acantharanea**
Acanthepeira:
„ verrucosa Marx 1883 = Verrucosa arenata (Walckenaer) 1841
Acanthoctenus:
„ dimidiatus Thorell 1890, 1892, F. Cambridge 1897 = Acantheis dimidiatus (Thorell) 1890
„ laetus Thorell 1890, 1892, F. Cambridge 1897 = Acantheis laetus (Thorell) 1890
„ omega Mello-Leitao 1936 = Mesoctenus omega Mello-Leitao 1929
„ sericeus Mello-Leitao 1936 = Mesoctenus sericeus Mello-Leitao 1929
„ spiniger Simon 1892 = Acanthoctenus spinigerus Keyserling 1876
„ spinulosus Mello-Leitao 1936 = Mesoctenus spinulosus Mello-Leitao 1929
„ variatus Thorell 1890, 1892, F. Cambridge 1897 = Acantheis variatus (Thorell) 1890
Acanthodon:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Idiops**
„ abrahami Hewitt 1915 = Segregara abrahami (Hewitt) 1913
„ cregoi Thorell 1895 = Ctenolophus cregoi (Purcell) 1902
„ hirschhorni Hewitt 1919 = Gorgyrella hirschhorni (Hewitt) 1919
„ kolbei Purcell 1902 = Ctenolophus kolbei (Purcell) 1902
„ oomi Hewitt 1916 = Ctenolophus oomi (Hewitt) 1916
„ pectinipalpis Purcell 1903 = Ctenolophus pectinipalpis (Purcell) 1903
„ sigillatus Simon 1892 = Idiosoma sigillatum (Cambridge) 1870
„ spiricola Purcell 1903 = Ctenolophus spiricola (Purcell) 1903
„ spiricola Hewitt 1914 = Idiops spiriferus Roewer 1942
„ transvaalensis Hewitt 1916 = Segregara transvaalensis (Hewitt) 1916
„ transvaalensis paucispinulosus Hewitt 1915 = Segregara transvaalensis paucispinulosus (Hewitt) 1915
Acanthognathus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Acanthogonatus**
Acantholycosa:
„ pedestris Dahl 1908, 1927 = Acantholycosa rupicola (Dufour) 1820
„ spinosa Denis 1950 = Acantholycosa pyrenaea (Simon) 1876
„ trajani Rosca 1939 = Pardosa trajani (Rosca) 1939

Acanthonotus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Acentroscelus**
Acanthopalpus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Acanthoscurria**
Acanthoscurria:
„ substernalis Strand 1907 = ? Acanthoscurria sternalis Pocock 1903
Acartauchenius:
„ insanus Banks 1898 = Grammonota insana (Banks) 1898
„ texanus Banks 1899 = Grammonota texana (Banks) 1899
Acattyma:
„ cryptica Simon 1897 = Latouchia cryptica (Simon) 1897
„ cunicularia Simon 1886 = Latouchia cunicularia (Simon) 1886
„ davidi Simon 1886 = Latouchia davidi (Simon) 1886
Acentropelma:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Crypsidromus**
„ rapida F. Cambridge 1897 = Crypsidromus tetricus Simon 1889
„ spinulosus Pocock 1901 = Stichoplastus spinulosus (F. Cambridge) 1897
Achaea:
„ acutiventris Keyserling 1884 = Theridion acutiventris (Keyserling) 1884
„ altiventris Keyserling 1884 = Theridion altiventris (Keyserling) 1884
„ compressa Keyserling 1884 = Theridion compressum (Keyserling) 1884
„ conifera Petrunkevitch 1911 = Thwaitesia conifera (Blackwall) 1862
„ dromedaria Keyserling 1884 = Theridion dromedariformis Roewer 1942
„ guadalupensis Keyserling 1884 = Theridion guadalupensis (Keyserling) 1884
„ ignota Keyserling 1884 = Theridion ignotum (Keyserling) 1884
„ insignis Cambridge 1882 = Achaea trapezoidalis (Taczanowski) 1873
„ maxima Keyserling 1891 = Theridion maximum (Keyserling) 1891
„ pulchra Keyserling 1891 = Theridion pulchrum (Keyserling) 1891
„ signata Keyserling 1891 = Theridion signatellum Roewer 1942
„ undata Keyserling 1884 = Theridion undatum (Keyserling) 1884
„ vittata Cambridge 1894 = Theridion cambridgei (Petrunkevitch) 1911
Acmaea:
„ villosa Keyserling 1883 = Hypoblemum villosum (Keyserling) 1883
Acompse:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Bavia**
„ clavipalpis Keyserling 1883 = Muziris clavipalpis (L. Koch) 1867
„ concinna Keyserling 1881 = Gangus concinnus (Keyserling) 1881
„ dulcinervis L. Koch 1879 = Bavia sexpunctata (Doleschall) 1859
„ suavis L. Koch 1879 = Bavia aericeps (Simon) 1877
Acracanthosoma = Acracanthostoma
Acrosoma:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Micrathena**
„ aculeatum C. L. Koch 1836 = Micrathena gladiola (Walckenaer) 1841
„ aculeatum Butler 1873 = Micrathena aculeata (Fabricius) 1775
„ affine C. L. Koch 1839 = Chaetacis affinis (C. L. Koch) 1839
„ agriliforme Taczanowski 1879 = nicht zu deuten!
„ aureolum C. L. Koch 1836 = Chaetacis aureola (C. L. Koch) 1836
„ bifurcatum Hahn 1834 = Micrathena bifurcata (Hahn) 1834
„ bifurcatum C. L. Koch 1839 = Micrathena difissa (Walckenaer) 1841
„ bovinum Thorell 1859, 1868 = Micrathena sagittata (Walckenaer) 1841
„ calcaratum Cambridge 1890, Keyserling 1892 = Micrathena cornigera (Cambridge) 1890
„ cornutum Taczanowski 1879 = Chaetacis cornuta (Taczanowski) 1879
„ fericulum Cambridge 1890, Taczanowski 1892 = Ildibaha fericula (Cambridge) 1890
„ flaveolum C. L. Koch 1839 = Micrathena flaveola (C. L. Koch) 1839
„ flaveolum Keyserling 1892 = Micrathena gladiola (Walckenaer) 1841
„ forcipatum Thorell 1859, 1868 = Micrathena sexspinosa (Hahn) 1822

Acrosoma (Forts.):
- „ furcatum Butler 1873 = Micrathena armata (Olivier) 1789
- „ furculum Cambridge 1890, Keyserling 1892 = Micrathena furcata (Cambridge) 1890
- „ gibbosum Taczanowski 1879 = Micrathena triangularis (C. L. Koch) 1836
- „ gilvulum C. L. Koch 1845 = Micrathena difissa (Walckenaer) 1841
- „ hexacantha Hahn 1834 = Gasteracantha servillei (Guérin) 1825
- „ incisum Butler 1873 = Chaetacis incisa (Walckenaer) 1841
- „ lygeana Simon 1864 = Phoroncidia lygeana (Walckenaer) 1841
- „ macracanthum Butler 1873 = Micrathena schreibersii (Perty) 1833
- „ macrocanthum Taczanowski 1873, Hasselt 1888 = Micrathena schreibersii (Perty) 1833
- „ mammillatum Butler 1873 = Micrathena horrida (Taczanowski) 1873
- „ matronale C. L. Koch 1845 = Micrathena gracilis (Walckenaer) 1805
- „ militare C. L. Koch 1838 = Micrathena sexspinosa (Hahn) 1822
- „ militare Butler 1873 = Micrathena militaris (Fabricius) 1775
- „ myrmeciaeforme Taczanowski 1872 = Ildibaha myrmeciaeformis (Taczanowski) 1872
- „ notacanthum Voigt 1836 = Dolophones notacantha (Quoy Gaimard) 1824
- „ oblongum Taczanowski 1872, Petrunkevitch 1911 = Micrathena kirbyi (Perty) 1833
- „ obtusispina Keyserling 1863, 1892 = Micrathena sexspinosa (Hahn) 1822
- „ pentacanthum Butler 1873 = Actinosoma pentacanthum (Walckenaer) 1841
- „ pictum C. L. Koch 1836 = Chaetacis picta (C. L. Koch) 1836
- „ prudens Holmberg 1887 = Micrathena swainsonii (Perty) 1833
- „ pulcherrima Holmberg 1876 = Actinosoma pentacanthum (Walckenaer) 1841
- „ quadrituberculatum Simon 1876 = Enacrosoma quadrituberculatum (Simon) 1876
- „ reduvianum Butler 1873 = Micrathena patruelis (C. L. Koch) 1839
- „ reduvianum McCook 1893 = Micrathena mitrata (Hentz) 1850
- „ rufum Karsch 1886 = Micrathena spinosa (Linné) 1758
- „ rugosum Emerton 1884, 1902 = Micrathena gracilis (Walckenaer) 1805
- „ sagittata Butler 1873, McCook 1913 = Micrathena sagittata (Walckenaer) 1841
- „ scutatum Perty 1833 = Hypognatha scutata (Perty) 1833
- „ sector Simon 1864 = Argyope sector (Forskal) 1776
- „ sedes Getaz 1893, Banks 1929 = Micrathena sexspinosa (Hahn) 1822
- „ sexspinosum Hahn 1834 = Micrathena sexspinosa (Hahn) 1822
- „ sexspinosum C. L. Koch 1839 (in tab.) = Micrathena difissa (Walckenaer) 1841
- „ sloanii Simon 1864, Butler 1873 = Argyope argentata (Fabricius) 1775
- „ spineum Emerton 1884, 1902 = Micrathena sagittata (Walckenaer) 1841
- „ spinosum C. L. Koch 1836 = Micrathena schreibersii (Perty) 1833
- „ spinosum Taczanowski 1873 = Micrathena spinosa (Linné) 1758
- „ stellatum Butler 1873 = Acanthepeira stellata (Walckenaer) 1805
- „ stelligerum Thorell 1859, 1868 = Actinosoma pentacanthum (Walckenaer) 1841
- „ transitorium C. L. Koch 1839 = Araenus transitorius (C. L. Koch) 1839
- „ tumidum Taczanowski 1879 = Araneus tumidus (Taczanowski) 1879

Acrosomoides:

Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Gasteracantha**

Actinacantha:

Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Gasteracantha**
- „ maculata Karsch 1878 = Gasteracantha mammosa C. L. Koch 1845
- „ pictispina Simon 1885 = Gasteracantha hasseltii C. L. Koch 1838
- „ propinqua Simon 1886 = Gasteracantha hasseltii C. L. Koch 1838

Actinopus:
- „ aedificatorius Westwood 1840 = Ummidia aedificatoria (Westwood) 1840
- „ algerianus Lucas 1846 = Ummidia aedificatoria (Westwood) 1840
- „ audouinii Lucas 1837 = Ummidia audouinii (Lucas) 1837

Actinopus (Forts.):
„ formosus Rainbow 1896 = Missulena rubrocapitata (Ausserer) 1875
„ fulvipes Lucas 1837 = Calommata fulvipes (Lucas) 1835
„ loricatus C. L. Koch 1842 = Chorizops loricatus (C. L. Koch) 1842
„ luteipes F. Cambridge 1896, Mello-Leitao 1923 = Actinopus crassipes (Keyserling) 1891
„ nitidulans Westwood 1840 = Ummidia nitidulans (Fabricius) 1787
„ venatorius C. L. Koch 1850 = Ummidia nitidulans (Fabricius) 1787
„ waldkenaeri Lucas 1837 = Missulena nigripes (Lucas) 1834
Adelonychia:
„ nigrostriata Walsh 1890 = Diplothele walshi Cambridge 1890
Admestina:
„ wheelerii Peckham 1888, 1894 = Admestina tibialis (C. L. Koch) 1848
Admirala:
„ lepida Peckham 1901 = Dendryphantes lepidus (Peckham) 1901
„ regia Peckham 1901 = Dendryphantes reimoseri Roewer 1951
Adonea:
„ capitata Simon 1876 = Adonea fimbriata Simon 1873
Adoxoneta:
„ europaea Simon 1929 = Centromerus europaeus (Simon) 1911
Aelurillus:
„ annulipes Strand 1901 = Aelurillus lucasi Roewer 1951
„ capreolus Simon 1884 = Aelurillus kochi Roewer 1951
„ insignitus Simon 1884 et sequ. = Aelurillus litera v-insignitus (Clerck) 1757
„ litera v-notatus Dahl 1926 = Aelurillus litera v-insignitus (Clerck) 1757
„ maindroni Simon 1885 = Langona maindroni (Simon) 1885
„ redii Simon 1885 = Langona redii (Audouin) 1827
„ tigrina Simon 1885 = Lagona tigrina (Simon) 1885
„ v-insignitus Chyzer & Kulczynski 1891 et auct. sequ. = Aelurillus litera v-insignitus (Clerck) 1757
Aelurops:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Aelurillus**
„ bresnieri Canestrini 1876 = Phlegra bresnieri (Lucas) 1846
„ capreolus Simon 1876 = Aelurillus kochi Roewer 1951
„ fasciatus Thorell 1873, Menge 1877 = Phlegra fasciata (Hahn) 1826
„ lineatus Pavesi 1872 = nicht zu deuten!
„ nobilis L. Koch 1876 = Phlegra nobilis (L. Koch) 1876
„ sapphirinus Thorell 1875 = Phlegra sapphirina (Thorell) 1875
„ v-insignitus Menge 1877, Cambridge 1881 = Aelurillus litera v-insignitus (Clerck) 1757
Aenigma:
„ australiana Karsch 1876 = Nilus australianus (Karsch) 1876
Aepygnatha:
„ ferox Thorell 1897 = Oedignatha ferox (Thorell) 1897
Aethrodes:
„ mammosa Pocock 1899 = Pasilobus mammosus Pocock 1899
Aetola:
„ australiana Karsch 1880 = Nilus australianus (Karsch) 1876
Aetrocantha:
„ falkensteinii Karsch 1879 = Gasteracantha falkensteinii (Karsch) 1879
Afracantha:
„ batesi Dahl 1914 = Gasteracantha batesi (Pocock) 1899
Agalena siehe **Agelena:**
Agassa:
„ georgiana Simon 1901 = Agassa cyanea (Hentz) 1846
Agathostola:
„ ihreringii Pocock 1895 = Grammostola ihreringii (Keyserling) 1891
„ strabo Simon 1892 = Homoeomma strabo (Simon) 1892

Agelena (= Agalena):

„ absoluta Gertsch 1936 = Calilena absoluta (Gertsch) 1936
„ actuosa Gertsch & Ivie 1936 = Agelenopsis actuosa (Gertsch & Ivie) 1936
„ adnexa Chamberlin & Gertsch 1929 = Hololena adnexa (Chamberlin & Gertsch) 1929
„ agelenoides Strand 1908 = Agelena dubiosa Strand 1908
„ albipilis Giebel 1869 = Agelenopsis naevia (Walckenaer) 1805
„ americana Keyserling 1877, Sayler 1941 part. = Agelenopsis pennsylvanica (C. L. Koch) 1843
„ angustifrons Simon 1870 = Agelena agelenoides (Walckenaer) 1841
„ annamae Gertsch & Davis 1940 = Novalena annamae (Gertsch & Davis) 1940
„ aperta Gertsch 1934 = Agelenopsis aperta (Gertsch) 1934
„ approximata Gertsch & Ivie 1936 = Novalena approximata (Gertsch & Ivie) 1936
„ arctuosa Exline 1938 = Agelenopsis actuosa (Gertsch & Ivie) 1936
„ attenuata Petrunkevitch 1911 = Novalena attenuata (F. Cambridge) 1902
„ barrowsi Gertsch 1934 = Agelenopsis barrowsi (Gertsch) 1934
„ bicavata Petrunkevitch 1911 = Melpomene bicavata (F. Cambridge) 1902
„ boopis Cambridge 1863 = Textrix boopis (Cambridge) 1863
„ brunea Menge 1871, Dahl 1931 = Agelena mengeella Strand 1942
„ brunnea Blackwall 1833, 1861 = Agroeca brunnea (Blackwall) 1833
„ californica Banks 1896, Chamberlin & Ivie 1929 = Calilena californica (Banks) 1896
„ cavata Petrunkevitch 1911 = Rualena cavata (F. Cambridge) 1902
„ civilis Sundevall 1831 = Tegenaria domestica (Clerck) 1757
„ coahuilana Gertsch & Davis 1940 = Melpomene coahuilana (Gertsch & Davis) 1940
„ coloripes Walckenaer 1841 = Supunna coloripes (Walckenaer) 1841
„ confusa Gertsch & Ivie 1936 = Tortolena confusa (Gertsch & Ivie) 1936
„ costata Banks 1939 = Novalena costata (F. Cambridge) 1902
„ curta Mc Cook 1893 = Hololena curta (Mc Cook) 1893
„ cuspidata Petrunkevitch 1911 = Novalena cuspidata (F. Cambridge) 1902
„ domestica Sundevall 1831 = Tegenaria ferruginea (Panzer) 1804
„ elegans Blackwall 1841, 1861 = Antistea elegans (Blackwall) 1841
„ elegans Petrunkevitch 1911 = Melpomene elegans (Cambridge) 1898
„ familiaris Walckenaer 1841 = Tegenaria domestica (Clerck) 1757
„ furcata Chamberlin & Gertsch 1929 = Hololena furcata (Chamberlin & Gertsch) 1929
„ glaucopis Petrunkevitch 1911 = Tortolena glaucopis (F. Cambridge) 1902
„ gracilipes Blackwall 1859, 1861 = Scotina gracilipes (Blackwall) 1859
„ gracilis Simon 1864 = Agelena gracilens C. L. Koch 1841
„ harrisoni Exline 1937 = Agelenopsis actuosa (Gertsch & Ivie) 1936
„ hentzii Becker 1879, Banks 1913 = Agelenopsis naevia (Walckenaer) 1805
„ hola Chamberlin & Gertsch 1928 = Hololena hola (Chamberlin & Gertsch) 1928
„ hyndmannii Blackwall 1861 = Cryphoeca silvicola (C. L. Koch) 1834
„ idahoana Gertsch 1934 = Novalena idahoana (Gertsch) 1934
„ intermedia Chamberlin & Gertsch 1930 = Novalena intermedia (Chamberlin & Gertsch) 1930
„ juniperina Bremi-Wolff 1849 = Drassodes lapidosus (Walckenaer) 1802
„ lobata Petrunkevitch 1911 = Novalena lobata (F. Cambridge) 1902
„ longistyla Banks 1901 = Agelenopsis longistyla (Banks) 1933
„ lutzi Gertsch 1933 = Novalena lutzi (Gertsch) 1933
„ lycosina Sundevall 1831 = Textrix denticulata (Olivier) 1789
„ marginata Petrunkevitch 1911 = Novalena marginata (F. Cambridge) 1902
„ mimoides Chamberlin 1919, Chamberlin & Gertsch 1929 = Hololena mimoides (Chamberlin) 1919
„ montana Blackwall 1841, 1861 = Hahnia montana (Blackwall) 1841
„ naevia Walckenaer 1805 et sequ. = Agelenopsis naevia (Walckenaer) 1805
„ naevia (var.) Comstock 1912 = Agelenopsis pennsylvanica (C. L. Koch) 1845

Agelena (Forts.):
- „ nava Blackwall 1841, 1861 = Hahnia nava (Blackwall) 1841
- „ nevada Chamberlin & Gertsch 1929 = Hololena nevada (Chamberlin & Gertsch) 1929
- „ nova Cambridge 1896 = Novalena nova (Cambridge) 1896
- „ obscura Sundevall 1831 = Anyphaena accentuata (Walckenaer) 1802
- „ oklahoma Gertsch 1936 = Agelenopsis oklahoma (Gertsch) 1936
- „ oquirrhensis Chamberlin & Gertsch 1930 = Hololena oquirrhensis (Chamberlin & Gertsch) 1930
- „ oregonensis Exline 1938 = Agelenopsis oregonensis (Chamberlin & Ivie) 1935
- „ orientalis C. L. Koch 1837, Thorell 1871 = Agelena labyrinthica orientalis (C. L. Koch) 1837
- „ orizaba Banks 1898 = Novalena orizaba (Banks) 1898
- „ pacifica Banks 1896 = Hololena pacifica (Banks) 1896
- „ panamana Petrunkevitch 1925 = Melpomene panamana (Petrunkevitch) 1925
- „ penetralis Banks 1909 = Agelenopsis penetralis F. Cambridge 1902
- „ peninsulana Banks 1898 = Calilena peninsulana (Banks) 1898
- „ pennsylvanica C. L. Koch 1845 = Agelenopsis pennsylvanica (C. L. Koch) 1845
- „ perita Chamberlin & Gertsch 1929 = Agelenopsis perita (Chamberlin & Gertsch) 1929
- „ plumbea Hentz 1847 = Trachelas tranquillus (Hentz) 1847
- „ potteri Blackwall 1846, Exline 1938 = Agelenopsis potteri (Blackwall) 1846
- „ proxima Cambridge 1870, C. L. Koch 1872 = Agroeca proxima (Cambridge) 1870
- „ pupis Karsch 1881 = Agelena lepida Cambridge 1876
- „ pusilla Canestrini & Pavesi 1870 = Hahnia pusilla C. L. Koch 1841
- „ rhodesiae Pocock 1901 = Agelena australis Simon 1896
- „ rua Chamberlin 1920 = Rualena rua (Chamberlin) 1920
- „ similis Keyserling 1862 et sequ. = Agelena gracilens C. L. Koch 1841
- „ simplex Petrunkevitch 1911 = Rualena simplex (F. Cambridge) 1902
- „ singula Gertsch & Ivie 1936 = Melpomene singula (Gertsch & Ivie) 1936
- „ subfusca Cambridge 1861 = Hahnia nava (Blackwall) 1841
- „ taurica Thorell 1873 = Agelena gracilens taurica Thorell 1876
- „ tentaria Roewer 1945 = Hololena tentativa (Chamberlin & Gertsch) 1929
- „ tentativa Chamberlin & Gertsch 1929 = Hololena tentativa (Chamberlin & Gertsch) 1929
- „ texana Gertsch 1934 = Agelenopsis texana (Gertsch) 1934
- „ tolucana Gertsch & Davis 1940 = Novalena tolucana (Gertsch & Davis) 1940
- „ torpida C. L. Koch 1834 = Histopona torpida (C. L. Koch) 1834
- „ transversa Petrunkevitch 1911 = Melpomene transversa (F. Cambridge) 1902
- „ utahana Chamberlin & Ivie 1933 = Agelenopsis utahana (Chamberlin & Ivie) 1933
- „ variabilis Petrunkevitch 1911 = Novalena variabilis (F. Cambridge) 1902

Agelenopsis:
- „ albipilis Giebel 1869 = Agelenopsis potteri (Blackwall) 1846
- „ americana Chamberlin & Ivie 1941, Seyler 1941 = Agelenopsis naevia (Walckenaer) 1805
- „ attenuata F. Cambridge 1902 = Novalena attenuata (F. Cambridge) 1902
- „ bicavata F. Cambridge 1902 = Melpomene bicavata (F. Cambridge) 1902
- „ californica Schenkel 1950 = Calilena californica (Banks) 1896
- „ cavata F. Cambridge 1902 = Rualena cavata (F. Cambridge) 1902
- „ costata F. Cambridge 1902 = Novalena costata (F. Cambridge) 1902
- „ cuspidata F. Cambridge 1902 = Novalena cuspidata (F. Cambridge) 1902
- „ elegans F. Cambridge 1902 = Melpomene elegans (Cambridge) 1898
- „ glaucopis F. Cambridge 1902 = Tortolena glaucopis (F. Cambridge) 1902
- „ lobata F. Cambridge 1902 = Novalena lobata (F. Cambridge) 1902
- „ marginata F. Cambridge 1902 = Novalena marginata (F. Cambridge) 1902
- „ nova F. Cambridge 1902 = Novalena nova (Cambridge) 1896
- „ orizaba F. Cambridge 1902 = Novalena orizaba (Banks) 1898

Agelenopsis (Forts.):
„ simplex F. Cambridge 1902 = Rualena simplex (F. Cambridge) 1902
„ transversa F. Cambridge 1902 = Melpomene transversa (F. Cambridge) 1902
„ variabilis F. Cambridge 1902 = Novalena variabilis (F. Cambridge) 1902

Agnyphantes:
„ expunctus Hull 1932 = Lepthyphantes lepidus (Cambridge) 1873

Agriognatha:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Cyrtognatha**

Agroeca:
„ badia Simon 1877 = Castianeira badia (Simon) 1877
„ brunea Menge 1873 = Agroeca proxima (Cambridge) 1870
„ brunnea Thorell 1870, Reimoser 1937 (part.) = Agroeca lusatica (L. Koch) 1875
„ celans Blackwall 1841, 1861 et sequ. = Scotina celans (Blackwall) 1841
„ celer Cambridge 1902 = Phurolithus festivus (C. L. Koch) 1835
„ cerioi Simon 1878 = Mesiotelus tenuissimus (L. Koch) 1866
„ chrysea L. Koch 1876 et sequ. = Agroeca pullata Thorell 1875
„ cuprea Menge 1873, Tullgren 1916, Locket & Millidge 1951 = Agroeca pullata (Thorell) 1875
„ diversa Cambridge 1913 = Scotina pallardii (L. Koch) 1881
„ fagorum Dahl 1912 = Agroecina striata (Kulczynski) 1882
„ flavopilosa Simon 1887 = Agroeca pullata Thorell 1875
„ gracilior Kulczynski 1898, Bösenberg 1902 = Agroecina striata gracilior (Lessert) 1910
„ gracilipes Simon 1878 = Scotina pallardii (L. Koch) 1881
„ gracilipes Chyzer & Kulczynski 1897, Bösenberg 1902, Dahl 1912 = Scotina gracilipes (Blackwall) 1859
„ haglundi Menge 1873, Simon 1878, Becker 1896 = Agroeca brunnea (Blackwall) 1833
„ hesperia Banks 1921 = Agroeca trivittata (Keyserling) 1887
„ inquinata Thorell 1890 = Castianeira inquinata (Thorell) 1890
„ insularis L. Koch 1873 = Supunna insularis (L. Koch) 1873
„ lineata Simon 1878 = Agroecina lineata (Simon) 1878
„ linotina Grube 1859, Ausserer 1867, Dahl 1883 = Agroeca brunnea (Blackwall) 1833
„ linotina Westring 1862 = Agroeca lusatica (L. Koch) 1875
„ littoralis F. Cambridge 1895 = Agroecina striata (Kulczynski) 1882
„ lycosiformis Cambridge 1872 = Prochora lycosiformis (Cambridge) 1872
„ munieri Simon 1877 = Castianeira munieri (Simon) 1877
„ notata Cambridge 1902 = Agroeca pullata Thorell 1875
„ oaba Gertsch 1935 = Agroeca trivittata (Keyserling) 1887
„ oswaldi Lenz 1891 = Uliodon oswaldi (Lenz) 1891
„ picta L. Koch 1873 = Supunna picta (L. Koch) 1873
„ praelongipes Simon 1878 = Scotina gracilipes (Blackwall) 1859
„ proxima Kulczynski 1898 = Agroeca inopina (Cambridge) 1886
„ repens Emerton 1894 = Agroeca ornata Banks 1892
„ striata Kulczynski 1882, 1897, Lessert 1910 = Agroecina striata (Kulczynski) 1882
„ thorellii Kulczynski 1897 = Agroeca lusatica (L. Koch) 1875
„ tristis Keyserling 1887 = Castianeira tristis (Keyserling) 1887
„ walsinghami Cambridge 1874 = Castianeira walsinghami (Cambridge) 1874

Aigola:
„ pauliana Chamberlin 1922 = Aigola crassimana (Emerton) 1882
„ tuberella Chamberlin 1922 = Aigola crassimana (Emerton) 1882

Akela:
„ obscura Caporiacco 1948 = Euophrys obscura (Taczanowski) 1871

Alcmena:
„ pallida C. L. Koch 1846 = Thiodina pallida (C. L. Koch) 1846

Allocosa:
- „ degesta Chamberlin 1904, 1908 = Allocosa noctuabunda (Montgomery) 1904
- „ exalbida Chamberlin 1908 = Allocosa dubia (Waldkenaer) 1837
- „ funerea Chamberlin 1908 = Allocosa sublata (Montgomery) 1902
- „ noctuabunda Gertsch 1933 = Allocosa mokiensis Gertsch 1934
- „ pylora Chamberlin 1925 = Allocosa noctuabunda (Montgomery) 1904
- „ rugosa Chamberlin 1908, Bishop & Crosby 1926 = Allocosa funerea (Hentz) 1844

Allomengea:
- „ scopigera Strand 1912 = Mengea scopigera (Grube) 1859

Almota:
- „ quinii Peckham 1903 = Cosmophasis australis Simon 1902

Alopecosa (Allopecosa):
- „ albofasciata Simon 1885, Caporiacco 1948 = Xerolycosa albofasciata (Brullé) 1832
- „ amica Mello-Leitao 1941 = Paratrochosina amica (Mello-Leitao) 1941
- „ anomala Mello-Leitao 1945 = Trochosippa anomala (Mello-Leitao) 1945
- „ beanii Petrunkevitch 1911 = Alopecosa aculeata (Clerck) 1757
- „ magallanica Mello-Leitao 1947 = Vesubia magallanica (Karsch) 1880
- „ minor Mello-Leitao 1941 = Trochosippa minor (Mello-Leitao) 1941
- „ murina Mello-Leitao 1941 = Paratrochosina murina (Mello-Leitao) 1941
- „ obscura Mello-Leitao 1943 = Trochosippa obscura (Mello-Leitao) 1943
- „ pelusiaca Caporiacco 1936 = Alopecosella pelusiaca (Audouin) 1827

Alpaida:
- „ conica Cambridge 1889, Keyserling 1893 = Aranea coniformis Roewer 1942

Altella:
- „ polita Banks 1898 = Argenna polita (Banks) 1898
- „ spinigera Bertkau 1884, Simon 1892, Bösenberg 1902 = Altella lucida (Simon) 1874

Altellopsis:
- „ luteus Mello-Leitao 1924 = Ciniflella lutea Mello-Leitao 1920

Amamra:
- „ bituberosa Cambridge 1889, Keyserling 1892 = Wixia bituberosa (Cambridge) 1889
- „ clivosa Cambridge 1898 = Wixia clivosa (Cambridge) 1898
- „ gibbifera Cambridge 1894 = Wixia gibbifera (Cambridge) 1894
- „ nigromaculata Cambridge 1895 = Eustala clavispina (Cambridge) 1889
- „ turrigera Cambridge 1898 = Wixia turrigera (Cambridge) 1898

Amaurobioides:

Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Uliodon**
- „ africanus Hewitt 1917 = Uliodon maritimus (Cambridge) 1883
- „ litoralis Hickman 1949 = Uliodon maritimus (Cambridge) 1883
- „ piscator Hogg 1909 = Uliodon maritimus (Cambridge) 1883

Amaurobius:
- „ agelenoides Emerton 1919, Chamberlin & Ivie 1947 = Hesperauximus agelenoides (Emerton) 1919
- „ alaskanus Chamberlin & Ivie 1947 = Callobius alaskanus (Chamberlin & Ivie) 1947
- „ albomaculatus Canestrini 1874, Simon 1892, Bösenberg 1902 = Titanoeca albomaculata (Lucas) 1846
- „ americana Emerton 1902, Bishop & Crosby 1928 = Titanoeca americana (Emerton) 1888
- „ angelus Chamberlin & Ivie 1947 = Callobius angelus (Chamberlin & Ivie) 1947
- „ annulipes L. Koch 1872 = Ixeuticus annulipes (L. Koch) 1872
- „ annulatus Simon 1874 = nomen nudum!
- „ anoplus Kulczynski 1906 = Coelotes anoplus Kulczynski 1897
- „ arizonicus Chamberlin & Ivie 1947 = Callobius arizonicus (Chamberlin & Ivie) 1947

Amaurobius (Forts.):
- „ armipotens Bishop & Crosby 1926 = Callioplus armipotens (Bishop & Crosby) 1926
- „ atramentarium Kulczynski 1906 = Coelotes segestriformis (Dufour) 1820
- „ atropos Simon 1864, Kulczynski 1906, Lessert 1910, Locket & Millidge 1953 = Coelotes atropos (Waldckenaer) 1825
- „ atrox C. L. Koch 1843 et sequ. = Amaurobius fenestralis (Stroem) 1768
- „ australiensis Strand 1913 = Ixeuticus australiensis (Strand) 1913
- „ bennetti Banks 1895 et sequ. = Callobiius bennetti (Blackwall) 1846
- „ bimetallicus Hogg 1896 = Ixeuticus bimetallicus (Hogg) 1896
- „ blochmanni Strand 1907 = Ixeuticus blochmanni (Strand) 1907
- „ borealis Emerton 1909 = Walmus borealis (Emerton) 1909
- „ canada Chamberlin & Ivie 1947 = Callobius canada (Chamberlin & Ivie) 1947
- „ candidus L. Koch 1872 = Ixeuticus candidus (L. Koch) 1872
- „ catalinus Chamberlin & Ivie 1947 = Callobius catalinus (Chamberlin & Ivie) 1947
- „ chalybeius L. Koch 1872 = Ixeuticus chalybeius (L. Koch) 1872
- „ charybdis Hogg 1910 = Ixeuticus charybdis (Hogg) 1910
- „ chatamensis Simon 1899, 1905 = Ixeuticus chatamensis (Simon) 1899
- „ claustrarius Canestrini & Pavesi 1870 = nicht zu deuten!
- „ corsicus Simon 1874 = Amaurobius ferox (Waldckenaer) 1825
- „ crassipalpis Canestrini & Pavesi 1870, Simon 1874 = Amaurobius jugorum L. Koch 1868
- „ crassipes L. Koch 1875 = Raecius crassipes (L. Koch) 1875
- „ crucifer Cambridge 1873 = Auximus crucifer (Cambridge)1873
- „ cryptarum C. L. Koch 1837 = Amaurobius ferox (Waldckenaer) 1825
- „ cyrilli Thorell 1871 = Amaurobius erberi (Keyserling) 1863
- „ deces Chamberlin & Ivie 1947 = Callobius deces (Chamberlin & Ivie) 1947
- „ dentichelis Simon 1883 = Auximus dentichelis (Simon) 1883
- „ distinctus Cambridge 1872, Strand 1914 = Titanoeca albomaculata (Lucas) 1846
- „ dubius Kulczynski 1906 ♀ = Coelotes segestriformis (Dufour) 1820
- „ XII-maculatus Canestrini 1868, Canestrini & Pavesi 1868 = Titanoeca albomaculata (Lucas) 1846
- „ exilipes Simon 1864 = Cheiracanthium exilipes (Lucas) 1846
- „ enus Chamberlin & Ivie 1947 = Callobius enus (Chamberlin & Ivie) 1947
- „ exsiccatus Strand 1913 = Ixeuticus exsiccatus (Strand) 1913
- „ falciger Kulczynski 1906 = Coelotes falciger (Kulczynski) 1897
- „ finschii L. Koch 1872 = Ixeuticus finschii (L. Koch) 1872
- „ fractus Chamberlin 1920 = Pimus fractus (Chamberlin) 1920
- „ frequens Rainbow 1920 = Ixeuticus frequens (Rainbow) 1920
- „ frigidus Marx 1889 = nom. nud.
- „ fuegianus Simon 1884, 1887 = Auximus fuegianus (Simon) 1884
- „ gasperinii Kulczynski 1906 = Coelotes gasperinii Simon 1891
- „ gausapatus Simon 1906 = Phryganoporus gausapatus (Simon) 1906
- „ hoplites Bishop & Crosby 1926 = Callioplus hoplites (Bishop & Crosby) 1926
- „ hoplomachus Bishop & Crosby 1926 = Callioplus hoplomachus (Bishop & Crosby) 1926
- „ horrenda Simon 1864 = Tomopisthes horrendus (Nicolet) 1849
- „ incertus Nosek 1905 = Titanoeca incerta (Nosek) 1905
- „ inermis L. Koch 1855, Kulczynski 1906, Lessert 1910 = Coelotes inermis (L. Koch) 1855
- „ inermis Franganillo 1920 = Amaurobius franganilloi Roewer 1951
- „ inornatus L. Koch 1872 = Badumna inornata (L. Koch) 1872
- „ insignis L. Koch 1872 = Ixeuticus insignis (L. Koch) 1872
- „ jurinitschi Drenski 1915 = Coelotes jurinitschi (Drenski) 1915
- „ kamelus Chamberlin & Ivie 1947 = Callobius kamelus (Chamberlin & Ivie) 1947
- „ karlinskii Kulczynski 1906 = Coelotes karlinskii (Kulczynski) 1906

Amaurobius (Forts.):

„ kochi Ausserer 1867 = Titanoeca kochi (Ausserer) 1867
„ kulczynski Drenski 1917 = Coelotes kulczynski (Drenski) 1917
„ leveillei Kulczynski 1906 = Coelotes segestriformis (Dufour) 1820
„ longinquus L. Koch 1867, 1872 = Ixeuticus longinquus (L. Koch) 1867
„ longipalpus Kroneberg 1875 = Nursica albosignata Simon 1874
„ longispina Kulczynski 1906 = Coelotes longispina Kulczynski 1897
„ mandibularis Simon 1864 = Clubiona mandibularis (Lucas) 1846
„ martius Simon 1899 = Ixeuticus martius (Simon) 1899
„ medicinalis Simon 1864 = Coras medicinalis (Hentz) 1821
„ mediocris Kulczynski 1906 = Coelotes mediocris Kulczynski 1887
„ melanus Chamberlin & Ivie 1947 = Calobius melanus (Chamberlin & Ivie) 1947
„ microps Simon 1908 = Ixeuticus microps (Simon) 1908
„ montanus C. L. Koch 1837, 1839 = Amaurobius claustrarius (Hahn) 1831
„ monticola Simon 1892 = Titanoeca monticola (Simon) 1870
„ mordax Canestrini & Pavesi 1870 = Amaurobius ferox (Walckenaer) 1825
„ munieri Kulczynski 1906 = Coelotes munieri Simon 1880
„ nevadensis Simon 1884 et sequ. = Callobius nevadensis (Simon) 1884
„ nigrellus Chamberlin 1920 = Titanoeca nigrella (Chamberlin) 1920
„ nomeus Chamberlin 1919, Gertsch & Jellison 1939, Chamberlin & Ivie 1947 = Callobius nomeus (Chamberlin) 1919
„ obesus Kulczynski 1906 ♂ = Coelotes segestriformis (Dufour) 1820
„ obesus Kulczynski 1906 ♀ = Coelotes pyrenaeus Simon 1870
„ obscurus Simon 1864 = Drassodes obscurus (Lucas) 1846
„ obscurus Petrunkevitch 1911 = Titanoeca obscura Keyserling 1877
„ olympus Chamberlin & Ivie 1947 = Callobius olympus (Chamberlin & Ivie) 1947
„ pabulator Kulczynski 1906, Lessert 1910 = Coelotes pabulator Simon 1875
„ pallescens Chamberlin & Ivie 1947 = Callobius pallescens (Chamberlin & Ivie) 1947
„ pastor Kulczynski 1906 = Coelotes pastor Simon 1875
„ patellaris Simon 1892 = Titanoeca patellaris (Simon) 1892
„ pickardi Kulczynski 1906, Lessert 1910 = Coelotes pickardi Cambridge 1873
„ pictus Simon 1884 et sequ. = Callobius pictus (Simon) 1884
„ pilosus Hogg 1900 = Aphyctoschaema pilosa (Hogg) 1900
„ poweri Kulczynski 1906 = Coelotes poweri Simon 1875
„ praecalvus Simon 1906 = Ixeuticus praecalvus (Simon) 1906
„ praeficus Simon 1910 = Titanoeca praefica (Simon) 1870
„ pyrenaeus Kulczynski 1906 = Coelotes pyrenaeus Simon 1870
„ quadriguttatus Simon 1892 = Titanoeca quadriguttata (Hahn) 1831
„ robustus L. Koch 1872, Strand 1907 = Ixeuticus robustus (L. Koch) 1872
„ roscidus C. L. Koch 1834, 1843 = Coelotes segestriformis (Dufour) 1820
„ rubrioides Hogg 1909 = Ixeuticus rubrioides (Hogg) 1909
„ rudolfi Schenkel 1925 = Coelotes rudolfi (Schenkel) 1925
„ saeva Simon 1864 = nicht zu deuten
„ saxatilis Simon 1864 = Coelotes atropos (Walckenaer) 1825
„ scalaris L. Koch 1872 = lexeuticus scalaris (L. Koch) 1872
„ segestrinus L. Koch 1872 = Ixeuticus segestrinus (L. Koch) 1872
„ senilellus Strand 1907 = Ixeuticus senilellus (Strand) 1907
„ senilis L. Koch 1872 = Ixeuticus senilis (L. Koch) 1872
„ severinus Chamberlin & Ivie 1947 = Callobius severinus (Chamberlin & Ivie) 1947
„ severus Simon 1884 et sequ. = Callobius severus (Simon) 1884
„ shastus Chamberlin & Ivie 1947 = Callobius shastus (Chamberlin & Ivie) 1947
„ silvanus L. Koch 1872 = Ixeuticus silvanus (L. Koch) 1872
„ silvicola Menge 1850 = Cryphoeca silvicola (C. L. Koch) 1834
„ simoni Keyserling 1877 = Amaurobius tristissimus Holmberg 1876
„ socialis Rainbow 1905 = Aphyctoschaema socialis (Rainbow) 1905

Amaurobius (Forts.):
„ solitarius Kulczynski 1906 = Coelotes solitarius L. Koch 1868
„ subnomus Chamberlin & Ivie 1947 = Callobius subnomus (Chamberlin & Ivie) 1947
„ subterraneus C. L. Koch 1837 = Coelotes terrestris (Wider) 1834
„ sylvestris Emerton 1888, 1902, Banks 1892, Simon 1903 = Amaurobius bennetti Blackwall) 1846
„ tamarus Chamberlin & Ivie 1947 = Callobius tamarus (Chamberlin & Ivie) 1947
„ terrestris C. L. Koch 1839, L. Koch 1865, 1868, Ohlert 1867 et sequ. = Coelotes terrestris (Wider) 1834
„ tetricus C. L. Koch 1839, L. Koch 1858, Ohlert 1867 = Cybaeus tetricus (C. L. Koch) 1839
„ tibialis Emerton 1888 et sequ. = Callioplus tibialis (Emerton) 1888
„ tigrinus C. L. Koch 1837 = Coelotes terrestris (Wider) 1834
„ torvus Thorell 1875 = Amaurobius jugorum L. Koch 1868
„ tristis L. Koch 1875 = Titanoeca tristis (L. Koch) 1872
„ trucidator Simon 1864 = Coelotes atropos (Walckenaer) 1825
„ utahensis Chamberlin 1919 = Callobius nevadensis (Simon) 1884

Amazula:
„ hetschkii Keyserling 1886 = Anapis hetschkii (Keyserling) 1886

Amphigyrum:
„ nebulosum Tullgren 1910 = Haemilla nebulosa (Tullgren) 1910

Amphirape (Amphyrape):
„ amabilis C. L. Koch 1850 — Evarcha amabilis (C. L. Koch) 1845
„ ancilis C. L. Koch 1850 = Euophrys ancilla C. L. Koch 1846
„ brunnescens C. L. Koch 1850 = Euophrys brunnescens C. L. Koch 1846
„ incomta C. L. Koch 1850 = Euophrys incomta C. L. Koch 1846
„ obfuscata Simon 1864 = Habrocestum pulex (Hentz) 1846
„ offuscata C. L. Koch 1850 = Habrocestum pulex (Hentz) 1846
„ rapida C. L. Koch 1850 = Phiale rapida (C. L. Koch) 1846

Amphissa:
„ spinigera Cambridge 1882 = Altella lucida (Simon) 1874

Amphyrape siehe **Amphirape**

Amycle (Amyclea):
„ albomaculata Cambridge 1874 = Amyciaea albomaculata (Cambridge) 1874
„ forticeps Cambridge 1873, Thorell 1875, Badcock 1917 = Amyciaea forticeps (Cambridge) 1873

Amycus:
„ albomaculatus Hasselt 1882 = Pseudamycus albomaculatus (Hasselt) 1882
„ guianensis Petrunkevitch 1911 = Phiale guianensis (Taczanowski) 1871
„ majori Peckham 1896 = Amycus benignus (Peckham) 1885
„ micans L. Koch 1880 = Cosmophasis micans (L. Koch) 1880
„ micarioides L. Koch 1880 = Cosmophasis micarioides (L. Koch) 1880
„ modestus L. Koch 1880 = Cosmophasis modestus (L. Koch) 1880
„ palpinalis F. Cambridge 1901 et sequ. = Amycus fallax Peckham 1896
„ praemabdibularis Hasselt 1893 = Eupalina praemandibularis (Hasselt) 1893
„ spinipes Petrunkevitch 1911 = Capidava spinipes (Taczanowski) 1871
„ splendens Simon 1901 = Cosmophasis thalassina (C. L. Koch) 1846
„ splendidus L. Koch 1880 = Cosmophasis thalassina (C. L. Koch) 1846
„ subfasciatus C. L. Koch 1846 = Vinnius subfasciatus (C. L. Koch) 1846
„ tristriatus L. Koch 1880 = Cosmophasis thalassina (C. L. Koch) 1846

Anadiastothele:
„ thorelli Simon 1903 = Lipistius thorelli (Simon) 1903

Anahita:
„ debilis Lessert 1915 = Anahita cambridgei Lessert 1915
„ kiwuana Caporiacco 1947 = Anahita kiwuensis Strand 1915
„ multidentata Caporiacco 1941 = Anahita caporiaccoi Roewer 1951
„ punctulata Simon 1897 = Anahita animosa (Walckenaer) 1837

Anamosa:
„ callosa Peckham 1895 = Rhene callosa (Peckham) 1895
„ inconcinna Peckham 1895 = Rhene inconcinna (Peckham) 1895
Anania:
„ bituberculata Thorell 1895 = Artonis bituberculata (Thorell) 1895
„ gallana Pavesi 1895 = Artonis gallana (Pavesi) 1895
Anapis:
„ paroculus Simon 1899 = Pseudanapis paroculus (Simon) 1899
Anchacantha:
„ curvispina Dahl 1914 = Gasteracantha curvispina (Guérin) 1837
Ancylometes:
„ pindareannus Mello-Leitao 1924 = Ancylometes pindareensis Mello-Leitao 1920
Andrasta:
„ globosa Cambridge 1896 = Theridiosoma globosum (Cambridge) 1896
Anelosimus:
„ jucundus F. Cambridge 1902 = Theridion jucundum Cambridge 1896
„ socialis Simon 1891 = Theridion eximium Keyserling 1884
„ studiosus F. Cambridge 1902 = Theridion studiosum Hentz 1850
Anepsia:
„ crinita Rainbow 1893 = Araneus crinitus (Rainbow) 1893
Anetes:
„ coeletron Menge 1850 = Araneus spec. pull. incert. sed.
Angaeus:
„ rhombifer leucomenus Thorell 1895 = Angaeus leucomenus Thorell 1895
Anglia:
„ hancockii Smith 1883 = Micryphantes affinis (Blackwall) 1855
Anisaspis:
„ bacillifera Simon 1892 = Anisaspis tuberculata Simon 1891
Anoka:
„ fimbriata F. Cambridge 1901 = Hentzia fimbriata (F. Cambridge) 1901
„ grenada Peckham 1894, F. Cambridge 1901 = Hentzia grenada (Peckkam) 1894
„ mitrata Peckham 1894 = Hentzia mitrata (Hentz) 1846
„ moneagua Peckham 1894, Simon 1901 = Hentzia peckhamii (Cockerell) 1893
„ palmarum Peckham 1894, Simon 1901 = Hentzia palmarum (Hentz) 1832
„ parallela Peckham 1894, Simon 1901 = Hentzia parallela (Peckham) 1894
„ vernalis Peckham 1893, 1894, Simon 1901 — Hentzia vernalis (Peckham) 1893
Anomalaria:
„ subtilis Dahl 1912, Roewer 1928 = Agyneta subtilis (Cambridge) 1873
Anomalomma:
„ albiventre Simon 1898 = Chaleposa albiventre (Simon) 1898
„ bisinuata Purcell 1903 = Chaleposa bisinuata (Purcell) 1903
„ coccineoplumosum Simon 1898 = Chaleposa coccineoplumosum (Simon) 1898
„ schreineri Purcell 1903 = Chaleposa schreineri (Purcell) 1903
Anthrobia:
„ europaea Simon 1911 = Centromerus europaeus (Simon) 1911
Antistea:
„ riparia Simon 1898 = Neoantistea riparia (Keyserling) 1887
Antrobia:
„ mammouthia Keyserling 1886 = Anthrobia mammouthia Tellkampf 1844
Anyphaena:
„ adfabilis Keyserling 1891 = Teudis adfabilis (Keyserling) 1891
„ angusticeps Keyserling 1891 = Teudis angusticeps (Keyserling) 1891
„ argentina Holmberg 1881 = Gayenna maculatipes (Keyserling) 1878
„ barbara Simon 1864 = Cheiracanthium barbarum (Lucas) 1846
„ calcarata Emerton 1889, 1902, Simon 1897 = Anyphaena pectorosa L. Koch 1866
„ censoria Keyserling 1891 = Aysha censoria (Keyserling) 1891
„ cita Keyserling 1891 = Teudis citus (Keyserling) 1891

Anyphaena (Forts.):

„ citrina L. Koch 1866 = Haptisus citrinus (L. Koch) 1886
„ clarovittata Keyserling 1891 = Teudis clarovittatus (Keyserling) 1891
„ clubionoides Cambridge 1896 = Anyphaena simplex Cambridge 1894
„ concolor Keyserling 1891 = Teudis concolor (Keyserling) 1891
„ conspersa Simon 1878 ♂, 1897 = Anyphaena alboirrorata Simon 1878
„ conspersa Simon 1878 ♀ = Anypaena sabina L. Koch 1866
„ conspersa Keyserling 1887 = Anyphaena fraterna (Banks) 1893
„ decepta Banks 1899 = Aysha decepta (Banks) 1899
„ diversicolor Keyserling 1891 = Teudis diversicolor (Keyserling) 1891
„ erratica Simon 1864 = Cheiracanthium dumetorum (Hahn) 1833
„ exilipes Simon 1864 = Cheiracanthium exilipes (Lucas) 1846
„ floridana Banks 1896 = Aysha velox (Becker) 1879
„ formosa Keyserling 1891 = Teudis formosus (Keyserling) 1891
„ fortis Keyserling 1891 = Teudis fortis (Keyserling) 1891
„ frenata Keyserling 1891 = Sillus frenatus (Keyserling) 1891
„ furcata Keyserling 1879 = Gayenna furcata (Keyserling) 1879
„ gibbosa Cambridge 1896 ♀ = Anyphaena gibba Cambridge 1896
„ gracilipes Banks 1903 = Anyphaenella gracilipes (Banks) 1903
„ gracilis L. Koch 1866, Banks 1904, Comstock 1912, Peelle & Saito 1932 = Aysha gracilis (Hentz) 1847
„ grisea Keyserling 1891 = Teudis griseus (Keyserling) 1891
„ helvola Keyserling 1891 = Teudis helvolus (Keyserling) 1891
„ ignota Keyserling 1887, 1891 = Gayenna ignota (Keyserling) 1887
„ imbecilla Keyserling 1891 = Sillus imbecillus (Keyserling) 1891
„ incerta Keyserling 1887, Emerton 1889, 1902 = Anyphaena celer (Hentz) 1847
„ insulana Karsch 1881 = nicht zu deuten!
„ insulana Bryant 1942 = Anyphaena bryantae Roewer 1951
„ intermontana Chamberlin 1920 = Anyphaena californica (Banks) 1904
„ keyserlingi L. Koch 1866 = Gayenna keyserlingi (L. Koch) 1866
„ lauta Bryant 1940 = Anyphaena dominicana (Roewer) 1951
„ lenis Keyserling 1891 = Teudis lenis (Keyserling) 1891
„ longipes Keyserling 1891 = Teudis longipes (Keyserling) 1891
„ maculatipes Keyserling 1878 = Gayenna maculatipes (Keyserling) 1878
„ mandibularis Keyserling 1879 = Aysha mandibularis (Keyserling) 1879
„ nicoleti Simon 1897 = Haptisus citrinus (L. Koch) 1866
„ nigrifrons Chamberlin & Woodbury 1929 = Aysha nigrifrons (Chamberlin & Woodbury) 1929
„ nutrix Simon 1864 = Cheiracantium punctorium (Villers) 1789
„ obscura Bösenberg 1902 = Anyphaena accentuata obscura (Sundevall) 1831
„ oceanica Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ opertanea Keyserling 1891 = Teudis opertaneus (Keyserling) 1891
„ ornata Simon 1864 = Cheiracanthium pelasgicum (C. L. Koch) 1837
„ pallidula Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
„ pampa Holmberg 1881 = Gayenna pampa (Holmberg) 1881
„ parvula Keyserling 1891 = Teudis parvulus (Keyserling) 1891
„ pelasgicum Simon 1864 = Cheiracanthium pelasgicum (C. L. Koch) 1837
„ pellucida Keyserling 1891 = Sillus pelucidus (Keyserling) 1891
„ perpusilla Banks 1909 = Temnida perpusilla (Banks) 1909
„ pilosa Keyserling 1879 = Josa pilosa (Keyserling) 1879
„ piscatoria Simon 1897 = Marcellina piscatoria (Hentz) 1847
„ procera Keyserling 1891 = Teudis procerus (Keyserling) 1891
„ punctata Keyserling 1891 = Aysha punctata (Keyserling) 1891
„ puta Cambridge 1896 = Sillus putus (Cambridge) 1896
„ pygmaea Keyserling 1891, Simon 1897 = Teudis pygmaeus (Keyserling) 1891
„ recentissima Keyserling 1891 = Teudis recentissimus (Keyserling) 1891
„ robusta Keyserling 1891, Simon 1897 = Teudis robustus (Keyserling) 1891
„ rubella Keyserling 1891 = Osoriella rubella (Keyserling) 1891

Anyphaena (Forts.):
„ rubra Emerton 1889, 1902, 1909 = Aysha gracilis (Hentz) 1847
„ rubromaculata Keyserling 1891 = Teudis rubromaculatus (Keyserling) 1891
„ saltabunda Emerton 1889, 1902 = Anyphaenella saltabunda (Hentz) 1847
„ sericea L. Koch 1866 = Aysha sericea (L. Koch) 1866
„ striolata Keyserling 1891 = Teudis striolatus (Keyserling) 1891
„ subrubra Keyserling 1891 = Teudis subruber (Keyserling) 1891
„ suspiciosa Keyserling 1891 = Teudis suspiciosus (Keyserling) 1891
„ taeniata Keyserling 1891 = Teudis taeniatus (Keyserling) 1891
„ tensa Keyserling 1891 = Teudis tensus (Keyserling) 1891
„ tensipes Keyserling 1891 = Teudis tensipes (Keyserling) 1891
„ tenuis L. Koch 1866 = Aysha tenuis (L. Koch) 1866
„ tenuipes Keyserling 1891 = Teudis tenuipes (Keyserling) 1891
„ trivittata Bertkau 1880 = Gayenna trivittata (Bertkau) 1880
„ unicolor Keyserling 1891 = Teudis unicolor (Keyserling) 1891
„ variabilis Keyserling 1891 = Teudis concolor (Keyserling) 1891
„ velox Becker 1879, Banks 1904 = Aysha velox (Becker) 1879
„ violens Keyserling 1891 = Teudis violens (Keyserling) 1891
„ virgata Keyserling 1891 = Teudis virgatus (Keyserling) 1891
„ vittata Keyserling 1882 = Gayenna vittata (Keyserling) 1882

Anyphaenella:
„ alba Bryant 1931 = Anyphaenella albens (Hentz) 1847

Anzacia:
„ insulana Dalmas 1919 = Hypodrassodes insulanus (Rainbow) 1901

Aphantaulax:
„ inda Simon 1897 = Ladissa inda (Simon) 1897
„ trimaculatus Simon 1897 = Aphantaulax seminiger trimaculatus (Simon) 1878
„ vojensis Caporiacco 1940 = Aphantaulax voiensis Berland 1920

Aphantochilus:
„ cambridgei Canals 1933 = Cryptoceroides cambridgei (Canals) 1933

Aphonopelma:
„ lamperti Petrunkevitch 1939 = Eurypelma lamperti Strand 1907
„ rusticum Pocock 1901 = Eurypelma rusticum Simon 1890
„ seemanni Pocock 1901 = Eurypelma seemanni F. Cambridge 1897

Aphyctoschaema:
„ misella Simon 1906 = Syrorisa misella (Simon) 1906
„ nexibilis Simon 1906 = Epimecinus nexibilis (Simon) 1906
„ pullata Simon 1906 = Epimecinus pullatus (Simon) 1906

Aporoptychus:
„ decoratus Lessert 1938 = Ancylotrypa decorata (Lessert) 1938

Apostenus:
„ acutus Emerton 1900 = Agroeca minuta Banks 1895
„ bertkaui Bösenberg 1899, 1902 = Scotina palliardii (L. Koch) 1881
„ cinctipes Banks 1896 = Ethobuella cinctipes (Banks) 1896
„ fuscus Bösenberg 1902 = Scotina palliardii (L. Koch) 1881

Aprolagus:
„ saxatilis Simon 1920 = Aprolagus lugubris (Blackwall) 1834

Apsectromerus:
„ duriusculus Simon 1885 = Stiphropus duriusculus (Simon) 1885

Aptostichus:
„ zebra Chamberlin & Ivie 1935 = Actinoxia zebra (Chamberlin & Ivie) 1935

Apyre:
„ catenulata Simon 1903 = Apyretina catenulata (Simon) 1903
„ nigra Simon 1903 = Apyretina nigra (Simon) 1903
„ pentagona Simon 1895 = Apyretina pentagona (Simon) 1895
„ quinquenotata Simon 1903 = Apyretina quinquenotata (Simon) 1903
„ tessera Simon 1903 = Apyretina tessera (Simon) 1903

Arachne:
- „ familiaris Audouin 1827 = Tegenaria domestica (Clerck) 1757
- „ timida Audouin 1827 = Agelena timida (Audouin) 1827

Arachnura (= **Arachnoura** Vinson):
- „ digitata Thorell 1877 = Arachnura melanura Simon 1867
- „ longicauda Urquhart 1884 = Argyope protensa L. Koch 1871
- „ nigrita Urquhart 1884 = Arachnura feredayi (L. Koch) 1871
- „ obtusa Urquhart 1884 = Arachnura feredayi (L. Koch) 1871
- „ trilobata Urquhart 1884 = Cyclosa trilobata (Urquhart) 1884

Aracus:
- „ captor Simon 1893 = Aracus captator Thorell 1887

Araeoncus:
- „ aequus Cambridge 1910 = Acartauchenius scurrilis (Cambridge) 1872
- „ bispinosus Emerton 1911 = Traematosisis bispinosus (Emerton) 1911
- „ erratus Cambridge 1907 = Acartauchenius scurrilis (Cambridge) 1872
- „ littoralis Emerton 1913 = Scolopembolus littoralis (Emerton) 1913
- „ pedalis Emerton 1923 = Gnathonaroides pedalis (Emerton) 1923
- „ vaporariorum F. Cambridge 1892 = Acartauchenius scurrilis (Cambridge) 1872

Aranea:

(Laut Entscheidung der Int. Nomencl. Comm. hat jetzt **Araneus** Clerck 1757 an die Stelle von **Aranea** Linné 1758 zu treten.)
- „ acalypha Walckenaer 1802 = Mangora acalypha (Walckenaer) 1802
- „ accentuata Walckenaer 1802 = Anyphaena accentuata (Walckenaer) 1802
- „ aculeata Fabricius 1775, 1793, Olivier 1789 = Micrathena aculeata (Fabricius) 1775
- „ aenea Schrank 1803 = Heliophanus cupreus (Walckenaer) 1802
- „ agalena Walckenaer 1802 = Araneus triguttatus (Fabricius) 1793
- „ agilis Walckenaer 1802, 1805 = Alopecosa trabalis (Clerck) 1757
- „ agraria Olivier 1789 = Pisaura mirabilis (Clerck) 1757
- „ agrestis Walckenaer 1802 = Tegenaria agrestis (Walckenaer) 1802
- „ agretyca Walckenaer 1805 = Trochosa ruricola (De Geer) 1778
- „ alba Gmelin 1789, Simon 1918 (N) = nicht zu deuten!
- „ albini Scopoli 1763 = nicht zu deuten!
- „ alboarcuata Panzer 1804 = Araneus bituberculatus (Walckenaer) 1802
- „ albofasciata De Geer 1778 = Salticus scenicus (Clerck) 1757
- „ albolunulata Panzer 1804 = Lithyphantes albomaculatus (De Geer) 1778
- „ albomaculata De Geer 1778 = Lithyphantes albomaculatus (De Geer) 1778
- „ albonigricans Panzer 1804 = Misumena vatia (Clerck) 1757
- „ albostriata columbiana Strand 1915 = Parepeira albostriata columbiana (Strand) 1915
- „ aldrovandi Scopoli 1763 = Araneus redii (Scopoli) 1763
- „ allodroma Walckenaer 1802 = Arctosa cinerea (Fabricius) 1793
- „ aloma Walckenaer 1802 = Clubiona pallidula (Clerck) 1757
- „ amarantha Walckenaer 1802 = Clubiona pallidula (Clerck) 1757
- „ amentata Olivier 1789 = Pardosa amentata (Clerck) 1757
- „ amphibia Müller 1776 = Argyroneta aquatica (Clerck) 1757
- „ angulata Schrank 1784 = Meta reticulata (Linné) 1758, jetzt: segmentata (Clerck) 1757
- „ annulata mensamontis Strand 1907 = Araneus annulellus mensamontis (Strand) 1907
- „ antriada Walckenaer 1802 = Meta merianae (Scopoli) 1763
- „ aphana Walckenaer 1802 = Ero aphana (Walckenaer) 1802
- „ apoclysa Walckenaer 1802 part. = Aranea dumetorum Fourcroy 1785, jetzt: Araneus ocellatus Clerck 1757
- „ apoclysa Walckenaer 1802 part. = Aranea foliata Fourcroy 1785, jetzt: Araneus cornutus Clerck 1757
- „ aquatica Linné 1758, Fabricius 1775, 1781, Latreille 1804, Olivier 1789 = Argyroneta aquatica (Clerck) 1757

Aranea (Forts.):
„ aquatica Fourcroy 1786 = nicht zu deuten!
„ aquatica Roemer 1789 = Atypus piceus (Sulzer) 1776
„ arcuata Fabricius 1793 = Gasteracantha arcuata (Fabricius) 1793
„ arcuatolineata Panzer 1804 = Pisaura mirabilis (Clerck) 1757
„ argentata Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = Argyope argentata (Fabricius) 1775
„ argentea Gmelin 1789 = Argyope lobata (Pallas) 1772
„ argentea Petagna 1792 = nicht zu deuten!
„ armata Olivier 1789 = Micrathena armata (Olivier) 1789
„ arundinacea Linné 1758, Olivier 1789 = Dictyna arundinacea (Linné) 1758
„ atomaria Panzer 1801 = Ocyptila atomaria (Panzer) 1801
„ atrica Reimoser 1929 = Zygiella calophylla (Walckenaer) 1808
„ atrox De Geer 1778, Olivier 1789 = Amaurobius fenestralis (Stroem) 1768
„ atrox Walckenaer 1802 = Amaurobius similis (Blackwall) 1861
„ audax Schrank 1803 = Xysticus audax (Schrank) 1803
„ audax Strand 1915 = Verrucosa audax (Blackwall) 1863
„ aurantia Olivier 1789 = Aranea raji Scopoli 1763, jetzt: Araneus marmoreus Clerck 1757
„ aurantia maculata De Geer 1778 = Aranea raji Scopoli 1763, jetzt: Araneus marmoreus Clerck 1757
„ aureola Olivier 1789 = Philodromus aureolus (Clerck) 1757
„ autumnalis Meyer 1790 = nicht zu deuten!
„ avicularia Linné 1758, Olivier 1789 = Avicularia avicularia (Linné) 1758
„ bacillifera Strand 1915 = Wixia bacillifera (Simon) 1895
„ basilissa Thorell 1899 = Caerostris basilissa (Thorell) 1899
„ benigna Walckenaer 1802 = Dictyna arundinacea (Linné) 1758
„ bicolor Olivier 1789, Fabricius 1798 = nicht zu deuten!
„ bicolor Walckenaer 1802 = Carrhotus xanthogrammus (Walckenaer) 1802
„ bicolor Risso 1826 = nicht zu deuten!
„ bicornis Walckenaer 1802 = Araneus gibbosus (Walckenaer) 1802
„ bimaculata Linné 1767, Olivier 1789 = Theridion bimaculatum (Linné) 1758
„ bipunctata Linné 1758, Schrank 1781, Olivier 1789 = Steatoda bipunctata (Linné) 1758
„ bivittata Risso 1826 = nicht zu deuten!
„ blancardi Scopoli 1763 = Evarcha flammata (Clerck) 1757
„ brünnichii Scopoli 1772 = Argyope brünnichii (Scopoli) 1772
„ bucculenta Olivier 1789 = Stemonyphantes lineatus (Linné) 1758
„ caementaria Latreille 1798 = Nemesia caementaria (Latreille) 1798
„ calceata Fabricius 1793 = Scodra calceata (Fabricius) 1793
„ calicina Olivier 1789 = Misumena vatia (Clerck) 1757
„ calophylla Walckenaer 1802 = Zygiella calophylla (Walckenaer) 1802
„ calophylla Panzer 1804 = Textrix denticulata (Olivier) 1789
„ callida Walckenaer 1802 = Pseudeuophrys callida (Walckenaer) 1802
„ calycina Linné 1758 = Misumena vatia (Clerck) 1757
„ camerunensis Strand 1906, 1907 = Araneus nauticus (L. Koch) 1875
„ cancriformis Linné 1758, 1767, Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = Gasteracantha cancriformis (Linné) 1758
„ carinata Olivier 1789 = Alopecosa pulverulenta (Clerck) 1757
„ carnifex Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = nicht zu deuten!
„ carolina Walckenaer 1805 = Theridion bimaculatum (Linné) 1758
„ caspia Gmelin 1789 = Argyope brünnichii (Scopoli) 1763
„ castanea Olivier 1789 = Teutana castanea (Clerck) 1757
„ catesbaei Scopoli 1763, Rossi 1794 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
„ cellaria Latreille 1804 = Segestria florentina (Rossi) 1790
„ cellulana Olivier 1789 = Nesticus cellulanus (Clerck) 1757
„ cellularia Meyer 1790 = Nesticus cellulanus (Clerck) 1757
„ cespitum Walckenaer 1802 = Philodromus aureolus (Clerck) 1757

Aranea (Forts.):

„ chalybeia Waldkenaer 1802 = Ballus chalybeiua (Waldkenaer) 1802
„ chelata Müller 1764 = Pardosa lugubris (Waldkenaer) 1802
„ chrysogaster Waldkenaer 1802 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
„ chrysops Poda 1761 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
„ cicatricosa De Geer 1778, Olivier 1789 = Aranea sexpunctata Linné 1758, jetzt: Araneus umbraticus Clerck 1757
„ cicurea Fabricius 1793, Panzer 1793 = Cicurina cicurea (Fabricius) 1893
„ cinerea Fabricius 1776, 1793, Olivier 1789 = Arctosa cinerea (Fabricius) 1776
„ cinerea Panzer 1793 = Cicurina cicurea (Fabricius) 1793
„ cingulata Panzer 1794 = Salticus cingulatus (Panzer) 1797
„ cinnaberina Olivier 1789 = Eresus cinnaberinus (Olivier) 1789
„ citrea De Geer 1778, Olivier 1789, Rossi 1790 = Misumena vatia (Clerck) 1757
„ citricola Forskal 1775 = Cyrtophora citricola (Forskal) 1775
„ citrina Fourcroy 1785 = Misumena vatia (Clerck) 1757
„ civilis Waldkenaer 1802 = Tegenaria domestica (Clerck) 1757
„ clavipes Linné 1767, Fabricius 1775, Olivier 1789 = Nephila clavipes (Linné) 1767
„ clerckii Scopoli 1763 = nicht zu deuten!
„ cnici Schrank 1795, 1803 = Pistius truncatus (Pallas) 1772
„ coarctata Dufour 1831 = Textrix coarctata (Dufour) 1831
„ conica Pallas 1772, De Geer 1778, Olivier 1789 = Cyclosa conica (Pallas) 1772
„ corollata Linné 1758 = nicht zu deuten!
„ cornuta Pallas 1772 = Nephila clavipes cornuta (Pallas) 1772
„ coronata De Geer 1783 = Theridion redimitum (Clerck) 1757
„ coronata Waldkenaer 1802 = Evarcha flammata (Clerck) 1757
„ corticalis Waldkenaer 1802 = Clubiona corticalis (Waldkenaer) 1802
„ cratera Waldkenaer 1802, Panzer 1804 = Aranea redii Scopoli 1763, jetzt: Araneus redii (Scopoli) 1763
„ cristata Olivier 1789 = Xysticus cristatus (Clerck) 1757
„ cruciata Waldkenaer 1802 = Aranea angulata Linné 1758, jetzt: Araneus angulatus Clerck 1757
„ crucigera De Geer 1778 = Aranea diadema Linné 1758, jetzt: Araneus diadematus Clerck 1757
„ cruentata Fabricius 1775, Olivier 1789 = Nephilengys cruentata (Fabricius) 1775
„ crypticola Latreille 1804 = Nesticus cellulanus (Clerck) 1757
„ crypticolens Waldkenaer 1802 = Nesticus cellulanus (Clerck) 1757
„ cuprea Waldkenaer 1802, 1805 = Heliophanus cupreus (Waldkenaer) 1802
„ curacaviensis Müller 1776 = Latrodectus curacaviensis (Müller) 1776
„ cylindrica F. Cambridge 1901 = Araneus cylindriformis (Roewer) 1942
„ dalmatica Strand 1915 = Araneus subfuscus (C. L. Koch) 1837
„ degeerii Scopoli 1763 = nicht zu deuten!
„ delicatula Waldkenaer 1802 = Misumenops tricuspidatus (Fabricius) 1775
„ denticulata Olivier 1789 = Textrix denticulata (Olivier) 1789
„ denticulata Waldkenaer 1802 = Theridion melanurum (Hahn) 1831
„ depressa Razoumowsky 1789 = Araneus cucurbitinus Clerck 1757
„ depressa Waldkenaer 1802 = Ballus chalybeius (Waldkenaer) 1802
„ derliamii Scopoli 1763 = Tegenaria domestica (Clerck) 1757
„ destrictoides Strand 1915 = Parawixia destrictoides (Strand) 1915
„ diadema Linné 1758 et sequ. = Araneus diadematus Clerck 1757
„ diana Waldkenaer 1802 = Misumenops tricuspidatus (Fabricius) 1775
„ diodia Waldkenaer 1802, Kolosvary 1938 = Zilla diodia (Waldkenaer) 1802
„ dispar Bösenberg & Strand 1906 = Zygiella dispar (Kulczynski) 1885
„ domestica Linné 1758, De Geer 1778, Olivier 1789, Schrank 1781 = Tegenaria domestica (Clerck) 1757
„ domestica Waldkenaer 1802 = Tegenaria ferruginea (Panzer) 1804
„ dorsalis Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = ? Pardosa lugubris (Waldkenaer) 1802

Aranea (Forts.):
- „ dorsata Fabricius 1781, 1793, Olivier 1789 = Diaea dorsata (Fabricius) 1781
- „ dromaderia Walckenaer 1802, 1805 = Araneus bituberculatus (Walckenaer) 1802
- „ drypta Walckenaer 1802 = Araneus triguttatus (Fabricius) 1793
- „ dumetorum Fourcroy 1785, Villers 1789 = jetzt: Araneus ocellatus Clerck 1757
- „ dumetorum islandicola Strand 1906 = Araneus ocellatus islandicola (Strand) 1906
- „ durandi Lamarck 1818 = Uroctea durandi (Lamarck) 1809
- „ edulis Labilladière 1799 = Nephila edulis (Labilladière) 1799
- „ elegans Meyer 1790 = Dolomedes fimbriatus (Clerck) 1757
- „ elegans Blackwall 1862 = Araneus elegantulus (Roewer) 1951
- „ elongata Olivier 1789 = Dolomedes fimbriatus (Clerck) 1757
- „ elongatospinosa De Geer 1778 = Micrathena aculeata (Fabricius) 1775
- „ emarginata Schrank 1803 = Philodromus emarginatus (Schrank) 1803
- „ encarpata Walckenaer 1802 = Pseudicius encarpatus (Walckenaer) 1802
- „ ensifera Rossi 1790 = nicht zu deuten!
- „ epimelas Walckenaer 1802 = Clubiona pallidula (Clerck) 1757
- „ eresifrons Strand 1908 = Araneus strupifer (Simon) 1885
- „ erratica Olivier 1789 = Pardosa pullata (Clerck) 1757
- „ erratica Walckenaer 1802 = Cheiracanthium dumetorum (Hahn) 1833
- „ erythrina Walckenaer 1802 = Dysdera erythrina (Walckenaer) 1802
- „ esuriens Fabricius 1775, Sulzer 1776 = nicht zu deuten!
- „ eumeniphila Strand 1915 = Parawixia eumeniphila (Strand) 1915
- „ extensa Linné 1758, Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = Tetragnatha extensa (Linné) 1758
- „ Fuesslin 1775, Sulzer 1776 = nicht zu deuten!
- „ fabrilis Olivier 1789 = Alopecosa fabrilis (Olivier) 1789
- „ falcata Olivier 1789 = Evarcha flammata (Clerck) 1757
- „ fasciata Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = Agryope brünnichii (Scopoli) 1763
- „ fasciata Fabricius 1775, 1781, Oliver 1789 = Argyope brünnichii (Scopoli) 1763
- „ fasciculata De Geer 1778 = Nephila clavipes fasciculata (De Geer) 1778
- „ fastuosa Olivier 1789 = Argyope trifasciata (Forskal) 1775
- „ fenestralis Stroem 1768 = Amaurobius fenestralis (Stroem) 1768
- „ ferruginea Panzer 1804 = Tegenaria ferruginea (Panzer) 1804
- „ fimbriata Linné 1758, Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = Dolomedes fimbriatus (Clerck) 1757
- „ fimbriata Razoumowsky 1789 = nicht zu deuten!
- „ flammata Olivier 1789 = Evarcha flammata (Clerck) 1757
- „ flava F. Cambridge 1904 = Singa flava Cambridge 1894
- „ flavissima Linné 1758, Olivier 1789 = nicht zu deuten!
- „ florentina Rossi 1790 = Segestria florentina (Rossi) 1791
- „ floricolens Walckenaer 1802, Schrank 1803 = Diaea dorsata (Fabricius) 1781
- „ foliata Fourcroy 1785, Olivier 1789, Reimoser 1928, Wiehle 1931 = jetzt: Araneus cornutus Clerck 1757
- „ folium Schrank 1803 = Aranea foliata Fourcroy 1785, jetzt: Araneus cornutus Clerck 1757
- „ formicaria De Geer 1778, Olivier 1789 = Myrmarachne joblotii (Scopoli) 1763
- „ formicina Olivier 1789 = Thanatus formicinus (Clerck) 1757
- „ formosa Cyrill 1789 = Argyope brünnichii (Scopoli) 1763
- „ formosa Olivier 1789 = Theridion lunatum (Clerck) 1757
- „ fornicata Fabricius 1775, 1781, 1793, Olivier 1789 = Gasteracantha fornicata (Fabricius) 1775
- „ forskalii Scopoli 1763 = nicht zu deuten!
- „ frischii Scopoli 1763 = Aranea cucurbitina Linné 1758, jetzt Araneus cucurbitinus Clerck 1757
- „ frontalis Olivier 1789 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
- „ frontalis Walckenaer 1802 = Euophrys maculata (Wider) 1834

Aranea (Forts.):

„ fucata Walckenaer 1802, Simon 1918 = nicht zu deuten!
„ fulgens Walckenaer 1802 = Micaria fulgens (Walckenaer) 1802
„ fulvata Fabricius 1787, 1793, Olivier 1789 = Salticus scenicus (Clerck) 1757
„ fumigata Linné 1758, Olivier 1789 = Pardosa amentata (Clerck) 1757
„ furcata Villers 1789 = Ero furcata (Villers) 1789
„ fusca De Geer 1778, Olivier 1789 = Meta merianae (Scopoli) 1763
„ fuscomarginata De Geer 1778, Olivier 1789 = Philodromus fuscomarginatus (De Geer) 1778
„ geniculata Olivier 1789 = Uloborus geniculatus (Olivier) 1789
„ gigas Comstock 1912 = Aranea raji Scopoli 1763, jetzt: Araneus marmoreus Clerck 1757
„ goedarti Scopoli 1763 = nicht zu deuten!
„ globosa Fabricius 1775 = Synema globosum (Fabricius) 1775
„ globosula Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = nicht zu deuten!
„ goezenii Schrank 1781 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
„ gregalis Strand 1907 = Metazygia gregalis (Cambridge) 1889
„ groenlandica Strand 1906 = Singa groenlandica (Simon) 1889
„ grossipes De Geer 1778, Olivier 1789 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
„ haematocnemis Pocock 1899 = Araneus sanguinipes (Thorell) 1899
„ hamata Olivier 1789 = Singa hamata (Clerck) 1757
„ hasselquistii Scopoli 1763 = Misumena vatia (Clerck) 1757
„ heterophthalma Latreille 1804 = Oxyopes heterophthalmus (Latreille) 1804
„ hexacantha Fabricius 1783, 1787 = Gasteracantha cancriformis (Linné) 1758
„ hirtipes Fabricius 1775, 1787, Olivier 1789 = Avicularia versicolor (Walckenaer) 1837
„ hirtipes Petagna 1792 = nicht zu deuten!
„ holosericea Linné 1758, Olivier 1789 et sequ. = Clubiona palludicola (Clerck) 1757
„ holosericea De Geer 1778 = Clubiona phragmitis C. L. Koch 1843
„ hombergii Scopoli 1763 = Harpactea hombergii (Scopoli) 1763
„ horrida Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = Pistius truncatus (Pallas) 1772
„ horticola Olivier 1789 = nicht zu deuten!
„ illibata Simon 1870 = Araneus dalmaticus (Doleschall) 1852
„ impedita L. Koch 1867 = Araneus dalmaticus (Doleschall) 1852
„ impressa Fabricius 1779 = Aranea sexpunctata Linné 1758, jetzt: Araneus umbraticus Clerck 1757
„ inaurata Olivier 1789 = Misumenops tricuspidatus (Fabricius) 1775
„ inclinata Walckenaer 1802 = Meta reticulata (Linné) 1758, jetzt: Meta segmentata (Clerck) 1757
„ inquilina Olivier 1789 = Alopecosa inquilina (Clerck) 1757
„ insidiatrix Forskal 1775, 1776 = Filistata insidiatrix (Forskal) 1775
„ insignita Olivier 1789 = Aelurillus litera V-insignita (Clerck) 1757
„ intersecta Fourcroy 1785 = nicht zu deuten!
„ irregularis Panzer 1801 = Synema globosum (Fabricius) 1775
„ jejuna Panzer 1801 = Philodromus margaritatus (Clerck) 1757
„ joblotii Scopoli 1763 = Myrmarachne joblotii (Scopoli) 1763
„ jonstoni Scopoli 1763 = nicht zu deuten!
„ kalmii Scopoli 1763 = nicht zu deuten!
„ kersteni Strand 1908 = Araneus rufipalpis (Lucas) 1858
„ kleinii Scopoli 1763 = nicht zu deuten!
„ knorrii Scopoli 1763 = Piratula knorrii (Scopoli) 1763
„ labyrinthica Linné 1758, Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789, Walckenaer 1841 = Agelena labyrinthica (Linné) 1758
„ lacera Olivier 1789 = Aranea dumetorum Fourcroy 1785, jetzt Araneus ocellatus Clerck 1757
„ laevipes Linné 1758, Fabricius 1781, Olivier 1789 = Philodromus margaritatus (Clerck) 1757

Aranea (Forts.):
- „ lapidosa Walckenaer 1802 = Drassodes lapidosus (Walckenaer) 1802
- „ latens Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = Dictyna latens (Fabricius) 1775
- „ lentiginosa C. L. Koch 1837 = Pterotricha lentiginosa (C. L. Koch) 1837
- „ leuwenhoekii Scopoli 1763 = Aranea foliata Fourcroy 1785, jetzt: Araneus cornutus Clerck 1757
- „ levipes Petagna 1792 = Philodromus margaritatus (Clerck) 1757
- „ lignaria Olivier 1789 = Acantholycosa lignaria (Sundevall) 1832
- „ liliigera Rossi 1790 = Agelena labyrinthica (Clerck) 1757
- „ limans Thorell 1875 = Araneus dalmaticus (Doleschall) 1852
- „ lineata Linné 1758, Olivier 1789 = Stemonyphantes lineatus (Linné) 1758
- „ lineata Razoumowsky 1789 = nicht zu deuten!
- „ linnaei Scopoli 1763 = Aranea diadema Linné 1758, jetzt: Araneus diadematus Clerck 1757
- „ listeri Scopoli 1763 = Pisaura mirabilis (Clerck) 1757
- „ litterata Olivier 1789 = Zygiella litterata (Olivier) 1789, jetzt: Zygiella x-notata (Clerck) 1757
- „ litterata Walckenaer 1802 = Aelurillus litera v-insignitus (Clerck) 1757
- „ litterata Panzer 1804 = Aranea sexpunctata Linné 1758, jetzt: Araneus umbraticus Clerck 1757
- „ littoralis De Geer 1778, Olivier 1789 = Pardosa amentata (Clerck) 1757
- „ livida Meyer 1790 = nicht zu deuten!
- „ lobata Pallas 1772, Fabricius 1781, Olivier 1789 = Argyope lobata (Pallas) 1772
- „ longimara Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = Nephila clavipes (Linné) 1758
- „ longipes Fuesslin 1775, Sulzer 1776 = Tegenaria domestica (Clerck) 1757
- „ longipes Fabricius 1781, 1793, Olivier 1789 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
- „ longipes Fourcroy 1785 = nicht zu deuten!
- „ luca Fabricius 1781 = nicht zu deuten!
- „ lucifuga Walckenaer 1802 = Gnaphosa lucifuga (Walckenaer) 1802
- „ lugubris Walckenaer 1802 = Pardosa lugubris (Walckenaer) 1802
- „ lunata Olivier 1789 = Theridion lunatum (Clerck) 1757
- „ lunulata Walckenaer 1802 = Dendryphantes hastatus (Clerck) 1757
- „ lupus Fourcroy 1785 = ? Pardosa pullata (Clerck) 1757
- „ lurida Olivier 1789 = nicht zu deuten!
- „ lusca Fabricius 1775, 1781, 1787, 1793, Olivier 1789 = nicht zu deuten!
- „ luteola Thorell 1899 = Araneus luteofaciens (Roewer) 1942
- „ lyonetti Scopoli 1763 = Pardosa amentata (Clerck) 1757
- „ mactans Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = Latrodectus mactans (Fabricius) 1775
- „ maculata Olivier 1789 = Lithyphantes albomaculatus (De Geer) 1778
- „ maculata Fabricius 1793 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
- „ macullulata Dufour 1831 = Hersiliola macullulata (Dufour) 1831
- „ M-album Panzer 1804 = Steatoda bipunctata (Linné) 1758
- „ malphigii Scopoli 1763 = nicht zu deuten!
- „ mammata De Geer 1778, Olivier 1789 = Argyope argentata (Fabricius) 1775
- „ marcgravii Scopoli 1763 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
- „ marginata De Geer 1785, Olivier 1789 = Dolomedes fimbriatus (Clerck) 1757
- „ marmorata Fourcroy 1785 = nicht zu deuten!
- „ marmorea Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = Aranea raji Scopoli 1763, jetzt: Araneus marmoreus Clerck 1757
- „ marmorea Panzer 1804 = Araneus adiantus (Walckenaer) 1802
- „ maxillosa Fabricius 1793 = Desis maxillosa (Fabricius) 1793
- „ melanogaster Latreille 1804 = Gnaphosa lucifuga (Walckenaer) 1802
- „ melittagria Walckenaer 1802 = Aranea raji Scopoli 1763, jetzt: Araneus marmoreus Clerck 1757
- „ menardi Latreille 1804 = Meta menardi (Latreille) 1804
- „ marianae Scopoli 1763 = Meta merianae (Scopoli) 1763
- „ meridionalis Strand 1915 = Verrucosa meridionalis (Keyserling) 1892

Aranea (Forts.):
- „ meticulosa Fourcroy 1785 = Pholcus phalangioides (Fuesslin) 1775
- „ militaris Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = Micrathena militaris (Fabricius) 1775
- „ minuta Meyer 1790 = nicht zu deuten!
- „ mirabilis Schrank 1803 = nicht zu deuten!
- „ modestella Strand 1907 = Araneus modestus (Simon) 1890
- „ moniligera Villers 1789 = Eresus cinnaberinus (Olivier) 1789
- „ montana Linné 1758, Olivier 1780 = Linyphia montana (Linné) 1758, jetzt: Linyphia triangularis (Clerck) 1757
- „ mortuorum Rossi 1790 = nicht zu deuten!
- „ mouffeti Scopoli 1763 = Tetragnatha extensa (Linné) 1758
- „ muscorum Walckenaer 1802 = Heliophanus muscorum (Walckenaer) 1802
- „ muscosa Olivier 1789 = Marpissa muscosa (Clerck) 1757
- „ myabora Walckenaer 1802 = Araneus triguttatus (Fabricius) 1793
- „ myagria Walckenaer 1802 = Aranea diadema (Linné) 1758, jetzt: Araneus diadematus Clerck 1757
- „ myopa Fabricius 1781, 1787, Olivier 1789, Schrank 1803 = Theridion redimitum (Clerck) 1757
- „ nephiloides F. Cambridge 1904 = Eriophora nephiloides (Cambridge) 1889
- „ nervosa Olivier 1789 = Theridion notatum (Linné) 1758, jetzt: Theridion sisyphium (Clerck) 1757
- „ nidicolens Walckenaer 1802 = Dendryphantes nidicolens (Walckenaer) 1802
- „ nidulans Fabricius 1787, Olivier 1789 = nicht zu deuten!
- „ nigra Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = nicht zu deuten!
- „ nigra Petagna 1786, 1792 = Eresus cinnaberinus (Olivier) 1789
- „ nigra Walckenaer 1802 = Sitticus walckenaeri (Roewer) 1951
- „ nigrita Fabricius 1775 = ? Zelotes pusillus (C. L. Koch) 1833
- „ nigrofasciata Razoumowski 1789 = Aranea dumetorum Fourcroy 1785, jetzt: Araneus ocellatus Clerck 1757
- „ nitida Meyer 1790 = nicht zu deuten!
- „ nitidulans Fabricius 1787 = Pachylomerides (Ummidia) nitidulans (Fabricius) 1787
- „ nivalis Olivier 1789 = Alopecosa inquilina (Clerck) 1757
- „ nobilis Fabricius 1798 = nicht zu deuten!
- „ nocturna Linné 1758, Olivier 1789 = Callilepis nocturna (Linné) 1758
- „ nocturna Schrank 1781 = ? Teutana grossa (C. L. Koch) 1839
- „ nocturna Walckenaer 1802 = Poecilochroa conspicua (L. Koch) 1866
- „ notacantha Quoy Gaimard 1824 = Dolophones notacantha (Quoy Gaimard) 1824
- „ notata Linné 1758 = Theridion notatum (Linné) 1758, jetzt: Theridion sisyphium (Clerck) 1757
- „ notata Fuesslin 1775 = nicht zu deuten!
- „ notata Latreille 1804 = Asagena phalerata (Panzer) 1801
- „ novemmaculata Panzer 1804 = Meta menardii (Latreille) 1804
- „ noxilla Strand 1907 = ? Araneus nox (Simon) 1877
- „ nutrix Walckenaer 1802 = Cheiracanthium punctorium (Villers) 1789
- „ oblonga Walckenaer 1802 = Tibellus oblongus (Walckenaer) 1802
- „ obscura Olivier 1789 = Alopecosa trabalis (Clerck) 1757
- „ obscura Fabricius 1793 = Pisaura mirabilis (Clerck) 1757
- „ obscura Walckenaer 1802 = Titanoeca quadriguttata (Hahn) 1831
- „ obtextrix Meyer 1790 = nicht zu deuten!
- „ ocellata Linné 1758, Olivier 1789 = nicht zu deuten!
- „ octopunctata Linné 1758, Olivier 1789 = Aranea cucurbitina Linné 1758, jetzt: Araneus cucurbitinus Clerck 1757
- „ octopunctata Schrank 1781 = nicht zu deuten!
- „ oculata Walckenaer 1802 = Cyclosa oculata (Walckenaer) 1802
- „ olearii Scopoli 1763 = Salticus olearii (Scopoli) 1763

Aranea (Forts.):

„ onici Schrank 1795, 1803 = Pistius truncatus (Pallas) 1772
„ opilionoides Schrank 1781 = Pholcus opilionoides (Schrank) 1781
„ ornata Sulzer 1776 = Philodromus margaritatus (Clerck) 1757
„ ornata Walckenaer 1802 = Micromata roseum ornatum (Walckenaer) 1802
„ osbeckii Schrank 1781 = nicht zu deuten!
„ osbekii Scopoli 1763 = Misumena vatia (Clerck) 1757
„ ovata Olivier 1789 = Theridion redimitum (Clerck) 1757
„ ovigera Panzer 1804 = jetzt: Araneus sericatus Clerck 1757
„ pallens Fabricius 1798 = Heteropoda venatoria (Linné) 1758
„ pallens Meyer 1790 = nicht zu deuten!
„ pallidula F. Cambridge 1904 = jetzt: Araneus pallidula (Keyserling) 1863
„ paludosa De Geer 1783 = Dolomedes fimbriatus (Clerck) 1757
„ palustris Linné 1758, 1761 = Pardosa palustris (Linné) 1758
„ palustris Fabricius 1775 = ? Pirata piratica (Clerck) 1757
„ palustris Razoumowsky 1789 = nicht zu deuten!
„ palustris Risso 1826 = nicht zu deuten!
„ papalis Fourcroy 1785 = Aranea diadema Linné 1758, jetzt: Araneus diadematus Clerck 1757
„ parallela Fabricius 1798 = Myrmarachne parallela (Fabricius) 1798
„ parietina Fourcroy 1785 = Tegenaria parietina (Fourcroy) 1785
„ perfida Walckenaer 1802, 1805 = Segestria florentina (Rossi) 1790
„ perita Latreille 1798 = Arctosa perita (Latreille) 1798
„ petiverii Scopoli 1763 (part.) = Zelotes ater (Hentz) 1832
„ phalangiodes Fourcroy 1785, Olivier 1789 = Tegenaria parietina (Fourcroy) 1785
„ phalangioides Fuesslin 1775 = Pholcus phalangioides (Fuesslin) 1875
„ phragmitis Rossi 1790 = Argyope brünnichii (Scopoli) 1763
„ pia Chamberlin 1924 = Araneus piatus (Roewer) 1942
„ picea Sulzer 1776 = Atypus piceus (Sulzer) 1776
„ picta Razoumowsky 1789 = Aranea dumetorum Fourcroy 1785, jetzt: Araneus ocellatus Clerck 1757
„ picta Walckenaer 1802 = Theridion ornatum (Hahn) 1831
„ pigra Walckenaer 1802 = Tmarus piger (Walckenaer) 1802
„ pilipes Fabricius 1793 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
„ pini De Geer 1778, Oilivier 1789 = Dendryphantes hastatus (Clerck) 1757
„ pinnata Stroem 1768 = Linyphia montana (Linné) 1758, jetzt: Linyphia triangularis (Clerck) 1757
„ piratica Olivier 1789 = Pirata piraticus (Clerck) 1757
„ piscatoria Olivier 1789 = Pirata piscatorius (Clerck) 1757
„ plantaria Olivier 1789 = Dolomedes plantarius (Clerck) 1757
„ plantigera Rossi 1790 = Synema globosum (Fabricius) 1775
„ pluchii Scopoli 1763, Rossi 1790 = Holocnemus pluchii (Scopoli) 1763
„ plumipes Latreille 1804 = Nephila plumipes (Latreille) 1804
„ podae Scopoli 1763 = nicht zu deuten!
„ pomatia Walckenaer 1802 = Marpissa pomatia (Walckenaer) 1802
„ prima Herrich-Schäffer 1804 = Tetragnatha extensa (Linné) 1758
„ pseudopfeifferae Strand 1907 = ? Araneus pfeifferae (Thorell) 1877
„ pseudostriata Strand 1908 = Pararaneus striatellus pseudostriatus Roewer 1942
„ pubescens Fabricus 1775, 1781, Olivier 1789 = Sitticus truncorum (Linné) 1758
„ pugnax Rossi 1790 = Sitticus truncorum (Linné) 1758
„ pulchella Walckenaer 1802 = Theridion pulchellum (Walckenaner) 1802
„ pulchra Razoumowsky 1789 = Argyope brünnichii (Scopoli) 1763
„ pullata Olivier 1789 = Pardosa pullata (Clerck) 1757
„ punctata De Geer 1778 = Staetoda bipunctata (Linné) 1758
„ punctata Olivier 1780 = Aelurillus litera v-insignitus (Clerck) 1757
„ punctoria Villers 1789 = Cheiracanthium punctorium (Villers) 1789
„ pupillata Fabricius 1793 = Hyllus pupillatus (Fabricius) 1793

Aranea (Forts.):

„ purpurata Panzer 1804 = Eresus cinnaberimis (Olivier) 1789
„ purpurata Panzer 1804 = Theridion redimitium (Clerck) 1757
„ pyramidata Olivier 1789 = Aranea raji betulae Sulzer 1776, jetzt: Araneus marmoreus pyramidatus Clerck 1757
„ quadrilineata Linné 1761, Olivier 1789 = Misumena vatia (Clerck) 1757
„ quadrilineata Panzer 1804 = Philodromus aureolus (Clerck) 1757
„ quadrimaculata De Geer 1778, Olivier 1789 = Aranea reaumurii Scopoli 1763, jetzt: Araneus quadratus Clerck 1757
„ quadripunctata Linné 1758 = Scotophaeus quadripunctatus (Linné) 1758
„ quadripunctata Fabricius 1775 = Steatoda bipunctata (Linné) 1758
„ quadripunctata Fuesslin 1775 = nicht zu deuten!
„ quarta Herrich-Schäffer 1804 = Tetragnatha extensa (Linné) 1758
„ quattuordecimpunctata Schrank 1803 = Dolomedes fimbriatus (Linné) 1758
„ quatuorguttata Rossi 1790, Coquebert 1840 = Eresus cinnaberinus (Olivier) 1789
„ quinquepunctata Panzer 1804 = Misumena vatia (Clerck) 1757
„ radulans Pavesi 1883 = Araneus dalmaticus (Doleschall) 1852
„ raji Scopoli 1763, Reimoser 1930, Wiehle 1931 = jetzt: Araneus marmoreus Clerck 1757
„ raji betulae Sulzer 1776 = jetzt: Araneus marmoreus pyramidatus Clerck 1757
„ ramosa Panzer 1804 = Oxyopes ramosus (Panzer) 1804
„ randiae Strand 1916 = Pararaneus striatellus similis (Bösenberg & Lenz) 1895
„ rapax Fabricius 1798 = nicht zu deuten!
„ reaumurii Scopoli 1763, Wiehle 1931 = jetzt: Araneus quadratus Clerck 1757
„ redimita Linné 1758, Olivier 1789 = Theridion redimitum (Clerck) 1757
„ regalis Panzer 1793 = Aranea redii Scopoli, jetzt: Araneus marmoreus Clerck 1757
„ regia Fabricius 1793 = Heteropoda venatoria (Linné) 1758
„ relucens Latreille 1804 = Micaria fulgens (Walckenaer) 1802
„ resupina domestica De Geer 1778 = Linyphia resupina domestica (De Geer) 1778, jetzt: Linyphia montana (Clerck) 1757
„ resupina sylvestris De Geer 1778 part. = Linyphia montana (Linné) 1758, jetzt: Linyphia marginata (C. L. Koch) 1834
„ resupina sylvestris De Geer 1778 part. = Linyphia triangularis (Clerck) 1757
„ resupinata Olivier 1789 = Linyphia resupina domestica (De Geer) 1778, jetzt: Linyphia montana (Clerck) 1757
„ reticulata Linné 1758, Oolivier 1789 = Meta reticulata (Linné) 1758, jetzt: Meta segmentata (Clerck) 1757
„ reticulata Roemer 1789 = Aranea raji betulae Sulzer 1776, jetzt: Araneus marmoreus pyramidatus Clerck 1757
„ rhomboica Walckenaer 1802 = Thanatus formicinus (Clerck) 1757
„ riparia Linné 1758 = Agelena Labyrinthica (Clerck) 1757
„ ritteri Scopoli 1763 = Heliophanus ritteri (Scopoli) 1763
„ rivulata Forskal 1775, 1776 = Holocnemus pluchii (Scopoli) 1763
„ roberti Scopoli 1763 = nicht zu deuten!
„ roeselii Scopoli 1763 = Agelena labyrinthica (Clerck) 1757
„ rolandri Scopoli 1763 = nicht zu deuten!
„ rosea Olivier 1789 = Micromata roseum (Clerck) 1757
„ rotundata Walckenaer 1802 = Synema globosum (Fabricius) 1775
„ rubricata Schrank 1803 = Theridion redimitum (Clerck) 1757
„ rufa De Geer 1778, Olivier 1789 = nicht zu deuten!
„ rufipalpis fuscinotum Strand 1908 = Araneus fuscinotum (Strand) 1908
„ rufipalpis madagascarica Strand 1908 = Araneus madagascaricus (Strand) 1908
„ rufipalpis nigrodecorata Strand 1908 = Araneus nigrodecoratus (Strand) 1908
„ rufipalpis punctipedella Strand 1908 = Araneus punctipedellus (Strand) 1908
„ rufipalpis strigatella Strand 1908 = Araneus strigatellus (Strand) 1908
„ rufipes Linné 1758, Olivier 1789 = Gongylidium rufipes (Linné) 1758
„ rufipes F. Cambridge 1904 = Araneus cambridgei (Roewer) 1942

Aranea (Forts.):

„ rufofasciata De Geer 1783 = Pisaura mirabilis (Clerck) 1757
„ rumpfii Scopoli 1763 = Marpissa muscosa (Clerck) 1757
„ rupestris Linné 1758, Schrank 1781, Olivier 1789 = nicht zu deuten!
„ ruricola De Geer 1778, Olivier 1789 = Trochosa ruricola (De Geer) 1778
„ saccata Linné 1758, Olivier 1789 = ? Pardosa amentata (Clerck) 1757
„ saccata Fabricius 1775, 1781 = Pardosa groenlandica (Thorell) 1872
„ saccata Razoumowsky 1789 = nicht zu deuten!
„ sagana Bösenberg & Strand 1908 = Araneus astridae (Strand) 1916
„ sanguinolenta Linné 1758, Olivier 1789, Petagna 1792 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
„ sauvagesi Latreille 1798 = Nemesia caementaria (Latreille) 1798
„ sauvagesii Dorthes 1799 = Nemesia caementaria (Latreille) 1798
„ scalaris Panzer 1793 = Aranea raji betulae Sulzer 1776, jetzt Araneus marmoreus pyramidatus Clerck 1757
„ scenica Linné 1758, Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = Salticus scenicus (Clerck) 1757
„ schaefferi Scopoli 1763 = Dolomedes fimbriatus (Clerck) 1757
„ scopulorum Fabricius 1779, 1781, Olivier 1789 = Segestria senoculata (Linné) 1758
„ scopulorum Schrank 1803 = Theridion notatum (Linné) 1758, jetzt: Theridion sisyphium (Clerck) 1757
„ scorpiformis Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = Misumena vatia (Clerck) 1757
„ scylla Bösenberg & Strand 1906 = Araneus theis (Walckenaer) 1841
„ scylloides Bösenberg & Strand 1906 = Araneus theis (Walckenaer) 1841
„ sebae Walckenaer 1802 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
„ sector Forskal 1776 = Argyope sector (Forskal) 1776
„ secunda Herrich-Schäffer 1804 = Tetragnatha extensa (Linné) 1758
„ segmentata Olivier 1789 = Meta reticulata (Linné) 1758, jetzt: Meta segmentata (Clerck) 1757
„ senoculata Linné 1758, De Geer 1778 = Segestria senoculata (Linné) 1758
„ senoculata Fabricius 1793, 1781 = Aranea cucurbitina Linné 1758, jetzt: Araneus cucurbitinus Clerck 1757
„ senoculata Fabricius 1793, 1781 = Aranea cucurbitina (Linné) 1758, jetzt: Araneus cucurbitinus (Clerck) 1757
„ sericea Olivier 1789 = Argyope lobata (Pallas) 1772
„ serratipes Schrank 1803 = Asagena phalerata (Panzer) 1801
„ sexcuspidata Fabricius 1793 = Caerostris sexcuspidata (Fabricius) 1793
„ sia Bösenberg & Strand 1906 = Zygiella sia (Bösenberg & Strand) 1906
„ signata Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = nicht zu deuten!
„ signata Walckenaer 1802 = Asagena phalerata (Panzer) 1801
„ simoniana Costa 1885 = Singa simoniana (Costa) 1885
„ singoriensis Laxmann 1770 = Allohogna singoriensis (Laxmann) 1770
„ sinistra F. Cambridge 1904 = Araneus sinistrellus (Roewer) 1942
„ sisysha Walckenaer 1802, 1841 = Theridion lunatum (Clerck) 1757
„ sloanii Scopoli 1763, Rossi 1790 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
„ smaragdula Fabricus 1793 = Micromata roseum (Clerck) 1757
„ solandri Scopoli 1763 = Tetragnatha extensa (Linné) 1758
„ speciosa Pallas 1773 = Argyope brünnichii (Scopoli) 1763
„ speciosa Meyer 1790 = nicht zu deuten!
„ spinicrus Dufour 1831 = nicht zu deuten!
„ spinimobilis Linné 1758, Olivier 1789 = nicht zu deuten!
„ spinosa Linné 1758, Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = Micrathena spinosa (Linné) 1758
„ striata Olivier 1789 = nicht zu deuten!
„ striata Strand 1908, Tullgren 1910 = Pararaneus striatellus Roewer 1942
„ subfusca Lebert 1877 = Araneus dalmaticus (Doleschall) 1852
„ subpilosa Panzer 1804 = Tegenaria ferruginea (Panzer) 1804

Aranea (Forts.):

„ subterranea Roemer 1789 = Atypus piceus (Sulzer) 1776
„ subterranea Latreille 1804 = Atypus affinis (Sulzer) 1776
„ sulphurea Olivier 1789 = nicht zu deuten!
„ swammerdamii Scopoli 1763 = Aranea sexpunctata Linné 1758, jetzt: Araneus umbraticus Clerck 1757
„ tarantula Linné 1758, Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = nicht zu deuten!
„ tarantula Rossi 1790, Petagna 1792 = Lycosa tarentula (Latreille) 1806
„ tardigrada Walckenaer 1802 = Marpissa muscosa (Clerck) 1757
„ tarentula Pallas 1771 = Allohogna singoriensis (Laxmann) 1770
„ taurus Fabricius 1793 = Micrathena armata (Olivier) 1789
„ terebrata Olivier 1789 = Sitticus terebratus (Clerck) 1757
„ terrestris Wider 1834 = Coelotes terrestris (Wider) 1834
„ testacea Panzer 1804 = Thanatus formicinus (Clerck) 1757
„ tetracantha Linné 1758, Pallas 1772, Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = Gasteracantha tetracantha (Linné) 1758
„ theisii Tullgren 1910, Roewer 1938 = Araneus theis (Walckenaer) 1841
„ theridiformis Bösenberg & Strand 1906 = Singa theridiformis (Bösenberg & Strand) 1906
„ thoracica Latreille 1804 = Scytodes thoracica (Latreille) 1804
„ tigrina De Geer 1778 = Philodromus margaritatus (Clerck) 1757
„ tigrina Walckenaer 1802, 1805 = Philodromus poecilus (Thorell) 1872
„ tincta Walckenaer 1802 = Theridion tinctum (Walckenaer) 1802
„ tredecimguttata Rossi 1790 = Latrodectus tredecimguttatus (Rossi) 1790
„ triangularis Walckenaer 1802 = Linyphia triangularis (Walckenaer) 1802, jetzt: Linyphia marginata (C. L. Koch) 1834
„ triangularispinosa De Geer 1778 = Micrathena spinosa (Linné) 1758
„ triangulosa Walckenaer 1802 = Teutana triangulosa (Walckenaer) 1802
„ tribulus Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = Pycnacantha tribulus (Fabricius) 1775
„ tricuspidata Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = Misumenops tricuspidatus (Fabricius) 1775
„ trifasciata Forskal 1775, 1776 = Argyope trifasciata (Forskal) 1775
„ triguttata Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = nicht zu deuten!
„ trilineata Linné 1758, Olivier 1789 = Stemonyphantes lineatus (Linné) 1758
„ tripunctata Walckenaer 1802 = Pellenes tripunctatus (Walckenaer) 1802
„ triquetra Sulzer 1776 = Cyclosa conica (Pallas) 1772
„ tristis Meyer 1790 = nicht zu deuten!
„ truncata Pallas 1772, Walckenaer 1802 = Pistius truncatus (Pallas) 1772
„ truncorum Linné 1758, Olivier 1789 = Sitticus truncorum (Linné) 1758
„ truncorum Schrank 1781 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
„ tuberculata De Geer 1778, Olivier 1789 = Ero tuberculata (De Geer) 1778
„ tubulosa Walckenaer 1802 = Singa hamata (Clerck) 1757
„ uddmanni Scopoli 1763 = Misumena vatia (Clerck) 1757
„ umbratica Villers 1789, Reimoser 1929 = Aranea sexpunctata Linné 1758, jetzt: Araneus umbraticus Clerck 1757
„ umbratica Olivier 1789 = Aranea foliata Fourcroy 1785, jetzt: Araneus cornutus Clerck 1757
„ umbraticola Latreille 1804 = Aranea sexpunctata Linné 1758, jetzt: Araneus umbraticus Clerck 1757
„ undata De Geer 1778 = Marpissa undata (De Geer) 1778
„ undata Olivier 1789, Wiehle 1931, Reimoser 1932 = Aranea ovigera Panzer 1804, jetzt: Araneus sericatus Clerck 1757
„ urinatoria Poda 1761 = Argyroneta aquatica (Clerck) 1757
„ urticae Walckenaer 1802, 1805 = Theridion lunatum (Clerck) 1757
„ varia Olivier 1789 = nicht zu deuten!
„ variegata Olivier 1789 = nicht zu deuten!
„ velox Walckenaer 1802 = Arctosa perita (Latreille) 1799

Aranea (Forts.):
- „ venatoria Linné 1767, Fabricius 1775, 1781, Olivier 1789 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
- „ venusta Walckenaer 1802 = Theridion redimitum (Clerck) 1757
- „ vestiaria De Geer 1783 = Avicularia avicularia (Linné) 1758
- „ viatica Linné 1758, Fabricius 1781, Olivier 1789 = Xysticus cristatus (Clerck) 1757
- „ viatica Fourcroy 1785 = Misumenops tricuspidatus (Fabricius) 1775
- „ virescens Linné 1758, Müller 1776 = Dolomedes fimbriatus (Clerck) 1757
- „ virescens Schrank 1781 = Micromata roseum (Clerck) 1757
- „ virescens Olivier 1789 = nicht zu deuten!
- „ virginea Müller 1776 = Misumena vatia (Clerck) 1757
- „ viridipunctata De Geer 1778 = Aranea cucurbitina Linné 1758, jetzt: Araneus cucurbitinus Clerck 1757
- „ viridissima De Geer 1778 = Micromata roseum (Clerck) 1757
- „ viridissima Walckenaer 1802 = Dictyna walckenaeri (Roewer) 1951
- „ vittata Fourcroy 1785 = Theridion redimitum (Clerck) 1757
- „ vorax Walckenaer 1802, 1805 = Alopecosa trabalis (Clerck) 1757
- „ webensis Strand 1908 = Araneus strupifer (Simon) 1885
- „ wilkii Scopoli 1763, Schrank 1781 = Philodromus margaritatus (Clerck) 1757
- „ zebra Sulzer 1776 = Argyope brünnichii (Scopoli) 1763

Araneus:

Alle hier nicht genannten Arten mußten noch 1942 (im 1. Bd.) unter A r a n e a Linné 1758 aufgeführt werden (vergl. Vorwort zu Bd. 1 und Bd. 2), haben jetzt aber den Genus-Namen A r a n e u s Clerck 1757 zu führen.

- „ abbreviatus Petrunkevitch 1911 = Singa abbreviata Keyserling 1879
- „ abdominalis Petrunkevitch 1911 = Wixia abdominalis Cambridge 1882
- „ aculeatus Clerck 1757 = Alopecosa aculeata (Clerck) 1757
- „ aculeatus Petrunkevitch 1911 = Araneus carbonarioides (Keyserling) 1892
- „ aequiangulus Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
- „ affinis Petrunkevitch 1911 = Araneus affinitata (Roewer) 1942
- „ agriliformis Simon 1895 = nicht zu deuten!
- „ albostriatus Tullgren 1905, Petrunkevitch 1911 = Parapeira albostriata (Keyserling) 1865
- „ albovittatus Lessert 1910, Simon 1914 = Singa albovittata Westring 1851
- „ alticeps Petrunkevitch 1911 = Verrucosa alticeps (Keyserling) 1879
- „ amentatus Clerck 1757 = Pardosa amentata (Clerck) 1757
- „ angulatus Clerck 1757 = Aranea angulata Linné 1758, jetzt: Araneus angulatus Clerck 1757
- „ anunciatus Franganillo 1931, 1934 = nicht zu deuten!
- „ appendiculatus Petrunkevitch 1911 = nicht zu deuten!
- „ aquaticus Clerck 1757 = Argyroneta aquatica (Clerck) 1757
- „ arcuatus Clerck 1757 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
- „ arenatus Petrunkevitch 1911 = Verrucosa arenata (Walckenaer) 1841
- „ armatus Petrunkevitch 1911 = Parawixia armata (Cambridge) 1889
- „ atricus Lessert 1910 = Zygiella calophylla (Walckenaer) 1802
- „ attestor Petrunkevitch 1911 = Araneus alboventris (Emerton) 1884
- „ audax Petrunkevitch 1911, Mello-Leitao 1932 = Verrucosa audax (Blackwall) 1863
- „ aureolus Clerck 1757 = Philodromus aureolus (Clerck) 1757
- „ aureolus Petrunkevitch 1911 = Zygiella aureola (Keyserling) 1884
- „ babel Clerck 1757 = Aranea raji (Scopoli) 1763, jetzt: Araneus marmoreus (Clerck) 1757
- „ bacillifer Simon 1896, Petrunkevitch 1911 = Wixia bacillifera (Simon) 1895
- „ balaustinus Petrunkevitch 1911 = Eriophora circulata (Walckenaer) 1841
- „ beccarii Butler 1933 = Cyrtophora beccarii (Thorell) 1878
- „ bertkaui Saito 1933 = Araneus maculatipes (L. Koch) 1871
- „ bicolor Petrunkevitch 1911 = Araneus bicolorata (Roewer) 1942

Araneus (Forts.):
„ bipunctatus Franganillo 1931, 1934 = nicht zu deuten!
„ bistriatus Petrunkevitch 1911 = Eriophora bistriata (Rengger) 1836
„ bituberosus Petrunkevitch 1911 = Wixia bituberosa (Cambridge) 1889
„ bivariolatus Petrunkevitch 1911 = Eriophora edax (Blackwall) 1863
„ bösenbergi Petrunkevitch 1911 = Zygiella bösenbergi (Keyserling) 1878
„ bradleyi Butler 1933 = Cyrtophora beaccarii (Thorell) 1878
„ bucculentus Clerck 1757 = Floronia frontata (Wider) 1834, jetzt: Floronia bucculenta (Clerck) 1757
„ cacozelus Petrunkevitch 1911 = Wagneriana carinata (F. Cambridge) 1904
„ californicus Petrunkevitch 1911 = Zygiella californica (Banks) 1896
„ callidus Petrunkevitch 1911 = Araneus callidulus (Roewer) 1942
„ carinatus Petrunkevitch 1911 = Araneus carenatus (Nicolet) 1849
„ castaneus Clerck 1757 = Teutana castanea (Clerck) 1757
„ cellulanus Clerck 1757 = Nesticus cellulanus (Clerck) 1757
„ chilapae Chamberlin & Ivie 1936 = Metepeira chilapae (Chamberlin & Ivie) 1936
„ cicatrosa Pocock 1900 = Cyrtophora cicatrosa (Stoliczka) 1869
„ citricola Pocock 1900 = Cyrtophora citricola (Forskal) 1775
„ citrinus Petrunkevitch 1911 = Araneus citrinella (Roewer) 1942
„ conicus Petrunkevitch 1911 = Araneus coniformis (Roewer) 1942
„ cornutus Clerck 1757, Fage 1921, Simon 1929 = Aranea foliata Fourcroy 1785, jetzt: Araneus cornutus Clerck 1757
„ corticalis Simon 1929 = Araneus corticaloides Roewer 1942
„ cribratus Simon 1895 = Cercidia punctigera (Simon) 1889
„ cristatus Clerck 1757, Charitonow 1925 = Xysticus cristatus (Clerck) 1757
„ cruciatus Petrunkevitch 1911 = Araneus crux (Roewer) 1942
„ cruciferus Petrunkevitch 1911 = Araneus keyserlingi (Roewer) 1942
„ cucurbitinus Clerck 1757 et sequ. = Aranea cucurbitina Linné 1758, jetzt: Araneus cucurbitinus Clerck 1757
„ cucurbitinus Petrunkevitch 1911 — Araneus displicatus (Hentz) 1847
„ cuneatus Clerck 1757 = Alopecosa cuneata (Clerck) 1757
„ cyaneus (err. pro cayanus) Petrunkevitch 1911 = nicht zu deuten!
„ cylindricus Petrunkevitch 1911 = Araneus cylindriformis (Roewer) 1942
„ dalmaticus Lessert 1910, Simon 1929 = Araneus subfuscus (C. L. Koch) 1837
„ decoloratus Petrunkevitch 1911 = Zygiella decolorata (Keyserling) 1893
„ decorus Simon 1929 = Singa decora (Simon) 1891
„ depressus Simon 1895, Petrunkevitch 1911 = Araneus depressatus (Roewer) 1942
„ depressus Rainbow 1898 = Araneus depressatulus (Roewer) 1942
„ destrictoides Petrunkevitch 1911 = Parawixia destrictoides (Strand) 1908
„ destrictus Petrunkevitch 1911 = Parawixia destricta (Cambridge) 1889
„ diadelus Petrunkevitch 1911 = Nephilengys cruentata (Fabricius) 1775
„ diadematus Clerck 1757 = Aranea diadema Linné 1758, jetzt: Araneus diadematus Clerck 1757
„ diodius Lessert 1910 = Zilla diodia (Walckenaer) 1802
„ domesticus Clerck 1757 part. = Tegenaria ferruginea (Panzer) 1804
„ domesticus Clerck 1757 part. = Tegenaria domestica (Clerck) 1757
„ dorsalis Petrunkevitch 1911 = Araneus dorsatulus (Roewer) 1942
„ dromedarius Simon 1929 = Araneus bituberculatus (Walckenaer) 1802
„ dufouri Simon 1929 = Larinia dufouri Simon 1874
„ duodecimguttatus Petrunkevitch 1911 = Singa duodecimguttata Keyserling 1878
„ ectypus Petrunkevitch 1911 = Wixia ectypa (Walckenaer) 1841
„ edax Petrunkevitch 1911 = Eriophora edeax (Blackwall) 1863
„ elegans Petrunkevitch 1911 = Araneus elegantulus (Roewer) 1942
„ eresifrons Pocock 1898 = Araneus strupifera (Simon) 1885
„ erraticus Petrunkevitch 1911 = Araneus errans (Roewer) 1942

Araneus (Forts.):

„ erythrothorax Petrunkevitch 1911 = Singa erythrothorax (Taczanowski) 1873
„ exanthematicus Pocock 1900 = Cyrtophora exanthematica (Doleschall) 1859
„ excavatus Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
„ fabrilis Clerck 1757 = Alopecosa fabrilis (Clerck) 1757
„ falcatus Clerck 1757 = Evarcha flammata (Clerck) 1757
„ fascinatrix Petrunkevitch 1911 = nicht zu deuten!
„ feae Pocock 1900 = Cyrtophora feae (Thorell) 1887
„ fimbriatus Clerck 1757 = Dolomedes fimbriatus (Clerck) 1757
„ fistulosus Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
„ flammatus Clerck 1757 = Evarcha flammata (Clerck) 1757
„ flavopunctatum Merian 1911 = Araneus flavosignatus (Roewer) 1942
„ flavus Petrunkevitch 1911 = Singa flava Cambridge 1894
„ floridanus Petrunkevitch 1911 = Singa floridana Banks 1896
„ folium Lessert 1910 = Aranea foliata Fourcroy 1785, jetzt: Araneus cornutus Clerck 1757
„ formicinus Clerck 1757 = Thanatus formicinus (Clerck) 1757
„ formosus Clerck 1757 = Theridion lunatum (Clerck) 1757
„ formosus Dyal 1935 = Araneus formosella (Roewer) 1942
„ fumigatus Clerck 1757 = Pardosa amentata (Clerck) 1757
„ funebris Petrunkevitch 1911 = Cercidia funebris Keyserling 1892
„ gemellus Petrunkevitch 1911 = Zygiella guttata (Keyserling) 1880
„ geniculatus Petrunkevitch 1911 = Nephila inaurata (Walckenaer) 1841
„ gibbifer Petrunkevitch 1911 = Wixia gibbifera (Cambridge) 1894
„ globosus Petrunkevitch 1911 = Wixia globosa F. Cambridge 1904
„ gracilipes Petrunkevitch 1911 = nicht zu deuten!
„ gracilis Petrunkevitch 1911 = Araneus gracilentus (Roewer) 1942
„ gregalis Petrunkevitch 1911 = Metazygia gregalis (Cambridge) 1889
„ griseus Petrunkevitch 1911 = Acanthepeira grisea (McCook) 1893
„ groenlandicus Petrunkevitch 1911 = Singa groenlandica (Simon) 1889
„ guatemalensis Petrunkevitch 1911 = Parawixia guatemalensis (Cambridge) 1889
„ guyanensis Petrunkevitch 1911 = Zygiella guyanensis (Keyserling) 1880
„ haematocnemis Pocock 1899 = Araneus sanguinipes (Thorell) 1899
„ hamatus Clerck 1757, Lessert 1910, Simon 1929 = Singa hamata (Clerck) 1757
„ hastatus Clerck 1757 = Dendryphantes hastatus (Clerck) 1757
„ heerii Simon 1929 = Singa heerii (Hahn) 1831
„ hentzi Petrunkevitch 1911 = Singa hentzi (Banks) 1907
„ heri Lessert 1910 = Singa heerii (Hahn) 1831
„ hirtipes Petrunkevitch 1911 = Araneus hirtipedatus (Roewer) 1942
„ hodiernus Petrunkevitch 1911 = Parawixia hamata F. Cambridge 1904
„ honestus Petrunkevitch 1911 = Parawixia honesta (Cambridge) 1899
„ horozontinus Mello-Leitao 1917 = Eriophora bistriata (Rengger) 1836
„ hoxaeus Petrunkevitch 1911 = Parawixia hoxaea (Cambridge) 1889
„ hypocritus Petrunkevitch 1911 = Parawixia hypocrita (Cambridge) 1889
„ incrassatus Petrunkevitch 1911 = Metepeira incrassata F. Cambridge 1903
„ inquilinus Clerck 1757 = Alopecosa inquilina (Clerck) 1757
„ janeirus Petrunkevitch 1911 = Nephila clavipes vespucea (Walckenaer) 1841
„ karkii Tullgren 1901 = Metepeira labyrinthea (Hentz) 1847
„ labyrintheus Simon 1904, 1905, Petrunkevitch 1911 = Metepeira labyrinthea (Hentz) 1847
„ lawrencei Lessert 1930 = Singa lawrencei (Lessert) 1930
„ leucogrammus Petrunkevitch 1911 = Singa leucogramma (White) 1841
„ leucoplagiatus Simon 1899 = Singa leucoplagiata (Simon) 1899
„ lignarius Clerck 1757 = Acantholycosa lignaria (Clerck) 1757
„ liliputanus Petrunkevitch 1911 = nicht zu deuten!
„ lineatus Clerck 1757 = Theridion redimitum (Clerck) 1757
„ lineatus Simon 1929 = Larinia lineata (Lucas) 1848
„ lineatus Franganillo 1934 = nicht zu deuten!

Araneus (Forts.):

„ litera v-insignitus Clerck 1757 = Aelurillus litera v-insignitus (Clerck) 1757
„ litera v-notatus Clerck 1757 = Aelurillus litera v-insignitus (Clerck) 1757
„ litera x-notatus Clerck 1757 = Zygiella litera x-notata (Clerck) 1757
„ longicauda Petrunkevitch 1911 = Singa longicauda Taczanowski 1878
„ lucinus Simon 1929 = Singa lucina (Audouin) 1827
„ lugubris Simon 1895 = Araneus punctiger (Doleschall) 1857
„ lunatus Clerck 1757 = Theridion lunatum (Clerck) 1757
„ lunulus Petrunkevitch 1911 = nicht zu deuten!
„ maculatus Petrunkevitch 1911 = Singa maculata (Emerton) 1884
„ mangarevus Pocock 1897 = Araneus theis (Walckenaer) 1841
„ margaritatus Clerck 1757 = Philodromus margaritatus (Clerck) 1757
„ marmoreus Clerck 1757 = Aranea raji Scopoli 1763, jetzt: Araneus marmoreus Clerck 1757
„ maurus Petrunkevitch 1911 = Singa maura (Hentz) 1847
„ melanocephalus Simon 1897 = Zygiella melanocephala (Taczanowski) 1874
„ melanocranius Simon 1909, Dyal 1935 = Zygiella melanocrania (Thorell) 1887
„ meridionalis Petrunkevitch 1911 = Verrucosa meridionalis (Keyserling) 1892
„ metuens Petrunkevitch 1911 = Singa moesta Banks 1896
„ mexicanus Simon 1895, Petrunkevitch 1911 = Verrucosa mexicana (Lucas) 1833
„ minax Petrunkevitch 1911 = Eriophora minax (Chambridge) 1893
„ minutus Petrunkevitch 1911 = Araneus minutellus (Roewer) 1942
„ mirabilis Clerck 1757 = Pisaura mirabilis (Clerck) 1757
„ modestus Petrunkevitch 1911 = Singa modesta Banks 1896
„ moestus Petrunkevitch 1911 = Acanthepeira moestella Roewer 1942
„ mollybyrnae Petrunkevitch 1911 = Singa mollybyrnae Mc Cook 1893
„ moluccensis Pocock 1897, 1900 = Cyrtophora moluccensis (Doleschall) 1857
„ mongolicus Simon 1895, Ermolajew 1937 = Araneus tartaricus (Kroneberg) 1875
„ montanus Clerck 1757 = Linyphia resupina-domestica (De Geer) 1778, jetzt: Linyphia montana (Clerck) 1757
„ montanus Lessert 1910 = Zygiella montana (C. L. Koch) 1839
„ monticola Clerck 1757 = Pardosa monticola (Clerck) 1757
„ monticola Petrunkevitch 1911 = Aranea monticola (Keyserling) 1892, jetzt: Araneus montis **nom. nov.**
„ multiplicatus Rosca 1935, 1936 = Araneus ixobolus (Thorell) 1873
„ mundus Petrunkevitch 1911 = Araneus mundatulus (Roewer) 1942
„ muscosus Clerck 1757 = Marpissa muscosa (Clerck) 1757
„ myrrheus Simon 1895 = Singa myrrhea (Simon) 1895
„ nawazi Dyal 1935 = Zygiella nawazi (Dyal) 1935
„ nephiloides Petrunkevitch 1911 = Eriophora nephiloides (Cambridge) 1889
„ niger Lister 1778 = nicht zu deuten!
„ nigripes Petrunkevitch 1911 = Singa nigripes (Keyserling) 1884
„ nigropunctatus Petrunkevitch 1911 = Araneus nigropunctatulus (Roewer) 1942
„ nitidulus Lessert 1910 = Singa nitidula C. L. Koch 1846
„ nivalis Clerck 1757 = Alopecosa inquilina (Clerck) 1757
„ ocellatus Clerck 1757, Simon 1929 = Aranea dumetorum Fourcroy 1785, jetzt: Araneus ocellatus Clerck 1757
„ ocellatus Petrunkevitch 1911 = Araneus ocellatulus Roewer 1942
„ ornatus Simon 1929 = Araneus canestrinii (Thorell) 1873
„ ovatus Clerck 1757 = Theridion redimitum (Clerck) 1757
„ pallidulus Clerck 1757 = Clubiona pallidula (Clerck) 1757
„ pallidulus Petrunkevitch 1911 = Araneus pallidula (Keyserling) 1863
„ paludicola Clerck 1757 = Pardosa paludicola (Clerck) 1757
„ patagiatus Clerck 1757 = Aranea dumetorum Fourcroy 1785, jetzt: Araneus ocellatus Clerck 1757
„ peleg Clerck 1757 = Aranea diadema Linné 1758, jetzt Araneus diadematus Clerck 1757

Araneus (Forts.):

„ pentacantha Simon 1895 = Actinosoma pentacantha (Walckenaer) 1841
„ piraticus Clerck 1757 = Pirata piraticus (Clerck) 1757
„ piscatorius Clerck 1757 = Pirata piscatorius (Clerck) 1757
„ plantarius Clerck 1757 = Dolomedes fimbriatus (Clerck) 1757
„ porraceus Petrunkevitch 1911 = Cyrtophora porracea (C. L. Koch) 1839
„ praticola Petrunkevitch 1911 = Singa pratensis Emerton 1884
„ prominens Bryant 1908, Lessert 1910, Simon 1929 = Cercidia prominens (Westring) 1851
„ pullatus Clerck 1757 = Pardosa pullata (Clerck) 1757
„ pulverulentus Clerck 1757 = Alopecosa carinata (Clerck) 1757
„ punctatus Petrunkevitch 1911 = Zygiella punctata (Keyserling) 1893
„ purpurascens Petrunkevitch 1911 = Metazygia purpurascens (Cambridge) 1889
„ pygmaeus Lessert 1910, Simon 1929 = Singa pygmaea (Sundevall) 1831
„ pyramidatus Clerck 1757, Lessert 1910, Simon 1929 = Aranea raji betulae Sulzer 1776, jetzt: Araneus marmoreus pyramidatus Clerck 1757
„ quadratus Clerck 1757, Getaz 1889, Lessert 1910, Petrunkevitch 1911, Simon 1929 = Aranea reaumurii Scopoli 1763, jetzt: Araneus quadratus Clerck 1757
„ quadrimaculatus Petrunkevitch 1911 = Araneus quadrimaculosus (Roewer) 1942
„ quadripunctatus Petrunkevitch 1911 = Araneus quadripunctatula (Roewer) 1942
„ rapax Petrunkevitch 1911 = Araneus rapaxata (Roewer) 1942
„ ravillus Petrunkevitch 1911 = Eriophora ravilla (C. L. Koch) 1845
„ redimitus Clerck 1757 = Theridion redimitum (Clerck) 1757
„ rigidus Petrunkevitch 1911 = Parawixia rigidus (Cambridge) 1889
„ rimosus Petrunkevitch 1911 = Parawixia rimosa (Keyserling) 1892
„ rogenhoferi Petrunkevitch 1911 = Zygiella rogenhoferi (Keyserling) 1877
„ roseus Clerck 1757 = Micromata roseum (Clerck) 1757
„ rufipes Petrunkevitch 1911 = Araneus cambridgei (Roewer) 1942
„ rufulus Simon 1929 = Singa aussereri Thorell 1873
„ rufus Petrunkevitch 1911 = Wixia rufa (Cambridge) 1889
„ rumpfi Simon 1899, Pocock 1900, Sherriffs 1934 = Araneus rufofemoratus (Simon) 1884
„ saga Petrunkevitch 1911 = Eustala saga (Keyserling) 1893
„ sagana Petrunkevitch 1911 = Eustala sagana (Keyserling) 1893
„ sanguineus Lessert 1910 = Singa aussereri Thorell 1873
„ sanguineus Simon 1929 = Singa sanguinea C. L. Koch 1843
„ sanguinosus Petrunkevitch 1911 = Eustala sanguinosa (Keyserling) 1893
„ scenicus Clerck 1757 = Salticus scenicus (Clerck) 1757
„ schefferi Petrunkevitch 1911 = Singa singaeformis (Scheffer) 1904
„ sclopetarius Clerck 1757, Lessert 1910 = Aranea ovigera Panzer 1804, jetzt: Araneus sericatus Clerck 1757
„ scylloides Saito 1939 = Araneus theis (Walckenaer) 1841
„ scyllius Saito 1939 = Araneus theis (Walckenaer) 1841
„ segmentatus Clerck 1757 = Meta reticulata (Linné) 1758, jetzt: Meta segmentata (Clerck) 1757
„ segmentatus Petrunkevitch 1911 = Araneus segmentatulus (Roewer) 1942
„ sericatus Clerck 1757, Petrunkevitch 1911, Simon 1929 = Aranea ovigera Panzer 1804, jetzt: Araneus sericatus Clerck 1757
„ siculus Petrunkevitch 1911 = Wixia sicula F. Cambridge 1904
„ similis Mosek 1905 = Araneus kariae (Strand) 1919
„ similis Petrunkevitch 1911 = Araneus similella (Roewer) 1942
„ singaeformis Scheffer 1904, Petrunkevitch 1911 = Singa singaeformis (Scheffer) 1904
„ singularis Rainbow 1899 = Araneus separatus (Roewer) 1942
„ sinister Petrunkevitch 1911 = Araneus sinistrellus (Roewer) 1942
„ sisyphius Clerck 1757 = Theridion notatum (Linné) 1758, jetzt: Theridion sisyphium (Clerck) 1757

Araneus (Forts.):

„ socialis Burmeister 1872, Simon 1895 = Araneus sermoniferus (Mello-Leitao) 1932
„ solitudinis Petrunkevitch 1911 = Metepeira labyrinthea (Hentz) 1847
„ soronis Simon 1899 = Araneus enucleatus (Karsch) 1879
„ spicatus Petrunkevitch 1911 = Wagneriana spicata (Cambridge) 1889
„ spinipes Petrunkevitch 1911 = Metepeira spinipes F. Cambridge 1903
„ stellatus Simon 1895 = Acanthepeira stellata (Walckenaer) 1805
„ striatus (Clerck) 1757 = nicht zu deuten! (Salticidae?)
„ striatus Lessert 1930, Lawrence 1936 = Pararaneus striatellus Roewer 1942
„ stroemi Lessert 1910 = Zygiella x-notata (Thorell) 1856
„ submucronatus Simon 1901, 1909 = Araneus dehaanii (Doleschall) 1859
„ subrufus Petrunkevitch 1911 = Wixia subrufa F. Cambridge 1904
„ taquara Petrunkevitch 1911 = Eustala taquara (Keyserling) 1892
„ tauricornis Petrunkevitch 1911 = Wagneriana tauricornis (Cambridge) 1889
„ terebratus Clerck 1757 = Sitticus terebratus (Clerck) 1757
„ theisi Simon 1897 = Araneus oaxacensis (Keyserling) 1863
„ theisi Saito 1939 = Araneus theis (Walckenaer) 1841
„ theisii Tullgren 1910, Merian 1911 = Araneus theis (Walckenaer) 1841
„ thorellii Lessert 1910 = Zygiella thorellii (Ausserer) 1871
„ trabalis Clerck 1757 = Alopecosa trabalis (Clerck) 1757
„ tredecimnotatus Petrunkevitch 1911 = Parawixia tredecimnotata F. Cambridge 1904
„ triangularis Clerck 1757 ♂ = Linyphia triangularis (Clerck) 1757
„ triangularis Clerck 1757 ♀ = Linyphia montana (Linné) 1758, jetzt: Linyphia marginata (C. L. Koch) 1834
„ trilineatus Petrunkevitch 1911 = Araneus trisignatus (Roewer) 1942
„ tristis Petrunkevitch 1911 = Eustala tristis (Blackwall) 1862
„ truncatus Simon 1895 = Edricus truncatus (Keyserling) 1865
„ tumidus Petrunkevitch 1911 = Wixia tumida (Keyserling) 1865
„ turrigerus Petrunkevitch 1911 = Wixia turrigera (Cambridge) 1898
„ tusus Petrunkevitch 1911 = Singa truncata Banks 1901
„ ulecebrosus Petrunkevitch 1911 = Eustala ulecebrosa (Keyserling) 1892
„ umbraticus Clerck 1757, Lessert 1910, Simon 1929 = Aranea sexpunctata Linné 1758, jetzt: Araneus umbraticus Clerck 1757
„ uncatus Petrunkevitch 1911 = Metepeira uncata F. Cambridge 1903
„ undatus Clerck 1757 = Dolomedes fimbriatus (Clerck) 1757
„ undecimtuberculatus Petrunkevitch 1911 = Wagneriana undecimtuberculata (Keyserling) 1865
„ unicolor Pocock 1900 = Cyrtophora unicolor (Doleschall) 1857
„ van bruysseli Petrunkevitch 1911 = Singa bruysseli Becker 1879
„ varians Petrunkevitch 1911 = Singa variabilis Emerton 1884
„ variolatus Petrunkevitch 1911 = Eriophora edax (Blackwall) 1863
„ vatius Clerck 1757 = Misumena vatia (Clerck) 1757
„ vaulogeri Simon 1909 = Singa vaulogeri (Simon) 1909
„ venustulus Petrunkevitch 1911 = Araneus venustulus (Keyserling) 1879
„ venustulus Dalmas 1917 = Araneus viriditas (Urquhart) 1886
„ venustus Petrunkevitch 1911 = Acanthepeira venusta (Banks) 1896
„ versicolor Petrunkevitch 1911 = Cercidia versicolor Keyserling 1877
„ verutus Bryant 1935 = Aranea viriditas (Urquhart) 1886
„ virescens Clerck 1757 = Micromata roseum (Clerck) 1757
„ virgatus Clerck 1757 = Araneus angulata (Clerck) 1757
„ vittatus Petrunkevitch 1911 = Singa vittata Taczanowski 1872
„ webensis Strand 1908 = Araneus strupifer (Simon) 1885
„ wittfeldae Petrunkevitch 1911 = Metazygia wittfeldae (Mc Cook) 1893
„ x-notatus Clerck 1757 = Zygiella litterata (Olivier) 1789, jetzt: Zygiella x-notata (Clerck) 1757

Architis:

„ nitidoplumosa Simon 1898 = Architis nitidopilosa Simon 1898

Archizelotes:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Zelotes**
Arcidius:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Gnolus**
Arctella:
„ lapponica Holm 1945 = Tricholathys lapponicus (Holm) 1945
Arctosa:
„ absoluta Gertsch 1934 = Allocosa floridiana (Banks) 1896
„ aequioculata Caporiacco 1940 = Megarctosa aequioculata (Strand) 1906
„ agilis Banks 1892 = Hogna montana (Emerton) 1885
„ allodroma Simon 1864 = Arctosa cinerea (Fabricius) 1776
„ altamontis Chamberlin 1916 = Avicosa altamontis (Chamberlin) 1916
„ ambigua Denis 1947 = Orthocosa ambigua (Denis) 1947
„ amylaceoides Schenkel 1936 = Arkalosula amylaceoides (Schenkel) 1936
„ animosa Simon 1864 = Anahita animosa (Walckenaer) 1837
„ apora Gertsch 1934 = Allocosa apora (Gertsch) 1934
„ argentata Denis 1947 = Megarctosa argentata (Denis) 1947
„ cervina Schenkel 1936 = Avicosa cervina (Schenkel) 1936
„ chamberlini Gertsch 1934 = Allocosa chamberlini (Gertsch) 1934
„ cheluncata Petrunkevitch 1925 = Arkalosula cheluncata (Petrunkevitch) 1925
„ cingara C. L. Koch 1848 = Lycosa cingara (C. L. Koch) 1848
„ elegans Stone 1890, Montgomery 1902, 1904 = Hogna montana (Emerton) 1885
„ emertoni Gertsch 1934, Kaston 1948 = Crocodilosa emertoni (Gertsch) 1934
„ farinosa C. L. Koch 1848 = Lycorma amylacea (C. L. Koch) 1839
„ figurata Caporiacco 1940 = Hygrolycosa figurata (Simon) 1876
„ figurata Holm 1947 = Lycorma sabulonum (L. Koch) 1877
„ floridiana Gertsch 1934 = Allocosa floridiana (Banks) 1896
„ frequentissima Caporiacco 1947 = Arkalosula frequentissima (Caporiacco) 1947
„ gertschi Fox 1935 = Vesubia gertschi (Fox) 1935
„ gobiensis Schenkel 1936 = Megarctosa gobiensis (Schenkel) 1936
„ halodroma Ohlert 1867 = Arctosa cinerea (Fabricius) 1776
„ hellenica Simon 1864 = Citilycosa hellenica (C. L. Koch) 1836
„ imperiosa Gertsch 1933 = Crocodilosa imperiosa (Gertsch) 1933
„ incerta Bryant 1934 = Schizocosa incerta (Bryant) 1934
„ incolor Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ infesta Simon 1864 = Lycosa infesta Walckenaer 1837
„ insignita Braendegaard 1939 = Arctosa alpigena (Doleschall) 1852
„ lamperti Dahl 1908 = Arctosa alpigena (Doleschall) 1852
„ latreillii C. L. Koch 1850 = Allohogna singoriensis (Laxmann) 1770
„ leopardus Thorell 1856, Dahl 1808 et sequ. = Megarctosa leopardus (Sundevall) 1832
„ leucotaeniata Mello-Leitao 1947 = Cynosa leucotaeniata (Mello-Leitao) 1947
„ littoralis Chamberlin 1924, Crosby & Bishop 1928, Kaston 1938, 1948 = Arctosa cinerea (Fabricius) 1776
„ lynx C. L. Koch 1848 = Arctosa perita (Latreille) 1798
„ maculata Dahl 1908, 1927 = Lycorma amylacea (C. L. Koch) 1839
„ montana Emerton 1885, 1911, Chamberlin 1908, Kaston 1938, 1948 = Hogna montana (Emerton) 1885
„ montanoides Banks 1892, 1916 = Hogna montanoides (Banks) 1892
„ moresoliana Gertsch & Davis 1940 = Allocosa moresoliana (Gertsch & Davis) 1940
„ nigromaculatus Montgomery 1902, 1904 = Hogna montana (Emerton) 1885
„ ovicula Thorell 1895 = Crocodilosa ovicula (Thorell) 1895
„ panamana Petrunkevitch 1925 = Arkalosula panamana (Petrunkevitch) 1925
„ paraguensis Gertsch & Wallace 1937 = Orinocosa paraguensis (Gertsch & Wallace) 1937
„ parva F. Cambridge 1902 = Allocosa parva (Banks) 1894

Arctosa (Forts.):
- „ picta Ohlert 1867, Menge 1879 ♀ = Arctosa perita (Latreille) 1798
- „ picta Menge 1879 ♂ = Cynosa stigmosa (Thorell) 1875
- „ pilipes Simon 1864 = Arctosa cinerea (Fabricius) 1776
- „ poecila Caporiacco 1939 = Arkalosula poecila (Caporiacco) 1939
- „ rubicunda Kaston 1948 = Crocodilosa rubicunda (Keyserling) 1876
- „ sabulonum Dahl 1908, 1927 = Lycorma sabulonum (L. Koch) 1877
- „ sanctae-rosae Gertsch & Wallace 1935 = Arkalosula santae-rosae (Gertsch & Wallace) 1935
- „ seminola Petrunkevitch 1911 = Allocosa floridiana (Banks) 1896
- „ similis Schenkel 1938 = Bonacosa similis (Schenkel) 1938
- „ singoriensis Simon 1864 = Allohogna singoriensis (Laxmann) 1770
- „ stigmosa Dahl 1908, 1927, Denis 1937 = Cynosa stigmosa (Thorell) 1875
- „ sublata Gertsch 1934 = Allocosa sublata (Montgomery) 1902
- „ tantilla Bryant 1948 = Lynxosa tantilla (Bryant) 1948
- „ turbida Rosca 1935, 1936 = Lycosa turbida (Rosca) 1935
- „ veracruzana Gertsch & Davis 1940 = Allocosa veracruzana (Gertsch & Davis) 1940
- „ versicula Karsch 1880 = Trochosomma versicula (Karsch) 1880
- „ virgo Gertsch 1934, Kaston 1948 = Allocosa virgo (Chamberlin) 1925
- „ vulcani Simon 1864 = nicht zu deuten!
- „ vultuosa Simon 1864 = Mimohogna vultuosa (C. L. Koch) 1839

Arcys:
- „ lancearius Simon 1895 = Arkys lancearius (Walckenaer) 1837

Argenna:
- „ albispiralis Bertkau 1883 = Argenna subnigra (Cambridge) 1861
- „ crassipalpis Reimoser 1919 = Argenna patula (Simon) 1874
- „ lendlii Kulczynski 1891 = Argenna patula (Simon) 1874
- „ lucida Kulczynski 1898 = ? Altella lucida (Simon) 1874
- „ matanuska Chamberlin & Ivie 1947 = Lathys alberta (Gertsch) 1946
- „ mengei Thorell 1869, Simon 1892, Bösenberg 1902 = Argenna subnigra (Cambridge) 1861
- „ minima Kulczynski 1891 = Argenna subnigra (Cambridge) 1861
- „ monticola Gertsch & Ivie 1936 = Pagomys monticola (Gertsch & Ivie) 1936
- „ ohioensis Chamberlin & Ivie 1936, Kaston 1948 = Tricholathys ohioensis (Chamberlin & Ivie) 1936
- „ spinigera Kulczynski 1898 = ? Altella lucida (Simon) 1874
- „ testacea Bertkau 1883 = Argenna subnigra (Cambridge) 1861

Argennina:
- „ hansi Schenkel 1950 = Tricholathys hansi (Schenkel) 1950
- „ reclusa Gertsch & Ivie 1936 = Tricholathys reclusa (Gertsch & Ivie) 1936

Argiope siehe **Argyope**

Argoctenus:
- „ aurens Bryant 1935 = Argoctenus aureus (Hogg) 1911

Argus:
- „ abnormis Walckenaer 1847 = Oreonetides abnormis (Blackwall) 1841
- „ acuminatus Walckenaer 1841 = Entelecara thorellii (Westring) 1862
- „ affinis Walckenaer 1841 = nicht zu deuten!
- „ albertinae Walckenaer 1841 = nicht zu deuten!
- „ anticus Walckenaer 1841 = Wideria antica (Wider) 1834
- „ apicatus Walckenaer 1841 = Wideria antica (Wider) 1834
- „ benignus Walckenaer 1847 = Dictyna arundinacea (Linné) 1758
- „ bicornis Walckenaer 1841 = Diplocephalus cristatus (Blackwall) 1841
- „ bicuspidatus Walckenaer 1847 = nicht zu deuten!
- „ bifrons Walckenaer 1841 = Dismodicus bifrons (Blackwall) 1841
- „ bituberculatus Walckenaer 1841 = Hypomma bituberculatum (Wider) 1834
- „ brevis Walckenaer 1841 = Ceratinella brevis (Wider) 1834
- „ ceciliae Walckenaer 1841 = nicht zu deuten!

Argus (Forts.):
„ celans Waldkenaer 1847 = Scotina celans (Blackwall) 1841
„ cheliferus Waldkenaer 1841 = Gonatium rubens (Blackwall) 1833
„ comatus Waldkenaer 1841 = Centromerita bicolor (Blackwall) 1833
„ cornutus Waldkenaer 1841 = Waldkenaeria acuminata Blackwall 1833
„ crassipalpus Waldkenaer 1841 = Gongylidium rufipes (Linné) 1758
„ cristatus Waldkenaer 1841 = Trematocephalus cristatus (Wider) 1834
„ cucullatus Waldkenaer 1841 = Wideria cucullata (C. L. Koch) 1836
„ dentatus Waldkenaer 1841 = Gnathonarium dentatum (Wider) 1834
„ dubius Waldkenaer 1847 = nicht zu deuten!
„ elongatus Waldkenaer 1841 = Lophocarenum elongatum (Wider) 1834
„ episinoides Waldkenaer 1847 = Euryopis acuminata (Lucas) 1846
„ errans Waldkenaer 1847 = Porrhomma errans (Blackwall) 1841
„ flavescens Waldkenaer 1847 = Dictyna flavescens (Waldkenaer) 1825
„ formivorus Waldkenaer 1841, 1847 = Theridion fuscum Blackwall 1841
„ fuscipalpus Waldkenaer 1841 = Meioneta fuscipalpus (C. L. Koch) 1836
„ germanicus Waldkenaer 1841 = Zodarion germanicum (C. L. Koch) 1837
„ gibbus Waldkenaer 1847 = Oedothorax gibbus (Blackwall) 1846
„ gracilis Waldkenaer 1841 = Meioneta fuscipalpus (C. L. Koch) 1836
„ graminicola Waldkenaer 1841 = Micryphantes graminicola (Sundevall) 1830
„ humilis Waldkenaer 1847 = Araeoncus humilis (Blackwall) 1841
„ latens Waldkenaer 1847 = Dictyna latens (Fabricius) 1773
„ lichenes Waldkenaer 1847 = nicht zu deuten!
„ longipalpis Waldkenaer 1841 = Tiso vagans (Blackwall) 1834
„ longipes Waldkenaer 1841 = Zodarion gallicum (Simon) 1873
„ mathildae Waldkenaer 1841 = nicht zu deuten!
„ minimus Waldkenaer 1847 = nicht zu deuten!
„ monoceros Waldkenaer 1841 = Prosopotheca monoceros (Wider) 1834
„ montanus Waldkenaer 1847 = Hahnia montana (Blackwall) 1841
„ mundus Waldkenaer 1841 = Gongylidium rufipes (Linné) 1758
„ navus Waldkenaer 1847 = Hahnia nava (Blackwall) 1841
„ nemoralis Waldkenaer 1847 = Lophocarenum nemoralis (Blackwall) 1841
„ nigrimanus Waldkenaer 1841 = Erigone atra Blackwall 1833
„ occitanica Waldkenaer 1841 = Zodarion gallicum (Simon) 1873
„ ochropus Waldkenaer 1841 = Miniryolus pusillus (Wider) 1834
„ parallelus Waldkenaer 1841 = Lophocarenum parallelum (Wider) 1834
„ parvipalpus Waldkenaer 1841 = Macrargus rufus (Wider) 1834
„ parvus Waldkenaer 1847 = nicht zu deuten!
„ picinus Waldkenaer 1847 = Plaesiocraerus picinus (Blackwall) 1841
„ pullus Waldkenaer 1847 = nicht zu deuten!
„ pumilus Waldkenaer 1847 = Pocadicnemis pumila (Blackwall) 1841
„ pusillus Waldkenaer 1841 = Miniryolus pusillus (Wider) 1834
„ quaternus Waldkenaer 1841 = Stylophora dorsalis (Wider) 1834
„ rufus Waldkenaer 1841 = ? Mengea scopigera (Grube) 1859
„ sulcifrons Waldkenaer 1841 = Panamomops sulcifrons (Wider) 1834
„ trapezoides Waldkenaer 1847 = Lophomma punctatum (Blackwall) 1841
„ terrestris Waldkenaer 1841 = nicht zu deuten!
„ tuberosus Waldkenaer 1847 = Oedothorax tuberosus (Blackwall) 1841
„ vagans Waldkenaer 1841 = Erigone vagans Audouin 1827
„ variegatus Waldkenaer 1847 = Poeciloneta variegata (Blackwall) 1841
„ viarius Waldkenaer 1847 = Micronetа viaria (Blackwall) 1841
„ viridissimus Waldkenaer 1847 = Dictyna waldkenaeri Roewer 1951

Argyope (= **Argiope**):
„ aetherea Keyserling 1856 = Argyope keyserlingii Karsch 1878
„ argyaspis McCook 1893 = Argyope trifasciata (Forskal) 1775
„ argyrea Badcock 1932 = Argyope argentata (Fabricius) 1775
„ aurelia Audouin 1827 = Argyope trifasciata (Forskal) 1775
„ basilica Marx 1889 = Allepeira basilica (McCook) 1878

Argyope (= **Argiope**) (Forts.):
„ chelifera Thorell 1890, 1895 = Argyope catenulata (Doleschall) 1859
„ chrysorrhoea L. Koch 1872 = Argyope appensa (Walckenaer) 1841
„ clarckii Pocock 1903 = Argyope sector (Forskal) 1776
„ cophinaria Marx 1889, McCook 1893 = Argyope aurantia (Lucas) 1833
„ crenulata Thorell 1878, Roewer 1938 = Argyope appensa (Walckenaer) 1841
„ doleschallii Thorell 1873 = Argyope reinwardtii (Doleschall) 1859
„ epeiroides Cambridge 1872 = Larinia epeiroides (Cambridge) 1872
„ fasciata Audouin 1827 = Argyope brünnichii (Scopoli) 1772
„ fasciata Mc Cook 1882 = Argyope trifasciata (Forskal) 1775
„ fasciata Keyserling 1886 = Argyope reinwardtii (Doleschall) 1859
„ fastuosa Banks 1909 = Argyope trifasciata (Forskal) 1775
„ fissiloba L. Koch 1875 = Argyope sector (Forskal) 1776
„ flavipalpis Brito Capello 1866 = Argyope cuspidata Thorell 1859
„ godmani Cambridge 1898 = Argyope aurantia (Lucas) 1833
„ gorgonea L. Koch 1871 = Argyope picta L. Koch 1871
„ gracilis Rainbow 1897 = Argyope gracillima Roewer 1942
„ hentzi Thorell 1878 = Argyope trifasciata (Forskal) 1775
„ laeta Thorell 1859 = Argyope clathrata (C. L. Koch) 1839
„ indecisa Cambridge 1876 = Argyope trifasciata (Forskal) 1775
„ lordi Cambridge 1870, Simon 1894 = Argyope sector (Forskal) 1776
„ magnifica L. Koch 1871 = Argyope aemula (Walckenaer) 1841
„ mauricia Hasselt 1882 = Argyope trifasciata (Forskal) 1775
„ multiconcha Treat 1887 = Argyope aurantia (Lucas) 1833
„ opulenta Thorell 1859, 1869 = Argyope catenulata (Doleschall) 1859
„ ornata Blackwall 1864 = Nephila antipodiana (Walckenaer) 1841
„ ornata Simon 1884 = Argyope anasuja Thorell 1887
„ pachuelii Karsch 1879 = Argyope cuspidata Thorell 1859
„ pelewensis Keyserling 1886 = Argyope catenulata (Doleschall) 1859
„ personata Cambridge 1893 = Argyope aurantia (Lucas) 1833
„ picta principalis Thorell 1881, Kulczynski 1911, 1914 = Argyope principalis L. Koch 1871
„ plana L. Koch 1867, 1871 = Argyope reinwardtii (Doleschall) 1859
„ regalis L. Koch 1871 = Argyope aetherea (Walckenaer) 1841
„ riparia McCook 1882, Emerton 1884, 1902 = Argyope aurantia (Lucas) 1833
„ sericea Audouin 1827 = Argyope lobata (Pallas) 1772
„ simplex Badcock 1932 = Argyope trifasciata (Forskal) 1775
„ splendida Audouin 1827 = Argyope lobata (Pallas) 1772
„ sticticalis Cambridge 1876 = Argyope trifasciata (Forskal) 1775
„ succincta L. Koch 1871, Pocock 1897 = Argyope versicolor (Doleschall) 1859
„ syrmatica L. Koch 1871 = Argyope protensa L. Koch 1871
„ transversa Emerton 1884, 1902 = Argyope trifasciata (Forskal) 1775
„ trivittata Cambridge 1889 = Allepeira trivittata (Cambridge) 1889
„ trivittata Karsch 1891 = Argyope aemula (Walckenaer) 1841
„ variabilis Bradley 1876 = Argyope aetherea (Walckenaer) 1841
„ versicolor Karsch 1891 = Argyope taprobanica Thorell 1887
„ zainensis Brito Capello 1866 = Argyope nigrovittata Thorell 1859

Argyopes:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Argyope**
„ amictoria Simon 1864 = Argyope argentata (Fabricius) 1775
„ arenata Simon 1864 = Verrucosa arenata (Walckenaer) 1841
„ aurelia Simon 1864 = Argyope trifasciata (Fabricius) 1775
„ australis Simon 1864 = Argyope clathrata (C. L. Koch) 1839
„ caudatus Blackwall 1866 = Argyope nigrovittata Thorell 1859
„ cerasia Simon 1864 = Aranea cerasiae (Walckenaer) 1841
„ clarckii Blackwall 1865 = Argyope sector (Forskal) 1776
„ crenulata Doleschall 1857, 1859 = Argyope appensa (Walckenaer) 1841
„ decaisni Simon 1864 = Araneus decaisnei (Lucas) 1863

Argyopes (Forts.):
- „ dentata Simon 1864 = Argyope lobata (Pallas) 1772
- „ depressa Simon 1864 = Araneus depressata Roewer 1951
- „ fenestrinus C. L. Koch 1839 = Argyope argentata (Fabricius) 1775
- „ ganygaster C. L. Koch 1839 = Eustala gonygaster (C. L. Koch) 1839
- „ gracilis Blackwall 1866 = Argyope gracilis (Blackwall) 1866
- „ impudicus L. Koch 1867 = Argyope lobata (Pallas) 1772
- „ iris Simon 1864 = Araneus iris (Walckenaer) 1841
- „ maronicus Taczanowski 1873 = Argyope argentata (Fabricius) 1775
- „ nobilis Simon 1864 = Acanthepeira stellata (Walckenaer) 1805
- „ praelautus C. L. Koch 1839 = Argyope lobata (Pallas) 1772
- „ prostypa Simon 1864 = Araneus prostypus (Walckenaer) 1841
- „ prudens Simon 1864 = nicht zu deuten!
- „ pustulosa Simon 1864 = Araneus pustulosus (Walckenaer) 1841
- „ sericea Eichwald 1841 = Argyope lobata (Pallas) 1772
- „ sericeus caboverdianus Brito Capello 1866 = Argyope sector (Forskal) 1776
- „ segmentata Simon 1864 = Araneus segmentatulus (Roewer) 1942
- „ splendida Simon 1864 = Argyope lobata (Pallas) 1772
- „ subtilis Taczanowski 1873 = Argyope argentata (Fabricius) 1775
- „ tridentata C. L. Koch 1839 = Eustala tridentata (C. L. Koch) 1839
- „ verrucosa Simon 1864 = Araneus pustulosus (Walckenaer) 1841

Argyrodes:

Die hier genannten und nicht genannten Arten siehe unter **Argyrodina**, jetzt: **Conopistha**

- „ argenteolus Kulczynski 1911 = Argyrodina kulczynskii (Roewer) 1942
- „ argyrodes Keyserling 1884 = Argyrodina trigonum (Hentz) 1850
- „ aurea Cambridge 1896 = Argyrodina argenteola (Cambridge) 1894
- „ bicornis Cambridge 1880 = Argyrodina trigonum (Hentz) 1850
- „ bonadea Bösenberg & Strand 1905, Strand 1907, Saito 1933 = Argyrodina argentata (Cambridge) 1880
- „ concinnus Cambridge 1880 = Argyrodina nephilae (Taczanowski) 1873
- „ conus Urquhart 1884 = Argyrodina antipodiana (Cambridge) 1888
- „ cyclosiformis Strand 1908 = Argyrodina sextuberculosa (Strand) 1908
- „ elegans Taczanowski 1873 = Theridion emendatum (Roewer) 1942
- „ epeirae Simon 1866 = Argyrodina argyrodes (Walckenaer) 1841
- „ fictilius Emerton 1882 = Rhomphaea fictilia (Hentz) 1850
- „ furcatus Cambridge 1898 = Rhomphaea bifissa F. Cambridge 1902
- „ gibbosa Pavesi 1876 = Argyrodina argyrodes (Walckenaer) 1841
- „ hirtus Taczanowski 1873 = Achaea hirta (Taczanowski) 1873
- „ inguinalis Cambridge 1880 = Argyrodina fissifrons (Cambridge) 1869
- „ larvatus Keyserling 1884 = Argyrodina cancellata (Hentz) 1850
- „ linguatus Cambridge 1898 = Argyrodina obtusa (Cambridge) 1880
- „ longicaudatus Keyserling 1891 = Synotaxus longicaudatus (Keyserling) 1891
- „ miniatus Thorell 1881 = Argyrodina minacea (Doleschall) 1857
- „ nephilae Cambridge 1880 = Argyrodina cambridgei (Keyserling) 1891
- „ niger Cambridge 1880 = Theridion nigrum (Cambridge) 1880
- „ paradoxus Taczanowski 1873 = Rhomphaea paradoxa (Taczanowski) 1873
- „ procrastinans Cambridge 1880 = Argyrodina fissifrons (Cambridge) 1869
- „ rostratus Banks 1908 = Argyrodina banksi (Petrunkevitch) 1911
- „ sumatranus Thorell 1890, Workman 1896 = Argyrodina flavescens (Thorell) 1890
- „ trapezoidalis Taczanowski 1873 = Achaea trapezoidalis (Taczanowski) 1873
- „ vittatus Keyserling 1884 = Argyrodina vittatula Roewer 1942

Argyrodina:

Die Gattung **Argyrodina** hat jetzt den Namen **Conopistha** zu führen.

- „ gibbosa Strand 1926 = Argyrodina (Conopistha) argyrodes (Walckenaer) 1841

Argyroepeira:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Leucauge**
„ alboguttata Keyserling 1893 = Pseudometa alboguttata (Cambridge) 1889
„ aurulenta Simon 1897 = Leucauge venusta (Walckenaer) 1841
„ bigibba Thorell 1887 = Tylorida striata (Thorell) 1877
„ blanda Cambridge 1890 = Leucauge undulata (Vinson) 1863
„ branickii Keyserling 1893 = Chrysometa branickii (Taczanowski) 1874
„ brevipes Keyserling 1893 = Pseudometa brevipes (Cambridge) 1889
„ celebesiana Simon 1894 = Leucauge celebesiana (Walckenaer) 1841
„ celebesiana Workman 1896 = Leucauge decorata (Blackwall) 1864
„ celebesiana Thorell 1899 = Leucauge cabindae (Brito Capello) 1866
„ debilis Cambridge 1889, 1896, Keyserling 1893 = Metargyra debilis (Cambridge) 1889
„ fastigiata Simon 1894 = Leucauge fastigata Simon 1877
„ festiva Kulczynski 1901 = Leucauge undulata (Vinson) 1863
„ formosa Cambridge 1889, F. Cambridge 1903 = Leucauge fragilis (Cambridge) 1889
„ globosa Keyserling 1893 = Mecynometa globosa (Cambridge) 1889
„ granulata Thorell 1890 = Leucauge granulata (Walckenaer) 1841
„ granulata Rainbow 1907 = Leucauge dromedaria (Thorell) 1881
„ hortorum Emerton 1884, 1902, Keyserling 1893, Simon 1894 = Laucauge venusta (Walckenaer) 1841
„ lepida Cambridge 1889 = Cyrtognatha lepida (Cambridge) 1889
„ lepida Keyserling 1893 = Meta lepida (Keyserling) 1882
„ longimana Keyserling 1893 = Chrysometa longimana (Keyserling) 1880
„ longipes Keyserling 1893 = Chrysometa longipes (Keyserling) 1881
„ ludibunda Keyserling 1893 = Meta ludibunda (Keyserling) 1893
„ mariana Keyserling 1893 = Chrysometa mariana (Keyserling) 1880
„ maura Banks 1898 = Singa maura (Hentz) 1847
„ minuta Keyserling 1893 = Meta minuta Keyserling 1883
„ monticola Keyserling 1893 = Meta monticola Keyserling 1883
„ nigrotrivittata Thorell 1890, Simon 1894 = Leucauge celebesiana (Walckenaer) 1841
„ nigrovittata Keyserling 1893 = Meta nigrovittata Keyserling 1865
„ opulenta Keyserling 1893 = Chrysometa opulenta (Keyserling) 1880
„ preciosissima Keyserling 1893 = Meta preciosissima (Keyserling) 1893
„ pulcherrima Cambridge 1897 = Leucauge moerens (Cambridge) 1896
„ quadrituberculata Keyserling 1893 = Mecynometa quadrituberculata (Keyserling) 1883
„ raripila Keyserling 1893 = Meta raripila (Keyserling) 1893
„ rubromaculata Keyserling 1893 = Chrysometa rubromaculata (Keyserling) 1863
„ satulla Keyserling 1893 = Meta satulla (Keyserling) 1880
„ speciosissima Keyserling 1893 = Meta speciosissima Keyserling 1880
„ striata Thorell 1887, Workman 1896 = Tylorida striata (Thorell) 1877
„ tenuipes Keyserling 1893 = Chrysometa tenuipes (Keyserling) 1863
„ triangularis Keyserling 1879 = Mimetus triangularis (Keyserling) 1879
„ ungulata Simon 1894 = Leucauge ungulata (Karsch) 1879
„ ungulata Thorell 1899 = Leucauge camerunensis Strand 1907
„ unicolor Keyserling 1893 = Meta unicolor Keyserling 1880
„ voluptabilis Keyserling 1893 = Meta voluptabilis (Keyserling) 1893

Argyroneta:
„ bicolor Risso 1826 = nicht zu deuten!
„ fimbriata Contarini 1843 = Dolomedes fimbriatus (Clerck) 1757
„ marina Hector 1877 = Desis marina (Hector) 1877
„ palustris Risso 1826 = nicht zu deuten!
„ trilineata Risso 1826 = nicht zu deuten!

Ariadna (= Ariadne):
- „ bösenbergii Keyserling 1877 = Ariadna mollis (Holmberg) 1876
- „ flagellum Doleschall 1857 = Ariamnes flagellum (Doleschall) 1857
- „ gracillima Thorell 1895 = Ariamnes birgitae Strand 1916
- „ insidiatrix Gasperini 1892 = Filistata insidiatrix (Forskal) 1775
- „ jonica Cambridge 1873 = Ariadna insidiatrix Audouin 1827
- „ mellissii Cambridge 1869 = Ariamnes mellissii (Cambridge) 1869
- „ nigra Simon 1893 = nom. nud.
- „ pallida C. L. Koch 1845 = Ariadna bicolor (Hentz) 1842
- „ rubella Keyserling 1877 = Ariadna bicolor (Hentz) 1842

Ariamnes:
- „ argenteolus Simon 1873 = Rhomphaea argenteola (Simon) 1873
- „ attenuatus Urquhart 1886 = Rhomphaea urquharti (Bryant) 1933
- „ conifer Urquhart 1886 = Moneta conifera (Urquhart) 1880
- „ fictilius Keyserling 1884 = Rhomphaea fictilia (Hentz) 1850
- „ furcatus Cambridge 1894 = Rhomphaea furcata (Cambridge) 1894
- „ gracilis L. Koch 1872 = Argyrodina gracilis (L. Koch) 1872; jetzt: Conopistha g.)
- „ longicaudatus Cambridge 1872 = Rhomphaea longicaudata (Cambridge) 1872
- „ malleiformis L. Koch 1872 = Argyrodina gracilis (L. Koch) 1872; jetzt: Conopistha g.)
- „ nasicus Simon 1873 = Rhomphaea nasica (Simon) 1873
- „ paradoxus Keyserling 1884 = Rhomphaea paradoxa (Taczanowski) 1873
- „ procerus Cambridge 1896 = Rhomphaea procera (Cambridge) 1896
- „ rostratus Simon 1873 = Rhomphaea rostrata (Simon) 1873
- „ triangulatus Urquhart 1886 = Rhomphaea triangulata (Urquhart) 1886

Arkys (= Arcys):
- „ cordiformis Nicolet 1849 = Gnolus cordiformis (Nicolet) 1849
- „ flavescens Nicolet 1849 = Oarces reticulatus (Nicolet) 1849
- „ gayi Nicolet 1849 = Oarces reticulatus (Nicolet) 1849
- „ inflatus Nicolet 1849 = Oarces reticulatus (Nicolet) 1849
- „ liliputanus Nicolet 1849 = Oarces reticulatus (Nicolet) 1849
- „ limbatus Nicolet 1849 = Gnolus limbatus (Nicolet) 1849
- „ nigriventris Nicolet 1849 = Gnolus spiculator (Nicolet) 1849
- „ parvulus Nicolet 1849 = Gnolus spiculator (Nicolet) 1849
- „ perlatus Simon 1888, 1895, Berland 1924 = Arkys brevipalpus Karsch 1878
- „ piriformis Nicolet 1849 = Oarces reticulatus (Nicolet) 1849
- „ reticulatus Nicolet 1849 = Oarces reticulatus (Nicolet) 1849
- „ spiculator Nicolet 1849 = Gnolus spiculator (Nicolet) 1849
- „ variabilis Nicolet 1849 = Gnolus limbatus (Nicolet) 1849

Arrecerus:
- „ atrotobialis Smith 1905 = Wideria atrotibialis (Cambridge) 1878
- „ camelinus Simon 1864 = Walckenaeria acuminata Blackwall 1834
- „ monoceros Simon 1864 = Prosopotheca monoceros (Wider) 1834

Artamus (= Artama):

Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Philodromus**
- „ armata Simon 1864 = ? Philodromus marxii Keyserling 1884
- „ callida Simon 1864 = Philodromus calidus Lucas 1846
- „ fuscolimbata Simon 1864 = Philodromus aureolus fuscolimbatus (Lucas) 1845
- „ gigas C. L. Koch 1837 = Thanatus gigas (C. L. Koch) 1837
- „ griseus C. L. Koch 1837, 1845, Ohlert 1867 = Philodromus emarginatus (Schrank) 1803
- „ jejunus C. L. Koch 1845, Ohlert 1867 = Philodromus margaritatus (Clerck) 1757
- „ laevipes C. L. Koch 1837, 1850, Prach 1866, Ohlert 1867 = Philodromus margaritatus (Clerck) 1757
- „ pallida Simon 1864 = Philodromus emarginatus (Schrank) 1803
- „ tigrina Simon 1864 = Philodromus margaritatus (Clerck) 1757

Artanes:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Philodromus**
„ fallax Pavesi 1873 = nicht zu deuten!
„ fuliginosus Karsch 1879 = Philodromus spinitarsis (Simon) 1895
„ margaritatus Thorell 1872 et sequ. = Philodromus margaritatus (Clerck) 1757
„ pallidus Bösenberg 1902 = Philodromus emarginatus (Schrank) 1803

Artema:
„ atlanta Pocock 1900, Dyal 1935 = Artema sisyphoides (Doleschall) 1857
„ atlantica Banks 1898 = Artema atlanta Walckenaer 1837
„ convexa Blackwall 1858, 1861 = Artema atlanta Walckenaer 1837
„ cretica Roewer 1928 = Neartema cretica (Roewer) 1928
„ mauricia Simon 1885, 1893 = Artema sisyphoides (Doleschall) 1857
„ mauritia Vinson 1863 = Artema mauriciana Walckenaer 1837
„ pristina Simon 1890 = Crossopriza pristina (Simon) 1890

Artoria:
„ bicolor Simon 1898 = Artoriellula bicolor (Simon) 1898
„ cingulipes Simon 1909 = Artoriella cingulipes (Simon) 1909
„ flavimanus Simon 1909 = Artoriella flavimanus (Simon) 1909
„ lycosimorpha Strand 1909 = Artoriella lycosimorpha (Strand) 1909
„ taeniifera Simon 1909 = Artoriella taeniifera (Simon) 1909

Asadipus:
„ muticus Simon 1897 = Stratius muticus (Simon) 1897

Asagena:
„ acuminata Simon 1864 = Euryopis episinoides (Walckenaer) 1847
„ americana Emerton 1882, 1902 et sequ. = Asagena dubia (Hentz) 1847
„ corollata C. L. Koch 1840 = Lithyphantes albomaculatus (De Geer) 1778
„ corsica Simon 1873 = Asagena phalerata corsica (Simon) 1873
„ serratipes C. L. Koch 1839 = Asagena phalerata (Panzer) 1801

Asamonea (= Asemonea):
„ flava Peckham & Wheeler 1889 = Chinoscopus flavus (Peckham & Wheeler) 1889
„ gracilis Peckham & Wheeler 1889 = Chinoscopus gracilis (Taczanowski) 1872

Ascalus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Myrmarachne**

Asceua:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Storena**
„ elegans Thorell 1887 = Storena thorelli Roewer 1942

Ascuris:
„ striatipes Simon 1897 = Ascurisoma striatipes (Simon) 1897

Ascyltus:
„ penicillatus Karsch 1878, Keyserling 1881 = Mopsus penicillatus (Karsch) 1878

Asemesthes:
„ aureus Purcell 1908, Tucker 1923 = Asemesthes subsimilis Simon 1887

Asemonea siehe **Asamonea**

Ashtabula:
„ nigricans F. Cambridge 1901 = Sassacus barbipes (Peckham) 1888

Astia:
„ minitabunda L. Koch 1880 = Helpis minitabunda (L. Koch) 1880
„ mollicoma L. Koch 1880 = Arasia mollicoma (L. Koch) 1880
„ morosa Peckham 1888 = Habrocestum morosum (Peckham) 1888
„ ornata Peckham 1885 = nicht zu deuten!
„ respersa L. Koch 1880 = Helpis respersa (L. Koch) 1880
„ vittata Peckham 1888 = Maevia vittata (Hentz) 1856

Astratea:
„ insignis Thorell 1890 = Medmassa insignis (Thorell) 1890

Atalia:
„ concinna Thorell 1887 = Clubiona concinna (Thorell) 1887

Ataulfo:
„ nugax Cambridge 1896 = Stemmops bicolor Cambridge 1894
Atea:
„ agalena C. L. Koch 1845, Ohlert 1867 = Araneus sturmi (Hahn) 1831
„ incerta C. L. Koch 1843 = nicht zu deuten!
„ melanogaster C. L. Koch 1837, 1845 = Dipoena melanogaster (C. L. Koch) 1837
„ sclopetaria C. L. Koch 1837, 1845 = Araneus redii (Scopoli) 1763
„ sclopetaria Barta 1869 = Aranea ovigera Panzer 1804, jetzt: Araneus sericatus (Clerck) 1757
„ semilunaris Karsch 1879 = Araneus semilunaris (Karsch) 1879
„ spinosa Ohlert 1865, 1867 = Cercidia prominens (Westring) 1851
„ sturmii C. L. Koch 1837, Archer 1951 = Araneus sturmii (Hahn) 1831
„ subfusca C. L. Koch 1837, 1845 = Araneus subfuscus (C. L. Koch) 1837
Atelacantha:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Gasteracantha**
„ heterodoxa Karsch 1879 = Casteracantha linnaei (Walckenaer) 1841
„ malayensis Hasselt 1882 = Gasteracantha mengei (Keyserling) 1863
„ wolfi Strand 1911, 1914 = Gasteracantha quadrispinosa (Cambridge) 1879
Atigale:
„ caementaria Lamarck 1818 = Nemesia caementaria (Latreille) 1798
Atkinsonia:
„ nana Cambridge 1879 = Dipoena nana (Cambridge) 1879
Atrytone:
„ anomala Keyserling 1882 = Tara anomala (Keyserling) 1882
Atta:
„ frontalis Simon 1864 = Euophrys maculata (Wider) 1834
„ nigromaculata Simon 1864 = Euophrys nigromaculata (Lucas) 1846
„ striolata Simon 1864 = Euophrys striolata (C. L. Koch) 1848
„ testaceolineata Simon 1864 = Icius testaceolineatus (Lucas) 1846
Attidops:
„ youngii Banks 1905 = Ballus youngii (Peckham) 1888
Attulus:
„ albocinctus Simon 1901 = Yllenus albocinctus (Kroneberg) 1875
„ cinereus Simon 1901, Dahl 1926, Ermolajew 1937 = Attulus helvolus (Simon) 1871
„ guttatus Lessert 1910 = Sitticulus penicillatus (Simon) 1875
„ penicillatus Simon 1901, 1937 = Sitticulus penicillatus (Simon) 1875
„ pubescens Simon 1901 = Sitticus truncorum (Linné) 1758
„ saltator Simon 1901, Locket & Millidge 1951 = Sitticulus saltator (Simon) 1868
„ sulcicola Simon 1937 = Attulus salsicola Simon 1937
„ univittatus Simon 1901 = Pseudomogrus univittatus (Simon) 1871
„ vittatus Simon 1901 = Yllenus vittatus Thorell 1875
Attus:
„ abbreviatus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ acripes Simon 1871 = Euophrys acripes (Simon) 1871
„ adansonii Audouin 1827 = Hasarius adansonii (Audouin) 1827
„ adustus Urquhart 1892 = Trite auricoma (Urquhart) 1885
„ aenescens Simon 1868 = Bianor aurocinctus (Ohlert) 1867
„ aeneus Walckenaer 1837 = Heliophanus muscorum (Walckenaer) 1802
„ aequipes Simon 1871 = Euophrys aequipes (Cambridge) 1871
„ aeruginosus Simon 1871 = Aelurillus aeruginosus (Simon) 1871
„ aestivalis Peckham 1883 = Dendryphantes capitatus (Hentz) 1846
„ affaber Simon 1871 = Pseudeuophrys callida (Walckenaer) 1802
„ affinis Simon 1868, 1871 = Aelurillus affinis (Lucas) 1846
„ africanus Vinson 1863 = Plexippus paykullii (Audouin) 1827
„ agilis Walckenaer 1841 = Menemerus semilimbatus (Hahn) 1829
„ agilis Simon 1868 = Habrocestum pullatum (Simon) 1876
„ agrestis Peckham 1883 = Thiodina puerpera (Hentz) 1846

Attus (Forts.):
„ alaceo Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ albertisii Thorell 1881 = Margaromma albertisii (Thorell) 1881
„ albibarbis Simon 1871 — Neaetha albibarbis (Simon) 1871
„ albicans Simon 1871 = Aelurillus candidus (Simon) 1868
„ albifrons Simon 1868, 1871 = Attulus albifrons (Lucas) 1846
„ albobimaculatus Simon 1871 = Bianor albobimaculatus (Lucas) 1846
„ albociliatus Simon 1868 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
„ albocinctus Kroneberg 1875 = Yllenus albocinctus (Kroneberg) 1875
„ alboimmaculatus Peckham 1883 = Poultonella alboimmaculata (Peckham) 1883
„ albolineatus Waldkenaer 1847 = Carrhotus viduus (C. L. Koch) 1846
„ albolineatus Kulczynski 1895 = Sitticus kulczynskii Roewer 1951
„ albomarginatus Lenz 1886 = Hyllus albomarginatus (Lenz) 1886
„ albooculatus Vinson 1863 = Hyllus albooculatus (Vinson) 1863
„ albopilosus Rainbow 1898 = nicht zu deuten!
„ albosignatus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ albosignatus Bösenberg & Lenz 1895 = nicht zu deuten!
„ albovariegatus Simon 1871 = Philaeus albovariegatus (Simon) 1871
„ alfurus Doleschall 1857 = Hyllus giganteus C. L. Koch 1846
„ algerinus Simon 1868, 1871 = Cyrba algerina (Lucas) 1846
„ alpicola Kulczynski 1887 = Sitticus alpicola (Kulczynski) 1887
„ alter Simon 1868, 1878 = Euophrys altera (Simon) 1868
„ amabilis Waldkenaer 1847 = Alcmena amabilis C. L. Koch 1846
„ ambesas Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ ambiguus Waldkenaer 1837 = ? Hentzia pálmarum (Hentz) 1832
„ ammophilus Thorell 1875 = Sitticus ammophilus (Thorell) 1875
„ anjouanus Butler 1879 = nicht zu deuten!
„ annosus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ annulipes Waldkenaer 1825, 1837 = Ballus chalybeius (Waldkenaer) 1802
„ annulipes Lucas 1838 = Aelurillus lucasi Roewer 1951
„ aquilus Urquhart 1886 = nicht zu deuten!
„ arcigerus Waldkenaer 1837 = Pellenes arcigerus (Waldkenaer) 1837
„ arcuatus Westring 1862, Simon 1868, Dahl 1883 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
„ arcuatus Thorell 1873 ♀ = Evarcha flammata (Clerck) 1757
„ arenicolor Grube 1861 = nicht zu deuten!
„ arenicolor Simon 1868 = Aelurillus aeruginosus (Simon) 1871
„ argentatus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ argenteolineatus Simon 1868 = Thyene imperialis (Rossi) 1846
„ arizonensis Peckham 1883 = Dendryphantes tuberculatus (F. Cambridge) 1901
„ armadillo Simon 1871 = Ballus armadillo (Simon) 1871
„ armiger L. Koch 1867 = Cyrba algerina (Lucas) 1846
„ asper Karsch 1878 = nicht zu deuten!
„ aspergatus Waldkenaer 1837 = ? Maevia vittata (Hentz) 1846
„ astutus Simon 1871 = Euophrys astuta (Simon) 1871
„ atellanus Simon 1871, 1876 = Sitticus caricis (Westring) 1862
„ atopodon Chamberlin 1825 = Dendryphantes capitatus (Hentz) 1845
„ atricapillus Simon 1882 = Sitticus atricapillus (Simon) 1882
„ atrovirens Sundevall 1832 = Heliophanus coupreus (Waldkenaer) 1802
„ attentus Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ audax Hentz 1845 = Dendryphantes audax (Hentz) 1845
„ aurantius Waldkenaer 1847 = Dendryphantes aurantius (Lucas) 1833
„ auratus Hentz 1846 = Corythalia aurata (Hentz) 1846
„ auratus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ aureolus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ auricomus Urquhart 1885 = Trite auricoma (Urquhart) 1885
„ auriventer Giebel 1863 = nicht zu deuten!
„ auspex Cambridge 1885 = Attulus auspex (Cambridge) 1885
„ avocator Cambridge 1885 = Attulus avocator (Cambridge) 1885

Attus (Forts.):
„ badius Simon 1871 = Pseudicius badius (Simon) 1868
„ balicola Simon 1871 = Euophrys balicola (Simon) 1871
„ barbipes Simon 1868, 1870, Bösenberg 1903 = Saitis barbipes (Simon) 1868
„ basalis Karsch 1879 = Sitticus basalis (Karsch) 1879
„ bedeli Simon 1875 = Pellenes nigrociliatus (L. Koch) 1875
„ bewsheri Butler 1879 = Echinussa praedatoria (Keyserling) 1877
„ bicolor Walckenaer 1805, 1837, Simon 1868 = Carrhotus xanthogrammus (Walckenaer) 1825
„ bicolor Lucas 1838 = nicht zu deuten!
„ bidens Taczanowski 1872 = nicht zu deuten!
„ biimpressus Doleschall 1852 = Ballus biimpressus (Doleschall) 1852
„ bilineatus Walckenaer 1825, 1837 = Philaeus bilineatus (Walckenaer) 1825
„ bimaculatus Simon 1868 ♂ = Pseudeuophrys bimaculata (Simon) 1868
„ bimaculatus Canestrini & Pavesi 1870 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
„ bimaculatus Simon 1871 = nicht zu deuten!
„ bimaculosus Urquhart 1886, 1887 = Trite bimaculosa (Urquhart) 1886
„ binus Hentz 1846 = Hyctia bina (Hentz) 1846
„ bipunctatus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ bistriatus Hasselt 1893 = nicht zu deuten!
„ bivittatus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ blandus Simon 1871 = Aelurillus blandus (Simon) 1871
„ bombycius Simon 1868, 1871 = Dendryphantes hastatus (Clerck) 1757
„ bonairensis Hasselt 1887 = nicht zu deuten!
„ bonnetii Audouin 1827, Cambridge 1876 = Mogrus bonnetii (Audouin) 1827
„ bos Sundevall 1833, Walckenaer 1837 = Hyllus bos (Sundevall) 1833
„ brandtii Taczanowski 1871 = Freya brandtii (Taczanowski) 1871
„ branickii Taczanowski 1871, Hasselt 1888 = Thiodina pallida (C. L. Koch) 1846
„ brasiliensis Walckenaer 1847 = nicht zu deuten!
„ brendeli Giebel 1863, 1869 = nicht zu deuten!
„ bresnieri Simon 1868 = Phlegra bresnieri (Lucas) 1846
„ brevipes Westring 1862, Simon 1868 = Ballus chalybeius (Walckenaer) 1802
„ brevis Simon 1868 = Pellenes brevis (Simon) 1868
„ bubo Taczanowski 1871 = Psecas bubo (Taczanowski) 1871
„ cabanisii Taczanowski 1872 = nicht zu deuten!
„ caenobiticus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ callidus Walckenaer 1805, 1837 = Pseudeuophrys callida (Walckenaer) 1802
„ calvipalpis L. Koch 1867 = Muziris calvipalpis (L. Koch) 1867
„ calvus Simon 1868 = Pellenes laevigatus (Simon) 1868
„ campylophorus Thorell 1875 = Pellenes campylophorus (Thorell) 1875
„ cancrimanus Taczanowski 1872 = nicht zu deuten!
„ cancroides Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ candefactus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ candidus Simon 1868 = Aelurillus candidus (Simon) 1868
„ canescens Walckenaer 1847, Simon 1868 = Mogrus canescens (C. L. Koch) 1846
„ canonicus Hentz 1846 = nicht zu deuten!
„ canosus Walckenaer 1837 = ? Corythalia aurata (Hentz) 1846
„ capitatus Hentz 1846, Simon 1868 = Dendryphantes capitatus (Hentz) 1846
„ capito Lucas 1838 = Hasarius adansonii (Audouin) 1827
„ capreolus Walckenaer 1825 = Evarcha flammata (Clerck) 1757
„ capreolus L. Koch 1868 = Aelurillus kochi Roewer 1951
„ cardinalis Hentz 1845 et sequ. = Dendryphantes cardinalis (Hentz) 1845
„ caricis Westring 1862, et sequ. = Sitticus caricis (Westring) 1862
„ castaneus Hentz 1845 = Sitticus castaneus (Hentz) 1846
„ castaneus Simon 1868 = Dendryphantes nidicolens (Walckenaer) 1825
„ castellanus Walckenaer 1841 = nicht zu deuten!
„ castriesianus Grube 1861 = Telamonia castriesiana (Grube) 1861
„ cautus Peckham 1888 = Sitticus cautus (Peckham) 1888

Attus (Forts.):

„ cayanus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ ceruleus Walckenaer 1837 = ? Agassa cyanea (Hentz) 1846
„ cerussatus Simon 1868 = Neaetha cerussata (Simon) 1868
„ chalybeius Walckenaer 1805, 1837 = Ballus chalybeius (Walckenaer) 1802
„ chlorommatus Cantor 1842 = nicht zu deuten!
„ chrysis Walckenaer 1805, 1837 = Dendryphantes aurantius (Lucas) 1833
„ chrysonotus Rossi 1846 = nicht zu deuten!
„ chrysops Simon 1875 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
„ cinctus Dugès 1836 — Leptorchestes cinctus (Dugès) 1836
„ cinctus Walckenaer 1837 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
„ cinereofasciatus Simon 1868 = Phlegra cinereofasciata (Simon) 1868
„ cinereus Walckenaer 1837 = Dendryphantes cinereus (Walckenaer) 1837
„ cinereus Westring 1862, Simon 1876, Dahl 1883, Bösenberg 1903 = Attulus helveolus (Simon) 1871
„ cingulatus Simon 1868, 1871, 1876 = Sitticus cingulatus (Simon) 1868
„ clandestinus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ clavatus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ clavimanus Taczanowski 1871 = Chirothecia clavimana (Taczanowski) 1871
„ coccociliatus Simon 1868 = Euophrys petrensis C. L. Koch 1837
„ coecatus Hentz 1846 = Pellenes coecatus (Hentz) 1846
„ comptulus Simon 1871 = Euophrys rufibarbis comptula (Simon) 1871
„ comptus Bösenberg & Lenz 1895 = nicht zu deuten!
„ concolor Banks 1894 = Euophrys concolor (Banks) 1894
„ congener Simon 1871 = Icius nebulosus (Simon) 1868
„ conicus Rossi 1846 = nicht zu deuten!
„ conspillum Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ contemplator Walckenaer 1837 = ? Dendryphantes obscurus (Peckham) 1888
„ cookii Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ cordialis Hahn 1826 = Salticus cingulatus (Panzer) 1797
„ cornatus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ cornutus Doleschall 1859 = Hyllus giganteus C. L. Koch 1846
„ cornutus Hasselt 1879 = Hyllus walckenaerii (White) 1846
„ coronatus Walckenaer 1805, 1837 = Evarcha flammata (Clerck) 1757
„ coronatus Hentz 1846 = Pellenes coecatus (Hentz) 1846
„ coronigera Taczanowski 1871 = Phiale coronigera (C. L. Koch) 1846
„ crassipes Simon 1868, 1871 = Icius crassipes (Simon) 1868
„ crassipes Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ cristatus Hentz 1846 = Pellenes coecatus (Hentz) 1846
„ croesus Hasselt 1888 = Psecas cyaneus (C. L. Koch) 1846
„ crucifer Sundevall 1832 = Pellenes tripunctatus (Walckenaer) 1802
„ crucigerus Walckenaer 1805, 1837, Westring 1862 et sequ. = Pellenes tripunctatus (Walckenaer) 1802
„ cruentatus Walckenaer 1837 = Phiale cruentata (Walckenaer) 1837
„ cunctator Walckenaer 1837 = Marpissa undata (De Geer) 1778
„ cupreus Hahn 1826, Audouin 1827 et sequ. = Heliophanus cupreus (Walckenaer) 1802
„ cyaneus Hentz 1846 = Agassa cyanea (Hentz) 1846
„ cyanothorax Thorell 1881 = Pystira cyanothorax (Thorell) 1881
„ cylindricus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ daminii Chyzer 1891, 1897 = Sitticus daminii (Chyzer) 1891
„ darwinii White 1849, 1850 = nicht zu deuten!
„ debilis Giebel 1863 = nicht zu deuten!
„ decipiens Simon 1868 = Bianor aurocinctus tantulus (Simon) 1860
„ decoratus Taczanowski 1871 = Freya decorata (C. L. Koch) 1846
„ decorus Thorell 1875 = Sitticus decorus (Thorell) 1875
„ deineiresus Walckenaer 1847 = nicht zu deuten!
„ delectus Cambridge 1876 = Heliophanus delectus (Cambridge) 1872

Attus (Forts.):
- „ deplanatus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
- „ depressus Walckenaer 1805, 1837 = Ballus chalybeius (Walckenaer) 1802
- „ diagonalis Simon 1868 = Pellenes diagonalis (Simon) 1868
- „ diardi Walckenaer 1837 = Hyllus diardi (Walckenaer) 1837
- „ diductus Cambridge 1885 = Sitticus diductus (Cambridge) 1885
- „ difficilis Simon 1868, 1871 = Pseudeuophrys difficilis (Simon) 1868
- „ dimidiatus Grube 1861 = nicht zu deuten!
- „ dissimulator Walckenaer 1837 = Dendryphantes dissimulator (Walckenaer) 1837
- „ distinguendus Simon 1868, Chyzer & Kulczynski 1891, Bösenberg 1903 = Sitticus distinguendus (Simon) 1868
- „ diversipes Simon 1868 = Cyrba algerina (Lucas) 1846
- „ divisus Walckenaer 1837 = Phlegra fasciata (Hahn) 1826
- „ doreyanus Walckenaer 1837 = Telamonia doreyana (Walckenaer) 1837
- „ dorsatus Banks 1895 = Attinella dorsata (Banks) 1895
- „ dorthesii Audouin 1827 = Aelurillus dorthesii (Audouin) 1827
- „ doumerci Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ druryi Audouin 1827 = nicht zu deuten!
- „ dryocopinus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
- „ dubius Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ d'urvillii Walckenaer 1837 = Zenodorus d'urvillii (Walckenaer) 1837
- „ dybowskii Taczanowski 1871 = Phiale dybowskii (Taczanowski) 1871
- „ dzieduszyckii L. Koch 1870, Chyzer & Kulczynski 1891, Bösenberg 1903 = Sitticus dzieduczyckii (L. Koch) 1870
- „ effigies Cambridge 1876 = nicht zu deuten!
- „ elaterinus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
- „ elegans Hentz 1846 = Tutelina elegans (Hentz) 1846
- „ elegans Nicolet 1849 = Thiodina nicoleti Roewer 1951
- „ elegans Kroneberg 1875 = Yllenus kronebergi Roewer 1951
- „ emaciatus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ encarpatus Walckenaer 1837, Simon 1868 = Pseudicius encarpatus (Walckenaer) 1802
- „ endacrys Rossi 1846 = nicht zu deuten!
- „ erraticus Walckenaer 1825 et sequ. = Pseudeuophrys callida (Walckenaer) 1802
- „ eurinus Simon 1871 = nicht zu deuten!
- „ excubitor Walckenaer 1805, 1837 = Dendryphantes excubitor (Walckenaer) 1805
- „ exiguus Bösenberg 1903 = Sitticus exiguus (Bösenberg) 1903
- „ explorator Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ falcatus Sundevall 1832 et sequ. = Evarcha flammata (Clerck) 1757
- „ familiaris Hentz 1846 = Marpissa undata (De Geer) 1778
- „ farinosus Simon 1868 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
- „ fasciatus Hahn 1832 et sequ. = Phlegra fasciata (Hahn) 1826
- „ fasciger Simon 1880 = Sitticus fasciger (Simon) 1880
- „ fasciolatus Hentz 1846 = Dendryphantes audax (Hentz) 1846
- „ felis Walckenaer 1837 = ? Dendryphantes capitatus (Hentz) 1845
- „ finitimus Simon 1868, 1871 = Pseudeuophrys vafra (Blackwall) 1867
- „ finschii L. Koch 1878 = Sitticus finschii (L. Koch) 1878
- „ flavicruris Rainbow 1897 = Salticus flavicruris (Rainbow) 1897
- „ flavipalpis Simon 1868, 1871, Pavesi 1876 = Pellenes flavipalpis (Lucas) 1853
- „ flavipes Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ flavipes Westring 1862 = Heliophanus ritteri (Scopoli) 1763
- „ flavoater Grube 1861 = nicht zu deuten!
- „ flavolineatus Walckenaer 1847 = Amycus flavolineatus C. L. Koch 1846
- „ flavus Peckham 1883 = Dendryphantes flavus (Peckham) 1883
- „ floricola Westring 1862, Simon 1876, Menge 1877, Hansen 1885, Chyzer & Kulczynski 1891, Bösenberg 1903 = Sitticus littoralis (Hahn) 1831

Attus (Forts.):
„ floricola Simon 1868 = Sitticus rupicola (C. L. Koch) 1846
„ floricola Cambridge 1881 = Sitticus mancus (Doleschall) 1852
„ foliatus L. Koch 1867 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
„ formicarius Walckenaer 1805, 1825, 1837 = Myrmarachne joblotii (Scopoli) 1763
„ formicoides Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ formosus Peckham 1883 = Dendryphantes formosus (Peckham) 1883
„ forskaeli Walckenaer 1837 = Hasarius adansonii (Audouin) 1827
„ fossilis Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ fraudulentus Walckenaer 1837 = ? Dendryphantes insignarius (C. L. Koch) 1846
„ frigidus Simon 1875, 1876 = Sitticus frigidus (Simon) 1875
„ frischii Audouin 1827 = Pellenes frischii (Audouin) 1827
„ frontalis Walckenaer 1837, C. L. Koch 1848, Simon 1868, 1871 = Euophrys maculata (Wider) 1834
„ frontalis Westring 1862, Ohlert 1867 = Neon reticulatus (Blackwall) 1853
„ frontosus Simon 1871 = Mogrus frontosus (Simon) 1871
„ fucatus Simon 1868 = Euophrys fucata (Simon) 1868
„ fulvaster Simon 1868, 1870, 1871 = Phlegra fulvastra (Simon) 1868
„ fulviventris Simon 1871 = Dendryphantes fulviventris (Lucas) 1846
„ funereus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ furtivus Walckenaer 1837 = ? Plexippus selectus C. L. Koch 1847
„ fuscipes Walckenaer 1847 = nicht zu deuten!
„ fusconotatus Grube 1861 = nicht zu deuten!
„ fuscostriatus Grube 1861 = nicht zu deuten!
„ fuscus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ galathea Walckenaer 1805, 1837 = Dendryphantes galathea (Walckenaer) 1805
„ gaymardius Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ gambosus Simon 1868, 1871 = Euophrys gambosa (Simon) 1868
„ gazellae Karsch 1878 = Thiania gazellae (Karsch) 1878
„ gemellus Simon 1875 = Pellenes gemellus (Simon) 1875
„ geniculatus Simon 1868, 1870, 1873 = Pellenes geniculatus (Simon) 1868
„ gerbillus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ gesneri Audouin 1827 = Menemerus gesneri (Audouin) 1827
„ gesticulator Lucas 1846 = Aelurillus gesticulator (Simon) 1868
„ gilvus Simon 1868 = Aelurillus gilvus (Simon) 1868
„ godlewskii Kulczynski 1895 = Sitticus godlewskii (Kulczynski) 1895
„ gracilis Walckenaer 1837 = Pseudeuophrys callida (Walckenaer) 1802
„ gracilis Hentz 1846 = nicht zu deuten!
„ gracilis Bösenberg & Lenz 1894 = Hyllus sansibaricus Roewer 1951
„ grossipes Walckenaer 1837 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
„ guianensis Taczanowski 1871 = Phiale guianensis (Taczanowski) 1871
„ guttatus Thorell 1875 = Sitticus guttatus (Thorell) 1875
„ guttatus Bösenberg 1903 = Sitticus penicillatus (Simon) 1875
„ haemorrhoicus Simon 1868 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
„ hamatinus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ hamatus Simon 1891 = Icius hamatus (C. L. Koch) 1846
„ hastatus Westring 1862, Simon 1868 = Dendryphantes hastatus (Clerck) 1757
„ hebes Hentz 1846 = Dendryphantes capitatus (Hentz) 1846
„ heliophaninus Taczanowski 1871 = Corythalia heliophanina (Taczanowski) 1871
„ helveticus Walckenaer 1847 = Myrmarachne joblotii (Scopoli) 1863
„ helveolus Simon 1871 = Attulus helveolus (Simon) 1871
„ herbigradus Simon 1871 = Euophrys herbigrada (Simon) 1871
„ heterophthalmus C. L. Koch 1848 = Ballus chalybeius (Walckenaer) 1802
„ heterophthalmus Westring 1862 = Bianor aurocinctus (Ohlert) 1867
„ hispidus Bösenberg & Lenz 1895 = nicht zu deuten!
„ histrio Simon 1875, 1876 = Attulus histrio (Simon) 1875
„ histrionicus Westring 1862 = Salticus scenicus (Clerck) 1757

Attus (Forts.):
- „ hoyi Peckham 1883 = Evarcha leucophaea (C. L. Koch) 1846
- „ hungaricus Kulczynski 1891 = Sitticus hungaricus (Kulczynski) 1891
- „ hunterii Audouin 1827 = Menemerus hunterii (Audouin) 1827
- „ hypaticus Walckenaer 1847 = nicht zu deuten!
- „ ictericus Walckenaer 1837 = Maevia vittata (Hentz) 1846
- „ igneus Walckenaer 1837 = Amycus igneus (Perty) 1833
- „ ignifrons Grube 1861 = Pellenes ignifrons (Grube) 1861
- „ illibatus Simon 1868, 1871 = Attulus illibatus (Simon) 1868
- „ illigerii Audouin 1827 = Menemerus illigerii (Audouin) 1827
- „ imitatus Simon 1868, 1871 = Euophrys imitata (Simon) 1868
- „ imperialis Rossi 1846, Simon 1871 = Thyene imperialis (Rossi) 1846
- „ imperialis Peckham 1888 = Dendryphantes mannii (Peckham) 1901
- „ inaequalipes Simon 1868 = Attulus inaequalipes (Simon) 1868
- „ inaequipes Simon 1876 = Attulus inaequalipes (Simon) 1868
- „ incertus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ inclemens Walckenaer 1837 = ? Maevia vittata (Hentz) 1846
- „ infestus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ infuscatus Peckham 1896 = nicht zu deuten!
- „ innotatus Simon 1868, 1871 = Euophrys innotata (Simon) 1868
- „ inquies Walckenaer 1837 = Thiodina sylvana (Hentz) 1846
- „ insidiosus Walckenaer 1837 = Dendryphantes insidiosus (Walckenaer) 1837
- „ insignitus Sundevall 1832, Simon 1868 = Aelurillus litera v-insignitus (Clerck) 1757
- „ insolens Hentz 1845 = Dendryphantes insolens (Hentz) 1845
- „ investigator Walckenaer 1837 = Dendryphantes investigator (Walckenaer) 1837
- „ iricolor Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ iris Walckenaer 1837 = Dendryphantes aurantius (Lucas) 1833
- „ irroratus Walckenaer 1837 = Thiodina puerpera (Hentz) 1846
- „ johannae Butler 1879 = nicht zu deuten!
- „ johnsonii Peckham 1883 = Dendryphantes johnsonii (Peckham) 1883
- „ jucundus Simon 1871 = Evarcha jucunda (Lucas) 1846
- „ juventus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ kessleri Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
- „ kirkii Urquhart 1892 = Trite auricoma (Urquhart) 1885
- „ kotschii Rossi 1846 = nicht zu deuten!
- „ laetabundus Westring 1862 = Euophrys poecilopus (Thorell) 1873
- „ laetabundus Simon 1868 = Euophrys laetabunda (C. L. Koch) 1848
- „ laevigatus Simon 1858 = Pellenes laevigatus (Simon) 1868
- „ laniger Simon 1871 = Euophrys lanigera (Simon) 1871
- „ lanipes Simon 1871 = Carrhotus xanthogramma (Walckenaer) 1825
- „ lapponicus Sundevall 1832 = Pellenes lapponicus (Sundevall) 1832
- „ latifasciatus Simon 1868 = Habrocestum latifasciatum (Simon) 1868
- „ latus Walckenaer 1837 = Dendryphantes latus (Walckenaer) 1837
- „ lectus Thorell 1875 = Sitticus dzieduszyckii (L. Koch) 1870
- „ legibilis Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ lemniscus Simon 1868 = Dendryphantes hastatus (Clerck) 1757
- „ lentus Walckenaer 1837 = Marpissa undata (De Geer) 1778
- „ leopardus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ leopardus Hentz 1846 = Phlegra fasciata (Hahn) 1826
- „ lepidus Walckenaer 1837 = Zenodorus lepidus (Guérin) 1834
- „ leporinus L. Koch 1867 = Cyrba algerina (Lucas) 1846
- „ lestus Thorell 1875 = Sitticus dzieduszyckii (L. Koch) 1870
- „ lethierryi Taczanowski 1871 = nicht zu deuten! (Lurio ??)
- „ leucomelas Rossi 1846 = nicht zu deuten!
- „ levaillantii Lucas 1846 = Pellenes levaillantii (Lucas) 1846
- „ levis Simon 1871 = Neon levis (Simon) 1871

Attus (Forts.):

„ ligo Waldkenaer 1837, Taczanowski 1871 = Plexippus paykullii (Audouin) 1827
„ limbatus Waldkenaer 1837 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
„ limbatus Waldkenaer 1847 = nicht zu deuten!
„ limbatus Karsch 1878 = nicht zu deuten!
„ linearis Rossi 1846 = Phlegra bresnieri (Lucas) 1846
„ lineatus Vinson 1863 = Beata lineata (Vinson) 1863
„ lineatus Simon 1868 = Phlegra lineata (C. L. Koch) 1848
„ lineolatus Sundevall 1832 = Salticus cingulatus (Panzer) 1797
„ lineolatus Grube 1861 = nicht zu deuten!
„ lippiens L. Koch 1867 ♂, Simon 1868, 1871 = Phlegra bresnieri (Lucas) 1846
„ lippiens L. Koch 1867 ♀ = Pellenes diagonalis (Simon) 1868
„ litteratus Waldkenaer 1805, 1837 = Aelurillus littera v-insignitus (Clerck) 1757
„ litteratus Simon 1868 = Aelurillus festivus (C. L. Koch) 1839
„ locustoides Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ longimanus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ longipes Canestrini 1873, 1874, Simon 1876 = Sitticus longipes (Canestrini) 1873
„ lucasii Simon 1868 = Icius hamatus (C. L. Koch) 1846
„ luctuosus Simon 1868 = Aelurillus luctuosus (Lucas) 1846
„ ludio Simon 1871 = Euophrys aequipes ludio (Simon) 1871
„ lugubris Vinson 1863 = Hyllus lugubris (Vinson) 1863
„ lunulatus Waldkenaer 1805, 1837 = Dendryphantes hastatus (Clerck) 1757
„ luridatus Simon 1868 = Euophrys luridata (Simon) 1868
„ luteofasciatus Simon 1871 = Phlegra subfasciata (Simon) 1868
„ luteolineatus Simon 1871 = Euophrys luteolineata (Simon) 1871
„ maculatus Waldkenaer 1837 = Pseudicius encarpatus (Waldkenaer) 1802
„ maculosus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ madagascariensis Vinson 1863 = Hyllus madagascariensis (Vinson) 1863
„ maderianus Warburton 1892 = Pseudeuophrys vafra (Blackwall) 1867
„ magus Waldkenaer 1837 = ? Corythalia aurata (Hentz) 1846
„ mancus Thorell 1873 = Sitticus mancus (Doleschall) 1852
„ mandibularis Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ manicatus Simon 1871 = Euophrys manicata (Simon) 1871
„ mannii Doleschall 1852, Simon 1868 = Sitticus mannii (Doleschall) 1852
„ mannii Peckham 1883 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
„ margaritaceus Hasselt 1893 = nicht zu deuten!
„ marginatus Waldkenaer 1837 = Dendryphantes marginatus (Waldkenaer) 1837
„ marmottanii Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ maronicus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ mccookii Peckham 1883 = Dendryphantes mccookii (Peckham) 1883
„ medius Westring 1862, Simon 1868 = Dendryphantes hastatus (Clerck) 1757
„ melanognathus Lucas 1838 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
„ melanopus Giebel 1863 = nicht zu deuten!
„ membrosus Simon 1868, 1871 = Neaetha membrosa (Simon) 1868
„ memorabilis Cambridge 1876 = Mithion memorabilis (Cambridge) 1876
„ memorialis Cambridge 1876 = Phlegra memorialis (Cambridge) 1876
„ mendax Cambridge 1876 = Langona mendax (Cambridge) 1876
„ mendicus Cambridge 1876 = nicht zu deuten!
„ metallicus Giebel 1863 = nicht zu deuten!
„ milberti Waldkenaer 1837 = Marpissa undata (De Geer) 1778
„ militaris Hentz 1846 = Dendryphantes marginatus (Waldkenaer) 1837
„ miniaceus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ miniatus Peckham 1883 = Dendryphantes miniatus (Peckham) 1883
„ minutus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ miser Simon 1868, 1871 = Euophrys misera (Simon) 1868
„ mitratus Hentz 1846 = Hentzia mitrata (Hentz) 1846
„ mitratus L. Koch 1867, Simon 1868 = Evarcha jucunda (Lucas) 1846

Attus (Forts.):
- „ modestus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ monadnock Banks 1895 = Euophrys monadnock Emerton 1891
- „ monardi Simon 1868 = Aelurillus monardi (Lucas) 1846
- „ monticolus Urquhart 1890 = nicht zu deuten!
- „ montigenus Thorell 1875, Bösenberg 1903 = Sitticus montigenus (Thorell) 1875
- „ montinus Urquhart 1890 = nicht zu deuten!
- „ moreletii Simon 1868, 1871 = Thyene moreletii (Lucas) 1846
- „ morigerus Hentz 1846 = Hentzia mitrata (Hentz) 1846
- „ morosus Banks 1895 = Sitticus morosus (Banks) 1895
- „ morsitans Walckenaer 1837, 1847 = Dendryphantes variegatus (Lucas) 1833
- „ mouffetii Audouin 1827 = nicht zu deuten!
- „ multicolor Hentz 1845 = Dendryphantes aurantius (Lucas) 1833
- „ multipunctatus Simon 1868, 1871, Cambridge 1874 = Telamonia castriesiana (Grube) 1861
- „ multivagus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ multivagus Hentz 1846 = nicht zu deuten!
- „ murinus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ muscivorus Vinson 1863 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
- „ muscosus Sundevall 1832 = Dendryphantes hastatus (Clerck) 1757
- „ muscosus Westring 1851, 1862 = Marpissa muscosa (Clerck) 1757
- „ musivum Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ mustellatus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ mustellatus Simon 1868 = Aelurillus aeruginosus (Simon) 1871
- „ muticus Simon 1871 = Neon muticus (Simon) 1871
- „ myrmecinus Rossi 1847 = Leptorchestes cinctus (Dugès) 1835
- „ mystaceus Hentz 1846 = Dendryphantes mystaceus (Hentz) 1846
- „ naucus Simon 1868 = Sitticus mancus (Doleschall) 1852
- „ nebulosus Simon 1868 = Icius nebulosus (Simon) 1868
- „ neglectus Simon 1868 = Mogrus neglectus (Simon) 1868
- „ nervosus Simon 1868 = Philaeus nervosus (Simon) 1868
- „ nidicolens Walckenaer 1825, 1837, Simon 1871 = Dendryphantes nidicolens (Walckenaer) 1825
- „ niger Sundevall 1832 = Phlegra fasciata (Hahn) 1821
- „ niger Walckenaer 1837, Simon 1871, 1876 = Sitticus walckenaeri Roewer 1951
- „ niger Hentz 1845 = Maevia vittata (Hentz) 1845
- „ niger Westring 1862 = Salticus scenicus (Clerck) 1757
- „ niger Karsch 1878 = nicht zu deuten!
- „ nigerrimus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
- „ nigrifrons Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ nigripalpis Thorell 1877 = Pystira nigripalpis (Thorell) 1877
- „ nigritarsis Simon 1868 = Euophrys nigritarsis (Simon) 1868
- „ nigrociliatus L. Koch 1875 = Pellenes nigrociliatus (L. Koch) 1875
- „ nigrofemoratus L. Koch 1867 = nicht zu deuten!
- „ nigrofuscus Vinson 1863 = Hasarius adansonii (Audouin) 1827
- „ nitelinus Canestrini 1874, Simon 1868 = Dendryphantes nidicolens (Walckenaer) 1825
- „ nitellus Simon 1868, 1871 = Dendryphantes nidicolens (Walckenaer) 1825
- „ nitens Walckenaer 1847 = Dendryphantes nitens (C. L. Koch) 1846
- „ nitidus Simon 1868 = Heliophanus nitidus (Lucas) 1846
- „ nivosus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ nobilis Grube 1861 = nicht zu deuten!
- „ niveosignatus Simon 1880 = Attulus niveosignatus (Simon) 1880
- „ nobilitatus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ notabilis Simon 1871 = Icius notabilis (Simon) 1871
- „ nubilus Hentz 1846 = Dendryphantes nubilus (Hentz) 1846
- „ nudus Giebel 1863 = nicht zu deuten!
- „ nuttallii Hentz 1846 = Dendryphantes insignarius (C. L. Koch) 1846

Attus (Forts.):

- „ obscuroides Simon 1871 = Ballus obscuroides (Canestrini & Pavesi) 1868
- „ obscurus Taczanowski 1871 = Euophrys obscurus (Taczanowski) 1871
- „ obsoletus Simon 1868 = Euophrys obsoleta (Simon) 1868
- „ ocellosus Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ octavus Hentz 1846 = Dendryphantes capitatus (Hentz) 1846
- „ octopunctatus Peckham 1883 = Dendryphantes octopunctatus (Peckham) 1883
- „ oculatus Cambridge 1876 = Neaetha oculata (Cambridge) 1876
- „ ogieri Simon 1868 = Aelurillus ogieri (Simon) 1868
- „ olivaceus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
- „ opifex Mc Cook 1883 = Dendryphantes opifex (Mc Cook) 1883
- „ oppositus Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ opulentus Waldkenaer 1837 = Ascyltus opulentus (Waldkenaer) 1837
- „ ornaticeps Simon 1868 = Habrocestum ornaticeps (Simon) 1868
- „ ornatus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
- „ ostrinus Simon 1868 = Pellenes ostrinus (Simon) 1868
- „ otiosus Hentz 1846 = Dendryphantes opifex (Mc Cook) 1883
- „ paederinus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
- „ palustris Peckham 1883, 1888, Emerton 1891, 1902 = Sitticus palustris (Peckham) 1883
- „ papillonaceus L. Koch 1867, Simon 1868 = Habrocestum papillonaceum (L. Koch) 1867
- „ parallelus Waldkenaer 1837 = Myrmarachne parallela (Fabricius) 1798
- „ parcus Simon 1868 = Bianor albibimaculatus (Lucas) 1846
- „ parvus Hentz 1846 = Dendryphantes capitatus (Hentz) 1846
- „ pavesii Simon 1876 = Telamonia castriesiana (Grube) 1861
- „ paykullii Audouin 1827 et sequ. = Plexippus paykullii (Audouin) 1827
- „ penicillatus Simon 1875, 1876 et sequ. = Sitticus penicillatus (Simon) 1875
- „ peninsulanus Banks 1898 = Sitticus peninsulanus (Banks) 1898
- „ peregrinus Waldkenaer 1837 = Dendryphantes pulcher (Waldkenaer) 1837
- „ peregrinus Peckham 1883 = Pellenes viridipes (Hentz) 1846
- „ petrensis C. L. Koch, Westring 1851, 1862, Simon 1871 = Euophrys petrensis (C. L. Koch) 1837
- „ phrinoides Waldkenaer 1837 = Diolenius phrinoides (Waldkenaer) 1837
- „ phrygianus Simon 1868 = Dendryphantes nidicolens (Waldkenaer) 1825
- „ picaceus Simon 1868, 1870 = Pseudicius picaceus (Simon) 1868
- „ pictilis Simon 1871 = Pseudeuophrys pictilis (Simon) 1871
- „ pileatus Waldkenaer 1837 = Dendryphantes pileatus (Waldkenaer) 1837
- „ pilosus Waldkenaer 1837 = Dendryphantes pilosus (Waldkenaer) 1837
- „ pinus Peckham 1883 = Evarcha leucophaea (C. L. Koch) 1846
- „ pisculus L. Koch 1867 = Cytaea piscula (L. Koch) 1867
- „ pistacius Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ planus Taczanowski 1871 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
- „ platycephalus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
- „ plumosus Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ podagrosus Hentz 1846 = Dendryphantes insolens (Hentz) 1845
- „ polyphemus L. Koch 1867 = Opisthoncus polyphemus (L. Koch) 1867
- „ pomatius Waldkenaer 1805, 1837 = Marpissa pomatia (Waldkenaer) 1802
- „ porcatus Taczanowski 1871 = Hypaeus porcatus (Taczanowski) 1871
- „ praemandibularis Hasselt 1893 = Eupalina praemandibularis (Hasselt) 1893
- „ pratincola Simon 1868 = Sitticus truncorum (Linné) 1758
- „ princeps Peckham 1883 = Dendryphantes princeps (Peckham) 1883
- „ promptus Simon 1871 = Marpissa pomatia (Waldkenaer) 1802
- „ protervus Waldkenaer 1837 (p. 443) = ? Dendryphantes capitatus (Hentz) 1845
- „ protervus Waldkenaer 1837 (p. 465), Chamberlin & Ivie 1944 = nicht zu deuten!
- „ provocator Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ psammodes Thorell 1875 = Sitticus psammodes (Thorell) 1875
- „ psyllus Waldkenaer 1837, 1847 = Pellenes tripunctatus (Waldkenaer) 1802

Attus (Forts.):

„ pubescens Hahn 1826, Westring 1862 et sequ. = Sitticus truncorum (Linné) 1758
„ pubescens Sundevall 1832 = Sitticus littoralis (Hahn) 1831
„ puerperus Hentz 1846 = Thiodina puerpera (Hentz) 1846
„ pugnax Waldkenaer 1847 = Dendryphantes pugnax (C. L. Koch) 1846
„ pulchellus Hahn 1829, Simon 1868 = Pseudicius encarpatus (Waldkenaer) 1802
„ pulcher Waldkenaer 1837 = Dendryphantes pulcher (Waldkenaer) 1837
„ pulex Hentz 1846 = Habrocestum pulex (Hentz) 1846
„ pulex Simon 1868 = Attulus pusio (Simon) 1871
„ pullus Urquhart 1889 = nicht zu deuten!
„ pulverulentus Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ purpurarius Waldkenaer 1837 = Dendryphantes purpurarius (Waldkenaer) 1837
„ purpuratus Waldkenaer 1841 = nicht zu deuten!
„ pusio Simon 1871 = Attulus pusio (Simon) 1871
„ putnamii Peckham 1883 = Dendryphantes putnamii (Peckham) 1883
„ quadratarius L. Koch 1867 = Opisthoncus quadratarius (L. Koch) 1867
„ quadrifasciatus Grube 1861 = Philaeus quadrifasciatus (Grube) 1861
„ quadriguttatus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ quadrilineatus Peckham 1883 = Fuentes lineata (C. L. Koch) 1848
„ quadrimaculatus Waldkenaer 1837 = Phiale quadrimaculata (Waldkenaer) 1837
„ quadripunctatus Waldkenaer 1847 = nicht zu deuten!
„ quaternus Waldkenaer 1837 part. = ? Agassa cyanea (Hentz) 1846
„ quaternus Waldkenaer 1837 part. = Zygoballus quaternus (Waldkenaer) 1837
„ quinquefidus Waldkenaer 1847 = Aelurillus litera v-insignitus (Clerck) 1757
„ quinquefoveolatus Doleschall 1852 = nicht zu deuten!
„ quinquepartitus Waldkenaer 1805 = Aelurillus litera v-insignitus (Clerck) 1757
„ quinquetesseratus Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ quoyi Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ radiatus Grube 1859 = Marpissa radiata (Grube) 1859
„ radoszkowskii Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ rapax Thorell 1873 = Sitticus rapax (Thorell) 1873
„ rarus Hentz 1846 = nicht zu deuten!
„ ravidus Simon 1868, 1871 = Dendryphantes ravidus (Simon) 1868
„ ravus Urquhart 1892 = Jotus ravus (Urquhart) 1892
„ ravus Bösenberg 1895 = nicht zu deuten!
„ rayi Simon 1875 = Neon rayi (Simon) 1875
„ redii Audouin 1827 = Langona redii (Audouin) 1827
„ regillus L. Koch 1867, Simon 1868, Cambridge 1878 = Thyene imperialis (Rossi) 1846
„ regius Waldkenaer 1847 = Dendryphantes regius (C. L. Koch) 1846
„ retiarius Hentz 1850 = Thiodina sylvana (Hentz) 1846
„ reticulatus Simon 1868 = Neon reticulatus (Blackwall) 1853
„ ricinatus Simon 1868 = Pellenes lapponicus (Sundevall) 1832
„ rimator Waldkenaer 1837 = ? Dendryphantes clarus (Keyserling) 1885
„ riparius Simon 1868 = Sitticus caricis (Westring) 1862
„ rogenhoferi Simon 1868 = Phlegra rogenhoferi (Simon) 1868
„ roseus Hentz 1846 = Pellenes decorus (Blackwall) 1846
„ rubescens Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ ruber Waldkenaer 1837 = Cytaea rubra (Waldkenaer) 1837
„ rubriceps Taczanowski 1871 = Phiale rubriceps (Taczanowski) 1871
„ rudis Sundevall 1832 = Dendryphantes hastatus (Clerck) 1757
„ rufibarbis Simon 1868 = Euophrys rufibarbis (Simon) 1868
„ ruficarpus Simon 1884 = Attulus ruficarpus (Simon) 1884
„ ruficeps Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ rufifrons Sundevall 1832 = Pellenes tripunctatus (Waldkenaer) 1802
„ rufimanus Simon 1875 = Euophrys rufimana (Simon) 1875
„ rufipes Simon 1868 = Ballus rufipes (Simon) 1868

Attus (Forts.):
„ rufus Hentz 1846 = nicht zu deuten!
„ rupicola Hentz 1846 = Marpissa undata (De Geer) 1778
„ rupicola Simon 1871, 1876, Chyzer & Kulczynski 1891, Bösenberg 1903 = Sitticus rupicola (C. L. Koch) 1837
„ rusticanus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ rusticolus Peckham 1883 = nicht zu deuten!
„ saevus Giebel 1863 = Rhene saeva (Giebel) 1863
„ sagax Walckenaer 1837 = Dendryphantes sagax (Walckenaer) 1837
„ saliens Simon 1885 = Attulus saliens (Cambridge) 1876
„ saltator Simon 1868, 1876 et sequ. = Sitticulus saltator (Simon) 1868
„ salutanus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ sanguinolentus Walckenaer 1805, 1837, Simon 1868 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
„ satageus Simon 1868 = Pseudeuophrys bimaculata (Simon) 1868
„ saxatilis Urquhart 1885 = Clynotis saxatilis (Urquhart) 1885
„ saxicola Simon 1868, Bösenberg 1903 = Sitticus littoralis (Hahn) 1831
„ scalaris Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ scenicoides Walckenaer 1837 = Dendryphantes latus (Walckenaer) 1837
„ scenicus Walckenaer 1805, 1837, Hahn 1826, Sundevall 1832 = Salticus scenicus (Clerck) 1757
„ scenicus Westring 1862 = Salticus olearii (Scopoli) 1763
„ scindus Urquhart 1889 = nicht zu deuten!
„ scriptus Simon 1868, 1871 = Saitis barbipes (Simon) 1868
„ scrutator Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ sedulus Simon 1875 = Euophrys sedula (Simon) 1875
„ seguipes Simon 1868 = Ballus biimpressus (Doleschall) 1852
„ semiater Doleschall 1852 (Fig.) = nicht zu deuten!
„ semiater Simon 1868, 1871 = Pellenes arcigerus (Walckenaer) 1837
„ semiglabratus Simon 1868, 1871 = Phlegra semiglabrata (Simon) 1868
„ semilimbatus Hahn 1829, Walckenaer 1837 = Menemerus semilimbatus (Hahn) 1829
„ seniculus Rossi 1846 = nicht zu deuten!
„ septemguttatus Taczanowski 1871 = Phiale septemguttata (Taczanowski) 1871
„ sericatus Thorell 1875 = Pellenes sericatus (Thorell) 1875
„ sericeus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ sexfasciatus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ sexpunctatus Hentz 1845 = Zygoballus sexpunctatus (Hentz) 1845
„ sexpunctatus Simon 1868 = Dendryphantes ravidus (Simon) 1868
„ sexsignatus Franganillo 1910, 1925 = Sitticus sexsignatus (Franganillo) 1910
„ sierranus Simon 1868 = Phlegra sierrana (Simon) 1868
„ signatus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ similis Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ simoni Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ sinister Hentz 1850 = nicht zu deuten!
„ sloani Hahn 1829 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
„ smaragdinus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ solaris Menge 1877 = Attulus helveolus (Simon) 1871
„ soldanii Audouin 1827 = Menemerus soldanii (Audouin) 1827
„ solskii Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ speculator Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ spinicrus Simon 1871 = Aelurillus spinicrus (Simon) 1871
„ spinipes Taczanowski 1871 = Capidava spinipes (Taczanowski) 1871
„ splendens Peckham 1883 = Pellenes decorus (Blackwall) 1946
„ splendens Rainbow 1896 = Saitis rainbowi Roewer 1951
„ splendens Simon 1901 = Saitis splendidus (Walckenaer) 1837
„ splendidus Walckenaer 1837 = Saitis splendidus (Walckenaer) 1837
„ strenuus Grube 1861 = nicht zu deuten!

Attus (Forts.):
„ striatus Sundevall 1832 = Marpissa muscosa (Clerck) 1757
„ striatus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ striatus Simon 1868 = Icius hamatus (C. L. Koch) 1846
„ strigipes Westring 1862 = Marpissa radiata (Grube) 1859
„ striolatus C. L. Koch 1848, Simon 1868 = Euophrys striolata (C. L. Koch) 1848
„ striolatus Westring 1862 = Euophrys maculata (Wider) 1834
„ subfasciatus Simon 1868 = Phlegra subfasciata (Simon) 1868
„ subflavus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ subfuscus Urquhart 1886 = nicht zu deuten!
„ subsultans Simon 1868 = Pellenes geniculatus subsultans (Simon) 1868
„ succinctus Doleschall 1857 = Hyllus janthinus (C. L. Koch) 1846
„ suffuscus Urquhart 1892 = Trite auricoma (Urquhart) 1886
„ sulphureus L. Koch 1867, Simon 1868 = Euophrys sulphurea (L. Koch) 1867
„ sulphureociliatus Simon 1871 = Euophrys sulphurea (L. Koch) 1867
„ sumptuosus Walckenaer 1837 = Psecas sumptuosa (Perty) 1833
„ superbus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ superciliatus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ superciliosus Hentz 1846 = Tutelina elegans (Hentz) 1846
„ sylvanus Hentz 1846 = Thiodina sylvana (Hentz) 1846
„ sylvestris Emerton 1891 = Sitticus palustris (Peckham) 1883
„ taczanowskii Simon 1868, 1871 = Evarcha taczanowskii (Simon) 1868
„ taeniatus L. Koch 1867 = Menemerus taeniatus (L. Koch) 1867
„ taeniolus Hentz 1845, Hasselt 1887 = Fuentes taeniola (Hentz) 1845
„ tamatavi Vinson 1863 = Thyene tamatavi (Vinson) 1863
„ tantulus Simon 1868, 1871 = Bianor aurocinctus tantulus (Simon) 1868
„ tardigradus Walckenaer 1805, 1837 = Marpissa muscosa (Clerck) 1757
„ tardigradus Audouin 1827 = Hasarius adonsonii (Audouin) 1827
„ tauricus Thorell 1875 = Pellenes tauricus (Thorell) 1875
„ taurinus Rossi 1846 = nicht zu deuten!
„ tenebrosus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ tenebrosus Urquhart 1893 = nicht zu deuten!
„ tenuis Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ terebratus Sundevall 1832 et sequ. = Sitticus terebratus (Clerck) 1757
„ terrestris Simon 1871 = Euophrys terrestris (Simon) 1871
„ tibialis Peckham 1883 = Tutelina elegans (Hentz) 1846
„ tigrinus Walckenaer 1837, Westring 1862 = Pseudeuophrys callida (Walckenaer) 1802
„ togatulus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ trematus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ triangulifer Simon 1868, 1871 = Pseudeuophrys bimaculata (Simon) 1868
„ tricinctus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ tridentiger Walckenaer 1837 = Dendryphantes tridentiger (Walckenaer) 1837
„ trilineatus Rossi 1846 = nicht zu deuten!
„ tripunctatus Walckenaer 1805, 1837 = Pellenes tripunctatus (Walckenaer) 1802
„ tripunctatus Hentz 1846, Peckham 1883 = Dendryphantes audax (Hentz) 1845
„ trivittatus Taczanowski 1871 = Shira trivittata (Taczanowski) 1871
„ uassanus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ undatus Walckenaer 1837 = Marpissa undata (De Geer) 1778
„ univittatus Simon 1871 = Pseudomogrus univittatus (Simon) 1871
„ valentulus Urquhart 1890 = nicht zu deuten!
„ vanus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ variabilis Vinson 1863 = nicht zu deuten!
„ varicans Thorell 1881 = Hasarius varicans (Thorell) 1881
„ varicus Simon 1868 = Philaeus varicus (Simon) 1868
„ venator Walckenaer 1837 = Synageles venator (Lucas) 1836
„ vernus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ verrauxii Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!

Attus (Forts.):
„ versicolor Waldkenaer 1847 = Chrysilla versicolor (C. L. Koch) 1846
„ vestitus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ vicinus Simon 1868 = Icius hamatus (C. L. Koch) 1846
„ viduus Waldkenaer 1847 = Carrhotus viduus (C. L. Koch) 1846
„ viduus Kulczynski 1895 = Sitticus sibiricus Roewer 1951
„ vilis Kulczynski 1895 = Sitticus vilis (Kulczynski) 1895
„ villosus Lucas 1838 = nicht zu deuten!
„ v-insignitus Westring 1862 = Aelurillus litera v-insignitus (Clerck) 1757
„ virgulatus Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ viridimanus Doleschall 1852 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
„ viridipes Hentz 1846 = Pellenes viridipes (Hentz) 1846
„ viridis Waldkenaer 1837 = Lyssomanes viridis (Waldkenaer) 1837
„ vittatus Hentz 1845 = Maevia vittata (Hentz) 1845
„ volupe Karsch 1879 = nicht zu deuten!
„ vulpes Grube 1861 = nicht zu deuten!
„ vulpinus Westring 1851, 1862 = Ballus vulpinus (Westring) 1851
„ wagae Simon 1871 = Sitticus dzieduczyckii (L. Koch) 1870
„ wagae Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ waleckii Taczanowski 1871 = Corythalia waleckii (Taczanowski) 1871
„ wankowiczi Simon 1868 = nicht zu deuten!
„ westringii Simon 1868 = Euophrys westringii (Simon) 1868
„ xanthogramma Waldkenaer 1825, 1837 = Carrhotus xanthogramma (Waldkenaer) 1825
„ xanthomelas Waldkenaer 1847, Simon 1868 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
„ xanthomelas Waldkenaer 1847 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
„ zanthefrontalis Urquhart 1884 = nicht zu deuten!
„ zimmermanni Simon 1877 et sequ. = Sitticus zimmermanni (Simon) 1877
„ zonarius Nicolet 1849 = nicht zu deuten!

Atypa siehe **Atypus**

Atypoides:
„ californicus Banks 1896 = Aliatypus californicus (Banks) 1896

Atypus (= Atypa):
„ affinis cedrorum Simon 1888 = Atypus affinis Eichwald 1830
„ affinis major Simon 1909 = Atypus affinis Eichwald 1830
„ anachoreta Ausserer 1871 = Atypus affinis Eichwald 1830
„ blackwalli Simon 1873 = Atypus affinis Eichwald 1830
„ bleodonticus Simon 1873 = Atypus affinis Eichwald 1830
„ coriaceus Simon 1881 = Atypus affinis Eichwald 1830
„ limbatus Risso 1828 = nicht zu deuten!
„ piceus Herman 1879 = Atypus muralis Bertkau 1890
„ sulzeri Latreille 1806 = Atypus affinis Eichwald 1830
„ sulzeri Hahn 1820, 1831 = Atypus piceus (Sulzer) 1776

Augusta:
„ papilionacea Cambridge 1877, Millot 1948 = Gasteracantha glyphica Guérin 1839

Aulonia:
„ aurantiaca Emerton 1885 = Pardosops aurantiaca (Emerton) 1885
„ funerea Banks 1898 = Allocosa evagata (Chamberlin) 1908
„ humicola Montgomery 1904 = Allocosa minuta (Emerton) 1885
„ micarioides L. Koch 1877 = Venonia micarioides (L. Koch) 1877

Aussereria:
„ insignis Holmberg 1881 = Actinopus insignis (Holmberg) 1881

Austrocantha:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Gasteracantha**

Auximus:
„ latescens Chamberlin 1919 = Walmus latescens (Chamberlin) 1919
„ pallescens Chamberlin 1920 = Callobius pallescens (Chamberlin) 1920
„ pristinus Simon 1910 = Lathys narbonensis (Simon) 1876

Avella:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Menneus**
Avicularia:
„ andalusiaca Simon 1873 = Ischnocolus andalusiacus (Simon) 1873
„ maroccana Simon 1873 = Ischnocolus maroccanus (Simon) 1873
„ striatocauda Simon 1873 = Chaetopelma olivaceum (C. L. Koch) 1842
„ tetramera Simon 1873 = Cratorrhagus tetramerus (Simon) 1873
„ vestiaria Ausserer 1871 = Avicularia avicularia (Linnè) 1758
„ vulpina Ausserer 1871 = Avicularia avicularia (Linné) 1758
Aysha:
„ incursa Chamberlin 1920 = Aysha decepta (Banks) 1899
„ mundella Chamberlin 1920 = Aysha decepta (Banks) 1899
„ orlandensis Tullgren 1901 = Aysha gracilis (Hentz) 1847
„ quelchii Pocock 1895 = Anyphaena quelchii (Pocock) 1895
„ septena Franganillo 1934 = nicht zu deuten!
„ striata Banks 1909 = Anyphaena gracilis (Hentz) 1847
Badumna:
„ scylla Hogg 1909 = Ixeuticus rubrioides (Hogg) 1909
„ subfasciata Simon 1899 = Ixeuticus subfasciatus (Simon) 1899
Baerella:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Synema**
„ albolimbata Dahl 1907 = Diaea albolimbata L. Koch 1875
„ imitator Dahl 1907, Caporiacco 1940 = Synema imitatrix (Pavesi) 1883
Ballus (= Balla):
„ aenescens Thorell 1873, Simon 1876, Dahl 1883 = Bianor aurocinctus (Ohlert) 1867
„ angulosus Karsch 1879 = Simaetha angulosa (Karsch) 1879
„ brachiatus Thorell 1877 = Harmochirus brachiatus (Thorell) 1877
„ compactus Urquhart 1891 = Bianor compactus (Urquhart) 1884
„ concolor Keyserling 1882 = Bianor concolor (Keyserling) 1882
„ depressus Simon 1876 et sequ. = Ballus chalybeius (Walckenaer) 1802
„ depressus seguipes Simon 1937 = Ballus biimpressus (Doleschall) 1852
„ heterophthalmus C. L. Koch 1850, Simon 1864 = Ballus chalybeius (Walckenaer) 1802
„ membrosus Thorell 1875 = Neaetha membrosa (Simon) 1868
„ obscurus Menge 1887 = Ballus chalybeius (Walckenaer) 1802
„ papuanus Thorell 1892 = Porius papuanus (Thorell) 1892
„ pratensis Simon 1864 = Euophrys petrensis C. L. Koch 1837
„ seguipes Lessert 1910 = Ballus biimpressus (Doleschall) 1852
„ tantulus Simon 1876 = Bianor aurocinctus tantulus (Simon) 1868
Balmaceda:
„ peckhami Chickering 1946 = Balmaceda chickeringi Roewer 1951
„ punctata F. Cambridge 1901 et sequ. = Breda punctata (Peckham) 1894
Barronopsis:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Agelenopsis**
Baryphyma:
„ schlicki Simon 1884, 1894 = Baryphyma pratensis (Blackwall) 1861
Bassania:
„ aemula Cambridge 1898, Strand 1926 = Coriarachne aemula (Cambridge) 1898
Bathyphantes:
„ alpinus Emerton 1882 = Lepthyphantes alpinus (Emerton) 1882
„ alpinus Banks 1892 = Lepthyphantes zebra (Emerton) 1882
„ anglicanus Banks 1899 = Ceratinopsis anglicanus (Hentz) 1850
„ angulipalpis Menge 1866 = Lepthyphantes angulipalpis (Westring) 1851
„ approximatus Simon 1884, Chyzer & Kulczynski 1894 = Stylophora approximata (Cambridge) 1870
„ arboreus Emerton 1915 = Lepthyphantes arboreus (Emerton) 1915
„ arcticus Strand 1911 = Bathyphantes strandi (Charitonow) 1928

Bathyphantes (Forts.):

„ argenteomaculatus Banks 1892 = Lepthyphantes zebra (Emerton) 1882
„ bicolor Bertkau 1880 = Centromerita bicolor (Blackwall) 1833
„ bihamatus Emerton 1882 = Lepthyphantes bihamatus (Emerton) 1882
„ brevipalpus Menge 1866 ♂ = Centromerus aequalis (Westring) 1862
„ brevipalpus Menge 1866 ♀ = Macrargus rufus (Wider) 1834
„ burgundicus Simon 1884 = Bathyphantes gracilis (Blackwall) 1841
„ calcaratus Emerton 1909 = Lepthyphantes calcaratus (Emerton) 1909
„ capucinus Bösenberg 1901 = Centromerus capucinus (Simon) 1884
„ charpentieri Lebert 1877 = Porrhomma microphthalmum (Cambridge) 1870
„ circumspectus Bösenberg 1901 = Bathyphantes gracilis (Blackwall) 1841
„ collinus Bertkau 1883 = Lepthyphantes collinus (L. Koch) 1872
„ comatus Menge 1867 = Centromerita bicolor (Blackwall) 1833
„ complicatus Emerton 1882, Banks 1892 = Lepthyphantes complicatus (Emerton) 1882
„ concolor Simon 1884 et sequ. = Stylophora concolor (Wider) 1834
„ conicus Crosby & Bishop 1928 = Stylophora concolor (Wider) 1834
„ cristatus Menge 1866 = Lepthyphantes cristatus (Menge) 1866
„ crucifer Menge 1866 = Bolyphantes crucifer (Menge) 1866
„ cyaneonitens Kulczynski 1887 = Theonina cornix (Simon) 1881
„ dorsalis Simon 1884 et sequ. = Stylophora dorsalis (Wider) 1834
„ duplicatus Emerton 1913 (part.), Jackson 1923 = Lepthyphantes duplicatus (Emerton) 1913 ♂
„ duplicatus Emerton 1913 (part.) = Lepthyphantes whashingtoni Zorsch 1937
„ flavipes Simon 1884 = Stylophora flavipes (Blackwall) 1854
„ furcatus Emerton 1913 = Lepthyphantes furcatus (Emerton) 1913
„ hallingdaliensis Strand 1926 = ? Lepthyphantes angulipalpis (Westring) 1851
„ holnacus Miller 1937 = Bathyphantes setiger F. Cambridge 1894
„ humilis Rainbow 1920 = Bathyphantes rainbowi Roewer 1942
„ inermis Lebert 1877 = Macrargus rufus (Wider) 1834
„ infimus Strand 1926 = Lepthyphantes angulipalpis (Westring) 1851
„ keyserlingi Bertkau 1883 = Lepthyphantes keyserlingi (Ausserer) 1867
„ leprosus Bertkau 1883 = Lepthyphantes leprosus (Ohlert) 1867
„ longipes Menge 1866 = Bathyphantes gracilis (Blackwall) 1841
„ luteolus Crosby & Bishop 1928 = Microneta luteola Banks 1892
„ mastodon Simon 1884 et sequ. = Theonina cornix (Simon) 1881
„ minutus Emerton 1882, 1902 = Lepthyphantes minutus (Blackwall) 1833
„ miser Bösenberg 1901 = Lepthyphantes miser (Cambridge) 1882
„ nebulosus Emerton 1882 = Lepthyphantes nebulosus (Sundevall) 1830
„ nigrinus Simon 1884 et sequ. = Stylophora nigrina (Westring) 1851
„ obscurus Bertkau 1883 = Lepthyphantes obscurus (Blackwall) 1841
„ occidentalis Emerton 1915 = Lepthyphantes fructuosus (Keyserling) 1886
„ pabulator Bertkau 1883 = Centromerus pabulator (Cambridge) 1875
„ pallescens Menge 1866 = Macrargus rufus (Wider) 1834
„ pallidus Banks 1892 = Bathyphantes pallescens Banks 1910
„ parvulus Simon 1884, F. Cambridge 1892 = Bathyphantes gracilis (Blackwall) 1841
„ patens Cambridge 1907 = Lepthyphantes relativus (Cambridge) 1879
„ pullatus Simon 1884 et sequ. = Stylophora flavipes (Blackwall) 1854
„ pygmaeus Menge 1866 = Lepthyphantes pygmaeus (Menge) 1866
„ pygmaeus Lebert 1877, Calloni 1889 = nicht zu deuten!
„ recurvatus Emerton 1913 = Aigola recurvata (Emerton) 1913
„ robustus Strand 1899, 1901 = Centromerus robustus (Westring) 1851
„ sabulosus Petrunkevitch 1911 = Lepthyphantes sabulosus (Keyserling) 1886
„ sabulosus Banks 1892 = Lepthyphantes zebra (Emerton) 1882
„ setipalpis Menge 1866 = Centromerus sylvaticus (Blackwall) 1841
„ subalpinus Emerton 1882 = Lepthyphantes subalpinus (Emerton) 1882
„ taczanowskii Simon 1884 = Lepthyphantes taczanowskii (Cambridge) 1873

Bathyphantes (Forts.):
„ terricola Menge 1866 = Stylophora nigrina (Westring) 1851
„ terricolus Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ theridiformis Emerton 1911 = Lepthyphantes theridiformis (Emerton) 1911
„ thoracicus Bertkau 1883 = Labulla thoracica (Wider) 1834
„ variegatus Simon 1884, Becker 1896 = Poeciloneta variegata (Blackwall) 1841
„ vilis Simon 1884 = Bathyphantes gracilis (Blackwall) 1841
„ wana Chamberlin 1925 = Microneta fabra (Keyserling) 1886
„ zebra Emerton 1882 = Lepthyphantes zebra (Emerton) 1882
„ zebrinus Menge 1866 = Lepthyphantes zebrinus (Menge) 1866
„ zebrinus Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ zygios Crosby & Bishop 1928 = Lepthyphantes zygios (Keyserling) 1886

Bavia:
„ albolineata Peckham 1885 = Cynapes albolineatus (Peckham) 1885
„ ornata Peckham 1885 = Empanda ornata (Peckham) 1885

Beata:
„ magna Banks 1929 = Dryphias maccuni (Peckham) 1895

Bedriacum:
„ praedator Cambridge 1898 = Strotarchus praedator (Cambridge) 1898

Belisana:
„ tauricornis Thorell 1898 = Uthina tauricornis (Thorell) 1898

Bellinda:
„ larvata Keyserling 1884 = Conopistha (Argyrodina) cancellata (Hentz) 1850

Berlandia:
„ asiatica Dalmas 1921 = Berlandina asiatica (Bösenberg & Strand) 1906
„ atlantica Dalmas 1921 = Berlandina atlantica (Dalmas) 1921
„ cinerea Dalmas 1921 = Berlandina cinerea (Menge) 1872
„ corcyrea Dalmas 1921 = Berlandina corcyrea (Cambridge) 1874
„ deserticola Dalmas 1921 = Berlandina deserticola (Dalmas) 1921
„ drassodea Caporiacco 1934 = Berlandina drassodea (Caporiacco) 1934
„ meruana Dalmas 1921 = Berlandina meruana (Dalmas) 1921
„ nubivaga Dalmas 1921, Schenkel 1926 = Berlandina nubivaga (Simon) 1878
„ plumalis Dalmas 1921, Schenkel 1936 = Berlandina plumalis (Cambridge) 1872
„ punica Dalmas 1921 = Berlandina punica (Dalmas) 1921
„ venatrix Dalmas 1921 = Berlandina venatrix (Cambridge) 1874

Bianor:
„ aenescens Lessert 1910, Simon 1901, 1937 = Bianor aurocinctus (Ohlert) 1867
„ balius Thorell 1890, 1892, Simon 1901 = Stertinius balius (Thorell) 1890
„ incitatus Thorell 1890, 1892, Simon 1901 = Stertinius incitatus (Thorell) 1890
„ leucostictus Thorell 1890, 1892 = Stertinius leucostictus (Thorell) 1890
„ magnus Simon 1901 = Beata magna Peckham 1895

Bion:
„ brevis Cambridge 1898 = Witica talis Cambridge 1895

Bizone:
„ longiventris Simon 1903 = Bizonella longiventris (Simon) 1903

Blaniargus:
Alle Arten sind unter **Micrargus** aufzuführen.
„ inconsta Simon 1926 = Micrargus (Blaniargus) incomtus (Cambridge) 1872
„ subaequalis Hull 1932 = Nothocyba subaequalis (Westring) 1851

Boebe:
„ benevola Cambridge 1885 = Evippa benevola (Cambridge) 1885

Bolepthyphantes:
„ index Strand 1901 = Bolyphantes index (Thorell) 1856
„ lofotensis Strand 1901 = Lepthyphantes lofotensis (Strand) 1901

Bolostromus:
„ brevipes Karsch 1879 = Ancylotrypa brevipes (Karsch) 1879
„ fluviatilis Banks 1892, Petrunkevitch 1911 = Myrmekiaphila fluviatilis (Hentz) 1850

Bolostromus (Forts.):
„ fodiens Thorell 1899 = Ancylotrypa fodiens (Thorell) 1899
„ fossor Simon 1892 = Ancylotrypa fossor Simon 1888
„ spinosa Simon 1892 = Ancylotrypa spinosa Simon 1888

Bolyphantes:
„ alpestris Ohlert 1867 = Bolyphantes alticeps (Sundevall) 1832
„ alpestris C. L. Koch 1837, 1841 = Bolyphantes luteolus (Blackwall) 1853
„ bucculentus Dahl 1883 = Floronia bucculenta (Clerck) 1757
„ drassoides Emerton 1882 = Wubana drassoides (Emerton) 1882
„ equestris C. L. Koch 1837 = Cheiracanthium dumetorum (Hahn) 1833
„ expunctus Hull 1909 = Lepthyphantes lepidus (Cambridge) 1873
„ flavolunata Simon 1864 = Teutana grossa (Olivier) 1789
„ frenatus Menge 1866 = Floronia bucculenta (Clerck) 1757
„ lofotensis Strand 1901 = Lepthyphantes lofotensis (Strand) 1901
„ pacificus Banks 1896 = Wubana pacifica (Banks) 1896
„ pelasgicum C. L. Koch 1837 = Cheiracanthium pelasgicum (C. L. Koch) 1837
„ stramineus C. L. Koch 1841 = Bolyphantes alticeps (Sundevall) 1832
„ stramineus Menge 1866 = Bolyphantes luteolus (Blackwall) 1853
„ subnigripes Jackson 1911 = Bolyphantes luteolus (Blackwall) 1853
„ trilineatus C. L. Koch 1837, 1841, Ohlert 1867 = Stemonyphantes lineatus (Linné) 1758

Bomis:
„ duricorius Simon 1880 = Boliscus duricorius (Simon) 1880
„ irroratus Thorell 1899 = Holopelus irroratus (Thorell) 1899

Bona:
„ dives Chyzer & Kulczynski 1897 = Micariolepis dives (Lucas) 1846
„ fastuosa Pavesi 1884 = Micaria fulgens (Walckenaer) 1802

Bootes:
„ ephippigera Thorell 1892 = Pystira ephippigera (Simon) 1885
„ nigripalpis Thorell 1891 = Pystira nigripalpis (Thorell) 1877
„ obscura Peckham 1886 = Margaromma obscurum (Keyserling) 1882

Bothriogaster:
„ coerulescens Simon 1895 = Phrynarachne coerulescens (Doleschall) 1859

Botryogaster:
„ coerulescens Doleschall 1859 = Phrynarachne coerulescens (Doleschall) 1859

Brachycentrum:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Lophocarenum**
„ thoracatum Chyzer & Kulczynski 1894, Lessert 1910 = Lophocarenum radicicola (L. Koch) 1875

Brachydrassodes:
„ rubicundulus Caporiacco 1934 = Drassodes rubicundulus Caporiacco 1934
„ singularis Caporiacco 1934 = Drassodes singulariformis Roewer 1951

Brachypelma:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Eurypelma**
„ aemilia Simon 1890 = Eurypelma emilia (White) 1856
„ albiceps Pocock 1903 = Eurypelma pallidum F. Cambridge 1897

Brachythele:
„ antillensis F. Cambridge 1898 = Tryssothele antillensis (F. Cambridge) 1898
„ argentina Simon 1897 = Tryssothele argentina (Simon) 1897
„ bicolor Pocock 1897 = Hermacha bicolor (Pocock) 1897
„ brunnea Simon 1888 = Tryssothele brunnea (Nicolet) 1849
„ pissii Simon 1888 = Tryssothele pissii (Simon) 1888
„ platypus Ausserer 1871 = Aname platypus (Ausserer) 1875
„ splendens Simon 1888 = Tryssothele splendens (Nicolet) 1849
„ subcalpetana Simon 1888 = Tryssothele subcalpeiana (Nicolet) 1849

Brachytheliscus:
„ bicolor Pocock 1902 = Hermacha bicolor (Pocock) 1897

Brettus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Portia**
„ martini Simon 1900, 1901 = Portia schultzii (Karsch) 1878
Brommella:
„ notabilis Tullgren 1948 = Pagomys notabilis (Tullgren) 1948
Bucranium:
„ spinigerum Cambridge 1891 = Majellula spinigera (Cambridge) 1881
Bueltia:
„ gracilipes Dahl 1907 = Synema gracilipes Dahl 1907
Caelotes siehe Coelotes:
Caerostris:
„ argostictus Pocock 1899 = Caerostris femoralis Thorell 1899
„ columnifer Pocock 1902 = Caerostris turrigera Pocock 1899
„ cuspidatus Workman 1896 = Ordgarius sexspinosus (Thorell) 1894
„ mitralis Hasselt 1882 = Caerostris sumatrana Strand 1914
„ nodulosa Pocock 1898 = Caerostris simata Bösenberg & Lenz 1895
„ paradoxa Butler 1879, Workman 1896 = Caerostris mitralis (Vinson) 1863
„ paradoxa Thorell 1890, Simon 1895 = Caerostris sumatrana Strand 1914
„ paradoxa Thorell 1895, Pocock 1900 = Caerostris indica Strand 1914
Caesetius:
„ politus Simon 1893 = Tryssoclitus politus (Simon) 1893
Caira:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Kaira**
Calapnita:
„ vermiformis Simon 1892 = Micromerys vermiformis (Simon) 1892
Callilepis:
„ concolor Machado 1941 = Callilepis nocturna concolor Simon 1914
„ nocturna Lessert 1910 = Callilepis nocturna (Linné) 1758
Calliethera (= Callietherus):
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Salticus**
„ affinitata Simon 1879 = Salticus olearii (Scopoli) 1763
„ albovittata Simon 1876 = Salticus scenicus (Clerck) 1757
„ ambigua C. L. Koch 1846 = Pseudicius encarpatus (Walckenaer) 1882
„ aulica C. L. Koch 1846 = Salticus scenicus (Clerck) 1757
„ goberti Simon 1875, 1876 = Salticus scenicus (Clerck) 1757
„ histrionica C. L. Koch 1837, 1846, Simon 1868, 1871 = Salticus scenicus (Clerck) 1757
„ icioides Simon 1884 = Pseudicius icioidis (Simon) 1884
„ infima Simon 1868, 1876 = Chalcoscirtus infimus (Simon) 1868
„ maculata Simon 1864 = Pseudicius encarpatus (Walckenaer) 1802
„ mendica C. L. Koch 1846 = Dendryphantes mendicus (C. L. Koch) 1846
„ notica Simon 1876 = Salticus conjonctus (Simon) 1868
„ pulchella C. L. Koch 1846 = Pseudicius encarpatus (Walckenaer) 1802
„ ruvoisoei Simon 1864 = Neaetha ravoisiaei (Lucas) 1846
„ sanguinolenta C. L. Koch 1837 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
„ scenica C. L. Koch 1846, L. Koch 1870, Simon 1876 = Salticus scenicus (Clerck) 1757
„ scenicus Simon 1868 = Salticus cingulatus (Panzer) 1797
„ similatus Simon 1868 = Salticus olearii (Scopoli) 1763
„ tenera C. L. Koch 1846 = Salticus olearii (Scopoli) 1763
„ terenus Simon 1868 = Salticus mutabilis Lucas 1846
„ zebraneus C. L. Koch 1837, 1846, Simon 1871, 1876, Becker 1882 = Salticus olearii (Scopoli) 1763
„ zebraneus Simon 1868 ♂ = Salticus mutabilis Lucas 1846
„ varia C. L. Koch 1837, 1848 = Salticus mutabilis Lucas 1846
Callilepis:
„ altitudonis Chamberlin 1935 = Pterotricha altitudonis (Chamberlin) 1935
„ asiatica Bösenberg & Strand 1906 = Berlandina asiatica (Bösenberg & Strand) 1906

Callilepis (Forts.):
- „ auris Tucker 1923 = Pterotricha auris (Tucker) 1923
- „ cabriolata Franganillo 1925 = nicht zu deuten!
- „ cambridgii Strand 1915 = Pterotricha cambridgii (Cambridge) 1872
- „ chazaliae Simon 1895 = Pterotricha chazaliae (Simon) 1895
- „ clara Petrunkevitch 1911 = Pterotricha clara (Keyserling) 1887
- „ concolor Machado 1941 = Callilepis nocturna concolor Simon 1914
- „ convexa Simon 1893, Bösenberg 1895 = Scotognapha convexa (Simon) 1883
- „ eremella Chamberlin & Gertsch 1928 = Pterotricha eremella (Chamberlin & Gertsch) 1928
- „ exornata Kulczynski 1887, Simon 1898 = Nomisia exornata (C. L. Koch) 1839
- „ femoralis Banks 1911 = Pterotricha femoralis (Banks) 1911
- „ frenata Purcell 1908, Tucker 1923 = Nomisia frenata (Purcell) 1908
- „ gosoga Chamberlin & Gertsch 1940 = Pterotricha gosoga (Chamberlin & Gertsch) 1940
- „ grisea Banks 1914 = Pterotricha grisea (Banks) 1914
- „ imbecilla Comstock 1912, Chamberlin 1935, Kaston 1948 = Pterotricha imbecilla (Keyserling) 1887
- „ insularis Banks 1900 = Pterotricha insularis (Banks) 1900
- „ jaffana Strand 1915 = Pterotricha jaffana (Strand) 1915
- „ lineatipes Purcell 1908 = Upognampa lineatipes (Purcell) 1908
- „ maculata Westring 1874 = Callilepis nocturna (Linné) 1758
- „ marginalis Tucker 1923 = Pterotricha marginalis (Tucker) 1923
- „ moebi Bösenberg 1895 = Nomisia musiva (Simon) 1889
- „ munda Chamberlin 1935, Gertsch & Davis 1940 = Pterotricha munda (Chamberlin) 1935
- „ nubivaga Simon 1898 = Berlandina cinerea (Menge) 1872
- „ plumalis Simon 1897 = Berlandina plumalis (Cambridge) 1872
- „ pluto Banks 1896 = Pterotricha imbecilla (Keyserling) 1887
- „ ripariensis Strand 1915 = Nomisia ripariensis (Cambridge) 1872
- „ saga Dönitz & Strand 1908 = Pterotricha saga (Dönitz & Strand) 1906
- „ schaefferi Strand 1908 = Pterotricha schaefferi (Audouin) 1827
- „ seduba Simon 1897 = Poecilochroa seduba (Simon) 1897
- „ spinigera Simon 1897 = Minosella pallida (L. Koch) 1875
- „ tubula Tucker 1923 = Nomisia tubula (Tucker) 1923
- „ varia Tucker 1923 = Pterotricha varia (Tucker) 1923
- „ zionis Chamberlin & Woodbury 1929 = Pterotricha zionis (Chamberlin & Woodbury 1929

Callinethis:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Leucauge**
- „ elegans Thorell 1887, 1895, Workman 1896 = Leucauge fastigata (Simon) 1877

Callioplus:
- „ borealis Kaston 1948 = Walmus borealis (Emerton) 1909

Callyntropus:
- „ convexus Pocock 1903 = Acanthoscurria convexa (C. L. Koch) 1842

Caloctenus:
- „ cyclothorax Keyserling 1891, F. Cambridge 1897 = Enoploctenus cyclothorax (Bertkau) 1880
- „ gracilitarsis Strand 1907 = Caloctenus tenuitarsis Strand 1908
- „ major Keyserling 1879 = Tuticanus major (Keyserling) 1879

Calommata:
- „ sumatrana Ausserer 1871 = Calommata sundaica (Doleschall) 1859

Calositticus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Sitticus**

Calydna:
- „ prospiciens Cambridge 1874 = Hypognatha prospiciens (Cambridge) 1874

Calymmaria:
„ modesta Chamberlin & Ivie 1937 = Calymmaria modestella (Roewer) 1951
Camaricus:
„ formosus Thorell 1887, Workman 1896 = Camaricus maugi (Walckenaer) 1837
„ formicatus Thorell 1890 = Camaricus maugi (Walckenaer) 1837
„ marmoratus Pocock 1900 = Camaricus nigrotesselatus Simon 1895
„ maugei Simon 1895 = Camaricus maugi (Walckenaer) 1837
„ mimosellus Strand 1907 = ? Camaricus mimus (Pavesi) 1895
„ striatipes Thorell 1894, 1895 = Camaricus maugi (Walckenaer) 1837
Cambridgea:
„ antipodiana Simon 1899 = Cambridgea antipodiana annulata Dalmas 1917
„ fasciata L. Koch 1872, Cambridge 1873, Pocock 1895, Simon 1899 = Cambridgea antipodiana (White) 1849
Camilla:
„ cordifera Tullgren 1910 = Camillina cordifera (Tullgren) 1910
Camillana:
„ cordifera Strand 1926 = Camillina cordifera (Tullgren) 1910
Camptotarsus:
„ truculentus Thorell 1887 = Calommata truculenta (Thorell) 1887
Canama:
„ expectans Strand 1911 = Cytaea expectans (Thorell) 1881
Caphaeris Lawrence 1928 = **Capheres** Simon 1893
Caracladus:
„ castellanus Simon 1894 = Cotyora castellana (Cambridge) 1875
„ gigas Crosby 1906 = Grammonota gigas (Banks) 1896
„ globipes Simon 1894, Bösenberg 1902 = Trichopterna globipes (L. Koch) 1872
„ turriger Simon 1894 = Trichopterna turrigera (Simon) 1881
Carepalxis:
„ americana Cambridge 1889 ♂, Keyserling 1892 = Scoloderus gibber Cambridge 1898
„ americana Cambridge 1889 ♀ = Scoloderus americanus (Cambridge) 1889
„ nigriceps Cambridge 1895 = Scoloderus nigriceps (Cambridge) 1895
„ tuberculifera Cambridge 1889, Keyserling 1892, Mc Cook 1893 = Scoloderus tuberculifer (Cambridge) 1889
Caripeta:
Alle Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Caripetella**
Carrhotus:
„ bicolor Lessert 1910, Dahl 1926, Simon 1937 = Carrhotus xanthogramma (Walckenaer) 1825
„ ephippiatus Thorell 1899 = Pharacocerus ephippiatus (Thorell) 1899
Caseola:
„ alticeps Emerton 1909 = Maso alticeps (Emerton) 1909
„ floridana Ivie & Barrows 1935 = Masonetta floridana (Ivie & Barrows) 1935
„ herbicola Emerton 1909 = Maso sundevallii (Westring) 1851
„ howardi Petrunkevitch 1925 = Eridantes erigonoides (Emerton) 1882
Castianeira (= Castaneira):
„ bicalcarata Banks 1910, 1913 = Corinna bicalcarata Simon 1896
„ bivittata Keyserling 1887 = Castianeira cingulata (C. L. Koch) 1842
„ debilis Cambridge 1898 = Castianeira flebilis Cambridge 1898
„ gertschi Kaston 1945, 1948 = Castianeira aurata Emerton 1913
„ peregrina Gertsch & Davis 1940 = Apochinomma peregrinum (Gertsch) 1935
„ pinnata Bryant 1908 = Castianeira longipalpis (Hentz) 1847
„ plumosa F. Cambridge 1899 = Castianeira pedo Roewer 1951
„ recurvata Strand 1906, 1908 = Merenius recurvatus (Strand) 1906
„ vittata Keyserling 1891 = Castianeira vittatula Roewer 1951
Castianeirodes:
„ insulicola Strand 1915 = Castianeira insulicola Strand 1915

Casturopoda:
„ sigillata Cambridge 1883 = Stiphropus sigillatus (Cambridge) 1883
Catabrithorax:
„ ceuthus Chamberlin 1920 = Catabrithorax clypiellus Chamberlin 1920
Cebrenis:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Cebrennus**
Cebrennus:
„ pulcherrimus Simon 1880 = Cerbalus pulcherrimus (Simon) 1880
„ verneaui Simon 1889 = Cerbalus verneaui (Simon) 1889
Cedicus:
„ moellendorffi Karsch 1881 = Coelotes moellendorffi (Karsch) 1881
Celaenia:
„ kimbergi Simon 1895 = Celaenia kingbergii Thorell 1868
Celidotopus:
„ pulchripes Simon 1889 = Bolostromus pulchripes (Simon) 1889
Centromeria:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Centromerita**
Centromerides:
„ bicolor Strand 1926 = Centromerita bicolor (Blackwall) 1833
Centromerinus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Centromerita**
Centromerus:
„ abnormis Lessert 1904, 1910 = Oreonetides abnormis (Blackwall) 1841
„ affinis Lessert 1910 = Micryphantes affinis (Blackwall) 1855
„ balteatus Lessert 1904 = Centromerus serratus (Cambridge) 1875
„ bicolor Chyzer & Kulczynski 1894 et sequ = Centromerita bicolor (Blackwall) 1833
„ brevipalpus Bösenberg 1902, Lessert 1910 = Centromerus aequalis (Westring) 1862
„ brevivulvatus Dahl 1912 = Centromerus aequalis (Westring) 1862
„ carpenteri Reimoser 1919 = Macrargus carpenteri (Cambridge) 1894
„ comper Reimoser 1919 = Gongylidiellum compar (Westring) 1862
„ concinnus Bösenberg 1902 = Centromerita bicolor concinna (Thorell) 1875
„ emptus Jackson 1907 = Centromerus levitarsis (Simon) 1884
„ europaeus Drenski 1936 = Centromerus subcaecus Kulczynski 1914
„ firmus Cambridge 1908 = Oreonetides firmus (Cambridge) 1901
„ fortunatus Cambridge 1908 = Trichoncus inerrans (Cambridge) 1885
„ illibatus Dahl 1886 = Centromerus aequalis (Westring) 1862
„ montanus Dahl 1886 = Oedothorax montanus (Blackwall) 1856
„ pabulator Dahl 1886, 1912 et sequ. = Centromerus pabulatrix (Cambridge) 1875
„ probabilis Cambridge 1908 = Mengea warburtoni (Cambridge) 1889
„ silvaticus Chyzer & Kulczynski 1894 = Centromerus sylvaticus (Blackwall) 1841
„ silvaticus Perelesdina 1930 = Lepthyphantes valentinae Charitonow 1935
„ subalpinus Lessert 1907, 1910 = Diplocentria rivalis (Cambridge) 1905
„ subalpinus Lessert 1937 ♀ = Centromerus arcanus (Cambridge) 1873
„ subcaecus Kratochvil 1934 = Centromerus obenbergeri Kratochvil & Miller 1938
Centropelma:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Nicodamus**
Cerarachne:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Ceraarachne**
Ceraticelus:
„ nubiliceps Chamberlin 1924 = Ceraticelus similis (Banks) 1892
„ tibialis Crosby 1905, Crosby & Bishop 1925 = Ceraticelus tibiatulus Roewer 1942
Ceratina:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Ceratinella**
„ globosa Menge 1868 = Crustulina guttata (Wider) 1834

Ceratinella:
„ annulipes Banks 1892 = Ceratinops annulipes (Banks) 1892
„ atriceps Emerton 1882 = Ceraticelus atriceps (Cambridge) 1874
„ bulbosa Emerton 1882, Banks 1892 = Ceraticelus bulbosus (Emerton) 1882
„ carinata Emerton 1911 = Ceraticelus carinatus (Emerton) 1911
„ emertonii Emerton 1882 = Ceraticelus emertonii (Cambridge) 1874
„ fissiceps Emerton 1882 = Ceraticelus fissiceps (Cambridge) 1874
„ formosa Banks 1892 = Ceraticelus formosus (Banks) 1892
„ formosa Emerton 1909 = Ceratinopsidis formosa (Banks) 1892
„ laeta Emerton 1882 = Ceraticelus laetus (Cambridge) 1874
„ laetabilis Emerton 1882, 1902 = Ceraticelus laetabilis (Cambridge) 1874
„ laticeps Emerton 1894 = Ceraticelus laticeps (Emerton) 1894
„ micropalpis Emerton 1882 = Ceraticelus micropalpis (Emerton) 1882
„ minuta Emerton 1882 = Ceraticelus minutus (Emerton) 1882
„ moesta Banks 1892 = Lophocarenum moestum (Banks) 1892
„ occidentalis Banks 1901 = Ceratinella brunnea Emerton 1882
„ ornatula Emerton 1926 = Ceraticelus ornatulus (Crosby & Bishop) 1925
„ pygmaea Emerton 1882 = Ceraticelus pygmaeus (Emerton) 1882
„ similis Banks 1892 = Ceraticelus similis (Banks) 1892

Ceratinodes:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Ceratinella**

Ceratinopsis:
„ alternata Emerton 1909 = Ceratinopsidis formosa (Banks) 1892
„ formosa Crosby & Bishop 1928 = Ceratinopsidis formosa (Banks) 1892
„ frontata Banks 1892 = Maso sundevallii (Westring) 1851
„ lineata Tullgren 1901 = Ceratinopsis araeonciformis Simon 1875
„ pergrata F. Cambridge 1903 = Itytis pergrata (Cambridge) 1894
„ similis Banks 1896 = Ceratinopsis nigripalpis Emerton 1882
„ tarsalis Emerton 1924 = Ceratinopsis nigripalpis Emerton 1882
„ unicolor Crosby 1905 = Ceratinopsis purpurescens (Keyserling) 1886

Ceratoscelis:
„ rufipes Lucas 1834 = Actinopus rufipes (Lucas) 1834

Cercidia:
„ decora Simon 1891 = Singa decora (Simon) 1891
„ pachyderma Simon 1873 = Singa heerii (Hahn) 1831

Cercis:
„ prominens Menge 1866 = Cercidia prominens (Westring) 1851

Cerinius:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Tharrhalea**

Ceto:
„ nitescens Simon 1878, Lessert 1910 = Ceto laticeps (Canestrini) 1868
„ unicolor Simon 1874, 1878, 1897 = Ceto laticeps (Canestrini) 1868

Cetuma:
„ morgani Simon 1885 = Hedana morgani (Simon) 1885

Chalcoscirtus:
„ elegans Simon 1885 = Rogmocrypta elegans (Simon) 1885

Chalinura:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Tharrhalea**

Charis:
„ rubripes Keyserling 1880 = Deltoclita rubripes (Keyserling) 1880

Charitonowia:
„ chilensis Strand 1934 = Macrobunus chilensis (Simon) 1888

Chasidamna:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Asaracus**

Cheiracanthium (= Chiracanthium):
„ abnorme Holmberg 1881 = Trachelopachys abnormis (Holmberg) 1881
„ adiacens Caporiacco 1935 = Cheiracanthium adjacens Cambridge 1885
„ albens Hentz 1847, Banks 1904 = Anyphaenella albens (Hentz) 1847

Cheiracanthium (Forts.):
- „ argenticomum Keyserling 1877 = Carteronius argenticomus (Keyserling) 1877
- „ auricomum L. Koch 1866 = Eustichurus auricomus (L. Koch) 1866
- „ brevipes Keyserling 1881 = Eutichurus brevipes (Keyserling) 1891
- „ candidum Simon 1878 = Cheiracanthium virescens (Sundevall) 1832
- „ candidum Mello-Leitao 1941 = Cheiracanthium melloi Roewer 1951
- „ carnifex C. L. Koch 1839 et sequ. = Cheiracanthium dumetorum (Hahn) 1833
- „ debile Cambridge 1897 = Cheiracanthium ferum Cambridge 1897
- „ edentulum L. Koch 1866 = Cheiracanthium subflavum (Blackwall) 1862
- „ erraticum Westring 1862 et sequ. = Cheiracanthium dumetorum (Hahn) 1833
- „ erroneum Cambridge 1873, Simon 1878, Becker 1896 = Cheiracanthium dumetorum (Hahn) 1833
- „ falculum Chamberlin 1925 = Aysha velox (Becker) 1879
- „ fasciatum Thorell 1873 = ? Cheiracanthium seidlitzii L. Koch 1864
- „ fasciatum Lebert 1877 = nicht zu deuten!
- „ fauveli Simon 1897 = Cheiracanthium albidulum (Blackwall) 1859
- „ gracilipes Mello-Leitao 1917 = Cheiracanthium leitaoi Roewer 1951
- „ granadensis Keyserling 1879 = Eutichurus granadensis (Keyserling) 1879
- „ gratum Kulczynski 1897 = Cheiracanthium angulitarse Simon 1878
- „ inornatum Lawrence 1927, 1936 = Cheiracanthium lawrencei Roewer 1951
- „ italicum Canestrini & Pavesi 1868, 1870 = Cheiracanthium punctorium (Villers) 1789
- „ keyserlingi Becker 1878 = Cheiracanthium subflavum (Blackwall) 1862
- „ lapidicolens Simon 1878 et sequ. = Cheiracanthium virescens (Sundevall) 1832
- „ letochae L. Koch 1878, Simon 1878 = Cheiracanthium elegans Thorell 1875
- „ melanostoma Simon 1910 = Cheiracanthium melanostomella Roewer 1951
- „ meridianum L. Koch 1866, Keyserling 1891 = Eutichurus meridianus (L. Koch) 1866
- „ molle Keyserling 1879 = Eutichurus keyserlingi Simon 1897
- „ montanum Keyserling 1891 = Eutichurus monticola Roewer 1951
- „ nutrix C. L. Koch 1839, Ohlert 1867, Menge 1873, Dahl 1883, Bösenberg 1902 = Cheiracanthium punctorium (Villers) 1789
- „ nutrix Westring 1862, Cambridge 1873 = Cheiracanthium virescens (Sundevall) 1832
- „ nutrix L. Koch 1864, 1866 = Cheiracanthium oncognathum Thorell 1871
- „ nutrix Lebert 1877 = nicht zu deuten!
- „ oncognathum Lebert 1877 = nicht zu deuten!
- „ orientale Kulczynski 1885 = Cheiracanthium dumetorum (Hahn) 1833
- „ paucalense Keyserling 1879 = Eutichurus paucalensis (Keyserling) 1879
- „ pelasgicum abbreviatum Simon 1932 = Cheiracanthium abbreviatum Simon 1878
- „ siedlitzi Simon 1932 = Cheiracanthium seidlitzii L. Koch 1864
- „ tenuissimum L. Koch 1866 = Mesiotelus tenuissimum (L. Koch) 1866
- „ viride Emerton 1889 = Cheiracanthium inclusum (Hentz) 1847

Chemmis:
- „ punctiger Banks 1914 = Chemmis frederici Simon 1898
- „ unicolor Banks 1901 = Anachemmis unicolor (Banks) 1901

Chenistonia:
- „ atra Strand 1913 = Sungenia atra (Strand) 1913

Chersis:
- „ dubius Walckenaer 1837 = Eresus cinnaberinus (Olivier) 1789
- „ gibbulus Walckenaer 1837 = Palpimanus gibbulus Dufour 1820
- „ niger Canestrini & Pavesi 1868 = Eresus cinnaberinus (Olivier) 1789
- „ savignyi Walckenaer 1837 = Palpimanus gibbulus Dufour 1820

Chira siehe **Shira**

Chiracanthium siehe **Cheiracanthium**

Chirothecia (= Chirotecia):
- „ formicina Taczanowski 1878 = Bellota formicina (Taczanowski) 1878

Chondronephila:
„ turneri Dahl 1912 = Nephila turneri Blackwall 1833
Chorizomma:
„ californicum Simon 1895, 1898, Chamberlin & Ivie 1937 = Yorima californica (Simon) 1895
„ flavum Chamberlin & Ivie 1937 = Yorima flava (Chamberlin & Ivie) 1937
„ minoratum Gertsch & Davis 1936 = Cicurina minorata (Gertsch & Davis) 1936
„ sequoiae Chamberlin & Ivie 1937 = Yorima sequoiae (Chamberlin & Ivie) 1937
„ texanum Gertsch 1935 = Cicurina texana (Gertsch) 1935
Chorizopsis:
„ exarata Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ infumata Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ lenta Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ maugei Simon 1864 = Camaricus maugi (Walckenaer) 1837
„ purpurata Simon 1864 = nicht zu deuten!
Chrosiothes:
„ porteri Simon 1900 = Chrosiothes australis Simon 1896
Chrysometa:
„ alboguttata Banks 1898 = Pseudometa albiguttata (Cambridge) 1882
Chrysothrix:
„ dives Simon 1878 = Micariolepis dives (Lucas) 1846
„ fastuosa Simon 1878 = Micaria fulgens (Walckenaer) 1802
„ splendidissima Simon 1878 = Micariolepis dives (Lucas) 1846
Chrysso:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Theridion**
„ cordiformis Butler 1882 = Theridula opulenta (Walckenaer) 1841
„ elegans Keyserling 1884 = Theridion emendatum Roewer 1942
„ nigriceps Keyserling 1884 = Theridion keyserlingi (Petrunkevitch) 1911
„ niveopictus Butler 1882 = Theridula opulenta (Walckenaer) 1841
„ splendida Banks 1898 = Theridion splendens Roewer 1942
Cicurata:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Cicurina**
Cicurella:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Cicurina**
Cicurina:
„ arietina Simon 1875 = Tetrilus arietinus (Thorell) 1870
„ atomaria Exline 1936 = Cicurina exlinae Chamberlin & Ivie 1940
„ cicur Menge 1870 et sequ. = Cicurina cicurea (Fabricius) 1793
„ cinerea Simon 1875 et sequ. = Cicurina cicurea (Fabricius) 1793
„ complicata Emerton 1902 = Cicurina arctuata (Keyserling) 1887
„ creber Banks 1892 = Cicurina brevis (Emerton) 1889
„ garrina Chamberlin 1919 = Cicurina robusta Simon 1886
„ impudica Simon 1875 = Tetrilus arietinus (Thorell) 1870
„ mellotei Simon 1886 = Cybaeus mellottei (Simon) 1886
„ pellucida Simon 1875 = Cicurina cicurea (Fabricius) 1793
Cicurona:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Cicurina**
Cicurusta:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Cicurina**
Cinetomorpha:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Gamasomorpha**
Ciniflo:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Amaurobius**
„ affinis Blackwall 1862 = Lathys affinis (Blackwall) 1862
„ atrox Blackwall 1841, 1861 = Amaurobius fenestralis (Stroem) 1768
„ bennetti Blackwall 1846 = Callobius bennetti (Blackwall) 1846
„ humilis Blackwall 1855, 1861 = Lathys humilis (Blackwall) 1855
„ mengei Cambridge 1873 = Argenna subnigra (Cambridge) 1861

Ciniflo (Forts.):
„ mordax Blackwall 1859, 1861 = Amaurobius ferox (Walckenaer) 1825
„ nivalis Lessert 1910 = Titanoeca nivalis (Simon) 1874
„ putus Cambridge 1863 = Lathys puta (Cambridge) 1863
„ IV-guttatus Lessert 1910 = Titanoeca obscura (Walckenaer) 1802
„ tristis Lessert 1910 = Titanoeca tristis L. Koch 1872

Cirrs:
„ relucens Thorell 1877 = Saitis relucens (Thorell) 1877
„ rotundata C. L. Koch 1848 = nicht zu deuten!

Cispius:
„ affinis Lessert 1916 = Pisaura affinis (Lessert) 1916
„ bidentatus Lessert 1936 = Cispiomma bidentatum (Lessert) 1936
„ flavidus Simon 1909 = Cispinilus flavidus (Simon) 1909

Citharacanthus:
„ spinicurs Petrunkevitch 1939 = Eurypelma spinicrus (Latreille) 1819

Citharoscelus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Grammostola**
„ kochii Pocock 1899, F. Cambridge 1899 = Grammostola spatulata (F. Cambridge) 1897

Cladonotus:
„ jobiensis Thorell 1876 = Phrynarachne jobiensis (Thorell) 1876

Clastes (= Clasta):
„ abbotii Walckenaer 1837 = Peucetia viridans (Hentz) 1845
„ abbotii Simon 1864 = Peucetia viridans (Hentz) 1845
„ roseus Walckenaer 1841 = Peucetia viridans (Hentz) 1845
„ viridis Walckenaer 1841 = Peucetia viridans (Hentz) 1845

Clotho:
„ algerica Walckenaer 1847 = Zodarion atriceps (Cambridge) 1872
„ amaranthia Walckenaer 1847 = Prodidromus amaranthinus (Lucas) 1846
„ anthracina C. L. Koch 1848 = Uroctea durandi (Latreille) 1809
„ cellariorum Dugès 1836 = Oecobius cellariorum (Dugès) 1836
„ cycacea C. L. Koch 1843 = Uroctea durandi (Latreille) 1809
„ durandi Latreille 1809, Audouin 1827, Walckenaer 1837 = Uroctea durandi (Latreille) 1809
„ gondotii Walckenaer 1837 = Uroctea durandi (Latreille) 1809
„ goudotii C. L. Koch 1843 = Uroctea durandi (Latreille) 1809
„ guttata C. L. Koch 1843 = Uroctea durandi (Latreille) 1809
„ lepida Blackwall 1859 = Zimirana lepida (Blackwall) 1859
„ limbata C. L. Koch 1843 = Uroctea limbata (C. L. Koch) 1843
„ longipes Walckenaer 1837 ♂ = Zodarion nitidum (Audouin) 1827
„ longipes Walckenaer 1837 ♀ = Zodarion gallicum (Simon) 1873
„ nitida Walckenaer 1837, Lucas 1846 = Zodarion nitidum (Audouin) 1827
„ paivani Blackwall 1868 = Oecobius paivani (Blackwall) 1868
„ septempunctata Cambridge 1872 = Uroctea septempunctata (Cambridge) 1872
„ stella Simon 1864 = Uroctea durandi (Latreille) 1809
„ stellata C. L. Koch 1843 = Uroctea durandi (Latreille) 1809

Clubiona:
„ abdominalis Nicolet 1849 = Gayenna abdominalis (Nicolet) 1849
„ accentuata Walckenaer 1805, 1837, Sundevall 1832 = Anyphaena accentuata (Walckenaer) 1802
„ acris Simon 1864 = Clubiona acies Nicolet 1849
„ acupicta Nicolet 1849 = Tomopisthes acupictus (Nicolet) 1849
„ acupita Simon 1864 = Tomopisthes acupictus (Nicolet) 1849
„ adusta Simon 1932, Machado 1949 = Clubiona aducta Simon 1932
„ advena Walckenaer 1847 = Tegenaria advena (C. L. Koch) 1841
„ aethiops Hahn 1829 = nicht zu deuten!
„ agrestis Hentz 1847 = Anyphaena agrestis (Hentz) 1847
„ agrestis Emerton 1924, Chickering 1939 = Clubiona bryantae Gertsch 1941

Clubiona (Forts.):

„ albens Hentz 1847 = Anyphaenella albens (Hentz) 1847
„ albens Getaz 1889 = nicht zu deuten!
„ albicans Bösenberg 1902 = nicht zu deuten!
„ albicans Bryant 1940 = Clubiona cubana Roewer 1951
„ albidula Blackwall 1859 = Cheiracanthium albidulum (Blackwall) 1859
„ albini Audouin 1827 = Aphantaulax albini (Audouin) 1827
„ albiventris Nicolet 1849 = Gayenna albiventris (Nicolet) 1849
„ alboabdominalis Simon 1864 = nom. nud.
„ aloma Walckenaer 1805 = Clubiona pallidula (Clerck) 1757
„ alpica Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ altiformis Nicolet 1849 = Trachelas altiformis (Nicolet) 1849
„ amarantha Walckenaer 1805, 1837, Hahn 1831, Ohlert 1867 = Clubiona pallidula (Clerck) 1757
„ amarantha Blackwall 1861 = Clubiona terrestris Westring 1851
„ amarantha Sordelli 1868, Canestrini & Pavesi 1868 = nicht zu deuten!
„ ambigua Nicolet 1849 = Rubrius ambiguus (Nicolet) 1849
„ americana Banks 1892 = Clubiona riparia L. Koch 1866
„ amussa Walckenaer 1837 = Zodarion germanicum (C. L. Koch) 1837
„ annulipes Taczanowski 1874 = Corinna annulipes (Taczanowski) 1874
„ aspersa Nicolet 1849, Simon 1864 = Liparotoma aspersum (Nicolet) 1849
„ assimilata Cambridge 1862 = Clubiona lutescens Westring 1851
„ atra Risso 1826 = nicht zu deuten!
„ atrox Walckenaer 1805, 1837 = Amaurobius similis (Blackwall) 1861
„ atrox Sundevall 1831, Hahn 1831 = Amaurobius fenestralis (Stroem) 1768
„ attigua Cambridge 1896 = Sillus attiguus (Cambridge) 1896
„ attiformis Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ barbara Lucas 1846 = Cheiracanthium barbarum (Lucas) 1846
„ bifurca Menge 1873 = Clubiona neglecta Cambridge 1862
„ borealis Thorell 1870, Tullgren 1942 = Clubiona reclusa Cambridge 1863
„ brevipes Marx 1889 = nom. nud.
„ breviventris Nicolet 1849 = Rubrius breviventris (Nicolet) 1849
„ canestrinii Castelli 1893 = Clubiona similis L. Koch 1866
„ castanea Walckenaer 1837 = Teutana castanea (Clerck) 1757
„ caudefacta Petrunkevitch 1911 = Clubiona candefacta Nicolet 1849
„ chilensis Nicolet 1849 = Philisca chilensis (Nicolet) 1849
„ celer Hentz 1847 = Anyphaena celer (Hentz) 1847
„ citrina Nicolet 1849 = Gayenna citrina (Nicolet) 1849
„ clandestina Menge 1873 = Clubiona genevensis L. Koch 1866
„ claustraria Hahn 1831 = Amaurobius claustrarius (Hahn) 1831
„ compta Walckenaer 1841 et sequ. = Clubiona comta C. L. Koch 1839
„ corticalis Menge 1873 = Clubiona subsultans Thorell 1875
„ crassipalpis Emerton 1909 = Clubiona mixta Emerton 1889
„ crassipalpis Keyserling 1887 et sequ. = Clubiona obesa Hentz 1847
„ decora Bertkau 1880, Chyzer & Kulczynski 1897, Bösenberg 1902, Lessert 1910, Hull 1950 = Clubiona genevensis L. Koch 1866
„ decora Rainbow & Pulleine 1920 = Clubiona rainbowi Roewer 1951
„ deinognatha Cambridge 1862 = Clubiona phragmitis C. L. Koch 1843
„ dilaticollis Nicolet 1849 = Gayenna dilaticollis (Nicolet) 1849
„ domestica Wider 1834, Blackwall 1861 = Liocranum rupicola (Walckenaer) 1825
„ dumetorum Hahn 1833 = Cheiracanthium dumetorum (Hahn) 1833
„ emertoni Petrunkevitch 1911, Kaston 1938 = Clubiona moesta Banks 1896
„ epimelas Walckenaer 1805, 1837, Blackwall 1861 = Clubiona pallidula (Clerck) 1757
„ erratica Walckenaer 1805, 1837, Blackwall 1861, Simon 1878, 1897, Dahl 1883, 1912 = Cheiracanthium dumetorum (Hahn) 1833

Clubiona (Forts.):

- „ erratica C. L. Koch 1843, L. Koch 1866, Ohlert 1867, Westring 1862, Menge 1873 = Clubiona subsultans Thorell 1875
- „ erratica Lebert 1877 = nicht zu deuten!
- „ exilipes Lucas 1846 = Cheiracanthium exilipes (Lucas) 1846
- „ fallax Walckenaer 1825, 1837 = Argyroneta aquatica (Clerck) 1757
- „ fallens Hentz 1847 = Anyphaena fallens (Hentz) 1847
- „ fauveli Simon 1897 = Cheiracanthium albidulum (Blackwall) 1859
- „ ferox Walckenaer 1825, 1837 = Amaurobius ferox (Walckenaer) 1825
- „ ferox nigra Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ flava Nicolet 1849 = Macerio flavus (Nicolet) 1849
- „ formicaria Sundevall 1831 = Micaria formicaria (Sundevall) 1831
- „ formosa Blackwall 1861 = Clubiona pallidula (Clerck) 1757
- „ fucata Blackwall 1841 = Clubiona comta C. L. Koch 1839
- „ fuscata Westring 1862, L. Koch 1866 = Clubiona brevipes Blackwall 1841
- „ gayi Nicolet 1849 = Gayenna gayi (Nicolet) 1849
- „ gemella Nicolet 1849 = Gayenna gemella (Nicolet) 1849
- „ gibbosa Nicolet 1849 = Gayenna gibbosa (Nicolet) 1849
- „ glauca Risso 1826 = nicht zu deuten!
- „ gracilis Hentz 1847 = Aysha gracilis (Hentz) 1847
- „ gremilla Simon 1864 = Gayenna gemella (Nicolet) 1849
- „ grisea C. L. Koch 1866, Simon 1878, Dahl 1883, Bösenberg 1902, Jackson 1915 = Clubiona reclusa Cambridge 1863
- „ grisea Canestrini & Pavesi 1870 = nicht zu deuten!
- „ grisea Menge 1873 = Clubiona phragmitis C. L. Koch 1843
- „ grisea Thorell 1873 = Clubiona stagnalis Kulczynski 1897
- „ hilaris Lawrence 1942 = Clubiona durbana Roewer 1951
- „ holosericea Hahn 1829, 1831, Ohlert 1867 = Clubiona caerulescens L. Koch 1866
- „ holosericea Sundevall 1831, Westring 1862, Hansen 1885 = Clubiona phragmitis C. L. Koch 1843
- „ holosericea Blackwall 1861 = Clubiona reclusa Cambridge 1863
- „ holosericea L. Koch 1866 = Clubiona germanica Thorell 1870
- „ holosericea Linné 1758, Olivier 1789, Menge 1873, Dahl 1883, 1912 = Clubiona pallidula (Clerck) 1757
- „ horrenda Nicolet 1849 = Tomopisthes horrendus (Nicolet) 1849
- „ humida Jackson 1915, Hull 1950 = Clubiona norvegica Strand 1900
- „ inclusa Hentz 1847 = Cheiracanthium inclusum (Hentz) 1847
- „ incompta Ohlert 1867 = Clubiona frutetorum L. Koch 1866
- „ incomta C. L. Koch 1837 = Clubiona holosericea (Linné) 1758
- „ insularis Vinson 1863 = nicht zu deuten!
- „ lapidaria Hahn 1833 = Drassodes lapidosus (Walckenaer) 1802
- „ lapidicola Latreille 1806 et sequ. = Drassodes lapidosus (Walckenaer) 1802
- „ lapidicolens Walckenaer 1805, 1825, 1837 = Drassodes lapidosus (Walckenaer) 1802
- „ latifrons Emerton 1913 = Clubiona littoralis Banks 1895
- „ lenta Banks 1892 = Clubiona pygmaea Banks 1892
- „ lepida Nicolet 1849 = Gayenna lepida (Nicolet) 1849
- „ limbata Nicolet 1849 = Tomopisthes limbatus (Nicolet) 1849
- „ listeri Audouin 1827 = nicht zu deuten!
- „ livida Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ longipes Lucas 1858 = nicht zu deuten!
- „ longiventris Nicolet 1849 = Gayenna longiventris (Nicolet) 1849
- „ lusatica L. Koch 1881 = Clubiona genevensis L. Koch 1866
- „ lutea Nicolet 1849 = Gayenna lutea (Nicolet) 1849
- „ macrocephala Nicolet 1849 = Trachelopachys macrocephalus (Nicolet) 1849
- „ maculosa Nicolet 1849 = Gayenna maculosa (Nicolet) 1849
- „ maculosa L. Koch 1873 = Clubiona maculata Roewer 1951

Clubiona (Forts.):
„ marmorata Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ medicinalis Waldkenaer 1837 = Coras medicinalis (Hentz) 1821
„ melanostoma Holmberg 1876 = Cheiracanthium subflavum (Blackwall) 1862
„ minuta Emerton 1889 = Clubiona pygmaea Banks 1892
„ minutissima Petrunkevitch 1911, Kaston 1948 = Clubiona pygmaea Banks 1892
„ minutula Thorell 1870 = Clubiona subtilis L. Koch 1866
„ mollis C. L. Koch 1837 = nicht zu deuten!
„ montana L. Koch 1866 = Clubiona neglecta Cambridge 1862
„ montana Bösenberg 1902 = Clubiona similis L. Koch 1866
„ necator Waldkenaer 1837 = Miturga necator (Waldkenaer) 1837
„ neglecta Chyzer & Kulczynski 1897 ♀ = Clubiona similis L. Koch 1866
„ nigricans Nicolet 1849 = Haptisus nigricans (Nicolet) 1849
„ nutrix Waldkenaer 1805, 1837 = Cheiracanthium punctorium (Villers) 1789
„ nutrix Latreille 1806, Hahn 1834, Blackwall 1861 (Fig.) = Cheiracanthium dumetorum (Hahn) 1833
„ obliterata Nicolet 1849 = Trachelopachys macrocephalus (Nicolet) 1849
„ oblonga Lucas 1846 = Drassodes lapidosus (Waldkenaer) 1802
„ ornata Lucas 1846 = Cheiracanthium pelasgicum C. L. Koch 1837
„ ornata Thorell 1875, Tullgren 1942 = Clubiona subsultans Thorell 1875
„ ornata Emerton 1889, 1894, 1902 = Clubiona riparia L. Koch 1866
„ pallens Hahn 1834, C. L. Koch 1839 = ? Clubiona reclusa Cambridge 1863
„ pallens Hentz 1847, Bishop & Crosby 1926 = Clubiona excepta L. Koch 1866
„ pallens Blackwall 1861 = Clubiona subtilis L. Koch 1866
„ pallens Westring 1862, Ohlert 1867 = Clubiona trivialis C. L. Koch 1843
„ pallens Giebel 1867 = nicht zu deuten!
„ pallipes Lucas 1846 = Clubiona comta C. L. Koch 1839
„ paradoxa L. Koch 1866 = Clubiona brevipes Blackwall 1841
„ parvula Blackwall 1833 = Dictyna arundinacea (Linné) 1758
„ parvula Lucas 1846 = Clubiona vegeta Simon 1918
„ parvula Getaz 1889 = nicht zu deuten!
„ paula C. L. Koch 1837 = nicht zu deuten!
„ pellucida C. L. Koch 1843, Ohlert 1867, Simon 1932 = ? Clubiona phragmitis C. L. Koch 1843
„ piscatoria Hentz 1847 = Marcellina piscatoria (Hentz) 1847
„ placens Cambridge 1896 = Sillus placens (Cambridge) 1896
„ prasina C. L. Koch 1837 = nicht zu deuten!
„ puella Nicolet 1849 = Gayenna puella (Nicolet) 1849
„ pulchella Nicolet 1849 = Gayenna pulchella (Nicolet) 1849
„ pulchella Lawrence 1938 = Clubiona lawrencei Roewer 1951
„ phragmitis Ohlert 1867 ♂ = Gayenna reclusa Cambridge 1863
„ phragmitis Ohlert 1867 ♀ = Clubiona trivialis C. L. Koch 1843
„ pulicaria Sundevall 1831 = Micaria pulicaria (Sundevall) 1831
„ punctata Hahn 1833, 1834 = Anyphaena accentuata (Waldkenaer) 1802
„ punctata Nicolet 1849 = Gayenna punctatula Roewer 1951
„ pusilla Emerton 1889 = Clubiona moesta Banks 1896
„ putris C. L. Koch 1839 = ? Clubiona subsultans Thorell 1875
„ quadrispinosa Strand 1908 = ? Clubiona latitans Pavesi 1883
„ rorulenta Nicolet 1849 = Amaurobius rorulentus (Nicolet) 1849
„ roscida Waldkenaer 1841 = Coelotes segestriformis (Dufour) 1820
„ rubicunda C. L. Koch 1843 = ? Clubiona reclusa Cambridge 1863
„ rubra Keyserling 1887, Emerton 1889, 1902 = Clubiona abbotii L. Koch 1863
„ rubra Emerton 1889 part. = Clubiona johnsoni Gertsch 1941
„ rubripes Hahn 1829 = nicht zu deuten!
„ rubropunctata Ohlert 1867 = Clubiona comta C. L. Koch 1839
„ rufea Nicolet 1849 = Gayenna rufea (Nicolet) 1849
„ rufipes Lucas 1846 = nicht zu deuten!

Clubiona (Forts.):
„ rupicola Walckenaer 1825, 1837 = Liocranum rupicola (Walckenaer) 1825
„ saeva Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ saltabunda Hentz 1847 = Anyphaenella saltabunda (Hentz) 1847
„ saxatilis Blackwall 1833, 1834, Walckenaer 1847 = Coelotes atropos (Walckenaer) 1825
„ saxatilis L. Koch 1866 = Clubiona coerulescens saxatilis (L. Koch) 1866
„ seideli Fickert 1874 = Clubiona trivialis C. L. Koch 1843
„ severa Walckenaer 1841 = Haplodrassus severus (C. L. Koch) 1839
„ silaticolis Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ similis Kulczynski 1897 ♀ = Clubiona neglecta Cambridge 1862
„ sinistra Nicolet 1849 = Amaurobius sinister (Nicolet) 1849
„ smaragdula Nicolet 1849 = Gayenna smaragdula (Nicolet) 1849
„ stigmatica Simon 1876 = Clubiona genevensis L. Koch 1866
„ stigmatisata Bösenberg 1902 = Clubiona dinensis Simon 1878
„ subalba Bösenberg 1902 = Clubiona stagnalis Kulczynski 1897
„ subflava Blackwall 1862 = Cheiracanthium subflavum (Blackwall) 1862
„ sublimpida Strand 1909 = ? Clubiona limpida Simon 1897
„ sublurida Hentz 1847 = Anyphaena sublurida (Hentz) 1847
„ sulphurea Nicolet 1849 = Gayenna sulphurea (Nicolet) 1849
„ tenera Franganillo 1934 = nicht zu deuten!
„ tetrica Walckenaer 1841 = Cybaeus tetricus (C. L. Koch) 1839
„ tigrina Walckenaer 1841 = Coelotes atropos (Walckenaer) 1825
„ tigrina F. Cambridge 1909, Banks 1909, Chickering 1937 = Clubiona tigrinella Roewer 1951
„ tranquilla Hentz 1847 = Trachelas tranquillus (Hentz) 1847
„ tridens Menge 1873 = Clubiona reclusa Cambridge 1863
„ tripunctata Nicolet 1849 = Liparotoma tripunctatum (Nicolet) 1849
„ trivialis Westring 1862 = Clubiona borealis Thorell 1870
„ troglodytes Walckenaer 1841 = Haplodrassus signifer (C. L. Koch) 1839
„ ultima Nicolet 1849 = Trachelopachys macrocsphalus (Nicolet) 1849
„ ventricosa Nicolet 1849 = Liparotoma ventricosum (Nicolet) 1849
„ versicolor Nicolet 1849 = Tomopisthes versicolor (Nicolet) 1849
„ versicolor Thorell 1890 = Clubiona thorelli Roewer 1951
„ virescens Sundevall 1832 = Cheiracanthium virescens (Sundevall) 1832
„ virgulata Blackwall 1859 = Mesiotelus virgatulus (Blackwall) 1859
„ viridicoma Urquhart 1859 = Anzacia viridicoma (Urquhart) 1891
„ viridis Risso 1826 = nicht zu deuten!

Cluilius:
„ chilensis Simon 1888 = Philisca chilensis (Nicolet) 1849

Cnephalocotes:
„ ambiguus Cambridge 1905 = Silometopus ambiguus (Cambridge) 1905
„ crassirostris Simon 1884 = Mecopisthes crassirostris (Simon) 1884
„ curtus Simon 1884, Cambridge 1894 = Silometotus curtus (Simon) 1881
„ dahli Carpenter 1900, Lessert 1909, 1910 = Mecopisthes silus (Cambridge) 1872
„ elegans Simon 1884, Becker 1896 = Silometopus ater (Blackwall) 1841
„ fuscus Cambridge 1899 = Nothocyba subaequalis (Westring) 1851
„ incurvatus Hull 1911 = Silometopus incurvatus (Cambridge) 1873
„ interjectus Chyzer & Kulczynski = Silometopus ater (Blackwall) 1841
„ laesus Kulczynski 1898 = Silometopus laesus (L. Koch) 1879
„ laesus Lessert 1910 = Silometopus ater (Blackwall) 1841
„ nesiotes Simon 1914 = Mecopisthes nesiotes (Simon) 1914
„ nitidithorax Simon 1914 = Silometopus nitidithorax (Simon) 1914
„ paulae Simon 1918 = Mecopisthes paulae (Simon) 1918
„ pusillus Simon 1884 = Mecopisthes silus (Cambridge) 1872
„ silus Chyzer & Kulczynski 1894 = Mecopisthes silus (Cambridge) 1872
„ subaequalis Lessert 1910 = Nothocyba subaequalis (Westring) 1851

Cocalus (= Cocala):
- „ bos Simon 1864 = Hyllus bos (Sundevall) 1833
- „ cyaneus C. L. Koch 1846 = Psecas cyaneus (C. L. Koch) 1846
- „ lancearius Thorell 1895 = Phaeacius lancearius (Thorell) 1895
- „ ramipalpis Thorell 1890, 1892 = Phaeacius ramipalpis (Thorell) 1890

Coccorchestes:
- „ adjacens Cambridge 1896, F. Cambridge 1901 = Cylistella adjacens (Cambridge) 1896
- „ cupreus Peckham 1895 = Cylistella cuprea (Simon) 1864
- „ scabaeoides Cambridge 1894, F. Cambridge 1901 = Cylistella scabaeoides (Cambridge) 1894

Coelotes:
- „ aemilii Bösenberg 1895 = Tegenaria maderiana Thorell 1875
- „ altilis Banks 1892, 1916 = Wadotes hybridis (Emerton) 1889
- „ atramentarius Simon 1875 = Coelotes segestriformis (Dufour) 1820
- „ atropos Pavesi 1873, Lebert 1877, Becker 1878, Calloni 1889 = nicht zu deuten!
- „ bimucronatus Simon 1898, Banks 1913, Crosby & Bishop 1926 = Wadotes bimucronatus (Simon) 1898
- „ brevidens Kulczynski 1898 = Coelotes solitarius L. Koch 1868
- „ bucculentus L. Koch 1868 = Tegenaria bucculenta (L. Koch) 1868
- „ calcaratus Keyserling 1887 ♂ (nec ♀), Emerton 1909 = Wadotes calcaratus (Keyserling) 1887
- „ calcaratus Keyserling 1887 ♀ (nec ♂) = Tegenaria domestica (Clerck) 1757
- „ castaneifrons Simon 1884 = Rubrius castaneifrons (Simon) 1884
- „ fidelis Banks 1892, 1916, Comstock 1912 = Coras juvenilis (Keyserling) 1881
- „ gnavus Banks 1892, 1916 = Cicurina arcuata Keyserling 1881
- „ hybridus Emerton 1889, Crosby & Bishop 1926 ♂ = Wadotes hybridus (Emerton) 1889
- „ hybridus Bishop & Crosby 1926 ♀ = Wadotes tennesseensis Gertsch 1936
- „ insidiosus L. Koch 1878 = Coras insidiosus (L. Koch) 1878
- „ intermedius Rosca 1935, 1937 = Coelotes kulczynskii (Drenski) 1917
- „ japonicus Karsch 1879 = Coras insidiosus (L. Koch) 1878
- „ juvenilis Keyserling 1881 = Coras juvenilis (Keyserling) 1881
- „ lamellosus Keyserling 1887 = Coras lamellosus (Keyserling) 1887
- „ leveillei Simon 1876 = Coelotes segestriformis (Dufour) 1828
- „ lineatus Banks 1892 = Coras juvenilis (Keyserling) 1881
- „ longitarsus Emerton 1889 ♂ = Wadotes calcaratus (Keyserling) 1887
- „ longitarsus Emerton 1889 ♀, Simon 1898, Banks 1892 = Coras juvenilis (Keyserling) 1881
- „ luctuosus L. Koch 1878 = Coras luctuosus (L. Koch) 1878
- „ medicinalis Emerton 1889, 1902 = Coras aerialis Muma 1946
- „ moellendorffi Bösenberg & Strand 1906 = Coelotes micado Strand 1907
- „ moerens Cambridge 1863 = Tuberta moerens (Cambridge) 1863
- „ montanus Emerton 1889 = Coras montanus (Emerton) 1889
- „ nigriceps Banks 1895 = Wadotes calcaratus (Keyserling) 1887
- „ pabulator Cambridge 1889 = Coelotes terrestris (Wider) 1834
- „ pastor Getaz 1889, Müller & Schenkel 1895 = nicht zu deuten!
- „ plancyi Simon 1880 = Coras plancyi (Simon) 1880
- „ plumarius Bishop & Crosby 1926 = Tegenaria domestica (Clerck) 1757
- „ roscidus L. Koch 1868, Simon 1875 = Coelotes segestriformis (Dufour) 1828
- „ roscidus Herman 1879 = Coelotes falciger Kulczynski 1897
- „ roscidus Calloni 1889 = nicht zu deuten!
- „ saxatilis Blackwall 1841, 1861 = Coelotes atropos (Waldkenaer) 1825
- „ solitarius Pavesi 1873 = nicht zu deuten!
- „ solitarius Lebert 1877 = nicht zu deuten!
- „ solitarius Calloni 1889 = nicht zu deuten!

Coelotes (Forts.):
„ solitarius Simon 1898 = Coelotes simoni Strand 1907
„ subfasciatus Simon 1884 = Rubrius antarcticus (Karsch) 1880
„ urbanus Keyserling 1887 = Coras medicinalis (Hentz) 1821
Coenoptychus:
„ pulchellus Simon 1897, Green 1912 = Coenoptychus pulcher Simon 1885
Coenothele:
„ gregalis Simon 1909, Berland 1913 = Mallos gregalis (Simon) 1909
Coleosoma:
„ blandum Cambridge 1882, Keyserling 1884 = Theridion vituperabile Petrunkevitch 1911
„ flavipes Cambridge 1895 = Theridion flavipes (Cambridge) 1895
„ floridanum Banks 1900 = Theridion floridanum (Banks) 1900
Collacantha:
„ geminata Dahl 1914 = Gasteracantha geminata (Fabricius) 1798
Colobocyba:
„ pallens Simon 1926 = Colobocyba exilis (Blackwall) 1853
Colonus:
„ crucifer F. Cambridge 1901 = Thiodina crucifera (F. Cambridge) 1901
„ puerperus F. Cambridge 1901 = Thiodina sylvana (Hentz) 1846
Colophon:
„ natalensis Cambridge 1874 = Caponia natalensis (Cambridge) 1874
Conopistha Karsch 1881 hat an die Stelle von **Argyrodes** Simon 1864 bzw. **Argyrodina** Strand 1926 zu treten.
„ bonadea Karsch 1881 = Conopistha (Argyrodina) argentea (Cambridge) 1880
Copa:
„ flavopilosa Simon 1897 = Copa flavoplumosa Simon 1885
Coptoprepes:
„ fulvopilosus Simon 1897, Tullgren 1901 = Coptoprepes flavopilosus Simon 1884
Coras:
„ lamellosus Muma 1944 = Coras aerialis Muma 1946
Coressa:
„ minutissima Simon 1894 = Theonoe minutissima (Cambridge) 1879
Coriarachne:
„ atomaria Menge 1876 = Ozyptila atomaria (Panzer) 1801
„ blackwalli Cambridge 1881 = Ozyptila blackwalli Simon 1875
„ brevipes Menge 1876 = Ozyptila brevipes (Hahn) 1825
„ claveata Menge 1875 = Ozyptila scabricula (Westring) 1851
„ fusca Menge 1876 = Xysticus lanio C. L. Koch 1845
„ horticola Menge 1876 = Ozyptila atomaria (Panzer) 1801
„ japonica Simon 1886 = Xysticus japonicus (Simon) 1886
„ lenta Chamberlin & Ivie 1944 = ? Coriarachne versicolor Keyserling 1880
„ melancholica Simon 1880 = Xysticus melancholicus (Simon) 1880
„ scabricula Simon 1875 = Ozyptila scabricula (Westring) 1851
„ scabricula Menge 1876, Cambridge 1881 = Ozyptila blackwalli Simon 1875
Corinna:
„ aenea Simon 1896 = Lausus aeneus (Simon) 1896
„ amoena C. L. Koch 1842 = Castianeira amoena (C. L. Koch) 1842
„ aurantiaca Mello-Leitao 1925 = Diestus alticeps (Keyserling) 1891
„ bellatrix Berland 1913 = Corinna bellator (L. Koch) 1866
„ cingulata C. L. Koch 1842 = Castianeira cingulata (C. L. Koch) 1842
„ memnonia C. L. Koch 1842 = Castianeira memnonia (C. L. Koch) 1842
„ plumosa Thorell 1881 = Castianeira plumosa (Thorell) 1881
„ praestans Cambridge 1911 = Trachelas praestans (Cambridge) 1911
„ severa Thorell 1877 = Corinnomma severum (Thorell) 1877
„ stigmatisata Simon 1897 = Corinna stigmatica Simon 1897
„ tahitica Strand 1913, 1914 = Corinna cetrata (Simon) 1888
„ tricolor C. L. Koch 1842 = Castianeira tricolor (C. L. Koch) 1842

Corinnomma:
„ dubium Cambridge 1898 = Myrmecotypus dubius (Cambridge) 1898
„ pilosum Cambridge 1898 = Myrmecotypus pilosus (Cambridge) 1898
Cornicularia:
„ clara F. Cambridge 1895 = Cornicularia cuspidata (Blackwall) 1833
„ corniculans Bösenberg 1902 = Prosopotheca corniculans (Cambridge) 1875
„ crinifrons Urquhart 1890 = Bolyphantes crinifrons (Urquhart) 1890
„ formosa Banks 1892 = Ceratinopsidis formosa (Banks) 1892
„ fugax Bösenberg 1902 = Wideria fugax (Cambridge) 1870
„ monoceras Menge 1869 = Cornicularia stylifera (Ohlert) 1867
„ monoceros Bösenberg 1902 = Prosopotheca monoceros (Wider) 1834
„ monticolens Chamberlin 1919 = Spirembolus monticolens (Chamberlin) 1919
„ pudens Cambridge 1900 = Wideria capito (Westring) 1862
„ recurvata Banks 1900 = Cheniseo recurvata (Banks) 1900
„ stativa Cambridge 1900 = Anacotyle stativa (Simon) 1881
„ tricornis Emerton 1882 = Tigellinus tricornis (Emerton) 1882
„ unicornis Bösenberg 1902 = Cornicularia kochii (Cambridge) 1872
„ valida Jackson 1909, Cambridge 1909 = Cornicularia kochii (Cambridge) 1872
Corynethrix:
„ tuberculatus Simon 1886 = Boliscus tuberculatus (Simon) 1886
Coryphaeolana:
„ mendica Braendegaard 1928 = Coryphaeolana holmgrenii (Thorell) 1871
Coryphaeolanus:
Alle Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Coryphaeolana**
Coryphaeus:
„ glabriceps F. Cambridge 1894 = Coryphaeolana distincta (Simon) 1884
„ mendicus L. Koch 1879, Jackson 1914 = Coryphaeolana holmgrenii (Thorell) 1871
Corypheus:
„ holmgrenii Bristowe 1925, 1933 = Coryphaeolana holmgrenii (Thorell) 1871
Corythalia:
„ cincta Mello-Leitao 1939 = Makthalia cincta Badcock 1932
„ endigma Chamberlin & Ivie 1936 = Corythalia obsoleta Banks 1929
„ heliophanoides Simon 1901 = Corythalia heliophanina (Taczanowski) 1871
„ lutea Simon 1903 = Corythalia parvula (Peckham) 1896
„ murcida Banks 1929 = Corythalia spiralis (F. Cambridge) 1901
„ parvula Bryant 1940 = Corythalia cubana Roewer 1951
„ signata Petrunkevitch 1911 = Corythalia banksi Roewer 1951
„ sitticus Chamberlin & Ivie 1936 = Corythalia bicincta Petrunkevitch 1925
Cosmophasis:
„ collingwodi Simon 1901 = Cosmophasis collingwoodi (Cambridge) 1871
„ rubra Simon 1901 = Cosmophasis bitaeniata (Keyserling) 1882
„ splendens Simon 1901 = Cosmophasis thalassina (C. L. Koch) 1846
Cragus:
„ mandibulatus Petrunkevitch 1925 = Wulfila mandibulata (Petrunkevitch) 1925
Cratorrhagus:
„ cervinus Simon 1890 = Hemirrhagus cervinus (Simon) 1890
Creugas:
Alle Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Corinna**
Crosbyana:
„ probata Strand 1934 = Eperigone probata (Emerton) 1882
Crustulina:
„ lascivula Keyserling 1886 = Dipoena lascivula (Keyserling) 1886
„ signata Simon 1881 = Lithyphantes signatus (Cambridge) 1876
„ sticta Keyserling 1886 = Crustulina guttata (Wider) 1834
Cryphoeca:
„ arietina Thorell 1870 = Tetrilus arietinus (Thorell) 1870
„ carpathica Herman 1879 = Cryphoeca silvicola carpathica (Herman) 1879
„ diversa Cambridge 1893 = Tetrilus diversus (Cambridge) 1893

Cryphoeca (Forts.):
„ latitans Menge 1870 = nicht zu deuten!
„ mirabilis Thorell 1870 = Tuberta moerens (Cambridge) 1863
„ moerens Simon 1875, Cambridge 1885 = Tuberta moerens (Cambridge) 1863
„ recisa Cambridge 1907 = Tetrilus macrophthalmus (Kulczynski) 1897

Crypsidromus:
„ convexus Ausserer 1871 = Acanthoscurria convexa (C. L. Koch) 1842
„ funestus Keyserling 1891 = Homoeomma villosum (Keyserling) 1891
„ gypsator Becker 1879 = Cyrtopholis bartholomaei (Latreille) 1832
„ innoncus Ausserer 1871 = Cyrtopholis innoncus (Ausserer) 1871
„ intermedius Ausserer 1875 = Phormictopus cancerides (Latreille) 1806
„ macropus Ausserer 1875 = Schizopelma macropus (Ausserer) 1875
„ pentaloris Simon 1888 = Hapalopus pentaloris (Simon) 1888
„ perfidus Keyserling 1891 = Homoeomma villosum (Keyserling) 1891
„ pernix Ausserer 1875 = Cyrtopholis pernix (Ausserer) 1875

Cryptoleptes:
„ paradoxus Simon 1884, 1894, 1913 = Centromerus paradoxus (Simon) 1884

Ctenium Menge 1870 hat an die Stelle von **Robertus** Cambridge 1879 zu treten.
„ clarkii Bertkau 1884 = Ctenium (Robertus) arundineti (Cambridge) 1870
„ pingue Menge 1870 = Ctenium (Robertus) lividus (Blackwall) 1836
„ lividum Bertkau 1884 = Ctenium (Robertus) lividus (Blackwall) 1836

Cteniza:
„ aedificatoria Ausserer 1871 = Ummidia (Pachylomerides) aedificatoria (Westwood) 1840
„ africana C. L. Koch 1839 = Nemesia africana (C. L. Koch) 1839
„ antipodiana White 1850 = Porrhothele antipodiana (Waldkenaer) 1837
„ californica Cambridge 1874 = Bothriocyrtum californicum (Cambridge) 1874
„ ferghanensis Kroneberg 1875 = Sterrhochrotus ferghanensis (Kroneberg) 1875
„ fodiens Cambridge 1873 = Cteniza sauvagesi (Rossi) 1790
„ grajum C. L. Koch 1836 = Cyrtocarenum grajum (C. L. Koch) 1836
„ hexops White 1850 = Porrhothele antipodiana (Waldkenaer) 1837
„ jonicum Cambridge 1873 — Cyrtocarenum jonicum (Saunders) 1842
„ malayana Doleschall 1859 = Conothele malayana (Doleschall) 1859
„ nitidulans Sells 1837 = Ummidia (Pachylomerides) nitidulans (Fabricius) 1787
„ orientalis Ausserer 1871 = Cyrtocarenum lapidarium (Lucas) 1853
„ orientalis mannii Ausserer 1871 = Cyrtocarenum lapidarium mannii (Ausserer) 1871
„ spinosa Blackwall 1832 = nicht zu deuten!
„ tigrina L. Koch 1867 = Cyrtocarenum cunicularium (Olivier) 1811
„ venatoria C. L. Koch 1839 = Ummidia (Pachylomerides) nitidulans (Fabricius) 1787

Ctenolophus:
„ kentanicus Purcell 1904 = Idiops kentanicus (Purcell) 1904

Ctenophora:
„ monticola Blackwall 1870, Cambridge 1872 = Mimetus monticola (Blackwall) 1870

Ctenophthalmus:
„ lineatus Simon 1880 = Ctenomma lineatum (Simon) 1880

Ctenus (= Ctena):
„ argentinus Holmberg 1881 = Cupiennius argentinus (Holmberg) 1881
„ bogotensis Keyserling 1876 = Ancylometes bogotensis (Keyserling) 1876
„ burtoni F. Cambridge 1898 = Ctenus capulinus (Karsch) 1879
„ carsoni F. Cambridge 1898 = Ctenus erythrochelis (Simon) 1876
„ castratus Strand 1909 = ? Ctenus rubripes Keyserling 1880
„ cinnamomeus C. L. Koch 1848 = Ctenus janeirus Waldkenaer 1837
„ cruciatus Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
„ cyclothorax Bertkau 1880 = Caloctenus cyclothorax (Bertkau) 1880
„ debilatus Strand 1908 = ? Anahita debilis (Pavesi) 1895
„ debilis Strand 1908 ♂ = Anahita debilis (Pavesi) 1895

Ctenus (Forts.):
- „ debilis Strand 1908 ♀ = Anahita cambridgei Lessert 1915
- „ fimbriatus Walckenaer 1837, F. Cambridge 1898 = Thalassius fimbriatus (Walckenaer) 1837
- „ granadensis Keyserling 1876 = Cupiennius granadensis (Keyserling) 1876
- „ herbigradus Des Arts 1912, Lawrence 1937, 1948 = Ctenus spenceri herbigradus (Des Arts) 1912
- „ impressus Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
- „ johnstoni F. Cambridge 1898 = Ctenus erythrochelis (Simon) 1876
- „ keyserlingi F. Cambridge 1897 = Ctenus ferus (Perty) 1833
- „ kükenthali Pocock 1897 = Ctenus celebensis Pocock 1897
- „ mordicus Cambridge 1892 = Cupiennius salei (Keyserling) 1876
- „ obscurus Thorell 1887, 1895, Cambridge 1897 = Ctenus feae F. Cambridge 1902
- „ obscurus Marx 1889 = nom. nud.
- „ oculatus Simon 1891 = Cupiennius salei (Keyserling) 1876
- „ oudinoti Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ pallidus L. Koch 1875, F. Cambridge 1898 = Thalassius pallidus (L. Koch) 1875
- „ peregrinoides Strand 1909 = ? Ctenus peregrinus F. Cambridge 1900
- „ pertyi F. Cambridge 1897 = Ctenus rufibarbis (Perty) 1833
- „ poecilus Thorell 1899 = Caloctenus poecilus (Thorell) 1899
- „ punctulatus Hentz 1844, Banks 1898, Crosby & Bishop 1926 = Anahita animosa (Walckenaer) 1837
- „ rivulatus Pocock 1899 = Ctenus nigromaculatus Thorell 1899
- „ rufibarbis Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
- „ salei Keyserling 1876 = Cupiennius salei (Keyserling) 1876
- „ scopulatus Pocock 1899 = Ctenus capulinus (Karsch) 1879
- „ spinosissimus Karsch 1879, F. Cambridge 1898 = Thalassius spinosissimus (Karsch) 1879
- „ torvus Pavesi 1883 = Thalassius torvus (Pavesi) 1883
- „ trabifer Thorell 1887 = Ctenus ramosus Thorell 1887
- „ trabifer Karsch 1891 = Ctenus karschi Roewer 1951
- „ trabifer Thorell 1895, F. Cambridge 1897, Gravely 1931 = Ctenus tamerlani Roewer 1951
- „ unicolor Walckenaer 1837 = Ctenus concolor (Perty) 1833
- „ velox Keyserling 1891, Mello-Leitao 1936 = Ctenus velocitatis Roewer 1951
- „ vertebratus F. Cambridge 1902, Mello-Leitao 1936 = Ctenus longipes Keyserling 1891

Cupiennius:
- „ arboreus Franganillo 1934 = nicht zu deuten!
- „ pilosus Franganillo 1930 = nicht zu deuten! (Ctenus ?)
- „ sallei F. Cambridge 1901, Strand 1910 = Cupiennius salei (Keyserling) 1876

Cybaeus:
- „ antarcticus Karsch 1880 = Rubrius antarcticus (Karsch) 1880
- „ conservans Chamberlin & Ivie 1932 part. = Cybaeus multnoma Chamberlin & Ivie 1942
- „ minor Banks 1904, Chamberlin & Ivie 1932 = Cybaeus hesper Chamberlin & Ivie 1932
- „ minoratus Gertsch 1936 = Cybaeus hesper Chamberlin & Ivie 1932
- „ minutus Banks 1905 = Cybaeina minuta (Banks) 1905
- „ montavencis Bishop & Crosby 1926 = Calymmaria montavencis (Bishop & Crosby) 1926
- „ morosus Emerton 1923 = Cybaeus signifer Simon 1886
- „ pusillus Simon 1886 = Cicurina pusilla (Simon) 1886
- „ reticulatus Worley 1932 = Cybaeus eutypus Camberlin & Ivie 1932
- „ signifer Emerton 1923 = Cybaeus morosus Simon 1886
- „ tetricus Menge 1871 = Amaurobius claustrarius (Hahn) 1831
- „ tetricus Simon 1875, Herman 1879, Lessert 1910 = Cybaeus angustiarum L. Koch 1868

Cybele:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Eustiromastix**
„ albopalpis Peckham 1901 = Compsodecta albopalpis (Peckham) 1901
„ grisea Peckham 1901 = Compsodecta grisea (Peckham) 1901
„ haytiensis Banks 1903 = Compsodecta haytiensis (Banks) 1903

Cyclocosmia:
„ theveneti Simon 1890 = Hebestatis theveneti (Simon) 1890

Cycloctenus:
„ fugax Goyen 1889 = Cycloctenus flaviceps L. Koch 1878
„ lepidus Urquhart 1882 = Cycloctenus flaviceps L. Koch 1878
„ pulcher Urquhart 1890 = Cycloctenus flaviceps L. Koch 1878

Cyclosa:
„ caudata L. Koch 1876 = Cyclosa sierae Simon 1870
„ caudata Keyserling 1893 = Cyclosa turbinata (Walckenaer) 1841
„ crassicauda Keyserling 1893 = Edricus crassicauda (Keyserling) 1865
„ cyclosternum Simon 1895 = nicht zu deuten!
„ fissicauda Cambridge 1889, F. Cambridge = Cyclosa bifurca (Mc Cook) 1887
„ laurae Simon 1874 = Nemoscolus laurae (Simon) 1868
„ macrura Strand 1911 = Cyclosa bifida (Doleschall) 1859
„ propinqua Simon 1882 = Cyclosa insulana (Costa) 1834
„ quadrituberosa Franganillo 1936 = nicht zu deuten!
„ sediculata Saito 1939 = Cyclosa sedeculata Karsch 1879
„ sierrae Simon 1874 = Cyclosa sierae Simon 1870
„ strangulata Simon 1885 = Cyclosa litoralis (L. Koch) 1867
„ thorelli Mc Cook 1893 = Eustala fuscovittata (Keyserling) 1863
„ trituberculata Simon 1874 = Cyclosa insulana (Costa) 1834
„ tubicola Simon 1887 = Nemoscolus tubicola (Simon) 1887

Cyclosternum:
„ semiaurantiacus Simon 1897 = Hapalopus semiaurantiacus (Simon) 1897
„ versicolor Simon 1897 = Hapalopus versicolor (Simon) 1897

Cyclothoracides: Roewer 1942 = **Cyclothoracoides** Strand 1929

Cyclothorax:
„ cyclothorax Mello-Leitao 1923 = Cyclothoracoides cyclothorax (Mello-Leitao) 1923

Cydippe:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Cydrela**

Cydonia:
„ luteola Peckham 1893 = Cerionesta luteola (Peckham) 1893

Cydrela:
„ crassimana Simon 1887 = Capheris crassimana (Simon) 1887
„ tripunctata Tullgren 1910 = Cydrela maculata Marx 1893
„ vandami Hewitt 1916 = Cydrelichus vandami (Hewitt) 1916

Cydrelichus:
„ tripunctatus Strand 1913, Lessert 1929 = Cydrela maculata Marx 1893

Cyllobelus:
„ miniaceomicans Simon 1888 = Cosmophasis miniaceomicans (Simon) 1888
„ nigrocyaneus Simon 1885 = Cosmophasis nigrocyanea (Simon) 1885

Cyllopodia:
„ cavata Hentz 1847 = Uptiotes cavatus (Hentz) 1897

Cylphosa:
„ sericata Chamberlin 1935 = Cylphosa bicolor (Hentz) 1847

Cyphagogus:
„ mouhotii Günther 1862 = Poltys mouhotii (Günther) 1862

Cyphonephila:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Nephila**
„ imperialis Dahl 1912 = Nephila laurinae Thorell 1881

Cyrba:
„ bicolor Keyserling 1883 = Salpesia bicolor (Keyserling) 1883
„ bimaculata Keyserling 1883 = Salpesia bimaculata (Keyserling) 1883
„ insularis Banks 1902 = Fuentes insularis (Banks) 1902
„ planipudens Keyserling 1883 = Artabrus planipudens (Karsch) 1881
„ pulex Keyserling 1884 = Habrocestum pulex (Hentz) 1846
„ squalida Keyserling 1883 = Salpesia squalida (Keyserling) 1883
„ taeniola Peckham 1888, Emerton 1902 = Fuentes taeniola (Hentz) 1845
„ villosa Keyserling 1883 = Salpesia villosa (Keyserling) 1883

Cyrene:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Phiale**
„ albosignata F. Cambridge 1901 = Freya albosignata (F. Cambridge) 1901
„ bicavata F. Cambridge 1901 = Freya bicavata (F. Cambridge) 1901
„ bifida F. Cambridge 1901 = Freya bifida (F. Cambridge) 1901
„ bifurcata F. Cambridge 1901 = Freya bifurcata (F. Cambridge) 1901
„ bilobata F. Cambridge 1901 = Phiale bilobata (F. Cambridge) 1901
„ bulbosa F. Cambridge 1901 = Freya bulbosa (F. Cambridge) 1901
„ curvispina F. Cambridge 1901 = Freya curvispina (F. Cambridge) 1901
„ emarginata F. Cambridge 1901 = Freya emarginata (F. Cambridge) 1901
„ flava F. Cambridge 1901 = Freya flava (F. Cambridge) 1901
„ gratiosa Bryant 1923 = Phiale bryantae Roewer 1951
„ grisea F. Cambridge 1901 = Freya grisea (F. Cambridge) 1901
„ infuscata F. Cambridge 1901 = Freya infuscata (F. Cambridge) 1901
„ longispina F. Cambridge 1901 = Freya longispina (F. Cambridge) 1901
„ maculatipes F. Cambridge 1901 = Freya maculatipes (F. Cambridge) 1901
„ minuta F. Cambridge 1901 = Freya minuta (F. Cambridge) 1901
„ prominens F. Cambridge 1901 = Freya prominens (F. Cambridge) 1901
„ regia F. Cambridge 1901 = Freya regia (Peckham) 1896
„ rustica F. Cambridge 1901 = Freya rustica (Peckham) 1896
„ sanguinea F. Cambridge 1901 = Freya sanguinea (Peckham) 1896

Cyriogonus:
„ rutenbergi Lessert 1919 = Cynathea rutenbergi (Karsch) 1881
„ vinsonii Lessert 1919 = Cynathea vinsonii (Thorell) 1875

Cyrsillus:
„ drassiformis Cambridge 1883 = Stiphropus drassiformis (Cambridge) 1883

Cyrtarachne:
„ bicurvata Becker 1879 = Mastophora cornigera (Hentz) 1850
„ bisaccata Emerton 1884 = Mastophora bisaccata (Emerton) 1884
„ caliginosa Rainbow 1894 = Dicrostichus caliginosus (Rainbow) 1894
„ coccinella Thorell 1890 = Paraplectana coccinella (Thorell) 1890
„ conohumeralis Hasselt 1895 = Pasilobus conohumeralis (Hasselt) 1895
„ cornigera Keyserling 1879 = Mastophora cornigera (Hentz) 1850
„ decemtuberculata Cambridge 1889, Keyserling 1892 = Glyptogona sextuberculata (Cambridge) 1889
„ dugesi Cambridge 1893 = Acanthepeira stellata (Walckenaer) 1805
„ furcata Cambridge 1877 = Dicrostichus furcatus (Cambridge) 1877
„ hobsoni Cambridge 1877 = Ordgarius hobsoni (Cambridge) 1877
„ longipes Cambridge 1877 = Cladomelea longipes (Cambridge) 1877
„ mexicana Cambridge 1893 = Acanthepeira stellata (Walckenaer) 1841
„ multilineata Atkinson 1888 = Mastophora bisaccata (Emerton) 1884
„ nigrohumeralis Hasselt 1882 = Pasilobus nigrohumeralis (Hasselt) 1882
„ quinquespinosa Keyserling 1892 = Actinosoma pentacantha (Walckenaer) 1841
„ raniceps Pocock 1900 = Cyrtarachne tricolor (Doleschall) 1859
„ speciosa L. Koch 1872 = Poecilopachys speciosa (L. Koch) 1872
„ tuberculiferum Berland 1927 = Cyrtarachne ixoides (Simon) 1870
„ verrucosa L. Koch 1871, Thorell 1881 = Poecilopachys verrucosa (L. Koch) 1871

Cyrtauchenius:
„ corcyraeus Thorell 1870 = Cyrtocarenum jonicum (Saunders) 1842
„ dentatus Purcell 1903 = Pelmatorycter dentatus (Purcell) 1903
„ doleschalli Ausserer 1871 = Amblyocarenum doleschalli (Ausserer) 1871
„ elongatum Simon 1873 = Leptopelma elongatum (Simon) 1873
„ flaviceps Pocock 1898 = Pelmatorycter flaviceps (Pocock) 1898
„ lapidarium Thorell 1870 = Cyrtocarenum lapidarium (Lucas) 1853
„ lateralis Purcell 1902 = Pelmatorycter lateralis (Purcell) 1902
„ maculatus Bertkau 1880 = Bolostromus maculatus (Bertkau) 1880
„ montanus Thorell 1890 = Damarchus montanus (Thorell) 1890
„ nigriceps Purcell 1902 = Pelmatorycter nigriceps (Purcell) 1902
„ obscurus Ausserer 1871 = Amblyocarenum obscurum (Ausserer) 1871
„ oneili Purcell 1902 = Pelmatorycter oneili (Purcell) 1902
„ similis Ausserer 1871 = Amblyocarenum simile (Ausserer) 1871
„ talpa Simon 1891 = Amblyocarenum talpa (Simon) 1891
„ terricola Simon 1892 = Cyrtauchenius gracilipes (Lucas) 1846
„ waldkenaerii Thorell 1870 = Amblyocarenum waldkenaerii (Lucas) 1846
„ zebra Simon 1892 = Pelmatorycter zebra (Simon) 1892

Cyrtocarenum:
„ arianum Ausserer 1871 = Cyrtocarenum cunicularium (Olivier) 1811
„ rufidens Ausserer 1871 = Stasimopus rufidens (Ausserer) 1871
„ tigrinum Ausserer 1871 = Cyrtocarenum cunicularium (Olivier) 1811

Cyrtocephalus (= Cyrtocephala):
„ lapidarium Lucas 1853 = Cyrtocarenum lapidarium (Lucas) 1853
„ mauritanicus Lucas 1846 = Amblyocarenum waldkenaerii (Lucas) 1846
„ terricola Lucas 1846 = Cyrtauchenius gracilipes (Lucas) 1846
„ waldkenaerii Lucas 1846 = Amblyocarenum waldkenaerii (Lucas) 1846

Cyrtogaster:
„ bispinosus Keyserling 1865, L. Koch 1871 = Poecilopachys bispinosa (Keyserling) 1865
„ excavatus L. Koch 1867 = Celaenia excavata (L. Koch) 1867
„ grubei Keyserling 1863, Simon 1895 = Cyrtarachne grubei (Keyserling) 1863
„ raniceps Pocock 1900 = Cyrtarachne perspicillata (Doleschall) 1859

Cyrtonota Simon 1864 = part.: **Maevia, Phidippus, Thiania, Cocala, Psecas, Salticus, Hyllus, Amycus**

Cyrtopholis
„ acutispina Strand 1907 = Cyrtopholis bartholomaei (Latreille) 1832
„ antillana Thorell 1894 = Cyrtopholis bartholomaei (Latreille)
„ implumis Franganillo 1931 = nicht zu deuten!
„ pelus Chamberlin 1917 = Cyrtopholis bartholomaei (Latreille) 1832
„ respinus Franganillo 1935 = nicht zu deuten!
„ venatorius Pocock 1903 = Cyrtopholis bartholomaei (Latreille) 1832

Cyrtophora:
„ angolensis Pocock 1899 = Cyrtophora gabonensis (Lucas) 1858
„ argentea Ausserer 1871 = Cyclosa insulana (Costa) 1834
„ basilica Simon 1895 = Allepeira basilica (Mc Cook) 1878
„ bifurca Mc Cook 1887 = Cyolosa bifurca (Mc Cook) 1887
„ conica Thorell 1870, Dahl 1883, Hansen 1885 = Cyclosa conica (Pallas) 1772
„ fusiformis Banks 1898 = Cyclosa fusiformis (Taczanowski) 1878
„ interalbicans Bösenberg & Lenz 1895 = Cyclosa insulana (Costa) 1834
„ margaritata Pocock 1899 = Cyclosa gemmosa Thorell 1899
„ melanura Simon 1877 = Cyclosa insulana (Costa) 1834
„ oculata Simon 1864, Bösenberg 1901 = Cyclosa oculata (Waldkenaer) 1802
„ opuntiae Simon 1874 = Cyrtophora citricola (Forskal) 1775
„ opuntiae nigra Franganillo 1925 = nicht zu deuten!
„ opuntiae pallida Franganillo 1925 = nicht zu deuten!
„ perfissa Thorell 1895 = Arachnura perfissa (Thorell) 1895
„ salebrosa Strand 1914 = Cyrtophora cicatrosa (Stoliczka) 1869

Cyrtophora (Forts.):
„ sculptilis L. Koch 1871 = Cyrtophora citricola (Forskal) 1775
„ tuberculata Keyserling 1893, Mc Cook 1893 = Dolichognatha tuberculata (Keyserling) 1893
„ viridis scalaris Strand 1934 = Cyrtophora cylindroides scalaris (Strand) 1914

Cyrtosternum:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Cyrtopholis**
„ ischnocoliforme Franganillo 1935 = nicht zu deuten!
„ majus Franganillo 1935 = nicht zu deuten!

Cytaea
„ barbatissima Keyserling 1883 = Servaea barbatissima (Keyserling) 1881
„ concinna Peckham 1885 = Phiale pratensis (Peckham) 1885
„ lauta Keyserling 1883 = Ascyltus lautus (Keyserling) 1881
„ minuta Peckham 1888 = Marchena minuta (Peckham) 1888
„ nigriventris Keyserling 1883 = Euryattus nigriventris (Keyserling) 1881
„ subsiliens Kulczynski 1910 = Cytaea piscula subsiliens (Kulczynski) 1910
„ subsinuata Strand 1909 = ? Cytaea sinuata (Doleschall) 1859

Dactylopisthes:
„ pauper Simon 1884 = Alioranus pauper (Simon) 1881

Damastes:
„ malagassus Strand 1907 = Damastes malagasus (Karsch) 1881

Dandridgea:
„ dysderoides White 1849, 1850 = Desis marina (Hector) 1877

Dapanus:
„ marmoratus Hentz 1845 (1875) = ? Pisaurina mira (Walckenaer) 1837

Daradius:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Thomisus**
„ annulipes Thorell 1891 = Thomisus spectabilis Doleschall 1859
„ bipunctatus Thorell 1891 = Thomisus spectabilis Doleschall 1859
„ variabilis Thorell 1897 = Thomisus stoliczkai (Thorell) 1887
„ yolophus Simon 1885, 1887 = Thomisus tripunctatus Lucas 1858

Dasumia:
„ istriaca Simon 1882 = Dasumia canestrinii (L. Koch) 1876
„ taenifera Thorell 1875 = Dasumia laevigata (Thorell) 1873

Dasynephila:
„ fenestrata Dahl 1912 = Nephila fenestrata Thorell 1859

Daturina:
„ hystrix Thorell 1876 = Pycnacantha tribulus (Fabricius) 1781

Decaphora:
„ trabiformis Franganillo 1931, 1934 = nicht zu deuten!

Decetia:
„ incisa Cambridge 1898 = Physocyclus globosus (Taczanowski) 1874

Deineresus:
„ walckenaerii White 1846, Hasselt 1879 = Hyllus walckenaerii (White) 1846

Deinognatha:
„ daindridgei White 1846 = Tetragnatha nitens (Audouin) 1827

Deinopis (= **Dinopis**):
„ bituberculatus Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
„ bubalus Simon 1890 = Deinopis cornigera Gerstäcker 1873
„ bubo Brito Capello 1867, Simon 1892, Berland 1913 = Deinopis anchietae (Brito Capello) 1867
„ ruandanus Strand 1913 = Deinopis cornigera Gerstäcker 1873
„ stauntoni Pocock 1902 = Deinopis cylindrica Pocock 1898
„ tuberculatus Franganillo 1926 = nicht zu deuten!

Dekana:
„ atra Strand 1913 = Sungenia atra (Strand) 1913

Delena:
„ canariensis Lucas 1838 = Olios canariensis (Lucas) 1838
„ cimicoides Nicolet 1849 = Doliomalus cimicoides (Nicolet) 1849
„ grandidieri Simon 1897 = Damastes grandidieri (Simon) 1880
„ hastifera Walckenaer 1837 = Camaricus hastiferus (Pecheron) 1833
„ immanis L. Koch 1867 = Isopeda immanis (L. Koch) 1867
„ impressa C. L. Koch 1845 = Delena canceroides Walckenaer 1837
„ lamina Nicolet 1849 = Doliomalus laminus (Nicolet) 1849
„ malagasa Simon 1897 = Damastes malagasus (Karsch) 1881
„ peroniana Walckenaer 1837 = Pandercetes peroniana (Walckenaer) 1837
„ plagusia Walckenaer 1837, C. L. Koch 1845 = Hemicloea plagusia (Walckenaer) 1805
„ plumipes Doleschall 1859 = Pandercetes plumipes (Doleschall) 1859

Deletrix:
„ exilis Blackwall 1837 = Oonops pulcher Templeton 1835

Deliana:
„ spinithorax Keyserling 1886 = Dipoena spinithorax (Keyserling) 1886

Delopelma:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Eurypelma**
„ steindachneri Petrunkevitch 1939 = Eurypelma californicum Ausserer 1871

Delorrhipis:
„ bicornis Emerton 1923 = Coreorgonal bicornis (Emerton) 1923
„ monoceros Simon 1884 = Coreorgonal monoceros (Simon) 1884
„ monoceros Simon 1894 = Gnathonargus unicornis (Banks) 1892

Delozeugma:
„ depicta Cambridge 1895 = Megalostrata depicta (Cambridge) 1895
„ formidabilis Cambridge 1893 = Megalostrata formidabilis (Cambridge) 1893
„ mordax Cambridge 1896 = Teudis mordax (Cambridge) 1896
„ mordicans Cambridge 1897 = Megalostrata mordicans (Cambridge) 1897

Dema:
„ simplex Karsch 1878 = Cyrtarachne simplex (Karsch) 1878

Demonax:
„ lugens Thorell 1881 = Demogenes lugens Thorell 1881

Demotarbus:
„ cubanus Franganillo 1930, 1931 = Eurypelma spinicrus (Latreille) 1819

Dendricon:
„ rastratus Cambridge 1889 = Pseudidiops rastratus (Cambridge) 1889

Dendrolycosa:
„ albolimbata Thorell 1878 = Hygropoda albolimbata (Thorell) 1878
„ dolomedes Thorell 1878 = Hygropoda dolomedes (Doleschall) 1859
„ exilis Thorell 1881 = Hygropoda exilis (Thorell) 1881
„ longitarsis Thorell 1877 = Hygropoda longitarsis (Thorell) 1877
„ tenella Simon 1893 = Voraptus tenellus (Simon) 1893

Dendryphantes:
„ aestivalis Emerton 1891, 1902 = Dendryphantes capitatus (Hentz) 1846
„ albobimaculatus Strand 1909 = Bianor albobimaculatus (Lucas) 1846
„ alboimmaculatus Peckham 1888 = Poultonella alboimmaculata (Peckham) 1883
„ amabilis Simon 1864 = Alcmena amabilis C. L. Koch 1846
„ annulipes Simon 1864 = Ballus chalybeius (Walckenaer) 1802
„ apachecus Chamberlin 1925 = Dendryphantes vitis Cockerell 1894
„ auratus C. L. Koch 1837, 1846 = nicht zu deuten!
„ badius Simon 1876 = Pseudicius badius (Simon) 1868
„ balteata Simon 1864 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
„ bicolor Simon 1864 = Carrhotus xanthogramma (Walckenaer) 1825
„ bifidus Banks 1895 = Dendryphantes aeneolus Curtis 1892
„ bilineatus Simon 1868 = Philaeus bilineatus (Walckenaer) 1825
„ bilineatus Petrunkevitch 1911 = Dendryphantes clarus (Keyserling) 1885
„ bimaculatus C. L. Koch 1846 = nicht zu deuten!

Dendryphantes (Forts.):
- „ bistriata Simon 1864 = Breda bistriata (C. L. Koch) 1846
- „ bombycius Simon 1876 = Dendryphantes hastatus (Clerck) 1757
- „ brevipes Simon 1864 = Ballus chalybeius (Walckenaer) 1802
- „ brunneus Petrunkevitch 1911 = Dendryphantes princeps (Peckham) 1883
- „ californicus Petrunkevitch 1911 = Dendryphantes graciosus Roewer 1951
- „ canescens C. L. Koch 1846 = Mogrus canescens (C. L. Koch) 1846
- „ capensis Simon 1864 = nicht zu deuten!
- „ capitatus Peckham 1909 part., Kaston 1938 = Dendryphantes galathea (Walckenaer) 1837
- „ castaneus Emerton 1911 = Dendryphantes canadensis (Banks) 1897
- „ castrensis Simon 1901 = Dendryphantes clarus (Keyserling) 1885
- „ chalcidon Petrunkevitch 1911 = Dendryphantes chalcedon (C. L. Koch) 1846
- „ comatus Petrunkevitch 1911 = Dendryphantes consimilis Roewer 1951
- „ conspersa 1864 = Marpissa undata (De Geer) 1778
- „ curtus Simon 1901 = Dendryphantes catus (Blackwall) 1867
- „ cuspidatus Petrunkevitch 1911 = Lurio cuspidatus (F. Cambridge) 1901
- „ digitatus Banks 1909 = Beata digitata (F. Cambridge) 1901
- „ diligens Kulczynski 1899 = Dendryphantes nidicolens (Walckenaer) 1802
- „ discoloria Simon 1864 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
- „ dissimilis Simon 1864 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
- „ dorsatus C. L. Koch 1846 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
- „ elegans Peckham 1888 = Tutelina elegans (Hentz) 1846
- „ encarpatus Simon 1876, Becker 1882 = Pseudicius encarpatus (Walckenaer) 1802
- „ erratica Simon 1864 = Icius hamatus (C. L. Koch) 1846
- „ fimbriatus Petrunkevitch 1911 = Lurio fimbriatus (F. Cambridge) 1901
- „ flavipedis Emerton 1913 = Dendryphantes exiguus Banks 1892
- „ fulviventris Simon 1868 = Philaeus albovariegatus (Simon) 1871
- „ grossus C. L. Koch 1837, Simon 1868 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
- „ guttatus Banks 1904, Petrunkevitch 1911 = Dendryphantes californicus (Peckham) 1888
- „ hamata Simon 1864 = Icius hamatus (C. L. Koch) 1846
- „ imperialis Peckham 1909 = Dendryphantes mannii Peckham 1901
- „ incerta Simon 1864 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
- „ insignis Banks 1892 = Dendryphantes octavus (Hentz) 1846
- „ insolens Simon 1901 = Dendryphantes clarus (Keyserling) 1885
- „ jeffersoni Emerton 1909, Chamberlin & Gertsch 1929 = Dendryphantes nigromaculatus (Keyserling) 1885
- „ jugatus L. Koch 1856 = Philaeus jugatus (L. Koch) 1856
- „ leucomelas C. L. Koch 1846, Simon 1868 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
- „ levispinus Petrunkevitch 1911, 1925 = Beata levispina (F. Cambridge) 1901
- „ medius C. L. Koch 1837, 1846, Ohlert 1867 = Dendryphantes hastatus (Clerck) 1757
- „ medius Canestrini & Pavesi 1868 = Pseudicius encarpatus (Walckenaer) 1802
- „ militaris Emerton 1891, 1902, 1909, Peckham 1909, Comstock 1912 = Dendryphantes marginatus (Walckenaer) 1837
- „ milvina Simon 1864 = Breda milvina (C. L. Koch) 1846
- „ minor C. L. Koch 1837 = Dendryphantes hastatus (Clerck) 1757
- „ montanus Kaston 1938 = Dendryphantes octavus (Hentz) 1846
- „ morsitans Simon 1901 = Dendryphantes variegatus (Lucas) 1833
- „ murcidus C. L. Koch 1846 = Carrhotus xanthogramma (Walckenaer) 1825
- „ multicolor Peckham 1888 = Dendryphantes aurantius (Lucas) 1833
- „ multiformis Simon 1901 = Dendryphantes clarus (Keyserling) 1885
- „ muscosus C. L. Koch 1837 = Marpissa rumpfii (Scopoli) 1763
- „ neglectus Simon 1868 = Mogrus neglectus (Simon) 1868
- „ nevoys Simon 1864 = Hyctia nivoyi (Lucas) 1846
- „ nigriceps Simon 1868 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
- „ nitelinus Kulczynski 1911 = Dendryphantes nidicolens (Walckenaer) 1825
- „ octavus Banks 1901, Simon 1901 = Dendryphantes capitatus (Hentz) 1846

Dendryphantes (Forts.):
„ octopunctatus Peckham 1893 = Beata octopunctata (Peckham) 1893
„ ornatus Banks 1892 = Dendryphantes capitatus (Hentz) 1846
„ pallida Simon 1864 = Thiodina pallida (C. L. Koch) 1846
„ pernix Peckham 1901 = Beata pernix (Peckham) 1901
„ perplexus Chamberlin & Ivie 1936 = Dendryphantes cupreus F. Cambridge 1901
„ pini Peckham 1886 et sequ. = Dendryphantes hastatus (Clerck) 1757
„ psittacinae Simon 1864 = Alcmena psittacinae C. L. Koch 1846
„ quadripunctata Simon 1864 = Pseudicius encarpatus (Walckenaer) 1802
„ retarius Banks 1898 = Thiodina sylvana (Hentz) 1846
„ riparius Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ ruber Simon 1901 = Dendryphantes mccookii (Peckham) 1883
„ rudis Simon 1876 et sequ. = Dendryphantes hastatus (Clerck) 1757
„ rufifrons Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ rufus Simon 1901 = Dendryphantes whitmani (Peckham) 1909
„ sausalitanus Chamberlin 1925 = Dendryphantes helenae Banks 1921
„ tardigradus Sordelli 1868 = Marpissa muscosa (Clerck) 1757
„ undata Simon 1864 = Marpissa undata (De Geer) 1778
„ varia Simon 1864 = Marpissa undata (De Geer) 1778
„ variegatus Caporiacco 1935 = Dendryphantes caporiaccoi Roewer 1951
„ virginis Chamberlin 1925, Kaston 1938 = Dendryphantes exiguus (Banks) 1892
„ xanthomelas C. L. Koch 1846 = Philaeus chrysops (Poda) 1761

Desis:
„ brevimanus Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ dysderoides Walckenaer 1837, L. Koch 1872 = Desis maxillosa (Fabricius) 1793
„ robsoni Powell 1878 = Desis marina (Hector) 1877

Deza:
„ sumptuosa Peckham 1894 = Psecas sumptuosa (Perty) 1833
„ sumptuosa Banks 1928 = Psecas euoplus Chamberlin & Ivie 1938

Dia:
„ arcigera Simon 1864 = Pellenes arcigerus (Walckenaer) 1837
„ atellana Simon 1864, Barta 1869 = Sitticus caricis (Westring) 1862
„ quinquefida Simon 1864 = Aelurillus litera v-insignitus (Clerck) 1757
„ qinquepartita C. L. Koch 1850 = Aelurillus litera v-insignitus (Clerck) 1757

Diaea:
„ albomaculata Bryant 1933 = Diaea albolimbata L. Koch 1875
„ candidans Cambridge 1876 = Synema candidans (Cambridge) 1876
„ chlorophila Holmberg 1881 = Misumenoides chlorophilus (Holmberg) 1881
„ daemelii L. Koch 1876 = Xysticus daemelii L. Koch 1874
„ damnosa Keyserling 1880 = Misumenops damnosus (Keyserling) 1880
„ decens Karsch 1878 = Synema decens (Karsch) 1878
„ devoniensis Cambridge 1879, 1881 = Diaea dorsata (Fabricius) 1781
„ diana Cambridge 1876 = Synema audouini Roewer 1951
„ globosa Pavesi 1873, 1880, Thorell 1873 = Synema globosum (Fabricius) 1775
„ guyanensis Keyserling 1880 = Misumenops guianensis (Taczonawski) 1872
„ imitatrix Pavesi 1883 = Synema imitatrix (Pavesi) 1883
„ lepida Thorell 1877 = Misumenops celer (Hentz) 1847
„ livens Simon 1876 = Diaea dorsata (Fabricius) 1781
„ nitida L. Koch 1878 = Diaea kochi Thorell 1881
„ ornata Thorell 1875 = Synema plorator (Cambridge) 1872
„ pallida Keyserling 1880 = Misumenops pallidus (Keyserling) 1880
„ pilula L. Koch 1876 = Xysticus pilula L. Koch 1867
„ puta Cambridge 1891 = Isaloides putus (Cambridge) 1891
„ regalis Rainbow 1902 = Diaea bipunctata Rainbow 1902
„ spinigera Cambridge 1898 = Misumenops celer (Hentz) 1847
„ tricuspidata Thorell 1870, 1872, Menge 1877 = Misumenops tricuspidatus (Fabricius) 1775
„ venusta L. Koch 1874 = Tharpyna venusta (L. Koch) 1874

Diana:
„ caparina Simon 1864 = Diaea dorsata (Fabricius) 1781
„ delicata Simon 1864 = Misumenops tricuspidatus (Fabricius) 1775
„ dorsalis Simon 1864 = Diaea dorsata (Fabricius) 1781
„ sphinx Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ violacea Simon 1864 = nicht zu deuten!

Diaphorocellus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Iheringia**

Diaphractus:
„ kalaharicus Hewitt 1915 = Diaphractus leipoldti Purcell 1907

Diapontia:
„ agalenoides Thorell 1887 = Hippasa agalenoides (Simon) 1884
„ albopunctata Mello-Leitao 1941 = Trochosa albopunctata (Mello-Leitao) 1941
„ freiburgensis Keyserling 1887 = ? Tetragonophthalma freiburgensis (Keyserling) 1876
„ gracilis Keyserling 1882 = Arctosippa gracilis (Keyserling) 1882
„ granadensis Keyserling 1876 = Porrima granadensis (Keyserling) 1876
„ infausta Mello-Leitao 1941 = Trochosa infausta (Mello-Leitao) 1941
„ kochii Keyserling 1878 = Trochosa oblonga (C. L. Koch) 1848
„ oblonga Mello-Leitao 1940 = Trochosa oblonga (C. L. Koch) 1848
„ olivacea Thorell 1887 = Hippasa olivacea (Thorell) 1887
„ simoni Thorell 1887 = Hippasa simoni (Thorell) 1887

Dicantha:
„ lata Butler 1873 = Gasteracantha tetracantha (Linné) 1767

Dicroneon:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Neon**

Dictis:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Scytodes**
„ domestica Thorell 1894, 1895 = Scytodes fusca (Walckenaer) 1837
„ fumida Thorell 1891 = Scytodes fusca (Walckenaer) 1837

Dictyna:
„ acuta Jones 1948 = Dictyna littoricolens Chamberlin & Ivie 1936
„ albopunctata Menge 1869 = Argenna albopunctata (Menge) 1869
„ alias Chamberlin 1948 = Dictyna sancta Gertsch 1946
„ alutatia C. L. Koch 1837 = nicht zu deuten!
„ ammophila Bösenberg 1902 = Dictyna latens (Fabricius) 1775
„ amophila Drenski 1940 = Dictyna ammophila Menge 1871
„ anguiniceps Simon 1899 = Archaeodictyna anguiniceps (Simon) 1899
„ annamae Gertsch & Mulaik 1946 = Dictyna bicornis Emerton 1915
„ arenicola Cambridge 1894 = Dictyna major Menge 1869
„ armata Banks 1911, Emerton 1915 = Dictyna formidolosa Gertsch & Ivie 1936
„ arundinaceoides Keyserling 1884, Banks 1901, Jones 1947 = Dictyna annulipes (Blackwall) 1846
„ arundinaceoides Chamberlin & Ivie 1944 = Dictyna coloradensis Chamberlin 1919
„ avara Banks 1898 = Mallos avarus (Banks) 1898
„ banksi Jones 1947 = Dictyna tridentata Bishop & Ruderman 1946
„ benigna Sundevall 1833 = Dictyna arundinacea (Linné) 1758
„ bifida Jones 1947 = Dictyna peragrata Bishop & Ruderman 1946
„ bishopi Gertsch & Mulaik 1940 = Dictyna secuta Chamberlin 1924
„ borealis Keyserling 1887 = Dictyna roscida (Hentz) 1850
„ bryantae Jones 1947 = Dictyna altamira Gertsch & Davis 1942
„ californica Jones 1947 = Dictyna reticulata Gertsch & Ivie 1936
„ chilapa Gertsch & Davis 1942 = Dictyna jacalana (Gertsch & Davis) 1937
„ cognata Cambridge 1885 = Dictyna major Menge 1869
„ contorta Jones 1947 = Dictyna phylax Gertsch & Ivie 1936
„ crassipalpis Dahl 1883 = Argenna patula (Simon) 1874
„ cruciata Simon 1911 = Dictyna simoni Petrunkevitch 1911

Dictyna (Forts.):

„ cubana Bryant 1940 = Dictyna spatula Gertsch & Davis 1937
„ curvata Jones 1948 = Dictyna hentzi Kaston 1945
„ dactylata Chamberlin 1929 = Dictyna calcarata Banks 1904
„ declarata Gertsch & Mulaik 1936 = Dictyna reticulata Gertsch & Ivie 1936
„ decolora Bryant 1933, Chamberlin 1946 = Dictyna urquharti Roewer 1951
„ decorata Banks 1892 = Dictyna sublata (Hentz) 1850
„ demores Chamberlin & Ivie 1944 = Dictyna angulata Emerton 1915
„ diligens Petrunkevitch 1911 = Dictyna annulipes (Blackwall) 1846
„ dubia Banks 1892 = Dictyna sublata (Hentz) 1850
„ dugesi Becker 1886 = Mallos dugesi (Becker) 1886
„ dyea Chamberlin & Ivie 1947 = Dictyna peragrata Bishop & Ruderman 1946
„ emertoni Jones 1947 = Dictyna annulipes (Blackwall) 1846
„ exlineana Jones 1948 = Dictyna olympiana Chamberlin 1919
„ extensa Jones 1947 = Dictyna longispina Emerton 1888
„ eutypus Chamberlin & Gertsch 1929 = Mallos eutypus (Chamberlin & Gertsch) 1929
„ flavescens Simon 1874, Becker 1896 = Dictyna hortensis Simon 1870
„ flavipedes Bryant 1940 = Dictyna meditata Gertsch 1936
„ floridana Banks 1904 = Dictyna pallida Keyserling 1887
„ foxii Banks 1892 = Lathys foxii (Marx) 1891
„ frondea Emerton 1888, 1902 = Dictyna foliacea (Hentz) 1850
„ ghigii Caporiacco 1938 = Mallos ghigii (Caporiacco) 1938
„ globiceps Simon 1870, 1892 = Dictyna latens (Fabricius) 1775
„ grandis Cambridge 1902 = Mallos grandis (Cambridge) 1902
„ grandis F. Cambridge 1902 = Mallos avarus (Banks) 1898
„ groenlandica Lenz 1897 = Dictyna borealis Cambridge 1877
„ hamifera Soerensen 1898 = Dictyna major Menge 1869
„ hardyi Gertsch 1946 = Dictyna cholla Gertsch & Davis 1942
„ hatchi Jones 1948 = Dictyna bellans Chamberlin 1919
„ hesperia Chamberlin 1916 = Mallos hesperius (Chamberlin) 1916
„ hoples Chamberlin 1929 = Dictyna calcarata Banks 1904
„ hystrica C. L. Koch 1837 = Theridion pallens Blackwall 1834
„ ignea Menge 1869 = nicht zu deuten!
„ keyserlingi Marx 1891, Banks 1910, Gertsch 1946=Dictyna roscida (Hentz) 1850
„ koziorowiczi Bösenberg 1902 = Dictyna latens (Fabricius) 1775
„ latens Bösenberg 1902 = Dictyna sedilloti Simon 1875
„ lugubris Cambridge 1873 = Dictyna latens (Fabricius) 1775
„ marxi Jones 1947 = Dictyna coloradensis Chamberlin 1919
„ mians Chamberlin 1920 = Mallos mians (Chamberlin) 1920
„ mitis Thorell 1875, Chyzer & Kulczynski 1897, Holm 1945 = Dictyna annulipes (Blackwall) 1846
„ montana Jones 1948 = Dictyna jonesae **nom. nov.**
„ montgomeryi Gertsch & Mulaik 1940 = Dictyna consulta Gertsch & Ivie 1936
„ monticola Simon 1870 = Titanoeca monticola (Simon) 1870
„ muraria Emerton 1888, 1902, Kaston 1945, 1948 = Dictyna annulipes (Blackwall) 1846
„ nivea F. Cambridge 1902, Simon 1903 = Mallos niveus Cambridge 1902
„ octomaculata Gertsch & Davis 1937 = Thallumetus octomaculatus (Gertsch & Davis) 1937
„ pacifica Jones 1948 = Dictyna terranea Ivie 1947
„ palmarum Simon 1886 = Dictyna conducens Cambridge 1876
„ parcita Chamberlin 1924 = Dictyna miniata Banks 1898
„ parietalis Petrunkevitch 1930 = Dictyna guanica Gertsch 1946
„ patellaris Jones 1947 = Dictyna segregata Gertsch & Mulaik 1936
„ patula Simon 1874 = Argenna patula (Simon) 1874
„ philoteichos Mc Cook 1893 = Dictyna sublata (Hentz) 1850
„ praefica Simon 1870 = Titanoeca praefica (Simon) 1870

Dictyna (Forts.):
„ puella Pavesi 1875 = nicht zu deuten!
„ puta Cambridge 1872 = Lathys cambridgii (Simon) 1874
„ putetorum Simon 1885 = Dictyna civica (Lucas) 1850
„ rotunda Jones 1948 = Dictyna oregona Gertsch 1946
„ rubra Emerton 1888 = Dictyna roscida (Hentz) 1850
„ savanna Chamberlin & Ivie 1944 = Dictyna altamira Gertsch & Davis 1942
„ scabra Simon 1874 = Dictyna latens (Fabricius) 1775
„ scalaris Canestrini 1873, 1874 = Dictyna bicolor Simon 1870
„ sedentaria Keyserling 1880 = Dictyna sublata (Hentz) 1850
„ socarnia Chamberlin 1948 = Dictyna uintana Chamberlin 1919
„ sociella Chamberlin 1919 = Dictyna bostoniensis Emerton 1888
„ sublata Banks 1891, Comstock 1912 = Dictyna annulipes (Blackwall) 1846
„ texana Jones 1948 = Dictyna iviei Gertsch & Mulaik 1936
„ toccoa Chamberlin & Ivie 1944 = Dictyna zaba Barrows & Ivie 1942
„ tristicula C. L. Koch 1837 = nicht zu deuten!
„ trivittata Gertsch 1935 = Mallos trivittatus (Banks) 1901
„ tuscona Chamberlin 1948 = Dictyna abundans Chamberlin & Ivie 1941
„ variabilis Ohlert 1867, Dahl 1883 = Dictyna flavescens (Walckenaer) 1825
„ variabilis Canestrini & Pavesi 1870 = nicht zu deuten!
„ vigilans Gertsch & Ivie 1936 = Dictyna annulipes (Blackwall) 1846
„ vincens Chamberlin 1919 = Dictyna major Menge 1869
„ viridissima Thorell 1873 Dictyna hortensis Simon 1870
„ viridissima Simon 1874 et sequ. = Dictyna walckenaeri Roewer 1951
„ vittata Keyserling 1884 = Dictyna foliacea (Hentz) 1850
„ volupis Keyserling 1882, 1884, Emerton 1888, 1902 = Dictyna sublata (Hentz) 1850

Dictynina:
„ eutypa Gertsch 1935 = Mallos eutypus (Chamberlin & Gertsch) 1929
„ pallida Banks 1904 = Mallos pallidus (Banks) 1904

Dictynoides:
„ arizonensis Chamberlin 1919 = Mallos dugesi (Becker) 1886

Dictyolathys:
„ californica Banks 1904 = Zanomys californica (Banks) 1904
„ maculata Banks 1900, Bryant 1943 = Lathys maculata (Banks) 1900

Dicymbium:
„ clavipes Menge 1868 = Dicymbium tibiale (Blackwall) 1836
„ gracilipes Menge 1868 = Dicymbium nigrum (Blackwall) 1834
„ pectinatum Emerton 1911 = Scirites pectinatum (Emerton) 1911
„ scabriculum Dahl 1886 = Troxochrus scabriculus (Westring) 1851

Dicyphus:
„ beckii Dahl 1886 = Lophocarenum turgidum (Blackwall) 1841
„ bicuspidatus Menge 1871 = Dismodicus elevatus (C. L. Koch) 1838
„ bilobatus Crosby 1905 = Hypemma marxii (Keyserling) 1886
„ bituberculatus Bertkau 1883, Bösenberg 1902 = Hypomma bituberculatum (Wider) 1834
„ cilunculus Menge 1869 = Hypomma cornutum (Blackwall) 1833
„ cornutus Bertkau 1880 et sequ. = Hypomma cornutum (Blackwall) 1833
„ trilobatus Banks 1896 = Oedothorax trilobatus (Banks) 1896
„ tumidus Menge 1871 = Hypomma bituberculatum (Wider) 1834

Dietopsis:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Dietopsa**

Dinamius siehe **Dynamius**

Dinopis siehe **Deinopis**

Diolenella:
„ carinifera Strand 1907 = Diolenius carinifer Strand 1907

Diolenius:
„ phrynoides Thorell 1878 et sequ. = Diolenius phrinoides (Walckenaer) 1837

Diops:
„ branickii Taczanowski 1874 = Nops branickii (Taczanowski) 1874
Diotima:
„ hirsutissima Simon 1880 = Devade hirsutissima (Simon) 1880
Diphya:
„ bilineata Tullgren 1901 = Diphya limbata Simon 1896
„ brevipes Nicolet 1849 = Diphya macrophthalma Nicolet 1849
„ crassipes Nicolet 1849 = Diphya macrophthalma Nicolet 1849
„ longipes Nicolet 1849 = Diphya macrophthalma Nicolet 1849
Diplocanthopoda:
„ marina Bristowe 1931 = Diplacanthopoda marina (Abraham) 1925
Diplocentria:
„ torrentum Simon 1929 = Diplocentria rivalis (Cambridge) 1905
Diplocephalus:
„ abruptus Crosby & Bishop 1928, 1933 =Mythoplastoides abruptus (Emerton) 1908
„ adjacens Cambridge 1903 = Streptosphaenus adjacens (Cambridge) 1913
„ annectens strandi Kolosvary 1937 = Plaesiocraerus connectens strandi (Kolosvary) 1937
„ antepenultimus Simon 1894, Lessert 1910 = Silometopus antepenultimus (Cambridge) 1882
„ arenarius Crosby & Bishop 1928 = Minyriolus arenarius (Emerton) 1911
„ barbatus Kulczynski 1908 = Savignia barbata (L. Koch) 1879
„ beckii Lessert 1910 = Lophocarenum turgidum (Blackwall) 1841
„ carolinus Banks 1911 = Ceratinops carolina (Banks) 1911
„ castaneipes Lessert 1904, 1923, Cambridge 1906, Schenkel 1923 = Plaesiocraerus fuscipes (Blackwall) 1836
„ castaneus Simon 1894, Crosby & Bishop 1928 = Minyriolus castaneus (Emerton) 1882
„ castigatorius Crosby 1905 = Tortembolus fasciatus (Banks) 1904
„ connectens Kulczynski 1894 = Plaesiocraerus connectens (Kulczynski) 1894
„ connectens subrufus Drenski 1939 = Plaesiocraerus connectens subrufus (Drenski) 1939
„ crenatoides Crosby 1905 = Ceratinops crenatus (Emerton) 1882
„ crenatus Simon 1894 = Ceratinops crenatus (Emerton) 1882
„ crumbi Petrunkevitch 1925 = Mimognatha foxi (Mc Cook) 1893
„ cryptodon Chamberlin 1920 = Zornella armata (Banks) 1905
„ culminicola Simon 1884 = Streptosphaenus culminicola (Simon) 1884
„ cuneatus Crosby & Bishop 1928 = Chocorua cuneata (Emerton) 1908
„ depressus Simon 1884, Crosby 1905 = Lophomma depressum (Emerton) 1882
„ eborodunensis Lessert 1905, 1910 = Plaesiocraerus helleri (L. Koch) 1869
„ erigonoides Simon 1894, Crosby 1905 = Eridantes erigonoides (Emerton) 1882
„ exiguus Crosby & Bishop 1928, 1933 = Mythoplastoides exiguus (Banks) 1892
„ frontatus Simon 1894, Bösenberg = Savignia frontata Blackwall 1833
„ furcillatus Förster & Bertkau 1883 = Tiggellinus furcillatus (Menge) 1871
„ fuscipes Lessert 1910, Schenkel 1923 = Plaesiocraerus fuscipes (Blackwall) 1936
„ gloriae Petrunkevitch 1930 = Mimognatha gloriae (Petrunkevitch) 1930
„ helleri Chyzer & Kulczynski 1894 = Plaesiocraerus helleri (L. Koch) 1869
„ humilis Chyzer & Kulczynski 1894 = Araeoncus humilis (Blackwall) 1836
„ insectus Lessert 1910 = Colobocyba insecta (L. Koch) 1869
„ kochii Lessert 1910 = Plaesiocraerus leberti Roewer 1942
„ latifrons Chyzer & Kulczynski 1894, Bösenberg 1902, Lessert 1910 = Plaesiocraerus latifrons (Cambridge) 1863
„ latus Simon 1894 = Ceratinops lata (Emerton) 1882
„ littoralis Crosby & Bishop 1928, 1933 = Ceratinops littoralis (Emerton) 1913
„ lusiscus Simon 1913, Hull 1932 = Plaesiocraerus lusiscus (Simon) 1872
„ minutus Crosby & Bishop 1928 = Cornicularia minuta Emerton 1882
„ montanus Simon 1894, Crosby 1905 = Minyriolus castaneus (Emerton) 1882

Diplocephalus (Forts.):
„ montiferus Banks 1916 = Oedothorax montiferus (Emerton) 1882
„ pallidus Crosby & Bishop 1928 = Scylaceus pallidus (Emerton) 1882
„ picinus Chyzer & Kulczynski 1894 et sequ. = Plaesiocraerus picinus (Blackwall) 1841
„ protuberans Cambridge 1907, Jackson 1907 = Plaesiocraerus protuberans (Cambridge) 1875
„ pullinus Simon 1918 = Streptosphaenus pullinus (Simon) 1918
„ simplex Simon 1894, Crosby 1905 = Tapinocyba simplex (Emerton) 1882
„ speciosus Cambridge 1899 = Entelecara speciosa (Cambridge) 1895
„ spinosus Hull 1901 = Streptosphaenus permixtus (Cambridge) 1870
„ subelevatus Chyzer & Kulczynski 1894 = Entelecara subelevata (L. Koch) 1869
„ subrufus Rosca 1935, 1936 = Plaesiocraerus connectens subrufus (Rosca) 1935
„ vernalis Banks 1910 = Cochlembolus vernalis (Emerton) 1882
„ wamutosus Chamberlin 1919 = Hybocoptus dentipalpis (Emerton) 1915

Diplostyla:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Bathyphantes**
„ concolor Emerton 1882 = Stylophora concolor (Wider) 1834
„ inornata Emerton 1917 = Bathyphantes emertoni Roewer 1942
„ nigrina Emerton 1882 = Stylophora nigrina (Westring) 1851
„ pallida Banks 1892 = Bathyphantes banksi Petrunkevitch 1911

Diplura:
„ calpeiana Thorell 1870 = Macrothele calpeiana (Walckenaer) 1805
„ fasciata Simon 1889 = Thalerothele fasciata Bertkau 1880
„ longipalpis Karsch 1879 = ? Heterothele gabonensis (Lucas) 1858
„ maculata Thorell 1890 = Macrothele maculata (Thorell) 1890
„ rogenhoferi Ausserer 1871 = Eudiplura rogenhoferi (Ausserer) 1871

Dipoena:
„ cyclosoides Simon 1895 = Dipoenura cyclosoides (Simon) 1895
„ lascivum Simon 1894 = Dipoena lascivula (Keyserling) 1886
„ leucoplagiata Simon 1881 = Mysmena leucoplagiata (Simon) 1879
„ nigra Keyserling 1886 = Dipoena nigerrima Petrunkevitch 1911
„ nigrina Lessert 1910 = Dipoena coracina (C. L. Koch) 1837
„ pallida Chickering 1950 = Dipoena furtiva Chickering (Roewer) 1951
„ petrunkevitchi Chickering 1950 = Dipoena roeweri Chickering (Roewer) 1951
„ proxima Lessert 1910 = Dipoena erythropus (Simon) 1881
„ tristis Petrunkevitch 1914 = Dipoena petrunkevitchi Roewer 1942
„ tubercula Bryant 1933 = Dipoena blattea (Urquhart) 1885

Dipoenura:
„ pyramidalis Simon 1909 = Theridion conigerum Simon 1914

Dirksia:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Ethobuella**

Dischiropus:
„ alticinctus Karsch 1891 = Epocilla aurantiaca (Simon) 1885

Dismodicus:
„ bituberculatus Hull 1932 = Hypomma bituberculatum (Wider) 1834
„ cornutus Hull 1932 = Hypomma cornutum (Blackwall) 1833
„ digitatus Hull 1932 = Typhochraestus digitatus (Cambridge) 1872

Dismodiscus:
„ alpinus Banks 1896 = Cochlembolus alpinus (Banks) 1896

Distillus:
„ frontosus Simon 1899 = Mantius frontosus (Simon) 1899
„ ravidus Simon 1899 = Mantius ravidus (Simon) 1899

Dixomys:
„ pineus Chamberlin 1948 = Thallumetus pineus (Chamberlin) 1944

Dolichognatha:
„ diversa Cambridge 1895 = Dolichognatha tuberculata (Keyserling) 1893
„ tigrina Simon 1893, 1894 = Dolichognatha tuberculata (Keyserling) 1893

Dolichoscaptus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Cyrtauchenius**
Dolomedes:
„ adamsoni Berland 1933 = Nukuhiva adamsoni (Berland) 1933
„ aerugina Simon 1864 = Dolomedes aerugineus C. L. Koch 1848
„ agelenoides Walckenaer 1841, Lucas 1846 = Agelena agelenoides (Walckenaer) 1841
„ albineus Banks 1904 = Teippus pinicola (Hentz) 1850
„ albocinctus Doleschall 1859 = Thalassius albocinctus (Doleschall) 1859
„ binotatus C. L. Koch 1848, Montgomery 1904 = Pisaurina mira (Walck.) 1837
„ borbonica Vinson 1863 = Hygropoda borbonica (Vinson) 1863
„ clercki Simon 1937 = Dolomedes fimbriatus (Linné) 1758
„ concolor Perty 1833 = Ctenus concolor (Perty) 1833
„ consocia Cambridge 1872 = Pisaura consocia (Cambridge) 1872
„ convexus Giebel 1869 = nicht zu deuten!
„ dufourii Walckenaer 1837, 1841 = Zoropsis spinimana (Dufour) 1820
„ elegans L. Koch 1876 = Nilus kochii Roewer 1951
„ errans Dufour 1831 = nicht zu deuten!
„ exilipes Lucas 1858 = Voraptus exilipes (Lucas) 1858
„ fimbriatus Westring 1862, Ohlert 1867 = Dolomedes plantarius (Clerck) 1757
„ fimbriatus Müller & Schenkel 1895 = nicht zu deuten!
„ fimbriatus C. L. Koch 1848 = Dolomedes clercki Simon 1937
„ fontanus Emerton 1885, Montgomery 1894, Comstock 1912 = Dolomedes scriptus Hentz 1845
„ fuscus Franganillo 1931, 1934 = nicht zu deuten!
„ hastulatus Hentz 1844 = nicht zu deuten!
„ hippomenes Thorell 1870 = Dolomedes hyppomene Audouin 1827
„ icadius L. Koch 1876 = Nilus icadius (L. Koch) 1876
„ idoneus Montgomery 1902, 1904, Emerton 1909 = Dolomedes tenebrosus Hentz 1843
„ imperiosus L. Koch 1876 = Dolomedes minor L. Koch 1876
„ insignis Lucas 1838 = Cladycnis insignis (Lucas) 1838
„ kochii Keyserling 1878 = Diapontia oblonga (C. L. Koch) 1848
„ lanceolatus Hentz 1847 = Dolomedes vittatus Walckenaer 1837
„ lepidus Thorell 1890 = Dendrolycosa lepida (Thorell) 1890
„ limbatus Hahn 1831, Simon 1876, Becker 1882 = Dolomedes fimbriatus (Linné) 1758
„ limbatus Müller & Schenkel 1895 = nicht zu deuten!
„ lineatus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ longimana Stoliczka 1869 = Hygropoda longimana (Stoliczka) 1869
„ longipes Taczanowski 1874 ♂ = Paradonessus taczanowski Caporiacco 1948
„ longipes Taczanowski 1874 ♀ = Paradonessus longipes (Taczanowski) 1874
„ lycaena Walckenaer 1837 = Zora spinnimana (Sundevall) 1832
„ marginatus Walckenaer 1805, 1837, Hahn 1831 = Dolomedes fimbriatus (Clerck) 1757
„ marginellus C. L. Koch 1848, Keyserling 1876 = Thaumasia marginella (C. L. Koch) 1848
„ massayae Pavesi 1883 = Thalassius massayae (Pavesi) 1883
„ minor Banks 1898 = Dolomedes minoratus Roewer 1951
„ mirabilis Hahn 1829, 1834 et sequ. = Pisaura mirabilis (Clerck) 1757
„ mirus Walckenaer 1837, Montgomery 1904 = Pisaurina mira (Walckenaer) 1837
„ montana Risso 1826 = nicht zu deuten!
„ neptunus Rainbow 1896 = Lycosa neptunus (Rainbow) 1896
„ oblongus C. L. Koch 1848 = Trochosa oblonga (C. L. Koch) 1848
„ ocreatus C. L. Koch 1841 = Zoropsis spinimana (Dufour) 1820
„ ocyale Walckenaer 1837 = Ocyale atalanta Audouin 1827
„ ornatus Blackwall 1859, 1861 = Dolomedes fimbriatus (Linné) 1758
„ ornatus Blackwall 1870 = Dolomedes lucensis Thorell 1870
„ pinicola Comstock 1912 et sequ. = Teippus pinicola (Hentz) 1850

Dolomedes (Forts.):
„ plantarius Kulczynski 1909 = Dolomedes clercki Simon 1937
„ pratensis Risso 1826 = nicht zu deuten!
„ punctipes Simon 1864 = Dolomedes signatus Waldkenaer 1837
„ riparius Hahn 1834 = Dolomedes plantarius (Clerck) 1757
„ rufus Waldkenaer 1837, part. = Teippus pinicola (Hentz) 1850
„ sacer C. L. Koch 1848 = Diapontia sacra (C. L. Koch) 1848
„ scapularis C. L. Koch 1848, Keyserling 1876 = Dolomedes triton Waldkenaer 1837
„ scheuchzeri Bremi-Wolff 1840 = Pisaura mirabilis (Clerck) 1757
„ scopularis Chamberlin & Ivie 1946 = Dolomedes triton Waldkenaer 1837
„ sexpunctatus Hentz 1845, Emerton 1885, 1902, 1909, Mc Cook 1890, Montgomery 1903, 1904 = Dolomedes triton sexpunctatus (Hentz) 1845
„ sexpunctatus Emerton 1909 part. = Dolomedes striatus Giebel 1869
„ spinimana Dufour 1820 = Zoropsis spinimana (Dufour) 1820
„ spinimana C. L. Koch 1835 = Zora spinimana (Sundevall) 1832
„ spinipes Rainbow 1896 = Lycosa spinipes (Rainbow) 1896
„ suspectus Chamberlin & Ivie 1944 = ? Dolomedes albineus Hentz 1845
„ tenax Hentz 1844 = Teippus praeceps (Waldkenaer) 1837
„ tenebrosus Emerton 1884 ♂ = Dolomedes vittatus Waldkenaer 1837
„ tenebrosus Emerton 1884 ♀, 1902 part. = Dolomedes scriptus Hentz 1845
„ unifasciata Doleschall 1859 = Perenethis unifasciata (Doleschall) 1859
„ urinator Banks 1895, Montgomery 1904 ♀, Emerton 1909 = Dolomedes vittatus Waldkenaer 1837
„ urinator Montgomery 1902 part. = Dolomedes scriptus Hentz 1845
„ vernalis Emerton 1909, Comstock 1912 = Dolomedes tenebrosus Hentz 1843
„ virgatus Waldkenaer 1837 = Pisaurina mira (Waldkenaer) 1837

Dolopoeus (= Dolopaeus):
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Thalassius**
„ doleschalli F. Cambridge 1898 = Thalassius albocinctus (Doleschall) 1859

Dolothymus:
„ pallidus Thorell 1890, 1892 = Epidius pallidus (Thorell) 1890

Donuca:
„ decorsi Simon 1903 = Donuea decorsi (Simon) 1903

Dossenus:
„ fulvotaeniatus Mello-Leitao 1924 = Dossenus fidelis Mello-Leitao 1920

Drances:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Dyrines**

Drapeta:
„ aeneus Menge 1873 = Liocranum rutilans (Thorell) 1875

Drapetisca:
„ socialis Emerton 1882 = Drapetisca alteranda Chamberlin 1909

Drassinella:
„ lepida Banks 1910 = Drassyllus lepidus (Banks) 1889

Drassodella:
„ salisburyi Tucker 1923 = Drassodella salisburii Hewitt 1916

Drassodes:
„ aegyptius Kulczynski 1908 = Drassodes pseudomorosus Strand 1915
„ beaufortensis Strand 1915 = Haplodrassus signifer (C. L. Koch) 1839
„ cognatus Simon 1914 = Haplodrassus cognatus (Westring) 1862
„ concertor Simon 1914 = Haplodrassus concertor (Simon) 1878
„ dalmatensis Simon 1914 = Haplodrassus dalmatensis (L. Koch) 1866
„ dimotus Simon 1908 = Anzacia dimota (Simon) 1908
„ dispulsus Schenkel 1936 = Scotophaeus dispulsus (Cambridge) 1885
„ erythrocephalus Denis 1937 = Zelotes erythrocephalus (Lucas) 1846
„ excavatus Rainbow 1920 = Anzacia excavata (Rainbow) 1920
„ gemineus Dalmas 1917 = Anzacia geminea (Dalmas) 1917
„ gosiutus Chamberlin 1919 = Geodrassus gosiutus (Chamberlin) 1919

Drassodes (Forts.):
- „ gracilis Westring 1862, Tullgren 1942 = ? Drassodes pubescens (Thorell) 1856
- „ inaudax Simon 1897 = Microdrassus inaudax (Simon) 1897
- „ incanus Thorell 1870 = Drassodes lapidosus (Walckenaer) 1902
- „ invalidus Simon 1914 = Haplodrassus invalidus (Cambridge) 1872
- „ kariae Strand 1916 = Drassodes similis Nosek 1905
- „ lapidicola Westring 1851, 1862 = Drassodes lapidosus (Walckenaer) 1802
- „ lutorius Tullgren 1910 = Camillina lutoria (Tullgren) 1910
- „ macellinus Simon 1914 = Haplodrassus macellinus (Thorell) 1870
- „ maoricus Dalmas 1917 = Hypodrassus maoricus (Dalmas) 1917
- „ melius Chamberlin 1919 = Orodrassus coloradensis (Emerton) 1877
- „ micaeus Simon 1908 = Anzacia micaea (Simon) 1908
- „ microps Lessert 1910, Simon 1914 = Haplodrassus microps (Menge) 1875
- „ minor Simon 1914 = Haplodrassus minor (Cambridge) 1879
- „ minusculus pictus Kulczynski 1899 = Haplodrassus dalmatensis pictus (Thorell) 1875
- „ morosus Kulczynski 1899, 1911 = Drassodes pseudomorosus Strand 1915
- „ musteculus Simon 1908 = Anzacia mustecula (Simon) 1908
- „ nigrosegmentatus Simon 1895 = Scotophaeus nigrosegmentatus (Simon) 1895
- „ nugatorius Simon 1908 = Anzacia simoni Roewer 1951
- „ petilus Simon 1908 = Anzacia petila (Simon) 1908
- „ pretiosus Dalmas 1917 = Scotophaeus pretiosus (L. Koch) 1873
- „ quadripunctatus Lessert 1910 = Scotophaeus quadripunctatus (Linné) 1758
- „ respersus Simon 1908 = Anzacia respersa (Simon) 1908
- „ robinsoni Kaston 1938 part. = Drassodes auriculoides Barrows 1919
- „ robustus Bryant 1908, Strand 1915 = Haplodrassus signifer (C. L. Koch) 1839
- „ rouxi Mello-Leitao 1939 = Apodrassodes rouxi (Mello-Leitao) 1939
- „ sarritus Simon 1908 = Anzacia sarrita (Simon) 1908
- „ scutulatus Lessert 1910 = Scotophaeus scutulatus (L. Koch) 1866
- „ seditiosus Caporiacco 1928 = Haplodrassus seditiosus (Caporiacco) 1928
- „ severus Westring 1851 = Drassodes villosus (Thorell) 1856
- „ severus Lebert 1877 = nicht zu deuten!
- „ severus Simon 1893, 1914 = Haplodrassus severus (C. L. Koch) 1839
- „ signatus Rainbow 1920 = Anzacia signata (Rainbow) 1920
- „ signifer Simon 1914, Braendegaard 1946 = Haplodrassus signifer (C. L. Koch) 1839
- „ silvestris Simon 1914 = Haplodrassus sylvestris (Blackwall) 1833
- „ singularis Caporiacco 1934 = Drassodes singulariformis Roewer 1951
- „ striatus Bösenberg 1902 = nicht zu deuten!
- „ troglodytes Lessert 1910, Simon 1914 = Haplodrassus signifer (C. L. Koch) 1839
- „ umbratilis Simon 1914 = Haplodrassus umbratilis (L. Koch) 1866
- „ validior Simon 1914 = Drassodes hispanus (L. Koch) 1866

Drassus:

Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Drassodes**
- „ adspersus Grube 1861 = Pterotricha adspersa (Grube) 1861
- „ aegyptius Cambridge 1874, Simon 1878 = Drassodes aegyptius (Cambridge) 1874
- „ aegyptus Simon 1914 = Drassodes aegyptius (Cambridge) 1874
- „ affinis Nicolet 1849 = Drassodes affinis (Nicolet) 1849
- „ affinis Pavesi 1875 = Phaeocedus braccatus (L. Koch) 1866
- „ albomaculatus Lucas 1846 = Poecilochroa albomaculata (Lucas) 1846
- „ albovittatus Lucas 1846 = Micaria albovittata (Lucas) 1846
- „ amaryi Pavesi 1875 = Phaeocedus braccatus (L. Koch) 1866
- „ anglicus Cambridge 1870 = Gnaphosa leporina (L. Koch) 1866
- „ angustifrons Westring 1862 = Boreoechemus angustifrons (Westring) 1862
- „ angustifrons Herman 1879 = Boreoechemus rhenanus (Bertkau) 1883
- „ assimilis Banks 1895 = Orodrassus assimilis (Banks) 1895
- „ ater Latreille 1806 part., Blackwall 1861, 1869 et sequ. = ? Zelotes subterraneus (C. L. Koch) 1833

Drassus (Forts.):

„ ater Hahn 1833, 1834, Walckenaer 1837 = Zelotes latreillei (Simon) 1878
„ atropos Walckenaer 1825, 1837 = Coelotes atropos (Walckenaer) 1825
„ auspex Simon 1878 = Poecilochroa dimidiata (Simon) 1878
„ australis Holmberg 1881 = Herpyllus australis (Holmberg) 1881
„ bicolor Hahn 1831 = Gnaphosa bicolor (Hahn) 1831
„ bicolor Costa 1835 = Poecilochroa phyllobia (Thorell) 1871
„ bicornis Emerton 1909 = Haplodrassus bicornis (Emerton) 1909
„ bidens Simon 1878, Chyzer & Kulczynski 1897 = Drassodes lapidosus bidens (Simon) 1878
„ blackwallii Thorell 1871, 1873 et sequ. = Scotophaeus blackwallii (Thorell) 1871
„ braccatus L. Koch 1866, Simon 1878 = Phaeocedus braccatus (L. Koch) 1866
„ brasilianus Keyserling 1891 = Zelotes brasiliana (Keyserling) 1891
„ brevimanus C. L. Koch 1839 = Aysha brevimana (C. L. Koch) 1839
„ brevipes Thorell 1875 = Scotophaeus validus (Lucas) 1846
„ brunneola Urquhart 1893 = Anzacia brunneola (Urquhart) 1893
„ buddebergi Simon 1887, Bösenberg 1902 = Haplodrassus capnodes (Thorell) 1875
„ bulbifer Cambridge 1874, 1879 = Phaeocedus braccatus (L. Koch) 1866
„ campestratus Cambridge 1874 = Poecilochroa campestrata (Cambridge) 1874
„ capito Lucas 1856 = Corinna capito (Lucas) 1856
„ capnodes Thorell 1875, Bösenberg 1902 = Haplodrassus capnodes (Thorell) 1875
„ capulatus Walckenaer 1837 = ? Sergiolus variegatus (Hentz) 1847
„ cerdo Thorell 1875 = Zelotes rusticus (L. Koch) 1872
„ chaetognathus Thorell 1887 = Echemus chaetognathus (Thorell) 1887
„ chebanus Thorell 1897 = Echemus chebanus (Thorell) 1897
„ cinereus Hahn 1831 = Drassodes lapidosus (Walckenaer) 1802
„ cinereus Hahn 1833 = Cicurina cicurea (Fabricius) 1793
„ cinereus Krynicki 1837 = Drassodes charcoviae (Thorell) 1875
„ cinereus C. L. Koch 1843, Heer 1846 = nicht zu deuten!
„ civilis Reuss 1834 = Heteropoda civilis (Reuss) 1834
„ clavator Cambridge 1860, Blackwall 1861 = Haplodrassus signifer (C. L. Koch) 1839
„ clubionde Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ coarctatus Lucas 1846 = Micaria formicaria (Sundevall) 1831
„ cognatus Westring 1862, Thorell 1871, Simon 1878 ♀, Dahl 1883, Chyzer & Kulczynski 1897, Bösenberg 1902 = Haplodrassus cognatus (Westring) 1862
„ cognatus Simon 1878 ♂ = Scotophaeus westringi Simon 1914
„ collingsiae Blackwall 1867 = nicht zu deuten!
„ coloradensis Emerton 1877, 1894 = Orodrassus coloradensis (Emerton) 1877
„ concertor Simon 1878 = Haplodrassus concertor (Simon) 1878
„ corcyreus Simon 1884 = Scotophaeus loricatus (L. Koch) 1866
„ corruscus L. Koch 1875 = Xerophaeus corruscus (L. Koch) 1875
„ criminalis Cambridge 1875 = Haplodrassus sylvestris (Blackwall) 1833
„ cupreus Blackwall 1834, 1861 = Haplodrassus lapidosus cupreus (Blackwall) 1833
„ dalmatensis L. Koch 1866 = Haplodrassus dalmatensis (L. Koch) 1866
„ debilis Hogg 1900 = Anzacia debilis (Hogg) 1900
„ decorus Blackwall 1869 = nicht zu deuten!
„ delinquens Cambridge 1875, 1879 = Haplodrassus dalmatensis (L. Koch) 1866
„ dilutus L. Koch 1873 = Echemus dilutus (L. Koch) 1873
„ dimidiatus Simon 1878, 1914 = Poecilochroa dimidiata (Simon) 1878
„ dispulsus Cambridge 1885 = Scotophaeus dispulsus (Cambridge) 1885
„ dives Lucas 1846 = Micariolepis dives (Lucas) 1846
„ dysderiformis Guérin 1830 = Clubiona dysderiformis (Guérin) 1830
„ electus Cambridge 1870 = Zelotes electus (C. L. Koch) 1839
„ elegans Nicolet 1849 = Storena elegans (Nicolet) 1849

Drassus (Forts.):

„ erebeus L. Koch 1873 = Megamyrmaekion erebum (L. Koch) 1873
„ erythrocephalus Lucas 1846 = Zelotes erythrocephalus (Lucas) 1846
„ exornatus Walckenaer 1841 = Nomisia exornata (C. L. Koch) 1839
„ fastuosus Walckenaer 1837, Lucas 1846 = Micaria fulgens (Walckenaer) 1802
„ femineus Simon 1873 = Leptodrassus femineus (Simon) 1873
„ ferrugineus Blackwall 1861 = Drassodes ferrugineus (Blackwall) 1861
„ ferrugineus Cambridge 1874 = Drassodes cambridgei Roewer 1951
„ flavescens Walckenaer 1825, 1837 = Dictyna flavescens (Walckenaer) 1825
„ flavitarsis Lucas 1846 = Phrurolithus flavitarsis (Lucas) 1845
„ formicarius Lucas 1846 = Micaria lucasii Thorell 1876
„ formicarius Urquhart 1886 = Lampona cylindrata (L. Koch) 1866
„ formosus Walckenaer 1841 = Micaria pulicaria (Sundevall) 1831
„ fugax Simon 1878 = Drassodes fugax (Simon) 1878
„ fulgens Walckenaer 1805, 1837 = Drassodes fulgens (Walckenaer) 1802
„ fulvus Thorell 1875 = Scotophaeus scutulatus (L. Koch) 1866
„ fumosus Westring 1851 = nicht zu deuten!
„ furtadoi Simon 1893 = Scotophaeus furtadoi (Simon) 1893
„ fuscus Latreille 1806, Walckenaer 1837 = Gnaphosa lucifuga (Walckenaer) 1802
„ fuscus Sundevall 1831, Westring 1862 = Scotophaeus scutulatus (L. Koch) 1866
„ fuscus C. L. Koch 1843, L. Koch 1866 = Haplodrassus cognatus (Westring) 1862
„ ghecuanus Thorell 1897 = Echemus ghecuanus (Thorell) 1897
„ gnaphosus Walckenaer 1805, 1837 = Callilepis nocturna (Linné) 1758
„ gotlandicus Thorell 1870, Menge 1875 = Scotophaeus blackwallii (Thorell) 1870
„ gracilipes Blackwall 1863 = Phrurolithus flavitarsis (Lucas) 1846
„ gracilis Simon 1878 = ? Drassodes pubescens (Thorell) 1856
„ griseus L. Koch 1873 = Echemus griseus (L. Koch) 1873
„ hebes Cambridge 1874 = Haplodrassus macellinus hebes (Cambridge) 1874
„ hellenicus Walckenaer 1841 = nicht zu deuten!
„ hiemalis Emerton 1909 = Haplodrassus hiemalis (Emerton) 1909
„ hispanus L. Koch 1866, Lebert 1877 = Drassodes hispanus (L. Koch) 1866
„ hispanus Simon 1878 = Drassodes heerii (Pavesi) 1873
„ immundus Kulczynski 1897 = Scotophaeus blackwallii (Thorell) 1871
„ incanus C. L. Koch 1837, Thorell 1870 = Drassodes lapidosus (Walckenaer) 1802
„ infuscatus Westring 1862 et sequ. = Haplodrassus sylvestris (Blackwall) 1833
„ inornatus Banks 1895 = Drassodes neglectus (Keyserling) 1887
„ insularis Lucas 1857 = Syrisca insularis (Lucas) 1857
„ invalidus Cambridge 1872, Simon 1878 = Haplodrassus invalidus (Cambridge) 1872
„ invenustus L. Koch 1872 = Anzacia invenusta (L. Koch) 1872
„ invisus Cambridge 1885 = Scotophaeus invisus (Cambridge) 1885
„ isabellinus Simon 1873, 1878 = Scotophaeus blackwallii isabellinus (Simon) 1873
„ lapidicola C. L. Koch 1837, 1839, et sequ. = Drassodes lapidosus (Walckenaer) 1802
„ lapidicolens Blackwall 1861 = Drassodes lapidosus (Walckenaer) 1802
„ lapidosus inermis Simon 1878 = Drassodes villosus (Thorell) 1856
„ laticeps Canestrini 1868, Canestrini & Pavesi 1868 = Ceto laticeps (Canestrini) 1868
„ lentiginosus C. L. Koch 1839, Walckenaer 1841 = Pterotricha lentiginosa (C. L. Koch) 1837
„ linnaei Audouin 1827 = Pterotricha linnaei (Audouin) 1827
„ listeri Audouin 1827, Walckenaer 1837 = Zelotes listeri (Audouin) 1827
„ longipes Nicolet 1849 = Herpyllus longipes (Nicolet) 1849
„ loricatus L. Koch 1866, Chyzer & Kulczynski 1897, Bösenberg 1902 = Scotophaeus loricatus (L. Koch) 1866

Drassus (Forts.):

„ lucifugus Waldkenaer 1805, 1825, 1837, Sundevall 1831 part., Blackwall 1861 part. = Gnaphosa lucifuga (Waldkenaer) 1802
„ lucifugus Blackwall 1861 part. = Gnaphosa leporina (L. Koch) 1866
„ lucifugus Sundevall 1831 part. = Gnaphosa montana (L. Koch) 1866
„ luctuosus Doleschall 1850 = Thelcticopis luctuosa (Doleschall) 1859
„ lugubris Waldkenaer 1837 = Micaria pulicaria (Sundevall) 1831
„ lyonnetii Audouin 1827, Waldkenaer 1837 = Zelotes lyonnetii (Audouin) 1827
„ macellinus Thorell 1870, Simon 1878 = Haplodrassus macellinus (Thorell) 1870
„ macer Thorell 1875, Chyzer & Kulczynski 1897 = Drassodes lapidosus macer (Thorell) 1875
„ maculatus Westring 1851 = Callilepis nocturna (Linné) 1758
„ maillardii Vinson 1863 = nicht zu deuten!
„ maxillosus Wider 1834 = Cheiracanthium punctorium (Villers) 1789
„ medius L. Koch 1866, Ohlert 1867 = Scotophaeus quadripunctatus (Linné) 1758
„ melanogaster Latreille 1806, Hahn 1834 = Gnaphosa lucifuga (Waldkenaer) 1802
„ mengei Simon 1878 = Scotophaeus mengei (Simon) 1878
„ micans Blackwall 1858, 1861 = Micaria pulicaria (Sundevall) 1831
„ microps Chyzer & Kulczynski 1897, Bösenberg 1902 = Haplodrassus kulczynskii Lohmander 1942
„ microps Menge 1875 = Haplodrassus umbratilis (L. Koch) 1866
„ minor Cambridge 1879, 1881, Chyzer & Kulczynski 1897, Bösenberg 1902 = Haplodrassus minor (Cambridge) 1879
„ minusculus L. Koch 1866, Simon 1878, Chyzer & Kulczynski 1897 = Haplodrassus dalmatensis (L. Koch) 1866
„ modestus Kulczynski 1897 = Haplodrassus modestus (Kulczynski) 1897
„ moestus Doleschall 1859 = Thelcticopis moesta (Doleschall) 1859
„ montanus Hahn 1834 = nicht zu deuten!
„ mundulus Cambridge 1872 = Scotophaeus mundulus (Cambridge) 1872
„ murinus Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ musculus Simon 1878 = Scotophaeus musculus (Simon) 1878
„ mysticus Cambridge 1894 = Haplodrassus signifer (C. L. Koch) 1839
„ navaricus Simon 1878 = Scotophaeus loricatus (L. Koch) 1866
„ nigritus Hahn 1831 = nicht zu deuten!
„ nigrofemoratus Cambridge 1874 = Poecilochroa variana (C. L. Koch) 1839
„ nigromaculatus Blackwall 1865 = Berlandina nigromaculata (Blackwall) 1865
„ nitens Blackwall 1833, 1861 = Micaria pulicaria (Sundevall) 1831
„ nocturnus Sundevall 1831 part. = Poecilochroa variana (C. L. Koch) 1839
„ nocturnus Sundevall 1831 part. = Zelotes ater (Hentz) 1832
„ nocturnus Sundevall 1831, var. b = Callilepis nocturna (Linné) 1758
„ nocturnus Waldkenaer 1837 = Poecilochroa conspicua (L. Koch) 1866
„ notatus Reuss 1834 = Thanatus notatus (Reuss) 1834
„ nyctalopes Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ nyctelius Thorell 1870 = Haplodrassus macellinus (Thorell) 1870
„ oblongus Simon 1878 = Drassodes lapidosus (Waldkenaer) 1802
„ occidentalis Lucas 1846 = Haplodrassus macellinus (Thorell) 1870
„ ocellatus Waldkenaer 1837 = Sergiolus decipiens Chamberlin 1922
„ ochropus L. Koch 1873 = Megamyrmaekion ochropus (L. Koch) 1873
„ omissus Cambridge 1872 = Haplodrassus omissus (Cambridge) 1872
„ orinus Thorell 1897 = Echemus orinus (Thorell) 1897
„ ornatus Cambridge 1874 = Talanites ornatus (Cambridge) 1874
„ pacificus Marx 1889 = nom. nud.
„ palliardii Cambridge 1870 = Scotina gracilipes (Blackwall) 1859
„ pallipes Lucas 1846 = Micaria pallipes (Lucas) 1846
„ parvulus Blackwall 1834 = Dictyna arundinacea (Linné) 1758
„ parvulus Lucas 1846 = Setaphis lucasi Roewer 1951
„ parvulus L. Koch 1882 = Drassodes parvicorpus Roewer 1951
„ patricius Simon 1878 = Poecilochroa patricia (Simon) 1878

Drassus (Forts.):

„ pedestris Cambridge 1861, Blackwall 1861 = Zelotes pedestris (C. L. Koch) 1837
„ pellus Urquhart 1893 = Anzacia pella (Urquhart) 1893
„ perelegans Rainbow 1894 = Anzacia perelegans (Rainbow) 1894
„ perexiguus Urquhart 1892 = Anzacia perexigua (Urquhart) 1892
„ phaleratus Sundevall 1831 = Asagena phalerata (Panzer) 1801
„ pictus Thorell 1875 = Haplodrassus dalmatensis pictus (Thorell) 1875
„ placidus Banks 1896 = Haplodrassus signifer (C. L. Koch) 1839
„ plapoensis Thorell 1897 = Echemus plapoensis (Thorell) 1897
„ politus Simon 1878 = Scotophaeus blackwallii politus (Simon) 1878
„ portator Simon 1878 = Drassodes luteomicans (Simon) 1878
„ praelongipes Cambridge 1861 = Scotina gracilipes (Blackwall) 1859
„ pretiosus L. Koch 1873 = Scotophaeus pretiosus (L. Koch) 1873
„ propinquus Blackwall 1854, 1861 = Phrurolithus festivus (C. L. Koch) 1835
„ pubescens Canestrini & Pavesi 1870 = nicht zu deuten!
„ pugnax Cambridge 1874 = Poecilochroa pugnax (Cambridge) 1874
„ pumilus Blackwall 1861 = Zelotes electus (C. L. Koch) 1839
„ pusillus Blackwall 1861 = Zelotes pusillus (C. L. Koch) 1833
„ quadripunctatus Thorell 1870 et sequ. = Scotophaeus quadripunctatus (Linné) 1758
„ quinquepunctatus Getaz 1889 = nicht zu deuten!
„ rangunensis Thorell 1895 = Echemus rangunensis (Thorell) 1895
„ ravidus Pavesi 1873 = Scotophaeus blackwallii (Thorell) 1871
„ razoumowskyi Pavesi 1873 = Zelotes rusticus (L. Koch) 1872
„ rebellatus Simon 1880 = Scotophaeus rebellatus (Simon) 1880
„ relucens Hahn 1834 = Micaria fulgens (Walckenaer) 1802
„ relucens Risso 1826 = nicht zu deuten! (Micaria?)
„ retusus Simon 1878 = Scotophaeus retusus (Simon) 1878
„ robustus Emerton 1889 = Haplodrassus signifer (C. L. Koch) 1839
„ rubens Ohlert 1867 = nicht zu deuten!
„ ruber Simon 1878 = Scotophaeus quadripunctatus (Linné) 1758
„ rubrens Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ rubrens (rubens) Menge 1850 = Scotophaeus mengei (Simon) 1878
„ rubrens Westring 1862, L. Koch 1866 = Scotophaeus quadripunctatus (Linné) 1758
„ rufescens Kroneberg 1875 = Scotophaeus rufescens (Kroneberg) 1875
„ rufipes Lucas 1846 = Drassodes rufipes (Lucas) 1846
„ rufipes Simon 1878 = nicht zu deuten!
„ saccatus Emerton 1889, 1902 = Drassodes neglectus (Keyserling) 1887
„ schaefferi (err.: scaefferi) Audouin 1827, Walckenaer 1837 = Pterotricha schaefferi (Audouin) 1827
„ scintillans Cambridge 1870 = Micaria scintillans (Cambridge) 1870
„ scitulus Urquhart 1892 = Anzacia scitula (Urquhart) 1892
„ scrutatus Cambridge 1872 = Scotophaeus scrutatus (Cambridge) 1872
„ scrutatus Simon 1878 = Scotophaeus scrutatus (Cambridge) 1872
„ scutulatus L. Koch 1866 et sequ. = Scotophaeus scutulatus (L. Koch) 1866
„ secretus Simon 1878 = Zelotes lyonnetii (Audouin) 1827
„ segestriformis Dufour 1820, 1858 = Coelotes segestriformis (Dufour) 1820
„ semitectus Simon 1885 = Scotophaeus semitectus (Simon) 1885
„ senilis Cambridge 1872 = Scotophaeus senilis (Cambridge) 1872
„ sericeus Sundevall 1831, Walckenaer 1837, C. L. Koch 1839, Westring 1862, Blackwall 1861 part. = Scotophaeus quadripunctatus (Linné) 1758
„ sericeus Blackwall 1843, 1861 part. = Scotophaeus blackwallii (Thorell) 1871
„ sericeus Lebert 1877, Calloni 1889 = nicht zu deuten!
„ severus C. L. Koch 1839, 1843, L. Koch 1866, Ohlert 1867, Simon 1878 = Haplodrassus severus (C. L. Koch) 1839
„ signifer C. L. Koch 1839 = Haplodrassus signifer (C. L. Koch) 1839
„ silaceus L. Koch 1872 = Anzacia silacea (L. Koch) 1872
„ silvestris Chyzer & Kulczynski 1897 = Haplodrassus sylvestris (Blackwall) 1833

Drassus (Forts.):
„ similis Nicolet 1849 = Storena elegans (Nicolet) 1849
„ similis L. Koch 1866 = Haplodrassus severus (C. L. Koch) 1839
„ soerenseni Strand 1900 = Haplodrassus soerenseni (Strand) 1900
„ spinifer Nicolet 1849 = Cyrioctea spinifera (Nicolet) 1849
„ spinulosus Thorell 1875 = Mesiotelus tenuissimus (L. Koch) 1966
„ subniger Cambridge 1861, 1873 = Argenna subnigra (Cambridge) 1861
„ subterraneus Westring 1851 = Zelotes tristis (Thorell) 1870
„ sylvestris Blackwall 1833, 1861 = Haplodrassus sylvestris (Blackwall) 1833
„ tenellus Thorell 1875 = Liocranum tenellum (Thorell) 1875
„ tenerrimus Cambridge 1872 = Leptodrassus tenerrimus (Cambridge) 1872
„ tenuis L. Koch 1866 = Zelotes tenius (L. Koch) 1866
„ tibialis Hahn 1833 = ? Scotophaeus scutulatus (L. Koch) 1866
„ troglodytes C. L. Koch 1839 et sequ. = Haplodrassus signifer (C. L. Koch) 1839
„ trucidator Walckenaer 1825, 1837 = Coelotes atropos (Walckenaer) 1825
„ typhon Simon 1878 = Haplodrassus macellinus (Thorell) 1870
„ umbratilis L. Koch 1866 et sequ. = Haplodrassus umbratilis (L. Koch) 1866
„ validus Lucas 1846 = Scotophaeus validus (Lucas) 1846
„ varianus Westring 1851 = Poecilochroa variana (C. L. Koch) 1839
„ vasifer Walkenaer 1805, 1837 = Herpyllus vasifer (Walckenaer) 1805
„ vastus Banks 1896 = Orodrassus vastus (Banks) 1896
„ viator L. Koch 1866, Simon 1878 = Scotophaeus validus (Lucas) 1846
„ vicarius Simon 1878 = Haplodrassus macellinus hebes (Cambridge) 1874
„ viduatus Pavesi 1883 = Poecilochroa viduata (Pavesi) 1883
„ viridissimus Walckenaer 1805, 1837 = Dictyna walckenaeri Roewer 1951
„ vulpinus Cambridge 1874 = Scotophaeus vulpinus (Cambridge) 1874

Drassyllus:
„ amissus Chamberlin 1835 = Drassyllus frigidus (Banks) 1892
„ frigidus Chamberlin 1935 = Drassyllus aprilinus (Banks) 1904
„ laccus Chamberlin 1922 = Zelotes laccus (Barrows) 1919
„ pullus Bryant 1936 = Zelotes pullus (Bryant) 1936

Drepanephora:
„ villosa Keyserling 1883 = Hypoblemum villosum (Keyserling) 1883

Drepanodus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Enoplognatha**
„ obscurus Menge 1869 = Enoplognatha thoracia (Hahn) 1831

Dryphias:
„ rusticus Simon 1901, Petrunkevitch 1911 = Dryphias maccuni (Peckham) 1895

Dugesiella:
„ californica Petrunkevitch 1939 = Eurypelma californicum Ausserer 1871
„ duplex Petrunkevitch 1939 = Eurypelma duplex Chamberlin 1925
„ epicureana Petrunkevitch 1939 = Eurypelma epicureanum Chamberlin 1925
„ mendozae Petrunkevitch 1939 = Eurypelma mendozae Strand 1907

Dyction:
„ reussi Walckenaer 1837 = Megamyrmaekion caudatum Reuss 1834

Dynamius:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Corythalia**

Dyomonomma:
„ drassoides Karsch 1879 = Ctenus drassoides (Karsch) 1879

Dysdera:
„ americana Simon 1868 = nom. nud.
„ angustata Lucas 1846 = Harpactea (Harpactes) angustata Lucas 1846
„ balearica Thorell 1873 = Dysdera crocota C. L. Koch 1839
„ cambridgii Thorell 1873 et sequ. = Dysdera erythrina (Walckenaer) 1802
„ coerulescens C. Koch 1874 = Dysdera crocota C. L. Koch 1839
„ cognata L. Koch 1870 = Harpactea (Harpactes) cognata (L. Koch) 1870
„ corallina Risso 1826 = nicht zu deuten!
„ crassipalpus Blackwall 1863 = Ariadna crassipalpus (Blackwall) 1863

Dysdera (Forts.):
- „ crocata Lebert 1877 = nicht zu deuten!
- „ crocata Becker 1896, Simon 1910, 1914, Drenski 1938 = Dysdera crocota C. L. Koch 1839
- „ crocota Bösenberg 1902 = Harpactea (Harpactes) rubicunda (C. L. Koch) 1839
- „ crocota hamulata Kulczynski 1897 = Dysdera hamulata (Kulczynski) 1897
- „ drassoides Simon 1882 = Harpactocrates drassoides (Simon) 1882
- „ elegans Walckenaer 1847 = nicht zu deuten!
- „ erythrina Heer 1846 = nicht zu deuten!
- „ fasciata Risso 1826 = nicht zu deuten!
- „ gracilis Wider 1834 = Harpactea (Harpactes) hombergii (Scopoli) 1763
- „ gracilis Nicolet 1849 = Dysdera crocota C. L. Koch 1839
- „ grisea Canestrini 1868 = Harpactea (Harpactes) grisea (Canestrini) 1868
- „ harpactes Walckenaer 1847 = Harpactea (Harpactes) hombergii (Scopoli) 1763
- „ hombergii Walckenaer 1825, et sequ. = Harpactea (Harpactes) hombergii (Scopoli) 1763
- „ ignava Simon 1882 = Harpactocrates ignavus (Simon) 1882
- „ inaequipes Simon 1882 = Harpactocrates inaequipes (Simon) 1882
- „ incerta Nicolet 1849 = Ariadna maxima (Nicolet) 1849
- „ insidiatrix Walckenaer 1837, Doblika 1833 = Ariadna insidiatrix Audouin 1827
- „ insulana Simon 1883 = Dysdera nesiotes Simon 1907
- „ interrita Hentz 1842, Emerton 1889, 1902 = Dysdera crocota C. L. Koch 1839
- „ kollari Simon 1892 = Dysdera subsquarrosa Simon 1914
- „ laevigata Thorell 1873 = Dasumia laevigata (Thorell) 1873
- „ latreillii Blackwall 1832, Templeton 1835 = Harpactea (Harpactes) hombergii (Scopoli) 1763
- „ lepida C. L. Koch 1839 = Harpactea (Harpactes) lepida (C. L. Koch) 1839
- „ longipes Nicolet 1849 = Ariadna maxima (Nicolet) 1849
- „ longitarsis Herman 1879 = Dysdera longirostris Doblika 1853
- „ lutea Risso 1826 = Aranea raji betulae Sulzer 1839; jetzt: Araneus pyramidalis Clerck 1757
- „ marusia Thorell 1883, Dahl 1883 = Dysdera crocota C. L. Koch 1839
- „ maxima Nicolet 1849 = Ariadna maxima (Nicolet) 1849
- „ obscura Blackwall 1858 = nicht zu deuten!
- „ parvula Dufour 1820, Thorell 1870 = Harpactea (Harpactes) parvula (Dufour) 1820
- „ pavesii Thorell 1873 = Dysdera ninnii Canestrini 1868
- „ provincialis Simon 1882 = Dysdera provincialis (Simon) 1882
- „ pulchra Walckenaer 1847 = Oonops pulcher Templeton 1835
- „ pumila Thorell 1873 = ? Dysdera fervida (Simon) 1882
- „ punctoria Thorell 1870 = Dysdera erythrina (Walckenaer) 1802
- „ rubicunda C. L. Koch 1839 = Harpactea (Harpactes) rubicunda (C. L. Koch) 1839
- „ rubicunda Heer 1846, Lebert 1877, Getaz 188 = nicht zu deuten!
- „ rubicunda Blackwall 1864, Dahl 1883 = Dysdera crocota C. L. Koch 1839
- „ rubicunda Menge 1872 = Dysdera erythrina (Walckenaer) 1802
- „ rubra Simon 1864 = nom. nud.
- „ sanguinipes Simon 1882 = Dysdera westringii Cambridge 1872
- „ scalaris C. L. Koch 1839 = ? Harpactea (Harpactes) lepida (C. L. Koch) 1839
- „ scheuchzeri Pavesi 1875 = Dasumia laevigata (Thorell) 1873
- „ spinipes Walckenaer 1847, Lucas 1846, Simon 1914, Denis 1934 = Ariadna insidiatrix Audouin 1872
- „ templetoni Vigors 1835 = Harpactea (Harpactes) hombergii (Scopoli) 1763
- „ tesselata Canestrini & Pavesi 1868 = Harpactea (Harpactes) hombergii (Scopoli) 1763
- „ virens Nicolet 1849 = Ariadna maxima (Nicolet) 1849

Dysderina:
- „ loricata Simon 1914 = Dysderina loricatula Roewer 1951

Dysmonomma:
„ brevicaudata Simon 1897 = Ctenus drassoides (Karsch) 1879
Ebaea:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Gea**
Ebo:
„ inquisitor Bryant 1933 = Titanebo californicus Gertsch 1933
„ mexicanus Banks 1898 = Titanebo mexicanus (Banks) 1898
Echemus:
„ angustifrons Holm 1940, Tullgren 1946 = Boreoechimus angustifrons (Westring) 1862
„ castrodennensis Getaz 1889 = Zelotes electus (C. L. Koch) 1839
„ rhenanus Bertkau 1883, Chyzer & Kulczynski 1897, Bösenberg 1902, Reimoser 1937 = Boreoechemus rhenanus (Bertkau) 1883
Ectatosticta:
„ australis Simon 1902 = Ectatosticta troglodytes (Higgins & Petterd) 1883
Edricus:
„ transitorius Petrunkevitch 1911 = Aranea transitoria (C. L. Koch) 1839
Egilona:
„ munda Cambridge 1896 = Ceratinopsis munda (Cambridge) 1896
Eilica:
„ cincta Banks 1909 = Eilicina cincta (Banks) 1909
Elaphidion:
„ flagelliferum Menge 1869 = ? Saloca flagellifera (Menge) 1869
Elaphipus:
„ flagelliferum Menge 1869 (in Reg.) = Saloca flagellifera (Menge) 1869
Elaphopus:
„ flagelliferum Simon 1894 = ? Saloca flagellifera (Menge) 1869
Elaver:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Clubiona**
„ tigrina Cambridge 1898 = Clubiona tigrinella Roewer 1951
Emathis:
„ cubensis Franganillo 1934, 1936 = Agobardus cubensis (Franganillo) 1934
„ haemorrhoidalis Simon 1899 = Lepidemathis haemorrhoidalis (Simon) 1899
„ sericea Simon 1899 = Lepidemathis sericea (Simon) 1899
„ unispina Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
Emblyna:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Dictyna**
„ ampla Chamberlin 1948 = Dictyna mariae (Chamberlin) 1948
„ bifida Chamberlin 1948 = Dictyna peragrata Bishop & Ruderman 1946
„ cognata Chamberlin 1948 = Dictyna chamberlini **nom. nov.**
„ eugenia Chamberlin 1948 = Dictyna annulipes (Blackwall) 1846
„ mitis Chamberlin 1948 = Dictyna annulipes (Blackwall) 1846
„ monoca Chamberlin 1948 = Dictyna piratica Ivie 1947
„ newina Chamberlin 1948 = Dictyna crosbyi Gertsch & Mulaik 1940
„ religens Chamberlin 1948 = Dictyna sancta Gertsch 1946
„ resana Chamberlin 1948 = Dictyna reticulata Gertsch & Ivie 1936
„ safrana Chamberlin 1948 = Dictyna stulta Gertsch & Mulaik 1936
„ siwa Chamberlin 1948 = Dictyna manitoba Ivie 1947
„ tosa Chamberlin 1948 = Dictyna hentzi Kaston 1945
„ urica Chamberlin 1948 = Mallos alpheus Chamberlin 1948
Emenista:
„ culta Simon 1926 = Linyphia impigra Cambridge 1870
Emmenophrys:
„ porcata Simon 1898 = Hamataliwa porcata (Simon) 1898
Encyocrypta:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Idiommata**
„ fuliginata Hogg 1901 = Idiommata fuliginea Thorell 1881

Enidia:
„ bituberculata Smith 1904 = Hypomma bituberculatum (Wider) 1834
Enoploctenus:
„ fallax Mello-Leitao 1922 = Enoploctenus maculipes Strand 1909
„ geralensis Strand 1909 = Enoploctenus cyclothorax (Bertkau) 1880
„ germaini Simon 1896, 1897, Strand 1915 = Enoploctenus cyclothorax (Bertkau) 1880
„ janeiroensis Strand 1909 = Enoploctenus cyclothorax (Bertkau) 1880
„ rondoni Mello-Leitao 1922 = Enoploctenus maculipes Strand 1909
„ strandi Mello-Leitao 1936 = Enoploctenus maculipes Strand 1909
„ wolfi Strand 1915 = Enoploctenus cyclothorax (Bertkau) 1880
„ zonatulus Strand 1909, Mello-Leitao 1936 = Enoploctenus cyclothorax (Bertkau) 1880
Enoplognatha:
„ nigrocincta Simon 1884 = Enoplognatha mandibularis nigrocincta (Simon) 1884
„ quadripunctata Simon 1884 = Enoplognatha thoracica (Hahn) 1831
„ robusta Simon 1884 = Enoplognatha robustula Roewer 1942
Entelecara:
„ altifrons Bösenberg 1902 = Entelecara acuminata (Wider) 1834
„ broccha Lessert 1905 = Rhaebothorax broccha (L. Koch) 1872
„ galerita Simon 1884 = Entelecara trifrons (Cambridge) 1863
„ gallica Simon 1908 = Entelecara congenera (Cambridge) 1879
„ jacksoni Cambridge 1902 = Hypselistes jacksoni (Cambridge) 1902
„ penicillata Simon 1891, Bösenberg 1902 = Styloctetor penicillatus (Westring) 1851
„ pusilla Hull 1932 = Minyriolus pusillus (Wider) 1834
Entomothele:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Ischnothele**
„ striatipes Simon 1892 = Ischnothele rutenbergi (Karsch) 1881
Enyo:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Zodarion**
„ amaranthina Lucas 1846 = Prodidomus amaranthinus (Lucas) 1846
„ annulipes L. Koch 1867 = Storena annulipes (L. Koch) 1867
„ braccata L. Koch 1867 = Storena braccata (L. Koch) 1867
„ italica Canestrini 1868, Simon 1874 ♀ = Zodarion italicum (Canestrini) 1868
„ italica Simon 1874 ♂ = Zodarion ludibundum Simon 1914
„ longipes Audouin 1827 = Zodarion nitidum (Audouin) 1827
„ nigrofusca Becker 1882 = Zodarion fulvonigrum Simon 1870
Eodelena:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Zachria**
Epeira:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Aranea**, für die jetzt **Araneus** 1757 Clerck einzutreten hat.
„ acalypha Walckenaer 1805, 1841 et sequ. = Mangora acalypha (Walckenaer) 1802
„ accincta Walckenaer 1841 = nicht zu deuten!
„ aciculata Walckenaer 1841 = nicht zu deuten!
„ acrobalia Thorell 1895 = Cyrtophora acrobalia (Thorell) 1895
„ aculeata Latreille 1806 = Micrathena aculeata (Fabricius) 1775
„ aculeata Emerton 1877, 1894 = Araneus carbonarioides (Keyserling) 1892
„ adianta Nicolet 1849 = Araneus advenus Petrunkevitch 1911
„ aemula Walckenaer 1841 = Argyope aemula (Walckenaer) 1841
„ aetherea Walckenaer 1841 = Argyope aetherea (Walckenaer) 1841
„ affinis Blackwall 1846 = Aranea foliata Fourcroy 1785; jetzt Araneus cornutus Clerck 1757
„ affinis Nicolet 1849 = Araneus affinitatus (Roewer) 1942
„ affinis Doleschall 1852 = Araneus circe (Audouin) 1827
„ affixa Walckenaer 1841 = nicht zu deuten!

Epeira (Forts.):

„ agalena Walckenaer 1805, 1841, Menge 1866, Blackwall 1864, Dahl 1883 = Araneus triguttatus (Fabricius) 1793
„ agalena Hahn 1834, Cambridge 1909 = Araneus redii (Scopoli) 1763
„ agalena Westring 1862, Cambridge 1881 = Araneus sturmii (Hahn) 1831
„ agalena Lebert 1877 — nicht zu deuten!
„ agalenoides Simon 1870 = Araneus sturmii (Hahn) 1831
„ alba Hentz 1850 = Kaira alba (Hentz) 1850
„ alba Keyserling 1885, 1892 = Araneus displicatus (Hentz) 1847
„ albertisii Thorell 1887 = Araneus enucleatus (Karsch) 1879
„ albimacula Blackwall 1854, 1864, Thorell 1870 = Zilla diodia (Walckenaer) 1802
„ albomaculata Lucas 1846 = Titanoeca albomaculata (Lucas) 1846
„ albomaculata Lenz 1886 = Araneus lenzi (Roewer) 1942
„ albostriata Keyserling 1865, 1893 = Parepeira albostriata (Keyserling) 1865
„ alsine Walckenaer 1805 et auct. sequ. = Araneus alsine (Walckenaer) 1802
„ alsine C. L. Koch 1845 = Araneus sturmii (Hahn) 1831
„ alticeps Keyserling 1879, 1892 = Verrucosa alticeps (Keyserling) 1879
„ alveata Walckenaer 1841 = nicht zu deuten!
„ amaurophila Holmberg 1876 = Verrucosa audax (Blackwall) 1863
„ ambagiosa Walckenaer 1841 = nicht zu deuten!
„ ambitoria Walckenaer 1841 = Argyope aurantia (Lucas) 1833
„ analis C. L. Koch 1845 = Araneus venatrix (Walckenaer) 1841
„ anama Walckenaer 1841 = Nephilengys malabarensis (Walckenaer) 1841
„ anastera Walckenaer 1841, Mc Cook 1893 = Eustala anastera (Walckenaer) 1841
„ ancora Krynicki 1837 = Steatoda bipunctata (Linné) 1758
„ angolensis Brito Capello 1866 = Cyrtophora gabonensis (Lucas) 1858
„ angulata C. L. Koch 1845 part., Westring 1862 part., Mc Cook 1893, Emerton 1902 = Araneus nordmanni (Thorell) 1870
„ angulata Emerton 1909 = Araneus solitarius (Emerton) 1884
„ annulata Lenz 1891 = Araneus annulellus (Strand) 1907
„ annulipes Lucas 1838 = Araneus annulipes (Lucas) 1838
„ annulipes Giebel 1867 = Aranea raji Scopoli 1763, jetzt: Araneus marmoreus Clerck 1757
„ annulipes Rainbow 1897 = Araneus annulipedatus (Roewer) 1942
„ anomala Taczanowski 1873 = Enacrosoma anomalum (Taczanowski) 1873
„ anseripes Walckenaer 1841 = Cyclosa insulana (Costa) 1834
„ anseripes Keyserling 1885 = Cyclosa trilobata (Urquhart) 1884
„ anthracina Blackwall 1864 = Singa pygmaea (Sundevall) 1831
„ antipodiana Walckenaer 1841 = Nephila antipodiana (Walckenaer) 1841
„ antriada Walckenaer 1805, 1841, Blackwall 1864 = Meta merianae (Scopoli) 1763
„ apoclysa Walckenaer 1805 part., Dufour 1831 = Aranea dumetorum Fourcroy 1785, jetzt: Araneus ocellatus Clerck 1757
„ apoclysa Walckenaer 1805 part., 1841 part., Sundevall 1832, Hahn 1834 = Aranea foliata Fourcroy 1785, jetzt: Araneus cornutus Clerck 1757
„ antriada Audouin 1827 = Araneus suspicax (Cambridge) 1876
„ apoclysa Giebel 1867, 1869 = nicht zu deuten!
„ apotroga Walckenaer 1841 = Eustala anastera (Walckenaer) 1841
„ appendiculatum Taczanowski 1873 = nicht zu deuten!
„ appensa Walckenaer 1841 = Argyope appensa (Walckenaer) 1841
„ approximata Blackwall 1846 = ? Araneus trifolium (Hentz) 1847
„ arbustorum C. L. Koch 1837, Dahl 1883 = Araneus gibbosus (Walckenaer) 1802
„ arenata Walckenaer 1841 = Verrucosa arenata (Walckenaer) 1841
„ argentata Walckenaer 1841 = Argyope argentata (Fabricius) 1775
„ argyraspidis Walckenaer 1841 = Argyope trifasciata (Forskal) 1775
„ argyopes Walckenaer 1841 = Eustala tridentata (C. L. Koch) 1839
„ armata Cambridge 1889, Keyserling 1892 = Parawixia armata (Cambridge) 1889

Epeira (Forts.):
- „ armictoria Waldkenaer 1841 = Argyope argentata (Fabricius) 1775
- „ armillipes Doumerc 1864 = Nephila senegalensis (Waldkenaer) 1841
- „ arundinacea C. L. Koch 1835, 1845, Ohlert 1867 = Aranea foliata Fourcroy 1785, jetzt: Araneus cornutus Clerck 1757
- „ assidua Waldkenaer 1841 = nicht zu deuten!
- „ assidua Vinson 1863 = Araneus theis (Waldkenaer) 1841
- „ atomaria Cambridge 1876 = Larinia atomaria (Cambridge) 1876
- „ atriapicata Urquhart 1890 = Araneus pustulosus (Waldkenaer) 1841
- „ atrica Westring 1851, 1862 = Zygiella calophylla (Waldkenaer) 1802
- „ attenuata Urquhart 1884 = Argyope protensa (L. Koch) 1871
- „ aubryi Lucas 1858 = Nephila senegalensis (Waldkenaer) 1841
- „ audax Blackwall 1863, Keyserling 1892 = Verrucosa audax (Blackwall) 1863
- „ aurantia Lucas 1840 = Argyope aurantia (Lucas) 1833
- „ aurantiaca C. L. Koch 1836, 1845 = Araneus triguttatus (Fabricius) 1793
- „ aurantiaca Canestrini & Pavesi 1870 = nicht zu deuten!
- „ aurelia Waldkenaer 1841 = Argyope trifasciata (Forskal) 1775
- „ aureola Hentz 1847 = Araneus trifolium (Hentz) 1847
- „ australasia Waldkenaer 1841 = nicht zu deuten!
- „ australis Waldkenaer 1841, Vinson 1863 = Argyope clathrata (C. L. Koch) 1839
- „ austriaca Thorell 1870 = Araneus circe (Audouin) 1827
- „ azzara Waldkenaer 1841 = Nephilengys cruentata (Fabricius) 1775
- „ balaustina Mc Cook 1888, 1893 = Eriophora circulata (Waldkenaer) 1841
- „ baltimorensis Keyserling 1879 = Araneus thaddeus (Hentz) 1847
- „ basilica Mc Cook 1878 = Allepeira basilica (Mc Cook) 1878
- „ beccarii Thorell 1878, Worman 1896 = Cyrtophora beccarii (Thorell) 1878
- „ beelzebub Hasselt 1873 = Carepalxis beelzebub (Hasselt) 1873
- „ bella Meade 1861, Blackwall 1864 = Cercidia prominens (Westring) 1851
- „ benjamini Keyserling 1892, Mc Cook 1893 = Araneus benjamini (Waldkenaer) 1841
- „ bertkaui Keyserling 1890 = Araneus maculatipes (L. Koch) 1871
- „ bicentenaria Mc Cook 1888 = Araneus angulatus (Clerck) 1757
- „ bicolor C. L. Koch 1839 = Araneus bicolorata (Roewer) 1942
- „ bicolor Waldkenaer 1841 = Araneus vulpinus (Hahn) 1834
- „ bicornis Waldkenaer 1841, C. L. Koch 1845, Blackwall 1864 = Araneus gibbosus (Waldkenaer) 1802
- „ bicornis Westring 1851, 1862 = Araneus omoedus (Thorell) 1870
- „ bifida Doleschall 1859, Thorell 1878, Workman 1896 = Cyclosa bifida (Doleschall) 1859
- „ bifida Banks 1909 = Eustala bifida (F. Cambridge) 1904
- „ bifurcata Waldkenaer 1841, Keyserling 1892 = Cyclosa bifurcata (Waldkenaer) 1841
- „ bifurcata Keyserling 1863 = Cyclosa cervicula (Mc Cook) 1893
- „ bilineata Cantor 1842 = nicht zu deuten!
- „ bimaculata Cambridge 1889, Keyserling 1893 = Mangora bimaculata (Cambridge) 1889
- „ biocellata Canestrini 1868 = Araneus redii (Scopoli) 1763
- „ bistriata Rengger 1836 = Eriophora bistriata (Rengger) 1836
- „ bivariolata Cambridge 1889, Keyserling 1892, Mc Cook 1893 = Eriophora edax (Blackwall) 1863
- „ bivittata Waldkenaer 1841 = Araneus miniatus (Waldkenaer) 1841
- „ bogoriensis Doleschall 1859 = Araneus dehaanii (Doleschall) 1859
- „ bohemica C. L. Koch 1839 ♀ = Aranea raji Scopoli 1763, jetzt: Araneus marmoreus Clerck 1757
- „ bohemica C. L. Koch 1839 ♂ = Araneus alsine (Waldkenaer) 1802
- „ bombycinaria Hentz 1847, Keyserling 1892 = Eustala anastera (Waldkenaer) 1841
- „ bonsallae Mc Cook 1893 = Araneus bispinosus (Keyserling) 1885

Epeira (Forts.):

- „ borbonica Vinson 1863 = Nephilengys cruentata borbonica (Vinson) 1863
- „ bougainvillea Walckenaer 1847 = Argyope bougainvillea (Walckenaer) 1847
- „ bradleyi Keyserling 1887 = Cyrtophora beccarii (Thorell) 1878
- „ braminica Stoliczka 1869, Simon 1884 = Araneus theis (Walckenaer) 1841
- „ brasiliensis Walckenaer 1841 = Nephilengys cruentata (Fabricius) 1775
- „ brounii Urquhart 1884 ♂ = Araneus pustulosus (Walckenaer) 1841
- „ brounii Urquhart 1884 ♀ = Araneus brounii (Urquhart) 1884
- „ bucardia Mc Cook 1893 = Cyrtophora californiensis (Keyserling) 1885
- „ bulleri Thorell 1881 = Cyclosa bulleri (Thorell) 1881
- „ burmeisteri Holmberg 1878 = Eriophora burmeisteri (Holmberg) 1876
- „ byzanthina Pavesi 1876 = Araneus adiantus (Walckenaer) 1802
- „ cacti-opuntiae Lucas 1838 = Cyrtophora citricola (Forskal) 1775
- „ caestata Thorell 1890 = Araneus dehaanii (Doleschall) 1859
- „ caerulea Bertkau 1880 = Araneus lathyrinus (Holmberg) 1873
- „ cajetana Costa 1882 = Cyrtophora citricola (Forskal) 1775
- „ caligata Thorell 1890 = Cyclosa caligata (Thorell) 1890
- „ caliginosa Walckenaer 1841 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
- „ callida Walckenaer 1841 = Araneus callidulus (Roewer) 1942
- „ calophylla Sundevall 1832, Walckenaer 1841, Blackwall 1864 = Zygiella calophylla (Walckenaer) 1802
- „ calva Blackwall 1852, 1864 = Singa albovittata (Westring) 1851
- „ calyptrata Thorell 1895, Workman 1896 = Zygiella calyptrata (Thorell) 1895
- „ cambridgii Keyserling 1893 = Eustala illicata (Cambridge) 1889
- „ camelina Simon 1870 = Araneus triguttatus triguttatus (Fabricius) 1793
- „ camelodes Thorell 1878 = Cyclosa camelodes (Thorell) 1878
- „ canadensis Blackwall 1846 = Cyclosa conica canadensis (Simon) 1929
- „ cancer Hentz 1850 = Gasteracantha cancriformis (Linné) 1758
- „ caroli Hentz 1850, Keyserling 1863, Mc Cook 1893 = Cyclosa caroli (Hentz) 1850
- „ catenulata Doleschall 1859 = Argyope catenulata (Doleschall) 1859
- „ caudata Hentz 1850 = Cyclosa turbinata (Walckenaer) 1841
- „ caudata Bradley 1876 = Arachnura caudatella Roewer 1942
- „ caudata Banks 1898 = Eustala fuscovittata (Keyserling) 1863
- „ cayana Taczanowski 1873, 1878 = Edricus cayanus (Taczanowski) 1873
- „ celata Blackwall 1841, 1864 = Meta merianae celata (Blackwall) 1842
- „ cepina Walckenaer 1841 = Eustala anastera (Walckenaer) 1841
- „ cepinoides Penther 1900 = nicht zu deuten!
- „ chinchoxensis Karsch 1879 = Cyrtophora gabonensis (Lucas) 1858
- „ chloris Audouin 1827 = Larinia chloris (Audouin) 1827
- „ chrysogaster Walckenaer 1805, 1841, Doleschall 1859 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
- „ chrysogaster Lucas 1858 = Nephila constricta (Karsch) 1879
- „ cicatrosa Stoliczka 1869 = Cyrtophora cicastrosa (Stoliczka) 1869
- „ cinerea Emerton 1884, 1902 = Araneus cavaticus (Keyserling) 1882
- „ cinerea Lenz 1886, 1891 = Araneus margitae (Strand) 1916
- „ cingulata Walckenaer 1841 =Araneus miniatus (Walckenaer) 1841
- „ circulata Walckenaer 1841 = Eriophora circulata (Walckenaer) 1841
- „ citricola Walckenaer 1841, Workman 1896 = Eriophora citricola (Forskal) 1775
- „ citrina Keyserling 1892 = Araneus citrinellus (Roewer) 1942
- „ clavipes Hahn 1820, 1831, Walckenaer 1841 = Nephila clavipes (Linné) 1767
- „ clavispina Cambridge 1889, Keyserling 1892 = Eustala clavispina (Cambridge) 1889
- „ clerckii Walckenaer 1841 = nicht zu deuten!
- „ clypeata Walckenaer 1805 = Micrthena clypeata (Walckenaer) 1805
- „ coccinea Doleschall 1857, 1859 = Leucauge grata (Guérin) 1830
- „ cognata Blackwall 1877 = Argyrodina cognata, jetzt: Conopistha cognata (Blackwall) 1877

Epeira (Forts.):
- „ confinis Simon 1870 = Araneus gibbosus confinis (Simon) 1870
- „ confraga Thorell 1892, Workman 1896 = Cyclosa confraga (Thorell) 1892
- „ conica Walckenaer 1805, 1841, Dufour 1824 = Cyclosa conica (Pallas) 1772
- „ conspicillata Cambridge 1841 = Aranea raji Scopoli 1763, jetzt: Araneus marmoreus Clerck 1757
- „ cophinaria Walckenaer 1841 = Argyope aurantia (Lucas) 1833
- „ coquerelii Vinson 1863 = Argyope coquerelii (Vinson) 1863
- „ cornigera Hentz 1850 = Mastophora cornigera (Hentz) 1850
- „ cornuta Walckenaer 1805, 1841, Lebert 1877 = Araneus circe (Audouin) 1827
- „ cornuta Westring 1851, 1862, Simon 1874, Menge 1866, Dahl 1883, Kulczynski 1885 etc. = Aranea foliata Fourcroy 1785, jetzt: Araneus cornutus Clerck 1757
- „ cornuta imermis Franganillo 1925 = nicht zu deuten!
- „ coronata Rainbow 1896 = Carepalxis coronata (Rainbow) 1896
- „ corrugata Urquhart 1886 = Araneus pustulosus (Walckenaer) 1841
- „ corticalis Simon 1874 = Araneus corticaloides (Roewer) 1942
- „ crassicauda Keyserling 1865 = Edricus crassicauda (Keyserling) 1865
- „ cratera Walckenaer 1805, 1841 = Araneus redii (Scopoli) 1763
- „ crenulata Doleschall 1857, 1859 = Argyope appensa (Walckenaer) 1841
- „ cruciata Walckenaer 1805 = Araneus angulatus Clerck 1757
- „ cruciata Nicolet 1849 = Araneus crux (Roewer) 1942
- „ crucifera Lucas 1835 = Araneus crucifer (Lucas) 1835
- „ crucifero Keyserling 1863 = Araneus keyserlingi (Roewer) 1942
- „ cucurbitina Sundevall 1832, Westring 1862, Ohlert 1867 etc. = Araneus cucurbitinus Clerck 1757
- „ cucurbitina Chyzer & Kulczynski 1891 = Araneus croaticus (Kulczynski) 1905
- „ cucurbitina Mc Cook 1893 = Araneus displicatus (Hentz) 1847
- „ cupidinea Thorell 1875 = Cyrtophora moluccensis cupidinea (Thorell) 1875
- „ curvicauda Vauthier 1824 = Gasteracantha arcuata (Fabricius) 1793
- „ curvispina Guérin 1829, 1837 = Gasteracantha curvispina (Guérin) 1837
- „ cyanospina Lucas 1835 = Micrathena cyanospina (Lucas) 1835
- „ cylindrica Taczanowski 1878 = Edricus truncatus (Keyserling) 1865
- „ cylindrica Cambridge 1889 = Araneus cylindriformis (Roewer) 1942
- „ cylindroides Walckenaer 1841 = Cyrtophora cylindroides (Walckenaer) 1841
- „ dalmatica Doleschall 1852, Simon 1874, Chyzer & Kulczynski 1891 = Araneus subfuscus (C. L. Koch) 1837
- „ decens Blackwall 1866 = Larinia decens (Blackwall) 1866
- „ decens Thorell 1877 = Araneus rufofemoratus (Simon) 1884
- „ decipiens Fitch 1855 = Araneus displicatus (Hentz) 1847
- „ decolorata Walckenaer 1841 = Eustala anastera (Walckenaer) 1841
- „ decorosa Urquhart 1893 = Araneus pustulosus (Walckenaer) 1841
- „ deludens Keyserling 1893 = Drexelia directa (Hentz) 1847
- „ dentata Walckenaer 1841 = Argyope lobata (Pallas) 1772
- „ depressa Walckenaer 1841 = Araneus depressatus (Roewer) 1942
- „ destricta Cambridge 1889 ♂, Keyserling 1892 = Parawixia destricta (Cambridge) 1889
- „ destricta Cambridge 1889 ♀ = Araneus consequus (Cambridge) 1889
- „ diadela Walckenaer 1841 = Nephilengys cruentata (Fabricius) 1775
- „ diademata Hahn 1834, Thorell 1856, Westring 1862, Dahl 1883 = Aranea diadema Linné 1758, jetzt: Araneus diadematus Clerck 1759
- „ diardi Lucas 1835 = Gasteracantha diardi (Lucas) 1835
- „ diazoma Thorell 1890 = Crytophora diazoma (Thorell) 1890
- „ dioidea Cambridge 1881 = Zilla diodia (Walckenaer) 1802
- „ diodia Walckenaer 1805, 1841 et sequ. = Zilla diodia (Walckenaer) 1802
- „ directa Hentz 1847 = Drexelia directa (Hentz) 1847
- „ ditissima Simon 1885 = Poecilarcys ditissimus (Simon) 1885
- „ diversa Blackwall 1859 = Enoplognatha diversa (Blackwall) 1859

Epeira (Forts.):

- domiciliorum Hentz 1847, Mc Cook 1881, Emerton 1884, 1902 = Araneus benjaminus (Walckenaer) 1841
- doreyana Walckenaer 1841 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
- doriae Thorell 1881 = Cyrtophora doriae (Thorell) 1881
- dorsalis Nicolet 1849 = Araneus dorsatulus (Roewer) 1942
- dorsuosa Blackwall 1866 = Cyrtophora dorsuosa (Blackwall) 1866
- dromaderia Walckenaer 1805, 1841 = Araneus bituberculatus (Walckenaer) 1802
- dromedaria Westring 1862, Menge 1879 et sequ. = Araneus bituberculatus (Walckenaer) 1802
- dromedaria C. L. Koch 1845, Ohlert 1867 = Araneus ullrichii (Hahn) 1834
- drypta Walckenaer 1805, 1841 = Araneus triguttatus (Fabricius) 1793
- dubitabilis Urquhart 1889 = Araneus crassus (Walckenaer) 1841
- dumetorum Hahn 1834 = Araneus ocellatus (Clerck) 1757
- duodecimtuberculata Bertkau 1880 = Verrucosa audax (Blackwall) 1863
- durvilla Walckenaer 1841 = Nephila tetragnatoides (Walckenaer) 1841
- eclipsis Marx 1843 = Araneus theis (Walckenaer) 1841
- ectypa Walckenaer 1841, Keyserling 1863 = Wixia ectypa (Walckenaer) 1841
- eczematica Thorell 1892, Workman 1896 = Cyrtophora eczematica (Thorell) 1892
- edax Blackwall 1863 = Eriophora edax (Blackwall) 1863
- edulis Walckenaer 1841 = Nephila edulis (Labillardière) 1799
- elegans Blackwall 1862 = Araneus elegantulus (Roewer) 1942
- elegantissima Taczanowski 1878 = Edricus truncatus (Keyserling) 1865
- emarginata Lucas 1858 = Cyrtophora citricola (Forskal) 1775
- ephippiata Thorell 1881 = Araneus punctiger (Doleschall) 1857
- eremita C. L. Koch 1835 = Aranea angulata Linné 1758, jetzt: Araneus angulatus Clerck 1757
- erratica Keyserling 1883, 1892 = Araneus errans (Roewer) 1942
- erudita Nicolet 1849 = Araneus clymene (Nicolet) 1849
- etheridgei Rainbow 1897 = Araneus theis (Walckenaer) 1841
- eustala Walckenaer 1841 = Eustala anastera (Walckenaer) 1841
- eustalina Marx 1889 = Eustala anastera (Walckenaer) 1841
- exanthematica Doleschall 1859, Keyserling 1887, Workman 1896 = Cyrtophora exanthematica (Doleschall) 1859
- excelsa Banks 1896 = Araneus bispinosus (Keyserling) 1885
- extuberata L. Koch 1871 = Araneus crassus (Walckenaer) 1841
- famulatoria Keyserling 1883, 1893 = Larinia famulatoria (Keyserling) 1883
- fasciata Walckenaer 1841 = Argyope brünnichii (Scopoli) 1763
- fasciata Hentz 1847 = Argyope trifasciata (Forskal) 1775
- fascinatrix Walckenaer 1841 = nicht zu deuten!
- fastuosa Walckenaer 1841 = Argyope trifasciata (Forskal) 1775
- fecunda Cambridge 1889, Keyserling 1892 = Araneus incertus (Cambridge) 1889
- femoralis Lucas 1858 = Nephila turneri (Blackwall) 1833
- feredayi L. Koch 1871 = Arachnura feredayi (L. Koch) 1871
- festiva Rainbow 1897 = Araneus theis (Walckenaer) 1841
- flava Vinson 1863 = Cyrtophora citricola (Forskal) 1775
- flava Giebel 1867 = Aranea raji Scopoli 1763, jetzt: Araneus marmoreus Clerck 1757
- flavipalpis Lucas 1858 = Argyope flavipalpis (Lucas) 1858
- flavipes Nicolet 1849 = Argyope trifasciata (Forskal) 1775
- foliata C. L. Koch 1845, Keyserling 1863, Reimoser 1928 = Aranea foliata Fourcroy 1785, jetzt: Araneus cornutus Clerck 1757
- foliata Hentz 1847, Emerton 1884, Mc Cook 1893 = Acacesia foliifera (Marx) 1889
- foliifera Marx 1889 = Acacesia foliifera (Marx) 1889

Epeira (Forts.):
- „ foliosa Walckenaer 1841 = Aranea foliata Fourcroy 1785, jetzt: **Araneus** cornutus Clerck 1757
- „ folium Kulczynski 1901 = Aranea foliata Fourcroy 1785, jetzt: Araneus cornutus Clerck 1757
- „ forata Mc Cook 1893 = Larinia nigrofoliata (Keyserling) 1884
- „ formosa Keyserling 1865 = Aranea dumetorum Fourcroy 1785, jetzt: **Araneus** ocellatus Clerck 1757
- „ fornicata Keyserling 1863, 1893 = Mangora fornicata (Keyserling) 1863
- „ frontata Blackwall 1864 = Gasteracantha frontata (Blackwall) 1864
- „ fragilis Cambridge 1889, Keyserling 1892 = Eustala fragilis (Cambridge) 1889
- „ frondosa Walckenaer 1841 = Aranea ovigera Panzer 1804, jetzt: Araneus sericatus Clerck 1757
- „ fructicosus Bremi-Wolff 1849 = Aranea diadema Linné 1758, jetzt: Araneus diadematus Clerck 1757
- „ frutetorum Bremi-Wolff 1849 = Aranea diadema Linné 1758, jetzt: Araneus diadematus Clerck 1757
- „ furcata Hahn 1822 = Micrathena sexspinosa (Hahn) 1822
- „ furcata Walckenaer 1825, 1841 = Araneus bituberculatus (Walckenaer) 1802
- „ fusca Walckenaer 1805, 1841, Blackwall 1864 = Meta menardii (Latreille) 1804
- „ fuscipes Walckenaer 1841 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
- „ fuscovittata Keyserling 1863, 1893 = Eustala fuscovittata (Keyserling) 1863
- „ fusiformis Taczanowski 1878 = Cyclosa fusiformis (Taczanowski) 1878
- „ gabonensis Lucas 1858 = Cyrtophora gabonensis (Lucas) 1858
- „ gasteracanthoides Nicolet 1840 = Mastophora gasteracanthoides (Nicolet) 1849
- „ geniculata Walckenaer 1841 = Nephila inaurata (Walckenaer) 1841
- „ genistae Hahn 1831 = Mangora acalypha (Walckenaer) 1802
- „ gibberosa Hentz 1847, Emerton 1884, Keyserling 1893 = Mangora gibberosa (Hentz) 1847
- „ gigas Leach 1815 = Aranea raji Scopoli 1763, jetzt: Araneus marmoreus Clerck 1757
- „ gigas C. L. Koch 1835 = Araneus grossus (C. L. Koch) 1845
- „ gistlii C. L. Koch 1835, 1845 = Araneus circe (Audouin) 1827
- „ globosa Keyserling 1865, 1892, Mc Cook 1878, Emerton 1902 = Araneus pegnius (Walckenaer) 1841
- „ göldii Karsch 1886 = Verrucosa alticeps (Keyserling) 1879
- „ gracilipes Blackwall 1862, 1868 = ? Araneus theis (Walckenaer) 1841
- „ gracilis Walckenaer 1805 = Micrathena gracilis (Walckenaer) 1841
- „ gracilis Keyserling 1865, 1893 = Araneus gracilentus (Roewer) 1942
- „ gracilis Menge 1879 = nicht zu deuten!
- „ gracilis Hogg 1896 = Araneus ragnhildae (Strand) 1916
- „ graduata Walckenaer 1841 = Aranea raji Scopoli 1763, jetzt: Araneus marmoreus Clerck 1757
- „ graeffei Keyserling 1865, 1871 = Phonognatha graeffei (Keyserling) 1865
- „ graeffi L. Koch 1871 = Araneus graeffi (L. Koch) 1871
- „ grata Guérin 1830 = Leucauge grata (Guérin) 1830
- „ grayii Blackwall 1863 = Araneus grayii (Blackwall) 1863
- „ grayi Keyserling 1865, 1892 = Araneus trispinosus (Keyserling) 1892
- „ gregalis Cambridge 1889, Keyserling 1892 = Metazygia gregalis (Cambridge) 1889
- „ grossa C. L. Koch 1845, Simon 1874, Chyzer & Kulczynski 1891, Kulczynski 1901 = Araneus grossus (C. L. Koch) 1845
- „ grossa Lebert 1877, Getaz 1889 = nicht zu deuten!
- „ guatemalensis Cambridge 1889 ♂, Keyserling 1892 ♂ = Wagneriana tauricornis (Cambridge) 1889
- „ guatemalensis Cambridge 1889 ♀, Keyserling 1892 ♀ = Parawixia guatemalensis (Cambridge) 1889

Epeira (Forts.):

„ guianensis Taczanowski 1878 = Eustala guianensis (Taczanowski) 1873
„ guttata Keyserling 1865, 1892 = Araneus guttatus (Keyserling) 1865
„ guttata Urquhart 1889 = Araneus crassus (Walckenaer) 1841
„ guttatula Walckenaer 1841 = Araneus miniatus (Walckenaer) 1841
„ hamata Hentz 1847 = Araneus hallucinor Petrunkevitch 1911
„ harpyia Doleschall 1859 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
„ hasseltii Doleschall 1859 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
„ hastifera Percheron 1833 = Camaricus hastiferus (Percheron) 1833
„ hebes Hentz 1847 = Eustala anastera (Walckenaer) 1841
„ heeri Blackwall 1864 (Fig.) = Singa sanguinea (C. L. Koch) 1845
„ heeri Blackwall 1864 (Text) = Singa pygmaea (Sundevall) 1831
„ heerii Hahn 1831 = Singa heerii (Hahn) 1831
„ heidemannii Marx 1889 = Araneus detrimentosus (Cambridge) 1889
„ helveoguttata Urquhart 1887 = Araneus pustulosus (Walckenaer) 1841
„ hentzii Keyserling 1863 = Araneus benjaminus (Walckenaer) 1841
„ heptagon Hentz 1850 = Argyope heptagon (Hentz) 1850
„ heraldica Cantor 1842 = nicht zu deuten!
„ herii Walckenaer 1841 = Singa heerii (Hahn) 1831
„ hexastigma Hasselt 1882 = Milonia hexastigma (Hasselt) 1882
„ hieroglyphica L. Koch 1871 = Cyrtophora moluccensis (Doleschall) 1857
„ higginsii L. Koch 1871 = Arachnura higginsii (L. Koch) 1871
„ hilaris Cambridge 1881 = Aranea dumetorum Fourcroy 1785, jetzt: Araneus ocellatus Clerck 1757
„ hirsuta Hahn 1831, Walckenaer 1841, Kulczynski 1901 = Araneus armidus (Audouin) 1827
„ hirsutula Stoliczka 1869 = Araneus hirsutulus (Stoliczka) 1869
„ hirtipes Taczanowski 1878 = Araneus hirtipedatus (Roewer) 1942
„ hispida C. L. Koch 1845 = Araneus hispidus (C. L. Koch) 1845
„ hispida Nicolet 1849 = Araneus clymene (Nicolet) 1849
„ hispida Doleschall 1859, Workman 1896 = Araneus rufofemoratus (Simon) 1884
„ honesta Cambridge 1899 = Parawixia honesta (Cambridge) 1899
„ hortorum Hentz 1847, 1850 = Leucauge venusta (Walckenaer) 1841
„ hoxaea Cambridge 1889, Keyserling 1892 = Parawixia hoxaea (Cambridge) 1889
„ hybophora Thorell 1887 = Cyclosa hybophora (Thorell) 1887
„ hygrophila Simon 1874 = Aranea ovigera Panzer 1804, jetzt: Araneus sericatus Clerck 1757
„ hypocrita Cambridge 1889, Keyserling 1892 = Parawixia hypocrita (Cambridge) 1889
„ illibata Simon 1870 = Araneus subfuscus (C. L. Koch) 1837
„ illicita Cambridge 1889 = Eustala illicita (Cambridge) 1889
„ illustrata Walckenaer 1841 = Eustala anastera (Walckenaer) 1841
„ impedita L. Koch 1867 = Araneus subfuscus (C. L. Koch) 1837
„ imperialis Walckenaer 1805, 1841 = Caerostris sexcuspidata (Fabricius) 1793
„ imperialis Doleschall 1857, 1859 = Nephila laurinae (Thorell) 1881
„ inaurata Walckenaer 1841, Vinson 1863 = Nephila inaurata (Walckenaer) 1841
„ incestifica Keyserling 1892 = Araneus corticarius (Emerton) 1884
„ inclinata Walckenaer 1805, 1841, Blackwall 1864 = Meta reticulata (Linnè), jetzt: Meta segmentata (Clerck) 1757
„ inclinata Sundevall 1832 var. b = Meta merianae (Scopoli) 1763
„ incongrua Cambridge 1872 = Cyclosa sierae (Simon) 1870
„ inconviniens Cambridge 1872 = Zygiella inconviniens (Cambridge) 1872
„ indagatrix L. Koch 1871 = Araneus punctiger (Doleschall) 1857
„ inflata Nicolet 1849 = Araneus clymene (Nicolet) 1849
„ infumata Hentz 1850, Emerton 1884 = Wixia ectypa (Walckenaer) 1841
„ insulana Costa 1834, Workman 1896 = Cyclosa insulana (Costa) 1834

Epeira (Forts.):
- „ insularis Hentz 1847, Keyserling 1863, 1892 = Aranea raji Scopoli 1763, jetzt: Araneus marmoreus Clerck 1757
- „ intercisa Cambridge 1889 = Drexelia directa (Hentz) 1847
- „ janeira Walckenaer 1841 = Nephila clavipes vespucea (Walckenaer) 1841
- „ jaspidata Walckenaer 1841 = ? Araneus trifolium (Hentz) 1847
- „ jelskii Taczanowski 1873 = Araneus transitorius (C. L. Koch) 1839
- „ jenisoni C. L. Koch 1834, 1845 = Aranea raji Scopoli 1763, jetzt: Araneus marmoreus Clerck 1757
- „ jucunda Walckenaer 1841 = nicht zu deuten!
- „ junghuhni Doleschall 1859 = Pitharatus junghuhni (Doleschall) 1859
- „ kandarensis Thorell 1877 = Araneus dehaanii (Doleschall) 1859
- „ kersteni Gerstäcker 1873 = Araneus rufipalpis (Lucas) 1858
- „ kuhlii Doleschall 1859 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
- „ labyrinthes Hentz 1847, Emerton 1884, 1902, Keyserling 1893, Mc Cook 1893 = Metepeira labyrinthea (Hentz) 1847
- „ lacerta Keyserling 1893 = Cyclosa lacerta (Cambridge) 1889
- „ lata Walckenaer 1805 = Gasteracantha tetracantha (Linné) 1767
- „ latebricola Cambridge 1889, Keyserling 1892 = Eustala latebricola (Cambridge) 1889
- „ latreilla Walckenaer 1841, Vinson 1863 = Argyope trifasciata (Forskal) 1775
- „ lentiginosa Blackwall 1862 = Araneus crucifer (Lucas) 1835
- „ lepechini Krynicki 1837 = Araneus bicornis (Lepechin) 1774
- „ lepeletierii Guérin 1825 = Gasteracantha lepeletierii (Guérin) 1825
- „ leucogaster Marx 1889 = Kaira alba (Hentz) 1850
- „ leucogaster Thorell 1895 = Mangora leucogasteroides (Roewer) 1942
- „ leucogramma White 1841 = Singa leucogramma (White) 1841
- „ libera Leardi 1901 = Araneus liber (Leardi) 1901
- „ liliputana Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ limans Thorell 1875 = Araneus subfuscus (C. L. Koch) 1837
- „ lineata Lucas 1846 = Larinia lineata (Lucas) 1846
- „ lintearia Keyserling 1893 = Mangora lintearia (Keyserling) 1893
- „ litoralis L. Koch 1867, 1871 = Cyclosa litoralis (L. Koch) 1867
- „ livida Vinson 1863 = Nephilengys cruentata livida (Vinson) 1863
- „ longipes Nicolet 1849 = Meta longipes (Nicolet) 1849
- „ longispina Rainbow 1897 = Araneus theis (Walckenaer) 1841
- „ lucina Audouin 1827, Walckenaer 1841 = Singa lucina (Audouin) 1827
- „ lugubris Walckenaer 1841 = ? Araneus punctiger (Doleschall) 1857
- „ lunula Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ lutea C. L. Koch 1837 et sequ. = Araneus alsine (Walckenaer) 1802
- „ luzona Walckenaer 1841 = Argyope luzona (Walckenaer) 1841
- „ macrura Thorell 1877 = Cyclosa bifida (Doleschall) 1859
- „ maculata Keyserling 1865, 1893 = Mangora maculata (Keyserling) 1865
- „ madagascariensis Vinson 1863 = Nephila inaurata madagascariensis (Vinson) 1863
- „ malabarensis Walckenaer 1841 = Nephilengys malabarensis (Walckenaer) 1841
- „ malabarica Doleschall 1857 = Nephilengys malabarensis (Walckenaer) 1841
- „ mammata Walckenaer 1805 = Argyope argentata (Fabricius) 1775
- „ mammillaris Stoliczka 1869 = Herennia ornatissima (Doleschall) 1859
- „ mangareva Walckenaer 1841, L. Koch 1872 = Araneus theis (Walckenaer) 1841
- „ manipa Doleschall 1857 = Araneus punctiger (Doleschall) 1857
- „ margaritacea Risso 1826 = Argyope lobata (Pallas) 1772
- „ margaritacea Doleschall 1859 = Cyrtophora moluccensis margaritacea (Doleschall) 1859
- „ maritima Keyserling 1865, L. Koch 1871 = Cyrtophora moluccensis (Doleschall) 1857
- „ marmorata Risso 1826 = nicht zu deuten!

Epeira (Forts.):

„ marmorata Sundevall 1832 = Aranea raji Scopoli 1763, jetzt: Araneus marmoreus Clerck 1757
„ marmorea C. L. Koch 1839 et sequ. = Aranea raji Scopoli 1763, jetzt: Araneus marmoreus Clerck 1757
„ maura Hentz 1847 = Singa maura (Hentz) 1847
„ mauricia Walckenaer 1841 = Argyope trifasciata (Fabricius) 1775
„ mauritia Vinson 1863 = Argyope trifasciata (Fabricius) 1775
„ majo Mc Cook 1893 = Araneus miniatus (Walckenaer) 1841
„ mediocris Kulczynski 1901 = Araneus proximus (Kulczynski) 1885
„ melania L. Koch 1871 = Singotypa melania (L. Koch) 1871
„ melania Urquhart 1890 = Araneus melanillus (Roewer) 1942
„ melanocephala Westring 1851 = Singa hamata melanocephala (C. L. Koch) 1836
„ melanocrania Thorell 1887 = Zygiella melanocrania (Thorell) 1887
„ melanogaster C. L. Koch 1837 = Dipoena melanogaster (C. L. Koch) 1837
„ melanopygia L. Koch 1871 = Singotypa melanopygia (L. Koch) 1871
„ melittagria Walckenaer 1805 = Aranea raji Scopoli 1763, jetzt: Araneus marmoreus Clerck 1757
„ menardi Latreille 1806 = Meta menardi (Latreille) 1806
„ mengii Blackwall 1870 = Meta reticulata mengii (Blackwall) 1870, jetzt: Meta regmentata mengii (Blackwall) 1870
„ merens Cambridge 1889 = Parawixia guatemalensis (Cambridge) 1889
„ meridionalis Keyserling 1865 = Verrucosa audax (Blackwall) 1863
„ mexicana Lucas 1833, Walckenaer 1841 = Verrucosa mexicana (Lucas) 1833
„ micula Thorell 1892, Workman 1896 = Cyclosa micula (Thorell) 1892
„ mimula L. Koch 1882 = Araneus adiantus (Walckenaer) 1802
„ minax Cambridge 1893 = Eriophora minax (Cambridge) 1893
„ minuscula Keyserling 1892 = Mangora minuscula (Keyserling) 1892
„ minuta Nicolet 1849 = Araneus minutellus (Roewer) 1942
„ mitralis Vinson 1863 = Caerostris mitralis (Vinson) 1863
„ mitrata Hentz 1850 = Micrathena mitralis (Hentz) 1850
„ mobilis Cambridge 1889, Keyserling 1893 = Mangora mobilis (Cambridge) 1889
„ modesta Simon 1890 = Araneus modestus (Simon) 1890
„ modesta Thorell 1898 = Araneus thorelli (Roewer) 1942
„ moesta Blackwall 1865 = Cyclosa moesta (Blackwall) 1865
„ moesta Keyserling 1892 = Acanthepeira moestella (Roewer) 1942
„ moluccensis Doleschall 1857, Thorell 1890 = Cyrtophora moluccensis (Doleschall) 1857
„ montana Westring 1851, 1862 = Zygiella montana (C. L. Koch) 1839
„ montevidensis Keyserling 1873, 1892 = Araneus lathyrinus (Holmberg) 1875
„ moreli Simon 1885, 1895 = Araneus theis (Walckenaer) 1841
„ morellii Vinson 1863 = Araneus theis (Walckenaer) 1841
„ mucronata Blackwall 1862 = Araneus mucronatus (Blackwall) 1862
„ mucronata L. Koch 1871 = Araneus mucronatellus (Roewer) 1942
„ mulleola Urquhart 1887, 1888 = Araneus pustulosus (Walckenaer) 1841
„ mulmeinensis Thorell 1887, 1895, Workman 1896 = Cyclosa mulmeinensis (Thorell) 1887
„ multipunctata Doleschall 1859 = Herennia ornatissima (Doleschall) 1859
„ multispina Rainbow 1897 = Araneus theis (Walckenaer) 1841
„ munda C. L. Koch 1836 = Aranea dumetorum Fourcroy 1785, jetzt: Araneus ocellatus Clerck 1757
„ munda Blackwall 1863 = Araneus mundatulus (Roewer) 1942
„ munda Urquhart 1892 = Araneus mundanius (Roewer) 1942
„ mundula Keyserling 1892 = Larinia mundula (Keyserling) 1892
„ mutabilis Walckenaer 1841 (part.) = Araneus arabescus (Walckenaer) 1841
„ mutabilis Walckenaer 1841 (part.) = Araneus benjaminus (Walckenaer) 1841
„ myabora Walckenaer 1805, 1841 = Araneus triguttatus (Fabricius) 1793

Epeira (Forts.):
- „ myagria Waldkenaer 1805 = Araneus diadema Linné 1758, jetzt: Araneus diadematus Clerck 1757
- „ nauseosa C. L. Koch 1834, 1845 = Aranea dumetorum Fourcroy 1785, jetzt: Araneus ocellatus Clerck 1757
- „ nava Cambridge 1899 = Eustala scutigera (Cambridge) 1898
- „ nephilina L. Koch 1871 = Cyrtophora cylindroides (Waldkenaer) 1841
- „ nephiloides Cambridge 1889, Keyserling 1893, Mc Cook 1893 = Eriophora nephiloides (Cambridge) 1889
- „ nephoda Waldkenaer 1841 = Argyope trifasciata (Forskel) 1775
- „ nigra Vinson 1863 = Nephila inaurata (Waldkenaer) 1841
- „ nigra Emerton 1894 = Araneus solitarius (Emerton) 1884
- „ nigrifrons Westring 1851 = Singa pygmaea (Sundevall) 1831
- „ nigrita Nicolet 1849 = Araneus clymene (Nicolet) 1849
- „ nigrohumeralis Cambridge 1893 = Araneus detrimentosus (Cambridge) 1889
- „ nigropunctata L. Koch 1871, Keyserling 1887 = Araneus nigropunctatus (L. Koch) 1871
- „ nigropunctata Taczanowski 1878 = Araneus nigropuntatulus (Roewer) 1942
- „ nigropunctata Rainbow 1920 = Araneus rainbowi (Roewer) 1942
- „ nigrotarsalis Doleschall 1859 = Leucauge nigrotarsalis (Doleschall) 1859
- „ nigrotrivittata Doleschall 1859 = Leucauge celebesiana (Waldkenaer) 1841
- „ nitida Waldkenaer 1841 = nicht zu deuten!
- „ nobilis Waldkenaer 1841 = Acanthepeira stellata (Waldkenaer) 1805
- „ nubila Blackwall 1837, 1864 = Theridion pallens (Blackwall) 1834
- „ oatesii Thorell 1892 = Cyclosa oatesii (Thorell) 1892
- „ obesa Hentz 1847 = Aranea raji Scopoli 1763, jetzt: Araneus marmoreus Clerck 1757
- „ obesa Thorell 1881 = Araneus tamerlani (Roewer) 1942
- „ oblitera Urquhart 1886 = Araneus pustulosus (Waldkenaer) 1841
- „ obscura Wider 1834, Waldkenaer 1841 = Meta merianae (Scopoli) 1763
- „ obscura Blackwall 1877 = Araneus nocturnellus (Roewer) 1942
- „ obscura Rainbow 1897 = Araneus theis (Waldkenaer) 1841
- „ oculata Waldkenaer 1805, 1841 = Cyclosa oculata (Waldkenaer) 1802
- „ olivieri Waldkenaer 1841 = Araneus pallidus (Olivier) 1789
- „ omoeda Thorell 1870 et sequ. = Araneus omoedus (Thorell) 1870
- „ opuntiae Dufour 1820, Waldkenaer 1841, Vinson 1863, Simon 1870 = Cyrtophora citricola (Forskal) 1775
- „ opuntiae C. L. Koch 1845 = Araneus kochii (Taczanowski) 1873
- „ orichalcea Doleschall 1857, 1859 = Leucauge granulata (Waldkenaer) 1841
- „ orientalis Urquhart 1886 = Araneus brounii (Urquhart) 1884
- „ ornata Blackwall 1850, 1864 = Araneus displicatus (Hentz) 1847
- „ ornata Canestrini 1868 = Araneus canestrinii (Thorell) 1873
- „ ornatissima Doleschall 1859 =Herennia ornatissima (Doleschall) 1859
- „ ostribrunnea Urquhart 1889 = Araneus pustulosus (Waldkenaer) 1841
- „ pacifica Mc Cook 1893 = Araneus bispinosus (Keyserling) 1885
- „ packardii Thorell 1875 = Araneus carbonarius (L. Koch) 1869
- „ pallida Waldkenaer 1805, Simon 1868 = Araneus pallidus (Olivier) 1789
- „ pallida Rainbow 1897 = Cyclosa rainbowi (Roewer) 1942
- „ pallidula Keyserling 1863, 1892 = Araneus palloides nom. nov.
- „ paradoxa Lucas 1846 = Ulesanis paradoxa (Lucas) 1846
- „ paradoxa Doleschall 1859 = Caerostris mitralis (Vinson) 1863
- „ parvula Keyserling 1863, Emerton 1902 = Eustala anastera (Waldkenaer) 1841
- „ parvula conchlea Mc Cook 1888 = Eustala anastera conchlea (Mc Cook) 1889
- „ passiva Cambridge 1889 = Mangora passiva (Cambridge) 1889
- „ patagiata C. L. Koch 1845 et sequ. = Aranea dumetorum Fourcroy 1785, jetzt: Araneus ocellatus Clerck 1757
- „ paviei Simon 1886 = Araneus punctigerus (Doleschall) 1857
- „ pectoralis C. L. Koch 1837 = Araneus circe (Audouin) 1827

Epeira (Forts.):

„ pellax Cambridge 1885 = Araneus pellax (Cambridge) 1885
„ pellax Thorell 1892 = Cyclosa pellaxoides (Roewer) 1942
„ penicillipes Karsch 1879 = Araneus rufipalpis (Lucas) 1858
„ penicillum Doleschall 1857, 1859 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
„ perfissa Thorell 1895 = Arachnura perfissa (Thorell) 1895
„ peronginia Urquhart 1893 = Araneus subcomptus (Urquhart) 1886
„ perplexa Waldkenaer 1841 = Araneus perplexus (Waldkenaer) 1841
„ perplexa Banks 1898 = Araneus perperus Petrunkevitch 1911
„ perpolita Thorell 1892, Workman 1896 = Singa perpolita (Thorell) 1892
„ perspicillata Doleschall 1859 = Cyrtarachne perspicillata (Doleschall) 1859
„ petax Thorell 1890 = Araneus papulatus (Thorell) 1887
„ phtisica L. Koch 1871 = Larinia phtisica (L. Koch) 1871
„ pilipes Lucas 1858 = Nephila fenestrata venusta (Blackwall) 1865
„ pilula Thorell 1877 = Araneus nox (Simon) 1877
„ pinetorum C. L. Koch 1837, 1845 = Aranea angulata Linné 1758, jetzt: Araneus angulatus Clerck 1757
„ placida Hentz 1847, Emerton 1884, 1902, Mc Cook 1893 = Mangora placida (Hentz) 1847
„ plumipes Waldkenaer 1841 = Nephila clavipes (Linné) 1767
„ pocillator Urquhart 1886 = Araneus pustulosus (Waldkenaer) 1841
„ porcula Simon 1877 = Araneus porculus (Simon) 1877
„ porcula Hasselt 1882, Workman 1896 = Araneus centrodes (Thorell) 1887
„ porracea Waldkenaer 1841 = Cyrtophora porracea (C. L. Koch) 1839
„ praetrepida Keyserling 1880, 1893 = Mangora placida (Hentz) 1847
„ prominens Westring 1851 = Cercidia prominens (Westring) 1851
„ prompta Hentz 1847 = Eustala anastera (Waldkenaer) 1841
„ prudens Waldkenaer 1841 = nicht zu deuten!
„ pulchra C. L. Koch 1845 = Araneus pulcherrimus (Roewer) 1942
„ pulchra Rainbow 1893 = Araneus pulchriformis (Roewer) 1942
„ pullata Thorell 1877 = Araneus nauticus (L. Koch) 1875
„ punctillata Keyserling 1879 = Araneus miniatus (Waldkenaer) 1841
„ purpurascens Cambridge 1889 = Eriophora purpurascens (Cambridge) 1889
„ purpurea Vinson 1863 = Cyrtophora citricola (Forskal) 1775
„ purpurea Urquhart 1886 = Araneus purpurcolor (Roewer) 1942
„ purpurescens Keyserling 1893 = Eriophora purpurascens (Cambridge) 1889
„ pyramidata Sundevall 1832 et sequ. = Aranea raji betulae Sulzer 1776, jetzt: Araneus marmoreus pyramidatus Clerck 1757
„ pyrenaea Simon 1874 = Aranea diadema Linné 1758, jetzt: Araneus diadematus Clerck 1757
„ quadrata Waldkenaer 1805 et sequ. = Aranea reaumuri Scopoli 1763, jetzt: Araneus quadratus Clerck 1757
„ quadrimaculata Nicolet 1849 = Araneus quadrimaculosus (Roewer) 1942
„ quadripunctata Nicolet 1849 = Araneus quadripunctatulus (Roewer) 1942
„ quinqueguttata Thorell 1881 = Cyclosa quinqueguttata (Thorell) 1881
„ radiosa Mc Cook 1881 = Theridiosoma gemmosum (L. Koch) 1877
„ radulans Pavesi 1883 = Araneus subfuscus (C. L. Koch) 1837
„ rapax Blackwall 1863 = Araneus rapaxatus (Roewer) 1942
„ raphanus Thorell 1887 = Araneus oxyurus (Thorell) 1877
„ ravilla C. L. Koch 1845, Mc Cook 1893 = Eriophora ravilla (C. L. Koch) 1845
„ rectangula Nicolet 1849 = Metepeira labyrinthea (Hentz) 1847
„ regia C. L. Koch 1835, 1845 = Araneus circe (Audouin) 1827
„ regia Simon 1874 = Aranea angulata Linné 1758, jetzt: Araneus angulatus Clerck 1757
„ regia Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ reinwardtii Doleschall 1859 = Argyope reinwardtii (Doleschall) 1859
„ rhodosternon Doleschall 1859 = Nephilengys malabarensis (Waldkenaer) 1841
„ rhombocephala Thorell 1881 = Cyclosa rhombocephala (Thorell) 1881

Epeira (Forts.):

„ rhomboides L. Koch 1867, 1871 = Anepsia rhomboides (L. Koch) 1867
„ rigida Cambridge 1889 = Parawixia rigida (Cambridge) 1889
„ rimosa Keyserling 1892 = Parawixia rimosa (Keyserling) 1892
„ riparia Hentz 1847 = Argyope aurantia (Lucas) 1833
„ rubella Hentz 1847 = Drexelia directa (Hentz) 1847
„ rufa Cambridge 1889, Keyserling 1892 = Wixia rufa (Cambridge) 1889
„ rufipes Cambridge 1889, Keyserling 1892 = Araneus cambridgei (Roewer) 1942
„ rugosa Hentz 1850 = Micrathena gracilis (Walckenaer) 1841
„ rumpfi Thorell 1878 = Araneus rufofemoratus (Simon) 1884
„ saga Keyserling 1893 = Eustala saga (Keyserling) 1893
„ sagana Keyserling 1893 = Eustala sagana (Keyserling) 1893
„ salebrosa Thorell 1878 = Cyrtophora cicatrosa (Stoliczka) 1869
„ sancti-benedicti Vinson 1863 = Cyclosa sancti-benedicti (Vinson) 1863
„ sanguinea Cambridge 1873 = Singa sanguinea (C. L. Koch) 1845
„ sanguinosa Keyserling 1893 = Eustala sanguinosa (Keyserling) 1893
„ scalaris Walckenaer 1805, 1841, Hahn 1834, Blackwall 1864 = Aranea raji betulae Sulzer 1776, jetzt: Araneus marmoreus pyramidatus Clerck 1757
„ schreibersii Hahn 1834, 1836, C. L. Koch 1845 = Araneus circe (Audouin) 1827
„ schrenckii Grube 1861 = Araneus schrenckii (Grube) 1861
„ sclopetaria Hahn 1834 = Araneus ceropegius (Walckenaer) 1802
„ sclopetaria Westring 1851, 1862, Menge 1866, Cambridge 1881, Emerton 1884 = Aranea ovigera Panzer 1804, jetzt: Araneus sericatus Clerck 1757
„ scutata Walckenaer 1841 = Hypognatha scutata (Perty) 1833
„ scutigera Cambridge 1898 = Eustala scutigera (Cambridge) 1898
„ scutulata Hentz 1850, Keyserling 1892, Emerton 1902 = Araneus miniatus (Walckenaer) 1841
„ scylla Karsch 1879 = Araneus theis (Walckenaer) 1841
„ segmentata Sundevall 1832 = Araneus adiantus (Walckenaer) 1802
„ segmentata Walckenaer 1841 = Araneus segmentatulus (Roewer) 1942
„ segmentata Westring 1851 = Meta reticulata (Linné) 1758, jetzt: Meta segmentata (Clerck) 1757
„ semiannulata Karsch 1879, Simon 1884 = Araneus rufipalpis (Lucas) 1858
„ semifoliata Cambridge 1899 = Eustala semifoliata (Cambridge) 1899
„ senegalensis Walckenaer 1841 = Nephila senegalensis (Walckenaer) 1841
„ senta Karsch 1879 = Araneus ventricosus (L. Koch) 1878
„ seriata Thorell 1881, 1890 = Cyclosa seriata (Thorell) 1881
„ sericata C. L. Koch 1833, 1845, Blackwall 1864 = Aranea ovigera Panzer 1804, jetzt: Araneus sericatus Clerck 1757
„ sericea Latreille 1806, Hahn 1820, 1831, Walckenaer 1841 = Argyope lobata (Pallas) 1772
„ sericea Franganillo 1918 = Araneus sericinus (Roewer) 1942
„ servillei Guérin 1828 = Gasteracantha servillei (Guérin) 1828
„ sexpunctata Keyserling 1884 = Araneus displicatus (Hentz) 1847
„ sexspinosa Hahn 1822 = Micrathena sexspinosa (Hahn) 1822
„ sextuberculata Keyserling 1863 = Glyptogona sextuberculata (Keyserling) 1863
„ signata Blackwall 1850, 1864 = Araneus triguttatus (Fabricius) 1793
„ silesiaca Fickert 1876 = Araneus alpicus (L. Koch) 1869
„ silvatica Emerton 1884, 1902, Keyserling 1892, Mc Cook 1893 = Araneus solitarius (Emerton) 1884
„ silvicultrix C. L. Koch 1845, Bösenberg 1901 = Araneus silvicultrix (C. L. Koch) 1845
„ silvicultrix Ohlert 1867 = Aranea dumetorum Fourcroy 1785, jetzt: Araneus ocellatus Clerck 1757
„ silvicultrix Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ similaris Urquhart 1890 = Araneus similaris (Urquhart) 1890
„ similaris Rainbow 1896 = Araneus urquharti (Roewer) 1942
„ similis Blackwall 1844, 1864 = Zygiella litterata (Olivier) 1789, jetzt: Zygiella litera x-notata (Clerck) 1757

Epeira (Forts.):
„ similis Taczanowski 1873 = Araneus similellus (Roewer) 1942
„ similis Bösenberg & Lenz 1895, Pavesi 1897 = Pararaneus striatellus similis (Bösenberg & Lenz) 1895
„ simulata Urquhart 1891 = Araneus pustulosus (Walckenaer) 1841
„ singaeformis Hasselt 1882 = Milonia singaeformis (Hasselt) 1882
„ sinuata Walckenaer 1837, 1841 = nicht zu deuten!
„ smaragdinea Taczanowski 1878 = Eustala smaragdinea (Taczanowski) 1878
„ socialis Rengger 1836 = Eriphora bistriata (Rengger) 1836
„ socialis Holmberg 1874, 1876, Simon 1891 = Araneus sermonifer (Mello-Leitao) 1932
„ solers Walckenaer 1805, 1841, Blackwall 1864, Menge 1866 = Araneus redii (Scopoli) 1763
„ solitudinis Holmberg 1881 = Metepeira labyrinthea (Hentz) 1847
„ sollers Westring 1862, Thorell 1870, Dahl 1883, Cambridge 1881 = Araneus redii (Scopoli) 1763
„ soronis Thorell 1890 = Araneus enucleatus (Karsch) 1879
„ soror Simon 1874 = Aranea diadema Linné 1758, jetzt: Araneus diadematus Clerck 1757
„ spatulata Walckenaer 1841 = Eustala anastera (Walckenaer) 1841
„ speciosa Krynicki 1837, Eichwald 1841 = Argyope brünnichii (Scopoli) 1763
„ speciosa Rainbow 1897 = Araneus speciosissimus (Roewer) 1942
„ spectabilis Doleschall 1859 = Araneus dehaanii (Doleschall) 1859
„ spicata Cambridge 1889 = Wagneriana spicata (Cambridge) 1889
„ spinea Hentz 1850 = Micrathena sagittata (Walckenaer) 1841
„ spinivulva Dufour 1835 = Araneus vulpinus (Hahn) 1834
„ spinivulva Simon 1874 = Aranea angulata Linné 1758, jetzt: Araneus angulatus Clerck 1757
„ spinosa Taczanowski 1873 = Araneus transitorius (C. L. Koch) 1839
„ spinulata Hentz 1847 = Mangora placida (Hentz) 1847
„ splendida Walckenaer 1841 = Argyope lobata (Pallas) 1772
„ squamosa Seidel 1849 = Aranea cucurbitina Linné 1758, jetzt: Araneus cucurbitinus Clerck 1757
„ stellata Walckenaer 1805, Hentz 1850, Keyserling 1863, Emerton 1884, 1902 = Acanthepeira stellata (Walckenaer) 1805
„ stellata C. L. Koch 1836, 1845 = Araneus diadematus stellatus (C. L. Koch) 1836
„ stellata Stoliczka 1869 = Argyope catenulata (Doleschall) 1859
„ stigmatisata Karsch 1878, Hasselt 1882, Thorell 1890 = Cyrtophora unicolor (Doleschall) 1857
„ strangulata L. Koch 1871 = Cyclosa litoralis (L. Koch) 1867
„ striapiata Urquhart 1890 = Araneus pustulosus (Walckenaer) 1841
„ striata Doleschall 1857, 1859 = Argyope aemula (Walckenaer) 1841
„ striata Bösenberg & Lenz 1895, Pavesi 1897 = Pararaneus striatellus **nom. nov.**
„ strix Hentz 1847, Emerton 1884, 1902 = Aranea foliata Fourcroy 1785, jetzt: Araneus cornutus Clerck 1757
„ subacalypha Simon 1882 = Cyrtophora subacalypha (Simon) 1882
„ subfusca Walckenaer 1841 = Eustala anastera (Walckenaer) 1841
„ submucronata Simon 1887 = Araneus dehaanii (Doleschall) 1859
„ sutrix Hentz 1847 = Argyope aurantia (Lucas) 1833
„ tabida L. Koch 1871, Keyserling 1887 = Larinia tabida (L. Koch) 1871
„ taquara Keyserling 1892 = Eustala taquara (Keyserling) 1892
„ tardipes Thorell 1895 = Cyclosa tardipes (Thorell) 1895
„ tauricornis Cambridge 1889, Keyserling 1892 = Wagneriana tauricornis (Cambridge) 1889
„ tectorum Bremi-Wolff 1849 = Aranea foliata Fourcroy 1785, jetzt: Araneus cornutus Clerck 1757
„ tetragnathoides Cambridge 1889 = Drexelia directa (Hentz) 1847
„ tetragnatoides Walckenaer 1841 = Nephila tetragnatoides (Walckenaer) 1841

Epeira (Forts.):
„ thalia Nicolet 1849 = Araneus clymene (Nicolet) 1849
„ theisi Thorell 1877, 1878, Roewer 1938 = Araneus theis (Waldkenaer) 1841
„ theisii Keyserling 1893, Mc Cook 1893 = Araneus neotheis Petrunkevitch 1911
„ thelura Thorell 1878 = Araneus laglaisei thelura (Thorell) 1878
„ theodori Thorell 1894 = Singa theodori (Thorell) 1894
„ thomisoides Dufour 1855 = Aranea sexpunctata Linné 1758, jetzt: Araneus umbraticus Clerck 1757
„ thomisoides Doleschall 1857, 1859 = Araneus laglaisei (Simon) 1877
„ tranquilla Keyserling 1893, Mc Cook 1893 = Araneus detrimentosus (Cambridge) 1889
„ transmarina Keyserling 1865, 1887 = Araneus transmarinus (Keyserling) 1865
„ transmarina Karsch 1878 = Araneus brounii (Urquhart) 1884
„ triangula Keyserling 1863 = Araneus punctiger (Doleschall) 1857
„ triangula Hasselt 1882 = Araneus enucleatus (Karsch) 1879
„ triangulata Franganillo 1913, 1918 = Araneus adiantus (Waldkenaer) 1802
„ triangulifera Thorell 1878 = Araneus theis (Waldkenaer) 1841
„ triaranea Emerton 1884, Mc Cook 1876 = Araneus pegnius (Waldkenaer) 1841
„ tricolor Leardi 1902 = Cyclosa tricolor (Leardi) 1902
„ trifasciata Westring 1851 = Singa pygmaea (Sundevall) 1831
„ trifasciata Doleschall 1857, 1859 = Argyope reinwardtii (Doleschall) 1859
„ triflex Waldkenaer 1841 = Eustala anastera (Waldkenaer) 1841
„ trilineata Taczanowski 1878 = Araneus trisignatus (Roewer) 1942
„ trinotata Waldkenaer 1841 = Eustala anastera (Waldkenaer) 1841
„ trinotata Urquhart 1889 = Araneus brounii (Urquhart) 1884
„ tristis Blackwall 1862 = Eustala tristis (Blackwall) 1862
„ tristis Taczanowski 1873 = Araneus tristimoniae Petrunkevitch 1911
„ trituberculata Lucas 1846 = Cyclosa insulana (Costa) 1834
„ trituberculata Urquhart 1886, 1887 = Araneus trituberculosus (Roewer) 1942
„ trivittata Keyserling 1863, 1891, Emerton 1884, 1902 = Araneus arabescus (Waldkenaer) 1841
„ truncata Keyserling 1865 = Edricus truncatus (Keyserling) 1865
„ tuberculata Canestrini & Pavesi 1868 = Glyptogona sextuberculata (Keyserling) 1863
„ tuberculosa Vinson 1863 = Caerostris tuberculosa (Vinson) 1863
„ tubulosa Waldkenaer 1805, 1841, Blackwall 1864 = Singa hamata (Clerck) 1757
„ tubulosa Hahn 1831 = Singa nitidula (C. L. Koch) 1845
„ tumida Keyserling 1865 = Wixia tumida (Keyserling) 1865
„ turbinata Waldkenaer 1841 = Cyclosa turbinata (Waldkenaer) 1841
„ turcica Simon 1879 = Araneus adiantus (Waldkenaer) 1802
„ tytera Waldkenaer 1841 = Araneus pegnius (Waldkenaer) 1841
„ ulecebrosa Keyserling 1892 = Eustala ulecebrosa (Keyserling) 1892
„ ullrichii Hahn 1834, Simon 1874, Chyzer & Kulczynski 1891 = Araneus ullrichii (Hahn) 1834
„ ullrichii Bösenberg 1901 = Araneus bituberculatus (Waldkenaer) 1802
„ ulrichi Westring 1851 = Araneus omoedus (Thorell) 1870
„ umbratica Waldkenaer 1805, 1841, Audouin 1827, Sundevall, Hahn 1834 et sequ. = Aranea sexpunctata Linné 1758, jetzt: Araneus umbraticus Clerck 1757
„ umbratica Menge 1866 ♀, 1879 ♀ = Araneus ixobolus (Thorell) 1873
„ umbratica Menge 1866 ♂ = Aranea ovigera Panzer 1804, jetzt: Araneus sericatus Clerck 1757
„ umbraticola Lister 1778 = Aranea sexpunctata Linné 1758, jetzt: Araneus umbraticus Clerck 1757
„ undata L. Koch 1871 = Araneus albiscutum (Urquhart) 1889
„ undata Wiehle 1931 = Aranea ovigera Panzer 1804, jetzt: Araneus sericatus Clerck 1757
„ undecimtuberculata Keyserling 1865, 1892 = Wagneriana undecimtuberculata (Keyserling) 1865

Epeira (Forts.):
„ undulata Simon 1863 = Leucauge undulata (Vinson) 1863
„ undulata Bertkau 1880 = Verrucosa alticeps (Keyserling) 1879
„ unicolor Doleschall 1857 = Cyrtophora unicolor (Doleschall) 1857
„ vallata Keyserling 1886 = Cyclosa vallata (Keyserling) 1886
„ variabilis Keyserling 1863, 1893 = Araneus variabilis (Keyserling) 1863
„ variabilis Rainbow 1897 = Araneus concinnus (Rainbow) 1899
„ variegata Risso 1826 = Meta reticulata (Linné) 1758, jetzt: Meta segmentata (Clerck) 1757
„ variolata Cambridge 1889 = Eriophora edax (Blackwall) 1863
„ vatia Thorell 1877 = Araneus punctiger (Doleschall) 1857
„ vegeta Keyserling 1865, 1892 = Eustala vegeta (Keyserling) 1865
„ veles Keyserling 1879 = Araneus grayii (Blackwall) 1863
„ ventricosa L. Koch 1878, Kulczynski 1901 = Araneus ventricosus (L. Koch) 1878
„ ventricosa Urquhart 1891 = Araneus ventricosellus (Roewer) 1942
„ ventricosa Rainbow 1897 = Araneus theis (Walckenaer) 1841
„ ventriosa Urquhart 1891 = Araneus ventriosus (Urquhart) 1891
„ venusta Walckenaer 1841 = Leucauge venusta (Walckenaer) 1841
„ venustula Keyserling 1879, 1892 = Araneus venustulus (Keyserling) 1879
„ venustula Urquhart 1890 = Araneus viriditas (Urquhart) 1886
„ verrucosa Walckenaer 1841, L. Koch 1871, Keyserling 1863 = Araneus pustulosus (Walckenaer) 1841
„ verrucosa Hentz 1850, Emerton 1902 = Verrucosa arenata (Walckenaer) 1841
„ versicolor Doleschall 1859 = Argyope versicolor (Doleschall) 1859
„ vertebrata Mc Cook 1888, 1893 = Araneus oaxacensis (Keyserling) 1863
„ verutum Urquhart 1886 = Araneus viriditas (Urquhart) 1886
„ vespucea Walckenaer 1841 = Nephila clavipes vespucea (Walckenaer) 1841
„ vicaria Kulczynski 1885, Grese 1909 = Aranea foliata Fourcroy 1785, jetzt: Araneus cornutus Clerck 1757
„ virgata Hahn 1834 = Aranea ovigera Panzer 1804, jetzt: Araneus sericatus Clerck 1757
„ viridipes Doleschall 1859, Keyserling 1887 = Cyrtophora cylindroides (Walckenaer) 1841
„ viridipes Taczanowski 1878 = Araneus viridipedatus (Roewer) 1942
„ vitiana Walckenaer 1847, L. Koch 1871 = Nephila vitiana (Walckenaer) 1847
„ vivida Walckenaer 1841 = Eustala anastera (Walckenaer) 1841
„ volucripes Keyserling 1885, Mc Cook 1893 = Araneus nauticus (L. Koch) 1875
„ vulgaris Hentz 1847 = Aranea ovigera Panzer 1804, jetzt: Araneus sericatus Clerck 1757
„ walckenaerii Doleschall 1857, 1859 = Nephila pictipes walckenaerii (Doleschall) 1857
„ walckenaeri Keyserling 1892 = Cyclosa walckenaeri (Cambridge) 1889
„ webbii Lucas 1838 = Argyope trifasciata (Forskal) 1775
„ westringii Thorell 1856, Westring 1862, Hansen 1885, Bösenberg 1901 = Araneus displicatus (Hentz) 1847
„ westringii Cambridge 1881 = Araneus inconspicuus (Simon) 1874
„ weyersi Simon 1885 = Araneus inustus (L. Koch) 1871
„ wittfeldae Mc Cook 1893 = Metazygia wittfeldae (Mc Cook) 1893
„ wordkmanni Keyserling 1887, 1892 = Araneus wordkmanni (Keyserling) 1887
„ youngii Cambridge 1870 = Araneus triguttatus (Fabricius) 1793

Epeiroides:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Aranea,** bzw. jetzt: **Araneus**

Eperigone:
„ simplex Crosby & Bishop 1928 = Eperigone simplicia Roewer 1842

Epeus:
„ tener Peckham 1886, 1889 = Viciria tenera (Simon) 1877

Ephippus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Zenodorus**
„ americanus Keyserling 1885 = Pellenes americanus (Keyserling) 1885
Epiblemum:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Salticus**
„ affinitatum Cambridge 1881, Jackson 1908 = Salticus olearii (Scopoli) 1763
„ albocinctum Peckham 1896, F. Cambridge 1901 = Salticus austinensis Gertsch 1936
„ ambiguum L. Koch 1877 = Pseudicius encarpatus (Walckenaer) 1802
„ faustum Hentz 1832, 1846 = Salticus scenicus (Clerck) 1757
„ histrionicum Thorell 1870 = Salticus scenicus (Clerck) 1757
„ latidens Kulczynski 1895 = Salticus latidentatus Roewer 1951
„ palmarum Hentz 1832, 1846, Peckham 1883 = Hentzia palmarum (Hentz) 1832
„ pilosum Karsch 1878 = Chrysilla pilosa (Karsch) 1878
„ scenicum tenerum Menge 1877 = Salticus olearii (Scopoli) 1763
„ tenerum Thorell 1873, Dahl 1883 = Salticus olearii (Scopoli) 1763
„ terenum Bösenberg 1903 = Salticus mutabilis (Lucas) 1846
„ zebraneum Chyzer & Kulczynski 1891, Kulczynski 1907 = Salticus olearii (Scopoli) 1763
Epicadinus:
„ cornutus Mello-Leitao 1929 = Tobias cornutus (Taczanowski) 1872
„ espinipes Mello-Leitao 1929 = Epicadinus spinipes (Blackwall) 1862
Epicadus:
„ spinipes Petrunkevitch 1911 = Epicadinus spinipes (Blackwall) 1862
Epicharmus:
„ ernsti Simon 1900 = Chinoscopus ernsti (Simon) 1900
Epiclubiona:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Clubiona**
Epinga:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Psecas**
„ ornata Peckkam 1894, 1896, F. Cambridge 1901 = Empanda ornata (Peckham) 1885
Episinus (= Episina):
„ australis Keyserling 1890 = Moneta australis (Keyserling) 1890
„ bigibbosus Cambridge 1896 = Episinus putus Cambridge 1894
„ lugubris Simon 1873, 1881, Bösenberg 1902, Cambridge 1906 = Episinus truncatus Latreille 1809
„ macrops Simon 1903 = Episinopsis macrops (Simon) 1903
„ nubilus Blackwall 1837, 1864 = Theridion pallens Blackwall 1834
„ theridioides Simon 1873 part. = Plocamis theridioides (Simon) 1873
„ theridioides Simon 1881 part. = Plocamis pyrenaea Simon 1914
„ truncatus Sordelli 1868, Canestrini & Pavesi 1868, Pavesi 1873, 1875 = nicht zu deuten!
„ truncatus Simon 1881 = Episinus maculipes Cavanna 1876
„ truncatus Bösenberg 1902 = Episinus angulatus (Blackwall) 1836
Epizelotes:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Zelotes**
Epocilla:
„ praetextata Simon 1887, 1892 = Epocilla aurantiaca (Simon) 1885
Erasinus:
„ dentipalpis Thorell 1892 = Erasinus labiatus (Thorell) 1887
Erasmia:
„ nigrovittata Keyserling 1882 = Iona nigrovittata (Keyserling) 1882
Erematttus:
„ albopilosus Banks 1904 = Pseudicius piraticus (Peckham) 1888
Eresus (= Eresa):
„ acanthophilus Dufour 1820, Walckenaer 1837 = Stegodyphus lineatus (Latreille) 1817

Eresus (Forts.):
- „ adspersus C. L. Koch 1846, Text, Simon 1873 = Stegodyphus lineatus (Latreille) 1817
- „ adspersus C. L. Koch 1846 Taf. = Stegodyphus dufourii (Audouin) 1827
- „ africanus Blackwall 1866 = Stegodyphus africanus (Blackwall) 1866
- „ albolunulatus Simon 1876 = Dorceus albolunulatus (Simon) 1876
- „ annulatus Hahn 1820, 1831, C. L. Koch 1846 = Eresus cinnaberinus (Olivier) 1789
- „ ater Waldckenaer 1805 = Eresus cinnaberinus (Olivier) 1789
- „ audouinii Brullé 1832 = Eresus waldckenaeri Brullé 1832
- „ bubo L. Koch 1865, 1878, Strand 1907 = Eresus fumosus C. L. Koch 1838
- „ ctenizoides C. L. Koch 1836 = Eresus waldckenaeri Brullé 1832
- „ dufourii Audouin 1827, Waldckenaer 1837 = Stegodyphus dufourii (Audouin) 1827
- „ eburneus Simon 1876 = Dorceus eburneus (Simon) 1876
- „ frontalis Latreille 1819, Waldckenaer 1837, Simon 1873, Bacelar 1936 = Eresus cinnaberinus frontalis (Latreille) 1819
- „ fulvus Rossi 1846 = Eresus cinnaberinus (Olivier) 1789
- „ fuscifrons C. L. Koch 1846 Text = Stegodyphus dufourii (Audouin) 1827
- „ fuscifrons C. L. Koch 1846 Taf. = Stegodyphus lineatus (Latreille) 1817
- „ guerinii Lucas 1846 = Eresus cinnaberinus (Olivier) 1789
- „ hildebrandti Karsch 1878 = Stegodyphus hildebrandti (Karsch) 1878
- „ illustris C. L. Koch 1838 = Eresus cinnaberinus (Olivier) 1789
- „ imperialis Dufour 1820, Waldckenaer 1837 = Eresus cinnaberinus frontalis (Latreille) 1819
- „ kollari Rossi 1846 = Eresus cinnaberinus (Olivier) 1789
- „ lineatus Latreille 1817 = Stegodyphus lineatus (Latreille) 1817
- „ lituratus C. L. Koch 1846 = Stegodyphus lineatus (Latreille) 1817
- „ lucasi Simon 1873 = Eresus albopictus Simon 1873
- „ luridus C. L. Koch 1836 = Eresus waldckenaeri Brullé 1832
- „ moerens C. L. Koch 1846 = Eresus waldckenaeri Brullé 1832
- „ molitor C. L. Koch 1846, Strand 1908 = Stegodyphus dufourii (Audouin) 1827
- „ molitor Simon 1873 = Stegodyphus lineatus (Latreille) 1817
- „ niger Chyzer & Kulczynski 1891, Simon 1892 et sequ. = Eresus cinnaberinus (Olivier) 1789
- „ pruinosus C. L. Koch 1846 = Eresus waldckenaeri Brullé 1832
- „ puniceus C. L. Koch 1838, Simon 1873 = Eresus waldckenaeri Brullé 1832
- „ quatuorguttatus Hahn 1831, C. L. Koch 1838 = Eresus cinnaberinus (Olivier) 1789
- „ ruficapillus Simon 1873 = Eresus cinnaberinus ignicomus (Simon) 1914
- „ ruficapillus Herman 1879 = Eresus cinnaberinus (Olivier) 1789
- „ semicinctus C. L. Koch 1846, Strand 1906 = Stegodyphus dufourii (Audouin) 1827
- „ siculus Lucas 1864 = Eresus waldckenaeri Brullé 1832
- „ theis Brullé 1832 = Eresus waldckenaeri Brullé 1832
- „ tibialis Cambridge 1869 = Stegodyphus tibialis (Cambridge) 1869
- „ tricolor Simon 1873, 1914 = Eresus cinnaberinus tricolor (Simon) 1873
- „ unifasciatus C. L. Koch 1846 = Stegodyphus lineatus (Latreille) 1817

Ergane:
- „ albifrons Kulczynski 1895 = Evarcha albifrons (Kulczynski) 1895
- „ arcuata Simon 1876 et auct. sequ. = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
- „ coronata Simon 1885 = Eugasmia coronata (Simon) 1885
- „ dentichelis Simon 1899 = Pancorius dentichelis (Simon) 1899
- „ dialeuca L. Koch 1881, Keyserling 1883 = Sigytes dialeuca (L. Koch) 1881
- „ dispar Simon 1888 = Penionomus dispar (Simon) 1888
- „ falcata Chyzer & Kulczynski 1891 et sequ. = Evarcha flammata (Clerck) 1757
- „ jucunda Chyzer & Kulczynski 1891 = Evarcha jucunda (Lucas) 1846
- „ laetabunda Chyzer & Kulczynski 1891, Bösenberg 1903 = Evarcha laetabunda (C. L. Koch) 1848

Ergane (Forts.):
„ madagascariensis Peckham 1885 = nicht zu deuten!
„ nigromaculata Keyserling 1883 = Thorelliola nigrimaculata (Keyserling) 1883
„ obscura Keyserling 1883 = Hasarius obscurus Keyserling 1881
„ scutulata L. Koch 1881 = Sigytes scutulata (L. Koch) 1881
„ signata Keyserling 1881 = Hasarius adansonii (Audouin) 1827
„ taeniata Keyserling 1885 = Evarcha leucophaea (C. L. Koch) 1846

Ergatis:
„ annulipes Blackwall 1846 = Dictyna annulipes (Blackwall) 1846
„ arborea Cambridge 1862 = Dictyna uncinata Thorell 1856
„ benigna Blackwall 1841, 1861 = Dictyna arundinacea (Linné) 1758
„ diligens Blackwall 1871 = Dictyna annulipes (Blackwall) 1846
„ flavescens Blackwall 1859, 1861 = Dictyna flavescens (Walckenaer) 1825
„ latens Blackwall 1841, 1861 = Dictyna latens (Fabricius) 1775
„ pallens Blackwall 1859, 1861 = Dictyna flavescens (Walckenaer) 1825
„ uncinata Cambridge 1870 = Dictyna uncinata Thorell 1856
„ viridissima Blackwall 1841 = Dictyna walckenaeri Roewer 1951

Eriauchenus:
„ workmanni Cambridge 1881 = Archaea workmanni (Cambridge) 1881

Ericulus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Bianor**
„ squamifer Simon 1885 = Attulus squamifer (Simon) 1881

Erigone:
„ acuminata Westring 1862 = Entelecara acuminata (Wider) 1834
„ acuminata Thorell 1871, Dahl 1883 = Walckenaeria acuminata (Blackwall) 1833
„ adipata L. Koch 1872 = Oreonetides vaginatus (Thorell) 1872
„ aequalis Westring 1862 = Centromerus aequalis (Westring) 1862
„ aesopea L. Koch 1873 = nicht zu deuten!
„ aestiva L. Koch 1872 = Tiso aestivus (L. Koch) 1872
„ affinis Thorell 1873, Dahl 1883 = Micryphantes affinis (Blackwall) 1855
„ alba Fox 1891 = Ceraticelus albus (Fox) 1891
„ albipunctata Cambridge 1878 = Enoplognatha thoracica (Hahn) 1831
„ alexandrina Cambridge 1872 = Tapinocyba alexandrina (Cambridge) 1872
„ aliena Kulczynski 1885 = Caledonia aliena (Kulczynski) 1885
„ alpigena L. Koch 1869 = Scotynotylus alpigenus (L. Koch) 1869
„ alpina Cambridge 1872 = Plaesiocraerus alpinus (Cambridge) 1872
„ altehabitans Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ alticeps Fox 1891 = Ceraticelus alticeps (Fox) 1891
„ altifrons Dahl 1883, Bösenberg 1902 = Entelecara acuminata (Wider) 1834
„ amabilis Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ anguinea L. Koch 1869 = Araeoncus anguineus (L. Koch) 1869
„ antennata Cambridge 1875 = Scotynotylus antennatus (Cambridge) 1875
„ antica Westring 1862, Dahl 1883 = Wideria antica (Wider) 1834
„ apicata Dahl 1883 = Oedothorax apicatus (Blackwall) 1850
„ aquilonaris L. Koch 1879 = Oedothorax aquilonaris (L. Koch) 1879
„ arctica Cambridge 1877 = Erigone atra Blackwall 1833
„ arctica Kulczynski 1902 = Erigone capra Simon 1884
„ arctica maritima Kulczynski 1902 = Erigone capra maritima (Kulczynski) 1902
„ arctica Braendegaard 1934 = Erigone sibirica orientalis (Braendegaard) 1940
„ aries Kulczynski 1882, 1894 = Scotynotylus antennatus (Cambridge) 1875
„ arietans Cambridge 1872 = Meioneta arietans (Cambridge) 1872
„ arundineti Thorell 1870 = Robertus arundineti (Cambridge) 1870
„ atriceps Cambridge 1874 = Ceraticelus atriceps (Cambridge) 1874
„ atrotibialis Cambridge 1878, 1879 = Wideria atrotibialis (Cambridge) 1878
„ auranticeps Marx 1889 = Cornicularia auranticeps Emerton 1882
„ aurita L. Koch 1869 = nicht zu deuten!
„ avicula L. Koch 1869 = Caracladus aviculus (L. Koch) 1869
„ barbata Thorell 1875 = Porrhomma pygmaeum (Blackwall) 1834

Erigone (Forts.):
„ barbata L. Koch 1879 = Savignia barbigera **nom. nov.**
„ barbigera L. Koch 1879 = Semljicola barbigera (L. Koch) 1879
„ bicissa Cambridge 1872 = Colobocyba bicissa (Cambridge) 1872
„ bicornis Westring 1851, 1862 = Diplocephalus cristatus (Blackwall) 1833
„ bicuspidata Westring 1862, Dahl 1883 = Hypomma cornutum (Blackwall) 1833
„ bicuspis L. Koch 1877 = Panamomops sulcifrons (Wider) 1834
„ bifrons Dahl 1883 = Dismodicus bifrons (Blackwall) 1841
„ bilacunata L. Koch 1881 = Tapinocyba bilacunata (L. Koch) 1881
„ bimaculata Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ biovata Cambridge 1875 = Thyreosthenius biovatus (Cambridge) 1875
„ bituberculata Westring 1862, Dahl 1883 = Hypomma bituberculatum (Wider) 1834
„ blackwallii Cambridge 1872 = Trichopterna cito (Cambridge) 1872
„ bogotensis Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ borea L. Koch 1879 = Porrhomma boreum (L. Koch) 1879
„ bostoniensis Marx 1889 = Sougambus bostoniensis (Emerton) 1882
„ brachyopis L. Koch 1873 = nicht zu deuten!
„ brevicornis Marx 1889 = Cornicularia brevicornis Emerton 1862
„ brevipalpis Dahl 1883 = Centromerus aequalis (Westring) 1862
„ brevipalpus Thorell 1870 = Centromerus aequalis (Westring) 1862
„ brevipes Westring 1851 = Ceratinella brevipes (Westring) 1851
„ broccha L. Koch 1872 = Rhaebothorax broccha (L. Koch) 1872
„ brunneonigra Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ bucephala Cambridge 1875 = Exechophysis bucephalus (Cambridge) 1875
„ bulbosa Marx 1889 = Ceraticelus bulbosus (Emerton) 1882
„ bulbosula Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ cacuminum Thorell 1877 = nicht zu deuten!
„ cacuminum Kulczynski 1882 = Oreonetides glacialis (L. Koch) 1872
„ caestata Thorell 1875 = Microneta caestata (Thorell) 1875
„ calcarata Keyserling 1886= Ceratinopsis laticeps Emerton 1882
„ californica Banks 1904 = Erigone dentosa Cambridge 1894
„ caliginosa L. Koch 1873 = nicht zu deuten!
„ capito Westring 1862, Thorell 1870, Cambridge 1875, Dahl 1883 = Wideria capito (Westring) 1862
„ carpathica Kulczynski 1882 = Tiso aestivus (L. Koch) 1872
„ castanea Marx 1889 = Minyriolus castaneus (Emerton) 1882
„ castellana Cambridge 1875 = Cotyora castellana (Cambridge) 1875
„ chelifera Westring 1852, Thorell 1871 = Gonatium rubens (Blackwall) 1838
„ cito Cambridge 1872 = Trichopterna cito (Cambridge) 1872
„ clarcksvillense Petrunkevitch 1928 = Eperigone tridentata (Emerton) 1882
„ clarkii L. Koch 1872 = Ctenium (Robertus) arundineti (Cambridge) 1870
„ clavicornis Marx 1889 = Cornicularia clavicornis Emerton 1882
„ coccinea Cambridge 1875 = Lophocarenum coccineum (Cambridge) 1875
„ collina Marx 1889 = Sisicottus montanus (Emerton) 1882
„ columbina L. Koch 1869 = Minyriolus columbinus (L. Koch) 1869
„ communis Marx 1889 = Cornicularia communis Emerton 1882
„ commutabilis Dahl 1883 = Oedothorax fuscus (Blackwall) 1834
„ compar Westring 1862 = Gongylidiellum compar (Westring) 1862
„ concava Marx 1889 = Sciastes concavus (Emerton) 1882
„ conica Westring 1851, 1862 = Savignia frontata (Blackwall) 1833
„ consimilis Cambridge 1875 = Utopiellum consimile (Cambridge) 1875
„ contorta Marx 1889 = Eperigone contorta (Emerton) 1882
„ convexa Westring 1851 1862 = Bathyphantes convexus (Westring) 1851
„ corallipes Cambridge 1875 = Gonatium corallipes (Cambridge) 1875
„ coriacea Westring 1862, Thorell 1871 = Troxochrus hiemalis (Blackwall) 1841
„ corniculans Cambridge 1875 = Prosopotheca corniculans (Cambridge) 1875
„ cornigera Thorell 1875 = Sintula cornigera (Blackwall) 1856

Erigone (Forts.):
„ cornupalpis Cambridge 1875 = Microneta cornupalpis (Cambridge) 1875
„ cornuta Westring 1862 = Walckenaeria acuminata (Blackwall) 1833
„ corrugis Cambridge 1875 = Hybocoptus corrugis (Cambridge) 1875
„ crassiceps Westring 1862 = Araeoncus crassiceps (Westring) 1862
„ crenata Marx 1889 = Ceratinops crenata (Emerton) 1882
„ criodes Thorell 1875 = Sintula criodes (Thorell) 1875
„ cristata Thorell 1871, Dahl 1883 = Diplocephalus cristatus (Blackwall) 1833
„ cristatopalpus leptocarpus Simon 1884 = Erigone tenuissima Simon 1884
„ cryophila Kölbel 1886 = Hilaira frigida (Thorell) 1872
„ cucullata Thorell 1856 = Wideria capito (Wider) 1834
„ cucullata Dahl 1883 = Wideria cucullata (C. L. Koch) 1836
„ cucurbitina Simon 1881 = Trichopterna cucurbitina (Simon) 1881
„ curta Simon 1881 = Silometopus curtus (Simon) 1881
„ curtipes Cambridge 1875 = Oedothorax curtipes (Cambridge) 1875
„ cuspidata Thorell 1871, Dahl 1883 = Cornicularia cuspidata (Blackwall) 1833
„ cyclops Simon 1881 = Plaesianillus cyclops (Simon) 1881
„ decemoculata Marx 1890 = Dismodicus decemoculatus (Emerton) 1882
„ decipiens Kulczynski 1882 = Wideria atrotibialis (Cambridge) 1878
„ decollata Simon 1881 = Hybocoptus decollatus (Simon) 1881
„ defloccata Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ dentata Westring 1862, Dahl 1883 = Gnathonarium dentatum (Wider) 1834
„ dentifera Westring 1862 = Micryphantes graminicola (Sundevall) 1830
„ dentipalpa Ohlert 1867 = Erigone atra Blackwall 1833
„ dentipalpis Menge 1868 = Erigone atra Blackwall 1833
„ depressa Marx 1889 = Lophomma depressum (Emerton) 1882
„ deserta L. Koch 1873 = nicht zu deuten!
„ desolata Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ diceros Dahl 1883 = Saloca diceros (Cambridge) 1870
„ digitata Cambridge 1872 = Typhochraestus digitatus (Cambridge) 1872
„ digiticeps Simon 1881 = Dactylopisthes digiticeps (Simon) 1881
„ diluta Cambridge 1875, 1881 = Centromerus dilutus (Cambridge) 1875
„ directa Cambridge 1874 = Cornicularia directa (Cambridge) 1874
„ discedens Simon 1881 = Araeoncus discedens (Simon) 1881
„ diversa L. Koch 1879 = Oedothorax diversus (L. Koch) 1879
„ diversicolor Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ dorsuosa Cambridge 1875 = Typhochraestus dorsuosus (Cambridge) 1875
„ douglasi Cambridge 1875 = Oreonetides abnormis (Blackwall) 1841
„ dybowskii Cambridge 1873 = Panamomops dybowskii (Cambridge) 1873
„ dysphorica Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ eborodunensis Cambridge 1875 = Plaesiocraerus helleri (L. Koch) 1869
„ egena L. Koch 1869 = Oedothorax egenus (L. Koch) 1869
„ elegans Cambridge 1872, 1905 = Silometopus elegans (Cambridge) 1872
„ elevata Westring 1851, 1862 = Dismodicus bifrons (Blackwall) 1841
„ elevata Dahl 1883 = Dismodicus elevatus (C. L. Koch) 1838
„ elongata Westring 1862, Dahl 1883 = Lophocarenum elongatum (Wider) 1834
„ elongata Marx 1889 = Dicymbium elongatum (Emerton) 1882
„ emertoni Cambridge 1874 = Ceraticelus emertoni (Cambridge) 1874
„ ensipotens Simon 1881 = Gonatium ensipotens (Simon) 1881
„ equestris L. Koch 1881 = Meioneta equestris (L. Koch) 1881
„ erecta L. Koch 1869 = Entelecara erecta (L. Koch) 1869
„ ericicola Simon 1881 = Hybocoptus decollatus ericicola (Simon) 1881
„ erigonoides Petrunkevitch 1911 = Eridantes erigonoides (Emerton) 1882
„ erythrocephala Westring 1862 = Macrargus rufus (Wider) 1834
„ erythropus Westring 1851, 1862 = Entelecara erythropus (Westring) 1851
„ eschatologica Crosby 1924 = Eperigone eschatologica (Crosby) 1924
„ excavata Kulczynski 1882 = Agyneta conigera (Cambridge) 1863
„ excelsa L. Koch 1879 = Araeoncus excelsus (L. Koch) 1879

Erigone (Forts.):
- „ extrapela Keyserling 1886 = Oedothorax extrapelus (Keyserling) 1886
- „ fabra Keyserling 1886 = Microneta fabra (Keyserling) 1886
- „ faceta L. Koch 1873 = nicht zu deuten!
- „ falsifica Keyserling 1886 = Oedothorax falsificus (Keyserling) 1886
- „ famelica Keyserling 1886, Banks 1900 = Gnathonarium famelicum (Keyserling) 1886
- „ famularis Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
- „ famulatoria Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
- „ famosa Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
- „ fasciata Thorell 1898 = nicht zu deuten!
- „ fastibilis Keyserling 1886 = Clitolyna fastibilis (Keyserling) 1886
- „ fellita Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
- „ femoralis Cambridge 1872 = Robertus femoralis (Cambridge) 1872
- „ fisheri Cambridge 1898 = Erigone psychrophila Thorell 1871
- „ fissiceps Cambridge 1874 = Ceraticelus fissiceps (Cambridge) 1874
- „ flavescens Cambridge 1873 = Sintula flavescens (Cambridge) 1873
- „ flavida Dahl 1883 = Wideria antica flavida (Menge) 1868
- „ florens Cambridge 1875, Keyserling 1886 = Hypselistes florens (Cambridge) 1875
- „ fluctuans Cambridge 1875 = nicht zu deuten!
- „ foraminifera Cambridge 1875 = Diplocephalus foraminifer (Cambridge) 1875
- „ formica Keyserling 1886 = Bathyphantes formica Emerton 1882
- „ formosa L. Koch 1873 = nicht zu deuten!
- „ frigida Thorell 1872 = Hilaira frigida (Thorell) 1872
- „ frigida Lenz 1897 = Hilaira vexatrix (Cambridge) 1877
- „ frontalis Dahl 1883 = Emtelecara frontalis (Ohlert) 1867
- „ frontata Dahl 1883 = Savignia frontata Blackwall 1833
- „ fucosa Keyserling 1891 = nicht zu deuten!
- „ fugax L. Koch 1877 = Wideria fugax (Cambridge) 1870
- „ furcillata Dahl 1883 = Tigellinus furcillatus (Menge) 1871
- „ fusca Thorell 1871, Dahl 1883 = Oedothorax fuscus (Blackwall) 1834
- „ fusca Marx 1889 = Hilaira leviceps (L. Koch) 1879
- „ fuscipalpis Thorell 1870 = Meioneta rurestris (C. L. Koch) 1836
- „ fuscipes Thorell 1873 = Plaesiocraerus fuscipes (Blackwall) 1836
- „ genistae Simon 1881 = Cineta genistae (Simon) 1881
- „ gibbicervix Thorell 1898 = nicht zu deuten!
- „ gibbicollis Westring 1851, 1862 = Oedothorax apicatus (Blackwall) 1850
- „ gibbifera Kulczynski 1882 = Oedothorax gibbiferus (Kulczynski) 1882
- „ gibbosa Thorell 1873 = Oedothorax gibbosus (Blackwall) 1841
- „ gibbum Westring 1851 = Pholcomma gibbum (Westring) 1851
- „ glacialis Thorell 1871 = Hilaira glacialis (Thorell) 1871
- „ glaphyra Simon 1881 = Wideria atrotibialis (Cambridge) 1878
- „ globipes L. Koch 1872 = Trichopterna globipes (L. Koch) 1872
- „ gradata Simon 1881 = Cineta gradata (Simon) 1881
- „ graeca Cambridge 1872 = Entelecara graeca (Cambridge) 1872
- „ graminicola Westring 1851, 1862 et sequ. = Micryphantes graminicola (Sundevall) 1830
- „ granulosa L. Koch 1879 = Centromerus granulosus (L. Koch) 1879
- „ groenlandica Lenz 1897 = Coryphaeolana holmgrenii (Thorell) 1871
- „ grouvellii Cambridge 1875 = Meioneta gulosa (L. Koch) 1869
- „ gulosa L. Koch 1869 = Meioneta gulosa (L. Koch) 1869
- „ habilis Cambridge 1875 = Tigellinus furcillatus (Menge) 1871
- „ hardii Thorell 1873, Dahl 1883 = Phaulothrix hardii (Blackwall) 1850
- „ helleri L. Koch 1869 = Plaesiocraerus helleri (L. Koch) 1869
- „ henkingi Dahl 1883 = Oedothorax henkingi (Dahl) 1883
- „ herniosa Thorell 1875 = Oreonetides vaginatus (Thorell) 1872
- „ heterogaster Cambridge 1875 = Lophocarenum ineditum (Cambridge) 1875

Erigone (Forts.):
- „ hiemalis Dahl 1883 = Troxochrus hiemalis (Blackwall) 1841
- „ hilaris Thorell 1875 = Gonatium hilaris (Thorell) 1875
- „ holmgrenii Thorell 1871 = Coryphaeolana holmgrenii (Thorell) 1871
- „ hortensis L. Koch 1872 = Lophocarenum parallelum (Wider) 1834
- „ humiliceps Keyserling 1886 = Cornicularia pallida Emerton 1882
- „ humilis Dahl 1883 = Araeoncus humilis (Blackwall) 1841
- „ huthwaitii Thorell 1873 = Leptorrhoptrum huthwaitii (Cambridge) 1861
- „ hyperborea L. Koch 1873 = nicht zu deuten!
- „ ignigena Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
- „ ignitula Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
- „ ignobilis Cambridge 1870 = Troxochrus ignobilis (Cambridge) 1870
- „ impolita Westring 1862, Thorell 1871 = Cnephalocotes obscurus (Blackwall) 1834
- „ impudica L. Koch 1869 = nicht zu deuten!
- „ imula L. Koch 1879 = Oedothorax imulus (L. Koch) 1879
- „ incauta Cambridge 1872 = Lophomma incautum (Cambridge) 1872
- „ incerta L. Koch 1873 = nicht zu deuten!
- „ inclara Simon 1881 = Erigonoplus inclarus (Simon) 1881
- „ incomta Cambridge 1872 = Micrargus (Blaniargus) incomtus (Cambridge) 1872
- „ incondita L. Koch 1879 = Hilaira incondita (L. Koch) 1879
- „ inconspicua Cambridge 1872 = Porrhomma inconspicuum (Cambridge) 1872
- „ indirecta Cambridge 1874, Keyserling 1886 = Cornicularia indirecta (Cambridge) 1874
- „ inedita Cambridge 1875 = Lophocarenum ineditum (Cambridge) 1875
- „ inexpedibilis Cambridge 1872 = Microneta inexpedibilis (Cambridge) 1872
- „ inflexa Westring 1862 = Trachynella inflexa (Westring) 1862
- „ innotabilis Dahl 1883 = Syedrula innotabilis (Cambridge) 1863
- „ inops Thorell 1875 = Microneta inops (Thorell) 1875
- „ inornata Marx 1889 = Grammonota inornata Emerton 1882
- „ insecta L. Koch 1869 = Colobocyba insecta (L. Koch) 1869
- „ intercepta Cambridge 1873 = Phaulothrix interceptus (Cambridge) 1873
- „ interpres Cambridge 1874, Keyserling 1886 = Ceratinopsis interpres (Cambridge) 1874
- „ intoleranta Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
- „ isabellina Westring 1851, 1862, Dahl 1883 = Gonatium rubellum (Blackwall) 1841
- „ jelskii Keyserling 1886 = Ceratinopsis jelskii (Keyserling) 1886
- „ jubata L. Koch 1881 = Wideria jubata (L. Koch) 1881
- „ justa Cambridge 1875 = Trichopterna justa (Cambridge) 1875
- „ karpinskii Cambridge 1873 = Cornicularia karpinskii (Cambridge) 1873
- „ kochii Cambridge 1872 = Cornicularia kochii (Cambridge) 1873
- „ kochii Lebert 1877 = Plaesiocraerus leberti Roewer 1942
- „ kochii Calloni 1889 = nicht zu deuten!
- „ labiata Keyserling 1866 = nicht zu deuten!
- „ laesa L. Koch 1879 = Silometopus laesus (L. Koch) 1879
- „ laeta Cambridge 1874 = Ceraticelus laetus (Cambridge) 1874
- „ laetabilis Cambridge 1874 = Ceraticelus laetabilis (Cambridge) 1874
- „ lantosquensis Simon 1884, Kulczynski 1902 = Erigone atra Blackwall 1833
- „ lapidicola Thorell 1873 = Porrhomma rufipes (Blackwall) 1833
- „ lasciva Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
- „ lata Marx 1889 = Ceratinops lata (Emerton) 1882
- „ latebricola Dahl 1883 = Gongylidiellum compar (Westring) 1862
- „ laticeps Marx 1889 = Ceratinopsis laticeps (Emerton) 1882
- „ latifrons Dahl 1883 = Plaesiocraerus latifrons (Cambridge) 1863
- „ latithorax Keyserling 1886 = Asemostera latithorax (Keyserling) 1886
- „ leprieuri Simon 1874 (nom. nud.), Cambridge 1875 = Acartauchenius leprieuri (Cambridge) 1875

Erigone (Forts.):
- „ leptocarpa Thorell 1875 = Donacochara speciosa (Thorell) 1875
- „ leviceps L. Koch 1879 = Hilaira leviceps (L. Koch) 1879
- „ litoralis L. Koch 1872 = Erigone vagans Audouin 1827
- „ livida Thorell 1870 = Ctenium (Robertus) lividum (Blackwall) 1836
- „ longa Kulczynski 1882 = Acartauchenius longus (Kulczynski) 1882
- „ longimana C. L. Koch 1841 et sequ. = Tiso vagans (Blackwall) 1841
- „ longipalpis L. Koch 1869, Emerton 1882 = Erigone atra Blackwall 1833
- „ longisetosa Marx 1889 = Aduva longisetosa (Emerton) 1882
- „ longitarsis Marx 1889 = Baryphyma longitarsis (Emerton) 1882
- „ longituba Petrunkevitch 1911 = Pocadicnemis pumila (Blackwall) 1841
- „ longiuscula Cambridge 1875 = Araeoncus longiusculus (Cambridge) 1875
- „ lucasi Simon 1874 (nom. nud.), Cambridge 1875 = Lophocarenum lucasi (Cambridge) 1875
- „ ludibunda Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
- „ ludicra Thorell 1873 = Peponocranium ludicrum (Cambridge) 1861
- „ lusisca Simon 1872 = Plaesiocraerus lusiscus (Simon) 1872
- „ macrochoera herniosa Thorell 1875 = Oreonetides vaginatus (Thorell) 1872
- „ marxii Keyserling 1886, Marx 1889 = Hypomma marxii (Keyserling) 1886
- „ mascula Karsch 1879 = Microneta mascula (Karsch) 1879
- „ matei Keyserling 1886 = Oedothorax matei (Keyserling) 1886
- „ maxima Marx 1889 = Oedothorax maximus (Emerton) 1882
- „ medusa Simon 1881 = Lophocarenum medusa (Simon) 1881
- „ melanocnemis Fox 1891 = Ceraticelus pygmaeus (Emerton) 1882
- „ mendica L. Koch 1879 = Coryphaeolana holmgrenii (Thorell) 1871
- „ meridionalis Simon 1884 = Erigone longipalpis meridionalis (Simon) 1926
- „ micropalpis Marx 1889 = Ceraticelus micropalpis (Emerton) 1882
- „ microtarsus Marx 1889 = Sciastes microtarsus (Emerton) 1882
- „ minutissima Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
- „ mirabilis L. Koch 1879 = Utopiellum consimile (Cambridge) 1875
- „ mitrata L. Koch 1877 = Wideria mitrata (Menge) 1868
- „ modesta Keyserling 1886 = Ceratinopsis modesta (Nicolet) 1849
- „ moebi Dahl 1883 = Lophocarenum moebi (Dahl) 1883
- „ mollicula L. Koch 1874, Thorell 1898 = nicht zu deuten!
- „ monoceros Westring 1862, Dahl 1883 = Prosopotheca monoceros (Wider) 1834
- „ monoceros Keyserling 1886 = Coreorgonal monoceros (Simon) 1884
- „ monodon Cambridge 1872 = Acartauchenius monodon (Cambridge) 1872
- „ montana Marx 1889 = Sisicottus montanus (Emerton) 1882
- „ montevidensis Keyserling 1877, 1886 = Oedothorax montevidensis (Keyserling) 1877
- „ monticola Marx 1889 = Souidas tibialis (Emerton) 1882
- „ montifera Marx 1889 = Oedothorax montiferus (Emerton) 1882
- „ montigena L. Koch 1872 = Hilaira montogena (L. Koch) 1872
- „ mordens Thorell 1871 = Micrargus (Blaniargus) herbigrada (Blackwall) 1854
- „ multesima Cambridge 1875 = Microneta multesima (Cambridge) 1875
- „ muscorum Lebert 1877 = nicht zu deuten!
- „ myrmicaria Kulczynski 1882 = Syedra myrmicaria (Kulczynski) 1882
- „ nasuta Cambridge 1879 = Trachelocamptus nasutus (Cambridge) 1879
- „ nemoralis Thorell 1873 = Lophocarenum nemorale (Blackwall) 1841
- „ nemorivaga Cambridge 1875 = Gonatium hilare (Thorell) 1875
- „ neoterica Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
- „ nigra Dahl 1883 = Dicymbium nigrum (Blackwall) 1834
- „ nigriana Keyserling 1886 = Ceratinopsis nigriana (Keyserling) 1886
- „ nigriceps Cambridge 1875 = Tigellinus furcillatus (Menge) 1871
- „ nigriceps Marx 1889 = Ceratinopsis nigriceps Emerton 1882
- „ nigripalpis Marx 1889 = Ceratinopsis nigripalpis Emerton 1882
- „ nigrita Simon 1881 = Hylyphantes nigritus (Simon) 1881
- „ nigrocaerulea Simon 1881 = Trichopterna nigrocaerulea (Simon) 1881

Erigone (Forts.):
„ nigrolimbata Cambridge 1875 = Minicia marginella (Wider) 1834
„ nitida Keyserling 1891 = nicht zu deuten!
„ nudipalpis Westring 1851, 1862 = Trachynella nudipalpis (Westring) 1851
„ nuncia Simon 1881, 1884 = Entelecara graeca (Cambridge) 1872
„ oblita Kulczynski 1902 = Erigone capra Simon 1884
„ obtusa Thorell 1873 = Trachynella obtusa (Blackwall) 1836
„ ochropus Canestrini & Pavesi 1868 = Minyriolus pusillus (Wider) 1834
„ orites Thorell 1875 = nicht zu deuten!
„ ornata Cambridge 1875 = Grammonota ornata (Cambridge) 1875
„ ovata Dahl 1883 = Colobocyba insecta (L. Koch) 1869
„ oxycephala L. Koch 1879 = Microerigone spetzbergensia (Thorell) 1871
„ pacifica Thorell 1875 = Hilaira montigena (L. Koch) 1872
„ paetuta Cambridge 1875 = Rhaebothorax paetutus (Cambridge) 1875
„ palaearctica Braendegaard 1934, Holm 1937 = Erigone arctica (White) 1852
„ pallens Cambridge 1872 = Colobocyba exilis (Blackwall) 1853
„ pallens Marx 1889 = Cochlembolus pallidus (Emerton) 1882
„ pallescens Marx 1889 = Scylaceus pallidus (Emerton) 1882
„ pallida Marx 1889 = Cornicularia pallida (Emerton) 1882
„ paraensis Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ parallela Westring 1862 = Silometopus ater (Blackwall) 1841
„ parallela Dahl 1883 = Lophocarenum parallelum (Wider) 1834
„ parasitica Westring 1851, 1862 = Porrhomma parasiticum (Westring) 1851
„ parumpunctata Simon 1881 = Lophocarenum parumpunctatum (Simon) 1881
„ parvula Fox 1891 = Ceraticelus parvulus (Fox) 1891
„ pastoralis Cambridge 1872 = Troxochrus pastoralis (Cambridge) 1872
„ paullula Marx 1889 = Cornicularia minuta Emerton 1882
„ paupera Simon 1881 = Alioranus pauper (Simon) 1881
„ pavida Cambridge 1872 = Lophocarenum pavidum (Cambridge) 1872
„ penicillata Westring 1851, 1862, Dahl 1883 = Styloctetor penicillatus (Westring) 1851
„ perforata Thorell 1871 = Trematocephalus cristatus (Wider) 1934
„ perplexa Keyserling 1886 = Catabrithorax perplexus (Keyserling) 1886
„ persica Keyserling 1886 = Eridantes erigonoides (Emerton) 1882
„ persimilis Cambridge 1875 = Erigone atra Blackwall 1833
„ persimilis Crosby 1905 = Erigone dentigera Cambridge 1874
„ pertinens Cambridge 1875 = Catabrithorax pertinens (Cambridge) 1875
„ persoluta Cambridge 1875 = Microneta persoluta (Cambridge) 1875
„ peruana Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ phaeopus Westring 1851, Thorell 1871 = Ceratinella phaeopus (Westring) 1851
„ phaulobia Thorell 1875 = Minyriolus phaulobius (Thorell) 1875
„ picina Dahl 1883 = Plaesiocraerus picinus (Blackwall) 1841
„ pictilis Cambridge 1875 = Grammonota pictilis (Cambridge) 1875
„ pilifrons L. Koch 1879 = Acartauchenius pilifrons (L. Koch) 1879
„ pinguis Westring 1851, 1862 (part.) = Ctenium (Robertus) lividum (Blackwall) 1836
„ pinguis Westring 1862 (part.) = Ctenium (Robertus) arundineti (Cambridge) 1870
„ plancyi Simon 1880 = Ceratinella plancyi (Simon) 1880
„ plicita Crosby 1905 = Erigone dentosa Cambridge 1894
„ plumosa Marx 1889 = Catabrithorax plumosus (Emerton) 1882
„ polaris Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ polita Simon 1881 = Wideria polita (Simon) 1881
„ praegracilis Cambridge 1872 = Entelecara flavipes (Blackwall) 1834
„ pratensis Thorell 1873 = Baryphyma pratensis (Blackwall) 1861
„ prativaga Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ probata Cambridge 1874 = Catabrithorax probatus (Cambridge) 1874
„ probata Keyserling 1886 = Eperigone probata (Emerton) 1882

Erigone (Forts.):

„ prominula Cambridge 1872 = Metopobactrus prominulus (Cambridge) 1872
„ prospiciens Thorell 1875 = Araeoncus prospiciens (Thorell) 1875
„ proterva L. Koch 1873 = nicht zu deuten!
„ protuberans Cambridge 1875 = Plaesiocraerus protuberans (Cambridge) 1875
„ provocans Cambridge 1877 = Microerigone spetzbergensis (Thorell) 1871
„ provida Cambridge 1875 = Cornicularia directa (Cambridge) 1874
„ proxima Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ psilocephala Dahl 1883 = Cornicularia vigilax (Blackwall) 1853
„ pulicaria Thorell 1875 = Diplocephalus pulicarius (Thorell) 1875
„ pumila Thorell 1873, Dahl 1883 = Pocadicnemis pumila (Blackwall) 1841
„ punctata Canestrini & Pavesi 1870 = nicht zu deuten!
„ punctata Thorell 1873, Dahl 1883 = Lophomma punctatum (Blackwall) 1841
„ purpurea Keyserling 1886 = Ceratinopsis purpurea (Keyserling) 1886
„ purpurescens Keyserling 1886 ♂ = Ceratinopsis purpurescens (Keyserling) 1886
„ purpurescens Keyserling 1886 ♀ = Ceratinopsis anglicana (Hentz) 1850
„ pusilla Westring 1851, 1862, Dahl 1883 = Minyriolus pusillus (Wider) 1834
„ pygmaea Marx 1889 = Ceraticelus pygmaeus (Emerton) 1882
„ quadricristata Marx 1889 = Horcotes quadricristatus (Emerton) 1882
„ quadripunctata Fickert 1886 = nicht zu deuten!
„ quisquiliarum Westring 1851, 1862 = Microneta viaria (Blackwall) 1841
„ radicicola L. Koch 1875 = Lophocarenum radicicola (L. Koch) 1875
„ rayi Simon 1881 = Metopobactrus rayi (Simon) 1881
„ relexata Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ repudiata L. Koch 1873 = nicht zu deuten!
„ resima L. Koch 1881 = Meioneta resima (L. Koch) 1881
„ reticulata Westring 1851 = Bathyphantes convexus (Westring) 1851
„ retroversa Cambridge 1875 = Sintula retroversa (Cambridge) 1875
„ retusa Westring 1851, 1862, Dahl 1883 = Oedothorax retusus (Westring) 1851
„ reussii Thorell 1871 = Silometopus ater (Blackwall) 1841
„ robusta Westring 1851, 1862 = Centromerus robustus (Westring) 1851
„ romana Cambridge 1872 = Styloctetor romanus (Cambridge) 1872
„ rostrata Marx 1889 = Origanates rostratus (Emerton) 1862
„ rostratula Keyserling 1886 = Gongylidiellum rostratulum (Keyserling) 1886
„ rubens Dahl 1883 = Gonatium rubens (Blackwall) 1833
„ rubicunda Keyserling 1886 = Ceratinopsis rubicunda (Keyserling) 1886
„ rufa Thorell 1870, Dahl 1883 = Macrargus rufus (Wider) 1834
„ rufa Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ rufipalpis Canestrini & Pavesi 1868 = nicht zu deuten!
„ rufipes Westring 1851, 1862, Dahl 1883 = Gongylidium rufipes (Linné) 1758
„ rufipes Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ rufithorax Simon 1881 = Trichopterna rufithorax (Simon) 1881
„ rugulosa Westring 1851, 1862 = Troxochrus rugulosus (Westring) 1851
„ rurestris Westring 1862 = Meioneta rurestris (C. L. Koch) 1836
„ rusticella Keyserling 1891 = nicht zu deuten!
„ rusticola Keyserling 1891 = nicht zu deuten!
„ saltuensis Cambridge 1872 = Abacoproeces saltuum (L. Koch) 1872
„ saltuum L. Koch 1872 = Abacoproeces saltuum (L. Koch) 1872
„ sarcinata Cambridge 1872 = Notioscopus sarcinatus (Cambridge) 1872
„ saxicola Thorell 1873 = Trichoncus saxicola (Cambridge) 1861
„ scabricula Westring 1851, 1862, Dahl 1883 = Troxochrus scabriculus (Westring) 1851
„ scabristernis Westring 1851, 1862, Thorell 1871 = Dicymbium nigrum (Blackwall) 1834
„ schumaginensis Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ scopulifera Marx 1889 = Tapinocyba scopulifera (Emerton) 1882

Erigone (Forts.):

„ scurrilis Cambridge 1872 = Acartauchenius scurrilis (Cambridge) 1872
„ semiatra Keyserling 1886 = Microneta semiatra (Keyserling) 1886
„ semiflava L. Koch 1879 = Oedothorax semiflavus (L. Koch) 1879
„ semiglobosa Westring 1862 = Diplocephalus semiglobosus (Westring) 1862
„ serotina C. L. Koch 1841, Ohlert 1867 = Dicymbium nigrum (Blackwall) 1834
„ serrata Cambridge 1875 = Centromerus serratus (Cambridge) 1875
„ servula Simon 1881 = Glyphesis servulus (Simon) 1881
„ sibiriana Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ silus Cambridge 1872 = Mecopisthes silus (Cambridge) 1872
„ silvestris Westring 1862 = Centromerus sylvaticus (Blackwall) 1841
„ similis Cambridge 1872 = Troxochrus hicmalis (Blackwall) 1841
„ similis Petrunkevitch 1911 = Ceraticelus similis (Banks) 1892
„ simonii Cambridge 1872 = Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer) 1841
„ simplex Westring 1851, 1862 = Oedothorax fuscus (Blackwall) 1834
„ simplex Marx 1889 = Tapinocyba simplex (Emerton) 1882
„ solitaris Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ sollers Cambridge 1873 = Wideria sollers (Cambridge) 1873
„ sordidata Thorell 1873 = Minyriolus pusillus (Wider) 1834
„ spadix Thorell 1875 = nicht zu deuten!
„ speciosa Thorell 1875 = Donacochara speciosa (Thorell) 1875
„ spelaea Simon 1872 = Oreonetides abnormis (Blackwall) 1841
„ spetzbergensis Thorell 1871 = Microerigone spetzbergensis (Thorell) 1871
„ spinifera Cambridge 1874 = Suessa spinifera (Cambridge) 1874
„ spinosa Cambridge 1872, 1909 = Erigone vagans Audouin 1827
„ stativa Simon 1881 = Anacotyle stativa (Simon) 1881
„ strabo Thorell 1877 = nicht zu deuten!
„ striaticeps Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ stylifrons Cambridge 1875 = Wideria stylifrons (Cambridge) 1875
„ subaequalis Westring 1851, 1862 = Lophomma subaequalis (Westring) 1851
„ subelevata L. Koch 1869 = Entelecara subelevata (L. Koch) 1869
„ subitanea Cambridge 1875 = Aulacocyba subitanea (Cambridge) 1875
„ submissa L. Koch 1879 = Oedothorax submissus (L. Koch) 1879
„ subrostrata Cambridge 1873 = Evansia subrostrata (Cambridge) 1873
„ sucinea L. Koch 1873 = nicht zu deuten!
„ sulcifrons Dahl 1883 = Panamomops sulcifrons (Wider) 1834
„ sundevallii Westring 1851, 1862 = Maso sundevallii (Westring) 1851
„ suspecta Kulczynski 1882 = Wideria suspecta (Kulczynski) 1882
„ sylvatica Thorell 1870, Dahl 1883 = Centromerus sylvaticus (Blackwall) 1841
„ synophrys Thorell 1870 = Lophocarenum turgidum (Blackwall) 1841
„ taczanowskii Cambridge 1873, L. Koch 1879 = Gnathonarium dentatum (Wider) 1834
„ tarsalis Thorell 1875 = Oedothorax tarsalis (Thorell) 1875
„ tatrica Kulczynski 1882 = Plaesiocraerus helleri (L. Koch) 1869
„ taurica Thorell 1875 = Diplocephalus tauricus (Thorell) 1875
„ tauricornis Simon 1881 = Panamomops tauricornis (Simon) 1881
„ terrestris Marx 1889 = Sciastes terrestris (Emerton) 1882
„ tesselata Westring 1862 = Centromerus tesselatus (Westring) 1862
„ thoracata Cambridge 1875 = Lophocarenum radicicola (L. Koch) 1875
„ thorellii Westring 1862, Dahl 1883 = Entelecara thorellii (Westring) 1862
„ tibialis Thorell 1871, Dahl 1883 = Dicymbium tibiale (Blackwall) 1836
„ tibialis Marx 1889 = Cornicularia tibialis (Emerton) 1882
„ tibialis Fox 1891 = Ceraticelus tibiatula Roewer 1942
„ tricornis Marx 1889 = Tigellinus tricornis (Emerton) 1882
„ tridentata Marx 1889, Crosby 1905 = Eperigone tridentata (Emerton) 1882
„ trilobata Marx 1889 = Eperigone trilobata (Emerton) 1882
„ truncata Marx 1889 = Sciastes truncata (Emerton) 1882
„ truncatifrons Cambridge 1875 = Stajus truncatifrons (Cambridge) 1875

Erigone (Forts.):
„ truncorum L. Koch 1872 = Ctenium (Robertus) truncorum (L. Koch) 1872
„ tuberosa Thorell 1873 = Oedothorax tuberosus (Blackwall) 1841
„ tumidosa Keyserling 1886 = Ceratinopsis tumidosa (Keyserling) 1886
„ turrigera Simon 1881 = Trichopterna turrigera (Simon) 1881
„ ululabilis Keyserling 1886 = Microneta ululabilis (Keyserling) 1886
„ umbraticola Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ umbratilis Keyserling 1886 = Bathyphantes umbratilis (Keyserling) 1886
„ uncata Thorell 1875 = Hilaira uncata (Cambridge) 1873
„ uncta L. Koch 1870 = Centromerus unctus (L. Koch) 1870
„ unicornis Thorell 1875, Dahl 1883 = Cornicularia unicornis (Cambridge) 1868
„ urusta Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ vacerosa Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ vagabunda Westring 1862 = Erigone atra Blackwall 1833
„ vaginata Thorell 1872 = Oreonetides vaginatus (Thorell) 1872
„ vaporariorum Cambridge 1875 = Araeoncus vaporariorum (Cambridge) 1875
„ vegeta Keyserling 1891 = nicht zu deuten!
„ veneta Thorell 1875 = Scotynotylus venetus (Thorell) 1875
„ venialis Keyserling 1891 = nicht zu deuten!
„ vernalis Marx 1889 = Cochlembolus vernalis (Emerton) 1882
„ verticalis Simon 1881 = Metopobactrus verticalis (Simon) 1881
„ vexatrix Cambridge 1877 = Hilaira vexatrix (Cambridge) 1877
„ vexatrix L. Koch 1879 = Hilaira nivalis Holm 1837
„ viaria Thorell 1870 = Microneta viaria (Blackwall) 1841
„ vicana Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ vigilax Thorell 1873 = Cornicularia vigilax (Blackwall) 1853
„ viva Cambridge 1875 = Gongylidiellum parvum (Blackwall) 1841
„ vulnerata L. Koch 1879 = Silometopus vulneratus (L. Koch) 1879
„ wagae Cambridge 1873 = Wubana wagae (Cambridge) 1873
„ westringi Simon 1881, 1884 = Maso sundevallii (Westring) 1851
„ wideri Thorell 1871 = Ceratinella wideri (Thorell) 1871
„ xanthippe Keyserling 1886 = Ceratinopsis xanthippe (Keyserling) 1886
„ zabluta Keyserling 1886 = nicht zu deuten!
„ zonaria Keyserling 1886 = Bathyphantes zonarius (Keyserling) 1886
„ zonata Lenz 1891 = Conopistha (Argyrodina) zonata (Walckenaer) 1841
„ zygia Keyserling 1886 = Bathyphantes zygius (Keyserling) 1886

Erigonella:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Troxochrus**
„ latifrons Dahl 1883, 1901 = Plaesiocraerus latifrons (Cambridge) 1863
„ subelevata Dahl 1901 = Entelecara subelevata (L. Koch) 1869

Erigonidium:
„ graminicola Smith 1904 = Micryphantes graminicola (Sundevall) 1830

Erigonoplus:
„ castanellus Simon 1884 = Cotyora castellana (Cambridge) 1875
„ gigas Banks 1896 = Grammonota gigas (Banks) 1896
„ globipes Simon 1884, Becker 1896 = Trichopterna globipes (L. Koch) 1872
„ justus Simon 1884 = Trichopterna justa (Cambridge) 1875
„ krueperi Simon 1884 = Trichopterna krueperi (Simon) 1884
„ nigerrimus Simon 1884 = Erigonoplus inclarus (Simon) 1881
„ nigrocaeruleus Simon 1884 = Trichopterna nigrocaerulea (Simon) 1881
„ turriger Simon 1884 = Trichopterna turrigera (Simon) 1881

Eriodon:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Missulena**
„ semicoccineum Simon 1896 = Missulena rubrocapillata (Ausserer) 1875

Eriophora:
„ balaustina F.Cambridge 1904, Banks 1909 = Eriophora circulata (Walckenaer) 1841
„ bivariolata F. Cambridge 1903 = Eriophora edax (Blackwall) 1863
„ variolata F. Cambridge 1903 = Eriophora edax (Blackwall) 1863

Eripus:
„ flavus Giebel 1863 = nicht zu deuten!
„ heterogaster Waldkenaer 1833, 1837, C. L. Koch 1845, Keyserling 1880, Göldi 1886 = Epicadus heterogaster (Guérin) 1829
„ quinquegibbosus Cambridge 1877, Keyserling 1880 = Epicadus heterogaster (Guérin) 1829
„ ruber Giebel 1863 = nicht zu deuten!
„ spinipes Blackwall 1862 = Epicadinus spinipes (Blackwall) 1862
„ trifidus Cambridge 1893 = Epicadinus trifidus (Cambridge) 1893

Eris:
„ albobimaculata Simon 1876, Peckham 1895 = Bianor albobimaculatus (Lucas) 1846
„ aurigera C. L. Koch 1846, Simon 1864 = Dendryphantes marginatus (Waldkenaer) 1837
„ barbata Karsch 1880 = Eugasmia barbata (Karsch) 1880
„ barbipes Peckham 1888, 1901 = Sassacus barbipes (Peckham) 1888
„ bella Karsch 1878 = Bianor bellus (Karsch) 1878
„ brendeli Giebel 1863 = nicht zu deuten!
„ illustris C. L. Koch 1846, Simon 1864, Petrunkevitch 1911 = Saitis illustris (C. L. Koch) 1846
„ jubata C. L. Koch 1846, Simon 1864 = Beata jubata (C. L. Koch) 1846
„ marginatus Peckham 1886 = Dendryphantes marginatus (Waldkenaer) 1837
„ nervosa Peckham 1888, Emerton 1909 = Zygoballus nervosus (Peckham) 1888
„ niveipalpis Gerstäcker 1873 = Hasarius adansonii (Audouin) 1827
„ octavus Peckham 1888 = Dendryphantes capitatus (Hentz) 1846
„ praedatorius Keyserling 1877 = Echinussa praedatoria (Keyserling) 1877
„ squamifera Simon 1881 = Attulus squamifer (Simon) 1881

Erissus:
„ pustulatus Cambridge 1898 = Isaloides putus (Cambridge) 1891

Ero:
„ americanus Taczanowski 1874 = Conopistha (Argyrodina) americana (Taczanowski) 1874
„ atomaria C. L. Koch 1845, L. Koch 1877, Dahl 1883 = Ero aphana (Waldkenaer) 1802
„ caudatus Taczanowski 1874 = Conopistha (Argyrodina) caudata (Taczanowski) 1874
„ laevigatus Keyserling 1863 = Mimetus laevigatus (Keyserling) 1863
„ saxatilis C. L. Koch 1850 = Theridion saxatile C. L. Koch 1834
„ thoracicum Thorell 1870, Emerton 1882, 1902, Dahl 1883 = Ero fuscata (Villers) 1789
„ variegata C. L. Koch 1836, Westring 1862, Menge 1866, Ohlert 1867 = Ero fuscata (Villers) 1789

Ervig:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Diguetia**

Erycina:
„ violacea Urquhart 1890 = Erycinicola purpurapunctata (Urquhart) 1888

Erygona:
„ longimana imon 1864 = Tiso vagans (Blackwall) 1841
„ serotina Simon 1864 = Dicymbium nigrum (Blackwall) 1834
„ vagans Simon 1864 = Erigone vagans Audouin 1827

Erythrophorus (= Erythrophora):
„ annulatus C. L. Koch 1850 = Eresus cinnaberinus (Olivier) 1789
„ cinnaberinus C. L. Koch 1850 = Eresus cinnaberinus (Olivier) 1789
„ fastuosa Simon 1864 = Dorceus fastuosus C. L. Koch 1846
„ illustris C. L. Koch 1850 = Eresus cinnaberinus illustris (C. L. Koch) 1838
„ pharaonis Simon 1864 = Eresus pharaonis Waldkenaer 1837
„ punicea Simon 1864 = Eresus walckenaeri Brullé 1832
„ 4-guttatus C. L. Koch 1850 = Eresus cinnaberinus (Olivier) 1789

Escambia:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Corythalia**

Ethilla:
„ variegata Simon 1874 = Heteropoda variegata (Simon) 1874

Euarcha:
„ jucunda Kulczynski 1911 = Evarcha jucunda (Lucas) 1846

Eucharia (= Euchiarium):
„ albomaculata Menge 1869 = Lithyphantes albomaculatus (De Geer) 1778
„ ampullaceum Simon 1864 = Linyphia pusilla Sundevall 1830
„ argus Simon 1864 = Crustulina guttata (Wider) 1834
„ atrica C. L. Koch 1845 = Zygiella calophylla (Walckenaer) 1802
„ bimaculata Menge 1869 = nicht zu deuten!
„ bipunctata C. L. Koch 1845, Ohlert 1867, Menge 1869 = Steatoda bipunctata (Linné) 1758
„ bracatum Simon 1864 = Dipoena braccata (C. L. Koch) 1841
„ castanea C. L. Koch 1845, Menge 1869 = Teutana castanea (Clerck) 1757
„ castaneum Simon 1864 = Teutana castanea (Clerck) 1757
„ civile Simon 1864 = Dictyna civica (Lucas) 1850
„ coracinum Simon 1864 = Dipoena coracina (C. L. Koch) 1837
„ corollata C. L. Koch 1837 = Lithyphantes albomaculatus (De Geer) 1778
„ erythropum Simon 1864 = Crustulina erythropus (Lucas) 1846
„ hera C. L. Koch 1836 = Teutana castanea (Clerck) 1757
„ luctuosum Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ obscurum Simon 1864 = Titanoeca quadriguttata (Hahn) 1831
„ punctatum Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ quadripunctatum Simon 1864, Menge 1850 = Steatoda bipunctata (Linné) 1758
„ rufithorax Simon 1864 = Pachygnatha degeerii Sundevall 1829
„ sexalbomaculatum Simon 1864 = Euryopis albomaculata (Lucas) 1846
„ thoracica Menge 1850 = Enoplognatha thoracica (Hahn) 1831
„ triangulifer Simon 1864 = Teutana triangulosa (Walckenaer) 1802
„ triste Simon 1864 = Dipoena tristis (Hahn) 1831
„ urticae Simon 1864 = Theridion lunatum (Olivier) 1789

Eucta:
„ caudata Banks 1893, Comstock 1912 = Tetragnatha lacerta Walckenaer 1841
„ filum Simon 1895 = Tetragnatha filum (Simon) 1907
„ gallica Simon 1881, 1894 = Eucta isidis (Simon) 1880
„ lutescens Lendl 1886, Simon 1894, Chyzer & Kulczynski 1894 = Eucta isidis (Simon) 1880
„ vermiformis Simon 1914 = Tetragnatha vermiformis Emerton 1884

Euctimena:
„ tibialis Rainbow 1914 = Atrax tibialis (Rainbow) 1914

Eucyrtops:
„ latior Pocock 1897 = Aganippe latior Cambridge 1877

Euetria:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Cyrtophora**
„ salebrosa Thorell 1890 = Cyrtophora cicatrosa (Stoliczka) 1869

Eugnatha:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Tetragnatha**
„ caudicola Karsch 1879 = Eucta caudicola (Karsch) 1879
„ cylindracea Keyserling 1887 = Tetragnatha cylindrica Walckenaer 1841
„ gracilis Cambridge 1889 = Tetragnatha cambridgei Roewer 1942
„ isidis Simon 1880 = Eucta isidis (Simon) 1880
„ pallida Mc Cook 1893, Banks 1898 = Tetragnatha pallescens F. Cambridge 1903
„ pallidula Banks 1910 = Tetragnatha pallescens F. Cambridge 1903
„ picta Lendl 1886 = Tetragnatha pinicola L. Koch 1870

Eulabes:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Simaetha**
„ fissidens Keyserling 1882 = Simaetha thoracica Thorell 1881
„ tenuior Keyserling 1882 = Simaethula tenuior (Keyserling) 1882
Eunesiotes:
„ jenningsi Rainbow 1899 = Poecilopachys jenningsi (Rainbow) 1899
Euophrys (= Evophrys):
„ agilis Simon 1864 = Pseudeuophrys callida (Walckenaer) 1802
„ amabilis C. L. Koch 1846 = Evarcha amabilis (C. L. Koch) 1846
„ aprica C. L. Koch 1848 = Phlegra fasciata (Hahn) 1826
„ arcigera Pavesi 1878 = Pallenes arcigerus (Walckenaer) 1837
„ arcuata C. L. Koch 1848 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
„ atellana C. L. Koch 1848 = ? Sitticus caricis (Westring) 1862
„ bacelari Schenkel 1938 = ? Pseudicius pictilis (Simon) 1871
„ barbipes Canestrini & Pavesi 1868 = Saitis barbipes (Simon) 1868
„ bella C. L. Koch 1846 = Freya bella (C. L. Koch) 1846
„ bicolor Simon 1864 = Carrhotus xanthogramma (Walckenaer) 1825
„ brevipes C. L. Koch 1837 = Ballus chalybeius (Walckenaer) 1802
„ callida Simon 1864 = Pseudeuophrys callida (Walckenaer) 1802
„ calva Pavesi 1867 = Pellenes laevigatus (Simon) 1868
„ cinerea Ausserer 1867 = Attulus helveolus (Simon) 1871
„ comptula Simon 1876 = Euophrys rufibarbis comptula (Simon) 1871
„ comta C. L. Koch 1846 = Freya comta (C. L. Koch) 1846
„ concolor Caporiacco 1935 = Euophrys concolorata Roewer 1951
„ confusa Kulczynski 1891 = Euophrys obsoleta (Simon) 1868
„ coronata Simon 1864 = Evarcha flammata (Clerck) 1757
„ coronigera C. L. Koch 1846 = Phiale coronigera (C. L. Koch) 1846
„ crucifera C. L. Koch 1837, Ohlert 1867 = Pellenes tripunctatus (Walckenaer) 1802
„ declivis Karsch 1879 = nicht zu deuten!
„ decorata C. L. Koch 1846 = Freya decorata (C. L. Koch) 1846
„ delibuta L. Koch 1865 = Plexippus paykullii (Audouin) 1827
„ deyrollei Karsch 1879 = Hyllus deyrollei (Lucas) 1858
„ difficilis Simon 1876, 1937 = Pseudeuophrys difficilis (Simon) 1868
„ erratica Simon 1876, 1901, 1937, Becker 1882, Bösenberg 1903, Lessert 1910 = Pseudeuophrys callida (Walckenaer) 1802
„ falcata C. L. Koch 1837, 1848, Ohlert 1867 = Evarcha flammata (Clerck) 1751
„ farinosa C. L. Koch 1846 = Evarcha arcuta (Clerck) 1757
„ festiva C. L. Koch 1834 = Aelurillus festivus (C. L. Koch) 1834
„ finitima Simon 1876, Chyzer & Kulczynski 1891, Lessert 1910 = Pseudeuophrys vafra (Blackwall) 1867
„ floricola C. L. Koch 1837, 1848 = Sitticus littoralis (Hahn) 1831
„ frontalis C. L. Koch 1834 et sequ. = Euophrys maculata (Wider) 1834
„ frontalis L. Koch 1877 = Neon reticulatus (Blackwall) 1853
„ giebelii Thorell 1890 = nicht zu deuten!
„ gracilis Simon 1864 = Pseudeuophrys callida (Walckenaer) 1802
„ gesticulator Simon 1864 = Aelurillus gesticulator (Lucas) 1846
„ hamata C. L. Koch 1846 = nicht zu deuten!
„ hastigera C. L. Koch 1846 = Phiale hastigera (C. L. Koch) 1846
„ humilis C. L. Koch 1846 = nicht zu deuten!
„ insignita Ausserer 1867 = Aelurillus litera v-insignitus (Clerck) 1757
„ jucunda C. L. Koch 1846 = Phiale jucunda (C. L. Koch) 1846
„ kulczynskii Thorell 1890 = nicht zu deuten!
„ laetabunda C. L. Koch 1848, Simon 1864 = Evarcha laetabunda (C. L. Koch) 1848
„ latefasciata Simon 1877 = Pselcis latefasciatus (Simon) 1877
„ latipes C. L. Koch 1846 = Corythalia latipes (C. L. Koch) 1846
„ leucophaea C. L. Koch 1846, Hasselt 1887 = Evarcha leuciphaea (C. L. Koch) 1846

Euophrys (Forts.):
- „ limbata Canestrini & Pavesi 1868 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
- „ linea Karsch 1879 = Jotus lineus (Karsch) 1879
- „ lineata C. L. Koch 1848 = Phlegra lineata (C. L. Koch) 1848
- „ longipalpis Simon 1888 = Penionomus longipalpis (Simon) 1888
- „ lundbladii Schenkel 1938 = ? Pseudicius difficilis (Simon) 1868
- „ lunulata Simon 1864 = Dendryphantes hastatus (Clerck) 1757
- „ molesta Cambridge 1913, Locket & Millidge 1951 = Euophrys aequipes (Cambridge) 1871
- „ morenensis Tullgren 1905 = Tullgrenella morenensis (Tullgren) 1905
- „ obscura Banks 1896 = Euophrys banksi Roewer 1951
- „ obscurofemorata Keyserling 1883 = Pystira obscurofemorata (Keyserling) 1883
- „ obscuroides Canestrini & Pavesi 1868 = Ballus obscuroides (Canestrini & Pavesi) 1868
- „ ocellata Kroneberg 1875 = Cyrba algerina (Lucas) 1846
- „ offuscata C. L. Koch 1846 = Habrocestum pulex (Hentz) 1846
- „ paludicola C. L. Koch 1848 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
- „ petersii Karsch 1878 = Plexippus petersii (Karsch) 1878
- „ pictilis Simon 1876, 1937 = Pseudeuophrys pictilis (Simon) 1871
- „ pratincola C. L. Koch 1848 = Sitticus truncorum (Linné) 1758
- „ pratincola Ohlert 1867 = Sitticus littoralis (Hahn) 1831
- „ prompta Thorell 1873 = Marpissa pomatia (Walckenaer) 1802
- „ saxicola C. L. Koch 1848 = Sitticus littoralis (Hahn) 1831
- „ pulchella Nosek 1905 = Euophrys prinkipona Roewer 1951
- „ pygaea Thorell 1891, Workman 1896 = Irura pygaea (Thorell) 1891
- „ quinquepartita C. L. Koch 1837, 1848 ♂ = Aelurillus litera v-insignitus (Clerck) 1757
- „ quinquepartita C. L. Koch 1848 ♀ = Pellenes tripunctatus (Walckenaer) 1802
- „ radiata Ohlert 1865, 1867 = Marpissa radiata (Grube) 1859
- „ rapida C. L. Koch 1846 = Phiale rapida (C. L. Koch) 1846
- „ reticulata Menge 1879, Dahl 1883 = Neon reticulatus (Blackwall) 1853
- „ rupicola C. L. Koch 1837, 1848 = Sitticus rupicola (C. L. Koch) 1837
- „ saxicola C. L. Koch 1848 = Sitticus littoralis (Hahn) 1831
- „ semiargentea Simon 1877 = Panysinus semiargenteus (Simon) 1877
- „ striata C. L. Koch 1848 = Aelurillus festivus (C. L. Koch) 1834
- „ striata Ohlert 1867 = Aelurillus litera v-insignitus (Clerck) 1757
- „ sublesta Kulczynski 1899 = Chalcoscirtus sublestus (Blackwall) 1867
- „ suralis C. L. Koch 1837 = Ballus chalybeius (Walckenaer) 1802
- „ terebrata C. L. Koch 1848 = Sitticus terebratus (Clerck) 1757
- „ tigrina C. L. Koch 1837, Ohlert 1867 et sequ. = Pseudeuophrys callida (Walckenaer) 1802
- „ triangulifera Simon 1876 = Pseudeuophrys bimaculata (Simon) 1868
- „ trifasciata C. L. Koch 1846, Penther 1900 = Freya decorata (C. L. Koch) 1846
- „ vafra Simon 1937 = Pseudeuophrys vafra (Blackwall) 1867
- „ vigorata C. L. Koch 1848, Simon 1864 = Menemerus semilimbatus (Hahn) 1829
- „ ysabali F. Cambridge 1901 = Euophrys ysobolii Peckham 1896

Eupalia:
- „ praemandibularis Simon 1903 = Eupalina praemandibularis (Hasselt) 1893
- „ rubra Simon 1899, 1903 = Eupalina praemandibularis (Hasselt) 1893

Euprosthenops:
- „ armatus Lessert 1916 = Euprosthenops lesserti Roewer 1954
- „ bayaonianus pedatus Strand 1913 = Euprosthenops pedatus (Strand) 1913
- „ proximus Schenkel 1936 = Euprosthenomma schenkeli Roewer 1954

Euryclubiona:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Clubiona**

Eurycorma:
- „ scutata Thorell 1868 = Hypognatha scutata (Perty) 1833

Eurymachus:
„ latus Keyserling 1880 = Gelanor latus (Keyserling) 1880
Euryopis
„ aenocincta Simon 1877 = Phylarchus aenocinctus (Simon) 1877
„ argenteomaculata Simon 1879, 1881 et sequ. = Euryopis quinqueguttata Thorell 1875
„ blackwallii Cambridge 1875 = Theridion blackwallii (Cambridge) 1870
„ braccata Becker 1881 = Dipoena braccata (C. L. Koch) 1841
„ elegans Keyserling 1890 = Phylarchus elegans (Keyserling) 1890
„ fusca Cambridge 1875 = Theridion fuscum Blackwall 1841
„ inornata Pavesi 1873 = Dipoena inornata (Cambridge) 1861
„ margaritata Simon 1881 = Euryopis margaritata (L. Koch) 1867
„ microthorax Lebert 1877 = Euryopis laeta (Westring) 1862
„ nigroreticulata Simon 1879 = Dipoena nigroreticulata (Simon) 1879
„ pilula Simon 1873 = Dipoena convexa (Blackwall) 1870
„ procax Simon 1879 = Dipoena procax (Simon) 1879
„ prona Cambridge 1881 = Dipoena prona (Menge) 1868
„ pyramidalis Simon 1879 = Theridion conigerum Simon 1914
„ quinquenotata Simon 1880 = Euryopis quinqueguttata Thorell 1875
„ sericata Simon 1879 = Dipoena sericata (Simon) 1879
„ tarsalis Pavesi 1875 = Euryopis acuminata tarsalis (Pavesi) 1875
„ tristis Menge 1868 = Dipoena tristis (Hahn) 1831
„ umbratilis Simon 1873 = Dipoena umbratilis (Simon) 1873
„ zimmermanni L. Koch 1875, Lessert 1910 = Euryopis laeta (Westring) 1862
Eurypelma:
„ campestratum Simon 1891 = Eupalaestrus campestratus (Simon) 1891
„ cancerides Ausserer 1871 = Phormictopus cancerides (Latreille) 1806
„ doeringii Holmberg 1881 = Euthycaelus doeringii (Holmberg) 1881
„ dupontii Becker 1879 = Eurypelma vagans Ausserer 1875
„ hentzi Simon 1890 = Dugesiella hentzi (Girard) 1854
„ ictericum Simon 1864 = Brachythele icterica (C. L. Koch) 1839
„ iheringii Keyserling 1891 = Grammostola iheringii (Keyserling) 1891
„ mollicomum Ausserer 1875, Keyserling 1891 = Grammostola mollicoma (Ausserer) 1875
„ mollicomum Simon 1892 = Eurypelma vitiosum Keyserling 1891
„ monstrosum C. L. Koch 1850 = Selenocosmia javanensis (Walckenaer) 1837
„ mordax Ausserer 1871 = Dugesiella hentzi (Girard) 1854
„ plumipes C. L. Koch 1850 = Tapinauchenius plumipes (C. L. Koch) 1842
„ pulchripes Simon 1891 = Grammostola pulchripes (Simon) 1891
„ rosea Ausserer 1871 = ? Grammostola spatulata (F. Cambridge) 1897
„ spatulata F. Cambridge 1897 = Grammostola spatulata (F. Cambridge) 1897
„ steindachneri Simon 1890 = Eurypelma californicum Ausserer 1871
„ striatipes Ausserer 1871 = Lasiodora striatipes (Ausserer) 1871
Eurysoma:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Paraplectana**
„ scutata C. L. Koch 1839, Keyserling 1879 = Hypognatha scutata (Perty) 1833
„ sexcuspidata C. L. Koch 1850 = Caerostris sexcuspidata (Fabricius) 1793
„ walleri Blackwall 1865 = Paraplectana walleri (Blackwall) 1865
„ walleri Bösenberg & Lenz 1895 = Paraplectana multimaculata Thorell 1899
Eusamuza:
Alle Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Gayenna**
Eusparassus:
„ argelasius Simon 1903, Roewer 1928 = Eusparassus dufouri Simon 1932
„ argelasius atlanticus Simon 1909 = Eusparassus dufouri atlanticus (Simon) 1909
„ argelasius kabylianus Denis 1937 = Eusparassus dufouri kabylianus (Denis) 1937
„ argelasius lamarcki Järvi 1914 = Olios lamarcki (Latreille) 1806

Eusparassus (Forts.):
„ argelasius maximus Strand 1906, 1908 = Eusparassus dufouri maximus Strand 1906
„ argelasius oraniensis Strand 1908, Simon 1909 = Eusparassus dufouri oraniensis (Lucas) 1846
„ argelasius syrticus Simon 1909 = Eusparassus dufouri syrticus (Simon) 1909
„ chiracanthiformis Strand 1906, 1908 = Oilios chiracanthiformis (Strand) 1906

Eustala:
„ procurva Franganillo 1936 = nicht zu deuten!
„ variolata Simon 1897 = Eriophora edax (Blackwall) 1863

Eustichothrix:
„ obscurus Dahl 1886 = Cnephalocotes obscurus (Blackwall) 1834
„ sanguinolentus Dahl 1886 = Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer) 1841

Eustirognathus:
„ oscitans Pocock 1898 = Carrhotus oscitans (Pocock) 1898

Eustiromastix:
„ haytiensis Petrunkevitch 1911 = Compsodecta haytiensis (Banks) 1903
„ obscurus Mello-Leitao 1942 = Eustiromastix parobscurus Roewer 1951

Eutichides siehe **Eutychides:**

Eutichurus:
„ insulanus Banks 1902 = Paratheuma insulana (Banks) 1902
„ montanus Simon 1897, Mello-Leitao 1926 = Eutichurus monticola Roewer 1951

Eutittha:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Cheiracanthium**

Eutychides (= Eutichides):
„ arizonica Gertsch & Ivie 1936 = Actinoxia arizonica (Gertsch & Ivie) 1936
„ versicolor Smith 1908 = Actinoxia versicolor Simon 1890

Eutychuroides:
„ fusca Petrunkevitch 1926 = Teminius insularis Keyserling 1887

Evagrus:
„ caffer Pocock 1902 = Allothele caffer (Pocock) 1902
„ caffer australis Hewitt 1919 = Allothele caffer australis (Hewitt) 1919
„ mexicanus Simon 1892 = Euagrus mexicanus Ausserer 1875

Evansia:
„ subcoronata Simon 1926 = Evansia subrostrata (Cambridge) 1873

Evarcha:
„ blancardi Smith 1908, Dahl 1926, Reimoser 1930, Tullgren 1944 = Evarcha flammata (Clerck) 1757
„ blancardi Bryant 1941 = Evarcha leucophaea (C. L. Koch) 1846
„ falcata Lessert 1910, Palmgren 1943 = Evarcha flammata (Clerck) 1757
„ hoyi Simon 1903, Petrunkevitch 1911 = Evarcha leucophaea (C. L. Koch) 1846
„ marcgravii Dahl 1926, Tullgren 1944 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
„ napoleon Karsch 1873 = Evarcha flammata (Clerck) 1757

Evenus:
„ tener Simon 1877 = Viciria tenera (Simon) 1877

Evetria:
„ sellata Simon 1895 = Cyrtophora sellata Simon 1895

Evippa:
„ aculeata Simon 1895 = Evippa kronebergi **nom. nov.**
„ crista Simon 1910 = Evippomma cristata (Simon) 1910

Evophrys siehe **Euophrys**

Exechophysis:
„ nigriceps Banks 1905 = Floricomus nigriceps (Banks) 1905
„ palustris Banks 1905 = Floricomus plumalis (Crosby) 1905
„ plumalis Crosby 1905 = Floricomus plumalis (Crosby) 1905

Faiditus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Theridion**
Falconeria:
„ cornuta Smith 1904 = Hypomma cornutum (Blackwall) 1833
Favilla:
„ relata Cambridge 1895 = Eucteniza relata (Cambridge) 1895
Filistata:
„ atra Wider 1834 = Zelotes subterraneus (C. L. Koch) 1833
„ bicolor Latreille 1817, Walckenaer 1837, Lucas 1846 = Filistata insidiatrix (Forskal) 1775
„ bicolor Taczanowski 1873 = Filistata hibernalis Hentz 1842
„ capillosa Cambridge 1899 = Filistata tractans Cambridge 1896
„ capitata Hentz 1847 et sequ. = Filistata hibernalis Hentz 1842
„ crassipalpus Gertsch 1935 = Filistatinella crassipalpus (Gertsch) 1935
„ cubaecola Lucas 1857 = Filistata hibernalis Hentz 1842
„ depressa Blackwall 1868 = Filistata hibernalis Hentz 1842
„ distincta Blackwall 1867 = Filistata hibernalis Hentz 1842
„ dubia Wider 1834 = nicht zu deuten!
„ femoralis Wider 1834 = Gnaphosa bicolor (Hahn) 1831
„ incerta Wider 1834 = Drassodes lapidosus (Walckenaer) 1802
„ maculata Wider 1834 = Callilepis nocturna (Linné) 1758
„ oceana Marx 1889 = nom. nud.
„ patagonica Mello-Leitao 1938 = Malalistata patagonica (Mello-Leitao) 1938
„ seclusa Caporiacco 1934 = Filistata reclusa Cambridge 1885
„ sericea Wider 1834 = Scotophaeus quadripunctatus (Linné) 1758
„ tambilloi Mello-Leitao 1941 = Pikeliana tambilloi (Mello-Leitao) 1941
„ testacea Latreille 1810, Simon 1890 = Filistata insidiatrix (Forskal) 1775
„ tractans Cambridge 1899 = Filistata hibernalis Hentz 1842
„ truncata Risso 1826 = nicht zu deuten!
Filistatoides:
„ insignis Cambridge 1899, Bryant 1940 = Filistata insignis (Cambridge) 1896
Firmicus:
„ dewitzi Simon 1895 = Synema multipunctatum dewitzi (Simon) 1899
„ lentiginosus Lessert 1943 = Synema lentiginosum (Simon) 1886
„ multipunctatus Simon 1895 = Synema multipunctatum (Simon) 1895
„ quadrinotatus Simon 1895, Caporiacco 1947 = Firmicus bragantinus (Brito Capello) 1866
Flacilla:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Flacillulus**
Floricomus:
„ floricomus Crosby & Bishop 1925 = Floricomus rostratus (Emerton) 1883
Floronia:
„ adstricta Banks 1898 = Linyphia adstricta (Keyserling) 1886
„ coccinea Banks 1903 = Linyphia coccinea (Keyserling) 1886
„ conferta Banks 1893 = Linyphia maculata Emerton 1908
„ frenata Chyzer & Kulczynski, Dahl 1912, Roewer 1942 = jetzt: Floronia bucculenta (Clerck) 1757
Formicina:
„ eleonorae Costa 1883 = Cresmatoneta eleonorae (Costa) 1883
„ mutinensis Canestrini 1868 et sequ. = Cresmatoneta mutinensis (Canestrini) 1868
„ pallida Canestrini 1868 = Cresmatoneta mutinensis (Canestrini) 1868
Formicinina:
„ mutinensis Strand 1932 = Cresmatoneta mutinensis (Canestrini) 1868
Freya:
„ ambigua C. L. Koch 1860, Simon 1864 = Euophrys ambigua C. L. Koch 1846
„ bilobata Petrunkevitch 1911 et sequ. = Phiale bilobata (F. Cambridge) 1901
„ compta Simon 1903 = Freya comta (C. L. Koch) 1846

Freya (Forts.):
„ distincta Petrunkevitch 1925 = Freya grisea (F. Cambridge) 1901
„ jucunda C. L. Koch 1850, Simon 1864 = Phiale jucunda (C. L. Koch) 1846
„ nannispina Chamberlin & Ivie 1936 = Phiale dybowskii (Taczanowski) 1871
„ sagittifer Chamberlin & Ivie 1936 = Freya frontalis Banks 1929
„ serrapophysis Chamberlin & Ivie 1936 = Corythalia serrapophysis (Chamberlin & Ivie) 1936
„ trifasciata Dyal 1935 = Freya dyali (Roewer) 1951
„ uncinella Chamberlin & Ivie 1936 = Freya bifurcata (F. Cambridge) 1901

Frigga:
„ coronigera C. L. Koch 1850, Simon 1864 = Phiale coronigera (C. L. Koch) 1846
„ hamata C. L. Koch 1850 = nicht zu deuten!
„ hastigera C. L. Koch 1850, Simon 1864 = Phiale hastigera (C. L. Koch) 1846
„ leucophaea C. L. Koch 1850, Simon 1864 = Evarcha leucophaea (C. L. Koch) 1846

Fritzia:
„ muelleri Cambridge 1879, Simon 1903 = nicht zu deuten!

Frontina:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Linyphia**
„ bucculenta Simon 1884 = Floronia frenata (Wider) 1834, jetzt: Floronia bucculenta (Clerck) 1757
„ phoenicea Cambridge 1894 = Sthelota phoenicea (Cambridge) 1894

Frontinella:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Linyphia**

Fuentes:
„ punctatus Banks 1929 = Breda punctata (Peckham) 1894
„ vittatus Banks 1901 = Menemerus vittatus (Banks) 1901

Galena:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Gelanor**
„ dicta Taczanowski 1874 = Gelanor zonatus (C. L. Koch) 1845

Gamasomorpha:
„ hypericon Simon 1890 = Xestaspis nitida Simon 1884
„ loricata Simon 1884, Bösenberg 1902 = Dysderina loricatula Roewer 1942
„ nigra Simon 1893 = nom. nud.

Ganesa:
„ workmannii Peckham 1885. 1886 = Goleta workmannii (Peckham) 1885

Gasteracantha:
„ abyssinica Strand 1907, Caporiacco 1910 = Gasteracantha sanguinolenta C. L. Koch 1845
„ alba Vinson 1863 = Gasteracantha mammosa C. L. Koch 1845
„ albertisii Thorell 1881 = Gasteracantha taeniata (Walckenaer) 1841
„ albiventer Butler 1873 = Gasteracantha taeniata (Walckenaer) 1841
„ analispina Strand 1911, 1914 = Gasteracantha taeniata (Walckenaer) 1841
„ annamita Simon 1886 = Gasteracantha kuhlii C. L. Koch 1838
„ annulipes C. L. Koch 1845 = Gasteracantha kuhlii C. L. Koch 1838
„ anomala Taczanowski 1879 = Enacrosoma anomala (Taczanowski) 1879
„ aruana Thorell 1881, Strand 1911 = Gasteracantha theisi Guérin 1838
„ beccarii Hasselt 1882 = Gasteracantha arcuata (Fabricius) 1793
„ biolleyi Banks 1905 = Gasteracantha cancriformis Linné 1758
„ blackwalli Keyserling 1863 = Gasteracantha hasseltii C. L. Koch 1838
„ bleekeri Thorell 1878 = Gasteracantha audouini Guérin 1838
„ borbonica Vinson 1863 = Gasteracantha mammosa C. L. Koch 1845
„ bouchardi Simon 1903 = Gasteracantha diardi (Lucas) 1835
„ bradleyi Thorell 1881 = Gasteracantha fornicata (Fabricius) 1793
„ bradleyi Strand 1911, 1914 = Gasteracantha taeniata (Walckenaer) 1841
„ brevispina Thorell 1878, Workman 1896, Pocock 1900 = Gasteracantha mammosa C. L. Koch 1845

Gasteracantha (Forts.):

„ brevispina camerunensis Thorell 1899 = Gasteracantha batesi Pocock 1899
„ bruijnii Thorell 1881 = Gasteracantha lunata Guérin 1830
„ butleri Simon 1877, Strand 1911, 1914 = Gasteracantha rubrospinis Guérin 1838
„ caduceator Nicolet 1849 = Ulesanis scutula (Nicolet) 1849
„ callida Cambridge 1879 = Gasteracantha cancriformis Linné 1758
„ canestrinii Cambridge 1879, F. Cambridge 1901 = Gasteracantha tetracantha (Linné) 1767
„ canningensis Stoliczka 1869 = Gasteracantha mammosa C. L. Koch 1845
„ chaperi Simon 1887 = Gasteracantha linnaei (Walckenaer) 1841
„ cicatrella Strand 1907 = Gasteracantha tabulata Thorell 1859
„ circummotata Simon 1877, Pocock 1897 = Gasteracantha rubrospinis Guérin 1838
„ claveata Cambridge 1879, Pocock 1897 = Gasteracantha clavatrix (Walckenaer) 1841
„ columbiae Giebel 1863 = Gasteracantha cancriformis Linné 1758
„ columnata Nicolet 1849 = Ulesanis scutula (Nicolet) 1849
„ confluxa Karsch 1884 = Gasteracantha sanguinolenta C. L. Koch 1845
„ connata Butler 1873 = Gasteracantha geminata (Fabricius) 1798
„ connata Simon 1895 = Gasteracantha simoni Cambridge 1879
„ consanguinea Butler 1873 = Gasteracantha diardi (Lucas) 1835
„ crepidophora Cambridge 1879, Kulczynski 1911 = Gasteracantha crucigera Bradley 1877
„ curvicauda Hasselt 1882 = Gasteracantha arcuata (Fabricius) 1793
„ dahomensis Karsch 1884 = Gasteracantha curvispina Guérin 1837
„ diadesmia Thorell 1887 = Gasteracantha panisicea Butler 1873
„ discallina Butler 1873 = Gasteracantha diardi (Lucas) 1835
„ doleschalli Simon 1877 = Gasteracantha lepeletieri Guérin 1825
„ elliptica Getaz 1893 = Gasteracantha cancriformis Linné 1758
„ ensifera Thorell 1859, 1868 = Gasteracantha sanguinolenta C. L. Koch 1845
„ fabricii Simon 1899 = Gasteracantha arcuata (Fabricius) 1793
„ falcifera C. L. Koch 1845, Simon 1877 = Gasteracantha hecata (Walckenaer) 1841
„ falciformis Simon 1895 = Gasteracantha falcicornis Butler 1873
„ feisthameli Guérin 1839 = Hypognatha scutata (Perty) 1833
„ flavida Hasselt 1882 = Gasteracantha mammosa C. L. Koch 1845
„ flavomaculata Keyserling 1865, 1886 = Gasteracantha minax Thorell 1859
„ flebilis Cambridge 1879 = Gasteracantha frontata (Blackwall) 1864
„ formosa Vinson 1863, Cambridge 1879, Pocock 1899 = Gasteracantha versicolor (Walckenaer) 1841
„ formosa thorelli Strand 1907 = Gasteracantha thorellii Keyserling 1863
„ fornicata C. L. Koch 1838, Thorell 1890, Simon 1901, Strand 1907 = Gasteracantha diardi (Lucas) 1835
„ fornicata hundshageni Strand 1907 = Gasteracantha doriae Simon 1877
„ fornicata jalorensis Simon 1901 = Gasteracantha diardi (Lucas) 1835
„ fragispina Keyserling 1886 = Gasteracantha lunata Guérin 1830
„ fumosa Nicolet 1849 = Glyptogona fumosa (Nicolet) 1849
„ gayi Nicolet 1849 = Glyptogona gayi (Nicolet) 1849
„ guttata Thorell 1859, 1868 = Gasteracantha mammosa C. L. Koch 1845
„ harpax Cambridge 1879 = Gasteracantha doriae Simon 1877
„ hebridisia Butler 1873, Simon 1897 = Gasteracantha taeniata (Walckenaer) 1841
„ helva Blackwall 1864, Cambridge 1879 = Gasteracantha hasseltii C. L. Koch 1838
„ hemisphaerica C. L. Koch 1845 = Paraplectana hemisphaerica (C. L. Koch) 1845
„ hepatica L. Koch 1871, Karsch 1878 = Gasteracantha hasseltii C. L. Koch 1838
„ hexacantha C. L. Koch 1838, Walckenaer 1841, Keyserling 1892 = Gasteracantha servillei (Guérin) 1825
„ hilaris Thorell 1859, 1868 = Gasteracantha tetracantha Linné 1767

Gasteracantha (Forts.):

- „ hildebrandti Strand 1908, Caporiacco 1940 = Gasteracantha cicatrosa C. L. Koch 1845
- „ horrens Thorell 1859, 1868 = Gasteracantha hasseltii C. L. Koch 1838
- „ inflata Nicolet 1849 = Ulesanis scutula (Nicolet) 1849
- „ insulana Thorell 1859, 1868, Butler 1873, 1877 = Gasteracantha servillei (Guérin) 1825
- „ impotens Gerstäcker 1873 = Gasteracantha versicolor (Waldkenaer) 1841
- „ karschii Thorell 1887 = Gasteracantha taeniata (Waldkenaer) 1841
- „ kibonotensis Tullgren 1910 = Gasteracantha tabulata Thorell 1859
- „ kochii Butler 1873, F. Cambridge 1901 (part.), 1904, Strand 1915 = Gasteracantha servillei (Guérin) 1825
- „ kochii Cambridge 1901 (part.) = Gasteracantha cancriformis Linné 1758
- „ kulczynskii Strand 1906 = Gasteracantha doriae Simon 1877
- „ laeta Fauvel 1865 = Gasteracantha westringii Keyserling 1863
- „ laeviuscula Strand 1907 = Gasteracantha lunata Guérin 1830
- „ lepida Cambridge 1870, Simon 1890, Strand 1915 = Gasteracantha sanguinolenta C. L. Koch 1845
- „ leucomelas Simon 1904 et sequ. = Gasteracantha kuhlii C. L. Koch 1838
- „ leucomelena Thorell 1887, 1890, Pocock 1900 = Gasteracantha kuhlii C. L. Koch 1838
- „ lugubris L. Koch 1871 = Gasteracantha astrigera L. Koch 1871
- „ macrura Pocock 1898 = Gasteracantha sanguinolenta C. L. Koch 1845
- „ maculata Nicolet 1849 = Ulesanis scutula (Nicolet) 1849
- „ maculosa Lenz 1886 = Gasteracantha reuteri Lenz 1886
- „ madagascariensis Vinson 1863, Cambridge 1879, Strand 1907 = Gasteracantha sanguinolenta C. L. Koch 1845
- „ mahurica Strand 1913 = Gasteracantha pentagona (Waldkenaer) 1841
- „ malayensis Hasselt 1882 = Gasteracantha mengei Keyserling 1863
- „ mammeata Thorell 1859, 1868 = Gasteracantha mammosa C. L. Koch 1845
- „ marsdeni Simon 1903, Strand 1907 = Gasteracantha diardi (Lucas) 1835
- „ mastoidea L. Koch 1871 = Gasteracantha mammosa C. L. Koch 1845
- „ maura Mc Cook 1893 = Gasteracantha cancriformis Linné 1758
- „ maurita Vinson 1863 = Gasteracantha rhomboidea Guérin 1838
- „ mediofusca Merian 1911 = Gasteracantha mammosa C. L. Koch 1845
- „ melanostica Kulczynski 1911 = Gasteracantha crucigera Bradley 1877
- „ milvoides Butler 1873 = Gasteracantha versicolor (Waldkenaer) 1841
- „ minahassae Merian 1911 = Gasteracantha irradiata (Waldkenaer) 1841
- „ minuta Nicolet 1849 = Ulesanis scutula (Nicolet) 1849
- „ modesta Thorell 1859, 1868 = Gasteracantha tabulata Thorell 1859
- „ moesta Thorell 1859, 1868 = Gasteracantha tetracantha Linné 1767
- „ molesta Cambridge 1879 = Gasteracantha importuna Cambridge 1879
- „ mollusca L. Koch 1871 = Gasteracantha westringii Keyserling 1863
- „ mollusca Keyserling 1886 = Gasteracantha signifera Pocock 1898
- „ mombensis Tullgren 1910 = Gasteracantha tabulata Thorell 1859
- „ montana Thorell 1890 = Gasteracantha diardi (Lucas) 1835
- „ nana Butler 1873, Simon 1907 = Gasteracantha sanguinolenta C. L. Koch 1845
- „ nebulosa Butler 1873 = Gasteracantha transversa C. L. Koch 1838
- „ nigrisparsa Butler 1873 = Gasteracantha clavigera Giebel 1863
- „ nigristernis Simon 1899 = Gasteracantha sturii (Doleschall) 1857
- „ nordviei Strand 1913 = Gasteracantha simoni Cambridge 1879
- „ obliqua C. L. Koch 1845 = Gasteracantha diardi (Lucas) 1835
- „ observatrix Cambridge 1879 = Gasteracantha mammosa C. L. Koch 1845
- „ ocillatum Urquhart 1888 = Gasteracantha westringii Keyserling 1863
- „ oldendorffii Holmberg 1876 = Gasteracantha cancriformis Linné 1758
- „ ornata Thorell 1859, 1868 = Gasteracantha sanguinolenta C. L. Koch 1845
- „ pallida C. L. Koch 1845, Mc Cook 1893 = Gasteracantha tetracantha (Linné) 1767
- „ pallida Nicolet 1849 = Glyptogona nicoleti Roewer 1942

Gasteracantha (Forts.):

„ papuana Thorell 1881 = Gasteracantha quadrispinosa Cambridge 1879
„ parvula Thorell 1859, 1868 = Gasteracantha hasseltii C. L. Koch 1838
„ pavesi Cambridge 1879 = Gasteracantha diardi (Lucas) 1835
„ peccans Cambridge 1879 = Gasteracantha rhomboidea Guérin 1838
„ pennata Nicolet 1849 = Glyptogona pennata (Nicolet) 1849
„ perakensis Simon 1901 = Gasteracantha hasseltii C. L. Koch 1838
„ petersii Karsch 1878 = Gasteracantha falcicornis Butler 1873
„ picea C. L. Koch 1846 = Gasteracantha servillei (Guérin) 1828
„ pictospina Hasselt 1882 = Gasteracantha hasseltii C. L. Koch 1838
„ porcellanea Nicolet 1849 = Ulesanis scutula (Nicolet) 1849
„ praetexta helva Merian 1911 = Gasteracantha lepeltierii (Guérin) 1825
„ preciosa Mc Cook 1893 = Gasteracantha tetracantha Linné 1767
„ proba Cambridge 1879 = Gasteracantha cicatrosa C. L. Koch 1845
„ proboscidea Taczanowski 1879 = Gasteracantha cancriformis (Linné) 1758
„ propinqua Cambridge 1879 = Gasteracantha hasseltii C. L. Koch 1838
„ pseudoflava Simon 1877, 1895, Thorell 1878 = Gasteracantha audouini Guérin 1838
„ punctata Nicolet 1849 = Ulesanis scutula (Nicolet) 1849
„ purpurea Simon 1884 = Gasteracantha mucronata (Waldkenaer) 1841
„ pygmaea Bösenberg & Lenz 1895 = Gasteracantha cicatrosa C. L. Koch 1845
„ quadridens C. L. Koch 1845 = Gasteracantha servillei (Guérin) 1825
„ quadrispina Lamb 1911 = Gasteracantha quadrispinosa Cambridge 1879
„ radiata Gerstäcker 1873, Simon 1890 = Gasteracantha sanguinolenta C. L. Koch 1845
„ raimondii Taczanowski 1879 = Gasteracantha cancriformis Linné 1758
„ relegata Simon 1877 = Gasteracantha taeniata (Waldkenaer) 1841
„ resupinata Gerstäcker 1873 = Gasteracantha falcicornis Butler 1873
„ retracta Butler 1873 = Gasteracantha curvispina (Guérin) 1837
„ retrorsa Thorell 1881 = Gasteracantha audouini Guérin 1838
„ rimata Cambridge 1879 = Gasteracantha geminata (Fabricius) 1798
„ rogersi Cambridge 1879 = ? Gasteracantha testudinaria Simon 1901
„ rubiginosa C. L. Koch 1845 = Gasteracantha cancriformis Linné 1758
„ rufospinosa Marx 1883 = Gasteracantha cancriformis Linné 1758
„ sanguinipes Strand 1906, 1907, 1908 = Gasteracantha cicatrosa C. L. Koch 1845
„ scapha Gerstäcker 1873 = Gasteracantha versicolor (Waldkenaer) 1841
„ schweinfurthi Simon 1890 = Gasteracantha sanguinolenta C. L. Koch 1845
„ scitula Nicolet 1849 = Ulesanis scutula (Nicolet) 1849
„ scoparia Simon 1877, 1895 = Gasteracantha clavigera Giebel 1863
„ scutula Nicolet 1849 = Ulesanis scutula (Nicolet) 1849
„ semiflava Simon 1895 = Gasteracantha mucronata (Waldkenaer) 1841
„ sexcuspidata C. L. Koch 1838 = Caerostris sexcuspidata (Fabricius) 1793
„ similis Kulczynski 1911 = Gasteracantha crucigera Bradley 1877
„ simoni Keyserling 1886 = Gasteracantha rubrospinis Guérin 1838
„ spenceri Pocock 1900, Strand 1907 = Gasteracantha sanguinolenta C. L. Koch 1845
„ spissa Nicolet 1849 = Glyptogona spissa (Nicolet) 1849
„ strasseni Strand 1911, 1913 = Gasteracantha pentagona (Waldkenaer) 1841
„ sumatrana Butler 1873, Hasselt 18882 = Gasteracantha diardi (Lucas) 1835
„ suminata L. Koch 1871 = Gasteracantha mammosa C. L. Koch 1845
„ sylvestris Simon 1877 = Gasteracantha sacerdotalis L. Koch 1872
„ tenuiscapus Kulczynski 1911 = Gasteracantha crucigera Bradley 1877
„ ternatensis Thorell 1881 = Gasteracantha lunata Guérin 1830
„ tjibodensis Strand 1907 = Gasteracantha hasseltii C. L. Koch 1838
„ toxotes Gerstäcker 1873 = Gasteracantha falcicornis Butler 1873
„ trigona Giebel 1863 = nicht zu deuten!
„ tuberosa Thorell 1859, 1868 = Gasteracantha mucronata (Waldkenaer) 1841
„ turrigera L. Koch 1867 = Dolophones turrigera (L. Koch) 1867

Gasteracantha (Forts.):
„ umbrosa Nicolet 1849 = Glyptogona umbrosa (Nicolet) 1849
„ unguicornis Butler 1873 = Gasteracantha diardi (Lucas) 1835
„ vaccula Thorell 1859 = Gasteracantha curvispina (Guérin) 1837
„ varia Thorell 1859, 1868 = Gasteracantha diardi (Lucas) 1835
„ variabilis Nicolet 1849 = Glyptogona variabilis (Nicolet) 1849
„ variegata L. Koch 1871, Thorell 1881 = Gasteracantha fasciata Guérin 1838
„ velitaris C. L. Koch 1838 = Gasteracantha cancriformis (Linné) 1758
„ ventrosa Nicolet 1849 = Ulesanis scutula (Nicolet) 1849
„ venusta Nicolet 1849 = Ulesanis scutula (Nicolet) 1849
„ violenta L. Koch 1871 = Gasteracantha taeniata (Walckenaer) 1841
„ vittata Thorell 1859, 1868, 1890 = Gasteracantha irradiata (Walckenaer) 1841
„ vittata L. Koch 1871 = Gasteracantha fornicata (Fabricius) 1793
„ vittata Keyserling 1877 = Gasteracantha sanguinolenta C. L. Koch 1845
„ vittata longicornis Strand 1907 = Gasteracantha transversa C. L. Koch 1838
„ walckenaerii Lucas 1858 = Gasteracantha curvispina (Guérin) 1837
„ wallacei Thorell 1881 = Gasteracantha taeniata (Walckenaer) 1841
„ wealii Cambridge 1879 = Gasteracantha cicatrosa C. L. Koch 1845
„ wolfi Strand 1911, 1914 = Gasteracantha quadrispina Cambridge 1879
„ wogeonis Strand 1911, 1914 = Gasteracantha westringii Keyserling 1863

Gaucelmus:
„ augustinus Hewitt 1913 = Nesticus augustinus (Keyserling) 1884

Gauroclubiona:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Clubiona**

Gayenna:
„ alticola Mello-Leitao 1926 = Gayenna brasiliensis Roewer 1951
„ aperta Banks 1921 = Anyphaena aperta (Banks) 1921
„ calcarata Banks 1910 = Anyphaena pectorosa L. Koch 1866
„ californica Banks 1904 = Anyphaena californica (Banks) 1904
„ citrina Keyserling 1891 = Haptisus citrinus (L. Koch) 1866
„ fraterna Banks 1896 = Anyphaena fraterna (Banks) 1893
„ immanis Tullgren 1901, 1902 = Tomopisthes immanis Simon 1884
„ maculata Banks 1896, Bishop & Crosby 1926 = Anyphaena maculata (Banks) 1896
„ minuta Banks 1898 = Gayenna minutissima Petrunkevitch 1911
„ pacifica Banks 1896 = Anyphaena pacifica (Banks) 1896
„ parvula Banks 1899 = Anyphaena fragilis Banks 1897
„ pectorosa Bishop & Crosby 1926 = Anyphaena pectorosa L. Koch 1866
„ rosea Marx 1889 = nom. nud.
„ saltabunda Comstock 1912 = Anyphaenella saltabunda Hentz 1847
„ strigosa Tullgren 1901 = Tomopisthes strigosus (Tullgren) 1901
„ trilineata Tullgren 1901 = Tomopisthes backhauseni Simon 1895
„ varia Tullgren 1901, 1902 = Tomopisthes varius (Tullgren) 1901

Gea:
„ integra Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
„ partita Franganillo 1930 = nicht zu deuten!

Gelanor:
„ errans Cambridge 1902 = Gelanor distinctus Cambridge 1899
„ medius Cambridge 1899 = Gelanor mixtus Cambridge 1899

Gelotia:
„ bimaculata Thorell 1890, 1892 = Policha bimaculata Thorell 1892

Gelotopoeus:
„ scytodimorphus Karsch 1886, Simon 1895 = Platythomisus scytodimorphus (Karsch) 1886

Geodrassus:
„ auriculatus Chamberlin 1922 = Drassodes auriculoides Barrows 1919
„ auriculatus Kaston 1938 = Geodrassus gosiutus (Chamberlin) 1919

Geolycosa:
„ arenicola Montgomery 1904 part. = Scaptocosa missouriensis (Banks) 1895
„ arenicola Montgomery 1904 part., Petrunkevitch 1911 part. = Geolycosa turricola (Treat) 1880
„ arenicola Montgomery 1904 part., Petrunkevitch 1911 part., Kaston 1936 = Geolycosa pikei (Marx) 1881
„ arenicola Petrunkevitch 1911 part., Kaston 1938, 1948 = Geolycosa latifrons Montgomery 1904
„ baltimoriana Montgomery 1904 = Hogna baltimoriana (Keyserling) 1876
„ carolinensis Montgomery 1904 = Hogna carolinensis (Walckenaer) 1806
„ escambiensis Wallace 1942 = Scaptocosa escambiensis (Wallace) 1942
„ fatifera Bishop & Crosby 1926, Wallace 1942 = Scaptocosa fatifera (Hentz) 1842
„ fatifera Petrunkevitch 1911 part. = Geolycosa latifrons Montgomery 1904
„ fatifera Petrunkevitch 1911 part. = Geolycosa uinticolens (Chamberlin) 1930
„ fatifera Kurata 1939 = Scaptocosa missouriensis (Banks) 1895
„ gosoga Wallace 1942 = Scaptocosa gosoga (Chamberlin) 1925
„ hubbelli Wallace 1942 = Scaptocosa hubbelli (Wallace) 1942
„ micanopy Wallace 1942 = Scaptocosa micanopy (Wallace) 1942
„ missouriensis Banks 1932, Wallace 1942 = Scaptocosa missouriensis (Banks) 1895
„ nidifex Kaston 1938 = Geolycosa turricola (Treat) 1880
„ ornatipes Wallace 1942 = Scaptocosa ornatipes (Wallace) 1942
„ patellonigra Wallace 1942 = Scaptocosa patellonigra (Wallace) 1942
„ rafaelana Wallace 1942 = Scaptocosa rafaelana (Chamberlin) 1928
„ riograndae Wallace 1942 = Scaptocosa riograndae (Wallace) 1942
„ serranoi Mello-Leitao 1941 = Avicosa serranoi (Mello-Leitao) 1941
„ texana Montgomery 1904 = Hogna carolinensis (Walckenaer) 1805
„ wrightii Banks 1932 = Scaptocosa wrightii (Emerton) 1912

Geotrecha:
„ bivittata Emerton 1889, 1902 = Castianeira cingulata (C. L. Koch) 1842
„ crocata Emerton 1889, 1902 = Castianeira descripta (Hentz) 1847
„ pinnata Emerton 1889 = Castianeira longipalpus (Hentz) 1847

Gephyra:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Gephyrota**

Gephyrella:
„ violacea Mello-Leitao 1918, 1929 = Gephyrellula violacea (Mello-Leitao) 1918

Gephyrina:
„ mutilatus Mello-Leitao 1917 = Cleocnemis mutilatus (Mello-Leitao) 1917

Gerhardtia:
„ fischeri Dahl 1907 = Synema fischeri Dahl 1907
„ fuelleborni Dahl 1907 = Synema fuelleborni Dahl 1907

Gerrosoma:
„ papense (papuense) Bradley 1876 = Poltys papense (Bradley) 1876

Gippsicola:
„ raleighi Hogg 1900 = Segestria raleighi (Hogg) 1900

Glenognatha:
„ foxi Crosby & Bishop 1928 = Mimognatha foxi (Mc Cook) 1893

Glyptocranium:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Mastophora**
„ fagoides Vellard 1926 = Mastophora corpulenta (Banks) 1898

Glyptogona:
„ excelsa Simon 1889 = Araneus excelsus (Simon) 1889

Gnaphosa:
„ aethiopica L. Koch 1875 = Pterotricha aethiopica (L. Koch) 1875
„ americana Banks 1896 = Gnaphosa fontinalis Keyserling 1887
„ anglica Simon 1878, Cambridge 1879, 1881, Strand 1900 = Gnaphosa leporina (L. Koch) 1866

Gnaphosa (Forts.):

„ atramentaria Getaz 1889 = nicht zu deuten!
„ aussereri L. Koch 1872 = Nomisia aussereri (L. Koch) 1872
„ aussereri Pavesi 1875 = nicht zu deuten!
„ borealis Thorell 1875, Tullgren 1942 = Gnaphosa leporina (L. Koch) 1866
„ cambridgii Cambridge 1872 = Pterotricha cambridgii (Cambridge) 1872
„ cinerea Menge 1872, 1875, Dahl 1883 = Berlandina cinerea (Menge) 1872
„ cinereoplumosa Pavesi 1880 = Berlandina cinerea (Menge) 1872
„ conspersa Cambridge 1872 = Pterotricha conspersa (Cambridge) 1872
„ conspersa Thorell 1877, Emerton 1889, 1902 = Gnaphosa gigantea Keyserling 1887
„ corcyrea Cambridge 1874 = Berlandina corcyrea (Cambridge) 1874
„ excerpta Cambridge 1872 = Nomisia excerpta (Cambridge) 1872
„ exornata Thorell 1873 = Nomisia exornata (C. L. Koch) 1839
„ explicator Drenski 1929 = Gnaphosa explicatrix (Drenski) 1929
„ fumosa Westring 1862, Tullgren 1942 = nicht zu deuten!
„ fumosa Herman 1879 = Gnaphosa opaca Herman 1879
„ fumosa Calloni 1889 = nicht zu deuten!
„ fusca Herman 1879 = Gnaphosa opaca Herman 1879
„ gosoga Chamberlin & Gertsch 1928 = Cylphosa gosoga (Chamberlin & Gertsch) 1928
„ harpax Cambridge 1874 = Nomisia harpax (Cambridge) 1874
„ helvetica Simon 1878 = Gnaphosa leporina (L. Koch) 1866
„ hospitalis Simon 1878 = Gnaphosa petrobia L. Koch 1872
„ humilis Banks 1892 = Gnaphosa brumalis Thorell 1875
„ humilis Holm 1939 = Gnaphosa holmi Lohmander 1942
„ islandica Soerensen 1898, Schenkel 1931, Braendegaard 1946 = Gnaphosa lapponum (L. Koch) 1866
„ jucunda Thorell 1875 = Pterotricha jucunda (Thorell) 1875
„ kochii Cambridge 1872 = Pterotricha kochii (Cambridge) 1872
„ krogerusi Schenkel 1934, Palmgren 1943 = Gnaphosa nigerrima L. Koch 1877
„ kulczynskii Damin 1896 = Gnaphosa alacris Simon 1878
„ lentiginosa Thorell 1875 = Pterotricha lentiginosa (C. L. Koch) 1837
„ lucifuga Charitonow 1926 = Gnaphosa montana (L. Koch) 1866
„ lugubris Cambridge 1873 = Gnaphosa funerea Dalmas 1921
„ lutata Cambridge 1872 = Pterotricha lutata (Cambridge) 1872
„ maculata Menge 1872 = Callilepis nocturna (Linné) 1758
„ marginata Cambridge 1874 = Nomisia marginata (Cambridge) 1874
„ moerens Cambridge 1885 = Pterotricha moerens (Cambridge) 1885
„ molendinaria Thorell 1875 = Nomisia molendinaria (L. Koch) 1866
„ molesta Herman 1879 = Gnaphosa opaca Herman 1879
„ muscorum Lebert 1877, Calloni 1889 = nicht zu deuten!
„ muscorum Emerton 1877, Gertsch 1935, Kaston 1948 = Gnaphosa gigantea Keyserling 1887
„ nocturna Thorell 1871 = Callilepis nocturna (Linné) 1758
„ nocturna Dahl 1883 = Gnaphosa islandica Soerensen 1898
„ nomas Thorell 1875 = Pterotricha nomas (Thorell) 1875
„ occidentalis Simon 1878 = Gnaphosa lugubris occidentalis (Simon) 1878
„ palaestina Cambridge 1872 = Nomisia excerpta (Cambridge) 1872
„ pallida L. Koch 1875 = Minosiella pallida (L. Koch) 1875
„ phyllobia Thorell 1871 = Poecilochroa phyllobia (Thorell) 1871
„ pittierii Getaz 1889 = Gnaphosa lugubris (C. L. Koch) 1839
„ plebeja Thorell 1875 = Gnaphosa badia (L. Koch) 1866
„ plumalis Cambridge 1872 = Berlandina plumalis (Cambridge) 1872
„ procera Cambridge 1874 = Pterotricha procera (Cambridge) 1874
„ pseudolapponica Schenkel 1931 = Gnaphosa lapponum (L. Koch) 1866
„ quagga Pavesi 1884 = Pterotricha quagga (Pavesi) 1884
„ recepta Pavesi 1880 = Nomisia recepta (Pavesi) 1880

Gnaphosa (Forts.):
„ rhodopis L. Koch 1875 = Berlandina plumalis (Cambridge) 1872
„ ripariensis Cambridge 1872 = Nomisia ripariensis (Cambridge) 1872
„ schuszteri Herman 1879 = Callilepis schuszteri (Herman) 1879
„ scioana Pavesi 1883 = Nomisia scioana (Pavesi) 1883
„ scudderi Thorell 1877 = Gnaphosa brumalis Thorell 1875
„ sericata Banks 1896, et sequ. = Cylphosa bicolor (Hentz) 1847
„ simplex Franganillo 1926 = Cylphosa bicolor (Hentz) 1847
„ spinosa Simon 1914 = Gnaphosa balearicola Strand 1942
„ spinosissima Pavesi 1880 = Crosbyellum santschii (Dalmas) 1921
„ spiralis F. Cambridge 1899 = Cylphosa bicolor (Hentz) 1847
„ subrufula Strand 1907 = ? Gnaphosa rufula (L. Koch) 1866
„ suspecta Cambridge 1879, 1881 = Gnaphosa immatura (Strand) 1942
„ thressa Pavesi 1876, 1878, = Pterotricha thressa (Pavesi) 1876
„ tigrina Simon 1878 ♀ = Gnaphosa muscorum (L. Koch) 1866
„ trebax Thorell 1875 = Pterotricha trebax (Thorell) 1875
„ variana Thorell 1870 = Poecilochroa variana (C. L. Koch) 1839
„ venatrix Cambridge 1874, 1876 = Berlandina venatrix (Cambridge) 1874

Gnatholycosa:
„ vittata Mello-Leitao 1945 = Melloicosa vittata (Mello-Leitao) 1945

Gnathonarium:
„ rohlfsianum Karsch 1881 = Gnathonarium dentatum (Wider) 1834

Gnathopalystes:
„ ferox Rainbow 1899 = Palystes ferox (Rainbow) 1899

Goeldia (Göldia):
„ obscura Keyserling 1891 = Titanoeca patellaris (Simon) 1892

Gohia:
„ falcata Dalmas 1917 = Gohia falxiata (Hogg) 1909

Goldia:
„ obscura Simon 1897 = Titanoeca patellaris (Simon) 1892

Gonatium:
„ bifidum Simon 1884 = Gonatium rubens (Blackwall) 1833
„ bituberculatum Simon 1884 = Hypomma bituberculatum (Wider) 1834
„ cheliferum Menge 1868 = Gonatium rubens (Blackwall) 1833
„ cornutum Simon 1884 = Hypomma cornutum (Blackwall) 1833
„ fulvum Bösenberg 1902 = Hypomma fulvum (Bösenberg) 1902
„ isabellinum Menge 1868, Dahl 1886 = Gonatium rubellum (Blackwall) 1841
„ nemorivagum Simon 1884 = Gonatium hilare (Thorell) 1875

Gongylidiellum:
„ arctatum Simon 1884 = Gongylidiellum parvum (Blackwall) 1841
„ bihamatum Simon 1915 = Scotargus pilosus Simon 1913
„ blandum Simon 1884, Lessert 1910 = Diplocentria blanda (Simon) 1884
„ faustum Jackson 1911 = Rhaebothorax faustus (Cambridge) 1900
„ latebricola Simon 1884, 1894, 1926, Bösenberg 1902, Dahl 1912 = Gongylidiellum compar (Westring) 1862
„ latebricola Lessert 1907 = Gongylidiellum kulczynskii (Lessert) 1910
„ longispina Simon 1884 = Asthenargus longispina (Simon) 1884
„ morulum Simon 1884 = Rhaebothorax morulus (Cambridge) 1873
„ paganum Simon 1884, Lessert 1910 = Asthenargus paganus (Simon) 1884
„ pallidum Crosby 1905 = Scylaceus pallidus (Emerton) 1882
„ placidum Simon 1884 = Asthenargus placidus (Simon) 1884
„ simoni Lessert 1904, 1910 = Asthenargus placidus (Simon) 1884
„ vivum Simon 1884, 1926, Bösenberg 1902 = Gongylidiellum parvum (Blackwall) 1841

Gongylidium:
„ agrestis Simon 1884, Becker 1896 = Oedothorax agrestis (Blackwall) 1853
„ alascensis Banks 1900 = Oedothorax alascensis (Banks) 1900
„ apicatum Simon 1884, Becker 1896 = Oedothorax apicatus (Blackwall) 1850

Gongylidium (Forts.):
- „ arenarium Emerton 1925 = Souceron arenarium (Emerton) 1925
- „ armatum Emerton 1919 = Zornella armata (Banks) 1905
- „ atramontensis Banks 1911 = Erigone brevidentata (Emerton) 1908
- „ barbarum Simon 1884 = Oedothorax barbarus (Simon) 1884
- „ bidentatum Simon 1884 = Scotoussa bidentata (Emerton) 1882
- „ borealis Banks 1899 = Oedothorax borealis (Banks) 1899
- „ bostoniensis Simon 1889, Emerton 1919 = Sougambus bostoniensis (Emerton) 1882
- „ brevipalpus Banks 1910 = Oedothorax brevipalpatus Roewer 1942
- „ canaliculatum Emerton 1915 = Soudinus canaliculatus (Emerton) 1915
- „ cantalicum Simon 1884 = Oedothorax cantalicus (Simon) 1884
- „ columbianum Emerton 1923 = Gnathonarium famelicum (Keyserling) 1886
- „ concavum Simon 1884 = Sciastes concavus (Emerton) 1882
- „ contortum Simon 1884 = Eperigone contorta (Emerton) 1882
- „ corticarium Banks 1910 = Soulgas corticarius (Emerton) 1908
- „ cristatum Simon 1884 = Trematocephalus cristatus (Wider) 1834
- „ curtipes Simon 1884 = Oedothorax curtipes (Cambridge) 1875
- „ curvitarsis Emerton 1917 = Utopiellum consimile (Cambridge) 1875
- „ decens Simon 1884 = Erigone decens Thorell 1871
- „ dentatum Simon 1884, Becker 1896 = Gnathonarium dentatum (Wider) 1834
- „ dentiferum Simon 1884 = Micryphantes graminicola (Sundevall) 1830
- „ distinctum Simon 1884 = Coryphaeolana distincta (Simon) 1884
- „ diversum Simon 1884 = Oedothorax diversus (L. Koch) 1879
- „ egenum Simon 1884 = Oedothorax egenus (L. Koch) 1869
- „ falsificum Banks 1900 = Oedothorax falsificus (Keyserling) 1886
- „ foenarium Simon 1884 = Coryphaeolana foenaria (Simon) 1884
- „ fuscum Simon 1884, Becker 1896 = Oedothorax retusus (Westring) 1851
- „ gibbiferum Simon 1884 = Oedothorax gibbiferus (Kulczynski) 1882
- „ gibbosum Simon 1884, Becker 1896 = Oedothorax gibbosus (Blackwall) 1841
- „ gibbum Cambridge 1900 = Oedothorax gibbus (Cambridge) 1900
- „ graminicola Simon 1884, Becker 1896 = Micryphantes graminicola (Sundevall) 1830
- „ improbum Simon 1884 = Entelecara erythropus (Westring) 1862
- „ imulum Simon 1884 = Oedothorax imulus (L. Koch) 1879
- „ kincaidi Banks 1905 = Grammonota kincaidi (Banks) 1905
- „ lapidicolum Soerensen 1898 = Coryphaeolana lapidicola (Soerensen) 1898
- „ leviceps Simon 1884 = Hilaira leviceps (L. Koch) 1879
- „ longipes Simon 1884 = Oedothorax agrestis longipes (Simon) 1884
- „ longisetosum Simon 1884 = Aduva longisetosa (Emerton) 1882
- „ lucidum Simon 1884 = Anacotyle stativa (Simon) 1881
- „ maximum Simon 1884 = Oedothorax maximus (Emerton) 1882
- „ mendicum Simon 1884 = Coryphaeolana holmgrenii (Thorell) 1871
- „ microtarsus Simon 1884 = Sciastes microtarsus (Emerton) 1882
- „ montanum Simon 1884, Emerton 1919 = Sisicottis montanus (Emerton) 1882
- „ montiferum Simon 1884 = Oedothorax montiferus (Emerton) 1882
- „ morulum Simon 1884 = Rhaebothorax morulus (Cambridge) 1873
- „ morum Cambridge 1894 = Plaesiocraerus picinus (Blackwall) 1841
- „ nefarium Simon 1884 = Pocadicnemis pumila (Blackwall) 1841
- „ nigricans Menge 1868 = Gongylidium rufipes (Linné) 1758
- „ nigrimanum Simon 1884 = Erigone nigrimana Thorell 1875
- „ ornatum Emerton 1914 = Micryphantes ornatus (Emerton) 1914
- „ pallidum Simon 1884 = Scylaceus pallidus (Emerton) 1882
- „ pascale Simon 1884 = Erigone longipalpis (Sundevall) 1830
- „ perplexum Emerton 1919 = Catabrithorax perplexus (Keyserling) 1886
- „ pertinens Simon 1884 = Catabrithorax pertinens (Cambridge) 1875
- „ piratum Simon 1884 = Oedothorax piratus (Simon) 1884
- „ piscator Simon 1884 = Rhaebothorax piscator (Simon) 1884

Gongylidium (Forts.):
„ plumosum Simon 1884 = Catabrithorax plumosus (Emerton) 1882
„ probatum Simon 1884 = Catabrithorax probatus (Cambridge) 1874
„ rucurvum Strand 1901 = Oedothorax recurvus (Strand) 1901
„ retusum Simon 1884, Becker 1896 = Oedothorax fuscus (Blackwall) 1834
„ spiniferum Simon 1884 = Souessa spinifera (Cambridge) 1874
„ subflavum Simon 1884 = Oedothorax semiflavus (L. Koch) 1879
„ submissum Simon 1884 = Oedothorax submissus (L. Koch) 1879
„ suppositum Kulczynski 1883 = Gnathonarium suppositum (Kulczynski) 1885
„ taczanowskii Simon 1884 = Gnathonarium dentatum (Wider) 1834
„ tarsalis Simon 1884 = Oedothorax tarsalis (Thorell) 1875
„ terrestris Simon 1884 = Sciastes terrestris (Emerton) 1882
„ tibialis Simon 1884 = Souidas tibialis (Emerton) 1882
„ tingitanum Simon 1884 = Oedithorax tingitanus (Simon) 1884
„ tridentatum Simon 1884 = Eperigone tridentata (Emerton) 1882
„ trilobatum Simon 1884 = Eperigone trilobata (Emerton) 1882
„ truncatum Simon 1884, Emerton 1919 = Sciastes truncatus (Emerton) 1882
„ tuberosum Simon 1884 = Oedothorax tuberosus (Blackwall) 1841
„ tuberosum Emerton 1915 = Aigola crassimana (Emerton) 1882
„ undulatum Emerton 1915 = Eperigone contorta (Emerton) 1882
„ unidentatum Emerton 1917 = Smodigoides thoracicus (Emerton) 1913
„ vaginatum Soerensen 1898 = Oreonetides vaginatus (Thorell) 1872
„ venator Simon 1884 = Hilaria nivalis Holm 1939
„ vilum Kulczynski 1885 = Oedothorax vilus (Kulczynski) 1885
„ wagae Simon 1884 = Wubana wagae (Cambridge) 1873

Gorgyrella:
„ abrahami Hewitt 1913 = Segregara abrahami (Hewitt) 1913

Goyena:
„ americana Franganillo 1926 = Gayenna americana Nicolet 1849

Grammonota:
„ fratella Chamberlin 1919 = Microneta fratella (Chamberlin) 1919
„ gradata Simon 1884 = Cineta gradata (Simon) 1881
„ letourneuxi Simon 1884 = Synaphris letourneuxi (Simon) 1894
„ obesior Chamberlin 1919 = Microneta viaria (Blackwall) 1841
„ orites Chamberlin 1919 = Sisicottus montanus (Emerton) 1882
„ simplex Chamberlin 1919 = Sciastes simplex (Chamberlin) 1919

Grammostola:
„ familiaris Mello-Leitao 1921 = Homoeomma familiaris Bertkau 1880
„ iheringi Strand 1907 = Grammostola brevimetatarsis Strand 1907

Grauhara:
„ vivida Peckham 1900 = Scopocira vivida (Peckham) 1900

Habrocestum:
„ agilis Banks 1893 = Pellenes auratus (Peckham) 1888
„ albovittatum Keyserling 1882 = Hypoblemum albovittatum (Keyserling) 1882
„ algericum Dyal 1935 = Habrocestum panjabius Roewer 1951
„ auratum Peckham 1888, 1896, Emerton 1902 = Pellenes auratus (Peckham) 1888
„ aztecanum Banks 1898 = Pellenes aztecanus (Banks) 1898
„ belligerum Peckham 1896 = Pellenes belligerus (Peckham) 1896
„ boreale Banks 1895 = Pellenes borealis (Banks) 1895
„ cinctipes Banks 1898 = Pellenes cinctipes (Banks) 1898
„ clypeatum Banks 1895 = Pellenes clypeatus (Banks) 1895
„ coecatum Peckham 1888 = Pellenes coecatus (Hentz) 1846
„ conjunctum Banks 1898 = Pellenes conjunctus (Banks) 1898
„ coronatum Peckham 1888 = Pellenes coecatus (Hentz) 1846
„ coronatum Dyal 1935 = Pellenes dyali Roewer 1951
„ cristatum Peckham 1888 = Pellenes coecatus (Hentz) 1846
„ cupidon Simon 1885 = Saitis cupidon (Simon) 1885
„ divaricatum Banks 1898 = Pellenes divaricatus (Banks) 1898

Habrocestum (Forts.):
„ dorsale Banks 1898 = Pellenes dorsalis (Banks) 1898
„ dubitatum Banks 1898 = Pellenes dubitatus (Banks) 1898
„ hirsutum Peckham 1888 = Pellenes hirsutus (Peckham) 1888
„ latens Banks 1892 = Evarcha leucophaea (C. L. Koch) 1846
„ latens Peckham 1896 = Pellenes hondurasus Roewer 1951
„ locuples Simon 1888 = Corythalia locuples (Simon) 1888
„ mexicanum Peckham 1896 = Pellenes mexicanus (Peckham) 1896
„ montanus Emerton 1894 = Pellenes montanus (Emerton) 1894
„ oregonense Peckham 1888 = Pellenes oregonensis (Peckham) 1888
„ paratum Peckham 1896 = Pellenes paratus (Peckham) 1896
„ peregrinum Peckham 1888 part., Emerton 1891, 1902 = Pellenes viridipes (Hentz) 1846
„ rubroclypeatum Dyal 1935 = Habrocestum dyali **nom. nov.**
„ signatum Banks 1900 = Pellenes signatus (Banks) 1900
„ speciosum Keyserling 1883 = Saitis speciosa (Cambridge) 1874
„ splendens Peckham 1888, Emerton 1891, 1902 = Pellenes decorus (Blackwall) 1846
„ viridipes Peckham 1888 part. = Pellenes calcaratus Banks 1904
„ viridipes Peckham 1888 part. = Pellenes viridipes (Hentz) 1846

Habronattus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Pellenes**
„ agilis Chamberlin & Ivie 1944 = Pellenes auratus (Peckham) 1888
„ coronatus Chamberlin & Ivie 1944, Kaston 1945 = Pellenes coecatus (Hentz) 1846
„ latens F. Cambridge 1901 = Pellenes hondurasus Roewer 1951
„ peregrinus Chickering 1944 ♂ = Pellenes calcaratus Banks 1904
„ peregrinus Chickering 1944 ♀ = Pellenes viridipes (Hentz) 1846
„ viridipes F. Cambridge 1901 = Pellenes fallax Peckham 1909

Habronestes:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Storena**
„ marinus Goyen 1889 = nicht zu deuten!

Hadites:
„ bidens krivosijanus Kratochvil 1935 = Hadites krivosijanus (Kratochvil) 1938

Hadrosoma:
„ ephippigera Simon 1885 = Pystira ephippigera (Simon) 1885
„ obscura Keyserling 1882 = Margaromma obscurum (Keyserling) 1882

Hahnia:
„ agilis Keyserling 1887, Comstock 1912 = Neoantistea agilis (Keyserling) 1887
„ bimaculata Emerton 1889, 1902 = Neoantistea agilis (Keyserling) 1887
„ brunnea Emerton 1908, 1915 = Antistea brunnea (Emerton) 1908
„ chyzeri Becker 1886 = Hahnia ononidum Simon 1875
„ elegans Simon 1875 et sequ. = Antistea elegans (Blackwall) 1841
„ fugans Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ helveola Simon 1875 (part.), Bösenberg 1902 = Hahnia bressica Simon 1875
„ helveola Simon 1875 (part.), 1937 = Hahnia pusilla C. L. Koch 1841
„ helveola Jackson 1934 = Hahnia jacksoni Roewer 1951
„ magna Keyserling 1887 = Neoantistea riparia (Keyserling) 1887
„ mengei Kulczynski 1897, Bösenberg 1902 = Hahnia ononidum Simon 1875
„ mengei Lessert 1910, M. Dahl 1937 = Hahnia jacksoni Roewer 1951
„ montana Bösenberg 1902, Lessert 1910 = Hahnia muscicola Simon 1875
„ ohlerti Bösenberg 1902 = Hahnia montana (Blackwall) 1841
„ parva Kulczynski 1882 = Hahnia montona (Blackwall) 1841
„ pirini Drensky 1921 = Cryphoeca pirini (Drenski) 1921
„ pratensis C. L. Koch 1841 part. = Hahnia jacksoni Roewer 1951
„ pratensis C. L. Koch 1841 part., Ohlert 1867, Menge 1869, Dahl 1883 = Antistea elegans (Blackwall) 1841
„ pratensis Westring 1862 = Tetrilus arietinus (Thorell) 1870

Hahnia (Forts.):
„ pratensis Simon 1875 = Hahnia pusilla C. L. Koch 1841
„ propinqua Simon 1875 = Antistea elegans propinqua (Simon) 1875
„ pusilla Menge 1869 = Hahnia jacksoni Roewer 1951
„ radula Emerton 1889, Simon 1898 = Neoantistea riparia radula (Emerton) 1889
„ radula Chamberlin & Ivie 1933 = Neoantistea gosiuta Gertsch 1934
„ riparia Keyserling 1887 = Neoantistea riparia (Keyserling) 1887
„ rupicola Simon 1934 = Hahnia candida Simon 1875
„ silvicola C. L. Koch 1845, Westring 1862, Menge 1869 = Cryphoeca silvicola (C. L. Koch) 1834
„ sylvicola Ohlert 1867 = Cryphoeca silvicola (C. L. Koch) 1834
„ sylvicolis Simon 1864 = Cryphoeca silvicola (C. L. Koch) 1834

Halonoproctus:
„ ricketti Pocock 1901 = Cyclocosmia ricketti (Pocock) 1901

Hamataliwa (= Hamataliva):
„ grisea Banks 1903 = Hamataliva haytiana (Chamberlin) 1925
„ grisea Banks 1909 = Oxyopeidon rana Simon 1897
„ marmorata Simon 1898 = Oxyopeidon marmoratum (Simon) 1898
„ rufocaligata Simon 1898 = Oxyopeidon rufocaligatum (Simon) 1898

Hamillus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Pensacola**

Hapalochrota:
„ caudata Keyserling 1863 = Arachnura scorpionides Vinson 1863

Hapalopus:
„ africanus Simon 1887 = Selenogyrus africanus (Simon) 1887
„ cervinus Simon 1889 = Hemiercus cervinus (Simon) 1889
„ elegans Simon 1889 = Cyriocosmus elegans (Simon) 1889
„ fallax Mello-Leitao 1923 = Crypsidromus fallax Bertkau 1880
„ inflatus Simon 1889 = Hemiercus inflatus (Simon) 1889
„ modestus Simon 1889 = Hemiercus modestus (Simon) 1889
„ pernix F. Cambridge 1895 = Cyrtopholis pernix (Ausserer) 1875
„ ruficeps Simon 1891 = Hapalopus pentaloris (Simon) 1888
„ sellatus Simon 1889 = Cyriocosmus sellatus (Simon) 1889
„ villosus Keyserling 1891 = Homoeomma villosum Keyserling 1891

Hapalothele:
„ albovittata Simon 1891 = Fufius albovittatus (Simon) 1891
„ atramentaria Simon 1892 = Fufius atramentarius (Simon) 1888
„ auricoma Simon 1891 = Fufius auricomus (Simon) 1891
„ digitata Simon 1892 = Ischnothele digitata (Cambridge) 1892
„ garleppi Simon 1892 = Fufius garleppi (Simon) 1892
„ lanicia Simon 1892 = Fufius lanicius (Simon) 1892
„ varia Hogg 1900 = Ixamatus varius (L. Koch) 1873

Haplodrassus:
„ lapponicus Holm 1939 = Haplodrassus soerenseni (Strand) 1900

Haptisus:
„ nicoleti Berland 1913 = Haptisus citrinus (L. Koch) 1866

Harmochirus:
„ malaccensis Simon 1885, Thorell 1892 = Harmochirus brachiatus (Thorell) 1877
„ nervosus Thorell 1890, 1892 = Harmochirus brachiatus (Thorell) 1877

Harpactes (weil praeocc. jetzt durch **Harpactea** Bristowe 1939 zu ersetzen)
„ canestrinii L. Koch 1876 = Dasumia canestrinii (L. Koch) 1876
„ carpathicus Kulczynski 1882, Miller & Kratochvil 1940 = Dasumia carpathica (Kulczynski) 1882
„ crassipalpis Simon 1882 = Harpactocrates crassipalpis (Simon) 1882
„ drassoides Lessert 1904, 1910 = Harpactocrates drassoides (Simon) 1882
„ ignavus Simon 1882 = Harpactocrates ignavus (Simon) 1882
„ laevigatus Lessert 1910 = Dasumia laevigata (Thorell) 1873
„ modestus Simon 1882 = Harpactea (Harpactes) corticalis (Simon) 1882

Harpactes (Forts.):
„ saevus Herman 1879, Kulczynski 1897 = Harpactocrates saevus (Herman) 1879
„ seidelii Thorell 1875, Müller-Schenkel 1895 = Harpactea (Harpactes) lepida (C. L. Koch) 1839
„ sturani Drensky 1938 = Harpactea (Harpactes) sturanyi (Nosek) 1905

Harpactira:
„ caffreriana Purcell 1902 = Harpactira cafreriana (Walckenaer) 1837
„ chordata Gerstäcker 1873 = Pterinochilus constrictus (Gerstäcker) 1873
„ constricta Gerstäcker 1873 = Pterinochilus constrictus (Gerstäcker) 1873
„ elevata Karsch 1878 = Pterinochilus constrictus (Gerstäcker) 1873

Harpactocrates:
„ rubicundus Simon 1914, Drensky 1938 = Harpactea rubicundus (C. L. Koch) 1839

Harpaxibius:
„ striatus Ausserer 1871 = Harpaxictis striatus (Ausserer) 1871

Harpaxotheria:
„ antilope Simon 1888 = Phoneyusa antilope (Simon) 1888
„ ectypus Simon 1888 = Loxoptygus ectypus (Simon) 1888
„ gracilipes Simon 1888 = Phoneyusa gracilipes (Simon) 1888

Hasarius:
„ albarius L. Koch 1878 = Evarcha albaria (L. Koch) 1878
„ albescens Keyserling 1881 = Euryattus albescens (Keyserling) 1881
„ albiventris Keyserling 1881 = Cytaea albiventris (Keyserling) 1881
„ albocinctus Keyserling 1881 = Sigytes albocincta (Keyserling) 1881
„ alter Simon 1876 = Euophrys altera (Simon) 1868
„ arcigerus Karsch 1891 = nicht zu deuten!
„ arcuatus Simon 1876 ♂, Becker 1882 = Evarcha arcuanta (Clerck) 1757
„ arcuatus Simon 1876 ♀ = Evarcha flammata (Clerck) 1757
„ barbatissima Keyserling 1881 = Servaea barbatissima (Keyserling) 1881
„ bisetatus Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
„ bistriatus Hasselt 1893 = nicht zu deuten!
„ chrysostomus Keyserling 1881 = Plotius chrysostomus (Keyserling) 1881
„ citus Cambridge 1878 = Hasarius adansonii (Audouin) 1827
„ clarovittatus Keyserling 1881 = Cytaea clarovittata (Keyserling) 1881
„ coelestis Karsch 1880 = nicht zu deuten!
„ copreus Thorell 1890, 1892 = Emathis coprea (Thorell) 1890
„ coronatus Thorell 1887 = Eugasmia coronata (Simon) 1885
„ crucifer Dönitz & Strand 1906 = nicht zu deuten!
„ cruciger Soerensen 1904 = Pellenes tripunctatus (Walckenaer) 1802
„ devorans Simon 1876 = nicht zu deuten!
„ diloris Keyserling 1881 = Sigytes diloris (Keyserling) 1881
„ dispalans Thorell 1890 = nicht zu deuten!
„ elisabethae Thorell 1890 = nicht zu deuten!
„ ensifer Thorell 1890 = Thorelliola ensifera (Thorell) 1877
„ falcatus Simon 1876 ♂, Becker 1882, Cambridge 1881 = Evarcha flammata (Clerck) 1757
„ falcatus Simon 1876 ♀ = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
„ farinosus Soerensen 1904 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
„ frontosus Simon 1876 = Mogrus frontosus (Simon) 1871
„ garetti Keyserling 1881 = Hasarius adansonii (Audouin) 1827
„ hoyi Peckham 1888, Emerton 1891, 1902 = Evarcha leucophaea (C. L. Koch) 1848
„ imitatus Simon 1876 = Euophrys imitata (Simon) 1868
„ infrastriatus Keyserling 1881 = Cytaea infrastriata (Keyserling) 1881
„ inhebes Karsch 1879 = nicht zu deuten!
„ insularis Keyserling 1881 = Chalcotropis insularis (Keyserling) 1881
„ jucundus Simon 1876 = Evarcha jucunda (Lucas) 1846
„ kjellerupii Thorell 1891 = nicht zu deuten!

Hasarius (Forts.):
„ laetabundus Simon 1876, Becker 1882 = Evarcha laetabunda (C. L. Koch) 1848
„ lautus Keyserling 1881 = Ascyltus lautus (Keyserling) 1881
„ lineatus Keyserling 1881 = Sigytes dialeuca (L. Koch) 1881
„ mccookii Thorell 1890 = nicht zu deuten!
„ multipunctatus Simon 1876 = Telamonia castriesiana (Grube) 1861
„ nepos Simon 1876 = nicht zu deuten!
„ nicholsoni Cambridge 1899 = Panysinus nicholsoni (Cambridge) 1899
„ nigriceps Simon 1899 = Donoessus nigriceps (Simon) 1899
„ nigriventris Keyserling 1881 = Euryattus nigriventris (Keyserling) 1881
„ orbiculatus Keyserling 1881 = Pystira orbiculata (Keyserling) 1881
„ patagiatus Simon 1876 = nicht zu deuten!
„ pauperatus Keyserling 1881 = Euryattus bleekeri (Doleschall) 1859
„ paykullii Simon 1876 = Plexippus paykullii (Audouin) 1827
„ plebejus Karsch 1879 = nicht zu deuten!
„ plumbeiventris Keyserling 1881 = Ptocasius plumbeiventris (Keyserling) 1881
„ plumipalpis Thorell 1895 = Ptocasius plumipalpis (Thorell) 1895
„ pumilio Keyserling 1881 = Euryattus bleekeri (Doleschall) 1859
„ punctiventer Karsch 1881 = nicht zu deuten!
„ riparius Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ russatus Workman 1896 = Mantius russatus Thorell 1891
„ sannio Workman 1896 = Eugasmia sannio (Thorell) 1877
„ scaber Thorell 1890, 1892 = Emathis scabra (Thorell) 1890
„ scylax Thorell 1890 = nicht zu deuten!
„ simonis Thorell 1891, 1892 = nicht zu deuten!
„ sulfuratus Thorell 1891 = nicht zu deuten!
„ taczanowskii Simon 1876 = Evarcha taczanowskii (Simon) 1868
„ validus Thorell 1891 = Pseudamycus validus (Thorell) 1877
„ virens Thorell 1891 = Eugasmia sannio (Thorell) 1877
„ workmani Thorell 1890 = nicht zu deuten!
„ xanthopus Keyserling 1881 = Canama xanthopus (Keyserling) 1881

Hecaerge:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Zora**
„ maculata Blackwall 1882, 1834 = Zora spinimana (Sundevall) 1832
„ maculata Cambridge 1872 = Zora maculosa Roewer 1951
„ wrightii Blackwall 1869 = Zoropsis spinimana (Dufour) 1820

Helicopis:
„ maderianus Thorell 1875 = Olios maderianus (Thorell) 1875

Heligmomerus (Bd. 1 p. 151, 1942 err.: **Heligomerus**):
„ astutus Hewitt 1916 = Idiops astutus Hewitt 1915
„ longipes Strand 1908 = Heligomerus somalicus Pocock 1896

Heliophanus (= Heliophana):
„ aeneus Simon 1876 et sequ. = Heliophanus muscorum (Walckenaer) 1802
„ armatus Simon 1868, 1871, 1876 = Heliophanus kochii Simon 1868
„ atratus Thorell 1875 = Chalcoscirtus infimus (Simon) 1868
„ aurocinctus Ohlert 1865, 1867 = Bianor aurocinctus (Ohlert) 1865
„ branickii Simon 1868 = Heliophanus auratus C. L. Koch 1848
„ cambridgii Simon 1868, 1871 et sequ. = Heliophanus tribulosus Simon 1868
„ cognatus Simon 1869, 1937 = Hilophanus tribulosus Simon 1868
„ cuprescens Simon 1868 = Heliophanus cupreus cuprescens (Simon) 1868
„ cupreus Simon 1896 ♀ = Heliophanus ritteri (Scopoli) 1763
„ dubius Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ equester Canestrini & Pavesi 1870 = nicht zu deuten!
„ expers Simon 1868, 1876, Cambridge 1881 = Heliophanus viriatus Simon 1868
„ flavipes C. L. Koch 1848, 1850 et sequ. = Heliophanus ritteri (Scopoli) 1763
„ fulvignathus Simon 1871, 1876 = Heliophanus ritteri (Scopoli) 1763
„ globifer Simon 1868 = Heliophanus cupreus globifer (Simon) 1868
„ grammicus Simon 1868, 1876, 1901 = Heliophanus viriatus Simon 1868

Heliophanus (= Heliophana) (Forts.):
„ hecticus Simon 1868, 1876 = Heliophanus ritteri (Scopoli) 1763
„ inornatus Simon 1868 = Heliophanus cupreus (Walckenaer) 1802
„ inornatus Simon 1876, 1937 = Heliophanus muscorum (Walckenaer) 1802
„ karpinskii Simon 1868 = Heliophanus dubius C. L. Koch 1848
„ lugubris Simon 1864 = Hyllus lugubris (Vinson) 1863
„ luctuosa Simon 1864 = Aelurillus luctuosus (Lucas) 1846
„ mariae Dahl 1926, Tullgren 1942 = Heliophanus dampfi (Schenkel) 1923
„ metallicus C. L. Koch 1848 = Heliophanus cupreus (Walckenaer) 1802
„ metallicus Ohlert 1867, Simon 1876 = Heliophanus patagiatus Thorell 1875
„ micans C. L. Koch 1848, Simon 1868 = Heliophanus cupreus (Walckenaer) 1802
„ micans Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ nitens C. L. Koch 1848, Simon 1868 = Heliophanus dubius C. L. Koch 1848
„ nitidiventris Simon 1864 = Phlegra nitidiventris (Lucas) 1846
„ niveiventris Simon 1901 = Heliophanus niveivestis Simon 1889
„ simplex Simon 1868, Chyzer & Kulczynski 1891, Dahl 1926 = Heliophanus cupreus simplex (Simon) 1868
„ tricinctus C. L. Koch 1837, 1848, Simon 1868 = Heliophanus cupreus (Walckenaer) 1802
„ truncorum C. L. Koch 1848, Ohlert 1867, Simon 1868 = Heliophanus muscorum (Walckenaer) 1802
„ variabilis Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ varians Simon 1868 ♂, Chyzer & Kulczynski 1891 = Heliophanus ritteri (Scopoli) 1763
„ varians Simon ♀ = Heliophanus cupreus (Walckenaer) 1802

Helophora:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Linyphia**
„ abnormis Bertkau 1883 = Oreonetides abnormis (Blackwall) 1841
„ pallescens Menge 1866, Blauvelt 1936, 1937 = Linyphia insignis Blackwall 1841

Helorus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Cobanus**

Helpidius:
„ extensus Simon 1901 = Cobanus extensus (Peckham) 1896

Helvibis:
„ sulcata Keyserling 1884 = Theridion sulcatum (Keyserling) 1884

Helvidius:
„ lugubris Cambridge 1896 = Cesonia lugubris (Cambridge) 1896

Hemicloea:
„ diversa L. Koch 1875 = Rebilus diversus (L. Koch) 1875
„ flavitarsis L. Koch 1875 = Pyrnus flavitarsis (L. Koch) 1875
„ fulva L. Koch 1875 = Pyrnus fulvus (L. Koch) 1875
„ lugubris L. Koch 1875 = Rebilus lugubris (L. Koch) 1875
„ praesignis L. Koch 1876 = Rebilus praesignis (L. Koch) 1876
„ somersetensis Thorell 1881 = Hemicloeina somersetensis (Thorell) 1881
„ walteri Karsch 1886, Tucker 1923 = Platyoides walteri (Karsch) 1886

Hemiphantes:
„ arcticus Strand 1901 = Bathyphantes strandi Charitonow 1928

Hemistajus:
„ rostratus Schenkel 1934 = Diplocephalus rostratus Schenkel 1934

Hentzia:
„ ambigua Chamberlin & Ivie 1944 = Hentzia palmarum (Hentz) 1832
„ basilica Mc Cook 1893 = Allepeira basilica (Mc Cook) 1878
„ trivittata F. Cambridge 1904 = Allepeira trivittata (Cambridge) 1889

Heraclea:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Freya**

Heratemis:
„ alboplagiata Simon 1899, 1903 = Heratemita alboplagiata (Simon) 1899
„ chrysozone Simon 1899, 1903 = Heratemita chrysozone (Simon) 1899

Herennia:
„ multipunctata Thorell 1877 = Herennia ornatissima (Doleschall) 1859
Heriaeus:
„ hirsutus Simon 1875 = Heriaeus oblongus Simon 1918
„ hirsutus Chyzer & Kulczynski 1891, Simon 1895, Bösenberg 1902, Lessert 1910 = Heriaeus hirtus (Latreille) 1819
„ hirtus Kulczynski 1903 = Heriaeus orientalis Simon 1918
„ savignyi Simon 1875, Becker 1882, Kulczynski 1903 = Heriaeus hirtus (Latreille) 1819
Heribertus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Ulesanis**
Herilus:
„ radiatus Thorell 1894 = Myrmarachne radiata (Thorell) 1894
Hermacha:
„ dispar Simon 1891 = Rachias dispar (Simon) 1891
Hermachastes:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Spiroctenus**
Hermosa:
„ volatilis Peckham 1892 = Myrmarachne volatilis (Peckham) 1892
Herpyllus:
„ alarius Hentz 1847 = Phrurotimpus alarius (Hentz) 1847
„ ater Hentz 1832, 1847 = Zelotes ater (Hentz) 1832
„ auratus Hentz 1847 = Micaria aurata (Hentz) 1847
„ australis Fox 1938 = Herpyllus irvingi Mello-Leitao 1944
„ bicolor Hentz 1847 = Cylphosa bicolor (Hentz) 1847
„ bilineatus Hentz 1847 = Cesonia bilineata (Hentz) 1847
„ californicus Banks 1904 Herpyllus propinquus (Keyserling) 1887
„ crocatus Hentz 1847 = Castianeira descripta (Hentz) 1847
„ cruciger Hentz 1847 = Castianeira crucigera (Hentz) 1847
„ descriptus Hentz 1847 = Castianeira descripta (Hentz) 1847
„ dubius Hentz 1847 = Asagena dubia (Hentz) 1847
„ ecclesiasticus Hentz 1832, 1847 = Herpyllus vasifer (Walckenaer) 1805
„ formicarius Urquhart 1891 = Lampona cylindrata (L. Koch) 1866
„ hesperolus Chamberlin 1928 = Herpyllus validus (Banks) 1896
„ insularis Banks 1910 = Sosticus insularis (Banks) 1895
„ longipalpus Hentz 1847 = Castianeira longipalpus (Hentz) 1847
„ marmoratus Hentz 1847 = Castianeira amoena (C. L. Koch) 1842
„ oabus Chamberlin 1919 = Agroeca trivittata (Keyserling) 1887
„ ornatus Hentz 1847 = Castianeira amoena (C. L. Koch) 1842
„ parcus Hentz 1847 = Phrurolithus parcus (Hentz) 1847
„ pygmaeus Hentz 1847 = nicht zu deuten!
„ ramulosus Hentz 1847 = nicht zu deuten!
„ trilineatus Hentz 1847 = Castianeira trilineata (Hentz) 1847
„ variegatus Hentz 1847 = Sergiolus variegatus (Hentz) 1847
„ zonarius Hentz 1847 = Castianeira cingulata (C. L. Koch) 1842
Hersilia:
„ calcuttensis Stoliczka 1869 = Hersilia savignyi Lucas 1836
„ edwardsii Lucas 1846 = Tama edwardsii (Lucas) 1846
„ indica Lucas 1836 = Murricia indica (Lucas) 1836
„ indica Walckenaer 1837 = Hersilia savignyi Lucas 1836
„ maculata lucasi Simon 1908 = Hersiliola lucasi (Cambridge) 1876
„ mexicana Cambridge 1893 = Tama mexicana (Cambridge) 1893
„ oraniensis Lucas 1846 = Hersiliola macullulata (Dufour) 1831
„ sumatrana Thorell 1890 = Tama sumatrana (Thorell) 1890
„ versicolor Blackwall 1865 = Hersiliola versicolor (Blackwall) 1865
Hersiliada:
„ simonii Cambridge 1872 = Hersiliola simonii (Cambridge) 1872

Hersilidia:
„ lucasi Cambridge 1876 = Hersiliola lucasi (Cambridge) 1876
„ oraniensis Simon 1870 = Hersiliola macullulata (Dufour) 1831

Hesydrus:
„ jullieni Simon 1898 = Enna jullieni (Simon) 1898

Heterocephala:
„ conifera Holmberg 1876 = Mastophora conifera (Holmberg) 1876

Heteroclubiona:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Clubiona**

Heterodictyna:
„ pallida Dahl 1904, 1907 = Mallos pallidus (Banks) 1904

Heterognatha:
„ chilensis Nicolet 1849 = Araneus collusor Petrunkevitch 1911
„ margaritacea Nicolet 1849 = Araneus margaritaceus (Nicolet) 1849

Heteromma:
„ anomalum Mello-Leitao 1935 = Agersborgia anomala (Mello-Leitao) 1935
„ fuegianum Karsch 1880 = Gayenna fuegiana (Karsch) 1880

Heterommides:
„ fuegiana Strand 1912 = Gayenna fuegiana (Karsch) 1880

Heteropoda:
„ ambigua Simon 1896 = Heteropoda fabrei Simon 1885
„ badia L. Koch 1875 = Olios mygalinus Doleschall 1857
„ badia Simon 1880, Thorell 1881 = Heteropoda badiella Roewer 1951
„ blaisei Simon 1902, Strand 1906 = Barylestis blaisei (Simon) 1902
„ boiei Simon 1880 = Parhedrus boiei (Doleschall) 1859
„ calligaster Thorell 1870, L. Koch 1875 = Olios calligaster (Thorell) 1870
„ casaria Simon 1897 = Heteropoda prompta (Cambridge) 1885
„ conspicua L. Koch 1875 = Olios conspicuus (L. Koch) 1875
„ debilis Thorell 1890 = Heteropoda imbecilla Thorell 1892
„ diana L. Koch 1875 = Olios diana (L. Koch) 1875
„ ferina Simon 1887 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ festiva L. Koch 1875 = Olios festivus (L. Koch) 1875
„ flavimana Simon 1880 = Parhedrus boiei (Doleschall) 1859
„ freycineti Simon 1880 = Clastes freycineti Walckenaer 1837
„ gracilipes Thorell 1890 = Heteropoda leptoscelis Thorell 1890
„ haemorrhoidalis L. Koch 1875 = Olios haemorrhoidalis (L. Koch) 1875
„ incompta L. Koch 1875 = Olios incomptus (L. Koch) 1875
„ inframaculata Hogg 1896 = Olios inframaculatus (Hogg) 1896
„ kochii Cambridge 1872 = Cebrennus kochii (Cambridge) 1872
„ macilenta L. Koch 1875 = Olios macilentus (L. Koch) 1875
„ natalia Karsch 1878 = Palystes natalius (Karsch) 1878
„ nitellina L. Koch 1875 = Olios nitellinus (L. Koch) 1875
„ occidentalis Karsch 1879 = Olios occidentalis (Karsch) 1879
„ ocellata Pocock 1903 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ pallida L. Koch 1875 = Olios pallidus (L. Koch) 1875
„ patellata Karsch 1878 = Olios patellatus (Karsch) 1878
„ peltata Strand 1915 = Barylestis peltata (Strand) 1915
„ peroniana Simon 1880 = Pandercetes peroniana (Walckenaer) 1837
„ pessleri Thorell 1870, L. Koch 1875 = Isopeda pessleri (Thorell) 1870
„ picta L. Koch 1875, Karsch 1878 = Olios pictus (L. Koch) 1875
„ praeclara L. Koch 1875 = Olios praeclarus (L. Koch) 1875
„ punctata L. Koch 1875 = Olios punctatus (L. Koch) 1875
„ regia Simon 1897 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ regina L. Koch 1875 = Pediana regina (L. Koch) 1875
„ rutila L. Koch 1875 = Olios rutilus (L. Koch) 1875
„ salacia L. Koch 1875 = Olios salacius (L. Koch) 1875
„ suspiciosa Simon 1880, Berland 1929 = Heteropoda nobiles (L. Koch) 1875

Heteropoda (Forts.):
„ venatoria aulica Strand 1909 = Heteropoda aulica (L. Koch) 1878
„ venatoria thoracica Merian 1931 = Heteropoda thoracica (C. L. Koch) 1845
„ viridis Thorell 1875 = nicht zu deuten!
Heterozelotes:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Zelotes**
Heurodes:
„ turrita Keyserling 1886 = Araneus turritus (Keyserling) 1886
Hexathele:
„ cinereopilosus Simon 1889 = Scotinoecus cinereopilosus (Simon) 1889
Hexomma:
„ hahnii Karsch 1878 = Sicarius hahnii (Karsch) 1878
Hexophthalma:
„ hahnii Karsch 1879 = Sicarius hahnii (Karsch) 1878
Hexops:
„ whitei Ausserer 1871 = Porrhothele antipodiana (Walckenaer) 1837
Hilaira:
„ curvitarsis Emerton 1919 = Utopiellum consimile (Cambridge) 1875
„ faroica Schenkel 1925 = Hilaira frigida (Thorell) 1872
„ frigida Strand 1901 = Hilaira montigena (L. Koch) 1872
„ glacialis Kulczynski 1908, 1916 = Hilaira nivalis Holm 1937
„ glacialis Emerton 1921, Jackson 1933 = Hilaira vexatrix (Cambridge) 1877
„ mirabilis Kulczynski 1916 = Utopiellum consimile (Cambridge) 1875
„ nubigena Hull 1911 = Utopiellum nubigena (Hull) 1911
„ rudis Schenkel 1923, 1927 = Hilaira montigena (L. Koch) 1872
„ uta Chamberlin 1919 = Catabrithorax utus (Chamberlin) 1919
„ whimperi Jackson 1933 = Hilaira vexatrix (Cambridge) 1877
Hildbolda:
„ simoni Keyserling 1884 = Thwaitesia simoni (Keyserling) 1884
Hilke:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Agroeca**
Hillhousia:
„ desolans F. Cambridge 1894, Hull 1932 = Erigone atra Blackwall 1833
„ turbatrix F. Cambridge 1894 = Lepthyphantes miser (Cambridge) 1882
Hippasa:
„ greenalliae Simon 1885 = Hippasa pantherina Pocock 1899
Hirrius:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Hirriusa**
Hirtia:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Clubiona**
Histagonia:
„ marxi Crosby 1906 = Paidisca marxi (Crosby) 1906
„ nasuta Simon 1894 = Floricomus rostratus (Emerton) 1882
„ nasuta Emerton 1911 = Floricomus nasutus (Emerton) 1911
„ palustris Emerton 1909 = Floricomus plumalis (Crosby) 1905
Hogna:
„ baulnyi Caporiacco 1947 = Allocosa baulnyi (Simon) 1876
„ berlandi Caporiacco 1944 = Arctosa berlandi (Caporiacco) 1944
„ brevis Denis 1953 = Arkalosula brevis (Denis) 1953
„ brunnea Caporiacco 1938 = Lycosa brunnea F. Cambridge 1902
„ carli Reimoser 1934 = Scaptocosa carli (Reimoser) 1934
„ catula Reimoser 1934 = Hogna indagatrix (Walckenaer) 1837
„ concolor Caporiacco 1935 = Avicosa concolor (Caporiacco) 1935
„ corporaali Reimoser 1935 = Trochosa corporaali (Reimoser) 1935
„ cretacea Caporiacco 1934 = Lycosa cretacea Simon 1898
„ cunicularia Simon 1876 = Allocosa oculata (Simon) 1876
„ cursor Caporiacco 1934 = Alopecosa cursor (Hahn) 1831
„ danneili Dahl 1908 = Allocosa danneili (Dahl) 1908

Hogna (Forts.):
„ delesserti Caporiacco 1941 = Allocosa delesserti (Caporiacco) 1941
„ forsaythi Dahl 1908 = Geolycosa (Dahl) 1908
„ hewitti Caporiacco 1949 = Avicosa hewitti (Lessert) 1933
„ hirsuta Caporiacco 1940 = Allocosa hirsuta (Bösenberg & Lenz) 1895
„ illegalis Caporiacco 1947 = Allocosa illegalis (Strand) 1906
„ kolbei Dahl 1908 = Agalenocosa kolbei (Dahl) 1908
„ leucophaeoides Roewer 1951 = Agalenocosa leucophaeoides (Roewer) 1951
„ lenzi Roewer 1951 = Arctosa lenzi (Roewer) 1951
„ macedonica Drenski 1929 = Alopecosa macedonica (Drenski) 1929
„ praegrandis Hadjissarandos 1940 = Lycosa praegrandis C. L. Koch 1836
„ schulzi Dahl 1908 = Geolycosa schulzi (Dahl) 1908
„ thieli Dahl 1908 = Dingosa thieli (Dahl) 1908

Holcolaetis:
„ vidua Dyal 1935 = Holcolaetis dyali Roewer 1951

Holcolethis:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Holcolaetis**

Holconia:
„ armillata Thorell 1887 = Torania armillata (Thorell) 1887
„ beccarii Thorell 1890, 1892 = Torania beccarii (Thorell) 1890
„ dolosa Simon 1880 = Isopeda dolosa (L. Koch) 1875
„ immanis Simon 1880 = Isopeda immanis (L. Koch) 1867
„ insignis Simon 1880, 1897 = Isopeda insignis (Thorell) 1870
„ malagasa Karsch 1881, Lenz 1886 = Damastes malagasus (Karsch) 1881
„ subdola Thorell 1881 = Isopeda subdola (Thorell) 1881

Holocnemus:
„ absoloni Kratochvil 1934 (part.) = Stygopholcus absoloni (Kulczynski) 1914
„ absoloni Kratochvil 1934 (part.) = Stygopholcus skotophilus Kratochvil 1940
„ acuminatus Franganillo 1925 = nicht zu deuten!
„ labyrinthi Kulczynski 1903 = Hoplopholcus labyrinthi (Kulczynski) 1903
„ rivulatus Simon 1873, Lessert 1910 = Holocnemus pluchii (Scopoli) 1763
„ semicaudatus Simon 1907 = Crossopriza semicaudata (Cambridge) 1876

Hololena:
„ intermedia Exline 1938 = Novalena intermedia (Chamberlin & Gertsch) 1930

Homalattoides:
„ alboguttatus F. Cambridge 1901 = Sassacus alboguttatus (F. Cambridge) 1901
„ longipes F. Cambridge 1901 = Beata longipes (F. Cambridge) 1901
„ phoeniceus F. Cambridge 1901 = Rhene phoenicea (Simon) 1888
„ roseus F. Cambridge 1901 = Dryphias maccuni (Peckham) 1895

Homalattus:
„ albiger Simon 1885 = Rhene albigera (C. L. Koch) 1848
„ albostriatus Thorell 1891 = Ligurra albostriata (Thorell) 1891
„ analis Thorell 1887 = Rhene rubrigera (Thorell) 1887
„ atratus Karsch 1881 = Rhene atrata (Karsch) 1881
„ auratus L. Koch 1879 = Rhene aurata (L. Koch) 1879
„ auronitens L. Koch 1879 = Simaethula auronitens (L. Koch) 1879
„ biscutellatus Simon 1887 = Peplometus biscutellatus (Simon) 1887
„ brevipes Thorell 1891 = Rhene brevipes (Thorell) 1891
„ bufo Simon 1885, Thorell 1887, 1892 = Rhene bufo (Doleschall) 1859
„ cingulatus Karsch 1891 = Simaetha cingulata (Karsch) 1891
„ cyaneus Peckham 1888, Emerton 1909 = Agassa cyanea (Hentz) 1846
„ deplanatus Karsch 1880 = nicht zu deuten!
„ gambeyi Simon 1880 = Pachyballus gambeyi (Simon) 1880
„ hirsutus Thorell 1877 = Rhene hirsuta (Thorell) 1877
„ hirsutus Hasselt 1882 = Rhene rubrigera (Thorell) 1887
„ hispidus Peckham 1900 = nicht zu deuten!
„ insularis Peckham 1885 = nicht zu deuten!
„ laminatus Karsch 1891 = Simaetha laminata (Karsch) 1891

Homalattus (Forts.):
„ latidens Thorell 1892 = Ligurra latidens (Doleschall) 1859
„ leucomela Thorell 1891 = Rhene leucomelas (Thorell) 1891
„ maccuni Peckham 1895 = Dryphias maccuni (Peckham) 1895
„ margarops Thorell 1877 = Rhene margarops (Thorell) 1877
„ mordax Thorell 1890, 1892 = Rhene mordax (Thorell) 1890
„ mus Simon 1889 = Rhene mus (Simon) 1889
„ nobilis Thorell 1890, 1892 = Stertinius nobilis (Thorell) 1890
„ opulentus L. Koch 1879 = Rhene opulenta (L. Koch) 1879
„ phoenicea Simon 1888 = Rhene phoenicea (Simon) 1888
„ reductus Karsch 1891 = Simaetha reducta (Karsch) 1891
„ rubriger Thorell 1887 = Rhene rubrigera (Thorell) 1887
„ rusticus Peckham 1895 = Dryphias maccuni (Peckham) 1895
„ septentrionalis Keyserling 1885 = Agassa cyanea (Hentz) 1846
„ sulfureus Simon 1885 = Rhene sulfurea (Simon) 1885
„ violaceus L. Koch 1879 = Simaethula violacea (L. Koch) 1879

Homalonychus:
„ selenopoides Banks 1898 = Homalonychus theologus Chamberlin 1924

Homoeomma:
„ stradlingi Cambridge 1881 = Homoeomma nigrum (Walckenaer) 1837
„ texense Simon 1890 = Rhechostica texensis (Simon) 1890
„ versicolor Ausserer 1871 = Homoeomma nigrum (Walckenaer) 1837

Hoplopholcus
„ absoloni Kulczynski 1914 (part.) = Stygopholcus absoloni (Kulczynski) 1914
„ absoloni Kulczynski 1914 (part.) = Stygopholcus skotophilus Kratochvil 1940

Hubba:
„ insignis Cambridge 1897, Banks 1929 = Theridion insignis (Cambridge) 1897

Hyarachne:
„ horrida Thorell 1899 = ? Scodra calcarata (Fabricius) 1783

Hybocoptus:
„ ericicola Simon 1884 = Hybocoptus decollatus ericicola (Simon) 1881

Hyctia:
„ canestrinii Simon 1876, Chyzer & Kulczynski 1891 = Mithion canestrinii (Canestrini & Pavesi) 1868
„ insignipes Simon 1880 = Corambis insignipes (Simon) 1880
„ xanthogramma Cambridge 1881 = Carrhotus xanthogramma (Walckenaer) 1825

Hyllus (= Hylla):
„ alternans C. L. Koch 1846 = Telamoniva vittata (C. L. Koch) 1846
„ barbipalpis Keyserling 1882 = Chalcotropis barbipalpis (Keyserling) 1882
„ calliethérinus Taczanowski 1878 = nicht zu deuten!
„ cambridgei Taczanowski 1878 = nicht zu deuten!
„ ceratodes Simon 1899, Reimoser 1929 = Hyllus keratodes (Hasselt) 1882
„ coccineovittatus Simon 1880, 1903 = Thyene coccineovittata (Simon) 1885
„ fuscomanus Taczanowski 1878 = nicht zu deuten!
„ heliophaninus Taczanowski 1878 = nicht zu deuten!
„ modestus Simon 1899 = Colyttus bilineatus Thorell 1891
„ mordax C. L. Koch 1846 = Dendryphantes mordax (C. L. Koch) 1846
„ morgani Simon 1885 = Carrhotus viduus (C. L. Koch) 1846
„ mutillaris Thorell 1892 = Hyllus diardi (Walckenaer) 1837
„ nobilis C. L. Koch 1846 = Dendryphantes nobilis (C. L. Koch) 1846
„ pratensis Peckham 1885 = Phiale pratensis (Peckham) 1885
„ pterygodes Keyserling 1882, L. Koch 1865 = Ascyltus pterygodes (L. Koch) 1865
„ pugnax C. L. Koch 1846 = Dendryphantes pugnax (C. L. Koch) 1846
„ quadrilunatus Taczanowski 1878 = nicht zu deuten!
„ rosenbergi Hasselt 1879 = nicht zu deuten!
„ solennis C. L. Koch 1848 = Lurio solennis (C. L. Koch) 1846
„ strenuus C. L. Koch 1846 = Dendryphantes strenuus (C. L. Koch) 1846

Hyllus (Forts.):
„ tenuipes Keyserling 1882 = Opisthoncus tenuipes (Keyserling) 1882
„ tumbezanus Taczanowski 1878 = nicht zu deuten!
Hylobihoggia:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Taurongia**
Hylobius:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Taurongia**
Hyloclubiona:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Clubiona**
Hypochilus:
„ davidi Simon 1888 = Ectatosticta davidi (Simon) 1888
Hypomma:
„ bilobatum Crosby 1905 = Hypomma marxii (Keyserling) 1886
„ bifrons Dahl 1886 = Dismodicus bifrons (Blackwall) 1841
„ trilobatum Crosby 1905 = Oedothorax trilobatus (Banks) 1896
Hypophthalma:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Hypognatha**
„ cordata Taczanowski 1879 = Scoloderus cordatus (Taczanowski) 1879
„ eresimorpha Taczanowski 1879 = Scoloderus eresimorphus (Taczanowski) 1879
Hypoplatea:
„ celer Mac Leay 1838 — Selenops celer (Mac Leay) 1839
„ fasciata Cantor 1842 = nicht zu deuten!
Hyposida:
„ Petrunkevitch 1928, Strand 1932 = **Hybosida** Simon 1897
Hyposinga:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Singa**
„ nigrifrons Ausserer 1871 = Singa heerii (Hahn) 1831
„ sanguinea Ausserer 1871 = Singa aussereri Thorell 1873
Hypositticus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Sitticus**
„ pubescens Lohmander 1944 = Sitticus truncorum (Linné) 1758
Hypsacantha:
„ crucimaculata Dahl 1914 = Gasteracantha crucimaculata Dahl 1914
Hypselistes:
„ semiflavus Kulczynski 1916 = Oedothorax semiflavus (L. Koch) 1879
Hypselomma:
„ altifrons Dahl 1886 = Entelecara acuminata (Wider) 1834
Hypsinotus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Corinna**
„ alticeps Keyserling 1891 = Diestus alticeps (Keyserling) 1891
„ capito L. Koch 1866 = Diestus kochi Simon 1898
„ rubripes L. Koch 1866 = Corinna kochi Petrunkevitch 1911
Hyptiotes (= Uptiotes):
„ alpinus C. Koch 1874, Lebert 1877 = Uptiotes paradoxus (C. L. Koch) 1837
„ americanus Wilder 1875 = Uptiotes cavatus (Hentz) 1847
„ anceps Thorell 1897, Chyzer & Kulczynski 1897 = Uptiotes flavidus (Blackwall) 1862
Hysterocratella:
„ ochraceus congona Strand 1919 = Hysterocrates ochraceus congonus (Strand) 1919
„ severini Strand 1919 = Hysterocrates severini (Strand) 1919
Hysterocrates:
„ camerunensis Strand 1907 = ? Hysterocrates laticeps Pocock 1897
„ maximus Strand 1907 ♀ = Hysterocrates greeffi (Karsch) 1884
„ sulcifer Strand 1908 = Hysterocrates robustus sulcifer (Strand) 1908
Icelus:
„ honestus C. L. Koch 1846 = Dendryphantes honestus (C. L. Koch) 1846
„ notabilis C. L. Koch 1846 = Icius hamatus (C. L. Koch) 1846

Icius:

- albobarbatus L. Koch 1879 = Clynotis albobarbatus (L. Koch) 1879
- albovittatus Keyserling 1883 = Sandalodes albovittatus (Keyserling) 1883
- albovittatus Keyserling 1885 = Dendryphantes marginatus (Walckenaer) 1837
- albovittatus Peckham 1888 = Hentzia palmarum (Hentz) 1832
- canadensis Banks 1897 = Dendryphantes canadensis (Banks) 1897
- congener Simon 1876, 1937 = Icius nebulosus (Simon) 1868
- convergens Thorell 1878 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
- cornutus Peckham 1885 = nicht zu deuten!
- crassiventer Keyserling 1885 = Dendryphantes capitatus (Hentz) 1846
- diminutus Banks 1896 = Euophrys diminuta (Banks) 1896
- discatus Karsch 1891 = nicht zu deuten!
- dissimilis Thorell 1881 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
- elegans Keyserling 1885, Emerton 1891, 1902, Peckham 1909 = Tutelina elegans (Hentz) 1846
- eximius Rainbow 1899 = nicht zu deuten!
- floridanus Banks 1895 = Icius wickhamii Peckham 1894
- formosus Banks 1892 = Hyctia bina (Hentz) 1846
- lineatus Peckham 1888 = Fuentes lineata (C. L. Koch) 1848
- maritus Karsch 1884 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
- minutus Banks 1895 = Talavera minuta (Banks) 1895
- mitratus Peckham 1894, Emerton 1891, 1902 = Hentzia mitrata (Hentz) 1846
- moestus Banks 1892 = Dendryphantes marginatus (Walckenaer) 1837
- montanus Banks 1896 = Chalcoscirtus montanus (Banks) 1896
- monticola Banks 1895 = Pseudicius monticola (Banks) 1895
- neomexicanus Banks 1901 = Dendryphantes neomexicanus (Banks) 1901
- nigromaculatus Keyserling 1885, Peckham 1909 = Dendryphantes nigromaculatus Keyserling 1885
- obliquus Banks 1895 = Neon nellii Peckham 1888
- palmarum Peckham 1888, Emerton 1891, 1902 = Hentzia palmarum (Hentz) 1832
- parvulus Keyserling 1883 = Clynotis parvulus (Keyserling) 1883
- peckhamae Cockerell 1897 = Salticus peckhamae (Cockerell) 1897
- piraticus Peckham 1888, Banks 1901 = Pseudicius piraticus (Peckham) 1888
- semiater L. Koch 1879 = Clynotis semiater (L. Koch) 1879
- semiferrugineus L. Koch 1879 = Clynotis semiferrugineus (L. Koch) 1879
- severus L. Koch 1879 = Clynotis severus (L. Koch) 1879
- striatus Simon 1876, 1901, Chyzer & Kulczynski 1891 = Icius hamatus (C. L. Koch) 1848
- subinermis Simon 1937 = Icius notabilis (Simon) 1871
- viduus L. Koch 1879 = Clynotis viduus (L. Koch) 1879
- vitis Peckham 1909 = Dendryphantes vitis Cockerell 1894
- vittatus Keyserling 1885 = Hentzia palmarum (Hentz) 1832

Ictidops:

- afolius Franganillo 1925 = nicht zu deuten!
- basseletii Pavesi 1880 = Aelurillus basseletii (Lucas) 1846
- bresnieri Pavesi 1880 = Phlegra bresnieri (Lucas) 1846
- constrictus Karsch 1880 = nicht zu deuten!
- deruptus Karsch 1880 = nicht zu deuten!
- fasciatus Bertkau 1880 = Phlegra fasciata (Hahn) 1826
- festivus Kulczynski 1884 = Aelurillus festivus (C. L. Koch) 1834
- foliosus Franganillo 1925 = nicht zu deuten!
- fulviventris Simon 1871 = Dendryphantes fulviventris (Lucas) 1846
- lineatus Pavesi 1878 = Phlegra lineata (C. L. Koch) 1848
- lippiens Pavesi 1878, 1880 = Phlegra bresnieri (Lucas) 1846
- monardi Pavesi 1888 = Aelurillus monardi (Lucas) 1846
- monoceros Karsch 1881 = Thorelliola monoceros (Karsch) 1881
- nitidiventris Pavesi 1880 = Phlegra nitidiventris (Lucas) 1846
- pupus Karsch 1879 = Aelurillus pupus (Karsch) 1879
- v-insignitus Kulczynski 1884 = Aelurillus litera v-insignitus (Clerck) 1757

Idiommata:
„ lepida Gerstäcker 1873 = Urothele lepida (Gerstäcker) 1873
Idionella:
„ formosa Banks 1893 = Ceraticelus formosus (Banks) 1892
Idiops:
„ aculeatus Walckenaer 1837 = Idiops fuscus Perty 1833
„ blackwallii Cambridge 1870 = Idiommata blackwallii (Cambridge) 1870
„ cambridgei Ausserer 1876 = Pseudidiops cambridgei (Ausserer) 1876
„ colletti Cambridge 1889 = Idiops crassus Simon 1884
„ kochii Cambridge 1870 = Strophaeus kochii (Cambridge) 1870
„ sigillatus Cambridge 1870 = Idiosoma sigillatum (Cambridge) 1870
Illenus:
„ arenarius Bösenberg 1903 = Yllenus arenarius Simon 1868
Inca:
„ branickii Taczanowski 1879 = Aspidolasius branickii (Taczanowski) 1879
Ino:
„ gracilis C. L. Koch 1850 = Pseudeuophrys callida (Walckenaer) 1802
„ nigra Simon 1864 = Phlegra fasciata (Hahn) 1831
„ psylla Simon 1864 = Sitticus terebratus (Olivier) 1789
„ pubescens C. L. Koch 1850, Simon 1864 = Sitticus truncorum (Linné) 1758
„ terebrata C. L. Koch 1850 = Sitticus terebratus (Clerck) 1757
„ tigrina C. L. Koch 1850, Simon 1864 = ? Pseudeuophrys callida (Walckenaer) 1802
Iola:
„ cowanii Peckham 1892 = Myrmarachne cowanii (Peckham) 1892
Iridopelma:
„ hirsuta Pocock 1901 = Avicularia hirsuta (Pocock) 1901
Isacantha:
„ hildebrandti Karsch 1878 = Gasteracantha cicatrosa C. L. Koch 1845
„ minax Keyserling 1886 = Gasteracantha minax Thorell 1859
Ischnapis:
„ aculeatus Simon 1893 = Ischnothyreus aculeatus (Simon) 1893
„ peltifera Simon 1891 = Ischnothyreus peltifer (Simon) 1891
Ischnocolus:
„ alticeps Keyserling 1877 = ? Eurypelma alticeps (Keyserling) 1877
„ asper Simon 1891 = Phlogiellus asper (Simon) 1891
„ baeri Simon 1877 = Phlogiellus baeri (Simon) 1877
„ brevipes Thorell 1897 = Neochilobrachys brevipes (Thorell) 1897
„ doleschalli Ausserer 1871 = Eurypelma doleschalli (Ausserer) 1871
„ fuscoannulatus Strand 1908 = ? Ischnocolus maroccanus (Simon) 1873
„ gracilis Keyserling 1891 = Eurypelma gracile (Keyserling) 1891
„ hirsutus Ausserer 1875 = Eurypelma hirsutum (Ausserer) 1875
„ inermis Ausserer 1871 = Phlogiellus inermis (Ausserer) 1871
„ insularis Simon 1877 = Phlogiellus insularis (Simon) 1877
„ janeirus Keyserling 1891 = Magulla janeira (Keyserling) 1891
„ lineatus Simon 1891 = Plesiophrictus lineatus (Simon) 1891
„ lucubrans L. Koch 1873 = Phlogiellus lucubrans (L. Koch) 1873
„ nebulosus Rainbow 1899 = Phlogiellus nebulosus (Rainbow) 1899
„ nigrescens Keyserling 1891 = Homoeomma villosum (Keyserling) 1891
„ obscurus Ausserer 1875 = Eurypelma obscurum (Ausserer) 1875
„ ornatus Thorell 1897 = Phlogiellus ornatus (Thorell) 1897
„ parvus Keyserling 1877 = Eurypelma parvum (Keyserling) 1877
„ pilosus Keyserling 1891 = Homoeomma villosum (Keyserling) 1891
„ rubropilosus Keyserling 1891 = nicht zu deuten!
„ sericeus Ausserer 1875 = Eurypelma sericeum (Ausserer) 1875
„ striatocauda Ausserer 1875 = Chaetopelma olivaceum (C. L. Koch) 1842

Ischnothele:
„ annectens Mello-Leitao 1923 = Thalerothele annectens (Bertkau) 1880
„ funestra Petrunkevitch 1939 = Ischnothele funesta (Fischel) 1927
„ gracilis Tucker 1917 = Ischnothele karschi (Bösenberg & Lenz) 1895
„ subdigitata Strand 1907 = Ischnothele digitata (Cambridge) 1892

Ischnyphantes:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Meioneta**

Isigonia:
„ limbata Simon 1896, 1897 = Teudis limbatus (Simon) 1896

Islandiana:
„ alata Braendegaard 1937, 1940 = Aduva alata (Emerton) 1919

Isoctenus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Ctenus**

Isopeda (= Isopoda):
„ armillata Gravely 1931 = Torania armillata (Thorell) 1887
„ barbata L. Koch 1875 = Typostola barbata (L. Koch) 1875
„ beccarii malangana Strand 1907 = Torania beccarii malangana (Strand) 1907
„ horni Hogg 1896 = Pedina horni (Hogg) 1896
„ imerinensis Simon 1880, Lenz 1891 = Rhitymna imerinensis (Vinson) 1863
„ maculata Simon 1880 = Polybetes pythagoricus (Holmberg) 1875
„ martius Simon 1880 = Polybetes martius (Nicolet) 1849
„ occidentalis Simon 1887 = Toriania occidentalis (Simon) 1887
„ striatipes Leardi 1901 = Torania striatipes (Leardi) 1901
„ valida Simon 1880 = Rhitymna valida (Blackwall) 1877
„ viridis Simon 1880 = nicht zu deuten!
„ woodwardi Simon 1908 = Isopeda simoni Rainbow 1911

Isopus:
„ longipes Taczanowski 1872 = Tapinillus longipes (Taczanowski) 1872

Isoxia (= Isoxya):
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Gasteracantha**

Ithyomma:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Wideria**

Itys:
„ pergrata Cambridge 1894 = Itytis pergrata (Cambridge) 1894

Ixalus:
„ varius L. Koch 1873 = Ixamatus varius (L. Koch) 1873

Jacksonia:
„ capito Smith 1905 = Wideria capito (Westring) 1862
„ cornuta Smith 1905 = Walckenaeria acuminata Blackwall 1833
„ nodosa Smith 1905 = Wideria nodosa (Cambridge) 1873
„ nudipalpis Smith 1905 = Trachynella nudipalpis (Westring) 1851
„ obtusa Smith 1905 = Trachynella obtusa (Blackwall) 1836

Janigena:
„ melanocephala Karsch 1880, Peckham 1886 = Myrmarachne kochi Reimoser 1925

Janulus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Janula**

Janus:
„ armatus Taczanowski 1871 = Sarinda armata (Taczanowski) 1871
„ atratus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ cayennensis Taczanowski 1871 = Cineas cayennensis (Taczanowski) 1871
„ gibberosus C. L. Koch 1846 = Synemosyna formica Hentz 1846
„ longulus Taczanowski 1871 = Zuniga longula (Taczanowski) 1871
„ lucasii Taczanowski 1871 = Simonella lucasii (Taczanowski) 1871
„ melanocephalus C. L. Koch 1846 = Myrmarachne kochi Reimoser 1925
„ mutillaeformis Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ myrmeciaeformis Taczanowski 1871 = Simonella myrmeciaeformis (Taczanowski) 1871

Janus (Forts.):
„ obscurus Taczanowski 1871 = nicht zu deuten!
„ subtilis Taczanowski 1871 = Synemosyna subtilis (Taczanowski) 1871
„ wankowiczii Taczanowski 1871 = Zuniga wankowiczii (Taczanowski) 1871
Jasoda:
„ woodii Peckham 1902, 1903 = Baryphas woodii (Peckham) 1902
Jelskia:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Lyssomanes**
„ gracilis Taczanowski 1872 = Chinoscopus gracilis (Taczanowski) 1872
Jotus:
„ albocircumdatus L. Koch 1880 = Hasarius albocircumdatus (L. Koch) 1880
„ cinctus Thorell 1899 = Thiratoscirtus cinctus (Thorell) 1899
„ formosus Rainbow 1899 = Mollika formosa (Rainbow) 1899
„ microphthalmus L. Koch 1881 = Mollika microphthalma (L. Koch) 1881
„ opimus Peckham 1885 = Corythalia opima (Peckham) 1885
„ semiater Peckham 1885 = Echinussa praedatoria (Keyserling) 1877
„ ultimus L. Koch 1881 = Viroqua ultima (L. Koch) 1881
Justella:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Synema**
Katadysas:
„ pumila Hentz 1850 = Zora pumila (Hentz) 1850
Keyserlingia:
„ cornigera Cambridge 1890 = Micrathena cornigera (Cambridge) 1890
Kochia:
„ sylvicola Menge 1850 = Cryphoeca silvicola (C. L. Koch) 1834
Kolosvarya:
„ perroti Strand 1934 = Paramigas perroti (Simon) 1891
Kulczynskiellum:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Oedothorax**
„ adipatum Odenvall & Järvi 1901 = Oreonetides vaginatus (Thorell) 1872
Labdacus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Senoculus**
„ monastoides Cambridge 1873 = Senoculus monastoides (Cambridge) 1873
„ monastoides Cambridge 1896 ♂ = Senoculus cambridgei Mello-Leitao 1927
„ parallelus Simon 1880 = Senoculus gracilis (Keyserling) 1879
Laches:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Lachesana**
„ scutiventris Simon 1893 = Lachesana rufiventris (Simon) 1873
Lachese:
„ blackwalli Simon 1873 = Lachesana blackwalli (Cambridge) 1872
Lachesis:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Lachesana**
„ meadii Cambridge 1872 = Storena meadii (Cambridge) 1872
„ reticulata Simon 1870 = Storena reticulata (Simon) 1870
Lagenicola:
„ doumercii Simon 1864 = nicht zu deuten!
Lagnus:
„ ruber Workman 1896 = Eupalina praemandibularis (Hasselt) 1893
Lampona:
„ cylindrata Simon 1908 = Lampona pseudocylindrata (Strand) 1922
„ sordida L. Koch 1873 = Lampona cylindrata (L. Koch) 1866
Landana:
„ lautiuscula Dalmas 1917 = Meta rufolineata (Urquhart) 1888
Lanuarulla:
„ pretiosa Peckham 1886, 1901 = Lauharulla pretiosa Keyserling 1883
Larinia:
„ bellona Banks 1898 = Drexelia bellona (Banks) 1898
„ directa Simon 1894, Banks 1894, 1909, Emerton 1902 = Drexelia directa (Hentz) 1847

Larinia (Forts.):
„ fissicauda Simon 1895 = Cyclosa bifurca (Mc Cook) 1887
„ forata Keyserling 1893 = Larinia nigrofoliata Keyserling 1884
„ graciosa Simon 1896 = nom. nud.
„ peltiventris Strand 1913 = ? Larinia punctipedana Strand 1913

Lasaeola:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Dipoena**
„ auberti Simon 1881 = Dipoena umbratilis (Simon) 1873
„ bösenbergi Strand 1902 = Dipoena inornata (Cambridge) 1861
„ cancellata Emerton 1882 = Conopistha (Argyrodina) cancellata (Hentz) 1850
„ dissimilis Cambridge 1906 ♂ = Dipoena dissimilis (Cambridge) 1906
„ dissimilis Cambridge 1906 ♀ = Dipoena inornata (Cambridge) 1861
„ jucunda Cambridge) 1881 = Dipoena prona (Menge) 1868
„ nigrina Simon 1881 = Dipoena coracina (C. L. Koch) 1837
„ proxima Cambridge 1895 = Dipoena erythropus (Simon) 1881
„ pyramidalis Simon 1881 = Theridion conigerum Simon 1914
„ torva Simon 1881 = Dipoena torva (Thorell) 1875
„ torva Bösenberg 1902 = Dipoena procax (Simon) 1879

Lasiocnemus:
„ grossus Ausserer 1871 = Lasiopelma grossum (Ausserer) 1871

Lasiodora:
„ augusti Simon 1888 = Pamphobeteus augusti (Simon) 1888
„ bahiensis Strand 1907 = Lasiodora klugii (C. L. Koch) 1842
„ benedenii Bertkau 1880 = Pamphobeteus benedenii (Bertkau) 1880
„ campestrata Simon 1897 = Eupalaestrus campestratus (Simon) 1891
„ cauta Ausserer 1875 = Phormictopus cautus (Ausserer) 1875
„ ferox Ausserer 1875 = Pamphobeteus ferox (Ausserer) 1875
„ fortis Ausserer 1875 = Pampobeteus fortis (Ausserer) 1875
„ immanis Ausserer 1875 = Xenesthis immanus (Ausserer) 1875
„ nigricolor Ausserer 1875 = Pamphobeteus nigricolor (Ausserer) 1875
„ robusta Ausserer 1875 = Megaphobema robusta (Ausserer) 1875
„ rosea C. L. Koch 1850 = ? Grammostola spatulata (F. Cambridge) 1897
„ versicolor C. L. Koch 1850 = Homoeomma nigrum (Walckenaer) 1837

Lathys:
„ alba Keyserling 1890 = Callevophthalmus albus (Keyserling) 1890
„ difficilis Mello-Leitao 1919 = Notolathys difficilis (Mello-Leitao) 1919
„ hirsutipes Banks 1921 = Tricholathys hirsutipes (Banks) 1921
„ maculina Gertsch 1946 = Lathys maculata (Banks) 1900
„ meridionalis Simon 1910 = Lathys humilis meridionalis (Simon) 1874
„ pinea Chamberlin & Ivie 1944 = Thallumetus pineus (Chamberlin & Ivie) 1944
„ stigmatisata Kulczynski 1898, Lessert 1910, Locket & Millidge 1951, Wiehle 1953 = Lathys puta (Cambridge) 1863
„ trivittata Petrunkevitch 1911 = Mallos trivittatus (Banks) 1901

Latona:
„ cylindrata L. Koch 1866 = Lampona cylindrata (L. Koch) 1866

Latonigena:
„ brasiliana Mello-Leitao 1941 = Zelotes brasilianus (Keyserling) 1891

Latrodectus:
„ albomaculatus Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
„ ancorifer Dahl 1902 = Latrodectus hasselti ancorifer (Dahl)
„ apicalis Butler 1877 = Latrodectus mactans (Fabricius) 1775
„ argus Audouin 1827, Lucas 1838 = Latrodectus tredecimguttatus (Rossi) 1790
„ armatus Simon 1864 = Lithyphantes paykullianus (Walckenaer) 1805
„ conglobatus C. L. Koch 1838 = Latrodectus tredecimguttatus (Rossi) 1790
„ distinctus Blackwall 1859 = Lithyphantes distinctus (Blackwall) 1859
„ dotatus C. L. Koch 1841, Simon 1864 = Latrodectus mactans (Fabricius) 1775
„ elegans Thorell 1898 = Latrodectus hasselti elegans (Thorell) 1898
„ erebus Audouin 1827, Simon 1864 = Latrodectus tredecimguttatus (Rossi) 1790

Latrodectus (Forts.):
- „ formidabilis Walckenaer 1837, Nicolet 1849 = Latrodectus mactans (Fabricius) 1775
- „ geographicus Hasselt 1888 = Latrodectus curacaviensis (Müller) 1776
- „ hispidus Walckenaer 1841, Simon 1864 = Latrodectus tredecimguttatus (Rossi) 1790
- „ indicus Simon 1897 = Latrodectus hasselti indicus (Simon) 1897
- „ insularis Dahl 1902 = Latrodectus mactans insularis (Dahl) 1902
- „ intersector Walckenaer 1837, Simon 1864 = Latrodectus mactans (Fabricius) 1775
- „ katipo Powell 1870 = Latrodectus hasselti Thorell 1870
- „ limacida Cantor 1842 = nicht zu deuten!
- „ lugubris Motschulsky 1849 = Latrodectus tredecimguttatus (Rossi) 1790
- „ lunifer Dahl 1902 = Latrodectus mactans lunifer (Dahl) 1902
- „ malmignatus Walckenaer 1837 = Latrodectus tredecimguttatus (Rossi) 1790
- „ malmignatha Simon 1864 = Latrodectus mactans (Fabricius) 1775
- „ malmignatus tropica Hasselt 1860 = Latrodectus mactans (Fabricius) 1775
- „ martius Audouin 1827, Simon 1864 = Lithyphantes paykullianus (Walckenaer) 1805
- „ martius Walckenaer 1837 = Latrodectus tredecimguttatus (Rossi) 1790
- „ menavoudi Simon 1864 = Latrodectus menavodi Vinson 1863
- „ oculaius Walckenaer 1837, Simon 1864 = Latrodectus tredecimguttatus (Rossi) 1790
- „ ornatus Lucas 1846 = Lithyphantes paykullianus (Walckenaer) 1805
- „ perfidus Walckenaer 1837, Simon 1864 = Latrodectus mactans (Fabricius) 1775
- „ IV-guttatus C. L. Koch 1850 = Titanoeca quadriguttata (Hahn) 1831
- „ quinqueguttatus Krynicki 1837 = Latrodectus tredecimguttatus (Rossi) 1790
- „ scelio Thorell 1870 = Latrodectus hasselti Thorell 1870
- „ spinipes Lucas 1846, Simon 1864 = Asagena phalerata (Panzer) 1801
- „ thoracicus Nicolet 1849, Keyserling 1886 = Latrodectus mactans (Fabricius) 1775
- „ tristis Canestrini & Pavesi 1870 = ? Titanoeca tristis L. Koch 1872
- „ variegatus Nicolet 1849, Simon 1864 = Latrodectus mactans (Fabricius) 1775
- „ variolatus Walckenaer 1837, Simon 1864 = Latrodectus mactans (Fabricius) 1775
- „ venator Audouin 1827, Simon 1864 = Lithyphantes paykullianus (Walckenaer) 1805
- „ venator Walckenaer 1837 = Latrodectus tredecimguttatus (Rossi) 1790

Lauricius:
- „ hemiclaeinus F. Cambridge 1900 = Lauricius hemicloeinus Simon 1888

Leaena:
- „ villica tridens Simon 1937 = Leaenella tridens (Simon) 1937

Leimonia:
- „ atomaria Simon 1864 = Pardosa atomaria (C. L. Koch) 1848
- „ audax Simon 1864 = Alopecosa inquilina (Clerck) 1757
- „ blanda Simon 1864 = Pardosa blanda (C. L. Koch) 1834
- „ dubia Simon 1864 = Allocosa dubia (Walckenaer) 1837
- „ fumigata Simon 1864, Ohlert 1867 = Pardosa paludicola (Walckenaer) 1825
- „ gulosa Simon 1864 = Varacosa gulosa (Walckenaer) 1837
- „ helluo Simon 1864 = Hogna helluo (Walckenaer) 1837
- „ indagatrix Simon 1864 = Hogna indagatrix (Walckenaer) 1837
- „ intrepida Simon 1864 = nicht zu deuten!
- „ invenusta Simon 1864 = Pardosa invenusta (C. L. Koch) 1837
- „ milbertii Simon 1864 = Hogna carolinensis (Walckenaer) 1805
- „ nigra Simon 1864 = Acantholycosa nigra (C. L. Koch) 1834
- „ pallida Simon 1864 = Pardosa wagleri (Hahn) 1822
- „ paludicola C. L. Koch 1850, Simon 1864, Ohlert 1867 = Pardosa amentata (Clerck) 1757

Leimonia (Forts.):
- „ pelliona Simon 1864 = Ocyale pelliona (Audouin) 1827
- „ pilipes Simon 1864 = Arctosa cinerea (Fabricius) 1776
- „ pullata C. L. Koch 1850 = Pardosa monticola (Clerck) 1757
- „ pullata Ohlert 1867 = Pardosa pullata (Clerck) 1757
- „ pullata Canestrini & Pavesi 1870 = nicht zu deuten!
- „ raptoria Simon 1864 = Scaptocosa raptoria (Walckenaer) 1837
- „ riparia Simon 1864, Ohlert 1867 = Pardosa kervillei Simon 1937
- „ say Simon 1864 = Hogna helluo (Walckenaer) 1837
- „ solers Simon 1864 = Pardosa monticola (Clerck) 1757
- „ valida Simon 1864 = Lycosa valida Lucas 1846

Leitanoctenus:
- „ spinulosus Soares & Camargo 1948 = Acanthoctenus spinulosus (Mello-Leitao) 1929

Lepthyphantes (= **Lephthyphantes** = **Leptyphantes**):
- „ abnormis Bösenberg 1901 = Oreonetides abnormis (Blackwall) 1841
- „ acceptus Cambridge 1903 = Lepthyphantes zimmermanni Bertkau 1890
- „ albulus Simon 1884 = Lepthyphantes frigidus Simon 1884
- „ albulus Kulczynski 1916 = Lepthyphantes kochiellus (Strand) 1900
- „ angulifer Simon 1884 = Lepthyphantes angulatus (Cambridge) 1881
- „ angulipalpis Simon 1884 = Lepthyphantes kochii Kulczynski 1898
- „ arcuatus Petrunkevitch 1911 = Lepthyphantes arcuatulus Roewer 1942
- „ beatula Cambridge 1911 = Lepthyphantes ericaeus (Blackwall) 1853
- „ bidens Simon 1884 = Lepthyphantes mansuetus (Thorell) 1875
- „ blackwalli Chyzer & Kulczynski 1894 = Lepthyphantes zimmermanni Bertkau 1890
- „ cacuminum Jackson 1914 = Lepthyphantes audax Soerensen 1898
- „ calypso Bösenberg 1901 = Porrhomma calypso (Bertkau) 1883
- „ cavernarum Roewer 1928 = Troglohyphantes cavernarum (L. Koch) 1872
- „ cingulipes Simon 1884 = Lepthyphantes minutus (Blackwall) 1866
- „ complicatus Jackson 1933 = Lepthyphantes washingtoni Zorsch 1937
- „ crucifer Simon 1884, Chyzer & Kulczynski 1894, Bösenberg 1901 = Bolyphantes crucifer (Menge) 1866
- „ crypticola Menge 1866 = Lepthyphantes nebulosus (Sundevall) 1830
- „ culminicola Simon 1884 = Lepthyphantes monticola (Kulczynski) 1881
- „ dubius Cambridge 1898 = Oedothorax dubius (Cambridge) 1898
- „ euchirus Simon 1884 = Aprolagus lugubris (Blackwall) 1834
- „ flavipes Lessert 1915 = Lepthyphantes pygmaeus (Menge) 1866
- „ ictericus Simon 1929 = Lepthyphantes eugeni Roewer 1942
- „ inconspicuus Simon 1884 = Lepthyphantes ericaeus (Blackwall) 1853
- „ infirmus Simon 1884 = Lepthyphantes angulipalpis (Westring) 1851
- „ lepidus Simon 1884 = Lepthyphantes expunctus (Cambridge) 1875
- „ lepthyphantiformis Roewer 1928 = Troglohyphantes lepthyphantiformis (Strand) 1907
- „ mansuetus Simon 1884 = Lepthyphantes simonis Kulczynski 1894
- „ mengei Kulczynski 1887, 1894, Lessert 1910, Braendegaard 1932 = Lepthyphantes pygmaeus (Menge) 1866
- „ mengei Müller-Schenkel 1895 = Lepthyphantes flavipes Bösenberg 1901
- „ mengei Bösenberg 1901 = Lepthyphantes gallicus Simon 1929
- „ miser Simon 1884 = Lepthyphantes ericaeus (Blackwall) 1853
- „ mitis Simon 1913 = Lepthyphantes stygius Simon 1834
- „ monodon Simon 1884 = Lepthyphantes sancti-vincenti (Simon) 1872
- „ muscicola Menge 1866 = Lepthyphantes minutus (Blackwall) 1866
- „ oblitus Simon 1884 = Porrhomma oblitum (Cambridge) 1870
- „ oblivius Simon 1884 = Aprolagus mollis (Cambridge) 1870
- „ obscurus Fedotow 1912 = Lepthyphantes murmanicola Strand 1913
- „ occidentalis Emerton 1919 = Lepthyphantes fructuosus (Keyserling) 1886
- „ orbatus Hull 1932 = Lepthyphantes flavipes Bösenberg 1901

Lepthyphantes (Forts.):
- „ pallidus Simon 1884 (part.) = Lepthyphantes troglodytes (L. Koch) 1872
- „ pallidus Chyzer & Kulczynski 1894 et sequ. = Lepthyphantes relativus (Cambridge) 1879
- „ patens Cambridge 1907 ♂ = Centromerus subacutus (Cambridge) 1891
- „ patens Cambridge 1907 ♀ = Lepthyphantes relativus (Cambridge) 1879
- „ pellucidus Simon 1884 = Lepthyphantes ericaeus (Blackwall) 1853
- „ pictus Simon 1884 = Taranucnus setosus (Cambridge) 1863
- „ plumiger F. Cambridge 1892 = Centromerus dilutus (Cambridge) 1875
- „ prodigialis Simon 1884 = Lepthyphantes angustiformis Simon 1884
- „ pusillus Hull 1932 = Lepthyphantes tenuis (Blackwall) 1852
- „ quadrimaculatus Kulczynski 1898 = Lepthyphantes keyserlingi (Ausserer) 1867
- „ relativus Simon 1884 = Lepthyphantes cristatus (Menge) 1866
- „ simoni Lessert 1910 = Lepthyphantes simonis Kulczynski 1894
- „ simoni Bösenberg 1901 = Lepthyphantes zimmermanni Bertkau 1890
- „ subnigripes Simon 1884 = Bolyphantes luteolus (Blackwall) 1833
- „ striatus Simon 1884, 1894 = Lepthyphantes pulcher (Kulczynski) 1881
- „ tenebricola Simon 1884, Becker 1896, Chyzer & Kulczynski 1894 = Lepthyphantes tenuis (Blackwall) 1852
- „ terricola Lessert 1910 = Lepthyphantes alacris (Blackwall) 1853
- „ turbator Simon 1884 = Lepthyphantes turbatrix (Cambridge) 1877
- „ zebrinus Simon 1884, Becker 1896 = Lepthyphantes zimmermanni Bertkau 1890
- „ zebrinus Müller-Schenkel 1895 = nicht zu deuten!
- „ zebrinus Kulczynski 1904 = Lepthyphantes parallelogrammus Simon 1884

Leptoctenus:

Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Ctenus**

Leptodrassus:
- „ femineus Chyzer & Kulczynski 1897 = Leptodrassus croaticus Dalmas 1919
- „ insulanus Rainbow 1901 = Hypodrassodes insulanus (Rainbow) 1901
- „ masculinus Strand 1942 = Leptodrassus simoni Dalmas 1919
- „ scutatus Simon 1879 = Echemus scutatus (Simon) 1879
- „ seriatus Karsch 1891 = Argistes seriatus (Karsch) 1891
- „ tenerrimus Simon 1914 = Leptodrassus simoni Dalmas 1919

Leptoneta:
- „ italica Simon 1907 = Paraleptoneta italica (Simon) 1907
- „ manca Simon 1914 = Leptoneta proserpina manca Fage 1913
- „ spinimana Simon 1884 = Paraleptoneta spinimana (Simon) 1884

Leptopelma:
- „ africanum Ausserer 1875 = Leptopelma elongatum (Simon) 1873
- „ cubana Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
- „ meridionale Ausserer 1875 = Nemesia meridionalis (Costa) 1835

Leptopholcus:
- „ conicus Franganillo 1931, 1934 = nicht zu deuten!
- „ delicatulus Franganillo 1930 = nicht zu deuten!

Leptorchestes:
- „ berolinensis Simon 1876 et sequ. = Leptorchestes cinctus (Dugès) 1836
- „ chrysopogon Simon 1876, Peckham 1882 = Leptorchestes mutilloides (Lucas) 1846
- „ cognatus L. Koch 1879 = Myrmarachne cognata (L. Koch) 1879
- „ cupreus Hogg 1896 = Myrmaranche cuprea (Hogg) 1896
- „ erythrocephalus L. Koch 1879 = Myrmarachne erythrocephala (L. Koch) 1879
- „ fornasinii Pavesi 1881 = Araegeus fornasinii (Pavesi) 1881
- „ formicaeformis Thorell 1870, Simon 1871 = Leptorchestes cinctus (Dugès) 1836
- „ georgius Peckham 1892 = Quekettia georgia (Peckham) 1892
- „ luctuosus L. Koch 1879 = Myrmarachne luctuosa (L. Koch) 1879
- „ ludibundus Simon 1875 = Synageles venator (Lucas) 1835
- „ simoni L. Koch 1879 = Myrmarachne simoni (L. Koch) 1879

Leptorchestes (Forts.):
„ striatipes L. Koch 1879 = Myrmarachne striatipes (L. Koch) 1879
„ subcingulatus Simon 1878 = Synageles subcingulatus (Simon) 1878
„ todillus Simon 1871, 1876 = Synageles dalmaticus (Keyserling) 1863
„ venator Simon 1871, Pavesi 1873 = Synageles venator (Lucas) 1835
Leptorhoptrum:
„ conigerum Dahl 1912 = Agyneta conigera (Cambridge) 1863
Leptostylus:
„ scopulata Fischel 1927 = Leptofischelia scopulata (Fischel) 1927
Leptothrix:
„ clavipes Menge 1869 = Phaulothrix hardii (Blackwall) 1850
„ hardii Bertkau 1880, Dahl 1912 = Phaulothrix hardii (Blackwall) 1850
Leptyphantes siehe **Lepthyphantes**
Lessertia:
„ simplex Smith 1908 = Lessertia dentichelis (Simon) 1884
Lessertiola Strand 1929 = **Berlandia** Lessert 1921, Juni (nec Dalmas 1921, August)
Lethia:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichen Artnamen bei **Lathys**
„ albispiraculis Cambridge 1878, 1879 = Argenna subnigra (Cambridge) 1861
„ lucida Simon 1874 = Altella lucida (Simon) 1874
„ mengei Simon 1874 = Argenna subnigra (Cambridge) 1861
„ mengii Cambridge 1879 = Argenna subnigra (Cambridge) 1861
„ meridionalis Simon 1874 = Lathys humilis meridionalis (Simon) 1874
„ pallida Emerton 1894 = Lathys alberta (Gertsch) 1945
„ patula Cambridge 1878 = Argenna patula (Simon) 1874
„ spinigera Cambridge 1881 = Altella lucida (Simon) 1874
„ stigmatisata Menge 1869 = Lathys puta (Cambridge) 1863
„ subnigra Cambridge 1875, 1881 = Argenna subnigra (Cambridge) 1861
„ trivittata Banks 1901, 1902, Petrunkevitch 1911 = Mallos trivittatus (Banks) 1901
„ varia Menge 1869 = Lathys humilis (Blackwall) 1855
Leucauge:
„ alticola Strand 1913 = Leucauge signiventris Strand 1913
„ annulipedella Strand 1913 = Leucauge reimoseri Strand 1936
„ fastigiata Simon 1905 = Leucauge fastigata (Simon) 1877
„ hortorum Banks 1909 = Leucauge venusta (Walckenaer) 1841
„ maura F. Cambridge 1903 = Singa maura (Hentz) 1847
„ nigrotrivittata Simon 1905 = Leucauge celebesiana (Walckenaer) 1841
„ sexpustulata Simon 1906 = Leucauge culta (Cambridge) 1869
„ ungulatella Strand 1907 = ? Leucauge ungulata (Karsch) 1879
Libania:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Cebrenninus**
„ armillata Thorell 1890, 1892 = Cebrenninus rugosus Simon 1887
Licosa siehe **Lycosa**
Ligurinus:
„ scopifer Karsch 1878, Peckham 1886 = Karschiola scopifera (Karsch) 1878
Limoxera:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Tetragnatha**
„ lineata Thorell 1890 = Tetragnatha lineatula Roewer 1942
Linus:
„ dentipalpis Thorell 1890 = Erasinus labiatus (Thorell) 1887
„ labiatus Thorell 1887 = Erasinus labiatus (Thorell) 1887
Linyphia:
„ abnormis Cambridge 1879 = Oreonetides abnormis (Blackwall) 1841
„ abrupta Karsch 1879 = Steatoda abrupta (Karsch) 1879
„ aeria Cambridge 1875, 1879 = Aprolagus mollis (Cambridge) 1870
„ affinis Westring 1862 = Bolyphantes luteolus (Blackwall) 1833
„ alacris Blackwall 1853 = Lepthyphantes alacris (Blackwall) 1853

Linyphia (Forts.):

„ albiapiata Urquhart 1890 = nicht zu deuten!
„ albicincta Cambridge 1863 = Linyphia hortensis Sundevall 1829
„ albimaculata Cambridge 1873 = Lepthyphantes albimaculatus (Cambridge) 1873
„ albomaculata Grube 1861 = nicht zu deuten!
„ albomaculata Ohlert 1867 = Floronia frenata (Wider) 1834; jetzt: Floronia bucculenta (Clerck) 1757
„ albomaculata Canestrini & Pavesi 1870 = Linyphia clathrata Sundevall 1830
„ albonotata Keyserling 1886 = Sthelota albonotata (Keyserling) 1886
„ albula Cambridge 1861, Blackwall 1869 = ? Lepthyphantes frigidus Simon 1884
„ albula L. Koch 1879 = Lepthyphantes kochiellus (Strand) 1900
„ albuloides Cambridge 1872 = Lepthyphantes albuloides (Cambridge) 1872
„ alpina Herman 1879 = Lepthyphantes mughi (Fickert) 1875
„ alpina Marx 1889 = Lepthyphantes alpinus Emerton 1882
„ alticeps Sundevall 1832, Thorell 1870, Cambridge 1881, Dahl 1883 = Bolyphantes alticeps (Sundevall) 1832
„ alticeps Blackwall 1864 = Bolyphantes luteolus (Blackwall) 1833
„ angulata Cambridge 1881 = Lepthyphantes angulatus (Cambridge) 1873
„ angulata Marx 1889 = Bathyphantes angulatus (Emerton) 1882
„ angulipalpis Westring 1851, 1862, Thorell 1870 = Lepthyphantes angulipalpis (Westring) 1851
„ angulipalpis Cambridge 1873 = Lepthyphantes angulatus (Cambridge) 1873
„ annulata Kulczynski 1882 = Lepthyphantes annulatus (Kulczynski) 1882
„ annulipes Blackwall 1833 = Drapetisca socialis (Sundevall) 1832
„ anthracina Blackwall 1853 = Stylophora dorsalis (Wider) 1834
„ antipodiana Berland 1925 = Mynoglenes insolens Simon 1905
„ approximata Cambridge 1870, 1879, Thorell 1875 = Stylophora approximata (Cambridge) 1870
„ arcana Cambridge 1873 = Centromerus arcanus (Cambridge) 1873
„ arcigera Kulczynski 1882 = Lepthyphantes arciger (Kulczynski) 1882
„ arctica Keyserling 1886 = Bathyphantes arcticus (Keyserling) 1886
„ arcuata Thorell 1856, 1873 = Lepthyphantes tenebricola (Wider) 1834
„ arcuata Keyserling 1886 = Lepthyphantes arcuatulus Roewer 1942
„ argentea Taczanowski 1874 = Leucauge taczanowskii (Marx) 1893
„ argentea Simon 1894 = Conopistha (Argyrodina) argentata (Cambridge) 1880
„ argentella Strand 1907 = ? Conopistha (Argyrodina) argentata (Cambridge) 1880
„ argyrobapta White 1841 = Leucauge argyrobapta (White) 1841
„ argyrodes Walckenaer 1841, Vinson 1863 = Conopistha (Argyrodina) argyrodes (Walckenaer) 1841
„ aride Thorell 1875 = Lepthyphantes aridus (Thorell) 1875
„ aurulenta C. L. Koch 1845 = Leucauge venusta (Walckenaer) 1841
„ autumnalis Hentz 1850 = Lepthyphantes nebulosus (Sundevall) 1830
„ bicolor Thorell 1870, Cambridge 1879, Dahl 1883 = Centromerita bicolor (Blackwall) 1833
„ bicolor Banks 1905 = Linyphia banksi Petrunkevitch 1911
„ bihamata Marx 1889 = Lepthyphantes bihamatus (Emerton) 1882
„ bimaculata C. L. Koch 1834 = Theridion bimaculatum (Linné) 1767
„ blattifera Urquhart 1886 = Stylophora blattifera (Urquhart) 1886
„ bonadea Bösenberg & Strand 1906 = Conopistha (Argyrodina) argentea (Cambridge) 1880
„ branickii Taczanowski 1874 = Chrysometa branickii (Taczanowski) 1874
„ brevipalpus Fickert 1876 = Centromerus aequalis (Westring) 1862
„ brevipes Keyserling 1886 = Lepthyphantes brevipes (Keyserling) 1886
„ bucculenta Sundevall 1831, Westring 1862, Blauvelt 1936 = Stemonyphantes lineatus (Linné) 1758
„ bucculenta Walckenaer 1841 = Drapetisca socialis (Sundevall) 1832

Linyphia (Forts.):

„ calypso Bertkau 1883 = Porrhomma calypso (Bertkau) 1883
„ canadensis Marx 1889 = Bathyphantes canadensis (Emerton) 1882
„ canestrinii Pavesi 1873 = Linyphia clathrata Sundevall 1830
„ cauta Blackwall 1841, 1864 = Labulla thoracica (Wider) 1834
„ cavernarum L. Koch 1872 = Troglohyphantes cavernarum (L. Koch) 1872
„ cellulana Sundevall 1831 = Nesticus cellulanus (Clerck) 1757
„ cerina L. Koch 1879 = nicht zu deuten!
„ cincta Waldkenaer 1841 = nicht zu deuten!
„ cingulipes Cambridge 1870, 1881 = Lepthyphantes minutus (Blackwall) 1833
„ circumcincta Cambridge 1870, 1879 = Linyphia impigra Cambridge 1870
„ circumflexa C. L. Koch 1845, Ohlert 1867 = Lepthyphantes nebulosus (Sundevall) 1830
„ circumspecta Blackwall 1854, 1864, Cambridge 1879 = Bathyphantes gracilis (Blackwall) 1841
„ clava L. Koch 1879 = nicht zu deuten!
„ claytoniae Blackwall 1841, 1864 = Stylophora dorsalis (Wider) 1834
„ clerckii Waldkenaer 1841 = Pachygnatha clerckii Sundevall 1823
„ collina L. Koch 1872 = Lepthyphantes collinus (L. Koch) 1872
„ collina Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ comata Westring 1851, 1862 = Centromerita bicolor (Blackwall) 1833
„ complicata Marx 1889 = Lepthyphantes complicatus (Emerton) 1882
„ concinna Thorell 1875 = Centromerita bicolor concinna (Thorell) 1875
„ concinna L. Koch 1879 = Linyphia concinnella Roewer 1942
„ concolor Wider 1834, Waldkenaer 1841, Westring 1862, Thorell 1870, Cambridge 1879 = Stylophora concolor (Wider) 1834
„ conferta Banks 1892 = Linyphia maculata Emerton 1908
„ confusa Cambridge 1870 = Lepthyphantes leprosus (Ohlert) 1865
„ congenera Cambridge 1872 = Lepthyphantes congener (Cambridge) 1872
„ conspersa L. Koch 1879 = nicht zu deuten!
„ contortipes Karsch 1881 = Labulla contortipes (Karsch) 1881
„ contrita Cambridge 1873, 1881 = Poeciloneta variegata (Blackwall) 1841
„ convexa Westring 1862, Dahl 1883 = Bathyphantes convexus (Westring) 1851
„ coronaria C. L. Koch 1837 = nicht zu deuten!
„ costata Hentz 1850 = Pityohyphantes phrygiana (C. L. Koch) 1836
„ cristata Cambridge 1879, Dahl 1883 = Lepthyphantes cristatus (Menge) 1866
„ crocea Waldkenaer 1841 = Pachygnatha listeri Sundevall 1830
„ crucigera Blackwall 1863 = Lepthyphantes cruciger (Blackwall) 1863
„ cruentum Urquhart 1890 = nicht zu deuten!
„ crypticola Westring 1862 = Lepthyphantes nebulosus (Sundevall) 1830
„ crypticola Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ crypticolens Waldkenaer 1841, Blackwall 1864, Ohlert 1867 = Nesticus cellulanus (Clerck) 1757
„ culta Cambridge 1890 = Linyphia impigra Cambridge 1870
„ cultrigera L. Koch 1879 = Zornella cultrigera (L. Koch) 1879
„ decens Cambridge 1870, 1879 = Porrhomma microphthalmum (Cambridge) 1870
„ decipiens Cambridge 1879 = Oreonetides abnormis (Blackwall) 1841
„ decipiens L. Koch 1879 = nicht zu deuten! (Lepthyphantes?)
„ decolor Westring 1862 = Lepthyphantes decolor (Westring) 1862
„ decolor Cambridge 1870 = Lepthyphantes cristatus (Menge) 1866
„ decolora Urquhart 1893 = Dictyna urquharti Roewer 1951
„ degeerii Waldkenaer 1841 = Pachygnaths degeerii Sundevall 1830
„ delicatula Waldkenaer 1841 = nicht zu deuten!
„ deplanata Mac Leay 1827, Waldkenaer 1841 = nicht zu deuten!
„ deplanata Cambridge 1870 = Lepthyphantes cristatus (Menge) 1866
„ desolata L. Koch 1879 = nicht zu deuten!
„ diloris Urquhart 1885 = Paralinyphia diloris (Urquhart) 1885

Linyphia (Forts.):

- „ diluta Thorell 1875 = Lepthyphantes dilutus (Thorell) 1875
- „ domestica Westring 1862 (part.) = Lepthyphantes leprosus (Ohlert) 1865
- „ domestica Wider 1834, Westring 1862 (part.), Waldkenaer 1841 = Lepthyphantes minutus (Blackwall) 1833
- „ dorsalis Wider 1834, Waldkenaer 1841, Thorell 1870, Cambridge 1879 = Stylophora dorsalis (Wider) 1834
- „ dorsalis Banks 1898 = Linyphia dorsatula Roewer 1942
- „ dorsigera Siemaschko 1861 = Theridion bimaculatum (Linné) 1767
- „ dybowskii Cambridge 1873 = Lepthyphantes dybowskii (Cambridge) 1873
- „ elegans Waldkenaer 1841 = Floronia frenata (Wider) 1834; jetzt: Floronia bucculenta (Clerck) 1757
- „ encausta Becker 1879 = Lepthyphantes encaustus (Becker) 1879
- „ ericaea Blackwall 1853, 1864, Thorell 1873, Cambridge 1879 = Lepthyphantes ericaeus (Blackwall) 1853
- „ errans Thorell 1873 = Porrhomma errans (Blackwall) 1841
- „ eumenis L. Koch 1879 = nicht zu deuten!
- „ experta Cambridge 1870, 1879 = Centromerus expertus (Cambridge) 1870
- „ explicata Cambridge 1875 = Lepthyphantes cristatus (Menge) 1866
- „ expuncta Cambridge 1875 = Lepthyphantes expunctus (Cambridge) 1875
- „ extricata Cambridge 1876 = Bathyphantes extricatus (Cambridge) 1876
- „ fastuosa Lucas 1846 = Linyphia frutetorum C. L. Koch 1834
- „ finitima Cambridge 1870, 1881 = Poeciloneta variegata (Blackwall) 1841
- „ flavipes Blackwall 1854, 1864, Cambridge 1881 = Stylophora fleavipes (Blackwall) 1854
- „ fragilis Thorell 1875 = Lepthyphantes fragilis (Thorell) 1875
- „ frederici Cambridge 1879 = Aprolagus mollis (Cambridge) 1870
- „ frenata Wider 1834, Westring 1862, Blackwall 1864, Thorell 1870 = Floronia frenata (Wider) 1834; jetzt: Floronia bucculenta (Clerck) 1757
- „ fructuosa Keyserling 1886 = Lepthyphantes fructuosus (Keyserling) 1886
- „ frutetorum Waldkenaer 1841, C. L. Koch 1845 (part.), Ohlert 1867 = Linyphia hortensis Sundevall 1820
- „ fucatinia Urquhart 1893 = Paralinyphia fucatinia (Urquhart) 1893
- „ fuliginea Blackwall 1833, 1864 = Linyphia pusilla Sundevall 1830
- „ furcigera Canestrini 1873 = Troglohyphantes furciger (Canestrini) 1873
- „ furcula C. L. Koch 1837, 1845 = Lepthyphantes nebulosus (Sundevall) 1830
- „ furcula Giebel 1869 = nicht zu deuten!
- „ furva Blackwall 1841, 1864 = nicht zu deuten!
- „ galbea Keyserling 1886, Banks 1913 = Lepthyphantes minutus (Blackwall) 1833
- „ gibbosa Lucas 1846 = Conopistha (Argyrodina) argyrodes (Waldkenaer) 1841
- „ glacialis L. Koch 1872 = Oreonetides glacialis (L. Koch) 1872
- „ globosa Wider 1834, Waldkenaer 1841 = Linyphia pusilla Sundevall 1830
- „ gracilis Blackwall 1841, 1864, Cambridge 1881 = Bathyphantes gracilis (Blackwall) 1841
- „ gracilis Westring 1851, 1862 = Poeciloneta variegata (Blackwall) 1841
- „ graminicola Sundevall 1830 = Micryphantes graminicola (Sundevall) 1830
- „ groenlandica Lenz 1897 = Lepthyphantes groenlandicus (Lenz) 1897
- „ guttata Thorell 1875 = Lepthyphantes keyserlingi (Ausserer) 1867
- „ hebescens L. Koch 1879 = Bathyphantes hebescens (L. Koch) 1879
- „ hespera Chamberlin 1920 = Pityhyphantes hesperus (Chamberlin) 1920
- „ humilis L. Koch 1879 = Bathyphantes humilis (L. Koch) 1879
- „ humilis Emerton 1894, 1911 = Estrandia nearctica (Banks) 1910
- „ humilis Franganillo 1926 = Linyphia coccinea (Keyserling) 1886
- „ ictericа Thorell 1875 = Lepthyphantes ictericus (Thorell) 1875
- „ inaurata Vinson 1863 = Thwaitesia inaurata (Vinson) 1863
- „ incerta Waldkenaer 1841 = nicht zu deuten!
- „ incerta Emerton 1875 = Porrhomma emertoni Roewer 1942
- „ incerta Cambridge 1878, 1879 = Porrhomma microphthalmum (Cambridge) 1870

Linyphia (Forts.):

„ incesta L. Koch 1879 = Lepthyphantes incestus (L. Koch) 1879
„ incilia L. Koch 1881 = Centromerus incilius (L. Koch) 1881
„ inconspicua Cambridge 1870, 1879 = Lepthyphantes ericaeus (Blackwall) 1853
„ index Thorell 1856, Westring 1862 = Bolyphantes index (Thorell) 1856
„ infirma Thorell 1875 ♀ = Lepthyphantes angulipalpis (Westring) 1851
„ ingloria L. Koch 1879 = nicht zu deuten!
„ javensis Doleschall 1859 = nicht zu deuten!
„ karpinskii Cambridge 1873 = Lepthyphantes karpinskii (Cambridge) 1873
„ keyserlingi Ausserer 1867 = Lepthyphantes keyserlingi (Ausserer) 1867
„ kochiella Strand 1900 = Lepthyphantes kochiellus (Strand) 1900
„ lagenifera Urquhart 1887 = Orsinome lagenifera (Urquhart) 1887
„ latebricola L. Koch 1879 = Lepthyphantes latebricola (L. Koch) 1879
„ latescens Chamberlin 1919 = Bathyphantes latescens (Chamberlin) 1919
„ lepida Blackwall 1866 = nicht zu deuten!
„ lepida Cambridge 1873, Simon 1884, Bösenberg 1901 = Lepthyphantes expunctus (Cambridge) 1875
„ leprosa Ohlert 1865, 1867, Dahl 1883 = Lepthyphantes leprosus (Ohlert) 1865
„ limitana Emerton 1915 = Pityohyphantes limitanus (Emerton) 1915
„ lineata Simon 1884, Keyserling 1886 = Stemonyphantes lineatus (Linné) 1758
„ linguata Cambridge 1873, 1879 = Oreonetides abnormis (Blackwall) 1841
„ lithobia Canestrini & Pavesi 1868 = Tapinopa longidens (Wider) 1834
„ longidens Wider 1834, Walckenaer 1841 = Tapinopa longidens (Wider) 1834
„ longipalpis Sundevall 1830 = Erigone longipalpis (Sundevall) 1830
„ longipes Cambridge 1871 = Bathyphantes gracilis (Blackwall) 1841
„ luctuosa C. L. Koch 1837, Walckenaer 1841 = Linyphia clathrata Sundevall 1830
„ lugubris Walckenaer 1841 = nicht zu deuten!
„ lusitanica Kulczynski 1911 = Linyphia montana maura (Thorell) 1875; jetzt: Linyphia triangularis maura (Thorell) 1875
„ luteipes L. Koch 1879 = nicht zu deuten!
„ luteola Blackwall 1833, Thorell 1871, Dahl 1883 = Bolyphantes luteolus (Blackwall) 1833
„ macrognatha Menge 1866 = Linyphia montana (Linné) 1758; jetzt: Linyphia triangularis (Clerck) 1757
„ magellanii Marx 1889 = nom. nud.
„ mandibulata Emerton 1882, 1901 = Linyphia pusilla Sundevall 1830
„ manducula Walckenaer 1847 = Pachygnatha listeri Sundevall 1830
„ mansueta Thorell 1875 = Lepthyphantes mansuetus (Thorell) 1875
„ marginata C. L. Koch 1834, 1848 et sequ. = Linyphia triangularis (Walckenaer) 1802, jetzt: Linyphia marginata (C. L. Koch) 1834
„ marmorata Hentz 1850 = Linyphia marginata C. L. Koch 1834
„ maxillosa Walckenaer 1841 part. = Pachygnatha clerckii Sundevall 1830
„ maxillosa Walckenaer 1841 part. = Pachygnatha listeri Sundevall 1830
„ maura Thorell 1875 = Linyphia montana maura (Thorell) 1875; jetzt: Linyphia triangularis maura (Thorell) 1875
„ meadii Blackwall 1853, 1864 = Bathyphantes meadii (Blackwall) 1853
„ melanocespala Taczanowski 1874 = Zygiella melanocephala (Taczanowski) 1874
„ melanopleuros Grube 1861 = Lepthyphantes melanopleuros (Grube) 1861
„ melanopygia Cambridge 1879, Urquhart 1886 = Ostearius melanopygius (Cambridge) 1879
„ micaria Marx 1889 = Bathyphantes micaria Emerton 1882
„ micrognatha Menge 1866 = Linyphia montana (Linné) 1758, jetzt: Linyphia triangularis (Clerck) 1757
„ microphthalma Cambridge 1870, 1881 = Porrhomma microphthalmum (Cambridge) 1870
„ microphthalmus Kulczynski 1882 = Porrhomma moravicum Miller & Kratochvil 1940

Linyphia (Forts.):

- minuta Blackwall 1833, 1864, Cambridge 1879, Dahl 1883, Emerton 1902 = Lepthyphantes minutus (Blackwall) 1833
- miser Cambridge 1882 = Lepthyphantes miser (Cambridge) 1882
- miser Simon 1884 ♂ = Lepthyphantes ericaeus (Blackwall) 1853
- montana Sundevall 1830, Menge 1866, Blauvelt 1936 = Linyphia resupina-domestica (De Geer) 1778
- monticola Kulczynski 1881, 1882 = Lepthyphantes monticola (Kulczynski) 1881
- mughi Fickert 1875 = Lepthyphantes mughi (Fickert) 1875
- multicolor Urquhart 1890 = nicht zu deuten!
- multiguttata Wider 1834, Walckenaer 1841, C. L. Koch 1845, Ohlert 1867 = Linyphia clathrata Sundevall 1830
- mundenia Urquhart 1893 = Paralinyphia mundenia (Urquhart) 1893
- nasata Blackwall 1864 = nicht zu deuten! ♂
- nearctica Banks 1910 = Estrandia nearctica (Banks) 1910
- nebulosa Sundevall 1830 (var. γ) = Lepthyphantes minutus (Blackwall) 1833
- nebulosa Sundevall 1830, Dahl 1883, Keyserling 1886, Emerton 1902 = Lepthyphantes nebulosus (Sundevall) 1830
- nemoralis Urquhart 1888 = Tekella nemoralis (Urquhart) 1888
- nigella Blackwall 1836 = nicht zu deuten!
- nigrina Westring 1851, 1862 et sequ. = Stylophora nigrina (Westring) 1851
- nigriventris L. Koch 1879 = Lepthyphantes nigriventris (L. Koch) 1879
- nitida Thorell 1875 = Lepthyphantes nitidus (Thorell) 1875
- nitidula Urquhart 1888 = Erycinicola purpurapunctata (Urquhart) 1888
- oblita Cambridge 1870, 1879 = Porrhomma oblitum (Cambridge) 1870
- oblivia Cambridge 1873 = Aprolagus mollis (Cambridge) 1870
- oblonga Cambridge 1870, 1879 = Porrhomma oblongum (Cambridge) 1870
- obscura Blackwall 1841, 1864, Thorell 1873, 1875, Cambridge 1879 = Lepthyphantes obscurus (Blackwall) 1841
- obscura Petrunkevitch 1911 = Linyphia obscurella Roewer 1942
- orinoma Chamberlin 1919 = Linyphia reducta Keyserling 1886
- ornata Taczanowski 1874 = Leucauge argyra (Walckenaer) 1841
- palilis L. Koch 1870 = Pityohyphantes palilis (L. Koch) 1870
- pallescens Westring 1851, 1862 = Linyphia insignis Blackwall 1841
- pallida Blackwall 1843 = Floronia frenata (Wider) 1834; jetzt: Floronia bucculenta (Clerck) 1757
- pallida Cambridge 1870, 1879 = Lepthyphantes relativus (Cambridge) 1879
- pallidula Blackwall 1834 = Nesticus cellulanus (Clerck) 1757
- pallipes Lucas 1846 = nicht zu deuten!
- parasita Vinson 1863 = Conopistha (Argyrodina) zonata (Vinson) 1863
- parvula Westring 1851, 1862 = Bathyphantes gracilis (Blackwall) 1841
- pascuensis Walckenaer 1841 = Linyphia pusilla Sundevall 1830
- pellos Urquhart 1890 = nicht zu deuten!
- pentophthalmica Giebel 1869 = Pachygnatha listeri Sundevall 1830
- peramoena Cambridge 1879 = Bathyphantes peramoenus (Cambridge) 1879
- pernix Blackwall 1852, 1864 = nicht zu deuten!
- pholcommoides Cambridge 1879 = Syedra gracilis (Menge) 1869
- phrygiana C. L. Koch 1836 et sequ. = Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch) 1836
- picta Thorell 1875 = Taranucnus setosus (Cambridge) 1863
- pigra L. Koch 1879 = nicht zu deuten!
- polita L. Koch 1879 = Linyphia jenisseica Charitonow 1932
- pratensis Wider 1834, C. L. Koch 1845 (part), Walckenaer 1841, Ohlert 1867 = Lyniphia pusilla Sundevall 1830
- pratensis C. L. Koch 1845 (part.), Blackwall 1864 = Linyphia hortensis Sundevall 1830
- proserpina Simon 1872 = Porrhomma proserpina (Simon) 1872
- prudens Cambridge 1873, 1881 = Centromerus prudens (Cambridge) 1873

Linyphia (Forts.):
„ pulchella Blackwall 1846 = nicht zu deuten!
„ pulchra Kulczynski 1881, 1882 = Lepthyphantes pulcher (Kulczynski) 1881
„ pulla Blackwall 1853, 1864 = Stylophora nigrina (Westring) 1851
„ pullata Cambridge 1863, 1873, 1879 = Stylophora flavipes (Blackwall) 1854
„ punctata Blackwall 1869 = nicht zu deuten!
„ purpurapunctata Urquhart 1888 = Erycinicola purpurapunctata (Urquhart) 1888
„ pusilla Black 1834 = Lepthyphantes tenuis (Blackwall) 1852
„ pusiola Fickert 1875 = Bathyphantes pusiolus (Fickert) 1875
„ pygmaea Thorell 1856 = Lepthyphantes alacris (Blackwall) 1853
„ pygmaea Westring 1862 (part.) = Lepthyphantes tenebricola (Wider) 1834
„ pygmaea Westring 1862 (part.), Thorell 1870 = Lepthyphantes tenuis (Blackwall) 1852
„ pygmaea Canestrini & Pavesi 1870 = nicht zu deuten!
„ quadrata Wider 1834 = Linyphia frutetorum C. L. Koch 1834
„ relativa Cambridge 1879 = Lepthyphantes relativus (Cambridge) 1870
„ relativa Cambridge 1881 = Lepthyphantes cristatus (Menge) 1866
„ resupina Walckenaer 1841, C. L. Koch 1845 = Linyphia resupina-domestica (De Geer) 1778, jetzt: Linyphia montana (Clerck) 1757
„ reticulata Walckenaer 1841 = Stemonyphantes lineatus (Linné) 1758
„ reticulata Cambridge 1873, 1881 = Oreonetides vaginatus (Thorell) 1872
„ rivalis Cambridge 1905 = Diplocentria rivalis (Cambridge) 1905
„ rosenhaueri L. Koch 1872 = Porrhomma rosenhaueri (L. Koch) 1872
„ rosenhaueri Herman 1879 = Porrhomma profundum M. Dahl 1939
„ rubea Blackwall 1841, 1864 = Linyphia peltata Wider 1834
„ rubecula Canestrini 1868, Lebert 1877 = Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer) 1841
„ rubra Walckenaer 1841 = nicht zu deuten!
„ rubrofasciata Keyserling 1886 = Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch) 1836
„ rufa Westring 1862 = Mengea scopigera (Grube) 1859
„ rufipes Sundevall 1829 = Gongylidium rufipes (Linné) 1758
„ rufocephala Urquhart 1887 = Paralinyphia rufocephala (Urquhart) 1888
„ rufolineata Urquhart 1888 = Meta rufolineata (Urquhart) 1888
„ sabulosa Keyserling 1886 = Lepthyphantes sabulosus (Keyserling) 1886
„ sagittata Grube 1861 = nicht zu deuten!
„ sancti-vincenti Simon 1872 = Lepthyphantes sancti-vincenti (Simon) 1872
„ saxatilis Thorell 1873 = Aprolagus lugubris (Blackwall) 1834
„ scalarifera Menge 1866 = Linyphia emphana Walckenaer 1841
„ scopigera Grube 1859, Dahl 1883 = Mengea scopigera (Grube) 1859
„ scripta Hentz 1850 = Linyphia trangularis (Walckenaer) 1802, jetzt: Linyphia marginata C. L. Koch 1834
„ senio Urquhart 1890 = Mimetus senio (Urquhart) 1890
„ sepium C. L. Koch 1837 = Drapetisca socialis (Sundevall) 1832
„ setipalpis Fickert 1876 = Centromerus sylvaticus (Blackwall) 1841
„ setosa Cambridge 1863, 1873, 1879 = Taranucnus setosus (Cambridge) 1863
„ sibiricus Grube 1861 = Bolyphantes sibiricus (Grube) 1861
„ signata C. L. Koch 1850 = Linyphia pusilla Sundevall 1830
„ similior L. Koch 1879 = nicht zu deuten!
„ simillima L. Koch 1879 = Bathyphantes simillimus (L. Koch) 1879
„ sobria Thorell 1871 = Lepthyphantes sobrius (Thorell) 1871
„ socialis Sundevall 1832, Westring 1862, Thorell 1870 = Drapetisca socialis (Sundevall) 1832
„ socialis Emerton 1902 = Drapetisca alteranda (Chamberlin) 1909
„ sordellii Pavesi 1875 = Troglohyphantes sordellii (Pavesi) 1875
„ splendida Taczanowski 1874 = Leucauge pulcherrima (Keyserling) 1865
„ subalpina Marx 1889 = Lepthyphantes subalpinus (Emerton) 1882
„ subnigripes Cambridge 1879, 1881 = Bolyphantes luteolus (Blackwall) 1833
„ subterranea Emerton 1875 = Phanetta subterranea (Emerton) 1875

Linyphia (Forts.):
- „ sudetica Fickert 1875 = Centromerus pabulatrix (Cambridge) 1875
- „ sylvatica Blackwall 1841 = Linyphia hortensis Sundevall 1829
- „ taczanowskii Cambridge 1873 = Lepthyphantes taczanowskii (Cambridge) 1873
- „ tardipes Blackwall 1863, 1864 = Tapinopa longidens (Wider) 1834
- „ tenebricola Wider 1834, Waldkenaer 1841, Dahl 1883 = Lepthyphantes tenebricola (Wider) 1834
- „ tenebricola Westring 1862 = Lepthyphantes alacris (Blackwall) 1853
- „ tenebricola Canestrini & Pavesi 1870, Pavesi 1873, Lebert 1877 = nicht zu deuten!
- „ tenella Blackwall 1864 = nicht zu deuten!
- „ tenuipalpis Kulczynski 1913 = Linyphia montana tenuipalpis (Simon) 1884 jetzt: Linyphia triangularis tenuipalpis Simon 1884
- „ tenuis Blackwall 1852, 1864 = Lepthyphantes tenuis (Blackwall) 1852
- „ terricola C. L. Koch 1845 = Bathyphantes gracilis (Blackwall) 1841
- „ terricola Blackwall 1864 = Lepthyphantes zimmermanni Bertkau 1890
- „ terricola Ohlert 1867 = Stylophora dorsalis (Wider) 1834
- „ thoracica Wider 1834, Waldkenaer 1841, Cambridge 1879 = Labulla thoracica (Wider) 1834
- „ thorellii Herman 1879 = Porrhomma thorellii (Herman) 1879
- „ tigrina Wider, Waldkenaer 1841, Ohlert 1867 = Drapetisca socialis (Sundevall) 1832
- „ torrentum Kulczynski 1881, 1882 = Bathyphantes torrentus (Kulczynski) 1881
- „ triangularis Waldkenaer 1805, 1841, Westring 1862, Blackwall 1864 = Linyphia triangularis (Waldkenaer) 1802, jetzt: Linyphia marginata (C. L. Koch) 1834
- „ triangularis Sundevall 1830, C. L. Koch 1845, Thorell 1870, Dahl 1883, Simon 1884 et sequ. = Linyphia montana (Linné) 1758, jetzt: Linyphia triangularis (Clerck) 1757
- „ triangularis Ohlert 1867 = Linyphia emphana Waldkenaer 1841
- „ trifididens Cambridge 1873 = Enoplognatha trifididens (Cambridge) 1873
- „ trilineata Emerton 1902 = Stemonyphantes lineatus (Linné) 1758
- „ trispathulata Urquhart 1885 = Lepthyphantes trispathulatus (Urquhart) 1885
- „ troglodytes L. Koch 1872 = Lepthyphantes troglodytes (L. Koch) 1872
- „ trucidans L. Koch 1879 = nicht zu deuten!
- „ turbatrix Cambridge 1877 = Lepthyphantes turbatrix (Cambridge) 1877
- „ turbatrix Cambridge 1879, 1881 = Lepthyphantes miser (Cambridge) 1882
- „ umbratica L. Koch 1881 = Porrhomma umbraticum (L. Koch) 1881
- „ unicornis Cambridge 1875 = Lepthyphantes unicornis (Cambridge) 1873
- „ variabilis Banks 1892, 1910 = Linyphia pusilla Sundevall 1830
- „ varians Kulczynski 1882 = Lepthyphantes varians (Kulczynski) 1882
- „ variegata Cambridge 1879 = Poeciloneta variegata (Blackwall) 1841
- „ vicina Franganillo 1926 = Linyphia coccinea (Keyserling) 1886
- „ vidua L. Koch 1879 = nicht zu deuten!
- „ vilis Thorell 1875 = Bathyphantes gracilis (Blackwall) 1841
- „ viridis Vinson 1863 = Conopistha (Argyrodina) viridis (Vinson) 1863
- „ viridis Karsch 1884 = Linyphia karschi Roewer 1942
- „ vivax Blackwall 1841, 1864 = Lepthyphantes nebulosus (Sundevall) 1830
- „ waldkenaeri Risso 1826 = Linyphia montana (Linné) 1758, jetzt: Linyphia triangularis (Clerck) 1757
- „ weburdi Urquhart 1889 = Bathyphantes weburdi (Urquhart) 1889
- „ weyeri Emerton 1875 = Bathyphantes weyeri (Emerton) 1875
- „ zebra Marx 1889 = Lepthyphantes zebra (Emerton) 1882
- „ zebrina Thorell 1873, Fickert 1876, Dahl 1883, ? Getaz 1889 = Lepthyphantes zebrinus (Menge) 1866
- „ zonata Vinson 1863 = Conopistha (Argyrodina) zonata (Waldkenaer) 1863

Linyphiella:
- „ coccinea Banks 1905, Bryant 1940 = Linyphia coccinea (Keyserling) 1886

Liocranum:
- „ albopunctatum Hogg 1896 = Supunna albopunctata (Hogg) 1896
- „ alexandrinum Simon 1880 = Mesiotelus alexandrinus (Simon) 1880
- „ annulipes Kulczynski 1897 = Mesiotelus annulipes (Kulczynski) 1897
- „ australiense L. Koch 1866, 1873 = Medmassa australiensis (L. Koch) 1866
- „ bisaticum Dyal 1935 = Agroeca lusatica (L. Koch) 1875
- „ calcaratum Emerton 1911 = Cybaeota calcarata (Emerton) 1911
- „ celans Canestrini & Pavesi 1868, Thorell 1873 = Scotina celans (Blackwall) 1841
- „ celer Cambridge 1879 = Scotina celer (Cambridge) 1879
- „ cerioi Pavesi 1875 = Mesiotelus tenuissimus (L. Koch) 1866
- „ domesticum Thorell 1870, 1873, Cambridge 1879, Bösenberg 1902 = Liocranum rupicola (Walckenaer) 1825
- „ fasciatum Simon 1873 = Prochora lycosiformis (Cambridge) 1872
- „ gracilipes Thorell 1873, Cambridge 1879 = Scotina gracilipes (Blackwall) 1859
- „ jucundum Karsch 1879 = Clubiona jucunda (Karsch) 1879
- „ libanicum Simon 1878 = Mesiotelus libanicus (Simon) 1878
- „ lubricum Simon 1880 = Mesiotelus lubricus (Simon) 1880
- „ lusaticum L. Koch 1875, Bösenberg 1902 = Agroeca lusatica (L. Koch) 1875
- „ major Simon 1932 = Liocranum majus Simon 1878
- „ mirabilis Cambridge 1896 = Heterochemmis mirabilis (Cambridge) 1896
- „ pallardii L. Koch 1881 = Scotina pallardii (L. Koch) 1881
- „ pallidulum Simon 1878 = Liocranum majus Simon 1878
- „ pallipes L. Koch 1873 = Medmassa pallipes (L. Koch) 1873
- „ patagonicum Boeris 1889 = Syrisca patagonica (Boeris) 1889
- „ praelongipes Cambridge 1873 = Scotina gracilipes (Blackwall) 1859
- „ pulchrum Thorell 1881 = Medmassa pulchra (Thorell) 1881
- „ spinulosum Simon 1878 = Mesiotelus tenuissimus (L. Koch) 1866
- „ squamosum L. Koch 1876 = Liocranum rutilans (Thorell) 1875
- „ tenuissimum Simon 1878, Chyzer & Kulczynski 1897 = Mesiotelus tenuissimum (L. Koch) 1866
- „ viride L. Koch 1867 = Mesiotelus viridis (L. Koch) 1867

Lionephila:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Nephila**

Liphistius:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Lipistius**
- „ birmanicus Thorell 1897, Pocock 1900, Bristowe 1933, 1938 = Lipistius birmanicus (Thorell) 1897
- „ birmanicus Simon 1908 = Lipistius tonkinensis (Bristowe) 1933
- „ desultor Hasselt 1882, Thorell 1890, Bristowe 1933 (part.) = Lipistius sumatranus (Thorell) 1890
- „ desultor Simon 1892, 1903, Bristowe 1933 (part.) = Lipistius desultor Schiödte 1849
- „ mammillanus Cambridge 1875 = Lipistius desultor Schiödte 1849
- „ kimurai Kishida 1920 = Heptathela kimurai Kishida 1920

Lipocrea:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Larinia**
- „ soror Thorell 1887 = Larinia tabida (L. Koch) 1871

Lithyfantes:
- „ latrodectoides Franganillo 1913 = Lithyphantes latrodectoides (Franganillo) 1913

Lithyphantes:
- „ corollatus Thorell 1869, 1870 et sequ. = Lithyphantes albomaculatus (De Geer) 1778
- „ distinctus Chamberlin & Ivie 1933 = Lithyphantes medialis Banks 1898
- „ dispar Thorell 1870 = Lithyphantes paykullianus (Walckenaer) 1805
- „ grossus Pavesi 1878 = Teutana grossa (C. L. Koch) 1838
- „ hamatus Pavesi 1873 = Lithyphantes paykullianus (Walckenaer) 1805
- „ juninensis Keyserling 1884 = Enoplognatha juninensis (Keyserling) 1884

Lithyphantes (Forts.):
- „ laetus Cambridge 1896 = Asagena alticeps Keyserling 1886
- „ marmoratus Keyserling 1884 = Enoplognatha marmorata (Hentz) 1850
- „ martius Simon 1873 = Lithyphantes paykullianus (Walckenaer) 1805
- „ mimoides Chamberlin 1920 = Enoplognatha mimoides (Chamberlin) 1920
- „ mobilis Thorell 1875, Cambridge 1907 = Teutana nobilis (Thorell) 1875
- „ tectus Keyserling 1884 = Enoplognatha tecta (Keyserling) 1884
- „ vittatus Keyserling 1884, Simon 1897 = Lithyphantes anchoratus (Holmberg) 1876

Litoporus:
- „ fulvus Moenkhaus 1898 = Litoporus imbecillus (Keyserling) 1891

Litopyllus:
- „ barrowsi Roewer 1951 = Litopyllus rupicolens Chamberlin 1922
- „ luteus Chamberlin 1922 = Litopyllus rupicolens Chamberlin 1922

Lollianus:
- „ perakensis Simon 1901 = Laufeia perakensis (Simon) 1901

Lophocarenum:
- „ abruptum Emerton 1909 = Mythoplastoides abruptus (Emerton) 1909
- „ affine Bösenberg 1902 = nicht zu deuten!
- „ alpinum Emerton 1909 = Cochlembolus alpinus (Banks) 1896
- „ altifrons Menge 1868, Bertkau 1880 = Entelecara acuminata (Wider) 1834
- „ arenarium Emerton 1911 = Minyriolus arenarius (Emerton) 1911
- „ armatum Emerton 1911 = Zornella armata (Banks) 1905
- „ arvensis Banks 1892 = Cornicularia communis Emerton 1882
- „ bicarinatum Emerton 1913, Crosby & Zorsch 1935 = Tapinocyba bicarinata (Emerton) 1913
- „ bicuspidatum Bertkau 1880 = Dismodicus elevatus (C. L. Koch) 1838
- „ bihamatum Menge 1868 = Plaesiocraerus latifrons (Cambridge) 1863
- „ bilobatum Emerton 1911 = Hypomma marxii (Keyserling) 1886
- „ blackwallii Simon 1884 = Trichopterna cito (Cambridge) 1872
- „ castaneum Emerton 1882, Banks 1892 = Minyriolus castaneus (Emerton) 1882
- „ cito Bösenberg 1902 = Trichopterna cito (Cambridge) 1872
- „ coriaceum Emerton 1913 = Lophocarenum moestum (Banks) 1892
- „ crassipalpum Menge 1868, Lebert 1877 = nicht zu deuten!
- „ crenatoideum Banks 1892 = Ceratinops crenata (Emerton) 1882
- „ crenatum Emerton 1882 = Ceratinops crenata (Emerton) 1882
- „ cucurbitinum Simon 1884 = Trichopterna cucurbitina (Simon) 1881
- „ cuneatum Emerton 1909 = Chocorua cuneata (Emerton) 1909
- „ decemoculatum Emerton 1882, 1911 = Dismodicus decemoculatus (Emerton) 1882
- „ dentipalpis Emerton 1915 = Hybocoptus dentipalpis (Emerton) 1915
- „ depressum Emerton 1882 = Lophomma depressum (Emerton) 1882
- „ dicholophum Menge 1868 = Lophocarenum elongatum (Wider) 1834
- „ domiciliorum Emerton 1911 = Aulacocyba subitanea (Cambridge) 1875
- „ elongatum Menge 1868 = Lophocarenum parallelum (Wider) 1834
- „ erectum Emerton 1915 = Mythoplastoides erectus (Emerton) 1915
- „ erigonoides Emerton 1882, Banks 1892 = Eridantes erigonoides (Emerton) 1882
- „ erythropus Menge 1868 = Plaesiocraerus picinus (Blackwall) 1841
- „ erythropus Strand 1907 = Entelecara erythropus (Westring) 1862
- „ exiguum Banks 1892, Emerton 1911 = Mythoplastoides exiguus (Banks) 1892
- „ fallaciosum Bertkau 1883 = Diplocephalus fallaciosus (Bertkau) 1883
- „ fasciatum Banks 1904 = Tortembolus fasciatus (Banks) 1904
- „ flagellatum Emerton 1911 = Phlattothrata flagellata (Emerton) 1911
- flavipes Bösenberg 1902 = Entelecara flavipes (Blackwall) 1834
- „ florens Emerton 1882, 1911 = Hypselistes florens (Cambridge) 1875
- „ formosum Banks 1892, 1906 = Eridantes erigonoides (Emerton) 1882
- „ frontale Banks 1904 = Pelecopsis frontalis (Banks) 1904
- „ globiceps Menge 1868 = Araeoncus humilis (Blackwall) 1841

Lophocarenum (Forts.):
- „ globipes Bertkau 1883 = Trichopterna globipes (L. Koch) 1872
- „ hartlandianum Emerton 1913 = Pocadicnemis hartlandiana (Emerton) 1913
- „ hiemale Dahl 1886 = Troxochrus hiemalis (Blackwall) 1841
- „ hortense Emerton 1924 = Tapinocyba hortensis (Emerton) 1924
- „ inflatum Emerton 1923 = Ceratinops inflata (Emerton) 1923
- „ latifrons Dahl 1886 = Plaesiocraerus latifrons (Cambridge) 1863
- „ latum Emerton 1882 = Ceratinops lata (Emerton) 1882
- „ latum Crosby & Bishop 1925 = Ceratinops annulipes (Banks) 1892
- „ littorale Emerton 1913 = Ceratinops littoralis (Emerton) 1913
- „ longior Banks 1892 = Cornicularia directa (Cambridge) 1874
- „ longitarse Emerton 1882 = Baryphyma longitarsis (Emerton) 1882
- „ longitubum Emerton 1882 = Pocadicnemis pumila (Blackwall) 1841
- „ ludicrum Bertkau 1883 = Peponocranium ludicrum (Cambridge) 1861
- „ miniakianum Emerton 1919 = Lophocarenum excavatum (Emerton) 1911
- „ miniatum Banks 1892, 1916 = Cornicularia directa (Cambridge) 1874
- „ minimum Emerton 1923 = Symmigma minimum (Emerton) 1923
- „ minutum Emerton 1909 = Tapinocyba minuta (Emerton) 1909
- „ montanum Emerton 1882 = Minyriolus castaneus (Emerton) 1882
- „ montiferum Emerton 1882 = Oedothorax montiferus (Emerton) 1882
- „ nicaeense Simon 1884 = Minyriolus nicaeensis (Simon) 1884
- „ obscurum Bertkau 1883 = Cnephalocotes obscurus (Blackwall) 1834
- „ pallidum Emerton 1882, 1909 = Cochlembolus pallidus (Emerton) 1882
- „ parvulum Menge 1868 = Troxochrus hiemalis (Blackwall) 1841
- „ parvum Banks 1892 = Eridantes erigonoides (Emerton) 1882
- „ prominulum Bertkau 1883 = Metopobactrus prominulus (Cambridge) 1872
- „ pumilum Bertkau 1880 = Pocadicnemis pumila (Blackwall) 1841
- „ pusillum Menge 1868 = Minyriolus pusillus (Wider) 1834
- „ quadricristatum Emerton 1882, 1909 = Horcotes quadricristatus (Emerton) 1882
- „ rostratum Emerton 1882 = Origanates rostratus (Emerton) 1882
- „ rotundum Emerton 1925 = Sisis rotundus (Emerton) 1925
- „ rufithorax Simon 1884 = Trichopterna rufithorax (Simon) 1881
- „ rugosum Emerton 1909 = Ceratinops rugosa (Emerton) 1909
- „ scabriculum Menge 1868 = Troxochrus scabriculus (Westring) 1851
- „ scopoliferum Emerton 1882 = Tapinocyba scopolifera (Emerton) 1882
- „ simplex Emerton 1882 = Tapinocyba simplex (Emerton) 1882
- „ spiculatum Menge 1868 = Minyriolus pusillus (Wider) 1834
- „ spiniferum Emerton 1882 = Souessa spinifera (Cambridge) 1874
- „ stramineum Simon 1884, Bösenberg 1902 = Lophocarenum mediocre (Kulczynski) 1899
- „ stramineum Cambridge 1907 = Lophocarenum memorale (Blackwall) 1841
- „ sylvaticum Emerton 1913 = Lophomma sylvaticum (Emerton) 1913
- „ thoracatum Simon 1884, Bösenberg 1902 = Lophocarenum radicicola (L. Koch) 1875
- „ thorellii Bertkau 1883, Bösenberg 1902 = Entelecara thorellii (Westring) 1862
- „ trilobatum Emerton 1909 = Oedothorax trilobatus (Banks) 1896
- „ triste Banks 1892 = Erigone tristis (Banks) 1892
- „ vaccinii Emerton 1926 = Lophomma vaccinii (Emerton) 1926
- „ venustum Banks 1892 = Ceratinopsidis formosa (Banks) 1892
- „ vernale Emerton 1882 = Cochlembolus vernalis (Emerton) 1882

Lophomma:
- „ anticum Menge 1868 = Wideria antica (Wider) 1834
- „ austerum Simon 1884 = Anacotyle austera (Simon) 1884
- „ bicorne Menge 1868 = Diplocephalus cristatus (Blackwall) 1833
- „ bicuspidatum Bertkau 1880 = Dismodicus elevatus (C. L. Koch) 1838
- „ capito Menge 1868 = Wideria mitrata (Menge) 1868
- „ castaneum Banks 1916 = Minyriolus castaneus (Emerton) 1882
- „ cristatum Menge 1868 = Prosopotheca monoceros (Wider) 1834

Lophomma (Forts.):
„ cristatum Emerton 1882, 1894, Banks 1916 = Diplocephalus cristatus (Blackwall) 1833
„ cucullatum Menge 1868 = Wideria cucullata (C. L. Koch) 1836
„ diceros Bertkau 1883 = Saloca diceros (Cambridge) 1870
„ elongatum Emerton 1882 = Dicymbium elongatum (Emerton) 1882
„ flavidum Menge 1868 = Wideria antica flavida (Menge) 1868
„ herbigradum Simon 1884 et sequ. = Micrargus (Blaniargus) herbigradus (Blackwall) 1854
„ holmgrenii Strand 1911 = Coryphaeolana holmgrenii (Thorell) 1871
„ laudatum Simon 1884, Becker 1896, Kulczynski 1898, Bösenberg 1902 = Nothocyba subaequalis (Westring) 1851
„ laudatum Smith 1908 = Nothocyba laudata (Cambridge) 1881
„ longitarse Simon 1884 = Baryphyma longitarsis (Emerton) 1882
„ mitratum Menge 1868 = Wideria mitrata (Menge) 1868
„ monoceros Dahl 1886 = Prosopotheca monoceros (Wider) 1834
„ nivicola Strand 1901 = Coryphaeolana holmgrenii (Thorell) 1871
„ psilocephalum Menge 1868 = Cornicularia vigilax (Blackwall) 1853
„ stativum Simon 1884, Cambridge 1905, Lessert 1910 = Anacotyle stativa (Simon) 1881
„ stictocephalum Menge 1868 = Lophomma punctatum (Blackwall) 1841
„ subaequale Smith 1908, Hull 1911 = Nothocyba subaequalis (Westring) 1851
„ vigilax Dahl 1886 = Cornicularia vigilax (Blackwall) 1853
„ vittatum Bertkau 1880 = Minicia marginella (Wider) 1834

Loxoscelis (= Loxosceles):
„ citigrada Lowe 1835 = Loxoscelis rufescens (Dufour) 1820
„ erythrocephala Simon 1873, 1914 = Loxoscelis distincta (Lucas) 1846
„ erythrocephala Thorell 1875, Pavesi 1876 = Loxoscelis rufescens (Dufour) 1820
„ galapagoensis Marx 1889 = nom. nud.
„ similis Moenkhaus 1898 = Loxoscelis laeta (Nicolet) 1849
„ thoracica Garneri 1902 = Scytodes thoracica (Latreille) 1804

Lucia:
„ germanica C. L. Koch 1837 = Zodarion germanicum (C. L. Koch) 1837

Lycaena:
„ spinimana Sundevall 1832 = Zora spinimana (Sundevall) 1832

Lycidas:
„ anomalus Simon 1903 = ? Saitis nigriceps (Keyserling) 1882

Lycoctenus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Ancylometes**
„ bogotensis F. Cambridge 1897, 1901 = Ancylometes bogotensis (Keyserling) 1876
„ brunneus F. Cambridge 1897 = Ancylometes bogotensis (Keyserling) 1876
„ colombianus F. Cambridge 1897 = Ancylometes bogotensis (Keyserling) 1876

Lycodia:
„ spinimana Sundevall 1833 = Zora spinimana (Sundevall) 1832

Lycodrassus L. Koch 1866 = **Zorocrates** (sine spec.)

Lycosa:
„ abalosi Mello-Leitao 1942 = Sosilaus abalosi (Mello-Leitao) 1942
„ abdita Gertsch 1934 = Geolycosa abdita (Gertsch) 1934
„ abmingani Hickman 1914 = Allocosa abmingani (Hickman) 1914
„ accentuata Latreille 1817 = nicht zu deuten!
„ accentuata Walckenaer 1937, Simon 1876, 1937, Becker 1882 = Alopecosa barbipes (Sundevall)
„ acompa Chamberlin 1924, Gertsch & Wallace 1935, Wallace 1947 = Varacosa acompa (Chamberlin) 1924
„ aculeata Sundevall 1832 = Xerolycosa nemoralis (Westring) 1862
„ aculeata Kroneberg 1875 = Evippa kronebergi **nom. nov.**
„ aculeata Lessert 1910 = Alopecosa aculeata (Clerck) 1757

Lycosa (Forts.):
- „ adumbrata Urquhart 1886 = Pardosa adumbrata (Urquhart) 1886
- „ adusta Odenvall 1901 = Pardosa adustella (Roewer) 1951
- „ adustella Roewer 1951 = Pardosa adustella (Roewer) 1951
- „ aerescens Goyen 1886 = Pardosa aerescens (Goyen) 1886
- „ afflicta Holmberg 1876 = Pardosa afflicta (Holmberg) 1876
- „ agilis Walckenaer 1837 = Alopecosa trabalis (Clerck) 1757
- „ agrestis Westring 1862, Thorell 1872 et sequ. = Pardosa agrestis (Westring) 1862
- „ agrestis Bösenberg 1903 = Pardosa monticola (Clerck) 1757
- „ agretyca Audouin 1827 = Geolycosa urbana (Cambridge) 1876
- „ agretyca Walckenaer 1837 = Trochosa ruricola (De Geer) 1778
- „ agretyca Blackwall 1861 = Trochosina terricola (Thorell) 1856
- „ agricola Thorell 1856, 1872, Menge 1879 et sequ. = Pardosa agricola (Thorell) 1856
- „ alacris C. L. Koch 1833, 1848 = Pardosa lugubris (Walckenaer) 1802
- „ albata L. Koch 1870, Chyzer & Kulczynski 1891 et sequ. = Pardosops albatula (Roewer) 1951
- „ albatula Roewer 1951 = Pardosops albatula (Roewer) 1951
- „ albemarlensis Banks 1902 = Galapagosa albemarlensis (Banks) 1902
- „ albimana Walckenaer 1805, 1837, Menge 1879 = Aulonia albimana (Walckenaer) 1805
- „ albimontis Strand 1908 = Pardosa modica (Blackwall) 1846
- „ albipunctata Walckenaer 1841 = nicht zu deuten!
- „ albocincta Blackwall 1870 = Xerolycosa albofasciata (Brullé) 1832
- „ albofasciata Brullé 1832, Simon 1876 et sequ. = Xerolycosa albofasciata (Brullé) 1832
- „ alboguttulata L. Koch 1878 = Arctosippa alboguttulata (L. Koch) 1878
- „ albohastata Emerton 1894, Chamberlin 1908 = Arctosa albohastata (Emerton) 1894
- „ albolimbata Westring 1862 = Pardosa herbigrada (Blackwall) 1857
- „ albomarginata Badcock 1932 = Scaptocosa albomarginata (Badcock) 1932
- „ albonotata Schmidt 1895 = Allocosa albonotata (Schmidt) 1895
- „ albopunctata Tullgren 1901 = Allocosa georgicola (Walckenaer) 1837
- „ albosparsa L. Koch 1876 = Lycorma albosparsa (L. Koch) 1876
- „ albostriata Grube 1861, Schmidt 1895 = Alopecosa albostriata (Grube) 1861
- „ albovestita Dalmas 1917 = Geolycosa albovestita (Dalmas) 1917
- „ albovittata Schmidt 1895 = Alopecosa albovittata (Schmidt) 1895
- „ algens Kulczynski 1908 = Pardosa algens (Kulczynski) 1908
- „ algina Chamberlin 1916 = Pardosa algina (Chamberlin) 1916
- „ algoensis Pocock 1900 = Allocosa algoensis (Pocock) 1900
- „ aliusmodi Karsch 1880 = Arctosa aliusmodi (Karsch) 1880
- „ allodroma Walckenaer 1837, C. L. Koch 1839, Blackwall 1861 = Arctosa cinerea (Fabricius) 1776
- „ alodroma Blackwall 1861 = Arctosa cinerea (Fabricius) 1776
- „ alpica C. L. Koch 1834 = Alopecosa cuneata (Clerck) 1757
- „ alpica C. L. Koch 1848 = Xerolycosa nemoralis (Westring) 1862
- „ alpicola Simon 1876, 1937 = Alopecosa alpicola (Simon) 1876
- „ alpigena Doleschall 1852, Lessert 1910, Simon 1937 = Arctosa alpigena (Doleschall) 1852
- „ alpina Hahn 1834 = Trochosa ruricola (De Geer) 1778
- „ alticeps Schmidt 1895 = Hogna alticeps (Kroneberg) 1875
- „ amalthea L. Koch 1876 = Lycorma amylacea (C. L. Koch) 1839
- „ amazonia Thorell 1896 = Pardosa amazonia (Thorell) 1896
- „ amblygyna Mello-Leitao 1942 = Prolycosides amblygyna (Mello-Leitao) 1942
- „ amentata Sundevall 1832, Thorell 1856 et sequ. = Pardosa amentata (Clerck) 1757
- „ ammophila Wallace 1942 = Isohogna ammophila (Wallace) 1942

Lycosa (Forts.):

„ amnicola L. Koch 1870, Thorell 1872 = Pardosa amnicola (L. Koch) 1870
„ amylacea C. L. Koch 1839 = Lycorma amylacea (C. L. Koch) 1839
„ andalusiaca Simon 1876 = Lycorma ferox (Lucas) 1838
„ andesina Berland 1913 = Solicosa andesina (Berland) 1913
„ andina Chamberlin 1916 = Arctosa andina (Chamberlin) 1916
„ andrenivora Walckenaer 1805 = Alopecosa pulverulenta (Clerck) 1757
„ andrenivora Walckenaer 1837, Blackwall 1861 = Alopecosa barbipes (Sundevall) 1832
„ angusta Tullgren 1901, Wallace 1950 = Isohogna angusta (Tullgren) 1901
„ animosa Walckenaer 1837 part. = Clubiona excepta L. Koch 1866
„ animosa Walckenaer 1837 part. = Anahita animosa (Walckenaer) 1837
„ annae Strand 1916 = Pardosa annae (Strand) 1916
„ annandalei Gravely 1924 = Pardosa annandalei (Gravely) 1924
„ annexa Gertsch 1934 = Hogna annexa (Chamberlin & Ivie) 1944
„ annulata Thorell 1872 et sequ. = Pardosa annulata (Thorell) 1872
„ antelucana Montgomery 1904, Gertsch & Wallace 1935 = Hogna antelucana (Montgomery) 1904
„ apicata Banks 1904, Chamberlin 1908 = Hogna antelucana (Montgomery) 1904
„ apothetica Wallace 1937 = Varacosa apothetica (Wallace) 1937
„ aquilonaris L. Koch 1874 = Pardosa glacialis (Thorell) 1872
„ arapensis Petrunkevitch 1911 = Mimohogna arapensis (Strand) 1908
„ arbuscula Purcell 1903 = Pterartoria arbuscula (Purcell) 1903
„ archaeologica Chamberlin 1916 = Hogna archaeologica (Chamberlin) 1916
„ arctica Kulczynski 1916 = Pardosa arctica (Kulczynski) 1916
„ arenaria Audouin 1827, Walckenaer 1837 = Evippa arenaria (Audouin) 1827
„ arenaria C. L. Koch 1843, 1848, Westring 1862 = Pardosa agricola (Thorell) 1856
„ arenaria Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ arenaria Urquhart 1890 = Geolycosa arenivaga (Dalmas) 1917
„ arenaris Hogg 1905 = Varacosa arenaris (Hogg) 1905
„ arenicola Cambridge 1875, 1881 et sequ. = Pardosa arenicola (Cambridge) 1875
„ arenicola Scudder 1877, Mc Cook 1890, Stone 1890, Banks 1895, Montgomery 1902, 1904, Chamberlin 1908 = Geolycosa pikei (Marx) 1881
„ arenicola Mc Cook 1889, 1893, part., Banks 1895 part., Chamberlin 1908 part. = Geolycosa turricola (Treat) 1880
„ arenicola Montgomery 1902 part., Chamberlin 1908 part. = Scaptocosa missouriensis (Banks) 1895
„ arenicola Montgomery 1903, Chamberlin 1908 part. = Geolycosa latifrons Montgomery 1904
„ arenivaga Dalmas 1917 = Geolycosa arenivaga (Dalmas) 1917
„ argenteomarginata Lucas 1846 = Pirata piraticus (Clerck) 1757
„ armillata Walckenaer 1837 = Alopecosa cuneata (Clerck) 1757
„ arorai Dyal 1935 = Chorilycosa arorai (Dyal) 1935
„ aspersa Hentz 1844, Chamberlin 1908, Kaston 1948 = Hygrolycosa aspersa (Hentz) 1844
„ aspersa Nicolet 1849 = Pardosa joerandae (Strand) 1916
„ astrigera Bösenberg & Strand 1906, Strand 1918 = Pardosa astrigera (L. Koch) 1878
„ astrigera gorontalensis Merian 1911 = Hogna gorontalensis (Merian) 1911
„ astuta Gerstäcker 1873 = Arctosa astuta (Gerstäcker) 1873
„ atlantica Marx 1889, Petrunkevitch 1929, Bryant 1940 = Hoggicosa atlantica (Marx) 1889
„ atomaria C. L. Koch 1848 et sequ. = Pardosa atomaria (C. L. Koch) 1848
„ atra Giebel 1869 = Pardosa waglerii atra (Giebel) 1869
„ atramentata Karsch 1879 = Hogna atramentata (Karsch) 1879
„ atrata Thorell 1873 et sequ. = Pardosa atrata (Thorell) 1873

Lycosa (Forts.):

„ audax Walckenaer 1837 = Alopecosa inquilina (Clerck) 1757
„ aurantipes Strand 1906, 1907 = Pardosa aurantipes (Strand) 1906
„ aurata Purcell 1903 = Allocosa aurata (Purcell) 1903
„ auribrachialis Schenkel 1936 = Hogna auribrachialis (Schenkel) 1936
„ auricoma Petrunkevitch 1911 = Hogna auricoma (Keyserling) 1891
„ auroguttata Keyserling 1891 = Varacosa auriguttata (Keyserling) 1891
„ aussereri Banks 1901 = Arctosa aussereri (Keyserling) 1876
„ australis Simon 1884, 1887, Tullgren 1901 = Allocosa australis (Simon) 1884
„ avara Montgomery 1903, Chamberlin 1908 et sequ. = Varacosa avara (Keyserling) 1876
„ avara gosiuta Chamberlin 1909 = Varacosa gosiuta (Chamberlin) 1909
„ avida Walckenaer 1837, Petrunkevitch 1911, Kaston 1948 = Avicosa avida (Walckenaer) 1837
„ babingtoni Blackwall 1846 = Hogna helluo (Walckenaer) 1837
„ bacchabunda Karsch 1884 = Arctosa bacchabunda (Karsch) 1884
„ badia Menge 1879 = Pardosa pullata (Clerck) 1757
„ badia Petrunkevitch 1911 = Lycorma badia (Keyserling) 1876
„ balearica Simon 1876 = Hogna balearica (Thorell) 1872
„ baliensis Giltay 1935 = Alopecosa baliensis (Giltay) 1935
„ baltimoriana Montgomery 1902, Emerton 1909 et sequ. = Geolycosa baltimoriana (Keyserling) 1870
„ barbipes Sundevall 1832, Westring 1862, Lessert 1910 = Alopecosa barbipes (Sundevall) 1832
„ barbipes Cambridge 1870 = Alopecosa cuneata (Clerck) 1757
„ barroanus Chamberlin & Ivie 1936 = Oxyopes barroanus (Chamberlin & Ivie) 1936
„ basiri Dyal 1935 = Pardosa basiri (Dyal) 1935
„ baulnyi Simon 1876 = Allocosa baulnyi (Simon) 1876
„ beanii Emerton 1894, Chamberlin 1908 = Alopecosa aculeata (Clerck) 1757
„ beckeri Schmidt 1895 = Alopecosa beckeri (Thorell) 1875
„ bellamyi Gertsch & Wallace 1937 = Avicosa bellamyi (Gertsch & Wallace) 1937
„ bellatrix L. Koch 1865 = Lycorma bellatrix (L. Koch) 1865
„ bellicosa Goyen 1887 = Pardosa bellicosa (Goyen) 1887
„ beltram Mello-Leitao 1842 = Trochosa beltram (Mello-Leitao) 1942
„ benedicta Chamberlin 1925 = Hogna benedicta (Chamberlin) 1925
„ berenice L. Koch 1877 = Avicosa berenice (L. Koch) 1877
„ bergi Holmberg 1876 = Aulonia bergi (Holmberg) 1876
„ bergsoeii Schmidt 1895 = Hogna bergsoeii (Thorell) 1875
„ bernensis Lebert 1877 = Pardosa bernensis (Lebert) 1877
„ bessiana Pocock 1900 = Allocosa algoensis (Pocock) 1900
„ biarmillata Strand 1942 = Pardosa biarmillata (Strand) 1942
„ bicolor Hogg 1905 = Allocosa bicolor (Hogg) 1905
„ bifasciata Menge 1879 o = Pardosa monticola (Clerck) 1757
„ bifasciata C. L. Koch 1834, 1848, Menge 1879 O, Bösenberg 1903 et sequ. = Passiena bifasciata (C. L. Koch) 1834
„ biimpressa Lucas 1846 = Hogna radiata (Latreille) 1819
„ bimaculata Purcell 1903 = Hogna bimaculata (Purcell) 1903
„ birmanica Thorell 1895, Gravely 1924, Dyal 1935 = Pardosa birmanica Simon 1884
„ bistriata Gravely 1924, Dyal 1935, Sinha 1951 = Hogna bistriata (Gravely) 1924
„ biunguiculata Cambridge 1873, 1894 = Arctosa alpigena (Doleschal) 1852
„ bivittata Mello-Leitao 1939, 1941 = Geolycosa bivittata (Mello-Leitao) 1939
„ blackwallii Johnson 1862, Pollock 1863 = Geolycosa blackwallii (Johnson) 1862
„ blanca Wagner 1894 = Pardosa lugubris (Walckenaer) 1802
„ blanda Heer 1846, Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ blanda Thorell 1872 = Pardosa ferruginea (L. Koch) 1870
„ blanda C. L. Koch 1834, 1848, Bösenberg 1903 et sequ. = Pardosa blanda (C. L. Koch) 1834

Lycosa (Forts.):
- „ bleyi Dahl 1908 = Pardosa bleyi (Dahl) 1908
- „ bogotensis Petrunkevitch 1911 = Arctosa bogotensis (Keyserling) 1876
- „ boiei Doleschall 1859 = Dolomedes boiei (Doleschall) 1859
- „ borealis Sundevall 1832, Westring 1862 = Acantholycosa lignaria (Clerck) 1757
- „ bowonglangi Merian 1911 = Hogna bowonglangi (Merian) 1911
- „ brevimetatarsis Strand 1907 = Pardosa brevimetatarsis (Strand) 1907
- „ brevipes Banks 1893 = Pirata brevipes (Banks) 1893
- „ brevispina Lessert 1915, 1926 = Arctosa brevispina (Lessert) 1915
- „ brevitarsis F. Cambridge 1902 = Hogna brevitarsis (F. Cambridge) 1902
- „ bridarollii Mello-Leitao 1945 = Geolycosa bridarollii (Mello-Leitao) 1945
- „ brisbanae L. Koch 1878 = Pirata brisbanae (L. Koch) 1878
- „ bruneipes Purcell 1903 = Trochosa bruneipes (Purcell) 1903
- „ brunneiventris Banks 1894 = Alopecosa kochii (Keyserling) 1876
- „ bruta Karsch 1880 = Trochosa bruta (Karsch) 1880
- „ burti Hickman 1944 = Hogna burti (Hickman) 1944
- „ caduca Karsch 1880 = Trochosa caduca (Karsch) 1880
- „ calamarica Mello-Leitao 1941 = Allocosa calmarica (Mello-Leitao) 1941
- „ calida Blackwall 1852 = Passiena bifasciata (C. L. Koch) 1834
- „ calida Dahl 1908, 1927, Palmgren 1939 = Passiena schenkeli (Lessert) 1904
- „ caliginosa Simon 1876 = Trochosa hispanica (Simon) 1870
- „ calvata Karsch 1880 = Trochosa calvata (Karsch) 1880
- „ cambrica Blackwall 1841, 1861 = Megarctosa leopardus (Sundevall) 1832
- „ cambridgei Simon 1876 = Allocosa cambridgei (Simon) 1876
- „ campestris Walckenaer 1825, 1837 = nicht zu deuten!
- „ campestris Blackwall 1861 = Trochosa ruricola (De Geer) 1778
- „ camtschadalica Kulczynski 1886 = Pardosa atrata (Thorell) 1873
- „ canadensis Blackwall 1871 = Pardosa milvina (Hentz) 1844
- „ candicans L. Koch 1876 = Trochosula candicans (L. Koch) 1876
- „ canescens Goyen 1886 = Pardosa canescens (Goyen) 1886
- „ captans Walckenaer 1837 = Hogna radiata (Latreille) 1819
- „ carmicheli Gravely 1924 = Pardosa carmicheli (Gravely) 1924
- „ carnifex Collett 1875 = Pardosa carnifex (Collett) 1875
- „ carolinensis Walckenaer 1805, 1837, Hentz 1842 et sequ. = Hogna carolinensis (Walckenaer) 1805
- „ carrana Bryant 1934, Gertsch & Wallace 1936 = Varacosa carrana (Bryant) 1934
- „ castanea Hogg 1905 = Allocosa castanea (Hogg) 1905
- „ catula Pocock 1900, Sinha 1951 = Hogna indagatrix (Walckenaer) 1837
- „ cayennensis Taczanowski 1879 = Pardosa cayennensis (Taczanowski) 1879
- „ cecilii Pocock 1901 = Avicosa cecilii (Pocock) 1901
- „ celebensis Merian 1911 = Hogna celebensis (Merian) 1911
- „ celeris Thorell 1875 = Pardosa celeris (Thorell) 1875
- „ ceraticola Gertsch & Wallace 1935, 1937 = Avicosa ceraticola (Gertsch & Wallace) 1935
- „ cerrofloresiana Petrunkevitch 1925 = Varacosa cerrofloresiana (Petrunkevitch) 1925
- „ chacoensis Mello-Leitao 1942 = Agalenocosa chacoensis (Mello-Leitao) 1942
- „ chaperi Simon 1885, Pocock 1900, Dyal 1935 = Hogna chaperi (Simon) 1885
- „ charonoides Montgomery 1902, 1903 = Schizocosa saltatrix (Hentz) 1844
- „ chelifasciata Mello-Leitao 1943 = Schizocosa chelifasciata (Mello-Leitao) 1943
- „ chelata Müller 1769 ?, Dahl 1908, 1927, Reimoser 1930, Palmgren 1939 = Pardosa lugubris (Walckenaer) 1802
- „ chengta Fox 1935 = Arkalosula chengta (Fox) 1935
- „ chersonensis Krynicki 1837 = Hogna radiata (Latreille) 1819
- „ chickeringi Chamberlin & Ivie 1936 = Hogna chickeringi (Chamberlin & Ivie) 1936
- „ chisimensis Saito 1932 = Pardosa chisimensis (Saito) 1932

Lycosa (Forts.):

„ chopini Fox 1935 = Avicosa chopini (Fox) 1935
„ cincta Kulczynski 1887, 1909 = Pardosa lapponica (Thorell) 1872
„ cinerascens Roewer 1951 = Pardosa cinerascens (Roewer) 1951
„ cinerea Sundevall 1832, Westring 1862, Thorell 1872, Becker 1882, Emerton 1885, 1902, Montgomery 1902, Chamberlin 1908 = Arctosa cinerea (Fabricius) 1776
„ cinerea Vinson 1863 = Pardosa cinerascens (Roewer) 1951
„ cinereofusca Dönitz & Strand 1906 = Pardosa cinereofusca (Dönitz & Strand) 1906
„ clara L. Koch 1877, Hogg 1905, 1914 = Allocosa clara (L. Koch) 1877
„ clardki Hogg 1912 = Hyaenosa clardki (Hogg) 1912
„ clavipalpus Purcell 1903 = Pardosa inopina clavipalpus (Purcell) 1903
„ clavipes C. L. Koch 1834, 1848 = Alopecosa cuneata (Clerck) 1757
„ coahuilana Gertsch & Davis 1940 = Schizocosa coahuilana (Gertsch & Davis) 1940
„ coelestis L. Koch 1878 = Hogna coelestis (L. Koch) 1878
„ coloradensis Banks 1894, 1898 = Hogna coloradensis (Banks) 1894
„ coloradensis Chamberlin 1908 = Pardosa ontariensis Gertsch 1933
„ commota Gertsch 1934 = Hogna commota (Gertsch) 1934
„ communis Emerton 1885, 1902 = Avicosa avida (Walckenaer) 1837
„ concinna Thorell 1877 = Pardosa concinna (Thorell) 1877
„ concolor Kroneberg 1875 = Evippa concolor (Kroneberg) 1875
„ concolor Banks 1895 = Pardosa concolorata (Roewer) 1951
„ condolens Cambridge 1885 = Pardosa condolens (Cambridge) 1885
„ congener Cambridge 1870 = Pardosa nigriceps (Thorell) 1856
„ conspersa L. Koch 1882 = Trochosula conspersa (L. Koch) 1882
„ constricta F. Cambridge 1902 = Lycorma constricta (F. Cambridge) 1902
„ contestata Montgomery 1903 = Allohogna pratensis (Emerton) 1885
„ cosquin Mello-Leitao 1941 = Hogna cosquin (Mello-Leitao) 1941
„ crassipalpis Emerton 1909 = Schizocosa crassipalpata Roewer 1951
„ crassipes Walckenaer 1837 = Hogna crassipes (Walckenaer) 1837
„ credula Cambridge 1885 = Pardosa credula (Cambridge) 1885
„ cretata Purcell 1903 = Geolycosa cretata (Purcell) 1903
„ crispipes L. Koch 1877 = Hygrolycosa crispipes (L. Koch) 1877
„ cristopheri Simon 1909 = Avicosa cristopheri (Simon) 1909
„ cruciata Sundevall 1832 = Alopecosa barbipes (Sundevall) 1832
„ crudelis Banks 1892 = Hogna helluo (Walckenaer) 1837
„ cuneata Sundevall 1832, Westring 1862, Simon 1876, Becker 1882, Lessert 1910 = Alopecosa cuneata (Clerck) 1757
„ cuneata C. L. Koch 1834 = Alopecosa trabalis (Clerck) 1757
„ cuneata C. L. Koch 1848 = Alopecosa pulverulenta (Clerck) 1757
„ cunicularia Simon 1886 = Allocosa oculata (Simon) 1876
„ cursor Hahn 1831 et sequ. = Alopecosa cursor (Hahn) 1831
„ cursor Westring 1862 = Alopecosa aculeata (Clerck) 1757
„ cursor dordeiae Strand 1916 = Alopecosa cursor insignis (Nosek) 1905
„ cursoria L. Koch 1870 = Pardosa blanda (C. L. Koch) 1834
„ cursoria Dahl 1908, 1927 = Pardosa kervillei Simon 1947
„ cursoria C. L. Koch 1848 = Pardosa monticola (Clerck) 1757
„ cyrenaica Simon 1908 = Geolycosa cyrenaica (Simon) 1908
„ daisetsuzana Saito 1934 = Pardosa daisetsuzana (Saito) 1934
„ danica Soerensen 1904 = Pardosa danica (Soerensen) 1904
„ darlingi Pocock 1898, Lawrence 1936 = Avicosa darlingi (Pocock) 1898
„ darolii Strand 1906, 1907 = Pardosa darolii (Strand) 1906
„ decipiens Cambridge 1903 = Pardosa agrestis (Westring) 1862
„ de greyi Cambridge 1870 = Pirata piraticus (Clerck) 1757
„ delfini Simon 1904 = Avicosa delfini (Simon) 1904
„ deserta Cambridge 1872 = Arctosa deserta (Cambridge) 1872

Lycosa (Forts.):

„ deserticola Simon 1898 = Allocosa deserticola (Simon) 1898
„ dilatata F. Cambridge 1902, Petrunkevitch 1925 = Hogna dilatata (F. Cambridge) 1902
„ dimota Simon 1909 = Isohogna dimota (Simon) 1909
„ dissonans Cambridge 1872 = Arctosa dissonans (Cambridge) 1872
„ distincta Blackwall 1846 = Pardosa distincta (Blackwall) 1846
„ dolosa Cambridge 1873 = Leaena dolosa (Cambridge) 1873
„ domifex Hancock 1899 = Scaptocosa missouriensis (Banks) 1895
„ dönitzi Bösenberg & Strand 1906 = Pardosa dönitzi (Bösenberg & Strand) 1906
„ dregei Purcell 1903 = Arctosa dregei (Purcell) 1903
„ dromea Thorell 1878 = Pardosa groenlandica (Thorell) 1872
„ dubia Walckenaer 1837, Mello-Leitao 1947 = Allocosa dubia (Walckenaer) 1837
„ dufouri Simon 1876 = Allocosa dufouri (Simon) 1876
„ edentula Simon 1910 = Edenticosa edentula (Simon) 1910
„ effera Cambridge 1872 = Hyaenosa effera (Cambridge) 1872
„ egena L. Koch 1877 = Scaptocosa egena (L. Koch) 1877
„ ehni Lessert 1933 = Avicosa ehni (Lessert) 1933
„ eisenii Thorell 1875 et sequ. = Pardosa eisenii (Thorell) 1875
„ ejusmodi Cambridge 1872 = Pardosa ejusmodi (Cambridge) 1872
„ elegans Thorell 1875 = Pardosa elegans (Thorell) 1875
„ embriki Kolosvary 1937 = Pardosa embriki (Kolosvary) 1937
„ encarpata Walckenaer 1837 = Teippus encarpatus (Walckenaer) 1837
„ entebbensis Lessert 1915 = Trochosa entebbensis (Lessert) 1915
„ entzii Chyzer 1891, Kolosvary 1940 = Pardosa entzii (Chyzer) 1891
„ ephippium Hahn 1829 = nicht zu deuten!
„ episima Chamberlin 1924 = Isohogna episima (Chamberlin) 1924
„ ericeticola Wallace 1942 = Isohogna ericeticola (Wallace) 1942
„ errans Hogg 1905 = Hoggicosa errans (Hogg) 1905
„ erratica Lucas 1846 = Avicosa algerica (Roewer) 1951
„ erratica Hentz 1844, Chamberlin 1908 = Avicosa avida (Walckenaer) 1837
„ erudita Simon 1980, Schenkel 1936 = Alopecosa erudita (Simon) 1880
„ erupticia Strand 1913 = Pardosa erupticia (Strand) 1913
„ erythrognatha Lucas 1836, Mello-Leitao 1947 = Scaptocosa raptoria (Walckenaer) 1837
„ erythrostoma C. L. Koch 1848 = Scaptocosa raptoria (Walckenaer) 1837
„ euepigynata Montgomery 1904, Gertsch & Wallace 1935 = Hogna euepigynata (Montgomery) 1904
„ evagra Chamberlin 1925 = Hogna evagra (Chamberlin) 1925
„ exalbida Becker 1881 = Allocosa dubia (Walckenaer) 1837
„ excellens Simon 1876 = Leaena excellens (Simon) 1876
„ exculta L. Koch 1877 = Allohogna exculta (L. Koch) 1877
„ excussa Tullgren 1905, Mello-Leitao 1941 = Geolycosa excussa (Tullgren) 1905
„ exigua Blackwall 1836, 1861 = Pardosa monticola (Clerck) 1757
„ exilipes Lucas 1846 = Hogna radiata (Latreille) 1819
„ exitiosa Banks 1892 = Hygrolycosa aspera (Hentz) 1844
„ exornata Herman 1879 = Hogna radiata (Latreille) 1819
„ expolita L. Koch 1877 = Avicosa expolita (L. Koch) 1877
„ fabella Karsch 1879 = Sosilaus fabella (Karsch) 1879
„ faberrima Simon 1910 = Allocosa faberrima (Simon) 1910
„ fabrilis Walckenaer 1825, Sundevall 1832 et sequ. = Alopecosa fabrilis (Clerck) 1757
„ fallax L. Koch 1877 = Agalenocosa fallax (L. Koch) 1877
„ fallax Marx 1889 = nom. nud.
„ famelica C. L. Koch 1839, Walckenaer 1841, Blackwall 1869 = Hogna radiata (Latreille) 1819
„ farinosa Herman 1879 = Alopecosa barbipes (Sundevall) 1832
„ farrenii Cambridge 1870, Smith 1907 = Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert) 1865

Lycosa (Forts.):

- „ fasciiventris Dufour 1835, Simon 1876 = Allocosa fasciiventris (Dufour) 1835
- „ fastosa Keyserling 1876, Strand 1914 = Pardosa fastosa (Keyserling) 1876
- „ fatifera Hentz 1844 part., Chamberlin 1910 part., 1925 = Scaptocosa fatifera (Hentz) 1844
- „ fatifera Hentz 1844 part. = Geolycosa turricola (Treat) 1880
- „ fatifera Chamberlin 1908, 1910 part. = Geolycosa latifrons Montgomery 1904
- „ fatifera Chamberlin 1908, 1919 part. = Scaptocosa missouriensis (Banks) 1895
- „ fatifera Chamberlin 1908, 1910 part. = Geolycosa uinticolens (Chamberlin) 1936
- „ febriculosa Becker 1881 = Pirata piraticus (Clerck) 1757
- „ feldmanni Strand 1907 = Pardosa feldmanni (Strand) 1907
- „ felina L. Koch 1878 = Hogna felina (L. Koch) 1878
- „ fernandezi Petrunkevitch 1911 = Trochosa fernandezi F. Cambridge 1899
- „ ferox Lucas 1838, Simon 1885, Denis 1947 = Lycorma ferox (Lucas) 1838
- „ ferruginea L. Koch 1870, 1876 et sequ. = Pardosa ferruginea (L. Koch) 1870
- „ ferruginea Lebert 1877 = nicht zu deuten!
- „ festina L. Koch 1877 = Geolycosa festina (L. Koch) 1877
- „ festina Bryant 1948 = Agalenocosa bryantae (Roewer) 1951
- „ festinans Herman 1879 = Pardosa festinans (Herman) 1879
- „ festiva Pavesi 1880 = Evippa arenaria (Audouin) 1827
- „ festiva Urquhart 1893 — Lycosa tasmanica (Roewer) 1951
- „ fidelis Cambridge 1872 = Pardosa fidelis (Cambridge) 1872
- „ figurata Simon 1876, 1937 = Hygrolycosa figurata (Simon) 1876
- „ filicata Simon 1876 = Arctosa perita (Latreille) 1798
- „ finkei Hickman 1944 = Allocosa finkei (Hickman) 1944
- „ flavida Cambridge 1885, Schmidt 1895 = Pardosa flavida (Cambridge) 1885
- „ flavipes Keyserling 1876 = Pardosa milvina (Hentz) 1844
- „ flavisternis L. Koch 1877 = Allocosa flavisternis (L. Koch) 1877
- „ fletcheri Gravely 1924 = Pardosa fletcheri (Gravely) 1924
- „ fletcheri Hickman 1944 = Varacosa hickmani **nom. nov.**
- „ floridana Banks 1896, Chamberlin 1908 = Pardosa floridana (Banks) 1896
- „ floridiana Chamberlin 1908 = Allocosa floridiana (Banks) 1890
- „ fluviatilis Blackwall 1861, Dahl 1908, 1927, Reimoser 1928, Palmgren 1939 = Pardosa agricola (Thorell) 1856
- „ formosana Saito 1936 = Lycorma formosana (Saito) 1936
- „ fortunata Cambridge 1885 = Pardosa fortunata (Cambridge) 1885
- „ foveata Odenvall 1901 = Pardosa foveata (Odenvall) 1901
- „ fraissei L. Koch 1882 = Lycorma fraissei (L. Koch) 1882
- „ frondicola Emerton 1885, Stone 1890, Chamberlin 1908 et sequ. = Allocosa frondicola (Emerton) 1885
- „ fuegiana Marx 1889 = nom. nud.
- „ fulvipes Collett 1875 = Pardosa prativaga fulvipes (Collett) 1875
- „ fulviventris Simon 1883 = Metatrochosina lucasi (Roewer) 1951
- „ fulvolineata Lucas 1846, Simon 1899 = Leaena fulvolineata (Lucas) 1846
- „ fumigata Walckenaer 1805, 1837, C. L. Koch 1848, Smith 1907 = Pardosa paludicola (Clerck) 1757
- „ fumigata Thorell 1856 = Pardosa amentata (Clerck) 1757
- „ fumigata Dahl 1908, 1927 = Alopecosa pinetorum (Thorell) 1856
- „ fumosa Emerton 1894, Banks 1898, Chamberlin 1908 = Melloicosa fumosa (Emerton) 1894
- „ funerea Hentz 1844, Emerton 1913 = Allocosa funerea (Hentz) 1844
- „ funesta C. L. Koch 1837 = Alopecosa funesta (C. L. Koch) 1837
- „ furcifera Thorell 1875, Soerensen 1898 = Pardosa furcifera (Thorell) 1875
- „ furcifera Simon 1937 = Piratula eugeni (Roewer) 1951
- „ furva Thorell 1899, Simon 1909 = Hogna furva (Thorell) 1899
- „ furva Strand 1906 = Varacosa pseudofurva (Strand) 1906
- „ furva Bösenberg 1903, Kolosvary 1938 = Pardosa annae (Strand) 1916
- „ furva minor Simon 1909 = Geolycosa minor (Simon) 1909

Lycosa (Forts.):

- furvescens Simon 1910 = Lycorma furvescens (Simon) 1910
- fusca Banks 1901, Petrunkevitch 1929, Bryant 1940 = Arkalusula fusca (Keyserling) 1876
- fuscana Pocock 1901 = Allocosa fuscana (Pocock) 1901
- fuscipes C. L. Koch 1848, Hadjissarandos 1940 = Alopecosa fuscipes (C. L. Koch) 1848
- fuscula Thorell 1875, Jackson 1933 = Pardosa fuscula (Thorell) 1875
- galapagoensis Banks 1902 = Gnatholycosa galapagoensis (Banks) 1902
- galerita L. Koch 1875, Simon 1876 = Pardosa venatrix (Lucas) 1846
- galilaei Caporiacco 1923 = Alopecosa galilaei (Caporiacco) 1923
- gallopavo Mello-Leitao 1941 = Pavocosa gallopavo (Mello-Leitao) 1941
- gasteinensis C. L. Koch 1834, 1848 = Alopecosa pulverulenta (Clerck) 1757
- georgiana Walckenaer 1837 = Hogna carolinensis (Walckenaer) 1805
- georgicola Walckenaer 1837, Chamberlin & Ivie 1944 = Allocosa georgicola (Walckenaer) 1837
- gerhardti Strand 1922 = Pardosa gerhardti (Strand) 1922
- giebeli Petrunkevitch 1911 = Hogna commota (Gertsch) 1934
- giebelii Pavesi 1873, Kulczynski 1916 et sequ. = Pardosa giebelii (Pavesi) 1873
- gilberta Hogg 1905 = Venonia gilberta (Hogg) 1905
- glacialis Thorell 1872, Cambridge 1877, Soerensen 1898 = Pardosa glacialis (Thorell) 1872
- godeffroyi L. Koch 1865, 1877 = Geolycosa godeffroyi (L. Koch) 1865
- goliathus Pocock 1901 = Allocosa phipsoni (Pocock) 1899
- gosiuta Gertsch 1935 = Varacosa gosiuta (Chamberlin) 1909
- gosoga Chamberlin 1925, 1936, Wallace 1942 = Scaptocosa gosoga (Chamberlin) 1925
- goyderi Hickman 1944 = Mustelicosa goyderi (Hickman) 1944
- goyeni Roewer 1951 = Pardosa goyeni (Roewer) 1951
- gracilenta Lucas 1846 = Pardosa gracilenta (Lucas) 1846
- gracilis Banks 1892 = Schizocosa saltatrix (Hentz) 1844
- gracilitarsis Purcell 1903 = Allocosa gracilitarsis (Purcell) 1903
- grahami Fox 1935 = Avicosa grahami (Fox) 1935
- graminicola Walckenaer 1825, 1837 = Alopecosa pulverulenta (Clerck) 1757
- granadensis Mello-Leitao 1941 = Agalenocosa helvola (C. L. Koch) 1848
- grandis Banks 6894, 1898, Chamberlin 1908 = Geolycosa grandis (Banks) 1894
- greenalliae Blackwall 1867 = Hippasa greenalliae (Blackwall) 1867
- grisea Risso 1826 = nicht zu deuten!
- grisea C. L. Koch 1848 = Hogna graeca (Roewer) 1951
- groenlandica Thorell 1872, Soerensen 1898, Jackson 1933 = Pardosa groenlandica (Thorell) 1872
- guaquiensis Petrunkevitch 1911 = Trochosa guaquiensis (Strand) 1908
- guayaquiliana Mello-Leitao 1939 = Geolycosa guayaquiliana (Mello-Leitao) 1939
- guentheri Pocock 1900 = Orinocosa guentheri (Pocock) 1900
- guernei Palmgren 1939 = Pardosa guernei Simon 1887
- guillouana Walckenaer 1847 = nicht zu deuten!
- gulosa Walckenaer 1837 et sequ. = Varacosa gulosa (Walckenaer) 1837
- gulosa Karsch 1884 = Hogna karschi (Roewer) 1951
- gulosa Tullgren 1905 = Hogna gumia (Petrunkevitch) 1911
- gumia Petrunkevitch 1911 = Hogna gumia (Petrunkevitch) 1911
- guttata Karsch 1878 = Ocyale atalanta (Audouin) 1827
- guttulata F. Cambridge 1902 = Hogna guttulata (F. Cambridge) 1902
- halei Hickman 1944 = Allocosa halei (Hickman) 1944
- handschini Schenkel 1937 = Allocosa handschini (Schenkel) 1937
- hasseltii L. Koch 1877, Karsch 1878 = Allocosa hasseltii (L. Koch) 1877
- hawaiiensis Simon 1899 = Hogna hawaiiensis (Simon) 1899
- hectoria Pocock 1900 = Scaptocosa hectoria (Pocock) 1900

Lycosa (Forts.):

- „ hellencia C. L. Koch 1836, 1839, Walckenaer 1837 = Citilycosa hellenica (C. L. Koch) 1836
- „ helluo Walckenaer 1837 = Hogna helluo (Walckenaer) 1837
- „ helluo Chamberlin & Ivie 1944 = Hogna annexa (Chamberlin & Ivie) 1944
- „ helva Vinson 1863 = nicht zu deuten!
- „ helvola C. L. Koch 1848 = Agalenocosa helvola (C. L. Koch) 1848
- „ hentzi Banks 1904, Wallace 1950 = Megarctosa hentzi (Banks) 1904
- „ herbigrada Blackwall 1857, 1861, Cambridge 1881, Smith 1951 = Pardosa herbigrada (Blackwall) 1857
- „ herteli Mello-Leitao 1947 = Pavocosa herteli (Mello-Leitao) 1947
- „ heterura Simon 1900 = Cynosa heterura (Simon) 1900
- „ hewitti Lessert 1915 = Avicosa hewitti (Lessert) 1915
- „ hirsuta F. Cambridge 1902 = Lycosa sigridae (Strand) 1916
- „ hispanica Walckenaer 1837, Simon 1876 = Hogna hispanica (Walckenaer) 1837
- „ hoggi Lessert 1926 = Varacosa hoggi (Lessert) 1926
- „ horrida Petrunkevitch 1911 = Allohogna horrida (Keyserling) 1876
- „ hortensis Thorell 1872 ♀, Dahl 1908, 1927, Locket & Millidge 1951 = Pardosa hortensis (Thorell) 1872
- „ hortensis Thorell 1872 ♂, Dahl 1883, Bösenberg 1903 = Pardosa blanda (C. L. Koch) 1839
- „ hostilis L. Koch 1877 = Allocosa hostilis (L. Koch) 1877
- „ houssa Strand 1913 part. = Pardosa foveolata (Purcell) 1903
- „ houssa Strand 1913 part. = Pardosa houssabeni **nom. nov.**
- „ huachoi Mello-Leitao 1942 = Ocyale huachoi (Mello-Leitao) 1942
- „ huberti Chamberlin 1924, Gertsch & Wallace 1935 = Scaptocosa huberti (Chamberlin) 1924
- „ humicola Mello-Leitao 1947 = Triccosta humicola (Bertkau) 1880
- „ humilis Banks 1892 = Schizocosa saltatrix (Hentz) 1844
- „ hygrophila Cambridge 1873, Lessert 1910, Simon 1937 = Piratula hygrophila (Thorell) 1872
- „ hylton-scottae Mello-Leitao 1941 = Geolycosa hylton-scottae (Mello-Leitao) 1941
- „ hyperborea Thorell 1872, Soerensen 1898, Fedotow 1911, Holm 1947 = Pardosa hyperborea (Thorell) 1872
- „ hyperborea Jackson 1930, Palmgren 1939 = Pardosa hyperborea pusilla (Thorell) 1872
- „ hypocrita Simon 1882 = Pardosa hypocrita (Simon) 1882
- „ immaculata Banks 1892 = Hygrolycosa aspersa (Hentz) 1844
- „ immanis L. Koch 1879 = Lycorma immanis (L. Koch) 1879
- „ immansueta Simon 1909 = Hogna immansueta (Simon) 1909
- „ impavida Thorell 1877 = Pardosops impavidula **nom. nov.**
- „ impedita Simon 1909 = Allocosa impedita (Simon) 1909
- „ implacida Nicolet 1849, Simon 1884 = Allocosa implacida (Nicolet) 1849
- „ impudica Mello-Leitao 1944 = Scaptocosa impudica (Mello-Leitao) 1944
- „ incerta Giltay 1932 = Pardosa incerta Nosek 1905
- „ incertula Mello-Leitao 1941 = Scaptocosa incertula (Mello-Leitao) 1941
- „ incilis Odenvall 1901 = Pardosops incilis (Odenvall) 1901
- „ inconspicua Bryant 1948 = Arkalosula inconspicua (Bryant) 1948
- „ indagatrix Walckenaer 1837, Simon 1884, Pocock 1900, Gravely 1924 = Hogna indagatrix (Walckenaer) 1837
- „ indagatrix Thorell 1877 = Pardosa groenlandica (Thorell) 1872
- „ indecora Kulczynski 1916 = Pardosa indecora (L. Koch) 1879
- „ indefinida Mello-Leitao 1941 = Hogna indefinida (Mello-Leitao) 1941
- „ indistinctepicta Strand 1907, 1909 = Pardosa indistinctepicta (Strand) 1907
- „ indomita Nicolet 1849, Simon 1900, 1902 = Hogna indomita (Nicolet) 1849
- „ inexorabilis Cambridge 1869, Lessert 1915 = Lynxosa inexorabilis (Cambridge) 1869

Lycosa (Forts.):
„ infensa L. Koch 1877 = Scaptocosa infensa (L. Koch) 1877
„ infernalis Motschulsky 1849, Simon 1884 = Mimohogna vultuosa (C. L. Koch) 1839
„ ingens Blackwall 1857, 1867 = Geolycosa ingens (Blackwall) 1857
„ ingenua Karsch 1879 = Ocyale ingenua (Karsch) 1879
„ inhonesta Montgomery 1902, 1904 = Hygrolycosa aspersa (Hentz) 1844
„ injucunda Cambridge 1876 = Pardosa injucunda (Cambridge) 1876
„ innominabilis Dönitz & Strand 1906 = Pardosa innominabilis (Dönitz & Strand) 1906
„ inominata Simon 1886, 1904 = Hogna inominata (Simon) 1886
„ inopina Cambridge 1876 = Pardosa inopina (Cambridge) 1872
„ inops Merian 1911 = Lycorma inops (Thorell) 1890
„ inops lompobattangi Merian 1911 = Pterartoriella lompobattangi (Merian) 1911
„ inops masarangi Merian 1911 = Pterartoria masarangi (Merian) 1911
„ inornata Giebel 1863 = Hogna commota (Gertsch) 1834
„ inornata L. Koch 1877 = Allocosa samoana (Roewer) 1951
„ inornata Mello-Leitao 1941 = Scaptocosa sangilia **nom. nov.**
„ inquieta Cambridge 1876 = Pardosa inquieta (Cambridge) 1876
„ inquilina C. L. Koch 1833, 1848 = Alopecosa barbipes (Sundevall) 1832
„ inquilina Westring 1862, Simon 1876 et sequ. = Alopecosa inquilina (Clerck) 1757
„ insignis F. Cambridge 1902 = Trochosa insignis (Cambridge) 1898
„ insignita Simon 1876 = Arctosa alpigena (Doleschall) 1852
„ insolita L. Koch 1878 = Paratrochosina insolita (L. Koch) 1878
„ insopita Montgomery 1904 = Scaptocosa pulchra (Keyserling) 1876
„ insulana L. Koch 1882 = Lycorma insulana (L. Koch) 1882
„ insulata Mello-Leitao 1944 = Geolycosa insulata (Mello-Leitao) 1944
„ intermedia Bösenberg 1903 = Pardosa intermedia (Bösenberg) 1903
„ intermedia Caporiacco 1928 = Lycosa intermedialis **nom. nov.**
„ intersecta Latreille 1817 = Alopecosa pulverulenta (Clerck) 1757
„ intrepida Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ intrepida Marx 1889 = Pardosa groenlandica (Thorell) 1872
„ invenusta C. L. Koch 1837, 1848 = Pardosa invenusta (C. L. Koch) 1837
„ ipnochoera Thorell 1890, 1892 = Pardosa birmanica Simon 1884
„ ipsa Karsch 1879 = Trochosula ipsa (Karsch) 1879
„ iracunda Thorell 1877 = Pardosa tristis (Thorell) 1877
„ iranii Pocock 1901 = Allocosa iranii (Pocock) 1901
„ irrorata Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ isabellina C. L. Koch 1848 = Hogna radiata (Latreille) 1819
„ iviei Gertsch & Wallace 1937 = Varacosa iviei (Gertsch & Wallace) 1937
„ joerandae Strand 1916 = Pardosa joerandae (Strand) 1916
„ jollensis Schenkel 1951 = Jollecosa jollensis (Schenkel) 1951
„ josemitensis Strand 1908 = Pardosa josemitensis (Strand) 1908
„ jugorum Simon 1898 = Vesubia jugorum (Simon) 1881
„ kalaharensis Simon 1910, Lawrence 1936 = Allocosa kalaharensis (Simon) 1910
„ kalukanai Simon 1900 = Trochosa kalukanai (Simon) 1900
„ karagonis Strand 1913 = Pardosa karagonis (Strand) 1913
„ kempi Gravely 1924, Dyal 1935, Sinha 1951 = Piratua kempi (Gravely) 1924
„ knorri Simon 1937 = Piratula knorrii (Scopuli) 1763
„ kochii Emerton 1885 et sequ. = Varacosa gulosa (Waldkenaer) 1837
„ kochii Chamberlin 1908 = Alopecosa kochii (Keyserling) 1876
„ kollari Doleschall 1852 = Alopecosa inquilina (Clerck) 1757
„ konei Berland 1924 = Arctosa konei (Berland) 1924
„ kratochvili Kolosvary 1934 = Pardosa kratochvili (Kolosvary) 1934
„ kulagini Spassky 1941 = Hogna kulagini (Spassky) 1941
„ labradorensis Thorell 1875 = Pardosa labradorensis (Thorell) 1875

Lycosa (Forts.):

„ labrea Chamberlin & Ivie 1942 = Hogna labrea (Chamberlin & Ivie) 1942
„ laccophila Simon 1910 = Arctosa laccophila (Simon) 1910
„ lacernata Karsch 1879 = Trochosula lacernata (Karsch) 1879
„ lacertosa L. Koch 1877 = Hogna lacertosa (L. Koch) 1877
„ laciniosa Simon 1876, 1937 = Alopecosa laciniosa (Simon) 1876
„ lacustris Simon 1876, 1937 = Arctosa lacustris (Simon) 1876
„ laeta L. Koch 1877 = Allocosa laeta (L. Koch) 1877
„ laeta Hasselt 1888 = nicht zu deuten!
„ laetabunda Spassky 1941 = Pardosa laetabunda (Spassky) 1941
„ lallemandi Berland 1913 = Alopecosa lallemandi (Berland) 1913
„ lambarenensis Simon 1910 = Hogna lambarenensis (Simon) 1910
„ lamperti Dahl 1927 = Arctosa alpigena (Doleschall) 1852
„ lanca Karsch 1879, 1891 = Ocyale lanca (Karsch) 1879
„ lancearia Mello-Leitao 1940, 1941 = Geolycosa lancearia (Mello-Leitao) 1940
„ landanae Simon 1877 = Hogna landanae (Simon) 1877
„ laperousi Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ lapidicola Hahn 1829 = Trochosa ruricola (De Geer) 1778
„ lapidicola Dahl 1908, 1927 = Trochosa robusta (Simon) 1876
„ lapponica Thorell 1872 ♀ = Pardosa atrata (Thorell) 1873
„ lapponica Thorell 1872 ♂, Schenkel 1926 et sequ. = Pardosa lapponica (Thorell) 1872
„ lasciva Holm 1847 = Pardosa lasciva L. Koch 1879
„ latifasciata Schmidt 1895 = Alopecosa latifasciata (Kroneberg) 1875
„ latifrons Chamberlin 1908 = Scaptocosa fatifera (Hentz) 1844
„ latisepta Kulczynski 1885 = Pardosa indecora (L. Koch) 1879
„ latitans Blackwall 1841, 1861, Lessert 1910, Simon 1937 = Piratula latitans (Blackwall) 1841
„ lativittata Purcell 1903 = Pterartoriola lativittata (Purcell) 1903
„ latreillii Hahn 1831, C. L. Koch 1839 = Allohogna singoriensis (Laxmann) 1770
„ laura Bösenberg & Strand 1906 = Pardosa laura (Bösenberg & Strand) 1906
„ lawrencei Roewer 1951 = Hogna lawrencei (Roewer) 1951
„ leaeniformis Simon 1915 = Leaenella leaeniformis (Simon) 1915
„ lehuillana Walckenaer 1847 = nicht zu deuten!
„ lenta Hentz 1844, Banks 1904, Chamberlin 1908 et sequ. = Isohogna lenta (Hentz) 1844
„ leopardus Sundevall 1832, Thorell 1872, Simon 1876 et sequ. = Megarctosa leopardus (Sundevall) 1832
„ lepida Montgomery 1902, 1904 = Avicosa avida (Walckenaer) 1837
„ leprieuri Simon 1876 = Hogna leprieuri (Simon) 1876
„ letourneuxi Simon 1885 = Leaena letourneuxi (Simon) 1885
„ leuckartii L. Koch 1877 = Scaptocosa leuckartii (L. Koch) 1870
„ leucocephala L. Koch 1878 = Hogna leucocephala (L. Koch) 1878
„ leucophaea Blackwall 1837 = Arctosa cinerea (Fabricius) 1776
„ leucophaea L. Koch 1877 = Agalenocosa leucophaeoides (Roewer) 1951
„ leucophaeoides Roewer 1951 = Agalenocosa leucophaeoides (Roewer) 1951
„ leucostigma Simon 1885, Gravely 1924 = Crocodilosa leucostigma (Simon) 1885
„ leucostigma Mello-Leitao 1937 = Trochosa melloi Roewer 1951
„ levis Karsch 1879 = Lycorma levis (Karsch) 1879
„ ligata Cambridge 1869 = Vesubia ligata (Cambridge) 1869
„ lightfooti Purcell 1903 = Arctosa lightfooti (Purcell) 1903
„ lignaria Sundevall 1832, Westring 1862 et sequ. = Acantholycosa lignaria (Clerck) 1757
„ lignaria C. L. Koch 1833 = Pardosa pullata (Clerck) 1757
„ likelikeae Simon 1900 = Isohogna likelikeae (Simon) 1900
„ lindneri Karsch 1879, Simon 1910 = Scaptocosa lindneri (Karsch) 1879
„ liopus Chamberlin 1916 = Dingosa liopus (Chamberlin) 1916

Lycosa (Forts.):

„ litoralis Hentz 1844, Chamberlin 1924, Crosby & Bishop 1928 = Arctosa cinerea (Fabricius) 1776
„ loenbergi Tullgren 1901 = Sosippus floridanus (Simon) 1898
„ lombokibia Strand 1915 = Pardosa lombokibia (Strand) 1915
„ longipes Thorell 1872 = Acantholycosa rupicola (Dufour) 1820
„ longitarsis F. Cambridge 1902, Petrunkevitch 1925 = Isohogna longitarsis (F. Cambridge) 1902
„ longivulvula Roewer 1951 = Pardosa longivulva F. Cambridge 1902
„ lucorum L. Koch 1877, Bösenberg 1903, Lessert 1910 = Triccosta lucorum (L. Koch) 1877
„ luctuosa Mello-Leitao 1947 = Trochosula luctuosa (Mello-Leitao) 1947
„ ludia Thorell 1895 = Pardosa ludia (Thorell) 1895
„ ludovici Dahl 1908, 1927 = Acantholycosa nigra (C. L. Koch) 1834
„ lugubris Waldkenaer 1805, 1837, Blackwall 1861, Strand 1906 et sequ. = Pardosa lugubris (Waldkenaer) 1802
„ lugubris Hahn 1831 = Alopecosa striata (Kulczynski) 1895
„ lugubris Menge 1879 O = Pardosa pullata (Clerck) 1757
„ lugubris Menge 1879 o = Trochosina terricola (Thorell) 1856
„ lugubris Bösenberg 1903 = Pardosa nigriceps (Thorell) 1856
„ lupina Karsch 1879 = Schizocosa lupina (Karsch) 1879
„ lupulina C. L. Koch 1837 = nicht zu deuten!
„ lutetiana Simon 1876 (nec 1937), Becker 1882 = Tricca lutetiana (Simon) 1876
„ lutetiana Simon 1937 (nec 1876) = Triccosta lucorum (L. Koch) 1877
„ lynx Hahn 1834 = Arctosa cinerea (Fabricius) 1776
„ lyrata Odenvall 1901 = Pardosa lyrata (Odenvall) 1901
„ lyrivulva Bösenberg & Strand 1906 = Pardosa lyrivulva (Bösenberg & Strand) 1906
„ maasi Gertsch & Wallace 1937 = Isohogna maasi (Gertsch & Wallace) 1937
„ mackenziana Keyserling 1876 = Pardosa mackenziana (Keyserling) 1876
„ mackenziei Gravely 1924, Dyal 1935 = Pardosa mackenziei (Gravely) 1924
„ maculata Hahn 1822 = ? Arctosa cinerea (Fabricius) 1776
„ maculata Lessert 1910 = Lycorma amylacea (C. L. Koch) 1839
„ maculata Rosca 1939 = Lycosa roscae Roewer 1951
„ maculatipes Keyserling 1887 = Pardosa maculatipes (Keyserling) 1887
„ madani Pocock 1901, Gravely 1924 = Hyaenosa madani (Pocock) 1901
„ maderiana Simon 1898 = Isohogna maderiana (Waldkenaer) 1837
„ madigani Hickman 1944 = Alopecosa madigani (Hickman) 1944
„ mafensis Lawrence 1927 = Allocosa mafensis (Lawrence) 1927
„ magallanica Karsch 1880 = Vesubia magallanica (Karsch) 1880
„ magdalenensis Mello-Leitao 1941 = Trochosa magdalenensis (Strand) 1914
„ maindroni Simon 1897 = Crocodilosa maindroni (Simon) 1897
„ malayana Doleschall 1859 = Trochosippa malayana (Doleschall) 1859
„ malitiosa Tullgren 1905, Mello-Leitao 1941 = Avicosa malitiosa (Tullgren) 1905
„ mananganuiensis Berland 1925 = Allotrochosina mananganuiensis (Berland) 1925
„ manicata Simon 1937 = Trochosa hispanica (Simon) 1870
„ marcentior Simon 1909 = Hogna marcentior (Simon) 1909
„ mariae Simon 1937 = Alopecosa mariae (Dahl) 1908
„ maritima Hentz 1844 = Arctosa cinerea (Fabricius) 1776
„ maritima Lawrence 1938 = Hogna lawrencei (Roewer) 1951
„ marshalli Pocock 1901 = Allocosa marshalli (Pocock) 1901
„ martensii Karsch 1878 = Diahogna martensii (Karsch) 1878
„ martinii Pavesi 1883 = Pardosa martinii (Pavesi) 1883
„ mascatensis Simon 1898 = Pirata mascatensis (Simon) 1898
„ masteri Pocock 1901 = Allocosa masteri (Pocock) 1901
„ maura Urquhart 1891 = Artoriella maura (Urquhart) 1891
„ maurusia Simon 1909 = Hogna maurusia (Simon) 1909

Lycosa (Forts.):

„ medellina Mello-Leitao 1941 = Hogna medellina (Strand) 1914
„ media Schmidt 1895 = Hogna media (Pocock) 1889
„ meinerti Simon 1876 = Bonacosa meinerti (Thorell) 1875
„ melanogaster Latreille 1819 = Lycosa narbonensis Latreille 1806
„ melanogaster Hahn 1831 = Alopecosa fabrilis (Clerck) 1757
„ melanogaster Lenz 1886 = Arctosa lenzi (Roewer) 1951
„ melanognatha Lucas 1853 = Hogna radiata (Latreille) 1819
„ melanostoma Mello-Leitao 1941 = Megarctosa melanostoma (Mello-Leitao) 1941
„ melanotaeniata Mello-Leitao 1941 = Agalenocosa melanotaeniata (Mello-Leitao) 1941
„ melica Fox 1937 = Hogna melica (Fox) 1937
„ mendicans Simon 1882 = Pardosa mendicans (Simon) 1882
„ meracula Simon 1909 = Tetralycosa meracula (Simon) 1909
„ meridiana Hahn 1831 = Alopecosa aculeata (Clerck) 1757
„ meridiana L. Koch 1877 = Xerolycosa nemoralis (Westring) 1862
„ miami Wallace 1942 = Isohogna miami (Wallace) 1942
„ michaelseni Simon 1902 = Alopecosa michaelseni (Simon) 1902
„ migdilybs Simon 1885 = Hogna migdilybs (Simon) 1885
„ milberti Walckenaer 1837 = Hogna carolinensis (Walckenaer) 1805
„ milvina Hentz 1844 = Pardosa milvina (Hentz) 1844
„ mimula Gertsch 1934 = Allocosa mimula (Gertsch) 1934
„ minahassae Merian 1911 = Avicosa minahassae (Merian) 1911
„ miniata C. L. Koch 1848, Simon 1876 et sequ. = Xerolycosa miniata (C. L. Koch) 1848
„ minima Keyserling 1876 = Pardosa saxatilis (Hentz) 1844
„ minima Mello-Leitao 1930 = nicht zu deuten!
„ minnesotensis Gertsch 1934 = Avicosa minnesotensis (Gertsch) 1934
„ minuta Simon 1898 = Piratosa (pro Piratessa praeocc.) minuta (Emerton) 1885
„ misella L. Koch 1882 = Arctosa misella (L. Koch) 1882
„ missouriensis Banks 1895, Emerton 1909 part., 1912 part. et sequ. = Scaptocosa missouriensis (Banks) 1895
„ missouriensis Banks 1900, Emerton 1912 part. = Scaptocosa fatifera (Hentz) 1844
„ missouriensis Emerton 1912 part. = Geolycosa latifrons Montgomery 1904
„ missouriensis Emerton 1912 part. = Geolycosa uinticolens (Chamberlin) 1936
„ missouriensis Emerton 1912 part. = Scaptocosa rafaelana (Chamberlin) 1928
„ mixta Kulczynski 1887, 1909 et sequ. = Pardosa mixta (Kulczynski) 1887
„ modesta Giebel 1863 = Ocyale pelliona (Audouin) 1827
„ modesta Banks 1894 = Allocosa frondicola (Emerton) 1885
„ modesta Kaston 1938, 1948 = Allocosa modesta (Keyserling) 1876
„ modica Blackwall 1846 = Pardosa modica (Blackwall) 1846
„ moesta Holmberg 1876, Simon 1886 = Alopecosa moesta (Holmberg) 1876
„ mogadorensis Simon 1909 = Allocosa mogadorensis (Simon) 1909
„ mojonia Mello-Leitao 1941 = Alopecosa mojonia (Mello-Leitao) 1941
„ molitor Bertkau 1880 = Molitorosa molitor (Bertkau) 1880
„ molyneuxi Hogg 1905 = Allocosa molyneuxi (Hogg) 1905
„ monticola Sundevall 1832, C. L. Koch 1848, Westring 1862, Thorell 1872, Menge 1879 et sequ. = Pardosa monticola (Clerck) 1757
„ monticola Walckenaer 1837 = Pardosa nigriceps (Thorell) 1856
„ monticola C. L. Koch 1848 = Pardosa palustris (Linné) 1758
„ monticola fucicola Dahl 1908, 1927, Palmgren 1939 = Pardosa arenicola fucicola (Dahl) 1908
„ monticola maritima Dahl 1883 = Pardosa arenicola fucicola (Dahl) 1908
„ montivaga Kulczynski 1898 = Pardosa kervillei montivaga (Kulczynski) 1898
„ morosa L. Koch 1870, Chyzer & Kulczynski 1891 et sequ. = Pardosa morosa (L. Koch) 1870

Lycosa (Forts.):

„ morosina Banks 1909 = Hogna morosina (Banks) 1909
„ moulmeinensis Gravely 1924 = Pardosa moulmeinensis (Gravely) 1924
„ mtugensis Strand 1908, 1915 = Pardosa mtugensis (Strand) 1908
„ munieri Simon 1876 = Allocosa munieri (Simon) 1876
„ naevia L. Koch 1875, Strand 1908 = Pardosa naevia (L. Koch) 1875
„ naevia L. Koch 1878 = Hogna naeviella (Roewer) 1951
„ naevioides Strand 1916 = Pardosa naevioides (Strand) 1916
„ nana Menge 1879 = Pardosa pullata (Clerck) 1757
„ nanahuensis Badcock 1932 = Allocosa nanahuensis (Badcock) 1932
„ nathani Roewer 1951 = Pardosa sabulosa Banks 1898
„ nautica Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ nebulosa Thorell 1872, 1875, Chyzer & Kulczynski 1891 = Pardosa nebulosa (Thorell) 1872
„ nemoralis Westring 1862, Simon 1876, Becker 1882 et sequ. = Xerolycosa nemoralis (Westring) 1862
„ nemoralis Bertkau 1880 = Pardosa lugubris (Walckenaer) 1802
„ nervosa Petrunkevitch 1911 = Hogna nervosa (Keyserling) 1891
„ nesiotes Thorell 1878 = Pardosa nesiotes (Thorell) 1878
„ nicobarica Thorell 1891 = Pardosa nicobarica (Thorell) 1891
„ nidicola Emerton 1885, 1902 et sequ. = Hogna helluo (Walckenaer) 1837
„ nidifex Emerton 1885, Bryant 1908 = Geolycosa pikei (Marx) 1881
„ nidifex Emerton 1885 part. Mc Cook 1888 = Geolycosa turricola (Treat) 1880
„ nidifex Chamberlin 1910 part. = Scaptocosa gosoga (Chamberlin) 1925
„ nidifex Chamberlin 1910 part. = Scaptocosa missouriensis (Banks) 1895
„ nidifex Chamberlin 1910 part. 1925 part. = Scaptocosa wrightii (Emerton) 1912
„ nigra C. L. Koch 1834, 1848, Chyzer & Kulczynski 1891 = Acantholycosa nigra (C. L. Koch)
„ nigra Vinson 1863 = Pardosa vinsoni (Roewer) 1951
„ nigra Montgomery 1904 = Allocosa funerea (Hentz) 1844
„ nigra Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ nigraurata Montgomery 1902 = Varacosa gulosa (Walckenaer) 1837
„ nigricans Simon 1886 = Alopecosa nigricans (Simon) 1886
„ nigriceps Thorell 1856, Cambridge 1881 et sequ. = Pardosa nigriceps (Thorell) 1856
„ nigriceps Menge 1879 ♂ = Pardosa lugubris (Walckenaer) 1802
„ nigriceps Menge 1879 ♀ = Pardosa pullata (Clerck) 1757
„ nigropalpis Strand 1915 = Pardosa nigropalpis (Emerton) 1885
„ nigrosecta Mello-Leitao 1940 = Lycorma nigrosecta (Mello-Leitao) 1940
„ nigrotibialis Simon 1884, Pocock 1900 = Hogna nigrotibialis (Simon) 1884
„ nigrotibialis Gravely 1924, Sinha 1951 = Allocosa phipsoni (Pocock) 1899
„ nigroventris Emerton 1885 = Allocosa frondicola (Emerton) 1885
„ nivalis Sundevall 1832 = Alopecosa aculeata (Clerck) 1757
„ nivalis C. L. Koch 1848 = Xerolycosa nemoralis (Westring) 1862
„ niveopilosa Mello-Leitao 1938 = Trochosa niveopilosa (Mello-Leitao) 1938
„ nivosa Purcell 1903 = Arctosa nivosa (Purcell) 1903
„ nolotthensis Simon 1910 = Geolycosa nolotthensis (Simon) 1910
„ nordenskiöldii Tullgren 1905, Mello-Leitao 1941 = Hogna nordenskiöldii (Tullgren) 1905
„ nordmanni Schmidt 1895 = Allocosa nordmanni (Thorell) 1875
„ norvegica Thorell 1872 = Acantholycosa norvegica (Thorell) 1872
„ norvegica Kulczynski 1916 = Acantholycosa spasskyi Charitonow 1936
„ notabilis Schmidt 1895 = Alopecosa notabilis (Schmidt) 1895
„ novitatis Strand 1906, 1907 = Pardosa novitatis (Strand) 1906
„ numida Lucas 1846 = Xerolycosa albofasciata (Brullé) 1832
„ nychthemera Bertkau 1880 = Hogna nychthemera (Bertkau) 1880

Lycosa (Forts.):
„ oahuensis Keyserling 1890, Simon 1898 = Alopecosa oahuensis (Keyserling) 1890
„ oaxacana Gertsch & Wallace 1937 = Hogna oaxacana (Gertsch & Wallace) 1937
„ oblonga Banks 1892 = Hygrolycosa aspersa (Hentz) 1844
„ oblonga Simon 1898 = Trochosa oblonga (C. L. Koch) 1848
„ obscoena Rainbow 1899 = Schizocosa obscoena (Rainbow) 1899
„ obscura Blackwall 1841 = Pardosa pullata (Clerck) 1757
„ obscura Giebel 1869 = nicht zu deuten!
„ obscura L. Koch 1877, Hogg 1905 = Allocosa obscuroides (Strand) 1906
„ observans Cambridge 1876 = Pardosa observans (Cambridge) 1876
„ obsoleta C. L. Koch 1848 = Alopecosa obsoleta (C. L. Koch) 1848
„ ocellaris Doleschall 1852 = Xerolycosa albofasciata (Brullé) 1832
„ ocellata L. Koch 1878 = Hogna ocellata (L. Koch) 1878
„ ochreata pulchra Montgomery 1902 = Lycosa bilineata (Emerton) 1885
„ ocreata Hentz 1842, Keyserling 1876 et sequ. = Hogna crassipes (Walckenaer) 1837
„ ocreata Lucas 1846 = Zoropsis spinimana (Dufour) 1820
„ oculata Simon 1876, 1937 = Allocosa oculata (Simon) 1876
„ ocyalina Simon 1910 = Hogna ocyalina (Simon) 1910
„ ohlini Tullgren 1901, Simon 1902 = Trochosippa ohlini (Tullgren) 1901
„ olivieri Simon 1876 = Allocosa olivieri (Simon) 1876
„ oneili Purcell 1903 = Pirata oneili (Purcell) 1903
„ opifex Simon 1898 = Mustelicosa opiphex (Wagner) 1891
„ oraria L. Koch 1876 = Crocodilosa oraria (L. Koch) 1876
„ ordosa Hogg 1912 = Mustelicosa ordosa (Hogg) 1912
„ orientalis Kroneberg 1875 = Pardosa orientalis (Kroneberg) 1875
„ orinus Chamberlin 1916 = Allocosa orinus (Chamberlin) 1916
„ ornata Perty 1833, Walckenaer 1837, C. L. Koch 1848 = Hogna ornata (Perty) 1833
„ ornata Marx 1889 = nicht zu deuten!
„ ornatipes Bryant 1935 = Scaptocosa ornatipes (Bryant) 1935
„ ornatula L. Koch 1877 = Allocosa ornatula (L. Koch) 1877
„ oreophila Simon 1937 = Alopecosa barbipes oreophila (Simon) 1937
„ orophila Chamberlin & Gertsch 1929 = Allohogna pratensis (Emerton) 1885
„ oryx Simon 1885 = Brevilabus oryx (Simon) 1885
„ osceola Gertsch & Wallace 1937 = Isohogna osceola (Gertsch & Wallace) 1937
„ pachana Pocock 1898, Lessert 1927 = Mimohogna pachana (Pocock) 1898
„ pacifica Banks 1904 = Avicosa avida (Walckenaer) 1837
„ palabunda L. Koch 1877 = Allocosa palabunda (L. Koch) 1877
„ palliclava Strand 1907, 1909 = Pardosa palliclava (Strand) 1907
„ pallida Walckenaer 1937 = Pardosa waglerii (Hahn) 1822
„ pallida Blackwall 1843 = Pardosa agricola (Thorell) 1856
„ pallideflava Lawrence 1936 = Allocosa pallideflava (Lawrence) 1936
„ pallipes Blackwall 1857 = Pirata pallipes (Blackwall) 1857
„ paludicola Walckenaer 1825, 1837, Sundevall 1832, Thorell 1872 et sequ. = Pardosa paludicola (Clerck) 1757
„ paludicola C. L. Koch 1834, 1848 = Pardosa amentata (Clerck) 1757
„ paludosa Hahn 1834 = Pardosa monticola (Clerck) 1757
„ palustris C. L. Koch 1848 = Piratula latitans (Blackwall) 1841
„ palustris Menge 1879 ♂ = Pardosa paludicola (Clerck) 1757
„ palustris Menge 1879 ♀ = Pardosa monticola (Clerck) 1757
„ palustris Cambridge 1881, Dahl 1883, 1908, 1927, Kulczynski 1887, 1891, Bösenberg 1903 = Pardosa palustris (Linné) 1758
„ palustris Holm 1947 = Pardosa herbigrada (Blackwall) 1857
„ pannonica Kolosvary 1934, 1935 = Pardosa pannonica (Kolosvary) 1934
„ paranensis Mello-Leitao 1937 = Trochosa paranensis (Mello-Leitao) 1937

Lycosa (Forts.):

- „ pardalina Petrunkevitch 1911, Mello-Leitao 1940 = Hogna pardalina (Bertkau) 1880
- „ pardaloides Mello-Leitao 1937 = Trochosa pardaloides (Mello-Leitao) 1937
- „ pardosina Simon 1898 = Arctosa pardosina (Simon) 1898
- „ parthenus Chamberlin 1925, et sequ. = Varacosa parthenus (Chamberlin) 1925
- „ parvivulva Lawrence 1927 = Allocosa parvivulva (Lawrence) 1927
- „ passerina Mello-Leitao 1941 = Hogna passerina (Mello-Leitao) 1941
- „ passibilis Cambridge 1885 = Pardosops passibilis (Cambridge) 1885
- „ pastoralis Simon 1876, 1937 = Alopecosa pastoralis (Simon) 1876
- „ patagonica Simon 1886, 1898, Mello-Leitao 1940 = Hogna patagonica (Simon) 1886
- „ patricki Purcell 1903 = Schizocosa patricki (Purcell) 1903
- „ pelliona Audouin 1827, Walckenaer 1837 = Ocyale pelliona (Audouin) 1827
- „ pelliona Lucas 1838 = Metatrochosina lucasi (Roewer) 1951
- „ pelusiaca Audouin 1827, Walckenaer 1837 = Alopecosella pelusiaca (Audouin) 1827
- „ percauta Simon 1909 = Allocosa percauta (Simon) 1909
- „ peregrina Audouin 1827, Walckenaer 1837 = Evippa peregrina (Audouin) 1827
- „ perita Walckenaer 1837, Simon 1876 et sequ. = Arctosa perita (Latreille) 1798
- „ permunda Chamberlin 1904, 1908 = Hogna permunda (Chamberlin) 1904
- „ pernix Thorell 1872, Holm 1947 = Pardosa pernix (Thorell) 1872
- „ persimilis Banks 1898 = Hogna persimilis (Banks) 1898
- „ personata L. Koch 1872, Simon 1876 et sequ. = Leaena fulvolineata (Lucas) 1846
- „ perspicax L. Koch 1882 = Alopecosella perspicax (L. Koch) 1882
- „ pertyi C. L. Koch 1846 = Lycosa tarentuloides Perty 1833
- „ petersii Karsch 1878 = Lycorma petersii (Karsch) 1878
- „ petiti Simon 1876 = Hogna petiti (Simon) 1876
- „ phegeia Simon 1909 = Triccosta phegeia (Simon) 1909
- „ phipsoni Pocock 1899, 1900 = Allocosa phipsoni (Pocock) 1899
- „ phyllis Hogg 1905 = Varacosa phyllis (Hogg) 1905
- „ pickeli Mello-Leitao 1937 = Agalenocosa pickeli (Mello-Leitao) 1937
- „ picta Hahn 1831, Blackwall 1861, Westring 1862 = Arctosa perita (Latreille) 1798
- „ pictilis Emerton 1885, 1919 et sequ. = Avicosa pictilis (Emerton) 1885
- „ pictipes Petrunkevitch 1911, Mello-Leitao 1941 = Allohogna pictipes (Keyserling) 1891
- „ pictiventris L. Koch 1877 = Geolycosa pictiventris (L. Koch) 1877
- „ pictula Pocock 1901 = Allocosa pictula (Pocock) 1901
- „ pikei Emerton 1909, 1912, Crosby & Bishop 1928, Chamberlin 1928 = Geolycosa turricola (Treat) 1880
- „ pikei Comstock 1913 = Scaptocosa wrightii (Emerton) 1912
- „ pilipes Lucas 1846, Cambridge 1876 = Arctosa cinerea (Fabricius) 1776
- „ pilosa Girard 1852 = Hogna carolinensis (Walckenaer) 1837
- „ pinangensis Thorell 1890, 1892 = Pardosa pinangensis (Thorell) 1890
- „ pinetorum Westring 1862 = Alopecosa pinetorum (Thorell) 1856
- „ piraticus Sundevall 1832, Hahn 1831, Lessert 1910 = Pirata piraticus (Clerck) 1757
- „ piratimorpha Petrunkevitch 1911 = Piratula piratimorpha (Strand) 1908
- „ piscatoria C. L. Koch 1848 = Piratula knorrii (Scopoli) 1863
- „ piscatoria Blackwall 1861 = Piratula hygrophila (Thorell) 1872
- „ piscatoria Westring 1852, 1862, Lessert 1910 et sequ. = Pirata piscatorius (Clerck) 1757
- „ planithorax Mello-Leitao 1938 = Hogna planithorax (Mello-Leitao) 1938
- „ plumata Braendegaard 1925 = Pardosa purbeckensis minor F. Cambridge 1895
- „ plumipes Thorell 1875, Odenvall 1901 = Pardosa plumipes (Thorell) 1875
- „ plumipes Mello-Leitao 1942 = Pardosa plumipedata (Roewer) 1951

Lycosa (Forts.):

„ plumipedella Strand 1909 = ? Pardosa plumipes (Thorell) 1875
„ podhorskii Kulczynski 1907 = Pardosa podhorskii (Kulczynski) 1907
„ poecila Herman 1879 = Pardosa poecila (Herman) 1879
„ poliostoma Simon 1902, Mello-Leitao 1940 = Scaptocosa poliostoma (Simon) 1902
„ polita Emerton 1885 part. = Crocodilosa emertoni (Gertsch) 1934
„ polita Emerton 1885 part., 1902 part. = Crocodilosa rubicunda (Keyserling) 1876
„ pontica Thorell 1875 = Pardosops pontica (Thorell) 1875
„ porteri Simon 1904 = Dingosa porteri (Simon) 1904
„ posticata Banks 1904 = Hogna posticata (Banks) 1904
„ postuma Cambridge 1912 = Pardosa postuma (Cambridge) 1912
„ praelongipes Cambridge 1870 = Evippa praelongipes (Cambridge) 1870
„ praesumptuosa Holmberg 1876, Mello-Leitao 1940 = Trochosa praesumptuosa (Holmberg) 1876
„ pratensis Emerton 1885, 1894, 1902, Montgomery 1903, Chamberlin 1908, Gertsch 1934 = Allohogna pratensis (Emerton) 1885
„ prativaga L. Koch 1870, Thorell 1872, Cambridge 1881 et sequ. = Pardosa prativaga (L. Koch) 1870
„ prativaga Cambridge 1876 = Pardosa kervillei Simon 1937
„ principum Simon 1910 = Hogna principum (Simon) 1910
„ profuga Herman 1879 = Pardosa profuga (Herman) 1879
„ proletaria Tullgren 1905, Mello-Leitao 1941 = Avicosa proletaria (Tullgren) 1905
„ prolifica Pocock 1901, Gravely 1924 = Allocosa prolifica (Pocock) 1901
„ prolificula Roewer 1951 = Pardosa prolifica F. Cambridge 1902
„ promontorii Pocock 1900 = Arctosa promontorii (Pocock) 1900
„ promptula Cambridge 1902 = Pardosa promptula (Cambridge) 1902
„ properipes Simon 1909 = Allohogna properipes (Simon) 1909
„ propinqua Blackwall 1846 = Avicosa avida (Walckenaer) 1837
„ propitia Simon 1909 = Allocosa propitia (Simon) 1909
„ proxima C. L. Koch 1848 et sequ. = Pardosa proxima (C. L. Koch) 1848
„ proxima Cambridge 1872 = Pardosa inopina (Cambridge) 1872
„ proxima Urquhart 1885 = Laestrigones urquhartii Bryant 1933
„ proximella Strand 1906, 1907 = Pardosa proximella (Strand) 1906
„ pruinosa L. Koch 1877 = Dingosa pruinosa (L. Koch) 1877
„ psammodes Thorell 1887 = Pardosa psammodes (Thorell) 1887
„ pseudoannulata Fox 1935, Saito 1939 = Avicosa pseudoannulata (Bösenberg & Strand) 1906
„ pseudoceraticola Wallace 1942 = Hogna pseudoceraticola (Wallace) 1942
„ pseudofurva Strand 1906 = Varacosa pseudofurva (Strand) 1906
„ pseudokaragonis Strand 1913 = Pardosa pseudokaragonis (Strand) 1913
„ pseudoterricola Schenkel 1936 = Avicosa pseudoterricola (Schenkel) 1936
„ pulchella Petrunkevitch 1911 = Hogna pulchella (Keyserling) 1876
„ pulchra Gertsch 1934, Gertsch & Wallace 1935 = Scaptocosa pulchra (Keyserling) 1876
„ pullastra Simon 1909 = Hogna pullastra (Simon) 1909
„ pullata C. L. Koch 1848, Westring 1862, Thorell 1872 et sequ. = Pardosa pullata (Clerck) 1757
„ pullata Giebel 1869 = Pardosa amentata (Clerck) 1757
„ pulveresparsa L. Koch 1877 = Varacosa pulveresparsa (L. Koch) 1877
„ pulverulenta Sundevall 1832, Westring 1862 et sequ. = Alopecosa pulverulenta (Clerck)
„ pulverulenta C. L. Koch 1835 = Xerolycosa nemoralis (Westring) 1862
„ pulverulenta Kulczynski 1882 = Alopecosa aculeata (Clerck) 1757
„ punctipes Gravely 1924 = Crocodilosa punctipes (Gravely) 1924
„ punctulata Hentz 1844 et sequ. = Isohogna punctulata (Hentz) 1844

Lycosa (Forts.):

„ punctiventris Doleschall 1852 = Xerolycosa albofasciata (Brullé) 1832
„ punctiventris Banks 1898 = Lycosa punctiventralis (Roewer) 1951
„ purbeckensis Locket & Millidge 1951 = Pardosa purbeckensis F. Cambridge 1895
„ purcelli Montgomery 1902 = Varacosa gulosa (Walckenaer) 1837
„ purcelli Simon 1910 = Trochosina eugeni (Roewer) 1951
„ pusilla Strand 1899 = Pardosa hyperborea pusilla (Thorell) 1872
„ pusiola Thorell 1891, 1892 = Pardosa pusiola (Thorell) 1891
„ quadrifer Gravely 1924 = Pardosa quadrifer (Gravely) 1924
„ quadripunctata Lucas 1846 = Arctosa quadripunctata (Lucas) 1846
„ quadripunctata Walckenaer 1847 = nicht zu deuten!
„ quinaria Emerton 1894, 1911, Chamberlin 1908 = Arctosa quinaria (Emerton) 1894
„ rabida Walckenaer 1837 = Rabidosa rabida (Walckenaer) 1837
„ rabulana Thorell 1890, 1891 = Pardosa rabulana (Thorell) 1890
„ raddei Simon 1889 = Alopecosa raddei (Simon) 1889
„ radiata Latreille 1819 et sequ. = Hogna radiata (Latreille) 1819
„ rafaelana Chamberlin 1928 = Scaptocosa rafaelana (Chamberlin) 1928
„ raffrayi Simon 1876, Lessert 1915, 1926 = Hogna raffrayi (Simon) 1876
„ ralphi Simon 1895 = Alopecosa ralphi (Simon) 1895
„ ramosa L. Koch 1877 = Cynosa ramosa (L. Koch) 1877
„ ramulosa Mc Cook 1893 = Pardosa sternalis (Thorell) 1877
„ rapa Karsch 1881 = Alopecosa rapa (Karsch) 1881
„ rapax Blackwall 1841, 1861 = Alopecosa pulverulenta (Clerck) 1757
„ raptoria Walckenaer 1837, 1841 = Scaptocosa raptoria (Walckenaer) 1837
„ rara Keyserling 1891 = Pardosa rara (Keyserling) 1891
„ rascheri Dahl 1908 = Pardosa rascheri (Dahl) 1908
„ reducta Bryant 1942 = Hogna reducta (Bryant) 1942
„ relucens Montgomery 1902, 1904, Emerton 1909 = Schizocosa saltatrix (Hentz) 1844
„ renidens Simon 1876, 1937, Lessert 1910 = Arctosa renidens (Simon) 1876
„ retenta Gertsch & Wallace 1935 = Allocosa retenta (Gertsch & Wallace) 1935
„ retiruga Simon 1905 = Allocosa retiruga (Simon) 1905
„ ricta Odenvall 1901 = Pardosops ricta (Odenvall) 1901
„ riparia Hentz 1844, Banks 1904, Chamberlin 1908 = Allocosa georgicola (Walckenaer) 1837
„ riparia Lebert 1891 = nicht zu deuten!
„ riparia C. L. Koch 1848, Thorell 1872, Menge 1879, Dahl 1883, Chyzer & Kulczynski 1891, Cambridge 1898, Strand 1909 et sequ. = Pardosa kervillei Simon 1937
„ riparia Cambridge 1875, 1881, Dahl 1908, 1927 = Pardosa prativaga (L. Koch) 1870
„ riparia Bösenberg 1903 = Pardosa montivaga (Kulczynski) 1898
„ riparia sphagnicola Dahl 1908 = Pardosa montivaga (Kulczynski) 1898
„ robusta Simon 1876, 1937, Becker 1882, Cambridge 1895 = Trochosa robusta (Simon) 1876
„ robusta Lenz 1891 = Ocyale fera Strand 1908
„ rossica Krynicki 1837 = Allohogna singoriensis (Laxmann) 1770
„ rostrata Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
„ ruanda Strand 1913 = Pardosa ruanda (Strand) 1913
„ rubicunda Chamberlin 1908 = Crocodilosa rubicunda (Keyserling) 1876
„ rubiginosa C. L. Koch 1839 = Lycosa tarentula (Rossi) 1790
„ rubrofaciata Simon 1876 et sequ. = Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert) 1865
„ rubrotaeniata Petrunkevitch 1911 = Geolycosa rubrotaeniata (Keyserling) 1876
„ rufa Keyserling 1876 = Hogna crassipes (Walckenaer) 1837
„ rufibarbis Mello-Leitao 1947 = Geolycosa rufibarbis (Mello-Leitao) 1947
„ rufimana C. L. Koch 1848 = Scaptocosa raptoria (Walckenaer) 1837

Lycosa (Forts.):

„ rufiventris Banks 1892 = Varacosa avara (Keyserling) 1876
„ rufula Roewer 1951 = Pardosa rufa Grese 1909
„ rugegensis Strand 1913 = Pardosa rugegensis (Strand) 1913
„ rugosa Keyserling 1876 = Allocosa funerea (Hentz) 1844
„ rupicola Dufour 1820 = Acantholycosa rupicola (Dufour) 1820
„ ruricola Hahn 1831, Westring 1862, Simon 1876 et sequ. = Trochosa ruricola (De Geer) 1778
„ ruricola Sundevall 1832 = Trochosina terricola (Thorell) 1856
„ ruricola Hentz 1844 = Isohogna lenta (Hentz) 1844
„ ruricolaris Simon 1910, Lawrence 1936 = Lycorma ruricolaris (Simon) 1910
„ sabulonum L. Koch 1877 = Lycorma sabulonum (L. Koch) 1877
„ sabulosa Hahn 1831 = Alopecosa cursor (Hahn) 1831
„ saccata Walckenaer 1805, 1837 = Pardosa annulata (Thorell) 1872
„ saccata Hahn 1831, Blackwall 1861, Dahl 1908 et sequ. = Pardosa amentata (Clerck) 1757
„ saccata Blackwall 1846 = Pardosa groenlandica (Thorell) 1872
„ saccata C. L. Koch 1848 = Pardosa hortensis (Thorell) 1872
„ saccigera Walckenaer 1837 = Pardosa monticola (Clerck) 1757
„ saccigera Westring 1851, 1862, Thorell 1856 ♂, 1872 = Pardosa nigriceps (Thorell) 1856
„ saccigera Thorell 1856 ♀ = Pardosa palustris (Linné) 1758
„ sacra Simon 1898 = Diapontia sacra (C. L. Koch) 1848
„ sagiba Strand 1918 = Pardosa sagiba (Strand) 1918
„ sagitta Mello-Leitao 1941 = Sosilaus sagitta (Mello-Leitao) 1941
„ sagittata Hentz 1844 = Avicosa avida (Walckenaer) 1837
„ sagittata C. L. Koch 1848 = Xerolycosa albofasciata (Brullé) 1832
„ sagittata Grube 1861, Schmidt 1895 = Paratrochosina sagittigera (Roewer) 1951
„ salaziana Vinson 1863 = nicht zu deuten!
„ saltatrix Hentz 1844 = Schizocosa saltatrix (Hentz) 1844
„ saltuaria L. Koch 1870 et sequ. = Pardosa saltuaria (L. Koch) 1870
„ saltuaria Pavesi 1883 = Pardosella saltuarides (Strand) 1907
„ saltuarides Strand 1907, 1908 = Pardosella saltuarides (Strand) 1907
„ sancti-thomasi Petrunkevitch 1926, Bryant 1942 = Hogna sancti-thomasi (Petrunkevitch) 1926
„ sancti-vincenti Simon 1897, Bryant 1942 = Hogna sancti-vincenti (Simon) 1897
„ sanlorenziana Petrunkevitch 1925 = Varacosa sanlorenziana (Petrunkevitch) 1925
„ sanogastensis Mello-Leitao 1944 = Scaptocosa sanogastensis (Mello-Leitao) 1944
„ saxatilis Hentz 1844 = Pardosa saxatilis (Hentz) 1844
„ sayi Walckenaer 1837 = Hogna helluo (Walckenaer) 1837
„ scalaris Petrunkevitch 1911 = Allocosa scalaris (Thorell) 1877
„ schauinslandi Simon 1899 = Alopecosa schauinslandi (Simon) 1899
„ schenkeli Mello-Leitao 1939 = Allocosa paraguayensis (Roewer) 1951
„ schmidtii Hahn 1834 = Alopecosa schmidtii (Hahn) 1834
„ schönlandi Pocock 1900 = Allocosa schönlandi (Pocock) 1900
„ schreineri Purcell 1903 = Hogna schreineri (Purcell) 1903
„ schubotzi Strand 1913 = Pardosa schubotzi (Strand) 1913
„ schultzei Simon 1910, Lawrence 1938 = Hogna schultzei (Simon) 1910
„ scutata Simon 1898 = Rabidosa rabida (Walckenaer) 1837
„ scutulata Hentz 1844, Emerton 1885, 1902 et sequ. = Rabidosa rabida (Walckenaer) 1837
„ securifer Tullgren 1905 = Isohogna securifer (Tullgren)
„ sefrana Schenkel 1937 = Allocosa sefrana (Schenkel) 1937
„ segregis Simon 1909 = Hogna segregis (Simon) 1909
„ selengensis Odenvall 1901 = Pardosa selengensis (Odenvall) 1901
„ selkirki Simon 1905 = Hogna selkirki (Simon) 1905

Lycosa (Forts.):

„ semiargentea Simon 1898 = Schizocosa semiargentea (Simon) 1898
„ semicana Strand 1909 = Pardosa semicana Simon 1885
„ semicincta L. Koch 1877 = Orthocosa semicincta (L. Koch) 1877
„ senica L. Koch 1877 = Hogna senica (L. Koch) 1877
„ senilis L. Koch 1877 = Hogna senilis (L. Koch) 1877
„ septentrionalis Westring 1862, Kulczynski 1916, Holm 1947 = Pardosa septentrionalis (Westring) 1862
„ sepulchralis Montgomery 1902, 1903, Gertsch 1934 = Geolycosa sepulchralis (Montgomery) 1902
„ serena L. Koch 1875 = Pardosa serena (L. Koch) 1875
„ sericata C. L. Koch 1837, 1848 = Megarctosa leopardus (Sundevall) 1832
„ sericea Simon 1898 = Hogna sericea (Simon) 1898
„ serranoa Tullgren 1901 = Alopecosa serranoa (Tullgren) 1901
„ serrata L. Koch 1877 = Geolycosa serrata (L. Koch) 1877
„ seydi Strand 1908 = Pardosa seydi (Strand) 1908
„ shenandoa Chamberlin & Ivie 1942, Muma 1944 = Varacosa shenandoa (Chamberlin & Ivie) 1942
„ siamensis Giebel 1863 = Pavocosa siamensis (Giebel) 1863
„ sibirica Kulczynski 1908 = Pardosa sibirica (Kulczynski) 1908
„ sibyllina Simon 1909 = Hogna sibyllina (Simon) 1909
„ signata Lenz 1886 = Allohogna signata (Lenz) 1886
„ silvicultrix C. L. Koch 1848 = Pardosa lugubris (Walckenaer) 1802
„ similis Banks 1892 = Hogna helluo (Walckenaer) 1837
„ simoni Simon 1876, 1937 = Alopecosa simonis (Thorell) 1872
„ simonii Bösenberg 1903 = Arctosa alpigena (Doleschall) 1852
„ simplex L. Koch 1882 = Pirata simplex (L. Koch) 1882
„ simsoni Simon 1898 = Dingosa simsoni (Simon) 1898
„ singoriensis L. Koch 1879, Simon 1898, Schenkel 1936 = Allohogna singoriensis (Laxmann) 1770
„ singoriensis gobiensis Schenkel 1936 = Allohogna gobiensis (Schenkel) 1936
„ sinistra Thorell 1877 = Pardosa sinistra (Thorell) 1877
„ sjöstedti Lessert 1926 = Allocosa sjöstedti (Lessert) 1926
„ snodgrassi Banks 1902 = Isohogna snodgrassi (Banks) 1902
„ solers Walckenaer 1837 = Pardosa monticola (Clerck) 1757
„ soluta Tullgren 1905 = Allocosa soluta (Tullgren) 1905
„ sordidata Thorell 1875, Chyzer & Kulczynski 1891, Bösenberg 1902, Kulczynski 1909 = Pardosa sordidata (Thorell) 1875
„ sordidata Dahl 1908, 1927 = Pardosa giebelii (Pavesi) 1873
„ sordidecolorata Strand 1906, 1907 = Pardosa sordidecolorata (Strand) 1906
„ soriculata Simon 1876 = Alopecosa soriculata (Simon) 1876
„ soror Simon 1889 = Arctosa soror (Simon) 1889
„ soukupi Mello-Leitao 1942 = Sosilaus soukupi (Mello-Leitao) 1942
„ speciosa L. Koch 1877 = Hogna speciosa (L. Koch) 1877
„ spenceri Pocock 1898, Lessert 1915 = Hogna spenceri (Pocock) 1898
„ spinipalpis F. Cambridge 1895, Simon 1875 = Trochosa spinipalpis (F. Cambridge) 1895
„ stellata Cambridge 1885 = Pardosa stellata (Cambridge) 1885
„ sternalis Thorell 1877, Chamberlin 1908 = Pardosa sternalis (Thorell) 1877
„ stictopyga Gravely 1924 = Lycorma stictopyga (Thorell) 1895
„ stigmosa Simon 1876 = Cynosa stigmosa (Thorell) 1875
„ stirlingae Hogg 1905 = Orinocosa stirlingae (Hogg) 1905
„ stonei Montgomery 1902 = Hogna crassipes (Walckenaer) 1837
„ strenua Nicolet 1849 = Allocosa implacida (Nicolet) 1849
„ strenua Thorell 1872 = Pardosa strigillata Simon 1876
„ strenua Rainbow 1920 = Lycosa rainbowi (Roewer) 1951
„ striata Lessert 1910, Simon 1937 = Alopecosa striata (Kulczynski) 1895
„ striatipes Doleschall 1852, Kulczynski 1895 = Alopecosa mariae (Dahl) 1908

Lycosa (Forts.):

„ striatipes C. L. Koch 1839, 1848 = Alopecosa striatipes (C. L. Koch) 1839
„ striatipes Simon 1876, 1937 = Alopecosa striata (Kulczynski) 1895
„ storeniformis Simon 1910 = Lycorma storeniformis (Simon) 1910
„ strix Holmberg 1876 = Pardosa strix (Holmberg) 1876
„ stygialis Simon 1898 = Alopecosa oahuensis (Keyserling) 1890
„ subbirmanica Strand 1909 = Pardosa birmanica Simon 1884
„ subcoelestis Fox 1935 = Tetrarctosa subcoelestis (Fox) 1935
„ subfasciata Simon 1876 = Leaena fulvolineata (Lucas) 1846
„ subhirsuta L. Koch 1881 ♀ = Alopecosa subhirsutella **nom. nov.**
„ subinermis Simon 1897 = Agalenocosa subinermis (Simon) 1897
„ subita Kulczynski 1887 = Pardosa strigillata Simon 1876
„ sublata Montgomery 1902 = Allocosa sublata (Montgomery) 1902
„ subligata Rainbow 1911 = Hogna subligata (L. Koch) 1877
„ subpersonata Simon 1910 = Avicosa subpersonata (Simon) 1910
„ subproximella Strand 1906, 1907 = Pardosa subproximella (Strand) 1906
„ subrufa Karsch 1878 = Lycorma subrufa (Karsch) 1878
„ subsemicana Strand 1909 = Pardosa semicana Simon 1885
„ subsolana Kulczynski 1907 = Pardosa subsolana (Kulczynski) 1907
„ subsordidatula Strand 1915 = Pardosops subsordidatula (Strand) 1915
„ subtarentula Dönitz & Strand 1906 = Pardosa subtarentula (Dönitz & Strand) 1906
„ subterranea L. Koch 1882 = Tricassa subterranea (L. Koch) 1882
„ subtilis Bryant 1942 = Hogna subtilis (Bryant) 1942
„ subvenatrix Strand 1907 = Pardosa venatrix (Lucas) 1846
„ subvittata Pocock 1900 = Scaptocosa subvittata (Pocock) 1900
„ sudetica L. Koch 1875, Fickert 1879, Bösenberg 1903 = Acantholycosa sudetica (L. Koch) 1875
„ sulzeri Simon 1876, 1937 = Alopecosa sulzeri (Pavesi) 1873
„ sumatrana Thorell 1890, 1892 et sequ. = Pardosa sumatrana (Thorell) 1890
„ superba L. Koch 1872 = Arctosa alpigena (Doleschall) 1852
„ suprenans Chamberlin 1924 = Hogna suprenans (Chamberlin) 1924
„ sutherlandi Gravely 1924 = Pardosa sutherlandi (Gravely) 1924
„ sylvicola Sundevall 1832, Blackwall 1861, Strand 1906 et sequ. = Pardosa lugubris (Walckenaer) 1802
„ sylvicola Lucas 1846 = Lycosa sylvatica (Roewer) 1951
„ sylvicola C. Koch 1873 = Pardosa mtugensis (Strand) 1908
„ tachypoda Thorell 1878 = Pardosa xerampelina (Keyserling) 1878
„ taczanowskii Thorell 1875 = Pardosa taczanowskii (Thorell) 1875
„ taeniata C. L. Koch 1835, 1848 = Alopecosa pulverulenta (Clerck) 1757
„ takahaschii Saito 1936 = Varacosa takahaschii (Saito) 1936
„ tamae Gertsch & Davis 1940 = Schizocosa tamae (Gertsch & Davis) 1940
„ tamerlani Roewer 1951 = Pardosa tenera Thorell 1899
„ tanna Berland 1936 = Varacosa tanna (Strand) 1913
„ tarantula Hahn 1822 = nicht zu deuten!
„ tarentula Dufour 1835 = Hogna hispanica (Walckenaer) 1837
„ tarentula narbonensis Latreille 1806 = Lycosa narbonensis Latreille 1806
„ tarentula suspecta Walckenaer 1845 = ? Dolomedes albineus Hentz 1845
„ tarentulina Audouin 1827, Walckenaer 1837 = Allocosa tarentulina (Audouin) 1827
„ tarentulina Karsch 1878 = Hogna inhambania **nov. nom.**
„ tarentuloides liguriensis Walckenaer 1837 = Hogna radiata (Latreille) 1819
„ tarentuloides maderiana Walckenaer 1837, Blackwall 1857 = Isohogna maderiana (Walckenaer) 1837
„ tarentuloides singoriensis Walckenaer 1837 = Allohogna singoriensis (Laxmann) 1770
„ tarsalis Thorell 1856, 1872, Westring 1862, Menge 1879 et sequ. = Pardosa palustris (Linné) 1758

Lycosa (Forts.)
„ tarsalis Locket & Millidge 1951 = Pardosa herbigrada (Blackwall) 1857
„ tasmanica Hogg 1905 = Dingosa tasmanica (Hogg) 1905
„ tatarica Thorell 1875 = Pardosa tatarica (Thorell) 1875
„ taylori Goyen 1886 = Pardosa taylori (Goyen) 1886
„ tenasserimensis Thorell 1895 = Pardosa tenasserimensis (Thorell) 1895
„ tenebrosa Petrunkevitch 1911 = Trochosa tenebrosa Keyserling 1876
„ tenella Petrunkevitch 1911 = Trochosa tenella Keyserling 1876
„ tenera Karsch 1879 = Avicosa tenera (Karsch) 1879
„ tenuissima Purcell 1903 = Lycorma tenuissima (Purcell) 1903
„ ternetzi Mello-Leitao 1939 = Lycorma ternetzi (Mello-Leitao) 1939
„ terricola Westring 1862, Thorell 1872, Simon 1876 et sequ. = Trochsina terricola (Thorell) 1856
„ terricola Menge 1879 part. = Trochosa ruricola (De Geer) 1778
„ tesquorum Odenvall 1901 = Pardosops tesquorum (Odenvall) 1901
„ thalassia Thorell 1891 = Pardosa thalassia (Thorell) 1891
„ thessala Simon 1885 = Alopecosa thessala (Simon) 1885
„ thetis Simon 1910 = Hogna thetis (Simon) 1910
„ thoas Mello-Leitao 1934 = Trochosa thoas (Mello-Leitao) 1934
„ thoracica Storm 1898 = Pardosa thoracica (Storm) 1898
„ thorelli Collett 1875 = Pardosa thorelli (Collett) 1875
„ thorellii Petrunkevitch 1911 = Lycorma thorellii (Keyserling) 1876
„ tigana Gertsch & Wallace 1935 et sequ. = Isohogna tigana (Gertsch & Wallace) 1935
„ tigrina Mc Cook 1879, Stone 1890 = Hygrolycosa aspersa (Hentz) 1844
„ timida Lucas 1846 = Sosilaus timidus (Lucas) 1846
„ timida Simon 1882 = Hogna timidula (Roewer) 1951
„ timidula Roewer 1951 = Hogna timidula (Roewer) 1951
„ timuqua Wallace 1942 = Isohogna timuqua (Wallace) 1942
„ T-insignita Bösenberg & Strand 1906, Saito 1934, 1936 = Pardosa T-insignita (Bösenberg & Strand) 1906
„ tivior Chamberlin & Ivie 1936 = Hogna tivior (Chamberlin & Ivie) 1936
„ tlaxcalana Gertsch & Davis 1940 = Hogna tlaxcalana (Gertsch & Davis) 1940
„ tomentosa Simon 1876 = Leaena villica (Lucas) 1846
„ topaziopsis Hogg 1896 = Dingosa topaziopsis (Hogg) 1896
„ trabalis Sundevall 1832 o, Westring 1862, Simon 1876, 1937 = Alopecosa trabalis (Clerck)
„ trabalis Sundevall 1832 O = Alopecosa inquilina (Clerck)
„ trabalis Becker 1882 = Alopecosa aculeata (Clerck) 1737
„ trägardhi Lawrence 1949 = Hogna trägardhi (Lawrence) 1949
„ traillii (trailii) Cambridge 1873, 1894, Jackson 1932, Locket & Millidge 1951 = Pardosa traillii (Cambridge) 1873
„ transvaalica Simon 1898 = Hogna transvaalica (Simon) 1898
„ transversolineata Tullgren 1901 = Sosippus floridanus Simon 1898
„ travassosi Mello-Leitao 1939 = Hogna travassosi (Mello-Leitao) 1939
„ tremens Simon 1885, 1908 = Allocosa tremens (Cambridge) 1876
„ tremula Simon 1899 = Arctosa tremula (Simon) 1899
„ trifoveata Strand 1907, 1909 = Pardosa trifoveata (Strand) 1907
„ tristani Banks 1909 = Schizogyna tristani (Banks) 1909
„ tristicella Roewer 1951 = Pardosa tristicella (Roewer) 1951
„ tristicula L. Koch 1877 = Trochosula tristicula (L. Koch) 1877
„ tristicula Thorell 1887 = Pardosa tristiculella (Roewer) 1951
„ tristiculella Roewer 1951 = Pardosa tristiculella (Roewer) 1951
„ tristis Thorell 1877 = Pardosa tristis (Thorell) 1877
„ triton Waldkenaer 1837 = Dolomedes triton (Waldkenaer) 1837
„ trucidatoria Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ turbida Simon 1905 = Dingosa turbida (Simon) 1905
„ turkestanica Roewer 1951 = Pardosops turkestanica (Roewer) 1951

Lycosa (Forts.)
„ turricola Treat 1880 = Geolycosa turricola (Treat) 1880
„ uinticolens Chamberlin 1936 = Geolycosa uinticolens (Chamberlin) 1936
„ uliginosa Westring 1862 = Piratula hygrophila (Thorell) 1872
„ uliginosa Goyen 1887 = Pardosa goyeni (Roewer) 1951
„ umbrata L. Koch 1877 = Avicosa umbrata (L. Koch) 1877
„ umtalica Purcell 1903 = Allocosa umtalica (Purcell) 1903
„ uncata Thorell 1877 = Pardosa mackenziana (Keyserling) 1876
„ uncata F. Cambridge 1902 = Lycosa illicita Gertsch 1934
„ ungulata Cambridge 1876 = Evippa ungulata (Cambridge) 1876
„ urbana Lessert 1915, Denis 1947 = Geolycosa urbana (Cambridge) 1876
„ urbana meruensis Lessert 1926 = Trochosippa meruensis (Lessert) 1926
„ urbana taurirtensis Schenkel 1937 = Pirata taurirtensis (Schenkel) 1937
„ urquharti Simon 1898 = Hogna urquharti (Simon) 1898
„ uruguayensis Simon 1898 = Diapontia uruguayensis (Keyserling) 1876
„ vagabunda Lucas 1846 = Hogna radiata (Latreille) 1819
„ vagula Thorell 1890, 1892 = Pardosa vagula (Thorell) 1890
„ validior Roewer 1951 = Pardosa valida Banks 1893
„ variana Simon 1876, 1937 = Arctosa variana C. L. Koch 1848
„ variana Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ variculosa Mello-Leitao 1941 = Lycorma variculosa (Mello-Leitao) 1941
„ velox Kroneberg 1875 = Pardosops turkestanica (Roewer) 1951
„ venatrix Lucas 1846 = Pardosa venatrix (Lucas) 1846
„ venefica Petrunkevitch 1911 = Avicosa venefica (Keyserling) 1891
„ venustula Hentz 1844 = Schizocosa saltatrix (Hentz) 1844
„ verisimilis Montgomery 1902 = Schizocosa saltatrix (Hentz) 1844
„ versicula Karsch 1880 = Trochosomma versicula (Karsch) 1880
„ verticillifer Strand 1906, 1907 = Pardosa verticillifer (Strand) 1906
„ vigilans L. Koch 1881 = Cynosa stigmosa (Thorell) 1875
„ villica Lucas 1846, Simon 1898, 1937 = Leaena villica (Lucas) 1846
„ villica tridens Simon 1937 = Leaenella tridens (Simon) 1937
„ vindex Cambridge 1885 = Pardosa vindex (Cambridge) 1885
„ vindicata Cambridge 1885 = Pardosa vindicata (Cambridge) 1885
„ vinsoni Roewer 1951 = Pardosa vinsoni (Roewer) 1951
„ virgata Karsch 1880 = Trochosa virgata (Karsch) 1880
„ virgata Goyen 1886 = Pardosa virgatella (Roewer) 1951
„ virgatella Roewer 1951 = Pardosa virgatella (Roewer) 1951
„ vittata Keyserling 1863. Chyzer & Kulczynski 1891 = Pardosa vittata (Keyserling) 1863
„ vivax Schmidt 1895 = Vesubia vivax (Thorell) 1875
„ vorax Walckenaer 1805, 1837, Sundevall 1832, C. L. Koch 1848 = Alopecosa trabalis (Clerck) 1757
„ vorax Hahn 1831 = Alopecosa cuneata (Clerck) 1757
„ vulcani Vinson 1863 = nicht zu deuten!
„ vulpecula L. Koch 1865, 1877 = Avicosa vulpecula (L. Koch) 1865
„ vulpina C. L. Koch 1848 = Hogna vulpina (C. L. Koch) 1848
„ vulpina Emerton 1885 = Hygrolycosa aspersa (Hentz) 1844
„ vultuosa C. L. Koch 1839, Walckenaer 1841 = Mimohogna vultuosa (C. L. Koch) (1839)
„ wacondana Scheffer 1904 = Pirata piraticus (Clerck) 1757
„ waglerii Hahn 1822, C. L. Koch 1848 et sequ. = Pardosa waglerii (Hahn 1822)
„ wallacei Chamberlin & Ivie 1944 = Hogna wallacei (Chamberlin & Ivie) 1944
„ watsoni Gertsch 1934 = Hogna watsoni (Gertsch) 1934
„ willeyi Pocock 1899 = Hogna willeyi (Pocock) 1899
„ woodwardi Simon 1909 = Allocosa woodwardi (Simon) 1909
„ wrighti Emerton 1912 = Scaptocosa wrighti (Emerton) 1912
„ wroughtoni Pocock 1899, 1900, Dyal 1935 = Hogna wroughtoni (Pocock) 1899
„ wulsini Fox 1935 = Avicosa wulsini (Fox) 1935

Lycosa (Forts.)
„ xerampelina Keyserling 1876 = Pardosa xerampelina (Keyserling) 1876
„ xylina C. L. Koch 1839, Waldkenaer 1841 = Hogna radiata (Latreille) 1819
„ yaucensis Petrunkevitch 1929 = Agalenocosa yaucensis (Petrunkevitch) 1929
„ yauliensis Petrunkevitch 1911 = Lynxosa yauliensis (Strand) 1908
„ yerburyi Pocock 1901 = Hogna yerburyi (Pocock) 1901
„ yurae Petrunkevitch 1911 = Avicosa yurae (Strand) 1908
„ zorimorpha Strand 1907, 1908 = Pardosa zorimorpha (Strand) 1907
„ zorodes Mello-Leitao 1942 = Hogna zorodes (Mello-Leitao) 1942

Lycosella:
„ hebridisiana Berland 1938 = Lycosula hebridisiana (Berland) 1938
„ minuta Berland 1938 = Lycosula minuta (Berland) 1938
„ thorelli Berland 1929, 1934 = Lycosula thorelli (Berland) 1929

Lycosina:
„ albimana Simon 1864 = Aulonia albimana (Walckenaer) 1805

Lycosoides:
„ algirica Lucas 1846 = Zoropsis spinimana (Dufour) 1820
„ digitalis Lucas 1846 = Textrix digitalis (Lucas) 1846
„ flavomaculata Lucas 1846 = Textrix flavomaculata (Lucas) 1846
„ pallipes Lucas 1846 = nicht zu deuten!
„ rufipes Lucas 1846 = Textrix coarctata (Dufour) 1831
„ rufithorax Lucas 1846 = Textrix rufithorax (Lucas) 1846

Lycotharses:
„ sjöstedtii Thorell 1899 = Hysterocrates sjöstedtii (Thorell) 1899

Lyroscelus:
„ bonhotei F. Cambridge 1901 = Cyrtopholis bonhotei (F. Cambridge) 1901

Lysania:
„ pygmaea Thorell 1890 = Anomalomma pygmaeum (Thorell) 1890

Lyssomanes:
„ completus Banks 1929 = Itata completa (Banks) 1929
„ femineus Simon 1901 = Lyssomanes jemineus Peckham & Wheeler 1889
„ modestus Peckham & Wheeler 1889 = Pandisus modestus (Peckham & Wheeler) 1889
„ pallens Blackwall 1877 = Asamonea pallens (Blackwall) 1877
„ tenuipes Cambridge 1869 = Asamonea tenuipes (Cambridge) 1869

Lyssomonea:
„ saphes Chamberlin & Ivie 1936 = Amycus benignus (Peckham) 1885

Macaria:
„ albomaculata Simon 1864 = Poecilochroa albomaculata (Lucas) 1846
„ albovittata Simon 1864 = Micaria albovittata (Lucas) 1846
„ aurulenta C. L. Koch 1839 = Micaria formicaria (Sundevall) 1831
„ chlorophana Heer 1845, Calloni 1889 = nicht zu deuten!
„ clubionoides Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ coarctata Simon 1864 = Micaria formicaria (Sundevall) 1831
„ corrusca C. L. Koch 1837 = Micaria pulicaria (Sundevall) 1831
„ erythrocephala Simon 1864 = Zelotes erythrocephalus (Lucas) 1846
„ fastuosa C. L. Koch 1835, 1839, Ohlert 1867 = Micaria fulgens (Walckenaer) 1802
„ festiva C. L. Koch 1835 = Phrurolithus festivus (C. L. Koch) 1835
„ flavitarsis Simon 1864 = Phrurolithus flavitarsis (Lucas) 1846
„ formicaria Simon 1864 = Micaria lucasii Thorell 1871
„ formosa C. L. Koch 1839, Ohlert 1867 = Micaria pulicaria (Sundevall) 1831
„ fulgens C. L. Koch 1835, 1850 = Micaria fulgens (Walckenaer) 1802
„ guttulata C. L. Koch 1839, Bösenberg 1902 = Micaria guttulata (C. L. Koch) 1839
„ listeri Simon 1864 = Zelotes listeri (Audouin) 1827
„ lugubris Simon 1864 = Micaria pulicaria (Sundevall) 1831
„ myrmecoides Ohlert 1865, 1867 = Micaria formicaria (Sundevall) 1831
„ nitens C. L. Koch 1839, Ohlert 1867 = Micaria pulicaria (Sundevall) 1831

Macaria (Forts.)
„ pallipes Simon 1864 = Micaria pallipes (Lucas) 1846
„ rufescens Simon 1864 = Micaria rufescens (Simon) 1864
„ salticina Taczanowski 1874 = Castianeira salticina (Taczanowski) 1874
„ schaefferii Simon 1864 = Pterotricha schaefferi (Audouin) 1827
„ valida Simon 1864 = Scotophaeus validus (Lucas) 1846
Macedonia:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Ariadna**
Machomenus:
„ albidus Marx 1893 = Runcinia albida (Marx) 1893
Macracantha:
„ arcuata Dahl 1914 = Gasteracantha arcuata (Fabricius) 1793
Macrargus:
„ abnormis Reimoser 1911, Roewer 1928 = Oreonetides abnormis (Blackwall) 1841
„ adipatus Chyzer & Kulczynski 1894, Lessert 1910, Roewer 1928 = Oreonetides vaginatus (Thorell) 1872
„ dentichelis Berland 1911 = Lessertia dentichelis (Simon) 1884
„ pusillus Schenkel 1923 = Oreonetides firmus (Cambridge) 1900
Macrinus:
„ atomarius Simon 1887 = Olios atratus Petrunkevitch 1911
„ longipes Simon 1887 = Olios longipedatus Roewer 1951
„ succineus Simon 1887 = Olios succineus (Simon) 1887
Macrobunus:
„ spinifer Tullgren 1901 = Macrobunus backhauseni (Simon) 1896
Macrothele:
„ annectens Bertkau 1880 = Thalerothele annectens (Bertkau) 1880
„ calpetana Ausserer 1871 = Macrothele calpeiana (Walckenaer) 1805
„ digitata Cambridge 1892 = Ischnothele digitata (Cambridge) 1892
„ fuliginea Simon 1891 = Marcrothele maculata (Thorell) 1890
„ huttonii Cambridge 1874 = Porrhothele antipodiana (Walckenaer) 1837
„ insignipes Simon 1891 = Porrhothele antipodiana (Walckenaer) 1837
„ silvicola Simon 1888 = Stenygrocercus silvicola (Simon) 1888
„ variabilis Pavesi 1898 = Macrothele maculata (Thorell) 1890
Madognatha:
„ abbotii Ausserer 1871 = Atypus abbotii (Walckenaer) 1837
Maeota:
„ dichrura Simon 1901, 1903 = Poultonia caudata Peckham 1900
„ dicrura Simon 1901 = Poultonia caudata Peckham 1900
„ fusca Mello-Leitao 1917 = Poultonia fusca (Mello-Leitao) 1917
Maevia:
„ agapeta Thorell 1881 = Telamonia agapeta (Thorell) 1881
„ alternans Thorell 1890, Workman 1896 = Telamonia vittata (C. L. Koch) 1846
„ annulipes C. L. Koch 1848 = Maevia vittata (Hentz) 1845
„ aurulenta C. L. Koch 1848 = Tutelina elegans (Hentz) 1846
„ californica Peckham 1888 = Dendryphantes californicus (Peckham) 1888
„ capistrata C. L. Koch 1848 = Viciria flavocincta (C. L. Koch) 1848
„ chlorophthalma Simon 1897 = Cosmophasis chlorophtalmus (Simon) 1897
„ chrysea C. L. Koch 1848 = Agassa cyanea (Hentz) 1846
„ clathrata Thorell 1895 = Telamonia clathrata (Thorell) 1895
„ coeruleostriata Thorell 1878 = Telamonia coeruleostriata (Doleschall) 1859
„ comosissima Simon 1886 = Telamonia comosissima (Simon) 1886
„ coronigera Peckham 1901 = Phiale coronigera (C. L. Koch) 1846
„ cristata C. L. Koch 1848 = Tutelina elegans (Hentz) 1846
„ cylindrata Karsch 1879 = Telamonia cylindrata (Karsch) 1879
„ cypria Thorell 1890, 1892 = Cosmophasis cypria (Thorell) 1890
„ debilis Giebel 1863 = nicht zu deuten!
„ dives Simon 1899 = Telamonia dives (Simon) 1899
„ doreyana Thorell 1881 = Telamonia doreyana (Walckenaer) 1837

Maevia (Forts.):
„ fenestrata Taczanowski 1878 = Cotinusa fenestrata (Taczanowski) 1878
„ flavocincta C. L. Koch 1848 = Viciria flavocincta (C. L. Koch) 1848
„ gemmans Thorell 1890, 1892 = Cosmophasis gemmans (Thorell) 1890
„ glaucochira Thorell 1890, 1892 = Chrysilla glaucochira (Thorell) 1890
„ inclemens Chamberlin & Ivie 1944 = Maevia vittata (Hentz) 1846
„ insultans Thorell 1881 = Cosmophasis insultans (Thorell) 1881
„ laticlavia Thorell 1892 = Cosmophasis laticlavia (Thorell) 1892
„ latruncula Thorell 1877 = Telamonia latruncula (Thorell) 1877
„ lineata C. L. Koch 1848 = Fuentes lineata (C. L. Koch) 1848
„ luteocincta Thorell 1891 = Telamonia luteocincta (Thorell) 1891
„ luzonica Karsch 1880 = nicht zu deuten!
„ margaritacea Hasselt 1893 = nicht zu deuten!
„ marxii Thorell 1890, 1892 = Cosmophasis marxii (Thorell) 1890
„ mellottei Simon 1888 = Telamonia mellottei (Simon) 1888
„ metallica Giebel 1863 = nicht zu deuten!
„ micans C. L. Koch 1848 = nicht zu deuten!
„ monacha Thorell 1881 = Cosmophasis monacha (Thorell) 1881
„ multipunctata Chyzer & Kulczynski 1891 = Telamonia castriesiana (Grube) 1861
„ mundula Thorell 1877 = Telamonia mundula (Thorell) 1877
„ neocaledonica Simon 1888 = Rhondes neocaledonica (Simon) 1888
„ nuda Giebel 1863 = nicht zu deuten!
„ ombrima Thorell 1877 = Cosmophasis viridifasciata (Doleschall) 1859
„ pallida C. L. Koch 1848 = Hentzia mitrata (Hentz) 1846
„ paula C. L. Koch 1848 = nicht zu deuten!
„ pavesii Simon 1876 = Telamonia castriesiana (Grube) 1861
„ pennicillata C. L. Koch 1848, Peckham 1886 = Maevia vittata (Hentz) 1845
„ persecta Thorell 1890 = nicht zu deuten!
„ picta C. L. Koch 1848 = Chrysilla versicolor (C. L. Koch) 1846
„ psittacina Thorell 1887 = Cosmophasis psittacina (Thorell) 1887
„ quadricincta Simon 1885 — Cosmophasis quadricincta (Simon) 1885
„ roseolimbata Hasselt 1893 = nicht zu deuten!
„ scalaris Thorell 1881 = Telamonia scalaris (Thorell) 1881
„ stolzmanni Taczanowski 1878 = Cotinusa stolzmanni (Taczanowski) 1878
„ sulphurea C. L. Koch 1848 = Hentzia mitrata (Hentz) 1846
„ thalassina Thorell 1881 = Cosmophasis thalassina (C. L. Koch) 1846
„ tibialis C. L. Koch 1848, Emerton 1909 = Admestina tibialis (C. L. Koch) 1848
„ trabifera Thorell 1881 = Telamonia trabifera (Thorell) 1881
„ virabunda Simon 1885 = Echinussa virabunda (Simon) 1885
„ viridifasciata Thorell 1878 = Cosmophasis viridifasciata (Doleschall) 1859
„ vittata Thorell 1892 = Telamonia vittata (C. L. Koch) 1846

Mahadeva:
„ meridionalis Keyserling 1892 = Verrucosa meridionalis (Keyserling) 1892
„ reticulata Keyserling 1892 = Verrucosa arenata (Walckenaer) 1841
„ undecimvariolata Keyserling 1892 = Verrucosa mexicana (Lucas) 1833
„ undulata Keyserling 1892 = Araneus undulatus (Keyserling) 1892
„ verrucosa Keyserling 1892 = Verrucosa arenata (Walckenaer) 1841
„ zebra Keyserling 1892 = Araneus zebra (Keyserling) 1892

Mahadiva:
„ reticulata Cambridge 1889 = Verrucosa arenata (Walckenaer) 1841
„ undecimvariolata Cambridge 1889 =Verrucosa mexicana (Lucas) 1833

Majella:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Majellula**

Mallos:
„ apanus Gertsch 1946 = Mallos hesperius (Chamberlin) 1916
„ arizonensis Gertsch 5 Davis 1942, Gertsch 1946 = Mallos dugesi (Becker) 1886
„ zionis Chamberlin 1948 = Mallos trivittatus (Banks) 1901

Mandane:
„ sudana Karsch 1880 = Mandaneta sudana (Karsch) 1880
Manduculus:
„ ambiguus Blackwall 1833, 1834 = Pachygnatha clerckii Sundevall 1823
„ limatus Blackwall 1841 = Pachygnatha listeri Sundevall 1830
„ vernalis Blackwall 1842 = Pachygnatha degeerii Sundevall 1830
Mangora:
„ semiatra Simon 1895 = nom. nud.
Maoriana:
„ dendyi Hogg 1901 = Cantuaria dendyi (Hogg) 1901
Maratus:
„ amabilis Karsch 1878, Peckham 1886 = Saitis volans (Cambridge) 1874
Margaromma:
„ gazellae Keyserling 1883 = Thiania gazellae (Karsch) 1878
„ nitida Thorell) 1899 = nicht zu deuten!
Maroussa:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Lyssomanes**
„ modesta Peckham & Wheeler 1889 = Pandisus modestus (Peckham & Wheeler) 1889
Marpesia:
„ arenicola Menge 1877 = Yllenus arenarius Simon 1868
Marpissa (= Marpissus, Marpessa):
„ aerihirta Urquhart 1887 = Laufeia aerihirta (Urquhart) 1887
„ albopilosa Banks 1902 = Pseudicius piraticus (Peckham) 1888
„ arenaria Urquhart 1887 = nicht zu deuten!
„ badius Simon 1868, 1870, Pavesi 1873 = Pseudicius badius (Simon) 1868
„ balteata C. L. Koch 1846 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
„ balteata Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ bistriata C. L. Koch 1846 = Breda bistriata (C. L. Koch) 1846
„ blackwalli Simon 1868. Thorell 1873 = Marpissa pomatia (Walckenaer) 1802
„ branickii Taczanowski 1878 = Thiodina pallida (C. L. Koch) 1846
„ brevipes C. L. Koch 1837 = Ballus chalybeius (Walckenaer) 1802
„ canestrinii Canestrini & Pavesi 1868, Simon 1871 = Mithion canestrinii (Canestrini & Pavesi) 1868
„ capensis C. L. Koch 1846 = nicht zu deuten!
„ cineracea Urquhart 1890 = nicht zu deuten!
„ cinereo-taeniatus Simon 1871 = Menemerus taeniatus (L. Koch) 1867
„ conspersa C. L. Koch 1846 = Marpissa undata (De Geer) 1778
„ diligens Kulczynski 1899 = Dendryphantes nidicolens (Walckenaer) 1825
„ discoloria C. L. Koch 1846 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
„ dissimilis C. L. Koch 1846 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
„ elata Thorell 1881 = nicht zu deuten!
„ encarpata Pavesi 1873 = Pseudicius encarpatus (Walckenaer) 1802
„ falsifica Pavesi 1873 = Menemerus falsificus Simon 1868
„ familiaris F. Cambridge 1901 = Marpissa undata (De Geer) 1778
„ fusca Karsch 1878 = Ocrisiona fusca (Karsch) 1878
„ grantii Warburton 1892 = Dendyphantes grantii (Warburton) 1892
„ grossa C. L. Koch 1846 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
„ hamata C. L. Koch 1846 = Icius hamatus (C. L. Koch) 1846
„ hamatus Simon 1868 = Marpissa radiata (Grube) 1859
„ imperialis Pavesi 1876 = Thyene imperialis (Rossi) 1846
„ incerta C. L. Koch 1846 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
„ isabellina Taczanowski 1878 = Itata isabellina (Taczanowski) 1878
„ leucophaeum Urquhart 1887 = nicht zu deuten!
„ longitudinalis Canestrini 1874 = nicht zu deuten!
„ lubomirskii Taczanowski 1878 = Breda lubomirskii (Taczanowski) 1878
„ marginatus Kroneberg 1875 = Menemerus marginatus (Kroneberg) 1875

Marpissa (Forts.):
„ melanognatha F. Cambridge 1901, Peckham 1909 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
„ melanura F. Cambridge 1901 = Marpissa californica (Peckham) 1888
„ milvina C. L. Koch 1846 = Breda milvina (C. L. Koch) 1846
„ minor F. Cambridge 1901 = Marpissa californica (Peckham) 1888
„ modesta Taczanowski 1878 = Balmaceda modesta (Taczanowski) 1878
„ monachus Simon 1868, 1871 = Marpissa pomatia (Walckenaer) 1802
„ nannodes Thorell 1890, 1892 = nicht zu deuten!
„ nardoi Canestrini & Pavesi 1868 = Dendryphantes nidicolens (Walckenaer) 1825
„ nemoralis Urquhart 1890 = nicht zu deuten!
„ nigrolimbata Cambridge 1875, Simon 1876 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
„ nitelina Pavesi 1873, 1875 = nicht zu deuten!
„ nivoyi Simon 1871, Thorell 1875 = Hyctia nivoyi (Lucas) 1846
„ obscura Kroneberg 1875 = Mithion canestrinii (Canestrini & Pavesi) 1868
„ ornata Thorell 1875, Warburton 1892 = Dendryphantes nidicolens (Walckenaer) 1825
„ plana Taczanowski 1878 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
„ pulchella Dahl 1883 = Pseudicius encarpatus (Walckenaer) 1802
„ ridens Hogg 1914 = Menemerus ridens (Hogg) 1914
„ robusta Bösenberg & Lenz 1895 = Plexippus robustus (Bösenberg & Lenz) 1895
„ rumpfii Dahl 1926, Palmgren 1943, Tullgren 1944 = Marpissa muscosa (Clerck) 1757
„ rupicola Bryant 1945 = Marpissa undata (De Geer) 1778
„ strigipes Simon 1868 = Marpissa radiata (Grube) 1859
„ stuhlmanni Bösenberg & Lenz 1895 = nicht zu deuten!
„ taeniatus Simon 1868 = Menemerus taeniatus (L. Koch) 1867
„ tardigrada Ninni 1869 = Marpissa muscosa (Clerck) 1757
„ varia C. L. Koch 1846 = Marpissa undata (De Geer) 1778

Marptusa:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Marpissa**
„ aerata L. Koch 1879 = Ocrisiona aerata (L. Koch) 1879
„ bracteata L. Koch 1879 = Menemerus bracteatus (L. Koch) 1879
„ cinerea L. Koch 1879 = Ocrisiona cinerea (L. Koch) 1879
„ complanata L. Koch 1879 = Ocrisiona complanata (L. Koch) 1879
„ decorata Thorell 1890, 1892 = Bavia decorata (Thorell) 1890
„ demissa Thorell 1892 = Thiana demissa (Thorell) 1892
„ doleschallii Thorell 1878 = Muziris doleschallii (Thorell) 1878
„ elegans L. Koch 1879 = Ocrisiona elegans (L. Koch) 1879
„ eriognatha Thorell 1881 = Opisthoncus eriognathus (Thorell) 1881
„ familiaris Peckham 1888, Emerton 1891, 1902 = Marpissa undata (De Geer) 1778
„ formosissima Thorell 1890, 1892 = Thiana formosissima (Thorell) 1890
„ hatamensis Thorell 1881 = Opisthoncus hatamensis (Thorell) 1881
„ hians Thorell 1890, 1892 = Bavia hians (Thorell) 1890
„ humilis Thorell 1877 = Thiania humilis (Thorell) 1877
„ inconspicuus Thorell 1881 = Opisthoncus inconspicuus (Thorell) 1881
„ inermis Karsch 1898, Lendl 1898 = nicht zu deuten!
„ invenusta L. Koch 1879 = Ocrisiona invenusta (L. Koch) 1879
„ jovialis L. Koch 1879 = Breda jovialis (L. Koch) 1879
„ leptochira Thorell 1881 = Muziris leptochirus (Thorell) 1881
„ leucocomis L. Koch 1879 = Ocrisiona leucocomis (L. Koch) 1879
„ liturata L. Koch 1879 = Ocrisiona liturata (L. Koch) 1879
„ longula Thorell 1881 = Trite longula (Thorell) 1881
„ marina Goyen 1891 = nicht zu deuten!
„ marita Karsch 1879 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
„ melancholica L. Koch 1879 = Ocrisiona melancholica (L. Koch) 1879

Marptusa (Forts.):
„ melanognatha Banks 1898 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
„ modesta Taczanowski 1878 = Balmaceda modesta (Taczanowski) 1878
„ muscosa Chyzer & Kulczynski 1891 = Marpissa muscosa (Clerck) 1757
„ ocellata Thorell 1899 = Viciria ocellata (Thorell) 1899
„ oppressa Thorell 1891, 1892 = Thiania oppressa (Thorell) 1891
„ parallelestriata L. Koch 1879 = Ocrisiona parallelestriata (L. Koch) 1879
„ planissima L. Koch 1879 = Holoplatys planissima (L. Koch) 1879
„ prensitans Thorell 1881 = Chalcolecta prensitans (Thorell) 1881
„ pulla Karsch 1879 = Menemerus pullus (Karsch) 1879
„ rapax Thorell 1881 = Chalcolecta rapax (Thorell) 1881
„ rubriceps Thorell 1881 = Trite rubriceps (Thorell) 1881
„ rupicola Banks 1892 = Marpissa undata (De Geer) 1778
„ sexpunctata Thorell 1878 = Bavia sexpunctata (Doleschall) 1859
„ soricina Thorell 1899 = nicht zu deuten!
„ tenerrima L. Koch 1879 = Copocrossa tenerrima (L. Koch) 1879
„ vulpecula Thorell 1881 = Trite vulpecula (Thorell) 1881

Martella:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Sarinda**
„ opica Peckham 1892 = Fluda opica (Peckham) 1892
„ pottsii Peckham 1892, F. Cambridge 1900, Petrunkevitch 1911 = Sarinda laeta Peckham 1892

Marussenca:
„ madagascariensis Dahl 1901 = Uduba dahli Simon 1903

Marxia:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Acanthepeira**
„ moesta Mc Cook 1893 = Acanthepeira moestella Roewer 1942
„ nobilis Mc Cook 1893 = Acanthepeira stellata (Walckenaer) 1805

Marxiella siehe **Dossenus**

Maso:
„ brittenii Jackson 1912, Schenkel 1927 = Perimones brittenii (Jackson) 1912
„ carpatica Chyzer 1894 = Pocadicnemis carpatica (Chyzer) 1894
„ frontata Banks 1896, 1911 = Maso sundevallii (Westring) 1851
„ sundevallii Simon 1884 = Maso gallica Simon 1894

Mastigosoma:
„ idae Ausserer 1871 = Poltys idae (Ausserer) 1871

Mastira:
„ bipunctata Thorell 1891 = Epidius bipunctatus (Thorell) 1891

Mastostigmus:
„ decemperlatus Simon 1888 = Theridion decemperlatum (Simon) 1888

Maturna:
„ arcuata C. L. Koch 1850 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
„ candefacta Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ fusca Simon 1864 = Pellenes tripunctatus (Walckenaer) 1802
„ grossipes Simon 1864 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
„ litoralis C. L. Koch 1850 = Sitticus littoralis (Hahn) 1831
„ nivosa Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ pratincola Simon 1864 = Sitticus truncorum (Linné) 1758
„ virgulata Simon 1864 = nicht zu deuten!

Maypacius:
„ floridanus Simon 1898, Banks 1913 = Thanatidius floridanus (Simon) 1898
„ hystrix Berland 1912 = Spencerella hystrix (Berland) 1912
„ lineatus sexmaculatus Lessert 1916 = Spencerella sexmaculata (Lessert) 1916
„ vittiger Simon 1898 = Maypacius bilineatus (Pavesi) 1895

Mazax:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Apochinomma**

Mecolaesthus:
„ signatus Banks 1914 = Modisimus signatus (Banks) 1914

Mecopisthes:
„ ater Hull 1932 = Silometopus ater (Blackwall) 1841
Mecynargus:
„ longus Chyzer & Kulczynski 1894 = Acartauchenius longus (Kulczynski) 1882
Medmassa:
„ humilis reichardti Strand 1915 = Corinna humilis reichardti (Strand) 1915
„ semilutea Simon 1897 = Medmassa semiflava Simon 1896
Megaera:
„ frenata Simon 1877 = Medmassa frenata (Simon) 1877
Megalostrata:
„ venenifica Simon 1898 = Megalostrata venifica Karsch 1880
Megamyrmeceon:
„ velox Tucker 1923 = Megamyrmaekion velox (Simon) 1887
Megamyrmecion:
Sämtliche hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Megamyrmaekion**
„ lepidum Banks 1899 = Drassyllus lepidus (Banks) 1899
Megatimus:
„ severus Thorell 1891, Workman 1896 = Dendryphantes severus (Thorell) 1891
Meioneta:
„ innotabilis Hull 1932 = Syedrula innotabilis (Cambridge) 1863
„ lugubris Hull 1932 = Aprolagus lugubris (Blackwall) 1834
„ mollis Hull 1932 = Aprolagus mollis (Cambridge) 1870
Melanippe:
„ punctigera Simon 1903 = Chemmis frederici Simon 1898
Melanophora:
Sämtliche hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Zelotes**
„ abdita Menge 1872 ♂ = Zelotes abditus (Menge) 1872
„ abdita Menge 1872 ♀ = Zelotes petrensis (C. L. Koch) 1839
„ acanthognatha Purcell 1907 = Camillina acanthognatha (Purcell) 1907
„ arida Purcell 1907 = Camillina arida (Purcell) 1907
„ atra C. L. Koch 1839, L. Koch 1866 = Zelotes latreillei (Simon) 1878
„ atra C. Koch 1872 = Zelotes manzae (Strand) 1908
„ bicolor L. Koch 1866 = Zelotes electus (C. L. Koch) 1839
„ bimaculata Bryant 1908 = Zelotes bryantae Roewer 1951
„ corrugata Purcell 1907 = Camillina corrugata (Purcell) 1907
„ conspicua L. Koch 1866 = Poecilochroa conspicua (L. Koch) 1866
„ depressa Bryant 1908 = Drassyllus depressus (Emerton) 1889
„ hamipalpis Kroneberg 1875 = Echemus hamipalpis (Kroneberg) 1875
„ latipes Canestrini 1873, 1874 = Zelotes carmeli (Cambridge) 1872
„ latitans L. Koch 1870 = Zelotes praeficus (L. Koch) 1866
„ lyonetii Simon 1864 = Zelotes lyonnetii (Audouin) 1827
„ moerens Thorell 1871 = Zelotes praeficus (L. Koch) 1866
„ nigrita Thorell 1870, Menge 1872 = Zelotes pusillus (C. L. Koch) 1833
„ nilotica Simon 1893 = Zelotes nilicola (Cambridge) 1874
„ nocturna Westring 1862 = Callilepis nocturna (Linné) 1758
„ nocturna Menge 1872 = Poecilochroa conspicua (L. Koch) 1866
„ oblonga Heer 1845 = nicht zu deuten!
„ pallipes C. L. Koch 1836 = nicht zu deuten!
„ parvula Simon 1864 = Setaphis lucasi Roewer 1951
„ petiverii Thorell 1868, 1870, Menge 1872 ♂ = Zelotes ater (Hentz) 1832
„ petiverii Menge 1872 ♀ Zelotes serotinus (L. Koch) 1866
„ petrensis C. L. Koch 1839, L. Koch 1866, Menge 1872 ♂ = Zelotes petrensis (C. L. Koch) 1839
„ petrensis Westring 1862 = Zelotes praeficus (L. Koch) 1866
„ petrensis Menge 1872 ♀ = Zelotes ater (Hentz) 1842
„ procurva Purcell 1907 = Camillina procurva (Purcell) 1907
„ rufula Petrunkevitch 1910 = Drassyllus rufulus (Banks) 1892

Melanophora (Forts.):
„ subterranea C. L. Koch 1833, 1839 et sequ. excl. Westring 1862 = Zelotes ater (Hentz) 1832
„ subterranea Westring 1862 = Zelotes tristis (Thorell) 1870
„ subterranea Heer 1846 = nicht zu deuten!
„ variana Westring 1862, 1874 = Poecilochroa variana (C. L. Koch) 1839

Melicertus:
„ acuminatus Simon 1864 = Entelecara acuminata (Wider) 1834
„ apicatus Simon 1864 = Wideria antica (Wider) 1834
„ ater Simon 1864 = Silometopus ater (Blackwall) 1841
„ bicornis Simon 1864 = Diplocephalus cristatus (Blackwall) 1833
„ bicuspidatus Simon 1864 = Hypomma cornutum (Blackwall) 1833
„ bifrons Simon 1864 = Dismodicus bifrons (Blackwall) 1841
„ bituberculatus Simon 1864 = Hypomma bituberculatum (Wider) 1834
„ cespitum Simon 1864 = Diplocephalus cristatus (Blackwall) 1833
„ chelyfer Simon 1864 = Gonatium rubens (Blackwall) 1833
„ elevatus Simon 1864 = Dismodicus elevatus (C. L. Koch) 1838
„ humilis Simon 1864 = Araeoncus humilis (Blackwall) 1841
„ nemoralis Simon 1864 = Lophocarenum nemorale (Blackwall) 1841
„ ochropus Simon 1864 = Minyriolus pusillus (Wider) 1834
„ parallelus Simon 1864 = Lophocarenum parallelum (Wider) 1834
„ parvus Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ picinus Simon 1864 = Plaesiocraerus picinus (Blackwall) 1841
„ pumilus Simon 1864 = Pocadionemis pumila (Blackwall) 1841
„ punctatus Simon 1864 = Lophomma punctatum (Blackwall) 1841
„ pusillus Simon 1864 = Minyriolus pusillus (Wider) 1834
„ sulcifrons Simon 1864 = Panamomops sulcifrons (Wider) 1834
„ turgidus Simon 1864 = Lophocarenum turgidum (Blackwall) 1841

Melodeus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Thalerothele**

Melos:
„ bicolor Cambridge 1900 = Cepheia longiseta (Simon) 1881

Memnon:
„ peragrans Cambridge 1898 = Teudis peragrans (Cambridge) 1898

Menalippe:
„ punctigera Cambridge 1898 = Chemmis frederici Simon 1898

Mendoza:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Mithion**

Menemerus:
„ balteatus Simon 1882, 1885 = Menemerus brevibulbis (Thorell) 1887
„ binus Emerton 1891 = Hyctia bina (Hentz) 1846
„ brevipalpis Simon 1901 = Menemerus brevibulbis (Thorell) 1887
„ culicivorus Thorell 1877, 1878, Keyserling 1883, Peckham 1888 = Plexippus paykullii (Audouin) 1827
„ delus Chamberlin & Ivie 1936 = Marpissa magna (Peckham) 1894
„ depressus Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
„ fannae Peckham 1896 = Plexippus fannae (Peckham) 1896
„ foliatus L. Koch 1879 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
„ fulviventris Thorell 1875 = Dendryphantes fulviventris (Lucas) 1846
„ galapagoensis Marx 1889 = nom. nud.
„ lineatus Emerton 1891 = Fuentes lineatus (C. L. Koch) 1848
„ marginellus Simon 1883 = Plexippus marginellus (Simon) 1883
„ melanognathus Peckham 1888, Marx 1889 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
„ obscurus Simon 1901 = Denemerus canestrinii (Canestrini & Pavesi) 1868
„ ochraceus Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
„ paykullii Thorell 1881, Peckham 1888, Marx 1889, Tullgren 1901 = Plexippus paykullii (Audouin) 1827

Menemerus (Forts.):
„ proximus Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
„ semilimbatus Getaz 1889 = nicht zu deuten!
„ vigoratus Simon 1868 = Menemerus semilimbatus (Hahn) 1829
„ vittatus Simon 1877 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
„ vittatus Peckham 1909 = Menemerus banksi Roewer 1951

Meriola:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Trachelas**

Mesoctenus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Acanthoctenus**

Mesopneustes:
„ nigrovittata Cambridge 1894 = Theridula opulenta (Walckenaer) 1841

Messua:
„ desidiosa Peckham 1896, F. Cambridge 1901 = Zygoballus desidiosus (Peckham) 1896

Meta:
„ acalypha Ausserer 1867 = Mangora acalypha (Walckenaer) 1802
„ adspersata Karsch 1891 = Cyrtophora cicatrosa (Stolitzca) 1869
„ albimacula Westring 1862 = Meta reticulata mengii jetzt: Meta segmentata mengii (Blackwall) 1870
„ alboguttata Cambridge 1889 = Pseudometa alboguttata (Cambridge) 1889
„ antinorii Pavesi 1883 = Leucauge undulata (Vinson) 1863
„ argentata Hogg 1911 = Leucauge dromedaria (Thorell) 1881
„ argentea Keyserling 1865 = Leucauge argentea (Keyserling) 1865
„ argentea Keyserling 1880 = Leucauge taczanowskii (Marx) 1893
„ argenteonigra Karsch 1884 = Leucauge argenteonigra (Karsch) 1884
„ argyra Keyserling 1880 = Leucauge argyra (Walckenaer) 1841
„ aurocincta Thorell 1877 = Leucauge aurocincta (Thorell) 1877
„ bigibbosa Petrunkevitch 1911 = Leucauge bigibbosa (Keyserling) 1863
„ blanda L. Koch 1878 = Leucauge blanda (L. Koch) 1878
„ branickii Keyserling 1893 = Chrysometa branickii (Taczanowski) 1874
„ brevipes Cambridge 1889 = Pseudometa brevipes (Cambridge) 1889
„ cavernicola Thorell 1878 = Orsinome cavernicola (Thorell) 1878
„ celebesiana Thorell 1877 = Leucauge decorata (Blackwall) 1864
„ celebesiana Simon 1885 = Leucauge celebesiana (Walckenaer) 1841
„ cellulana C. L. Koch 1841 = Nesticus cellulanus (Clerck) 1757
„ coccinea Thorell 1878, Keyserling 1887 = Leucauge grata (Guérin) 1830
„ decolorata Cambridge 1889 = Pseudometa decolorata (Cambridge) 1889
„ decorata L. Koch 1872 = Leucauge decorata (Blackwall) 1864
„ dönitzi Bösenberg & Strand 1906, Saito 1933 = Araneus dönitzi (Bösenberg & Strand) 1906
„ dromedaria Thorell 1881 = Leucauge dromedaria (Thorell) 1881
„ elegans Thorell 1877 = Leucauge fastigata (Simon) 1877
„ fastigata Simon 1877 = Leucauge fastigata (Simon) 1877
„ fastigiata Simon 1886 = Leucauge fastigata (Simon) 1877
„ fastuosa Thorell 1877 = Leucauge fastuosa (Thorell) 1877
„ flava Cambridge 1894 = Pseudometa flava (Cambridge) 1894
„ formosa Bertkau 1880 = Leucauge formosa (Blackwall) 1863
„ fusca C. L. Koch 1841 = Meta menardii (Latreille) 1804
„ fusca Thorell 1856, 1870, Westring 1862 = Meta merianae (Scopoli) 1763
„ fusiformis Thorell 1877 = Larinia fusiformis (Thorell) 1877
„ gemmea Hasselt 1882 = Leucauge gemmea (Hasselt) 1882
„ globosa Cambridge 1889 = Mecynometa globosa (Cambridge) 1889
„ gracilis Stoliczka 1869 = Tetragnatha ceylonica Cambridge 1869
„ granulata L. Koch 1867, 1871 = Leucauge dromedaria (Thorell) 1881
„ granulata Thorell 1881 = Leucauge granulata (Walckenaer) 1841
„ hispida C. L. Koch 1836 = Latrodectus tredecimguttatus (Rossi) 1790
„ insularis Keyserling 1865, L. Koch 1871 = Leucauge insularis (Keyserling) 1865

Meta (Forts.):
„ longimana Keyserling 1880 = Chrysometa longimana (Keyserling) 1880
„ longipes Keyserling 1881 = Chrysometa longipes (Keyserling) 1881
„ longula Thorell 1878, 1881, Hasselt 1882 = Leucauge longula (Thorell) 1878
„ mariana Keyserling 1880 = Chrysometa mariana (Keyserling) 1880
„ mengei Bösenberg 1901 = Meta reticulata mengii, jetzt: Meta segmentata mengii (Blackwall) 1870
„ muraria C. L. Koch 1846, Menge 1866 = ? Meta merianae (Scopoli) 1763
„ nigrotrivittata Simon 1885 = Leucauge celebesiana (Walckenaer) 1841
„ nigroventris Keyserling 1879 = Leucauge nigroventris (Keyserling) 1879
„ opulenta Keyserling 1880 = Chrysometa opulenta (Keyserling) 1880
„ orichalcea Thorell 1878 = Leucauge granulata (Walckenaer) 1841
„ ornata L. Koch 1871 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
„ pilatrix Thorell 1878 = Orsinome pilatrix (Thorell) 1878
„ prodiga L. Koch 1871 = Leucauge prodiga (L. Koch) 1871
„ pulcherima Keyserling 1865, 1880 = Leucauge pulcherima (Keyserling) 1865
„ pumila Thorell 1877, Hasselt 1882 = Leucauge pumila (Thorell) 1877
„ pusilla Thorell 1878 — Leucauge pusilla (Thorell) 1878
„ quadripenicillata Hasselt 1893 = Leucauge quadripenicillata (Hasselt) 1893
„ quadrituberculata Keyserling 1883 = Mecynometa quadrituberculata (Keyserling) 1883
„ rabli Karsch 1878 = Leucauge undulata (Vinson) 1863
„ reticulata Reimoser 1929, Wiehle 1931 = jetzt: Meta segmentata (Clerck) 1757
„ reticulata mengei Wiehle 1931 = jetzt: Meta segmentata mengii (Blackwall) 1870
„ schaufussii L. Koch 1882 = Enoplognatha schaufussii (L. Koch) 1882
„ schuchii C. L. Koch 1836 = Latrodectus schuchii (C. L. Koch) 1836
„ segmentata Westring 1862 et sequ. = Meta reticulata (Linné) 1758, jetzt: Meta segmentata (Clerck) 1757
„ segmentata Schmitz 1905 = Meta barretii (Kulczynski) 1899
„ serrana Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
„ soror Thorell 1877 = Larinia tabida (L. Koch) 1871
„ splendida Butler 1882 = Leucauge festiva (Blackwall) 1866
„ stellimicans Simon 1885 = Tylorida stellimicans (Simon) 1885
„ striata Thorell 1877, Hasselt 1882 = Tylorida striata (Thorell) 1877
„ striatpes Bradley 1876 = Leucauge striatipes (Bradley) 1876
„ subterranea Lebert 1877 = Meta merianae (Scopoli) 1763
„ superans Cambridge 1896 = Pseudometa superans (Cambridge) 1896
„ tigrina C. L. Koch 1845 = Drapetisca socialis (Sundevall) 1832
„ tredecimguttata Simon 1877 = Leucauge tredecimguttata (Simon) 1877
„ triangularis (Keyserling) 1879 = Mimetus triangularis (Keyserling) 1879
„ tuberculata Keyserling 1865, L. Koch 1871 = Leucauge granulata (Walckenaer) 1841
„ ungulata Karsch 1879 = Leucauge ungulata (Karsch) 1879
„ ventralis Thorell 1877 = Leucauge ventralis (Thorell) 1877
„ zelivira Keyserling 1887 = Deliochus zelivira (Keyserling) 1887

Metabus:
„ gravidus Cambridge 1899 = Meta gravida (Cambridge) 1899

Metacyrba:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Fuentes**
„ similis Banks 1904 = Fuentes taeniola (Hentz) 1845

Metadiaea:
„ melloleitaoi Caporiacco 1947 = Metadiaea candidoi Caporiacco 1948

Metaphidippus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Dendryphantes**
„ digitatus F. Cambridge 1901 = Beata digitata (F. Cambridge) 1901
„ flavolineatus F. Cambridge 1901 = Beata flavolineata (F. Cambridge) 1901
„ imperialis Gertsch 1930 = Dendryphantes mannii Peckham 1901

Metaphidippus (Forts.):
„ insignis Kaston 1948 = Dendryphantes octavus (Hentz) 1846
„ latus Chickering 1946 = Dendryphantes latior nom nov.
„ levispinus F. Cambridge 1901 = Beata levispina (F. Cambridge) 1901
„ maxillosus F. Cambridge 1901 = Dendryphantes prosper Peckham 1901
„ montanus Kaston 1938, Chickering 1944 = Dendryphantes octavus (Hentz) 1846
„ pernix F. Cambridge 1901 = Dendryphantes pernotus Petrunkevitch 1911
„ protervus Chamberlin & Ivie 1944, Kaston 1948 = Dendryphantes capitatus (Hentz) 1845
„ retiarius F. Cambridge 1901 = Thiodina sylvana (Hentz) 1846
„ tricolor Chamberlin & Ivie 1941 = Dendryphantes iviei Roewer 1951
„ variegatus F. Cambridge 1901 = Beata variegata (F. Cambridge) 1901
„ virginis Muma 1944, Kaston 1945 = Dendryphantes exiguus Banks 1892

Metargiope:
„ trifasciata F. Cambridge 1902 et sequ. = Argyope trifasciata (Forskal) 1775

Metastenus:
„ oblongus Bertkau 1878 = Tibellus oblongus (Walckenaer) 1802
„ parallelus Bertkau 1878 = Tibellus oblongus (Walckenaer) 1802

Metatobias:
„ stelloides F. Cambridge 1900 = Stephanopis stelloides (Walckenaer) 1837

Metazygia:
„ mundulella Strand 1915 = Larinia mundulella (Strand) 1915

Metriopelma
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Crypsidromus**
„ meridionale Mello-Leitao 1923 = Cyrtopholis meridionalis (Keyserling) 1891
„ spinulosum F. Cambridge 1897 = Stichoplastus spinulosus (F. Cambridge) 1897

Mettus:
„ reclivis Cambridge 1899 = Stemmops bicolor Cambridge 1894

Mezenia:
„ dorsalis Simon 1897, 1904, Tullgren 1902 = Mezenina dorsalis (Simon) 1897

Mezentia:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Fecenia**

Miagrammopes:
„ albomaculatus Mello-Leitao 1943 = Miagrammopes brasiliensis Roewer 1951
„ rimatus Simon 1892 = Miagrammopes rimosus Simon 1886

Miaschistopus:
„ rapidus Pocock 1897 = Crypsidromus tetricus Simon 1889

Mica:
„ longithorax Petrunkevitch 1925 = Micalula longithorax (Petrunkevitch) 1925

Micaria:
„ agilis Banks 1895, 1896 = Micaria aurata (Hentz) 1847
„ albini L. Koch 1866 = Aphantaulax seminiger Simon 1878
„ albostriata L. Koch 1877 et sequ. = Micaria subopaca Westring 1862
„ armata Cambridge 1874 = Micariolepis dives (Lucas) 1846
„ aurata Canestrini 1868, Simon 1878, 1932 = Micaria canestrinii Roewer 1951
„ aurata Gertsch 1933 ♀, nec ♂ = Micaria gosiuta Gertsch 1942
„ breviuscula Simon 1878, Lessert 1907, 1910 = Micaria alpina L. Koch 1872
„ canadensis Roewer 1951 = Micaria hesperella Gertsch 1939
„ chalybeia Kulczynski 1897 = Micaria smaragdula Simon 1878
„ cincta L. Koch 1866 = Aphantaulax cinctus (L. Koch) 1866
„ constricta L. Koch 1876 = Micaria formicaria (Sundevall) 1831
„ constricta Emerton 1894 = Micaria hesperella Gertsch 1939
„ corvina Simon 1878 = Aphantaulax corvinus (Simon) 1878
„ delicatula Bryant 1941 = Micaria aurata (Hentz) 1847
„ dives Bösenberg 1902 = Micariolepis dives (Lucas) 1846
„ formicaria L. Koch 1866 = Micaria lucasii Thorell 1871
„ formicoides Banks 1892 = Micaria longipes Emerton 1889

Micaria (Forts.):
- „ formicoides Chamberlin & Woodbury = Micaria formicula Roewer 1951
- „ foveata Strand 1900 = Micaria aenea Thorell 1871
- „ foveata Schenkel 1931 = Micaria alpina L. Koch 1872
- „ gentilis Banks 1895, Emerton 1909, Kaston 1945 = Micaria montana Emerton 1890
- „ ignea Cambridge 1872 = Castianeira ignea (Cambridge) 1872
- „ movens Simon 1878 = Micaria funerea Simon 1878
- „ multimaculata Kaston 1938 = Micaria laticeps Emerton 1909
- „ nitens Westring 1862, L. Koch 1866, Menge 1873 = Micaria pulicaria (Sundevall) 1831
- „ quinquenotata Emerton 1909, Muma 1945 = Micaria emertoni Gertsch 1935
- „ romana Simon 1878 = Micaria smaragdula Simon 1878
- „ scabra Simon 1878 = Graptartia scabra (Simon) 1878
- „ similis Bösenberg 1902, Kolosvary 1936 = Micaria pulicaria (Sundevall) 1831
- „ soyauxii Karsch 1879 = Castianeira soyauxii (Karsch) 1879
- „ spinulosa Simon 1878 = Micaria scintillans (Cambridge) 1870
- „ splendidissima L. Koch 1872 = Micariolepis dives (Lucas) 1846
- „ trifasciata Cambridge 1872 = Aphantaulax trifasciatus (Cambridge) 1872

Micariaulax:
- „ dugesii Becker 1879 = Castianeira dugesii (Becker) 1879

Micariolepis:
- „ splendidissima Becker 1882, 1896 = Micariolepis dives (Lucas) 1846

Micariosoma:

Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Phrurolithus**

Micrargus:
- „ albipes Roewer 1928 = Lophomma albipes (Bösenberg) 1902
- „ austerus Roewer 1928 = Anacotyle austera (Simon) 1884
- „ diceros Dahl 1886 = Saloca diceros (Cambridge) 1870
- „ candidus Roewer 1928 = Lophomma candidum (Bösenberg) 1902
- „ herbigradus Dahl 1886, Roewer 1928 = Micrargus (Blaniargus) herbigradus (Blackwall) 1854
- „ laudatus Roewer 1928 = Nothocyba laudata (Cambridge) 1881
- „ latebricola Dahl 1886 = Gongylidiellum compar (Westring) 1862
- „ rufipes Roewer 1928 = Lophomma rufipes (Bösenberg) 1902
- „ stativus Roewer 1928 = Anacotyle stativa (Simon) 1881
- „ vittatus Roewer 1928 = Minicia marginella (Wider) 1834

Micrathena:
- „ anomala Simon 1895 = Enacrosoma anomala (Taczanowski) 1873
- „ argiodes Butler 1873 = Phoroncidia argiodes (Doleschall) 1859
- „ aureola Petrunkevitch 1911 = Chaetacis aureola (C. L. Koch) 1836
- „ bufonina Simon 1867 = Pasilobus bufoninus (Simon) 1867
- „ fericula F. Cambridge 1904 = Ildibaha fericula (Cambridge) 1890
- „ forcipata Petrunkevitch 1911 = Micrathena sexspinosa (Hahn) 1822
- „ gibbosa Simon 1895 = Micrathena triangularis (C. L. Koch) 1836
- „ horrida Simon 1885 = Micrathena simoni Petrunkevitch 1910
- „ incisa Petrunkevitch 1911 = Chaetacis incisa (Waldkenaer) 1841
- „ laminaris Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
- „ mammillata F. Cambridge 1904 = Micrathena horrida (Taczanowski) 1873
- „ matronalis Simon 1895 = Micrathena gracilis (Waldkenaer) 1805
- „ oblonga Simon 1895, Petrunkevitch 1911 = Micrathena kirbyi (Perty) 1833
- „ obtusispina F. Cambridge 1904 = Micrathena sexspinosa (Hahn) 1822
- „ paraguayensis Mello-Leitao 1931 = Micrathena swainsonii (Perty) 1833
- „ picta Petrunkevitch 1911 = Chaetacis picta (C. L. Koch) 1836
- „ prudens Simon 1895 = Micrathena swainsonii (Perty) 1833
- „ quadrituberculata Simon 1876 = Enacrosoma quadrituberculatum (Simon) 1876

Micrathena (Forts.):
„ reduviana Simon 1895, F. Cambridge 1904 = Micrathena patruelis (C. L. Koch) 1839
„ rufa Petrunkevitch 1911 = Micrathena spinosa (Linné) 1758
„ sedes F. Cambridge 1904 = Micrathena sexspinosa (Hahn) 1822
„ sexacantha Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
„ sloanei Petrunkevitch 1911 = Argyope argentata (Fabricius) 1775
„ sloanii Mello-Leitao 1932 = Argyope argentata (Fabricius) 1775
„ spathulifera Simon 1895, Strand 1915 = Micrathena stübeli (Karsch) 1886
„ squammosa Simon 1864 = Hypognatha squammosa (Simon) 1864
„ triserrata Butler 1873 = Gasteracantha tetracantha (Linné) 1767.

Microclubiona:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Clubiona**

Microctenonyx:
„ longimana Dahl 1886 = Tiso vagans (Blackwall) 1834
„ ovatus Dahl 1886 = Colobocyba insecta (L. Koch) 1869
„ subitaneus Dahl 1886 = Aulacocyba subitanea (Cambridge) 1875

Microctenus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Ctenus**

Microcyllus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Talaus**

Microdipoena:
„ guttata Banks 1895 = Mysmena guttata (Banks) 1895

Microepeira:
„ radiosa Emerton 1884 = Theridiosoma gemmosum (L. Koch) 1877

Microerigone:
„ mendica M. Dahl 1928 = Coryphaeolana holmgrenii (Thorell) 1871

Micromata (= **Micrommata**)
„ argelasia Latreille 1818, Dufour 1820 = Eusparassus dufouri Simon 1932
„ belletana Risso 1826 = nicht zu deuten!
„ canadensis Emerton 1875 = Pisaurina mira (Walckenaer) 1837
„ carolinensis Hentz 1845 = Pisaurina mira (Walckenaer) 1837
„ fulva Simon 1874, 1875 = Micromata rosea ornata (Walckenaer) 1802
„ marmorata Hentz 1845 = Pisaurina mira (Walckenaer) 1837
„ ornata Thorell 1870, Simon 1874 et sequ. = Micromata rosea ornata (Walckenaer) 1802
„ ovambica Lawrence 1927 = Pseudomicrommata vittigera (Simon) 1896
„ pinicola Hentz 1850 = Teippus pinicola (Hentz) 1850
„ serrata Hentz 1845 = Pisaurina mira (Walckenaer) 1837
„ setulosa Perty 1833 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ smaragdina Latreille 1804, 1806, Hahn 1831 = Micromata rosea (Clerck) 1757
„ spongitarsis Dufour 1820 = Olios argelasius (Walckenaer) 1805
„ subinflata Hentz 1850 = Pisaurina subinflata (Hentz) 1850
„ undata Hentz 1845 = Pisaurina mira (Walckenaer) 1837
„ virescens Thorell 1869 et sequ. = Micromata rosea (Clerck) 1757
„ viridissima Reimoser 1931, Palmgren 1943, Tullgren 1944 = Micromata rosea (Clerck) 1757
„ vittigera Simon 1896, 1897 = Pseudomicrommata vittigera (Simon) 1876

Microneta:
„ anomala Bösenberg 1902 = Agyneta subtilis (Cambridge) 1863
„ arietans Simon 1884, Roewer 1928 = Meioneta arietans (Cambridge) 1872
„ beata Cambridge 1906 = Aprolagus beatus (Cambridge) 1906
„ bifida (in Abb.: biloba) Menge 1869 = Pocadicnemis pumila (Blackwall) 1841
„ bowditchiae Bishop 1924 = Microneta fabra (Keyserling) 1886
„ caesta Simon 1884 = Microneta caestata (Thorell) 1875
„ cauta Cambridge 1902 ♂ = Agyneta cauta (Cambridge) 1902
„ cauta Cambridge 1902 ♀ = Agyneta subtilis (Cambridge) 1863

Micromata (Forts.):
„ clavata Emerton 1917 = Sciastes terrestris (Emerton) 1882
„ clypeata F. Cambridge 1894 = Agyneta decora (Cambridge) 1870
„ conigera Simon 1884 et sequ. Agyneta conigera (Cambridge) 1863
„ crassimana Emerton 1882 = Aigola crassimana (Emerton) 1882
„ decora Simon 1884 = Agyneta decora (Cambridge) 1870
„ discolor Emerton 1882 = Microneta multesima (Cambridge) 1875
„ equestris Simon 1884 = Meioneta equestris (L. Koch) 1881
„ flava Emerton 1915 = Aigola flava (Emerton) 1915
„ furcifera Simon 1911 = Sintula furcifera (Simon) 1911
„ fuscipalpus Carpenter & Evans 1894 = Meioneta fuscipalpus (C. L. Koch) 1836
„ gargopa Crosby & Bishop 1929 = Sciastes gargopa (Crosby & Bishop) 1929
„ glacialis Chyzer & Kulczynski 1894, Lessert 1910 = Oreonetides vaginatus (Thorell) 1872
„ gracilis Menge 1869 = Syedra gracilis (Menge) 1869
„ grouvellei Simon 1884 = Meioneta gulosa (L. Koch) 1869
„ gulosa Simon 1884, Kulczynski 1887 = Meioneta gulosa (L. Koch) 1869
„ hirsuta Simon 1884 = Lasiargus hirsutus (Menge) 1869
„ incomta Simon 1884 = Micrargus (Blaniargus) incomtus (Cambridge) 1872
„ innotabilis Simon 1884 = Syedrula innotabilis (Cambridge) 1863
„ innotabilis Bösenberg 1902 = Minyriolus pusillus (Wider) 1834
„ keyserlingi Simon 1884 = Lepthyphantes keyserlingi (Ausserer) 1867
„ mollis Simon 1884 = Aprolagus mollis (Cambridge) 1870
„ nefaria Cambridge 1905 = Pocadicnemis pumila (Blackwall) 1841
„ nicholsonii Cambridge 1906 = Microneta viaria (Blackwall) 1841
„ nigriceps Simon 1884 = Tigellinus furcillatus (Menge) 1871
„ nigripes Simon 1884 = Meioneta nigripes (Simon) 1884
„ oblonga Simon 1884 = Porrhomma oblongum (Cambridge) 1870
„ ochropus Menge 1869 = Syedrula innotabilis (Cambridge) 1863
„ pallida Emerton 1917 = Microneta emertoni Roewer 1942
„ pallipes Simon 1884 = Porrhomma oblitum (Cambridge) 1870
„ palustris Banks 1892, 1916 = Ctenium (Robertus) palustris (Banks) 1892
„ passiva Cambridge 1906 ♂ = Agyneta cauta (Cambridge) 1902
„ passiva Cambridge 1906 ♀, 1910 = Aprolagus lugubris (Blackwall) 1834
„ penicilligera Simon 1884 = Sintula penicilligera (Simon) 1884
„ pusilla Menge 1869 = Meioneta tenera (Menge) 1869
„ pygmaea Menge 1869 = Tapinocyba pygmaea (Menge) 1869
„ quisquiliarum Menge 1869 = Microneta viaria (Blackwall) 1841
„ rectangulata Emerton 1913 = Aigola rectangulata (Emerton) 1913
„ retroversa Simon 1884 = Sintula retroversa (Cambridge) 1875
„ rotunda Emerton 1913 = Aigola rotunda (Emerton) 1913
„ rufipes Simon 1884 = Porrhomma rufipes (Blackwall) 1833
„ rurestris Simon 1884 et sequ. = Meioneta rurestris (C. L. Koch) 1836
„ rustica Simon 1884, Roewer 1928 = Aprolagus lugubris (Blackwall) 1834
„ saxatilis Simon 1884 = Aprolagus lugubris (Blackwall) 1834
„ scrobiculata Menge 1869 = Lophomma punctatum (Blackwall) 1841
„ simplicitarsis Simon 1884 = Aprolagus simplicitarsis (Simon) 1884
„ sublimis Simon 1884, F. Cambridge 1891 = Meioneta gulosa (L. Koch) 1869
„ subtilis Simon 1884, Lessert 1910 = Agyneta subtilis (Cambridge) 1863
„ sundevallii Menge 1869 = Maso sundevallii (Westring) 1851
„ tesselata Menge 1871 = Oedothorax fuscus (Blackwall) 1834
„ territa Cambridge 1906 = Metopobactrus prominulus (Cambridge) 1872
„ tenera Simon 1884 = Meioneta tenera (Menge) 1869

Micronetaria:
„ viaria Dahl 1912 = Microneta viaria (Blackwall) 1841

Microstigma:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Microstigmata**

Micryphantes (= Micryphantus):

„ acuminatus C. L. Koch 1838 = Entelecara thorellii (Westring) 1862
„ aequalis C. L. Koch 1841, Simon 1864, Ohlert 1867 = Macrargus rufus (Wider) 1834
„ affinis Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ albertinae Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ albipes Bösenberg 1902 = Lophomma albipes (Bösenberg) 1902
„ alutacius C. L. Koch 1845, Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ anthracinus C. L. Koch 1837 = Singa pygmaea (Sundevall) 1831
„ arcticus White 1852 = Erigone arctica (White) 1852
„ beatus Jackson 1912 = Aprolagus beatus (Cambridge) 1906
„ bicolor C. L. Koch 1837, 1850 = nicht zu deuten!
„ bicuspidatus Ohlert 1867 = nicht zu deuten!
„ bipuncatus Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ birulai Kulczynski 1908 = Meioneta birulai (Kulczynski) 1908
„ bituberculatus Ohlert 1867 = Hypomma bituberculatum (Wider) 1834
„ brevis Simon 1864 = Ceratinella brevis (Wider) 1834
„ caespitum C. L. Koch 1837, Ohlert 1867 = Diplocephalus cristatus (Blackwall) 1833
„ camelinus C. L. Koch 1836 = Waldkenaeria acuminata Blackwall 1833
„ capito Ohlert 1867 = Troxochrus hiemalis (Blackwall) 1841
„ cheliferus Six 1863 = Gonatium rubens (Blackwall) 1833
„ columella Grube 1859 = nicht zu deuten!
„ comatus Simon 1864 = Centromerita bicolor (Blackwall) 1833
„ conifer Grube 1859, Ohlert 1867 = Savignia frontata Blackwall 1833
„ corniger Chyzer & Kulczynski 1894 = Sintula cornigera (Blackwall) 1856
„ crassipalpus C. L. Koch 1838, Simon 1864, Ohlert 1867 = Gongylidium rufipes (Linné) 1758
„ crassipes Menge 1869 = nicht zu deuten!
„ cristatopalpus Ohlert 1867 = Styloctetor penicillatus (Westring) 1851
„ cucullatus C. L. Koch 1836 = Wideria cucullata (C. L. Koch) 1836
„ cucullatus Ohlert 1867 = Plaesiocraerus latifrons (Cambridge) 1863
„ dentatum Simon 1864, Hull 1932 = Gnathonarium dentatum (Wider) 1834
„ denticulatus Simon 1864 = Gnathonarium dentatum (Wider) 1834
„ dentisetis Grube 1861 = nicht zu deuten!
„ dilutus Lessert 1910 = Centromerus dilutus (Cambridge) 1875
„ dysderoides Simon 1864 = Wideria dysderoides (Wider) 1834
„ elevatus C. L. Koch 1838 = Dismodicus elevatus (C. L. Koch) 1838
„ equestris Kulczynski 1898 = Meioneta equestris (L. Koch) 1881
„ erythrocephalus C. L. Koch 1836, 1841, Simon 1864, Ohlert 1867 = Macrargus rufus (Wider) 1834
„ ferrumequinum Grube 1861 = nicht zu deuten!
„ flavomaculatus C. L. Koch 1836, Simon 1864 = Euryopis flavomaculata (C. L. Koch) 1836
„ formivorus Simon 1864 = Theridion fuscum Blackwall 1841
„ frontalis Ohlert 1867 = Entelecara frontalis (Ohlert) 1867
„ fuscipalpus C. L. Koch 1836 et sequ. = Meioneta fuscipalpus (C. L. Koch) 1836
„ gibbus Ohlert 1867 = Oedothorax apicatus (Blackwall) 1850
„ gracilis Holmberg 1876 = Euryopis gracilis (Holmberg) 1876
„ graminicolis Simon 1864 = Micryphantes graminicola (Sundevall) 1830
„ grandimanus Ohlert 1867 = Stylophora concolor (Wider) 1834
„ gulosus Kulczynski 1898, Lessert 1910 = Meioneta gulosa (L. Koch) 1869
„ hiemalis C. L. Koch 1837 = nicht zu deuten!
„ hirsutus Menge 1869 = Lasiargus hirsutus (Menge) 1869
„ histericus Simon 1864 = Theridion pallens Blackwall 1834
„ hystricus C. L. Koch 1845 = Theridion pallens Blackwall 1834
„ hystrix C. L. Koch 1845 = Theridion pallens Blackwall 1834

Micryphantes (Forts.):
„ inaequalis C. L. Koch 1841, Ohlert 1867 = Lophocarenum elongatum (Wider) 1834
„ innotabilis Dahl 1886, Lessert 1910 = Syedrula innotabilis (Cambridge) 1863
„ inuncans Bösenberg 1902 = Styloctetor romanus (Cambridge) 1872
„ isabellinus C. L. Koch 1841, Simon 1864 = Gonatium rubellum (Blackwall) 1841
„ isabellinus Menge 1850 = Gonatium rubens (Blackwall) 1833
„ kochii Heer 1845 = nicht zu deuten!
„ laminatus C. L. Koch 1845, Simon 1864 = Stylophora dorsalis (Wider) 1834
„ laminatus Ohlert 1867 = Bathyphantes ohlerti Simon 1884
„ lividus Menge 1869 = nicht zu deuten!
„ longipalpus C. L. Koch 1837, Simon 1864 = Tiso vagans (Blackwall) 1834
„ lugens C. L. Koch 1837 = nicht zu deuten!
„ mathildae Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ miniatus Grube 1861 = nicht zu deuten!
„ mollis Jackson 1912 = Aprolagus mollis (Cambridge) 1870
„ nigripes Lessert 1910, Jackson 1914 = Meioneta nigripes (Simon) 1884
„ ochropus C. L. Koch 1838, Ohlert 1867 = Minyriolus pusillus (Wider) 1834
„ olivaceus Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ ovatus C. L. Koch 1833 et sequ. = Meioneta ovata (C. L. Koch) 1833
„ pantherinus C. L. Koch 1836, Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ parvipalpus Simon 1864 = Macrargus rufus (Wider) 1834
„ phaeopus C. L. Koch 1845, Simon 1864, Ohlert 1867 = Ceratinella brevis (Wider) 1834
„ punctulatus C. L. Koch 1836 = nicht zu deuten!
„ quaternus Simon 1864 = Stylophora dorsalis (Wider) 1834
„ retroversus Chyzer & Kulczynski 1894 = Sintula retroversa (Cambridge) 1875
„ rubens C. L. Koch 1837 = nicht zu deuten!
„ rubripes C. L. Koch 1834, 1838, 1850, Ohlert 1867, Hull 1932 = Micryphantes graminicola (Sundevall) 1830
„ ruficephalus Ohlert 1867 = Macrargus rufus (Wider) 1834
„ rufipalpus C. L. Koch 1836, Simon 1864, Ohlert 1867 = nicht zu deuten!
„ rufus Simon 1864 = Macrargus rufus (Wider) 1834
„ rurestris C. L. Koch 1836 et sequ. = Meioneta rurestris (C. L. Koch) 1836
„ saxatilis Jackson 1912 = Aprolagus lugubris (Blackwall) 1834
„ similis Kulczynski 1926 = Meioneta similis (Kulczynski) 1926
„ stativus Bertkau 1884, Bösenberg 1902 = Anacotyle stativa Simon 1881
„ stylifer Ohlert 1867 = Cornicularia stylifera (Ohlert) 1867
„ sublimis Jackson 1912 = Meioneta gulosa (L. Koch) 1869
„ sulcicollis Grube 1859 = nicht zu deuten!
„ sulculus C. L. Koch 1837 = nicht zu deuten!
„ tener Menge 1869 = Meioneta tenera (Menge) 1869
„ tenuipalpis Menge 1869 = Meioneta rurestris (C. L. Koch) 1836
„ terrestris Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ tesselatus C. L. Koch 1836, Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ thoracicus C. L. Koch 1850 = Enoplognatha thoracica (Hahn) 1831
„ tibialis C. L. Koch 1836, 1841, Ohlert 1867 = Wideria antica (Wider) 1834
„ tuberculatus Grube 1859 = Oedothorax apicatus (Blackwall) 1850
„ villosus C. L. Koch 1845, Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ vittatus Grube 1859 = Stylophora dorsalis (Wider) 1834

Midamus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Olios**
„ longipes Simon 1884 = Olios longipedes Roewer 1951

Migas:
„ abrahami Simon 1892 = Caedmon abrahami (Cambridge) 1889
„ sandageri Goyen 1890 = Migas paradoxus L. Koch 1873

Miltia:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Prodidomus**

Mimetus:
„ epeiroides Emerton 1882, Chamberlin 1923 = Mimetus interfector Hentz 1832
„ interfector Simon 1881 = Mimetus laevigatus (Keyserling) 1863
„ laevigatus Pavesi 1873, 1875 = nicht zu deuten!
„ senio Dalmas 1917 = Mimetus sennio (Urquhart) 1890
„ triangularis Keyserling 1886 = Mimetus keyserlingi Mello-Leitao 1929
„ tuberosus Hentz 1850, Emerton 1882 = Mimetus interfector Hentz 1832

Minicia:
„ spinosa Thorell 1875 = Minicia marginella (Wider) 1834

Minosia:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Crosbyellum**
„ jaffana Dalmas 1921 = Pterotricha jaffana (Strand) 1915

Minyriolus:
„ laesus Simon 1884 = Silometopus laesus (L. Koch) 1879
„ scopulifer Simon 1884, Crosby 1905 = Tapinocyba scopulifera (Emerton) 1882
„ servulus Simon 1884, 1894 = Glyphesis servulus (Simon) 1881
„ vulneratus Simon 1884 = Silometopus vulneratus (L. Koch) 1879

Miopristis:
„ pulvinata Simon 1907 = Kratochvilia pulvinata (Simon) 1907

Mioxena:
„ blanda Simon 1926 = Diplocentria blanda (Simon) 1884

Miranda:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Araneus** (= Aranea)
„ acalyphia Menge 1866 = Mangora acalypha (Walckenaer) 1802
„ carinata Giebel 1869 = Cercidia prominens (Westring) 1851
„ cophinaria F. Cambridge 1903 = Argyope aurantia (Lucas) 1833
„ exornata C. L. Koch 1845 = Araneus armida (Audouin) 1827
„ hirsuta C. L. Koch 1848 = Araneus armida (Audouin) 1827
„ pictilis C. L. Koch 1837, 1839 = Araneus adiantus Walkenaer 1802
„ pinipila Bremi-Wolff 1849 = Meta reticulata (Linné) 1758, jetzt: Meta segmentata (Clerck) 1757
„ porracea C. L. Koch 1839 = Cyrtophora porracea (C. L. Koch) 1839
„ transalpina C. L. Koch 1835 = Argyope brünnichii (Scopoli) 1763
„ zabonica Chamberlin 1924 = Argyope zabonica (Chamberlin) 1924

Missulena:
„ gracilis Petrunkevitch 1939 = Closterochilus gracilis (Hentz) 1842
„ rubriceps Strand 1907 = ? Missulena rubrocapitata (Ausserer) 1875

Misumena:
„ alabamensis Keyserling 1883 = Misumenops celer (Hentz) 1847
„ aleatoria Emerton 1893, 1902, Peelle & Saito 1933 = Misumenoides aleatorius (Hentz) 1847
„ albiceris L. Koch 1876 = Diaea albiceris (L. Koch) 1876
„ americana Keyserling 1880, Simon 1897 = Misumenops oblongus (Keyserling) 1880
„ anguliventris Simon 1900 = Misumenoides anguliventris (Simon) 1900
„ asperata Emerton 1893, 1902 = Misumenops asperatus (Hentz) 1847
„ bellula Banks 1896 = Misumenops bellulus (Banks) 1896
„ bitaeniata Thorell 1878 = Diaea bitaeniata (Thorell) 1878
„ bivittata Keyserling 1880, Mello-Leitao 1929 = Misumenops bivittatus (Keyserling) 1880
„ californica Banks 1896 = Misumenops californicus (Banks) 1896
„ calycina occidentalis Kulczynski 1911 = Misumena occidentalis (Kulcz.) 1911
„ citrea Latreille 1804 = Misumena vatia (Clerck) 1757
„ clarckii Warburton 1892 = Misumena spinifera (Blackwall) 1862
„ conjuncta Cambridge 1891 = Misumenops pascalis (Cambridge) 1891
„ conspersa Keyserling 1880 = Misumenops conspersus (Keyserling) 1880
„ consueta Banks 1898 = Misumenops consuetus (Banks) 1898

Misumena (Forts.):

„ cretacea Simon 1900 = Misumenoides cretaceus (Simon) 1900
„ crocea Keyserling 1880, Berland 1913 = Misumenops croceus (Keyserling) 1880
„ decolor Kulczynski 1901 = Misumenops decolor (Kulczynski) 1901
„ decora Banks 1898 = Misumenops decorus (Banks) 1898
„ diegoi Keyserling 1887 = Misumenops celer (Hentz) 1847
„ dierythra Thorell 1890, 1892 = Misumenops dierythra (Thorell) 1890
„ dubia Keyserling 1880 = Misumenops dubius (Keyserling) 1880
„ elongata L. Koch 1874 = Runcinia acuminata (Thorell) 1881
„ exanthematica Holmberg 1881 = Misumenops exanthematicus (Holmberg) 1881
„ expallidata Cambridge 1885 = Misumena vatia (Clerck) 1757
„ flavens Thorell 1877, Merian 1911 = Diaea flavens (Thorell) 1877
„ foliata Banks 1892 = Misumenops asperatus (Hentz) 1847
„ georgiana Keyserling 1880, Banks 1913 = Misumenops celer (Hentz) 1847
„ gracilis Keyserling 1880 = Misumenops gracilis (Keyserling) 1880
„ hilaris Thorell 1877 = Diaea hilaris (Thorell) 1877
„ hirsuta Thorell 1873 = Heriaeus oblongus Simon 1918
„ hirta Pavesi 1875 = Heriaeus orientalis Simon 1918
„ importuna Keyserling 1882 = Misumenops importunus (Keyserling) 1882
„ inclusa Banks 1902 = Misumenops inclusus (Banks) 1902
„ ignobilis Badcock 1932 = Misumenops ignobilis (Badcock) 1932
„ lactea L. Koch 1876 = Diaea lactea (L. Koch) 1876
„ lateralis Pavesi 1878 = Runcinia cerina (C. L. Koch) 1845
„ lenis Keyserling 1880 = Misumenops lenis (Keyserling) 1880
„ maculisparsa Keyserling 1891 = Misumenops maculisparsus (Keyserling) 1891
„ mexicana Keyserling 1880 = Misumenops mexicanus (Keyserling) 1880
„ modesta Banks 1898 = Misumenops modestus (Banks) 1898
„ nepenthicola Pocock 1898 = Misumenops nepenthicola (Pocock) 1898
„ nesiotes Simon 1899, 1900 = Misumenoides nesiotes (Simon) 1899
„ nigrofrenata Simon 1900 = Misumenoides nigrofrenatus (Simon) 1900
„ nitida Thorell 1877 = Diaea nitida (Thorell) 1877
„ oblonga Keyserling 1880, Emerton 1893 = Misumenops oblongus (Keyserling) 1880
„ oblonga Cambridge 1885 = Misumena vatia (Clerck) 1757
„ oblonga Saito 1939 = Misumena saitoi (Roewer) 1951
„ ocellata Tullgren 1905 = Misumenops ocellatus (Tullgren) 1905
„ oreades Simon 1900 = Misumenoides oreades (Simon) 1900
„ ornata Cambridge 1893 = Misumenops dubius (Keyserling) 1880
„ pallens Keyserling 1880, Simon 1904 = Misumenops pallens (Keyserling) 1880
„ pallida Keyserling 1891 = Misumenops pallidus (Keyserling) 1880
„ pallida Cambridge 1891 = Misumenops damnosus (Keyserling) 1880
„ particeps Cambridge 1891 = Misumenops damnosus (Keyserling) 1880
„ pascalis Cambridge 1891 = Misumenops pascalis (Cambridge) 1891
„ personata Simon 1916 = Misumena occidentalis (Kulczynski) 1911
„ pictilis Banks 1896 = Diaea pictilis (Banks) 1896
„ placida Banks 1892 = Misumenops asperatus (Hentz) 1847
„ punctata Keyserling 1880 = Misumenops punctatus (Keyserling) 1880
„ pustulosa L. Koch 1874 = Thomisus spectabilis Doleschall 1859
„ quadrivulvata Franganillo 1926 = nicht zu deuten!
„ rosea Keyserling 1880 = Misumenops asperatus (Hentz) 1847
„ savignyi Cantoni 1881, Pavesi 1884 = Heriaeus hirtus (Latreille) 1819
„ spinosa Keyserling 1880, Banks 1913 = Misumenops celer (Hentz) 1847
„ splendens Keyserling 1880 = Misumenops splendens (Keyserling) 1880
„ tricuspidata Simon 1875 et sequ. = Misumenops tricuspidatus (Fabricius) 1775
„ tristania Rainbow 1900 = Diaea tristania (Rainbow) 1900
„ truncata Thorell 1872 et sequ. = Pistius truncatus (Pallas) 1772
„ tuckeri Lessert 1919 = Misumenops tuckeri (Lessert) 1919
„ varia Keyserling 1880 = Misumenops varius (Keyserling) 1880

Misumena (Forts.):
„ velata Simon 1900 = Misumenoides velatus (Simon) 1900
„ villosa Pavesi 1873 = Heriaeus oblongus Simon 1918
„ villosa Thorell 1873 = Heriaeus hirtus (Latreille) 1819
„ vinsonii Thorell 1875 = Cynathea vinsonii (Thorell) 1875
„ viridans Banks 1896 = Synema viridans (Banks) 1896
„ xanthogaster L. Koch 1875 = Diaea xanthogaster (L. Koch) 1875

Misumenoides:
„ californicus Petrunkevitch 1911 = Misumenops dubius (Keyserling) 1880
„ cinereus Mello-Leitao 1939 = Misumenoides nicoleti Roewer 1951
„ ignobilis Mello-Leitao 1939 = Misumena ignobilis Badcock 1932

Misumenops:
„ delphinus Chamberlin & Ivie 1944 = Misumenops celer (Hentz) 1847
„ diegoi Petrunkevitch 1911 = Misumenops celer (Hentz) 1847
„ lepidus Petrunkevitch 1911 = Misumenops celer (Hentz) 1847
„ pallidulus Petrunkevitch 1911 = Misumenops californicus (Banks) 1896
„ pallidus Berland 1934 = Misumenops melloleitaoi Berland 1942
„ pictilis Petrunkevitch 1911 = Diaea pictilis (Banks) 1896
„ spinosus F. Cambridge 1900 = Misumenops celer (Hentz) 1847
„ viridans Petrunkevitch 1911 = Synema viridans (Banks) 1896
„ volutus F. Cambridge 1900 = Misumenops decorus (Banks) 1896

Misumessus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Misumenops**
„ echinatus Banks 1914 = Parastephanops echinatus (Banks) 1914
„ lepidus Banks 1910 = Misumenops celer (Hentz) 1847
„ pallidulus Banks 1904 = Misumenops californicus (Banks) 1896
„ pictilis Banks 1896 = Diaea pictilis (Banks) 1896
„ viridans Banks 1910 = Synema viridans (Banks) 1896

Mithion:
„ ocellatus Simon 1901, 1903, Strand 1906 = Viciria ocellata (Thorell) 1899

Mithras:
„ dubius Blackwall 1862 = Uptiotes flavidus (Blackwall) 1862
„ flavidus Blackwall 1862 = Uptiotes flavidus (Blackwall) 1862
„ paradoxus C. L. Koch 1837, 1845 et sequ. = Uptiotes paradoxus (C. L. Koch) 1837
„ undulatus C. L. Koch 1845 = Uptiotes paradoxus (C. L. Koch) 1837

Mitothele:
„ caudicola Simon 1892 = Heterothele caudicola (Simon) 1887

Mitura:
„ caudicola Simon 1887 = Heterothele caudicola (Simon) 1887

Miturgina:
„ vittata Simon 1888 = Argoctenus vittatus (Simon) 1888

Modisimus:
„ propinquus Cambridge 1896 ♀ = Modisimus inornatus Cambridge 1895

Modysticus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Ozyptila**

Moebelia:
„ penicillata Dahl 1886 et sequ. = Styloctetor penicillatus (Westring) 1851
„ picina Dahl 1886 = Plaesiocraerus picinus (Blackwall) 1841

Moero:
„ quadrimaculatus Cambridge 1904 = Cyatholipus quadrimaculatus (Simon) 1894

Moggridgea:
„ abrahami Cambridge 1889 = Caedmon abrahami (Cambridge) 1889
„ meyeri Karsch 1879 = Stasimopus meyeri (Karsch) 1879
„ tidmarshi Lenz 1889 = Caedmon abrahami (Cambridge) 1889

Mogrus:
„ cephalotes Simon 1888 = Bythocrotus cephalotes (Simon) 1888
„ flavovittatus Simon 1901 = Mogrus fulvivittatus Simon 1882
„ neglectus Simon 1884 = Philaeus neglectus (Simon) 1868

Mollica:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Mollika**
Monaeses:
„ albidus L. Koch 1876 = Tmarus albidus (L. Koch) 1876
„ angulatus L. Koch 1873 = Tmarus angulifer Simon 1895
„ caudicola Simon 1884, Chyzer & Kulczynski 1891 = Monaeses paradoxus (Lucas) 1846
„ cinerascens L. Koch 1876 = Tmarus cinerascens (L. Koch) 1876
„ cuneolus Bertkau 1880 = Tmarus piger (Walckenaer) 1802
„ leo Caffi 1895 = Tmarus piochardi (Simon) 1866
„ macilentus L. Koch 1876 = Tmarus macilentus (L. Koch) 1876
„ marmoreus L. Koch 1876 = Tmarus marmoreus (L. Koch) 1876
„ piger Pavesi 1878 = Tmarus piger (Walckenaer) 1802
„ projectus L. Koch 1876 = Tmarus projectus (L. Koch) 1876
„ truncatus L. Koch 1876 = Tmarus truncatus (L. Koch) 1876
„ variabilis L. Koch 1876, Thorell 1881 = Tmarus variabilis (L. Koch) 1876
Monapia:
„ moreirae Mello-Leitao 1915 = Gayenna moreiae (Mello-Leitao) 1915
Monastes:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Tmarus**
„ lucasii Taczanowski 1872 = Monaeses lucasii (Taczanowski) 1872
Monocephalus:
„ castaneipes Hull 1932 = Plaesiocraerus fuscipes castaneipes Simon 1926
„ fuscipes Smith 1906 = Plaesiocraerus fuscipes (Blackwall) 1836
„ turgidus Hull 1932 = Lophocarenum turgidum (Blackwall) 1841
Monoclova (= Monclovia):
„ braunii Peckham 1902 = Tusitala barbata Peckham 1902
Montilaira:
„ heathi Chamberlin 1922 = Microneta heathi (Chamberlin) 1922
„ perplexa Chamberlin 1922 = Catabrithorax perplexus (Keyserling) 1886
„ uta Chamberlin 1922 = Catabrithorox utus (Chamberlin) 1919
Mopiopia:
„ comatula Simon 1903 = Mopiopia comatala Simon 1902
Mopsus:
„ albobarbatus Keyserling 1882 = Sandalodes albobarbatus (Keyserling) 1882
„ bipenicillatus Keyserling 1882 = Sandalodes bipenicillatus (Keyserling) 1882
Mulicymnis:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Melicymnis**
Musaeus:
„ politus Thorell 1890, 1892 = Oxytate polita (Thorell) 1890
Musagetes:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Chilobrachys**
„ decipiens Thorell 1897 = Chilobrachys flavopilosus (Simon) 1884
„ masoni Pocock 1895 = Chilobrachys stridulans (Wood Mason) 1877
„ rufofuscus Thorell 1897 = Chilobrachys andersonii (Pocock) 1895
Mutina:
„ furcifera Cambridge 1881 = Hypognatha furcifera (Cambridge) 1881
Mutusca:
„ mammosa Cambridge 1874 = Molycria mammosa (Cambridge) 1874
Mygale:
„ affinis Nicolet 1849 = Eurypelma affinis (Nicolet) 1849
„ africana Lucas 1846 = Nemesia africana (C. L. Koch) 1839
„ annulipes C. L. Koch 1842 = nicht zu deuten!
„ annulipes Taczanowski 1873 = nicht zu deuten!
„ antipodiana Walckenaer 1837 = Porrhothele antipodiana (Walckenaer) 1837
„ anthracina C. L. Koch 1842 = Eurypelma anthracinum (C. L. Koch) 1842
„ ariana Walckenaer 1837 = Cyrtocarenum cunicularium (Olivier) 1811
„ athletica C. L. Koch 1839 = nicht zu deuten!

Mygale (Forts.):
„ atra Latreille 1832 = Harpactira atra (Latreille) 1832
„ australiana Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ avicularia Latreille 1804 = Avicularia avicularia (Linné) 1758
„ avicularia C. L. Koch 1842 = ? Eurypelma rubropilosum Ausserer 1871
„ bartholomaei Latreille 1832 = Cyrtopholis bartholomaei (Latreille) 1832
„ bicolor Lucas 1859 = nicht zu deuten!
„ blondii Latreille 1806 = Theraphosa leblondi (Latreille) 1804
„ brunnea Nicolet 1849 = Tryssothele brunnea (Nicolet) 1849
„ brunnipes C. L. Koch 1842 = nicht zu deuten!
„ caementaria Latreille 1804 = Nemesia caementaria (Latreille) 1798
„ caesia C. L. Koch 1842 = Avicularia caesia (C. L. Koch) 1842
„ cafreriana Waldkenaer 1837 = Harpactira cafreriana (Waldkenaer) 1837
„ calpeiana Waldkenaer 1805 = Macrothele calpeiana (Waldkenaer) 1805
„ cancerides Latreille 1806 = Phormictopus cancerides (Latreille) 1806
„ carminans Latreille 1818, Waldkenaer 1837 = Nemesia carminans (Latreille) 1818
„ carolinensis Hentz 1842 = Ummidia (Pachylomerides) audouini (Lucas) 1835
„ cellicola Waldkenaer 1837 = Nemesia cellicola Audouin 1827
„ chilensis Molina 1810 = ? Phrixotrichus roseus (Guérin) 1838
„ chilensis Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ conformis C. L. Koch 1839 = nicht zu deuten!
„ conspersa Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ convexa C. L. Koch 1842 = Acanthoscurria convexa (C. L. Koch) 1842
„ coracina C. L. Koch 1842 = Harpactira atra (Latreille) 1832
„ cubana Waldkenaer 1837 = Eurypelma spinicrus (Latreille) 1819
„ cunicularium Olivier 1811 = Cyrtocarenum cunicularium (Olivier) 1811
„ debarrow Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ detrita C. L. Koch 1842 = Avicularia detrita (C. L. Koch) 1842
„ dewhite Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ diversipes C. L. Koch 1842 = Eurypelma diversipes (C. L. Koch) 1842
„ drassiformis C. L. Koch 1842 = nicht zu deuten!
„ elegans Blackwall 1832 = nicht zu deuten!
„ emilia White 1856 = Eurypelma emilia (White) 1856
„ erichsoni C. L. Koch 1842 = Phormictopus cancerides (Latreille) 1806
„ fasciata Latreille 1804 = Poecilotheria fasciata (Latreille) 1804
„ felina C. L. Koch 1842 = nicht zu deuten!
„ fervida C. L. Koch 1842 = nicht zu deuten!
„ fimbriata C. L. Koch 1842 = nicht zu deuten!
„ fluviatilis Hentz 1850 = Myrmekiaphila fluviatilis (Hentz) 1850
„ fodiens Waldkenaer 1825, 1837, Latreille 1829 = Cteniza sauvagesi (Rossi) 1790
„ foliata Atkinson 1886 = Myrmekiaphila fluviatilis (Hentz) 1850
„ funebra Waldkenaer 1837, C. L. Koch 1842 = Harpactira atra (Latreille) 1832
„ fusca Perty 1833, C. L. Koch 1842 = nicht zu deuten!
„ gabonensis Lucas 1858 = Heterothele gabonensis (Lucas) 1858
„ geniculata C. L. Koch 1842 = Acanthoscurria geniculata (C. L. Koch) 1842
„ gracilipes Lucas 1846 = Cyrtauchenius gracilipes (Lucas) 1846
„ gracilis Hentz 1842 = Closterochilus gracilis (Hentz) 1842
„ guianensis Waldkenaer 1837 = Ischnothele guianensis (Waldkenaer) 1837
„ hentzi Girard 1854 = Dugesiella hentzi (Girard) 1854
„ herculea C. L. Koch 1839 = nicht zu deuten!
„ hirsuta C. L. Koch 1837 = nicht zu deuten!
„ hirsutissima C. L. Koch 1842 = Avicularia avicularia (Linné) 1758
„ hirtipes C. L. Koch 1842 = ? Avicularia versicolor (Waldkenaer) 1837
„ hostilis Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ icteria C. L. Koch 1839 = Brachythele icteria (C. L. Koch) 1839
„ icteria Doleschall 1852 = ? Leptopelma transalpinum Ausserer 1871
„ incana C. L. Koch 1842 = Cyrtopholis bartholomaei (Latreille) 1832

Mygale (Forts.):
- „ javanensis Walckenaer 1837 = Selenocosmia javanensis (Walckenaer) 1837
- „ jonicum Saunders 1842 = Cyrtocarenum jonicum (Saunders) 1842
- „ klugii C. L. Koch 1842 = Lasiodora klugii (C. L. Koch) 1842
- „ laeta C. L. Koch 1842 = Avicularia laeta (C. L. Koch) 1842
- „ leblondi Latreille 1804 = Theraphosa leblondi (Latreille) 1804
- „ leporina C. L. Koch 1842 = Avicularia leporina (C. L. Koch) 1842
- „ lineata Lucas 1857 = nicht zu deuten!
- „ longitarsis Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ luctuosa Lucas 1855 = Macrothele luctuosa (Lucas) 1855
- „ lycosiformis C. L. Koch 1842 = Trechona lycosiformis (C. L. Koch) 1842
- „ macrura C. L. Koch 1842 = Diplura macrura (C. L. Koch) 1842
- „ maculata Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ mendozina Holmberg 1876 = nicht zu deuten!
- „ meridionalis Costa 1835 = Nemesia meridionalis (Costa) 1835
- „ mexicana Bellvoye 1870 = nicht zu deuten!
- „ mindanao Walckenaer 1847 = nicht zu deuten!
- „ monstrosa C. L. Koch 1839 = Selenocosmia javanensis (Walckenaer) 1837
- „ morenii Holmberg 1876 = Crypsidromus morenii (Holmberg) 1876
- „ murina Walckenaer 1837 = Ephebopus murinus (Walckenaer) 1837
- „ muritelaria Holmberg 1876 = nicht zu deuten!
- „ mutata Ausserer 1871 = nicht zu deuten!
- „ nigra Walckenaer 1837 = Homoeomma nigrum (Walckenaer) 1837
- „ nitidulans Latreille 1804 = Ummidia (Pachylomerides) nitidulans (Fabricius) 1787
- „ notasiana Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ occidentalis Lucas 1858 = myostola occidentalis (Lucas) 1858
- „ ochracea Perty 1833 = Eurypelma ochraceum (Perty) 1833
- „ olivacea C. L. Koch 1842 = Chaetopelma olivaceum (C. L. Koch) 1842
- „ pampeana Holmberg 1876 = nicht zu deuten!
- „ plumipes C. L. Koch 1842 = Tapinauchenius plumipes (C. L. Koch) 1842
- „ pumilio Perty 1833, Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ pygmaea Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ quoyi Lucas 1835 = ? Porrhothele antipodiana (Walckenaer) 1837
- „ radialis Cambridge 1869 = Scalidognathus radialis (Cambridge) 1869
- „ reichii C. L. Koch 1842 = nicht zu deuten!
- „ rosea Walckenaer 1837, C. L. Koch 1842 = ? Grammostola spatulata (F. Cambridge) 1897
- „ rosea Guérin 1838 = Phrixotrichus roseus (Guérin) 1838
- „ rubiginosa Nicolet 1849 = ? Grammostola spatulata (F. Cambridge) 1897
- „ rufidens C. L. Koch 1842 = nicht zu deuten!
- „ saeva Walckenaer 1837 = Lasiodora saeva (Walckenaer) 1837
- „ sancti-vincenti Walckenaer 1837 = Tapinauchenius sanct-vincenti (Walckenaer) 1837
- „ sauvagesi Latreille 1798 = Cteniza sauvagesi (Rossi) 1790
- „ scoparia C. L. Koch 1842 = Avicularia avicularia (Linné) 1758
- „ seladonia C. L. Koch 1842 = Avicularia seladonia (C. L. Koch) 1842
- „ sicula Latreille 1831, Walckenaer 1837 = ? Amblyocarenum doleschalli (Ausserer) 1871
- „ solitaria Risso 1826 = nicht zu deuten!
- „ solstitialis Hentz 1842 = Ummidia (Pachylomerides) audouini (Lucas) 1835
- „ spinicrus Latreille 1819 = Eurypelma spinicrus (Latreille) 1819
- „ splendens Nicolet 1849 = Tryssothele splendens (Nicolet) 1849
- „ stridulans Wood Mason 1877 = Chilobrachys stridulans (Wood Mason) 1877
- „ subcalpeiana Nicolet 1849 = Tryssothele subcalpeiana (Nicolet) 1849
- „ testacea C. L. Koch 1842 = Avicularia avicularia (Linné) 1758
- „ truncata Hentz 1841, 1868 = Cyclocosmia truncata (Hentz) 1841
- „ unicolor Hentz 1842 = Antrodiaetus unicolor (Hentz) 1842

Mygale (Forts.):
„ ursina C. L. Koch 1842 = nicht zu deuten!
„ valenciana Walckenaer 1837 = Ischnocolus valentinus (Dufour) 1820
„ valentinum Dufour 1820, Latreille 1829 = Ischnocolus valentinus (Dufour) 1820
„ venosa Latreille 1830 = Trechona venosa (Latreille) 1830
„ versicolor Walckenaer 1837 = Avicularia versicolor (Walckenaer) 1837
„ versicolor C. L. Koch 1842 = Homoeomma nigrum (Walckenaer) 1837
„ villosa Walckenaer 1837 = Harpactira cafreriana (Walckenaer) 1837
„ walckenaerii Perty 1833 = Avicularia walckenaerii (Perty) 1833
„ zebra Walckenaer 1835 = Trechona venosa (Latreille) 1830

Mygalodonta:
„ caementaria Simon 1864 = Nemesia caementaria (Latreille) 1798
„ fodiens Simon 1864 = Cteniza sauvagesi (Rossi) 1790
„ sicula Simon 1864 = ? Amblyocarenum doleschalli (Ausserer) 1871

Mygaloides:
„ nubila Nicolet 1849 = nicht zu deuten!

Mynthes:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Rubrius**

Myostola:
„ trispinifera Strand 1919 = ? Myostola occidentalis (Lucas) 1858

Myrmarachne:
„ angustiformis Simon 1901 = Myrmarachne angusta (Peckham) 1892
„ bellicosa Simon 1901 = Myrmarachne maxillosa (C. L. Koch) 1846
„ championi Simon 1901, Petrunkevitch 1911 = Myrmarachne armata (Peckham) 1892
„ formicaria tyrolensis Lessert 1910 = Myrmarachne jobloti tyrolensis (C. L. Koch) 1846
„ lurida Simon 1901 = Myrmarachne manducator (Westwood) 1831
„ myrmeciaeformis Reimoser 1919 = Myrmarachne myrmicaeformis (Lucas) 1870
„ simplex Simon 1901 = Myrmarachne simplexella Roewer 1951

Myrmecia:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Myrmecium**
„ caliginosa Walckenaer 1837 = ? Peckhamia americana (Peckham) 1892
„ fulva Walckenaer 1837, 1841 = Myrmecium rufum Latreille 1824
„ lunata Walckenaer 1837 = ? Synemosyna formica Hentz 1846
„ melanocephala Walckenaer 1841 = Myrmarachne melanocephala Mc Leay 1839
„ nigra Perty 1833 et sequ. = Sphecotypus niger (Perty) 1833
„ rubra Walckenaer 1837 = ? Synemosyna formica Hentz 1846
„ xanthopus C. L. Koch 1842 = Myrmecium vertebratum (Walckenaer) 1837

Myrmeciaphila:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Myrmekiaphila**

Myrmecium:
„ caliginosum Simon 1897, Mello-Leitao 1932 = Peckhamia americana (Peckham) 1892
„ lunatum Simon 1897, Mello-Leitao 1932 = ? Synemosyna formica Hentz 1846
„ mendax Mello-Leitao 1928 = Myrmecium rufum (Latreille) 1824
„ rubrum Mello-Leitao 1932 = ? Synemosyna formica Hentz 1846
„ velutinum Simon 1896 = Myrmecium bifasciatum (Taczanowski) 1874

Myrmecisca:
„ birmanica Thorell 1897 = Sphecotypus birmanicus (Thorell) 1897

Myrmecobius:
„ luederwaldti Mello-Leitao 1923 = Attacobius luederwaldti (Mello-Leitao) 1925

Myro:
„ backhauseni Simon 1896 = Macrobunus backhauseni (Simon) 1896
„ chilensis Simon 1888 = Macrobunus chilensis (Simon) 1888
„ hamiltoni Hogg 1909, Rainbow 1917 = Myro kerguelenensis Cambridge 1876
„ kerguelensis Enderlein 1903 = Myro kerguelenensis Cambridge 1876

Myropsis:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Macrobunus**
Myrtale:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Paramigas**
Mysmena:
„ bulbifera Banks 1896, 1904, Barrows 1919 = Mimognatha foxi (Mc Cook) 1893
Nagaina:
„ olivacea Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
Namopsilus:
„ pletus Chamberlin 1920 = Cybaeus tardatus (Chamberlin) 1920
Natta:
„ horizontalis Karsch 1879, Simon 1903 = nicht zu deuten!
Neaetha:
„ amanicola Strand 1907 = ? Neaetha ravoisiaei (Lucas) 1846
Nealces:
„ caligatus Simon 1900 = Boethus caligatus (Simon) 1900
„ striatipes Simon 1900 = Boethus striatipes (Simon) 1900
Nebridia:
„ borealis Kaston 1945 = Hasarius adansonii (Audouin) 1827
Neera:
„ membrosa Simon 1876 = Neaetha membrosa (Simon) 1868
Nematogmus:
„ dentimanus Simon 1886 = Sphocozone dentimana (Simon) 1886
„ drassoides Banks 1910 = Wubana drassoides (Emerton) 1882
„ florens Simon 1894 = Hypselistes florens (Cambridge) 1875
„ obscurus Chyzer & Kulczynski 1894 et sequ. = Snephalocotes obscurus (Blackwall) 1834
„ pacificus Banks 1910 = Wubana pacifica (Banks) 1896
Nemesia:
„ alpigrada Simon 1873 = Nemesia carminans (Latreille) 1818
„ anomala Bertkau 1880 = Hermacha anomala (Bertkau) 1880
„ caementaria Cambridge 1874 ♀ = Nemesia carminans (Latreille) 1818
„ concolor Simon 1873 = Cratorrhagus concolor (Simon) 1873
„ eleanora Cambridge 1874 ♂ = Nemesia carminans (Latreille) 1818
„ fodiens Carruccio 1871 = Cteniza sauvagesi (Rossi) 1790
„ fossor Bertkau 1880 = Hermacha fossor (Bertkau) 1880
„ gilliesi Cambridge 1877 = Arbanitis gilliesi (Cambridge) 1877
„ kirkii Urquhart 1893 = Arbanitis kirkii (Urquhart) 1893
„ meridionalis Cambridge 1873 = Nemesia manderstjernae Ausserer 1871
„ meridionalis Simon 1873 = Nemesia corsica Simon 1914
„ moggridgei Cambridge 1874 = Nemesia carminans (Latreille) 1818
„ sauvagei Simon 1892 = Nemesia caementaria (Latreille) 1798
„ suffusa Cambridge 1874 = Nemesia dubia Cambridge 1874
„ tubifex Pocock 1889 = Anemesia tubifex (Pocock) 1889
Nemesiothele:
„ denieri Drenski 1937 = Nemesia denieri Simon 1916
Nemoscolus:
„ turrida Gerhardt & Kästner 1938 = Nemoscolus turricola Berland 1933
Neoantistea:
„ radula Kaston 1948 = Neoantistea riparia radula (Emerton) 1889
Neodiplura:
„ jelskii F. Cambridge 1896 = Uruchus jelskii (F. Cambridge) 1896
Neon:
„ pictus Kulczynski 1891, Bösenberg 1903, Denis 1939 = Neon levis (Simon) 1871
„ pompatus Peckham 1893, 1895 = Oningis pompatus (Peckham) 1893

Neophanes:
„ pallidus Marx 1891, Banks 1892 = Lathys pallida (Marx) 1891
Neoscona:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Araneus** (= **Aranea**)
„ parallela Franganillo 1934 = nicht zu deuten!
„ volucripes F. Cambridge 1904, Petrunkevitch 1930 = Araneus nauticus (L. Koch) 1875
Neosconella:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Araneus** (= **Aranea**)
„ guttata F. Cambridge 1904 = Araneus gratuitus Petrunkevitch 1911
Neosparassus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Olios**
Neothereutes:
„ darwini Holmberg 1883 = Senoculus darwini (Holmberg) 1883
Neottiura:
„ bimaculata Menge 1868 = Theridion bimaculatum (Linné) 1767
Neozimiris:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Zimiris**
Nephila:
„ amoenula Gerstäcker 1873 = Nephila sumptuosa Gerstäcker 1873
„ angustata Stoliczka 1869 = Leucauge decorata (Blackwall) 1864
„ annulata Thorell 1859, 1868 = Nephila senegalensis annulata (Thorell) 1859
„ ardentipes Butler 1876, 1878 = Nephila inaurata (Walckenaer) 1841
„ argentata Urquhart 1886 = Leucauge dromedaria (Thorell) 1881
„ argyrotoxa Gerstäcker 1873 = Nephila inaurata madagascariensis (Vinson) 1863
„ aubryi Brito Capello 1866 = Nephila senegalensis (Walckenaer) 1841
„ aurelia Blackwall 1867 = Argyope trifasciata (Forskal) 1775
„ aurosa L. Koch 1871 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
„ baculigera Thorell 1899 = Nephila constricta Karsch 1879
„ baeri Simon 1877 = Nephila antipodiana (Walckenaer) 1841
„ bennetti Cambridge 1898 = Nephila sumptuosa Gerstäcker 1873
„ borbonica mossambicensis Karsch 1878 = Nephilengys cruentata (Fabricius) 1775
„ bragantina Brito Capello 1867, Bertkau 1880 = Nephila senegalensis bragantina (Brito Capello) 1867
„ brasiliensis Petrunkevitch 1911 = Nephilengys cruentata (Fabricius) 1775
„ chrysogaster Cambridge 1871 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
„ concolor Mc Cook 1893 = Nephila clavipes (Linné) 1767
„ cornuta F. Cambridge 1901 = Nephila clavipes cornuta (Pallas) 1772
„ cothurnata Gerstäcker 1873 = Nephila inaurata madagascariensis (Vinson) 1863
„ cruentata Simon 1887, Dahl 1912 = Nephilengys cruentata (Fabricius) 1775
„ ruentata Lenz 1891 = Nephilengys cruentata livida (Vinson) 1863
„ cuminghamii King 1827 = Nephila plumipes (Latreille) 1804
„ dasycnemis Gerstäcker 1873 = Nephila fenestrata venusta (Blackwall) 1865
„ dolabella Thorell 1899 = Nephila fenestrata venusta (Blackwall) 1865
„ edwardsii Rainbow 1895 = Nephila plumipes (Latreille) 1804
„ eremiana Hogg 1896 = Nephila edulis (Labillardière) 1799
„ fasciata C. L. Koch 1845 = Argyope brünnichii (Scopoli) 1772
„ fasciculata C. L. Koch 1839 = Nephila clavipes fasciculata (De Geer) 1778
„ femoralis Pocock 1899, Simon 1903, Strand 1906 = Nephila turneri Blackwall 1833
„ flagellans L. Koch 1871 = Nephila plumipes (Latreille) 1804
„ fletcheri Rainbow 1895 = Nephila plumipes (Latreille) 1804

Nephila (Forts.):
- „ fuelleborni Dahl 1912 = Nephila fenestrata venusta (Blackwall) 1865
- „ fuscipes C. L. Koch 1839, L. Koch 1871, Thorell 1878 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
- „ genualis Gerstäcker 1873 = Nephilengys cruentata (Fabricius) 1775
- „ grayii Blackwall 1865 = Nephila senegalensis (Walckenaer) 1841
- „ holmerae Thorell 1881 = Nephila antipodiana (Walckenaer) 1841
- „ hymenaea Gerstäcker 1873, Karsch 1886 = Nephila senegalensis keyserlingii (Blackwall) 1865
- „ imperialis Doleschall 1857, 1859, Dahl 1912, Strand 1911, 1916 = Nephila laurinae Thorell 1881
- „ imperatrix L. Koch 1871 = Nephila edulis (Labillardière) 1799
- „ instigans Butler 1876, 1878 = Nephilengys cruentata borbonica (Vinson) 1863
- „ insularis Keyserling 1887 = Nephila plumipes (Latreille) 1804
- „ jalorensis Simon 1901 = Nephila maculata (Fabricius) 1793
- „ janeira Walckenaer 1841 = Nephila clavipes vespucea (Walckenaer) 1841
- „ keyserlingii Blackwall 1865 = Nephila senegalensis keyserlingii (Blackwall) 1865
- „ kuhlii Thorell 1887, Pocock 1900 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
- „ labillardieri Thorell 1875 = Nephila plumipes (Latreille) 1804
- „ limbata Thorell 1898 = Nephila clavata L. Koch 1878
- „ lineata Thorell 1859 = Nephila senegalensis annulata (Thorell) 1859
- „ lucasi Simon 1887 = Nephila constricta Karsch 1879
- „ maculata Leach 1815 et sequ. = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
- „ madagascariensis Thorell 1875, Bonnet 1929 = Nephila inaurata madagascariensis (Vinson) 1863
- „ malabarensis Simon 1894, Pocock 1900 et sequ. = Nephilengys malabarensis (Walckenaer) 1841
- „ nigra Strand 1906 = Nephila inaurata (Walckenaer) 1841
- „ nigritarsis L. Koch 1871 = Nephila plumipes (Latreille) 1804
- „ nyikae Pocock 1898 = Nephila senegalensis nyikae (Pocock) 1898
- „ obnubila Simon 1906 = Nephila clavata L. Koch 1878
- „ obsoleta Gerstäcker 1873 = Nephila fenestrata venusta (Blackwall) 1865
- „ ornata Adams 1847 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
- „ ornata Rainbow 1896 = Nephila plumipes (Latreille) 1804
- „ pecuniosa L. Koch 1871 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
- „ picta Rainbow 1896 = Nephila plumipes (Latreille) 1804
- „ piepersii Thorell 1877, Merian 1911 = Nephila vitiana (Walckenaer) 1847
- „ pilipes Pavesi 1895, Pocock 1899, Simon 1907 = Nephila fenestrata venusta (Blackwall) 1865
- „ pilipes fenestrata Strand 1907 = Nephila fenestrata Thorell 1859
- „ plumipes C. L. Koch 1839 = Nephila clavipes (Linné) 1767
- „ procera L. Koch 1871 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
- „ prolixa L. Koch 1871, Strand 1914 = Nephila plumipes (Latreille) 1804
- „ relicina Keyserling 1887 = Araneus relicinus (Keyserling) 1887
- „ riverai Brethes 1918 = Nephila clavipes vespucea (Walckenaer) 1841
- „ rivulata Cambridge 1871 = Nephilengys malabarensis (Walckenaer) 1841
- „ schweinfurthi Simon 1890 = Nephila sumptuosa Gerstäcker 1873
- „ senegalensis calabarensis Simon 1908 = Nephila senegalensis (Walckenaer) 1841
- „ sexpunctata Giebel 1867 = Nephila clavipes vespucea (Walckenaer) 1841
- „ submaculata Strand 1906 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
- „ sulphurea Taczanowski 1873 = Nephila clavipes cornuta (Pallas) 1772
- „ sulphurosa L. Koch 1871 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
- „ tenuipes L. Koch 1871 = Nephila pilipes (Fabricius) 1793
- „ transalpina C. L. Koch 1839 = Argyope brünnichii (Scopoli) 1772
- „ transvaalica Pocock 1892 = Nephila senegalensis annulata (Thorell) 1859
- „ urna Hasselt 1882 = Nephilengys malabarensis (Walckenaer) 1841

Nephila (Forts.):
- „ venosa L. Koch 1867, 1871, Thorell 1881, Hogg 1914 = Nephila plumipes (Latreille) 1804
- „ ventricosa Rainbow 1895 = Nephila plumipes (Latreille) 1804
- „ venusta Blackwall 1865 = Nephila fenestrata venusta (Blackwall) 1865
- „ vespucea Walckenaer 1841 = Nephila clavipes vespucea (Walckenaer) 1841
- „ vestita C. L. Koch 1839 = Argyope aurantia (Lucas) 1833
- „ victorialis L. Koch 1871 = Nephila plumipes (Latreille) 1804
- „ vittata Keyserling 1863 = Nephila turneri Blackwall 1833
- „ walckenaerii Thorell 1877 = Nephila pilipes walckenaerii (Doleschall) 1857
- „ wallacei Thorell 1877 = Nephila vitiana (Walckenaer) 1847
- „ wilderi Mc Cook 1893 = Nephila clavipes (Linné) 1767
- „ windhukensis Strand 1906, 1907 = Nephila senegalensis annulata (Thorell) 1859
- „ wistariana Mc Cook 1893 = Nephila clavipes (Linné) 1767

Nephilengys:
- „ hofmanni L. Koch 1872 = Nephilengys malabarensis (Walckenaer) 1841
- „ rainbowi Hogg 1898 = Nephilengys malabarensis (Walckenaer) 1841
- „ schmeltzii L. Koch 1872 = Nephilengys malabarensis (Walckenaer) 1841

Neriene:
- „ abnormis Blackwall 1841, 1864 = Oreonetides abnormis (Blackwall) 1841
- „ affinis Blackwall 1855, 1864, Thorell 1873, Cambridge 1879 = Micryphantes affinis (Blackwall) 1855
- „ agrestis Blackwall 1853, 1864, Cambridge 1881, 1882, Chyzer & Kulczynski 1894 = Oedothorax agrestis (Blackwall) 1853
- „ agrestis Cambridge 1879 = Oedothorax fuscus (Blackwall) 1834
- „ albipunctata Cambridge 1873 = Enoplognatha thoracica (Hahn) 1831
- „ analis Simon 1894 = Oedothorax analis (Simon) 1894
- „ anomala Cambridge 1863, 1873 = Agyneta subtilis (Cambridge) 1863
- „ aperta Cambridge 1870, 1879 = Micrargus (Blaniargus) herbigrada (Blackwall) 1854
- „ apicata Blackwall 1850, 1864, Cambridge 1879, Chyzer & Kulczynski 1894 = Oedothorax apicatus (Blackwall) 1850
- „ arcuata Tullgren 1901 = Oedothorax arcuatus (Tullgren) 1901
- „ arundineti Cambridge 1870 = Ctenium (Robertus) arundineti (Cambridge) 1870
- „ aspera Cambridge 1870, 1879 = Ctenium (Robertus) asper (Cambridge) 1870
- „ atra Cambridge 1873, 1909 = Erigone atra Blackwall 1833
- „ avida Blackwall 1844, 1864 = nicht zu deuten!
- „ barbata Cambridge 1879 = Porrhomma pygmaeum (Blackwall) 1834
- „ bicolor Blackwall 1833, 1864 = Centromerita bicolor (Blackwall) 1833
- „ bicuspis Cambridge 1863, 1873, 1879 = Panamomops sulcifrons (Wider) 1834
- „ bifida Cambridge 1863, 1873 = Gonatium rubens (Blackwall) 1833
- „ bisignata Banks 1909 = Linyphia bisignata (Banks) 1909
- „ bituberculata Blackwall 1864, Cambridge 1879 = Hypomma bituberculata (Wider) 1834
- „ campbelli Cambridge 1881 = Aprolagus lugubris (Blackwall) 1834
- „ carinata Blackwall 1864, Cambridge 1881 = nicht zu deuten!
- „ clara Cambridge 1873, 1881 = Cornicularia cuspidata (Blackwall) 1833
- „ clarkii Cambridge 1870 = Ctenium (Robertus) arundineti (Cambridge) 1870
- „ clathrata Banks 1910, Comstock 1912 = Linyphia clathrata Sundevall 1830
- „ coccinea Comstock 1912 = Linyphia coccinea (Keyserling) 1886
- „ conigera Cambridge 1863, 1873, 1879 = Agyneta conigera (Cambridge) 1863
- „ convexa F. Cambridge 1902 = Linyphia convexana Roewer 1942
- „ cornigera Blackwall 1856, 1864, Cambridge 1881 = Sintula cornigera (Blackwall) 1856
- „ cornuta Blackwall 1833, 1864, Cambridge 1879 = Hypomma cornutum (Blackwall) 1833
- „ coronata Simon 1894 = Oedothorax coronatus (Simon) 1894

Neriene (Forts.):

„ corticea Cambridge 1862 = Styloctetor penicillatus (Westring) 1851
„ curtipes Cambridge 1881 = Oedothorax curtipes (Cambridge) 1875
„ decemoculata Simon 1894 = Dismodicus decemoculatus (Emerton) 1882
„ decora Cambridge 1870, 1881, 1885 = Agyneta decora (Cambridge) 1870
„ demissa Cambridge 1881 = Centromerus dilutus (Cambridge) 1875
„ dentata Blackwall 1864, Cambridge 1879 = Gnathonarium dentatum (Wider) 1834
„ dentipalpis Cambridge 1863, 1873, 1879 = Erigone dentipalpis (Wider) 1834
„ digitata Cambridge 1872 = Typhochraestus digitatus (Cambridge) 1872
„ diluta Cambridge 1881 = Centromerus dilutus (Cambridge) 1875
„ dogmatica Chamberlin 1925 = Linyphia digna Keyserling 1886
„ dolosa Cambridge 1879 = Tapinocyba dolosa (Cambridge) 1879
„ douglasii Cambridge 1881 = Oreonetides abnormis (Blackwall) 1841
„ dubia Blackwall 1841, 1852, 1864 = ? Ctenium (Robertus) arundineti (Cambridge) 1870
„ duplicata F. Cambridge 1902 = Linyphia duplicata (F. Cambridge) 1902
„ elegans F. Cambridge 1902 = Linyphia elegantula Roewer 1942
„ elevata Cambridge 1862 = Oedothorax retusus (Westring) 1851
„ emarginata F. Cambridge 1902 = Linyphia emarginata (F. Cambridge) 1902
„ errans Blackwall 1841, 1864 = Porrhomma errans (Blackwall) 1841
„ esperanzae Tullgren 1901 = Oedothorax esperanzae (Tullgren) 1901
„ excisa Cambridge 1870, 1881 = Hilaira excisa (Cambridge) 1870
„ exhilarans Cambridge 1879 = Micrargus (Blaniargus) herbigradus (Blackwall) 1854
„ festinans Cambridge 1885 = Agyneta conigera (Cambridge) 1863
„ flavipes Blackwall 1864 = Meioneta rurestris (C. L. Koch) 1836
„ formidabilis Cambridge 1870 = Lepthorrhoptrum huthwaitii (Cambridge) 1861
„ fuegiana Simon 1902 = Oedothorax fuegianus (Simon) 1902
„ fugax Cambridge 1870, 1879 = Wideria fugax (Cambridge) 1870
„ furva Blackwall 1836, 1841, 1864 = nicht zu deuten!
„ fusca Blackwall 1834 et sequ. = Oedothorax fuscus (Blackwall) 1834
„ fuscipalpis Cambridge 1879 = Meioneta fuscipalpus (C. L. Koch) 1836
„ gamma F. Cambridge 1902 = Linyphia gamma (F. Cambridge) 1902
„ gibbifera Kulczynski 1894 = Oedothorax gibbiferus (Kulczynski) 1882
„ gibbosa Blackwall 1841, 1864, Cambridge 1873, 1879 = Oedothorax gibbosus (Blackwall) 1841
„ gracilis Blackwall 1841, 1864 = Meioneta fuscipalpus (C. L. Koch) 1836
„ graminicola Blackwall 1852, 1864, Cambridge 1879 = Micryphantes graminicola (C. L. Koch) 1833
„ graminicolens Blackwall 1843 = Stemonyphantes lineatus (Linné) 1758
„ henkingi Dahl 1886, 1912 = Oedothorax henkingi (Dahl) 1883
„ herbigrada Blackwall 1854, 1864, Cambridge 1879 = Micrargus (Blaniargus) herbigradus (Blackwall) 1854
„ hispida Cambridge 1871 = Enoplognatha thoracica (Hahn) 1831
„ huthwaitii Cambridge 1861, 1881, Blackwall 1864 = Leptorrhoptrum huthwaitii (Cambridge) 1861
„ improba Cambridge 1879, 1881 = Entelecara erythropus (Westring) 1851
„ incisa Cambridge 1870, 1881 = Prosopotheca incisa (Cambridge) 1870
„ incompta Cambridge 1872 = Micrargus (Blaniargus) incomptus (Cambridge) 1872
„ indecora Cambridge 1893 = Sintula cornigera (Blackwall) 1856
„ inerrans Cambridge 1885 ♂ = Trichoncus inerrans (Cambridge) 1885
„ inerrans Cambridge 1885 ♀ = Pocadicnemis pumila (Blackwall) 1841
„ innotabilis Cambridge 1863, 1873, 1879 = Syedrula innotabilis (Cambridge) 1863
„ insolens Simon 1894 = Oedothorax insolens (Simon) 1894
„ iracunda Cambridge 1879 = Microneta iracunda (Cambridge) 1879
„ isabellina Cambridge 1879 = Gonatium rubellum (Blackwall) 1841

Neriene (Forts.):

„ jugulans Cambridge 1879 = Microneta viaria (Blackwall) 1841
„ keyserlingii Cambridge 1879 = Donacochara speciosa (Thorell) 1875
„ lambda F. Cambridge 1902 = Linyphia lambda (F. Cambridge) 1902
„ lapidicola Cambridge 1881 = Porrhomma rufipes (Blackwall) 1833
„ latebricola Cambridge 1870, 1879 = Gongylidiellum compar (Westring) 1862
„ laudata Cambridge 1882 = Nothocyba laudata (Cambridge) 1882
„ limbata F. Cambridge 1902 = Linyphia limbata (F. Cambridge) 1902
„ linguatula F. Cambridge 1902 = Limyphia linguatula (F. Cambridge) 1902
„ livida Blackwall 1836 = Ctenium (Robertus) lividum (Blackwall) 1836
„ longimana Cambridge 1879 = Tiso vagans Blackwall 1834
„ longipalpalis Blackwall 1864 = Erigone atra (Blackwall) 1833
„ longipalpis Cambridge 1873 = Erigone longipalpis (Sundevall) 1830
„ longispina F. Cambridge 1902 = Linyphia longispina (F. Cambridge) 1902
„ lucida Cambridge 1873, 1879, ♂ = Anacotyle stativa (Simon) 1881
„ lucida Cambridge 1873, 1879, ♀ = Diplocephalus cristatus (Blackwall) 1833
„ lugubris Blackwall 1834, 1852, 1864 = Aprolagus lugubris (Blackwall) 1834
„ maculata Banks 1910 = Linyphia maculata (Emerton) 1908
„ maculosa Banks 1909 = Linyphia maculosa (Banks) 1909
„ marginata Blackwall 1833, 1834, 1864 = Linyphia clathrata Sundevall 1830
„ matei Tullgren 1901, Simon 1902 = Oedothorax matei (Keyserling) 1886
„ michaelseni Simon 1902 = Oedothorax michaelseni (Simon) 1902
„ minima Cambridge 1881 = nicht zu deuten!
„ mollis Cambridge 1870, 1879 = Aprolagus mollis (Cambridge) 1870
„ montana Blackwall 1856, 1864, Cambridge 1881 = Oedothorax montanus (Blackwall) 1856
„ montevidensis Keyserling 1877 = Oedothorax montevidensis (Keyserling) 1877
„ montifera Simon 1894 = Oedothorax montiferus (Emerton) 1882
„ morula Cambridge 1873 ♂, Cambridge 1912 ♂ = Rhaebothorax morulus (Cambridge) 1873
„ morula Cambridge 1873, ♀ = Meioneta gulosa (L. Koch) 1869
„ munda Blackwall 1841, 1864 = Gongylidium rufipes (Linné) 1758
„ mystica Cambridge 1879, 1881 = Agyneta conigera (Cambridge) 1863
„ nefaria Cambridge 1879, 1881 = Microneta nefaria (Cambridge) 1879
„ neglecta Cambridge 1870 = Ctenium (Robertus) neglectum (Cambridge) 1870
„ nigra Blackwall 1834, 1864, Cambridge 1879 = Dicymbium nigrum (Blackwall) 1834
„ nigriceps Cambridge 1875, 1879 = Tigellinus furcillatus (Menge) 1871
„ nigrita F. Cambridge 1902 = Linyphia nigrita (F. Cambridge) 1902
„ nudipalpis Cambridge 1873 = Trachynella nudipalpis (Westring) 1851
„ octopunctata Chamberlin & Ivie 1936 = Linyphia octopunctata (Chamberlin & Ivie) 1936
„ pallida F. Cambridge 1902 = Linyphia pallida (F. Cambridge) 1902
„ pallidula Blackwall 1864 = nicht zu deuten!
„ pallipes Cambridge 1870, 1879 = Porrhomma oblitum (Cambridge) 1870
„ parva Blackwall 1841, 1864 = Gongylidiellum parvum (Blackwall) 1841
„ pascalis Cambridge 1873 = Erigone longipalpis (Sundevall) 1830
„ pavitans Cambridge 1873, 1881 = Cornicularia karpinskii (Cambridge) 1873
„ penicillata Cambridge 1873, 1879 = Styloctetor penicillatus (Westring) 1851
„ pholcommoides Cambridge 1881 = Syedra gracilis (Menge) 1869
„ pictonensis Simon 1902 = Oedothorax pictonensis (Simon) 1902
„ pigra Blackwall 1862 = Erigone vagans Audouin 1827
„ pilosa Blackwall 1864 = nicht zu deuten!
„ postica Banks 1909 = Linyphia postica (Banks) 1909
„ promiscua Cambridge 1873 = Erigone promiscua (Cambridge) 1873
„ pudens Cambridge 1873, 1881 = Wideria capito (Westring) 1862
„ pulla Blackwall 1841, 1864 = nicht zu deuten!

Neriene (Forts.):
- „ pygmaea Blackwall 1834, Cambridge 1881 = Porrhomma pygmaeum (Blackwall) 1834
- „ pygmaea Cambridge 1893 = Minyriolus pusillus (Wider) 1834
- „ rasa Cambridge 1879 = Porrhomma rasum (Cambridge) 1879
- „ redacta Chamberlin 1925 = Oedothorax redactus (Chamberlin) 1925
- „ reproba Cambridge 1879, 1881, 1885 = Halorates reprobus (Cambridge) 1879
- „ retusa Cambridge 1873, 1879, Dahl 1886, Chyzer & Kulczynski 1894 = Oedothorax retusus (Westring) 1851
- „ romana Cambridge 1872 = Styloctetor romanus (Cambridge) 1872
- „ rubella Blackwall 1841 = Gonatium rubellum (Blackwall) 1841
- „ rubens Blackwall 1833, 1864, Cambridge = Gonatium rubens (Blackwall) 1833
- „ rubripes Blackwall 1836, 1864 = Macrargus rufus (Wider) 1834
- „ rudis Cambridge 1879, 1881 = Hilaira montigena (L. Koch) 1872
- „ rufa Cambridge 1879 = Macrargus rufus (Wider) 1834
- „ rufipes Blackwall 1833, 1864 = Porrhomma rufipes (Blackwall) 1833
- „ rufipes Cambridge 1879 = Gongylidium rufipes (Linné) 1758
- „ rustica Cambridge 1881 = Aprolagus lugubris (Blackwall) 1834
- „ saxatilis Blackwall 1844, 1864, Cambridge 1879 = Aprolagus lugubris (Blackwall) 1834
- „ sila Cambridge 1872 = Mecopisthes silus (Cambridge) 1872
- „ simplicata F. Cambridge 1902 = Linyphia simplicata (F. Cambridge) 1902
- „ speciosa Hasselt 1885 = Donacochara speciosa (Thorell) 1875
- „ spinifera Simon 1894 = Souessa spinifera (Cambridge) 1874
- „ sublimis Cambridge 1875, 1881 = Meioneta gulosa (L. Koch) 1869
- „ subtilis Cambridge 1863, 1873, 1879 = Agyneta subtilis (Cambridge) 1863
- „ sulcata Blackwall 1844, 1864 = nicht zu deuten!
- „ sundevallii Cambridge 1870, 1879 = Maso sundevallii (Westring) 1851
- „ sylvatica Blackwall 1841, 1864, Cambridge 1873, 1879 = Centromerus sylvaticus (Blackwall) 1841
- „ tarsalis Hasselt 1885 = Oedothorax tarsalis (Thorell) 1875
- „ tibialis Blackwall 1836, 1864, Cambridge 1881 = Dicymbium tibiale (Blackwall) 1836
- „ timida Blackwall 1864 = nicht zu deuten!
- „ trifalcata F. Cambridge 1902 = Linyphia trifalcata (F. Cambridge) 1902
- „ trilineata Blackwall 1843, 1864 = Stemonyphantes lineatus (Linné) 1758
- „ tuberosa Blackwall 1841, 1864, Cambridge 1879 = Oedothorax tuberosus (Blackwall) 1841
- „ uncata Cambridge 1873, 1881 = Hilaira uncata (Cambridge) 1873
- „ vagans Blackwall 1834, 1864 = Tiso vagans (Blackwall) 1834
- „ variabilis Banks 1892, 1910 = Linyphia pusilla Sundevall 1830
- „ variegata Blackwall 1841, 1864, Cambridge 1879 = Poeciloneta variegata (Blackwall) 1841
- „ viaria Blackwall 1841, 1864, Cambridge 1879 = Micronetа viaria (Blackwall) 1841
- „ vigilax Blackwall 1853, 1864, Cambridge 1879 = Cornicularia vigilax (Blackwall) 1853
- „ viva Cambridge 1881 = Gongylidiellum parvum (Blackwall) 1841

Nesis:
- „ nigropunctatus Cambridge 1883 = Phaenopoma nigropunctata (Cambridge) 1883

Nesticus:
- „ affinis Kulczynski 1894 = Nesticus cellulanus affinis (Kulczynski) 1894
- „ eremita Simon 1879, 1929, Lessert 1906, 1910 = Nesticus speluncarum Pavesi 1873
- „ jonescui Simon 1914 = Nesticus biroi Kulczynski 1895
- „ noctivaga Simon 1913 = Nesticus cellulanus noctivagus (Simon) 1913
- „ strasseri Roewer 1931 = Nesticus speluncarum Pavesi 1873
- „ tenebricola Szombathy 1917 = Nesticus fodinarum Kulczynski 1894
- „ unicolor Simon 1895 = nom. nud.

Nicthyphantes:
„ microphthalmus Joseph 1881 = Troglohyphantes polyophthalmus Joseph 1881
Nidivalvata:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Brachybothrium**
Nilacantha:
„ cockwelli Simon 1901 = Nilakantha cockerelli Peckham 1901
Nilus:
„ camerunensis Lessert 1916 = Charminus camerunensis Thorell 1899
„ elegans Simon 1898 = Nilus kochi (Roewer) 1951
Nodocion:
„ zelotoides Chamberlin 1936 = Nodocion chamberlini Roewer 1951
Nops:
„ sternalis Banks 1898 = Tarsonops sternalis (Banks) 1898
Notionella:
„ interpres Banks 1905 = Ceratinopsis interpres (Cambridge) 1874
Notioscopus:
„ curvitarsis Soerensen 1898 = Hilaira vexatrix (Cambridge) 1877
„ faustus Hull 1932 = Rhaebothorax faustus (Cambridge) 1900
„ paganus Hull 1932 = Asthenargus paganus (Simon) 1914
Notocentria:
„ sexspinosa Thorell 1894 = Ordgarius sexspinosus (Thorell) 1894
Nuctobia:
„ acalypha Simon 1864 = Mangora acalypha (Walckenaer) 1802
„ albimaculata Simon 1864 = Zilla diodia (Walckenaer) 1802
„ albomaculata Simon 1864 = Titanoeca albomaculata (Lucas) 1846
„ antriada Simon 1864 = Meta merianae (Scopoli) 1763
„ atrica Simon 1864 = Zygiella calophylla (Walckenaer) 1802
„ callophylla Simon 1864 = Zygiella calophylla (Walckenaer) 1802
„ diodia Simon 1864 = Zilla diodia (Walckenaer) 1802
„ fusca Simon 1864 = Meta merianae (Scopoli) 1763
„ genistae Simon 1864 = Mangora acalypha (Walckenaer) 1802
„ inclinata Simon 1864 = Meta reticulata (Linné) 1758, jetzt: Meta segmentata (Clerck) 1757
Nydia:
„ punctata Thorell 1890, 1892, F. Cambridge 1897 = Anahita punctata (Thorell) 1890
Nyssus (= Nyssa):
„ canariensis Simon 1864 = Agelena canariensis Lucas 1838
„ coloripes Walckenaer 1805 = nicht zu deuten!
„ familiaris Simon 1864 = Tegenaria domestica (Clerck) 1757
„ naevia Simon 1864 = Agelena naevia Walckenaer 1805
„ pedicolor Walckenaer 1805, Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ timida Simon 1864 = Agelena timida (Audouin) 1827
Obrima:
„ tennenti Simon 1894 = Obrimana tennenti (Simon) 1894
Ochyrocera:
„ cruciata Simon 1893 = Merizocera cruciata (Simon) 1893
„ pictorata Simon 1893 = Merizocera pictorata (Simon) 1893
„ stellata Simon 1905 = Althepus stellatus (Simon) 1905
Ocrepeira:
„ ectypa Marx 1883 = Wixia ectypa (Walckenaer) 1841
Ocyale (= Ocyala):
„ aethiopica Pavesi 1883 = Rothus aethiopicus (Pavesi) 1883
„ consocia Kulczynski 1911 = Pisaura consocia (Kulczynski) 1911
„ dentifasciata Cambridge 1885 = Pisaura dentifasciata (Cambridge) 1885
„ lagotis Holmberg 1876 = Porrima lagotis (Holmberg) 1876
„ maculata Strand 1907 = Ocyale atalanta Audouin 1827
„ madagascariensis Lenz 1886 = Caripetella madagascariensis (Lenz) 1886

Ocyale (Forts.):
„ mira Simon 1864 = Pisaurina mira (Walckenaer) 1837
„ mirabilis Audouin 1827 et sequ. = Pisaura mirabilis (Clerck) 1757
„ murina C. L. Koch 1837, 1848, Ohlert 1867 = Pisaura mirabilis (Clerck) 1757
„ noukhaiva Simon 1864 = nom. nud.
„ novica L. Koch 1878 = Pisaura novica (Cambridge) 1878
„ ocyale Simon 1864 = Ocyale atalanta Audouin 1827
„ pinicola Marx 1889 = Teippus pinicola (Hentz) 1850
„ rectifasciata Cambridge 1885 = Pisaura rectifasciata (Cambridge) 1885
„ rufa C. L. Koch 1848 = nicht zu deuten!
„ rufofasciata C. L. Koch 1848 = Pisaura mirabilis (Clerck) 1757
„ spinipes Taczanowski 1874 = Tetragonophthalma spinipes (Taczanowski) 1874
„ spissides Strand 1907 = ? Ocyale spissa (Bösenberg & Lenz) 1895
„ undata Emerton 1885, 1902, Montgomery 1902 = Pisaurina mira (Walck.) 1837
„ virgata Simon 1864 = Pisaurina mira (Walckenaer) 1837

Ocypete:
„ algerina Canestrini & Pavesi 1870 = Olios argelasius (Walckenaer) 1805
„ brunneiceps Giebel 1863 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ derasa C. L. Koch 1845 = Olios derasus (C. L. Koch) 1845
„ detrita C. L. Koch 1845 = Olios detritus (C. L. Koch) 1845
„ draco C. L. Koch 1845 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ erythrophthalmus Giebel 1863 = nicht zu deuten!
„ ferruginea C. L. Koch 1834 = Olios ferrugineus (C. L. Koch) 1834
„ flava Giebel 1863 = nicht zu deuten!
„ fritschi C. Koch 1873 = Eusparassus dufouri oraniensis (Lucas) 1846
„ gracilipes C. L. Koch 1845 = nicht zu deuten!
„ megacephala C. L. Koch 1845 = Palystes megacephalus (C. L. Koch) 1845
„ melanogaster C. L. Koch 1845 = Palystes castaneus (Latreille) 1819
„ microphthalmus Giebel 1863 = nicht zu deuten!
„ murina C. L. Koch 1845 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ nigritarsis Canestrini & Pavesi 1868 = Olios argelasius (Walckenaer) 1805
„ nobilis C. L. Koch 1845 = Palystes castaneus (Latreille) 1819
„ pallens C. L. Koch 1838 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ pallens Giebel 1863 = nicht zu deuten!
„ procera L. Koch 1867 = Heteropoda procera (L. Koch) 1867
„ pythagoricus Holmberg 1875 = Polybetes pythagoricus (Holmberg) 1875
„ sartrix L. Koch 1865 = Heteropoda sartrix (L. Koch) 1865
„ setulosa C. L. Koch 1836, 1837 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ striata Giebel 1863 = nicht zu deuten!
„ tersa C. L. Koch 1838, 1845 = Eusparassus tersus (C. L. Koch) 1838
„ testacea C. L. Koch 1838 = nicht zu deuten!
„ thoracica C. L. Koch 1845 = Heteropoda thoracica (C. L. Koch) 1845
„ vasta L. Koch 1867 = Isopeda vasta (L. Koch) 1867
„ vulpina C. L. Koch 1845 = Olios argelasius (Walckenaer) 1805

Ocyptila siehe **Ozyptila**

Odo:
„ guttipes Simon 1903 = Odomasta guttipes (Simon) 1903

Oecobius:
„ affinis Cambridge 1872 = Oecobius annulipes Lucas 1846
„ albipunctatus Cambridge 1872 = Oecobius annulipes Lucas 1846
„ domesticus Lucas 1846 = Oecobius cellariorum (Dugès) 1836
„ floridanus Petrunkevitch 1911 = Platoecobius floridanus (Banks) 1896
„ jonicus Cambridge 1873 = Oecobius cellariorum (Dugès) 1836
„ maculatus Simon 1875, 1892, Machado 1949 = Oecobius annulipes maculatus Simon 1870
„ maculatus Petrunkevitch 1911, Mello-Leitao 1917 = Oecobius keyserlingi Roewer 1951
„ navus Blackwall 1859 et sequ. = Oecobius annulipes Lucas 1846

Oecobius (Forts.):
- „ nigripalpis Dufour 1863 = Filistata insidiatrix (Forskal) 1775
- „ petionius Simon 1892 = Oecobius petronius Simon 1890
- „ teliger Cambridge 1872 = Oecobius annulipes Lucas 1846
- „ trimaculatus Cambridge 1872 = Oecobius annulipes maculatus Simon 1870

Oecophloeus:
- „ cinctipes Pocock 1892 = Sason cinctipes (Pocock) 1892

Oedipus:
- „ aenescens Menge 1877 et sequ. = Bianor aurocinctus (Ohlert) 1867
- „ aurocinctus Peckham 1886 = Bianor aurocinctus (Ohlert) 1867

Oedothorax:
- „ bidentatus Crosby 1905 = Scotoussa bidentata (Emerton) 1882
- „ bostoniensis Crosby 1905 = Sougambus bostoniensis (Emerton) 1882
- „ brunneus Crosby & Bishop 1928 = Hilaira leviceps (L. Koch) 1879
- „ concavus Crosby 1905 = Sciastes concavus (Emerton) 1882
- „ contortus Crosby 1905 = Eperigone contorta (Emerton) 1882
- „ corticarius Crosby & Bishop 1928 = Soulgas corticarius (Emerton) 1908
- „ debilis Crosby 1905, Crosby & Bishop 1928 = Tunagyna debilis (Banks) 1892
- „ decemoculatus Crosby 1905 = Dismodicus decemoculatus (Emerton) 1882
- „ dentatus Bösenberg & Strand 1906, Lessert 1910 = Gnathonarium dentatum (Wider) 1834
- „ dubius Schenkel 1929 = Oedothorax schenkeli Roewer 1942
- „ dubius Caporiacco 1935 = Oedothorax caporiaccoi Roewer 1942
- „ eranistes Crosby & Bishop 1927 = Goneatara eranistes (Crosby & Bishop) 1927
- „ exsiccatus Bösenberg & Strand 1906 = Gnathonarium dentatum (Wider) 1834
- „ flaveolus Crosby 1905 = Aduva flaveola (Banks) 1892
- „ kincaidi Petrunkevitch 1911 = Grammonota kincaidi (Banks) 1905
- „ lapidicolus Petrunkevitch 1911 = Coryphaeolana lapidicola (Soerensen) 1898
- „ longisetosus Crosby 1905 = Aduva longisetosa (Emerton) 1882
- „ maculatus Crosby 1905 = Eperigone probata (Emerton) 1882
- „ melacrus Chamberlin 1916 = Scolopembolus melacrus (Chamberlin) 1916
- „ melanopygius Strand 1909 = Ostearius melanopygius (Cambridge) 1879
- „ microtarsus Crosby 1905 = Sciastes microtarsus (Emerton) 1882
- „ montanus Crosby 1905 = Sisicottus montanus (Emerton) 1882
- „ nesides Chamberlin 1922 = Sisicottus montanus (Emerton) 1882
- „ orites Chamberlin & Ivie 1933 = Sisicottus montanus (Emerton) 1882
- „ ornatus Crosby & Bishop 1928 = Micryphantes ornatus (Emerton) 1914
- „ oxypaederotipus Crosby 1905 = Catabrithorax oxypaederotipus (Crosby) 1905
- „ parvus Crosby 1905 = Souessoula parva (Banks) 1899
- „ pectinatus Crosby 1905 = Catabrithorax perplexus (Keyserling) 1886
- „ pertinens Crosby 1905 = Catabrithorax pertinens (Cambridge) 1875
- „ pidacitis Crosby & Bishop 1927 = Sisicottus montanus (Emerton) 1882
- „ platyrrhinus Crosby & Bish. 1927 = Coneatara platyrrhina (Crosby & Bish.) 1927
- „ plumosus Crosby 1905 = Catabrithorax plumosus (Emerton) 1882
- „ potamius Crosby & Bishop 1927 = Souessoula parva (Banks) 1899
- „ probatus Crosby 1905, Comstock 1912, Kaston 1938 = Eperigone probata (Emerton) 1882
- „ rusticus Crosby 1905 = Sisyrbe rustica (Banks) 1892
- „ sarcinatus Bösenberg 1902 = Notioscopus sarcinatus (Cambridge) 1872
- „ sarcocuon Crosby & Bishop 1927 = Maso sarcocuon (Crosby & Bishop) 1927
- „ spiniferus Crosby 1905 = Souessa spinifera (Cambridge) 1874
- „ tarsalis Crosby & Bishop 1928 = Scironis tarsalis (Emerton) 1911
- „ terrestris Crosby 1905 = Sciastes terrestris (Emerton) 1882
- „ tibialis Crosby 1905 = Souidas tibialis (Emerton) 1882
- „ trilobatus Crosby 1905 = Eperigone trilobata (Emerton) 1882
- „ truncatus Crosby 1905 = Sciastes truncatus (Emerton) 1882
- „ undulatus Crosby & Bishop 1928 = Eperigone contorta (Emerton) 1882
- „ unidentatus Crosby & Bishop 1928 = Smodigoides thoracicus (Emerton) 1913

Oeta:
„ spinosa Cambridge 1870, Simon 1894 = Schenkeliella spinosa (Cambridge) 1870
Olbus:
„ gounellei Simon 1896 = Olbophthalmus gounellei (Simon) 1896
„ personatus Simon 1896 = Olbophthalmus personatus (Simon) 1896
Oletera:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Atypus**
„ atypa Walckenaer 1805, 1806, 1837 = Atypus affinis Eichwald 1830
Oligoctenus:
„ ottleyi Petrunkevitch 1930 = Ctenus ottleyi (Petrunkevitch) 1930
Oligophthalmus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Adrastis**
Olios:
„ abnormis Keyserling 1884, Fox 1937 = Olios foxi Roewer 1951
„ actaeon Hogg 1914 = Olios artemis Hogg 1915
„ albifrons Lucas 1852 = nicht zu deuten!
„ algerianus Lucas 1846 = Olios argelasius (Walckenaer) 1805
„ annulipes Lucas 1858 = nicht zu deuten!
„ antillianus Walckenaer 1837 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ barbarus Lucas 1846 = Eusparassus barbarus (Lucas) 1846
„ captiosus Walckenaer 1837, Vinson 1863 = Olios lamarcki (Latreille) 1806
„ castaneus Walckenaer 1837 = Palystes castaneus (Latreille) 1819
„ colombianus Walckenaer 1837 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ concolor Keyserling 1884 = Olios fasciculatus Simon 1880
„ concolor Caporiacco 1947, 1948 = Olios roeweri Caporiacco 1949
„ exasperans Cambridge 1890 = Olios erroneus Cambridge 1890
„ freycinetii Walckenaer 1837, Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ fulvoclypeus Caporiacco 1940 = Eusparassus fulvoclypeus Strand 1906
„ fuscus Walckenaer 1837 = Palystes castaneus (Latreille) 1819
„ gabonensis Lucas 1858 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ geniculatus Lucas 1850 = nicht zu deuten!
„ giganteus Keyserling 1884 = Olios fasciculatus Simon 1880
„ guineensis Lucas 1858 = Thalassius guineensis (Lucas) 1858
„ hispidus Nicolet 1849 = Polybetes martius (Nicolet) 1849
„ imerinensis Vinson 1863 = Rhitymna imerinensis (Vinson) 1863
„ javensis Doleschall 1857 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ leucosius Walckenaer 1837, Vinson 1863 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ longipes Walckenaer 1837 = Tychicus longipes (Walckenaer) 1837
„ longipes Petrunkevitch 1911 = Olios longipedatus Roewer 1951
„ lunula Doleschall 1857, 1859 = Heteropoda thoracica (C. L. Koch) 1945
„ maculatus Berland 1924 = Olios berlandi Roewer 1951
„ madagascariensis Vinson 1863 = Uduba madagascariensis (Vinson) 1863
„ malayanus Doleschall 1857, 1859 = Tychicus longipes (Walckenaer) 1837
„ martius Nicolet 1847 = Polybetes martius (Nicolet) 1849
„ megacephalus Simon 1880 = Palystes megacephalus (C. L. Koch) 1845
„ melanogaster Simon 1880 = Palystes castaneus (Latreille) 1819
„ montanus Simon 1880 = Olios peruvianus Roewer 1951
„ morbidosa Simon 1864 = Olios morbillosus (Mac Leay) 1827
„ natalius Simon 1880 = Palystes natalicus (Karsch) 1878
„ oraniensis Lucas 1846 = Eusparassus dufouri oraniensis (Lucas) 1846
„ pictus Caporiacco 1947, 1948 = Olios bivittatus Roewer 1951
„ pinnotheres Walckenaer 1837 = Palystes pinnotheres (Walckenaer) 1805
„ pragmaticus Chamberlin 1924 = Olios fasciculatus Simon 1880
„ rapidus Simon 1880, Mello-Leitao 1918 = Streptaedoea rapida (Keyserling) 1880
„ regius Gerstäcker 1873 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ roseus Simon 1880 = Heteropoda rosea Karsch 1879
„ rufipes Lucas 1838 = Zoropsis rufipes (Lucas) 1838

Olios (Forts.):
„ sagus Cambridge 1890 = Olios ferrugineus (C. L. Koch) 1834
„ setulosus Walckenaer 1841 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ sparassoides Nicolet 1849 = Olbus sparassoides (Nicolet) 1849
„ spongitarsis Walckenaer 1837, Järvi 1914, Roewer 1928 = Olios argelasius (Walckenaer) 1805
„ taprobanicus Walckenaer 1837 = Sparíolenus taprobanicus (Walckenaer) 1837
„ testaceus Doleschall 1859 = nicht zu deuten!
„ tridentiger Cambridge 1869 = Corinna tridentigera (Cambridge) 1869
„ validus Blackwall 1877 = Rhitymna valida (Blackwall) 1877
„ viridis Vinson 1863 = nicht zu deuten!
„ zonatus Doleschall 1859 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767

Omanus:
„ maculatus Keyserling 1891 = Oecobius keyserlingi Roewer 1951

Omosita:
„ bicolor Holmberg 1876 = Loxoscelis rufipes (Lucas) 1834
„ rufescens Simon 1901 = Loxoscelis thorelli (Simon) 1901

Omothymus:
Alle Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Cyriopagopus**

Omura:
Alle Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Ceriomura**

Onesinda:
„ minutissima Cambridge 1895 = Theonoe minutissima (Cambridge) 1879

Onocolus:
„ pentagonus Simon 1895 = Onoculus simoni Mello-Leitao 1915

Onondaga:
„ lineata Peckham 1909 et sequ. = Fuentes lineata (C. L. Koch) 1848

Onychocryptus:
„ mutillarius Karsch 1891 = Coenoptychus pulcher Simon 1885

Oonops:
„ angustatus Simon 1882 = Oonopinus angustatus (Simon) 1882
„ concolor Blackwall 1859 = Opopaea concolor (Blackwall) 1859
„ cupidus Keyserling 1882 = Opopaea cupida (Keyserling) 1882
„ desultrix Keyserling 1882 = Dysderina desultrix (Keyserling) 1882
„ floridanus Gertsch 1936 = Oonopinus floridanus Chamberlin & Ivie 1935
„ globosus Keyserling 1877 = Dysderina globosa (Keyserling) 1877
„ inermis Simon 1882 = Tapinesthis inermis (Simon) 1882
„ loricatus L. Koch 1872 = Gamasomorpha loricata (L. Koch) 1872
„ loricatus Simon 1873 = Dysderina loricatula Roewer 1942
„ machinator Keyserling 1882 = Dysderina machinator (Keyserling) 1882
„ montanus Keyserling 1883 = Dysderina montana (Keyserling) 1883
„ pauper Cambridge 1876 = Sulsula pauper (Cambridge) 1876
„ planus Keyserling 1883 = Gamasomorpha plana (Keyserling) 1883
„ principalis Keyserling 1882 = Dysderina principalis (Keyserling) 1882
„ propinquus Keyserling 1882 = Dysderina propinqua (Keyserling) 1882
„ punctatus Cambridge 1872 = Opopaea punctata (Cambridge) 1872
„ scutatus Cambridge 1876 = Dysderina scutata (Cambridge) 1876
„ septemcinctus Urquhart 1890 = Ariadna septemcincta (Urquhart) 1890
„ similis Keyserling 1882 = Dysderina similis (Keyserling) 1882
„ spinimanus Simon 1891 = Heteroonops spinimanus (Simon) 1891

Oophora:
„ meridionalis Hentz 1850 = Spermophora meridionalis Hentz 1841

Opas:
Alle Arten sind unter gleichem Artnamen bei **Leucauge**

Opistoncus:
„ aurantiaca Simon 1885 = Epocilla aurantiaca (Simon) 1885

Opistoxys:
„ subacutus Cambridge 1891, 1914 = Centromerus subacutus (Cambridge) 1891

Opitis:
Alle Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Philodromus**
Opopaea:
„ deserticola Simon 1892 = Opopoea punctata (Cambridge) 1872
„ plana Petrunkevitch 1911 = Gamasomorpha plana (Keyserling) 1883
Orcevia:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Laufeia**
Orchestina:
„ saltabunda Petrunkevitch 1911 = Orchestina saltitans Banks 1894
Ordgarius:
„ bisaccatus Keyserling 1892, Mc Cook 1893 = Mastophora bisaccata (Emerton) 1884
„ cornigerus Keyserling 1892, Mc Cook 1893 = Mastophora cornigera (Hentz) 1850
„ corpulentus Banks 1898 = Mastophora corpulenta (Banks) 1898
„ gasteracanthoides Keyserling 1892 = Mastophora gasteracanthoides (Nicolet) 1849
„ obesus Banks 1898 = Mastophora obesa (Banks) 1898
Oreognaphosa:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Gnaphosa**
Oreoneta:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Hilaira**
„ nigra Chyzer & Kulczynski 1894 = Hilaira montigena (L. Koch) 1872
Oreonetides:
„ adipatus Hull 1909, 1911 = Oreonetides vaginatus (Thorell) 1872
„ strandi Schenkel 1934 = Scotargus pilosus Simon 1913
Orinomus:
„ lamprus Chamberlin 1916 = Orinomana lampra (Chamberlin) 1916
Orithya:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Uloborus**
„ williamsii Blackwall 1858, 1861 = Uloborus geniculatus (Olivier) 1789
Ornithoctonus:
„ minax Gravely 1935 = Melopoeus minax Thorell 1897
Ornithoscatoides:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Phrynarachne**
Oroodes:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Ulesanis**
Orphnoecus siehe **Orphnaecus**
Orsinome:
„ australis Simon 1899 = Orsinome lagenifera (Urquhart) 1887
„ herbigrada Dalmas 1917 = Orsinome lagenifera (Urquhart) 1887
Orthops:
„ oblongus Franganillo 1925 = ? Tibellus oblongus (Walckenaer) 1802
Orthotrichus:
„ vulpinus Karsch 1880 = Phrixotrichus roseus (Guérin) 1838
Orus:
„ virens Thorell 1891 = Dieta virens (Thorell) 1891
Oryphantes:
„ angulatus Hull 1932 = Lepthyphantes angulatus (Cambridge) 1881
Ostearius:
„ nigricauda Hull 1911 = Ostearius melanopygius (Cambridge) 1879
Oxyopeidon (= Oxyopedon):
„ facilis Cambridge 1894 = Hamataliwa facilis (Cambridge) 1894
„ haytianum Chamberlin 1925 = Hamataliwa haytiana (Chamberlin) 1925
Oxyopes (= Oxyopa Simon 1864**):**
„ alexandrina Simon 1864 = Oxyopes heterophthalmus (Latreille) 1804
„ alluaudi Simon 1893 = Oxyopes dumonti (Vinson) 1863
„ annulipes F. Cambridge 1902 = Oxyopes cambridgei Mello-Leitao 1928

Oxyopes (Forts.):
„ astutus Hentz 1845 = Oxyopes salticus Hentz 1845
„ brevis Banks 1898 = Oxyopes banksi Mello-Leitao 1928
„ candidus L. Koch 1867 = Oxyopes ramosus (Panzer) 1804
„ concolor Caporiacco 1939 = Oxyopes concoloratus Roewer 1951
„ dentatus Thorell 1872 = Oxyopes heterophthalmus (Latreille) 1804
„ dorsualis Thorell 1899 = Oxyopes flavipalpis (Lucas) 1858
„ dumonti Strand 1908 = Oxyopes hova Strand 1908
„ fronto Thorell 1890, 1892 = Tapponia fronto (Thorell) 1890
„ gracilis Keyserling 1877 et sequ. = Oxyopes salticus Hentz 1845
„ halmaherensis Strand 1909 = ? Oxyopes papuanus Thorell 1881
„ hieroglyphicus Thorell 1887 = Tapponia hieroglyphica (Thorell) 1887
„ incertus Caporiacco 1939 = Oxyopes caporiaccoi Roewer 1951
„ italicus Thorell 1872 = Oxyopes lineatus Latreille 1806
„ laminatus Tullgren 1901 = Oxyopes scalaris Hentz 1845
„ latifrons Thorell 1890, 1892 = Tapponia latifrons (Thorell) 1890
„ lineata Simon 1864 = Oxyopes heterophthalmus (Latreille) 1804
„ lineatus Thorell 1872 = Oxyopes ramosus (Panzer) 1804
„ lineatus Pavesi 1880, 1884 = Oxyopes heterophthalmus (Latreille) 1804
„ lineatipes Simon 1885 = Oxyopes javanus Thorell 1887
„ littoralis Simon 1866 = Peucetia viridis (Blackwall) 1858
„ luteus Keyserling 1891 = Oxyopes salticus Hentz 1845
„ obtusus Thorell 1890, 1892 = Tapponia obtusa (Thorell) 1890
„ salticus Banks 1903 = Oxyopes crewi Bryant 1948
„ similaris Sherriffs 1951 = Oxyopes lepidus (Blackwall) 1864
„ superbus Thorell 1887 = Tapponia superba (Thorell) 1887
„ taeniatus Mello-Leitao 1941 = Oxyopes taeniatulus nom. nov.
„ thalassina Simon 1864 = Peucetia thalassina (C. L. Koch) 1848
„ transalpinus Simon 1866 = Oxyopes lineatus Latreille 1806
„ variabilis Strand 1906, 1909 = Oxyopes embriki Roewer 1951
„ varians Taczanowski 1874 = Oxyopes salticus Hentz 1845
„ variegatus Latreille 1806 = Oxyopes hetreophthalmus (Latreille) 1804
„ variegatus Hahn 1834, Simon 1869 = Oxyopes ramosus (Panzer) 1804
„ viridans Hentz 1845 = Peucetia viridans (Hentz) 1845
„ vittatus Simon 1864 = Castianeira vittata (Walckenaer) 1837

Oxyptila siehe **Ozyptila**

Oxysoma:
„ lineatum Tullgren 1905 = Oxysoma tullgreni Roewer 1951
„ pallidum Franganillo 1925, 1926 = nicht zu deuten!

Ozaleus:
„ tarandus Thorell 1889 = Nicodamus tarandus (Thorell) 1889

Ozopactus:
„ silvicola Simon 1892 = Ozopactus ernsti Simson 1889

Ozyptila (= **Ocyptila** = **Oxyptila**):
„ albimana Simon 1875 ♀, Berland 1927 = Xysticus bufo (Dufour) 1820
„ americana Gertsch 1939 part., Chickering 1940 part. = Ozyptila barrowsi Gertsch 1939
„ beaufortensis Strand 1915 = Ozyptila modesta (Scheffer) 1907
„ brevipes Dahl 1912 = Ozyptila praticola (C. L. Koch) 1837
„ bufo Simon 1875 ♂ = Xysticus graecus C. L. Koch 1838
„ bufo Simon 1875 ♀ = Xysticus bufo (Dufour) 1820
„ caligans Simon 1875 = Ozyptila praticola (C. L. Koch) 1837
„ cinera Emerton 1893 = Xysticus canadensis Gertsch 1934
„ claveata Dahl 1883 = Ozyptila blackwalli Simon 1875
„ conspurcata Emerton 1894 part. = Ozyptila americana Banks 1895
„ dura Soerensen 1898, Jackson 1930, Braendegaard 1937 = Xysticus durus (Soerensen) 1898

Ozyptila (Forts.):
- „ flexa Cambridge 1895 = Ozyptila brevipes (Hahn) 1825
- „ floridensis Banks 1904 = Ozyptila floridana Banks 1895
- „ fucata Strand 1907 = Xysticus bufo (Dufour) 1820
- „ fulvipes Karsch 1879 = Coriarachne fulvipes (Karsch) 1879
- „ georgiana Keyserling 1880, Banks 1892 = Ozyptila conspurcata Thorell 1877
- „ guttulata Pavesi 1876 = Ozyptila confluens (C. L. Koch) 1845
- „ hirta Simon 1880 = Ozyptila audouini Roewer 1951
- „ horticola Simon 1875 et sequ. = Ozyptila atomaria (Panzer) 1901
- „ infumata Chamberlin & Ivie 1944 = Ozyptila floridana Banks 1895
- „ marshalli Barrows 1919, Bryant 1930 = Ozyptila modesta (Scheffer) 1904
- „ modesta Bryant 1930 ♂ = Ozyptila barrowsi Gertsch 1939
- „ monroensis Banks 1895, Bryant, 1930, Kaston 1938 = Ozyptila bryantae Gertsch 1939
- „ neglecta Bryant 1930 = Ozyptila monroensis Keyserling 1884
- „ nigrita Bösenberg 1902 = Ozyptila rauda Simon 1875
- „ obsoleta Kulczynski 1882 = Ozyptila rauda Simon 1875
- „ okefenokensis Gertsch 1939 = Ozyptila okefinokensis Gertsch 1934
- „ orientalis Kulczynski 1926 = Ozyptila rauda arctica Kulczynski 1908
- „ pallida Simon 1875 = Ozyptila atomaria (Panzer) 1801
- „ pusio Dahl 1912 = Ozyptila brevipes (Hahn) 1825
- „ rauda Tullgren 1944 = Ozyptila rauda arctica Kulczynski 1908
- „ septentrionalium L. Koch 1879 = Ozyptila rauda Simon 1875
- „ septentrionalium Schenkel 1931 = Ozyptila rauda arctica Kulczynski 1908
- „ tristicula Pavesi 1876 = Xysticus tristiculus Thorell 1875
- „ westringi Dahl 1883 = Ozyptila trux (Blackwall) 1846

Pachiloscelis:
- „ nigripes Lucas 1834, 1835 = Missulena nigripes (Lucas) 1834

Pachomius:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Phiale**

Pachydactylus:
- „ prona Menge 1868 = Dipoena prona (Menge) 1868

Pachygnatha:
- „ argyrostilba Cambridge 1876 = Dyschiriognatha argyrognatha (Cambridge) 1876
- „ australis Keyserling 1883 = Glenognatha australis (Keyserling) 1883
- „ clerckii C. L. Koch 1845 = Pachygnatha degeerii Sundevall 1830
- „ clerckii Ohlert 1867 = Pachygnatha listeri Sundevall 1830
- „ curtisi Mc Cook 1893 = Meta curtisi (Mc Cook) 1893
- „ dorothea Mc Cook 1893, Bryant 1923 = Pachygnatha autumnalis Keyserling 1884
- „ furcillata Keyserling 1884, Banks 1913, Bryant 1933 = Pachygnatha brevis Keyserling 1884
- „ listeri C. L. Koch 1837, 1845 = Pachygnatha clerckii Sundevall 1823
- „ mandibularis Cambridge 1872 = Enoplognatha mandibularis (Lucas) 1846
- „ maxillosa Doleschall 1852 = Pachygnatha clerckii Sundevall 1823
- „ superba Rainbow 1896 = Euryopis superba (Rainbow) 1896
- „ tenera Karsch 1879 = Dyschiriognatha tenera (Karsch) 1879
- „ tristriata Keyserling 1883, Emerton 1908 = Pachygnatha brevis Keyserling 1884 1884
- „ vernalis Doleschall 1852 = Pachygnatha degeerii Sundevall 1830
- „ vethii Hasselt 1882 = Orsinome vethii (Hasselt) 1882

Pachyidiops:
- „ crassus Simon 1903 = Idiops crassus Simon 1884

Pachylomerides:
Sämtliche Arten müssen unter gleichem Artnamen zu **Ummidia** gestellt werden

Pachylomerus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Pachylomerides**, zu ersetzen durch **Ummidia**
„ carolinensis Ausserer 1871 = Ummidia (Pachylomerides) audouini (Lucas) 1835
„ natalensis Cambridge 1889 = Stasimopus rufidens (Ausserer) 1871
„ piceus Frade & Bacelar 1931, 1937 = Ummidia (Pachylomerides) aedificatoria (Westwood) 1840
„ quadrispinosus Atkinson 1886 = Ummida (Pachylomerides) carabivora (Atkinson) 1886
„ turris Atkinson 1886 = Ummidia (Pachylomerides) audouini (Lucas) 1835
Pachyloscelis:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Pachylomerides**, zu ersetzen durch **Ummidia**
„ audouini Lucas 1835 = Ummidia (Pachylomerides) audouini (Lucas) 1835
„ fulvipes Lucas 1835 = Calommata fulvipes (Lucas) 1835
„ luteipes Keyserling 1891 = Actinopus crassipes (Keyserling) 1891
Pachypleuracantha:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Gasteracantha**
Pachyptile:
„ devia Simon 1864 = Misumena vatia (Clerck) 1757
„ luctuans Simon 1864 = Xysticus luctans (C. L. Koch) 1845
„ villosa Simon 1864 = Heriaeus hirtus (Latreille) 1819
Pachypus:
„ mac-leayi Cambridge 1873 = Steriphopus mac-leayi (Cambridge) 1873
Padilla:
„ cornuta Peckham 1894 = nicht zu deuten!
Pagomys:
„ uinta Chamberlin 1948 = Pagomys monticola (Gertsch & Ivie) 1936
Palaephatus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Pagida**
Palaestina:
„ sexoculata Cambridge 1872 = Trygetus sexoculatus (Cambridge) 1872
Palaestrina:
„ variegata Peckham 1901 = Phiale variegata (Peckham) 1901
Pales:
„ crucifera Simon 1864 = Pellenes tripunctatus (Walckenaer) 1802
„ crucigera C. L. Koch 1850 = Pellenes tripunctatus (Walckenaer) 1802
„ tripunctata Simon 1864 = Pellenes tripunctatus (Walckenaer) 1802
Palpimanus:
„ haematinus C. L. Koch 1836 = Palpimanus gibbulus Dufour 1820
Palystes:
„ frenatus L. Koch 1875 = Palystes castaneus (Latreille) 1819
„ höhneli Strand 1907 = Palystes rubrioculatus Strand 1906
„ lycosinus Pocock 1900 = Palystes megacephalus (C. L. Koch) 1845
„ maderianus Simon 1880 = Olios maderianus (Thorell) 1875
„ melanychius Thorell 1890 = Palystes kochi Simon 1880
„ ornatus Thorell 1877 = Olios ornatus (Thorell) 1877
„ pulchripes Pocock 1896 = Palystes superciliosus L. Koch 1875
„ spenceri Pocock 1896 = Palystes natalicus (Karsch) 1878
Palystodes:
„ plumosus Pocock 1899 = Anchonastus plumosus (Pocock) 1899
Pamphobeteus:
„ isabellinus Mello-Leitao 1923 = Crypsidromus isabellinus Ausserer 1871
Panamomops:
„ antepenultimus Bösenberg 1902 = Silometopus antepenultimus (Cambridge) 1882
„ bicuspis Simon 1884, 1894 = Panamomops sulcifrons (Wider) 1834

Panamomops (Forts.):
„ diceros Simon 1884, 1894, Bösenberg 1902, Lessert 1910 = Saloca diceros (Cambridge) 1870
„ diceros Chyzer & Kulczynski 1894 = Saloca kulczynskii Miller & Kratochvil 1939
„ quadricristatus Simon 1884 = Horcotes quadricristatus (Emerton) 1882
„ sulcifrons Chyzer & Kulczynski 1894 = Panamomops mengei Simon 1926
Panaretella:
„ distincta Lawrence 1952 = Panaretella disticta (Pocock) 1896
Panaretus:
„ distictus Pocock 1896 = Paranetella disticta (Pocock) 1896
Pandeus:
„ coeruleus Keyserling 1891 = Ochyrocera coerulea (Keyserling) 1891
Pandercetes:
„ pallicolor Strand 1911 = ? Pandercetes malleator Thorell 1890
Pandora:
„ cirtana Simon 1864 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
„ litterata Simon 1864 = Aelurillus insignitus (Olivier) 1789
„ striata C. L. Koch 1850 = Aelurillus festivus (C. L. Koch) 1834
Panysinus:
„ vittatus Simon 1902 = Panysinus nicholsoni (Cambridge) 1899
Paphlagon:
„ beatus Cambridge 1893 = Pronous tuberculifer Keyserling 1880
Paraclubiona:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Clubiona**
Paractenonyx:
„ parallelus Dahl 1886 = Lophocarenum parallelum (Wider) 1834
Paradesis:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Desis**
Paradiestus:
„ aurantiacus Mello-Leitao 1915 = Diestus alticeps (Keyserling) 1891
Paraleptoneta:
„ orientalis Kulczynski 1914, Kratochvil 1934, 1935 ♀ = Sulcia orientalis (Kulczynski) 1914
„ orientalis Kratochvil 1934, 1935 ♂ = Sulcia mirabilis (Kratochvil) 1934
Paraltellopsis:
„ luteus Mello-Leitao 1925 = Ciniflella lutea Mello-Leitao 1920
Paramarpissa:
„ insignis Banks 1929 = Carabella insignis (Banks) 1929
„ tibialis F. Cambridge 1901 = Pseudicius piraticus (Peckham) 1888
Paramodunda:
„ thyeniformis Caporiacco 1947 = Paramodunda thyenioides Lessert 1925
Paranetella:
„ distincta Lawrence 1937 = Panaretella disticta (Pocock) 1896
Paranetus:
„ distictus Pocock 1896 = Panaretella disticta (Pocock) 1896
Paraphidippus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Dendryphantes**
„ aureus F. Cambridge 1901 = Dendryphantes aurantius (Lucas) 1833
„ chrysis F. Cambridge 1901 = Dendryphantes aurantius (Lucas) 1833
„ mexicanus F. Cambridge 1901 = Dendryphantes merus Petrunkevitch 1911
„ militaris F. Cambridge 1901 = Dendryphantes marginatus (Walckenaer) 1837
„ multicolor F. Cambridge 1901 = Dendryphantes aurantius (Lucas) 1833
„ quadrisignatus Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
„ sexsignatus Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
Paraplectana:
„ anchietae Brito Capello 1867 = Paraplectana thorntoni (Blackwall) 1865
„ cabindae Brito Capello 1867 = Paraplectana thorntoni (Blackwall) 1865

Paraplectana (Forts.):
„ decora Cambridge 1877 = Hypognatha decora (Cambridge) 1877
„ depressa Thorell 1877 = Anepsia depressa (Thorell) 1877
„ kochii Cambridge 1877 = Paraplectanoides kochii (Cambridge) 1877
„ lunata Simon 1896 = Pasilobus lunatus (Simon) 1895
„ maritata Cambridge 1877 = Anepsia maritata (Cambridge) 1877
„ migroanalis Hasselt 1882 = Anepsia maritata (Cambridge) 1877
„ peltoides Thorell 1878, Strand 1911 = Anepsia peltoides (Thorell) 1878
„ peruana Keyserling 1879, 1892 = nicht zu deuten!
„ picta Thorell 1877, 1878 = Anepsia maritata (Cambridge) 1877
„ scutata Keyserling 1892 = Hypognatha scutata (Perty) 1833
„ semialba Simon 1880 = Anepsia semialba (Simon) 1880
„ villosa Thorell 1877 = Anepsia villosa (Thorell) 1877
„ walleri Bösenberg & Lenz 1895 = Paraplectana multimaculata Thorell 1899

Pararaneus:
„ striatus Caporiacco 1940 = Pararaneus striatellus **nom. nov.**

Parasintula:
„ balteata Dahl 1912 = Centromerus serratus (Cambridge) 1875

Parastephanops:
„ echinatus Bryant 1940 = Onocolus echinatus (Taczanowski) 1872

Parastrophius:
„ blanci Mello-Leitao 1917 = Synstrophius blanci (Mello-Leitao) 1917

Parasynema:
„ adusta F. Cambridge 1900 = Parasynema cambridgei Roewer 1942
„ pictilis Gertsch 1934 = Diaea pictilis (Banks) 1896
„ viridans Gertsch 1934 = Synema viridans (Banks) 1896

Paratobias:
„ championi F. Cambridge 1900 = Stephanopis championi (F. Cambridge) 1900

Paratropis:
„ scrupea Simon 1892 = Paratropis scruposa Simon 1889

Parauximus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Cybaeus**

Pardessus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Phiale**
„ formosus Bryant 1940 = Phiale cubana Roewer 1951
„ gratiosus Peckham 1896, F. Cambridge 1901 = Phiale mimica (C. L. Koch) 1846

Pardosa:
„ albiceps Emerton 1915 = Pardosops tesquorum (Odenvall) 1901
„ albomaculata Emerton 1885, 1919 = Pardosa groenlandica (Thorell) 1872
„ albopatella Emerton 1885, 1902 = Pardosa saxatilis (Hentz) 1844
„ albopilosa Petrunkevitch 1925 = Schizogyna tristani (Banks) 1909
„ albopilosa Franganillo 1931, 1937, Bryant 1940 = Pardosa floridana (Banks) 1896
„ alveolata Simon 1876 = Pardosa ferruginea (L. Koch) 1870
„ andersoni Gertsch 1937 = Pardosa palustris (Linné) 1758
„ annulata Banks 1892 = Pardosa saxatilis (Hentz) 1844
„ arenaria Ohlert 1867 = Pardosa agricola (Thorell) 1856
„ armillata Schenkel 1936 = Pardosa biarmillata (Strand) 1942
„ atra Chamberlin 1908 = Pardosa wyuta (Gertsch) 1934
„ atromedia Banks 1904 = Pardosa sierra (Banks) 1898
„ atlantica Emerton 1913 = Pardosa saxatilis (Hentz) 1844
„ auberti Simon 1898 = Passiena auberti (Simon) 1898
„ baltoroi Caporiacco 1935 = Acantholycosa baltoroi (Caporiacco) 1935
„ baltistana Caporiacco 1935 = Acantholycosa baltoroi (Caporiacco) 1935
„ banksi Chamberlin 1904, 1908 = Pardosa longispinata Tullgren 1901
„ bifasciata Simon 1876, 1937, Becker 1882, Lessert 1904, 1910 = Passiena bifasciata (C. L. Koch) 1834

Pardosa (Forts.):

„ bilineata Emerton 1885 = Lycosa bilineata (Emerton) 1885
„ bilobata Tullgren 1901 = Allocosa insularis (Emerton) 1885
„ blanda Simon 1876 = Pardosa ferruginea (L. Koch) 1870
„ blanda Becker 1870 = nicht zu deuten!
„ brunnea Emerton 1885 = Pardosa modica brunnea (Emerton) 1885
„ cavannae Simon 1881 = Pardosa frigida Simon 1876
„ clavipalpis Purcell 1903 = Pardosa inopina clavipalpis (Purcell) 1903
„ coloradensis Banks 1894 = Pardosa ontariensis Gertsch 1933
„ concolor Chamberlin 1924 = Pardosa concolorata (Roewer) 1951
„ condolens Schmidt 1895, Caporiacco 1935 = Pardosops condolens (Cambridge) 1885
„ coronadensis Mello-Leitao 1941 = Pardosella coronadensis (Mello-Leitao) 1941
„ cursoria Simon 1876 = Pardosa blanda (C. L. Koch) 1834
„ cursoria Lessert 1910, Fox 1937 = Pardosa kervillei Simon 1937
„ diffusa Emerton 1909 = Pardosa moesta Banks 1892
„ dimidiata virgata Kulczynski 1901 = Pardosops virgata (Kulczynski) 1901
„ distincta Chamberlin 1908 = Pardosa hyperborea (Thorell) 1870
„ dorsalis Banks 1894 = Pardosa mackenziana (Keyserling) 1876
„ eiseni Schenkel 1925 = Pardosa eisenii (Thorell) 1875
„ emertoni Chamberlin 1908, Comstock 1912 = Pardosa distincta (Blackwall) 1846
„ evippiformis Caporiacco 1935 = Evippomma evippiformis (Caporiacco) 1935
„ evippina Simon 1897 = Evippomma evippina (Simon) 1897
„ ferruginea Simon 1876 = Pardosa giebelii (Pavesi) 1873
„ ferruginea Calloni 1889 = nicht zu deuten!
„ floridana Banks 1904, Gertsch & Wallace 1935, Kaston 1948 = Pardosa longispinata Tullgren 1901
„ fortunata Schmidt 1895, Caporiacco 1935 = Pardosops fortunata (Cambridge) 1885
„ furtadoi Simon 1883 = Pardosa proxima (C. L. Koch) 1848
„ futilis Banks 1898 = Pardosa sternalis (Thorell) 1877
„ glacialis Emerton 1894, 1918, 1919, Montgomery 1904 = Pardosa concinna (Thorell) 1877
„ gracilis Banks 1892 = Schizocosa saltatrix (Hentz) 1844
„ greenlandica Emerton 1902 = Pardosa groenlandica (Thorell) 1872
„ heretica Chamberlin 1925 = Alopecosa kochii (Keyserling) 1876
„ hesperella Chamberlin 1920 = Pardosa metlakatla Emerton 1917
„ lapidicina Chamberlin 1908 = Pardosa mercurialis Montgomery 1904
„ lapponica Sytshevskaja 1935, Schenkel 1951 = Pardosa atrata (Thorell) 1873
„ leprevosti Mello-Leitao 1947 = Pardosops leprevosti (Mello-Leitao) 1947
„ lignaria Simon 1876 = Acantholycosa lignaria (Clerck) 1757
„ littoralis Banks 1896, Emerton 1909 = Pardosa longispinata Tullgren 1901
„ ludovici Lessert 1910 = Acantholycosa nigra (C. L. Koch) 1835
„ luteola Emerton 1894 = Pardosa hyperborea (Thorell) 1870
„ minima Montgomery 1902, 1904 = Pardosa saxatilis (Hentz) 1844
„ molitor Mello-Leitao 1947 = Molitorosa molitor (Bertkau) 1880
„ montana Emerton 1885 = Pardosa xerampelina (Keyserling) 1876
„ monticola Ohlert 1867 = Pardosa palustris (Linné) 1758
„ monticola maritima Dahl 1883 = Pardosa arenicola fuscicola (Dahl) 1908
„ monticola mixta Simon 1937 = Pardosa mixta (Kulczynski) 1887
„ morosa Simon 1876, 1937 = Pardosops morosa (L. Koch) 1870
„ muscicola Emerton 1911, Crosby 5 Bishop 1928 = Pardosa concinna (Thorell) 1877
„ neglecta L. Koch 1881 = Pardosa agrestis (Westring) 1862
„ nigra Simon 1876, 1937, Lessert 1910 = Acantholycosa nigra (C. L. Koch) 1834
„ nigra Stone 1890, Montgomery 1902 = Allocosa funerea (Hentz) 1844
„ nigra Calloni 1889 = nicht zu deuten!

Pardosa (Forts.):
- „ obsoleta Banks 1892 = Pardosa lapidicina Emerton 1885
- „ ocala Bryant 1935 = Pardosa longispinata Tullgren 1901
- „ orophila Gertsch 1933 = Pardosa yavapa Chamberlin 1925
- „ orthodox Chamberlin 1924 = Pardosa falcifera F. Cambridge 1902
- „ pallida Emerton 1885, 1902, Montgomery 1903, 1904 = Pardosa distincta (Blackwall) 1846
- „ parallela Banks 1898 = Allocosa parallela (Banks) 1898
- „ parvula Banks 1904 = Pardosa saxatilis (Hentz) 1844
- „ passibilis Schmidt 1895 = Pardosops passibilis (Cambridge) 1885
- „ pauxilla Montgomery 1904, Chamberlin 1908, Gertsch & Wallace 1935 = Pardosa uncatula F. Cambridge 1902
- „ pedestris Simon 1876 = Acantholycosa rupicola (Dufour) 1820
- „ peninsulana Banks 1898 = Pardosa sternalis (Thorell) 1877
- „ pentheri Nosek 1905 = Pardosella pentheri (Nosek) 1905
- „ praelongipes Schmidt 1895 = Evippa praelongipes (Cambridge) 1870
- „ pyrenaea Simon 1876, Lessert 1910 = Acantholycosa pyrenaea (Simon) 1876
- „ raboti Simon 1887 = Acantholycosa raboti (Simon) 1887
- „ retrorsa Banks 1911 = Scaptocosa retrorsa (Banks) 1911
- „ ricta Odenvall 1901 = Pardosops ricta (Odenvall) 1901
- „ riparia Simon 1876 = Pardosa kervillei Simon 1937
- „ riparia Lessert 1910 = Pardosa prativaga (L. Koch) 1870
- „ rubrofasciata L. Koch 1877 = Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert) 1865
- „ rupicola Simon 1937 = Acantholycosa rupicola (Dufour) 1820
- „ saccata Ohlert 1867 = Pardosa hortensis (Thorell) 1872
- „ saniuana Chamberlin 1928 = Pardosa yavapa Chamberlin 1925
- „ schenkeli Lessert 1904, 1910 = Passiena schenkeli (Lessert) 1904
- „ scita Montgomery 1902, 1904 = Pardosa milvina (Hentz) 1844
- „ seguarai, seguerari Simon 1937 = ? Pardosa strigellata Simon 1876
- „ silvicola Zimmermann 1871 = Pardosa lugubris (Walckenaer) 1802
- „ solivaga Montgomery 1902 = Hogna crassipes (Walckenaer) 1837
- „ sowerbyi Hogg 1912 = Lynxosa sowerbyi (Hogg) 1912
- „ spinosa Denis 1937 = Acantholycosa pyrenaea (Simon) 1876
- „ sternomaculata Mello-Leitao 1943 = Pirata sternomaculata (Mello-Leitao) 1943
- „ strandi Schenkel 1936 = Acantholycosa strandi Kratochvil 1935
- „ strandi Caporiacco 1947 = Pardosa strandembriki Caporiacco 1949
- „ striatipes C. L. Koch 1848 = Alopecosa striatipes (C. L. Koch) 1839
- „ striatipes Giebel 1867 = nicht zu deuten!
- „ subita Simon 1876 = Pardosa strigillata Simon 1876
- „ sudetica Simon 1876 = Acantholycosa sudetica (L. Koch) 1875
- „ tachypoda Emerton 1894, Montgomery 1904 = Pardosa xerampelina (Keyserling) 1876
- „ tarsalis Lessert 1910, Simon 1937 = Pardosa palustris (Linné) 1758
- „ tenuipes L. Koch 1882 = Pardosops tenuipes (L. Koch) 1882
- „ texana Banks 1904 = Pardosa mercurialis Montgomery 1904
- „ timida Simon 1897 = Hogna timidula (Roewer) 1951
- „ tristis Keyserling 1877 = Pardosa xerampelina (Keyserling) 1876
- „ tristis Chamberlin & Ivie 1941 = Pardosa groenlandica (Thorell) 1872
- „ tristis Mello-Leitao 1941 = Pardosa tristicella (Roewer) 1951
- „ uintana Gertsch 1933, Bishop 1949 = Pardosa giebelii (Pavesi) 1873
- „ uncata Banks 1894, Emerton 1894 = Pardosa mackenziana (Keyserling) 1876
- „ uncata Emerton 1894 = Pardosa giebelii (Pavesi) 1873
- „ utahensis Chamberlin 1919, Gertsch & Wallace 1935 = Pardosa distincta (Blackwall) 1846
- „ vancouveri Emerton 1917, 1919 = Pardosa sternalis (Thorell) 1877
- „ velox Schmidt 1895, Schenkel 1936 = Pardosa turkestanica (Roewer) 1951
- „ venatica L. Koch 1882 = Pardosops venatica (L. Koch) 1882
- „ venusta Banks 1892 = Pardosa lapidicina Emerton 1885

Pardosa (Forts.):
„ waglerii nigra Lessert 1910, Schenkel 1936 = Pardosa waglerii atra (Giebel) 1869
„ waglerii saturatior Simon 1937 = Pardosa waglerii atra (Giebel) 1869
Parerigone:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Eperigone**
„ fradeorum Berland 1932 = Anerigone fradeorum (Berland) 1932
„ maculata Crosby 1926 = Eperigone probata (Emerton) 1882
„ probata Crosby & Bishop 1928 = Catabrithorax probatus (Cambridge) 1874
„ simplex Crosby 1926 = Eperigone simplicia Roewer 1942
„ undulata Crosby 1926 = Eperigone contorta (Emerton) 1882
Parnaeus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Dendryphantes**
„ chrysis Peckham 1900 = Dendryphantes aurantius (Lucas) 1833
„ cuspidatus F. Cambridge 1901 = Lurio cuspidatus (F. Cambridge) 1901
„ fimbriatus F. Cambridge 1901 = Lurio fimbriatus (F. Cambridge) 1901
„ griseus Peckham 1901 = Dendryphantes opifex (Mc Cook) 1883
Parthenia:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Phlegra**
„ bivittata Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ africana Simon 1864 = Plexippus paykullii (Audouin) 1827
„ limbata Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ trifasciata Simon 1864 = Freya decorata (C. L. Koch) 1846
Partona:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Tacuna**
„ roseus Simon 1903, Petrunkevitch 1911, 1925 = Dryphias maccuni (Peckham) 1895
Pasithea:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Peucetia**
Patiscus:
„ peringueyi Simon 1893 = Patiscana peringueyi (Simon) 1893
Peckhamia:
„ caliginosa Chamberlin & Ivie 1944 = Packhamia americana (Peckham) 1892
„ idahoana Gertsch 1934 = Gertschia idahoana (Gertsch) 1934
„ scorpiona Peckham 1909, Kaston 1938 = Gertschia noxiosa (Hentz) 1850
„ scorpionia Emerton 1909 = Gertschia noxiosa (Hentz) 1850
Pedanostethus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Robertus**, wofür **Ctenium** einzutreten hat
„ clarkii Chyzer & Kulczynski 1894, Bösenberg 1902 = Ctenium (Robertus) arundineti (Cambridge) 1870
„ reprobus Simon 1884 = Halorates reprobus (Cambridge) 1879
Pedina:
„ cristata Menge 1866 = Mengea scopigera (Grube) 1859
Pedinella:
„ scopigera Dahl 1909 = Mengea scopigera (Grube) 1859
Pedinopistha:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Pandercetes**
Pedo:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Castianeira**
„ plumosus Cambridge 1898 = Castianeira pedo Roewer 1942
Pelecodon:
„ sundaica Doleschall 1859 = Calommata sundaica (Doleschall) 1859
Pelecopsis:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Lophocarenum**
„ cito Roewer 1928 = Trichopterna cito (Cambridge) 1872
„ inaequalis Simon 1864 = Lophocarenum elongatum (Wider) 1834
„ rugosum Crosby & Bishop 1928 = Ceratinops rugosa (Emerton) 1908

Pelecopsis (Forts.):
„ sculptum Crosby & Bishop 1931 = Lophocarenum sculptum Emerton 1917
„ sculptum Chamberlin & Ivie 1933 = Lophocarenum dignum (Chamberlin & Ivie) 1939
„ thoracatum Dahl 1912, Roewer 1928 = Lophocarenum radicola (L. Koch) 1875
Pelegrina:
„ geniculata Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
Pelinobius:
„ gabonica Simon 1888 = Myostola gabonica (Simon) 1888
Pella:
„ fasciata Cambridge 1892 = Davus fasciatus Cambridge 1892
Pellenes:
„ agilis Peckham 1909 = Pellenes auratus (Peckham) 1888
„ auratus Simon 1901 = Corythalia aurata Hentz) 1846
„ bedeli Simon 1876, Chyzer & Kulczynski = Pellenes nigrociliatus (L. Koch) 1875
„ bedeli Chyzer & Kulczynski 1891 ♀ 1891 ♂ = Pellenes campylophorus (Thorell) 1875
„ bilunatus Simon 1877 = Pellenes nigrociliatus bilunatus (Simon) 1877
„ brassayi Herman 1879 = Pellenes nigrociliatus (L. Koch) 1875
„ cognatus Peckham 1900, Banks 1901 = Pellenes auratus (Peckham) 1888
„ coronatus Peckham 1909 = Pellenes coecatus (Hentz) 1846
„ cristatus Peckham 1900 = Pellenes coecatus (Hentz) 1846
„ crucigerus Peckham 1886 = Pellenes tripunctatus (Walckenaer) 1802
„ delectus Peckham 1909 = Pellenes birgei Peckham 1900
„ facetus Petrunkevitch 1930 = Pellenes translatus Peckham 1901
„ festus Peckham 1900 = Pellenes brunneus Peckham 1900
„ fischeri Simon 1876 = Pellenes frischii (Audouin) 1827
„ formosus Peckham 1900, Banks 1905 = Pellenes clypeatus (Banks) 1895
„ howardi Peckham 1900 = Pellenes viridipes (Hentz) 1846
„ hoyi Banks 1905, Peckham 1909 = Evarcha leucophaea (C. L. Koch) 1848
„ klauseri Banks 1904, Peckham 1909 = Pellenes brunneus Peckham 1900
„ latens Peckham 1900 = Pellenes hondurasus Roewer 1951
„ locuples Banks 1903 = Corythalia locuples (Simon) 1888
„ nigriceps Keyserling 1885 = Pellenes decorus (Blackwall) 1846
„ peregrinus Peckham 1900, 1909 = Pellenes viridipes (Hentz) 1846
„ roseus Emerton 1909, Peckham 1909 = Pellenes decorus (Blackwall) 1846
„ semiater Simon 1876, Schenkel 1938 = Pellenes arcigerus (Walckenaer) 1837
„ speciosus Banks 1904 = Pellenes americanus (Keyserling) 1885
„ splendens Peckham 1900, 1909 = Pellenes decorus (Blackwall) 1846
„ subsultans Simon 1876 = Pellenes geniculatus subsultans (Simon) 1868
„ townsendii Peckham 1900 = Pellenes limatus Peckham 1900
Pelmopoda:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Olios**
Peltorrhynchus:
„ rostratus Thorell 1892, Workman 1896 = Strigoplus albostriatus Simon 1885
Peltosoma:
„ ixoides Simon 1870 = Cyrtarachne ixoides (Simon) 1870
„ tuberculiferum Simon 1870 = Cyrtarachne ixoides (Simon) 1870
Penionomus:
„ longipalpis Dyal 1935 = Penionomus dyali Roewer 1951
Peniza:
„ europaea Ausserer 1871 = Cyrtarachne icoides (Simon) 1870
„ testudo Thorell 1868 = Paraplectana thorntoni (Blackwall) 1865
Peponocranium:
„ biovatum Simon 1884 = Thyreosthenius biovatus (Cambridge) 1875
„ decollatum Hull 1932 = Hybocoptus decollatus (Simon) 1881

Peponocranium (Forts.):
„ orbiculatum Simon 1884, Bösenberg 1902, Dahl 1912 = Peponocranium ludicrum (Cambridge) 1861
,, penultimum Simon 1884 = Diastanillus penultimus (Cambridge) 1882
„ pumilus Dahl 1912 = Pocadicnemis pumila (Blackwall) 1841
Perenethis:
,, indica Pocock 1900 = Perenethis sindica (Simon) 1897
„ venusta L. Koch 1878, Thorell 1881 = unifasciata (Doleschall) 1859
Pergassus:
„ formosus Thorell 1894 = Myrmarachne formosa (Thorell) 1893
Perissoblemma:
„ approximata Cambridge 1893, F. Cambridge 1902 = Enna approximata (Cambridge) 1893
„ thomisiformis Cambridge 1881 = Trechalea thomisiformis (Cambridge) 1881
Perytraeus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Peritraeus**
Peucetia:
„ abboti Chamberlin & Ivie 1944 = Peucetia viridans (Hentz) 1845
„ aurosa Mc Cook 1883 = Peucetia viridans (Hentz) 1845
„ kunenensis Lawrence 1927 = Peucetia fasciiventris kunenensis (Lawrence) 1927
„ longipes Keyserling 1880 = Tapinillus longipes (Taczanowski) 1872
„ madagascariensis Lenz 1886 = Peucetia lucasii (Vinson) 1863
„ nigropunctata Simon 1884 = Peucetia viridana (Stoliczka) 1869
„ prasina Thorell 1887 = Peucetia viridana (Stoliczka) 1869
„ purpureofasciata Strand 1908 = ? Peucetia casseli Simon 1899
,, thalissina Keyserling 1876 ♂ = Peucetia bibranchiata F. Cambridge 1902
Pezionyx:
„ guianensis Taczanowski 1874 = Ischnothele guianensis (Walckenaer) 1837
Phaedima:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Paculla**
Phaenothele:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Bolostromus**
Phalaea:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Tetragonophthalma**
Phalangium:
„ phaleratum Panzer 1801 = Asagena phalerata (Panzer) 1801
Phalops:
,, acuminatus Dahl 1886 = Walckenaeria acuminata Blackwall 1833
„ conicus Menge 1871 = Savignia frontata Blackwall 1833
„ cornutus Menge 1868 = Walckenaeria acuminata Blackwall 1833
„ cuspidatus Bertkau 1880 = Cornicularia cuspidata (Blackwall) 1833
„ furcillatus Menge 1871 = Tigellinus furcillatus (Menge) 1871
„ gibbicollis Menge 1871 = Oedothorax apicatus (Blackwall) 1850
Phanoptilus:
„ sericeus Thorell 1887 = Corinna gulosa (Thorell) 1878
Phantyna:
„ micro Chamberlin 1948 = Dictyna micro (Chamberlin & Ivie) 1944
Phaulothrix:
„ robusta Hull 1932 = Centromerus robustus (Westring) 1851
Phiale:
„ bristowei Caporiacco 1948 = Phiale pseudaprica Caporiacco 1947
„ delecta Banks 1929 = Phiale interrupta (F. Cambridge) 1901
„ gratiosa C. L. Koch 1846 et sequ. = Phiale mimica (C. L. Koch) 1846
„ lineola Chamberlin & Ivie 1936 = Phiale dybowskii (Taczanowski) 1871
„ modesta C. L. Koch 1846 = Dendryphantes modestus (C. L. Koch) 1846
,, panamense Petrunkevitch 1925, Banks 1929 = Phiale panamae Chamberlin 1916
„ tamatavi Peckham 1885 = Thyene tamatavi (Vinson) 1863

Phidippus (= Phidippia):

Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Dendryphantes**

„ albomaculatus Keyserling 1885 = Dendryphantes purpuratus (Keyserling) 1885
„ albomaculatus Peckham 1888 = Dendryphantes texanus (Banks) 1905
„ albulatus F. Cambridge 1901 = Dendryphantes tyrellii (Peckham) 1906
„ alchymistus C. L. Koch 1846 = Dendryphantes audax (Hentz) 1845
„ arizonensis Peckham 1888, 1909, Banks 1901, F. Cambridge 1901 = Dendryphantes tuberculatus (F. Cambridge) 1901
„ asinarius C. L. Koch 1846 = Dendryphantes purpuratus (Keyserling) 1885
„ auctus C. L. Koch 1846 = nicht zu deuten!
„ bardus Peckham 1901 = Dendryphantes insolens (Hentz) 1845
„ bicolor Keyserling 1885 = Dendryphantes johnsonii (Peckham) 1883
„ bilineatus Tullgren 1901 = Dendryphantes clarus (Keyserling) 1885
„ borealis Banks 1895 = Dendryphantes purpuratus (Keyserling) 1885
„ brunneus Emerton 1891, 1909, Peckham 1909 = Dendryphantes princeps (Peckham) 1883
„ brunneus F. Cambridge 1901 = Dendryphantes deceptus Petrunkevitch 1911
„ bryantae Kaston 1945 = Dendryphantes audax (Hentz) 1845
„ bucculentus Gerstäcker 1873 = Thyene bucculenta (Gerstäcker) 1873
„ californicus Peckham 1901, 1909 = Dendryphantes graciosus Roewer 1951
„ castrensis C. L. Koch 1846 = ? Dendryphantes clarus (Keyserling) 1885
„ chrysis Banks 1909 = Dendryphantes aurantius (Lucas) 1833
„ clarconensis Tullgren 1901 = Dendryphantes clarus (Keyserling) 1885
„ comatus Peckham 1901, 1909 = Dendryphantes consimilis Roewer 1951
„ concinnatus C. L. Koch 1846 = Dendryphantes audax (Hentz) 1845
„ diardii Simon 1864 = Hyllus diardii (Walckenaer) 1837
„ dubiosus C. L. Koch 1846 = Dendryphantes audax (Hentz) 1845
„ electus C. L. Koch 1846 = ? Dendryphantes purpuratus (Keyserling) 1885
„ elegans C. L. Koch 1846 = Dendryphantes audax (Hentz) 1845
„ ferrugineus Scheffer 1904 = Dendryphantes insolens (Hentz) 1845
„ fraudulentus Chamberlin & Ivie 1944 = ? Dendryphantes insignarius (C. L. Koch) 1846
„ fraternus Banks 1898 = Dendryphantes aurantius (Lucas) 1833
„ fuscipes C. L. Koch 1846 = Dendryphantes fascipes (C. L. Koch) 1846
„ galathea Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ galathea Peckham 1888, 1901 = Dendryphantes purpuratus (Keyserling) 1885
„ gracilis Keyserling 1885 = Dendryphantes putnamii (Peckham) 1883
„ incertus Peckham 1901, Bryant 1942 = Dendryphantes mystaceus (Hentz) 1846
„ inflatus Gerstäcker 1873 = Thyene inflata (Gerstäcker) 1873
„ insolens Peckham 1888 = Dendryphantes clarus (Keyserling) 1885
„ insolens Peckham 1901, 1909 = Dendryphantes insolens (Hentz) 1845
„ insolens Kaston 1938 = Dendryphantes whitmani (Peckham) 1909
„ keratodes Hasselt 1882, 1893 = Hyllus keratodes (Hasselt) 1882
„ latus Chamberlin & Ivie 1944 = Dendryphantes latus (Walckenaer) 1837
„ lunulatus C. L. Koch 1846 = Dendryphantes audax (Hentz) 1845
„ minutus Banks 1892 = Dendryphantes clarus (Keyserling) 1885
„ molinor Chamberlin 1925 Dendryphantes marginatus (Walckenaer) 1837
„ montivagus Peckham 1901 = Dendryphantes tyrellii (Peckham) 1901
„ morsitans Peckham 1888, 1896 = Dendryphantes audax (Hentz) 1845
„ morsitans Tullgren 1901 part. = Dendryphantes variegatus (Lucas) 1833
„ morsitans Tullgren 1901 part. = Dendryphantes tullgreni (Wallace) 1950
„ multiformis Emerton 1891, 1902, Peckham 1901 = Dendryphantes clarus (Keyserling) 1885
„ multivaga Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ mundulus C. L. Koch 1846 = Dendryphantes audax (Hentz) 1845
„ mystaceus Emerton 1891, 1902 = Dendryphantes purpuratus (Keyserling) 1885
„ mystaceus Peckham 1909 = Dendryphantes mystaceus (Hentz) 1846

Phidippus (Forts.):
- „ oaklandensis Tullgren 1901 = Dendryphantes cardinalis (Hentz) 1845
- „ obcurus Peckham 1888, 1909 = Dendryphantes obscurus (Peckham) 1888
- „ obscurus Peckham 1901 = Dendryphantes carolinensis (Peckham) 1909
- „ olivaceus Tullgren (in schedula) = Dendryphantes clarus (Keyserling) 1885
- „ orbicularis Gerstäcker 1873 = Thyene orbicularis (Gerstäcker) 1873
- „ orichalceus Peckham 1896 = Dendryphantes aurantius (Lucas) 1833
- „ paludatus C. L. Koch 1846 = Dendryphantes cardinalis (Hentz) 1845
- „ personatus C. L. Koch 1846 = Dendryphantes audax (Hentz) 1845
- „ pileatus Chamberlin & Ivie 1944 = Dendryphantes pileatus (Walckenaer) 1837
- „ pilosus Chamberlin & Ivie 1944 = Dendryphantes pilosus (Walckenaer) 1837
- „ puerperus Emerton 1902 = Thiodina puerpera (Hentz) 1846
- „ pulcher Chamberlin & Ivie 1944 = Dendryphantes pulcher (Walckenaer) 1837
- „ purpurarius Chamberlin & Ivie 1944 = Dendryphantes purpurarius (Walckenaer) 1837
- „ purpurifer C. L. Koch 1846 = Dendryphantes audax (Hentz) 1845
- „ rimator Simon 1864, Chamberlin & Ivie 1944 = ? Dendryphantes clarus (Keyserling) 1885
- „ rimator Peckham 1901 = Dendryphantes formosus (Peckham) 1883
- „ ruber Keyserling 1885, Emerton 1891 = Dendryphantes mccookii (Peckham) 1883
- „ rufimanus C. L. Koch 1846 = Dendryphantes audax (Hentz) 1845
- „ rufus Peckham 1888 ♂ = Dendryphantes whitmani (Peckham) 1909
- „ rufus Emerton 1891, 1902, Peckham 1888 ♀, 1901 = Dendryphantes clarus (Keyserling) 1885
- „ sagax Simon 1864, Chamberlin & Ivie 1944 = Dendryphantes sagax (Walckenaer) 1837
- „ setipes Karsch 1879 = Plexippus setipes (Karsch) 1879
- „ smaragdifer C. L. Koch 1846 = Dendryphantes audax (Hentz) 1845
- „ testaceus C. L. Koch 1846 = nicht zu deuten!
- „ togatus C. L. Koch 1846 = Dendryphantes regius (C. L. Koch) 1846
- „ tridentiger Simon 1864, Chamberlin & Ivie 1944 = Dendryphantes tridentiger (Walckenaer) 1837
- „ tripunctatus Emerton 1891, 1902 = Dendryphantes audax (Hentz) 1845
- „ variegatus Kaston 1938 = Dendryphantes audax (Hentz) 1845

Phidyle:

Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Oxysoma**

Philaeus:
- „ bicolor Simon 1876, Kulczynski 1891 = Carrhotus xanthogramma (Walckenaer) 1825
- „ chrysis Peckham 1888, Banks 1909 = Dendryphantes aurantius (Lucas) 1833
- „ consimilis Banks 1898 = Dendryphantes limbatus (Banks) 1898
- „ cupreonitens Simon 1899 = Thiania cupreonitens (Simon) 1899
- „ farneus Peckham 1888 = Dendryphantes farneus (Peckham) 1888
- „ fartilis Peckham 1888 = Dendryphantes fartilis (Peckham) 1888
- „ limbatus Banks 1898 = Dendryphantes limbatus (Banks) 1898
- „ luteostriatus Keyserling 1877 = Plexippus luteostriatus (Keyserling) 1877
- „ luteus Peckham 1896 = Dendryphantes luteus (Peckham) 1896
- „ manicus Peckham 1903 = Pachypoessa albimana Simon 1902
- „ maniscus Peckham 1903 = Hyllus maniscus (Peckham) 1903
- „ metallescens L. Koch 1879 = Mollika metallescens (L. Koch) 1879
- „ mexicanus Peckham 1888 = Dendryphantes merus Petrunkevitch 1911
- „ militaris Peckham 1888 = Dendryphantes marginatus (Walckenaer) 1837
- „ monticola Banks 1896 = Dendryphantes insignarius (C. L. Koch) 1846
- „ multicolor Banks 1898 = Dendryphantes aurantius (Lucas) 1833
- „ neglectus Simon 1876 = Mogrus neglectus (Simon) 1868
- „ princeps Peckham 1888 = Dendryphantes princeps (Peckham) 1883
- „ princeps Banks 1892 = Dendryphantes clarus (Keyserling) 1885

Philaeus (Forts.):
„ rimator Peckham 1888, Banks 1899 = Dendryphantes clarus (Keyserling) 1885
„ taeniatus Pavesi 1877 = Menemerus taeniatus (L. Koch) 1867
„ trimaculatus Banks 1898 = Dendryphantes trimaculatus (Banks) 1898
„ vinsonii Peckham 1885 = Hyllus vinsonii (Peckham) 1885

Philarcus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Phylarchus**

Philesius:
„ marmoratus Simon 1893 = Pelicinus marmoratus Simon 1891
„ vernalis Bryant 1945 = Pelicinus vernalis (Bryant) 1945

Philia:
„ bilineata Simon 1864 = Philaeus bilineatus (Walckenaer) 1825
„ erythrogaster Simon 1864 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
„ gratiosa Bertkau 1880 = Philaeus mimica (C. L. Koch) 1846
„ haemorrhoica C. L. Koch 1846 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
„ sanguinolenta C. L. Koch 1846 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
„ setigera Doleschall 1852 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
„ vaillanti Simon 1864 = Plexippus paykullii (Audouin) 1827

Phillyra:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Uloborus**
„ mammeata Hentz 1850 = Uloborus glomosus (Walckenaer) 1841
„ riparia Hentz 1850 = Uloborus glomosus (Walckenaer) 1841

Philodromus (= Philodroma):
„ abboti Walckenaer 1837, Chamberlin & Ivie 1944 = ? Philodromus marxii (Keyserling) 1884
„ adjacens Cambridge 1876 = Thanatus adjacens (Cambridge) 1876
„ affinis Wider 1834 = Philodromus aureolus (Clerck) 1757
„ aganus Chamberlin & Gertsch 1928 = Apollophanes texanus Banks 1909
„ albicans Bösenberg 1902 = Philodromus bösenbergi Mello-Leitao 1929
„ albini Audouin 1827 = Thanatus albini (Audouin) 1827
„ alpestris L. Koch 1876, Chyzer & Kulczynski 1891, Lessert 1910 = Philodromus vagulus Simon 1875
„ ambara Urquhart 1884, 1886 = Diaea ambara (Urquhart) 1884
„ ambiguus Blackwall 1867 = Philodromus margaritatus (Clerck) 1757
„ arenarius Menge 1875 = Philodromus fallax Sundevall 1832
„ aureolus marmoratus Kulczynski 1892 = Philodromus aureolus constellatus (Simon) 1875
„ auronitens Ausserer 1867, Hansen 1885 = Philodromus collinus C. L. Koch 1835
„ auronitens Simon 1875, Becker 1882 = Philodromus fuscomarginatus (De Geer) 1778
„ banksi Mello-Leitao 1929 = Philodromus marxii Keyserling 1884
„ bidentatus Emerton 1893 = Philodromus placidus Banks 1892
„ bistigma Simon 1870, 1875 = Philodromus pulchellus Lucas 1846
„ brevis Emerton 1893 = Philodromus satullus Keyserling 1880
„ caespiticolis Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ canadensis Emerton 1917 = Philodromus aureolus (Clerck) 1757
„ carolinus Banks 1911 = Philodromus imbecillus Keyserling 1880
„ cespiticolis (caespiticola) Walckenaer 1837, Blackwall 1861, Dahl 1883, Bösenberg 1902 = Philodromus aureolus cespiticolis (Walckenaer) 1837
„ cespiticolis Westring 1862 = Philodromus collinus (C. L. Koch) 1835
„ cinereus Westring 1862 = Philodromus fuscomarginatus (De Geer) 1778
„ clarae Bertkau 1880 = Philodromus rufus Walckenaer 1825
„ clarkii Blackwall 1850, 1861 = Philodromus rufus Walckenaer 1825
„ clarus Keyserling 1880 = Philodromus virescens Keyserling 1880
„ clerckii Audouin 1827 = nicht zu deuten!
„ conspersus Lebert 1877 = nicht zu deuten!

Philodromus (Forts.):

„ constellatus Simon 1875, Cambridge 1881, Bösenberg 1902 = Philodromus aureolus constellatus (Simon) 1875)
„ crenifer Chamberlin & Gertsch 1928 ♂ = Apollophanes texanus Banks 1904
„ crenifer Chamberlin & Gertsch 1928 ♀ = Philodromus virescens Keyserling 1880
„ cyaneus Petrunkevitch 1911 = Philodromus cayanus Taczanowski 1872
„ debilis Simon 1875 = Philodromus pulchellus Lucas 1846
„ decorus Westring 1862 = Philodromus histrix (Latreille) 1819
„ delectus Cambridge 1863 = Philodromus fallax Sundevall 1832
„ diardi Doleschall 1859 = nicht zu deuten!
„ elegans Canestrini 1874 ♂ = Philodromus margaritatus (Clerck) 1757
„ elegans Lebert 1877, Franganillo 1921, 1925 = nicht zu deuten!
„ emarginatus Lessert 1904 = Philodromus albomaculatus (Bösenberg) 1899
„ emertoni Bryant 1933 = Philodromus mineri Gertsch 1933
„ exilis Banks 1892 = Philodromus rufus Walckenaer 1825
„ exilis Kaston 1938, Chickering 1940, Chamberlin & Ivie 1944 = Philodromus placidus Banks 1892
„ fabricii Audouin 1827 = Thanatus fabricii (Audouin) 1827
„ fabricii Cambridge 1872 = Thanatus adjacens (Cambridge) 1876
„ fallax Canestrini & Pavesi 1870, Pavesi 1875 = nicht zu deuten!
„ formicinus Sundevall 1832, Westring 1862, Menge 1875 = Thanatus formicinus (Clerck) 1757
„ funebris Nicolet 1849 = Petrichus funebris (Nicolet) 1849
„ fuscolimbatus Lucas 1846, Simon 1932 = Philodromus aureolus fuscolimbatus (Lucas) 1846
„ gracilentus Lucas 1846 = Tibellus oblongus (Walckenaer) 1802
„ griseus Westring 1862 = Philodromus emarginatus (Schrank) 1803
„ hirsutus Cambridge 1863, 1873 = Thanatus striatus C. L. Koch 1845
„ histrix Getaz 1889 = nicht zu deuten!
„ hoples Chamberlin & Gertsch 1928 = Philodromus californicus Keyserling 1883
„ inquisitor Walckenaer 1837 = Tmarus angulatus (Walckenaer) 1837
„ inquisitor Thorell 1877, Emerton 1894 = Philodromus alascensis Keyserling 1884
„ jejunus Walckenaer 1825, 1837 = Philodromus margaritatus (Clerck) 1757
„ karschi Mello-Leitao 1929 = Philodromus spinitarsis Simon 1895
„ keyserlingi Gertsch 1934, Kaston 1938 = Philodromus washita Banks 1932
„ laevipes Tullgren 1944 = Philodromus margaritatus (Clerck) 1757
„ laevipes tigrinus Bösenberg & Strand 1906, Tullgren 1944 = Philodromus margaritatus tigrinus (De Geer) 1778
„ laricium Simon 1875, Lessert 1910 = Philodromus corticinus (C. L. Koch) 1838
„ lentiginosus Keyserling 1882 = ? Philodromus alascensis Keyserling 1884
„ limbatus Sundevall 1832, C. L. Koch 1845, Ohlert 1867, Westring 1862 = Philodromus dispar Walckenaer 1825
„ limbatus Prach 1866 = Philodromus fuscomarginatus (De Geer) 1778
„ lineata Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ lineatipes Cambridge 1878, 1881 = Philodromus emarginatus (Schrank) 1803
„ lineatus Emerton 1893, 1902 = Philodromus imbecillus Keyserling 1880
„ linnaei Audouin 1827 = Eusparassus walckenaerii (Audouin) 1827
„ lividus Simon 1875 = Philodromus aureolus lividus (Simon) 1875
„ longipalpis Simon 1870, 1875 = Philodromus aureolus longipalpis (Simon) 1870
„ louisianus Chamberlin 1924 = Philodromus laticeps Keyserling 1880
„ luteus Nicolet 1849 = Petrichus luteus (Nicolet) 1849
„ macrotarsus Emerton 1917 = Philodromus infuscatus Keyserling 1880
„ maculatipes Cambridge 1893 = Apollophanes maculatipes (Cambridge) 1893
„ maritimus Simon 1875 = Philodromus lepidus Blackwall 1870
„ medius Cambridge 1872, Strand 1913 = Philodromus glaucinus Simon 1870
„ medius cinereoalbus Strand 1913 = Philodromus glaucinus cinereoalbus (Strand) 1913

Philodromus (Forts.):
- „ meridionalis Keyserling 1891 = Cleocnemis meridionalis (Keyserling) 1891
- „ minusculus Banks 1892 = Philodromus marxii Keyserling 1884
- „ minutus Banks 1892, Comstock 1912 = Philodromus satullus Keyserling 1880
- „ montanus Caporiacco 1949 = Philodromus caporiaccoi Roewer 1951
- „ niveus Simon 1895 = Petrichus niveus (Simon) 1895
- „ oblongiusculus Lucas 1846 = Paratibellus oblongiusculus (Lucas) 1846
- „ oblongus Walckenaer 1837, Blackwall 1861, Westring 1862 = Tibellus oblongus (Walckenaer) 1802
- „ oblongus Bryant 1933 = Philodromus alascensis Keyserling 1884
- „ obscurus Blackwall 1871 = Philodromus rufus Walckenaer 1825
- „ obscurus Keyserling 1884 = Philodromus keyserlingii Marx 1889
- „ ornatus Lucas 1846 = Thanatus ornatus (Lucas) 1846
- „ ornatus Banks 1892, Emerton 1893, 1902 = Philodromus marxii Keyserling 1884
- „ ovatus Urquhart 1886 = Diaea albolimbata L. Koch 1875
- „ pallidus Walckenaer 1825, 1837, Dahl 1883 = Philodromus emarginatus (Schrank) 1803
- „ pallidus Blackwall 1857, 1861 = Philodromus margaritatus (Clerck) 1757
- „ pellax Herman 1879 = Philodromus rufus Walckenaer 1825
- „ pernix Simon 1875 = Philodromus simoni Mello-Leitao 1929
- „ pictus Emerton 1893, 1902 = Philodromus rufus Walckenaer 1825
- „ politus Simon 1870, 1875 = Philodromus aureolus politus (Simon) 1870
- „ praeceps Walckenaer 1837 = Teippus praeceps (Walckenaer) 1837
- „ praedatus Cambridge 1870, 1881, Simon 1875 = Philodromus collinus C. L. Koch 1835
- „ praelustris Banks 1892, 1913 = Philodromus pernix Blackwall 1846
- „ punctatus Nicolet 1849 = Tmarus punctatus (Nicolet) 1849
- „ quadrilineatus Lucas 1838 = Thanatus quadrilineatus (Lucas) 1838
- „ quadrivulva Strand 1906 = Philodromus hiulcus (Pavesi) 1883
- „ rhombiferens Audouin 1827 = Thanatus formicinus (Clerck) 1757
- „ robustus Emerton 1892, Chamberlin & Ivie 1944 = Philodromus laticeps Keyserling 1880
- „ sabulosus Menge 1875, Chyzer & Kulczynski 1891, Bösenberg 1902 = Thanatus sabulosus (Menge) 1875
- „ senilis Walckenaer 1837 = Thaumasia senilis Perty 1833
- „ setigerus Cambridge 1872 = Thanatus setigerus (Cambridge) 1872
- „ signifer Banks 1892 = Philodromus expositus Keyserling 1880
- „ sphaeroides Urquhart 1885, 1886 = Diaea sphaeroides (Urquhart) 1885
- „ syntheticus Chamberlin 1925 = Apollophanes texanus Banks 1904
- „ thorellii Cambridge 1872 = Vacchellia thorellii (Cambridge) 1872
- „ thorellii Marx 1889 = Philodromus alascensis Keyserling 1884
- „ tigrinus Walckenaer 1825, 1837 = Philodromus poecilis (Thorell) 1872
- „ tigrinus Sundevall 1832, Westring 1862 = Philodromus margaritatus tigrinus (De Geer) 1778
- „ trilineatus Sundevall 1833 part. = Tibellus oblongus (Walckenaer) 1802
- „ truncatus Nicolet 1849, Simon 1864 = Tmarus trunctatus (Nicolet) 1849
- „ ubiquitor Mello-Leitao 1929 = Philodromus alascensis Keyserling 1884
- „ unicolor Banks 1892 = Philodromus infuscatus Keyserling 1880
- „ utus Chamberlin 1921 = Philodromus infuscatus Keyserling 1880
- „ varians Kulczynski 1908 = Philodromus alascensis Keyserling 1884
- „ variatus Blackwall 1837, 1861 = Philodromus collinus C. L. Koch 1835
- „ vivax Blackwall 1852 = nicht zu deuten!
- „ vulgaris Keyserling 1880, Banks 1892, Emerton 1893 = Philodromus pernix Blackwall 1846
- „ waldkenaerii Audouin 1827 = Eusparassus waldkenaerii (Audouin) 1827
- „ washita Banks & Newport 1932 = Philodromus keyserlingii Marx 1889

Philoeca:
- „ domestica Menge 1870 = Tegenaria ferruginea (Panzer) 1804

Philoica:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Tegenaria**
„ cicurea C. L. Koch 1850 = Cicurina cicurea (Fabricius) 1793
„ civilis C. L. Koch 1850 = Tegenaria domestica (Clerck) 1757
„ coarctata Simon 1864 = Textrix coarctata (Dufour) 1831
„ domestica C. L. Koch 1837 = Tegenaria ferruginea (Panzer) 1804
„ linotina C. L. Koch 1843 = Agroeca brunnea (Blackwall) 1833
„ notata C. L. Koch 1841 = Liocranum rupicola (Walckenaer) 1825
„ stricta C. L. Koch 1850 = Tegenaria atrica (C. L. Koch) 1843

Philoponella:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Uloborus**

Philoponus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Uloborus**

Philotherus:
„ setosus Thorell 1895, Simon 1903 = Philotheroides setosus (Thorell) 1895

Phintia:
„ viridimicans Simon 1901 = Phintodes viridimicans (Simon) 1901

Phlegra:
„ bonnetii Simon 1876 = Mogrus bonnetii (Audouin) 1827
„ fulviventris Simon 1876 = Dendryphantes fulviventris (Lucas) 1846
„ icioides Simon 1889 = Icius icioides (Simon) 1889
„ leoparda Emerton 1891, Peckham 1909 = Phlegra fasciata (Hahn) 1826
„ lippiens Simon 1876 = Phlegra bresnieri (Lucas) 1846

Phloeodrassus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Haplodrassus**

Phloeoides:
„ abbreviata Simon 1864 = Thomisus onustus Walckenaer 1805
„ diadema Simon 1864 = Thomisus onustus Walckenaer 1805
„ horrida Simon 1864 = Pistius truncatus (Pallas) 1772
„ secata Simon 1864 = Stephanopis secata (Walckenaer) 1805
„ truncata Simon 1864 = Pistius truncatus (Pallas) 1772

Phlogiellus:
„ insulanus Giltay 1934 = Selenocosmia insulana Hirst 1909
„ obscurus Giltay 1934 = Selenocosmia obscura Hirst 1909
„ subarmatus Pocock 1900 = Neochilobrachys subarmatus (Pocock) 1891

Phlogius:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Selenocosmia**
„ cervinus Thorell 1895 ♂ = Chilobrachys andersonii (Pocock) 1895
„ cervinus Thorell 1895 ♀ = Chilobrachys flavopilosus (Simon) 1884
„ cunicularius Simon 1892 = Chilobrachys cunicularius (Simon) 1892
„ oculatus Thorell 1895 = Chilobrachys oculatus (Thorell) 1895
„ sericeus Thorell 1895 = Chilobrachys sericeus (Thorell) 1895

Phoebe:
„ bicolor Simon 1864 = Carrhotus xanthogramma (Walckenaer) 1825
„ floricola C. L. Koch 1850, Simon 1864 = Sitticus littoralis (Hahn) 1831
„ jucunda Simon 1864 = Evarcha jucunda (Lucas) 1846
„ rupicola Simon 1864 = Sitticus rupicola (C. L. Koch) 1837
„ saxicola Simon 1864 = Sitticus littoralis (Hahn) 1831

Pholcomma:
„ hirsutum Emerton 1882 = Ancylorrhanis hirsutum (Emerton) 1882
„ projectum Thorell 1870 = Pholcomma gibbum (Westring) 1851
„ rostratum Emerton 1882 = Floricomus rostratus (Emerton) 1882
„ thorelli Simon 1873 = Pholcomma gibbum (Westring) 1851

Pholcus:
„ altiventer Keyserling 1891 = Cryssocnemis altiventer (Keyserling) 1891
„ americanus Nicolet 1849 = Pholcus phalangioides (Fuesslin) 1775
„ annulipes Keyserling 1877 = Blechroscelis annulipes (Keyserling) 1877
„ atlanticus Hentz 1850 = Pholcus phalangioides (Fuesslin) 1775

Pholcus (Forts.):
- „ barbarus Lucas 1846 = Holocnemus pluchii (Scopoli) 1763
- „ borbonicus Vinson 1863, Simon 1873 = Artema mauriciana (Walckenaer) 1837
- „ borbonicus L. Koch 1875 = Artema kochii (Kulczynski) 1901
- „ caudatus Dufour 1820, Walckenaer 1837, Simon 1866, 1873 = Holocnemus caudatus (Dufour) 1820
- „ coeruleus Keyserling 1891 = Blechroscelis coerulea (Keyserling) 1891
- „ conicus Franganillo 1925 = nicht zu deuten!
- „ cornutus Keyserling 1887, Emerton 1902 = Psilochorus cornutus (Keyserling) 1887
- „ cyaneomaculatus Keyserling 1891 = Blechroscelis cyaneomaculata (Keyserling) 1891
- „ cyaneotaeniatus Keyserling 1891 = Blechroscelis cyaneotaeniata (Keyserling) 1891
- „ distinctus Cambridge 1869 = Smeringopus elongatus (Vinson) 1863
- „ doriae Thorell 1881 = Artema mauriciana Walckenaer 1837
- „ elongatus Vinson 1863 = Smeringopus elongatus (Vinson) 1863
- „ forskalii Thorell 1871, Chyzer & Kulczynski 1894 = Hoplopholcus forskalii (Thorell) 1871
- „ gibbosus Keyserling 1877, Workman 1896 = Physocyclus globosus (Taczanowski) 1874
- „ globosus Taczanowski 1874 = Physocyclus globosus (Taczanowski) 1874
- „ grossipalpus Simon 1866 = Pholcus opilionoides (Schrank) 1781
- „ imbecillus Keyserling 1891 = Litoporus imbecillus (Keyserling) 1891
- „ impressus C. L. Koch 1838 = Holocnemus pluchii (Scopoli) 1763
- „ lucifugus var. Simon & Fage 1923 = Pholcus fagei Kratochvil 1940
- „ luteus Keyserling 1891 = Litoporus luteus (Keyserling) 1891
- „ lyoni Blackwall 1867 = Crossopriza lyoni (Blackwall) 1867
- „ margarita Workman 1878 = Smeringopus elongatus (Vinson) 1863
- „ nemastomoides C. L. Koch 1838 = Pholcus phalangioides (Fuesslin) 1775
- „ opilionoides Westring 1862 = Pholus phalangioides (Fuesslin) 1775
- „ pallidus Blackwall 1858 — Smeringopus pallidus (Blackwall) 1858
- „ phalangioides Hahn 1834 = Pholcus opilionoides (Schrank) 1781
- „ phalangioides Doleschall 1859 = Smeringopus elongatus (Vinson) 1863
- „ pullulus Thorell 1877 = Psilochorus pullulus (Hentz) 1850
- „ quadripunctatus Lucas 1846 = Spermophora senoculata (Dugès) 1836
- „ reini C. Koch 1873 = nicht zu deuten!
- „ rivulatus Audouin 1827, Walckenaer 1837 = Holocnemus pluchii (Scopoli) 1763
- „ rotundatus Karsch 1879 = Artema atlanta Walckenaer 1837
- „ ruber Canestrini & Pavesi 1868 = nicht zu deuten!
- „ ruralis Blackwall 1858 = Holocnemus pluchii (Scopoli) 1763
- „ semicaudatus Cambridge 1876 = Crossopriza semicaudata (Cambridge) 1876
- „ senoculatus Dugès 1836 = Spermophora senoculata (Dugès) 1836
- „ sexoculatus Simon 1866 = Spermophora senoculata (Dugès) 1836
- „ sisyphoides Doleschall 1857 = Artema sisyphoides (Doleschall) 1857
- „ sphaeroides L. Koch 1872 = Psilochorus sphaeroides (L. Koch) 1872
- „ tigrinus Taczanowski 1873 = Priscula tigrina (Taczanowski) 1873
- „ tipuloides L. Koch 1872, Marx 1889 = Smeringopus elongatus (Vinson) 1863
- „ togatus Keyserling 1891 = Cryssocnemis togata (Keyserling) 1891

Pholeuon:
- „ longipes L. Koch 1873 = Arbanitis longipes (L. Koch) 1873

Phoneutria:

Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Ctenus**
- „ auricularis Karsch 1879 = Ctenus erythrochelis (Simon) 1878
- „ debilis Pavesi 1895, Cambridge 1898 = Anahita debilis (Pavesi) 1895
- „ fasciata Lenz 1886 = Vulsor fasciatus (Lenz) 1886
- „ oculifera Karsch 1879 = Cupiennius salei (Keyserling) 1876

Phoneyusa:
- „ greeffi Karsch 1886 = Hysterocrates greeffi (Karsch) 1886
- „ greeffi Simon 1892 = Hysterocrates didymus Pocock 1900
- „ greshoffi Simon 1892 = Hysterocrates greshoffi (Simon) 1891
- „ occidentalis Pocock 1899 = Myostola occidentalis (Lucas) 1858
- „ umangiana Strand 1919 = Umangia umangiana (Strand) 1919

Phoroncidia:
- „ acrosomoides Hasselt 1882 = Phoroncidia lygeana (Walckenaer) 1841
- „ tricuspidata Keyserling 1886 = Trithena bicuspidata (Blackwall) 1863
- „ trispinosa Cambridge 1873 = Molione trispinosa (Cambridge) 1873

Phrictus:

Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Chilobrachys**
- „ crassipes L. Koch 1873 = Selenocosmia crassipes (L. Koch) 1873
- „ validus Thorell 1881 = Selenocosmia valida (Thorell) 1881

Phrissaecia:
- „ ecuadorensis Simon 1892 = Fufius ecuadorensis (Simon) 1892

Phrixotrichus:
- „ auratus Pocock 1903, Simon 1903 = Phrixotrichus roseus (Guérin) 1838
- „ chilensis Simon 1896 = Phrixotrichus roseus (Guérin) 1838

Phrurolithus (= Phrurolithum):
- „ affinis Banks 1896 = Phrurolithus pugnatus Emerton 1889
- „ alarius Emerton 1889 part. 1902, 1911, Chickering 1939 = Phrurotimpus alarius (Hentz) 1847
- „ alarius Emerton 1889 part., Banks 1892, Comstock 1912, Bishop & Crosby 1926 = Phrurotimpus borealis (Emerton) 1911
- „ armatum Simon 1864 = nicht zu deuten!
- „ borealis Emerton 1911, Chickering 1939 = Phrurotimpus borealis (Emerton) 1911
- „ britcheri Gertsch 1935 ♂, nec ♀ = Phrurolithus brittoni Gertsch 1941
- „ corollatus C. L. Koch 1839, 1850, Ohlert 1867 = Lithyphantes albomaculatus (De Geer) 1778
- „ delicatulus Gertsch 1935 ♂ = Phrurolithus similis Banks 1895
- „ delicatulus Gertsch 1935 ♀ = Phrurolithus singulus Gertsch 1941
- „ erythrocephalus C. L. Koch 1839, Simon 1864 = Lithyphantes paykullianus (Walckenaer) 1805
- „ formica Banks 1895 = Phruronellus formica (Banks) 1895
- „ formica Emerton 1911 part. = Phrurolithus brittoni Gertsch 1941
- „ formidabilis Chickering 1939 = Phruronellus formidabilis Chamberlin & Gertsch 1930
- „ gracilipes Cambridge 1874 = Phrurolithus flavitarsis (Lucas) 1846
- „ hamatus C. L. Koch 1839 = Lithyphantes paykullianus (Walckenaer) 1805
- „ lunatus C. L. Koch 1839, Simon 1864 = Lithyphantes paykullianus (Walckenaer) 1805
- „ maculatum Simon 1864 = Lithyphantes albomaculatus (De Geer) 1778
- „ mateonus Chamberlin & Gertsch 1910 = Phrurotimpus mateonus (Chamberlin & Gertsch) 1930
- „ minutus Banks 1892, Emerton 1911 = Phrurotimpus minutus (Banks) 1892
- „ mormon Chamberlin & Gertsch 1930 = Phrurotimpus mormon (Chamberlin & Gertsch) 1930
- „ ornatum Simon 1864 = Theridion ornatum (Hahn) 1831
- „ pallipes C. L. Koch 1845, Simon 1864 = Asagena phalerata (Panzer) 1801
- „ palustris Banks 1892, Bishop & Crosby 1926 = Phrurotimpus alarius (Hentz) 1847
- „ parallelus Chamberlin 1921 = Phrurotimpus parallelus (Chamberlin) 1921
- „ pugnatus Emerton 1889 = Phrurolithus pugnatus Emerton 1889
- „ romanus L. Koch 1866 = Phrurolithus flavitarsis (Lucas) 1846
- „ rufescens C. L. Koch 1839 = nicht zu deuten!
- „ scalaris Bertkau 1880 = Phrurolithus minimus C. L. Koch 1839
- „ tejanus Chamberlin & Gertsch 1930 = Phrurotimpus alarius tejanus (Chamberlin & Gertsch) 1930

Phrurolithus (Forts.):
„ trifasciatus C. L. Koch 1839, Simon 1864 = Singa pygmaea (Sundevall) 1831
„ utus Chamberlin & Gertsch 1933 = Phrurotimpus borealis (Emerton) 1911
„ woodburyi Chamberlin & Gertsch 1929 = Phrurotimpus woodburyi (Chamberlin & Gertsch) 1929

Phruronellus:
„ duncani Chamberlin 1925 = Phrurolithus duncani (Chamberlin) 1925
„ pugnatus Chamberlin 1921 = Phrurolithus pugnatus Emerton 1899
„ similis Chamberlin & Gertsch 1930 = Phrurolithus redemptus Gertsch 1941

Phrurotimpus:
„ alarius Muma 1944, Chamberlin & Ivie 1944 = Phrurotimpus borealis (Emerton) 1911
„ emertoni Barnes 1953 = Phrurolithus emertoni Gertsch 1935
„ kentuckyense Muma 1944 = Phrurolithus kentuckyensis Chamberlin & Gertsch 1930
„ paludivagus Chamberlin & Ivie 1944 = Phrurolithus paludivagus Bishop & Crosby 1926
„ umbratilis Muma 1944 = Phrurolithus umbratilis Bishop & Crosby 1926

Phrynarachne:
„ foka Thorell 1875 = Phrynarachne rugosa (Latreille) 1804
„ laevis Keyserling 1877 = Pyresthesis laevis (Keyserling) 1877

Phryssaecia:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Fufius**

Phryxotrichus:
„ roseus Simon 1892 = Phrixotrichus roseus (Guérin) 1838

Phyale:
„ decorata Simon 1864 = Freya decorata (C. L. Koch) 1846
„ gratiosa C. L. Koch 1850, Taczanowski 1878, Peckham 1886 = Phiale minuta (C. L. Koch) 1848
„ modesta Simon 1864 = Dendryphantes modestus (C. L. Koch) 1846
„ tamatavi Simon 1864 = Thyene tamatavi (Vinson) 1863

Phycus:
Sämtliche Arten sie unter gleichem Artnamen bei **Phylarchus**

Phylaeus:
„ luteostriatus Keyserling 1877 = Plexippus luteostriatus (Keyserling) 1877

Phylarcus:
Alle Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Phylarchus**

Phylloeca:
„ marginata Dahl 1886 = Minicia marginata (Wider) 1834
„ sundevallii Dahl 1886 = Maso sundevallii (Westring) 1851

Phyllonetis (= Phylloneta):
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Theridion**
„ electa Cambridge 1895 ♂ = Theridion electum (Cambridge) 1895
„ electa Cambridge 1895 ♀ = Theridion evexum Keyserling 1884
„ lineata Thorell 1870 = Theridion redimitum (Clerck) 1757
„ thorellii Cambridge 1894 = Theridion adjacens (Cambridge) 1896

Phyrnoides:
„ foka Simon 1864 = Phrynarachne rugosa (Latreille) 1804
„ rugosa Simon 1864 = Phrynarachne rugosa (Latreille) 1804

Physcoa:
„ scintillans Thorell 1895 = Meotipa scintillans (Thorell) 1895

Physiola:
„ nigrans Simon 1895 = Witica talis Cambridge 1895

Phyxioschaema:
„ raddei Simon 1892 = Phyxiochema raddei Simon 1889

Pirata:
„ agelenoides Simon 1884 = Hippasa agelenoides (Simon) 1884
„ agilis Banks 1892 = Hogna montana (Emerton) 1885

Pirata (Forts.):
- „ alachua Gertsch & Wallace 1935 = Allocosa alachua (Gertsch & Wallace) 1935
- „ allapahae Gertsch 1940 = Allocosa allapahae (Gertsch) 1940
- „ aomorensis Saito 1938 = Avicosa aomorensis (Saito) 1938
- „ apalachea Gertsch 1940, Barnes 1953 = Lycosa apalachea (Gertsch) 1940
- „ arenicola Emerton 1909, Gertsch 1934 part., Kaston 1938, 1948 = Allocosa arenicola (Emerton) 1909
- „ arenicola Gertsch 1934 part., = Allocosa aspirans (Chamberlin) 1904
- „ arenicola Gertsch 1934 part., = Allocosa maculata (Emerton) 1909
- „ aspirans Chamberlin 1904, 1908 ♀, Comstock 1912 = Allocosa aspirans (Chamberlin) 1904
- „ aspirans Chamberlin 1908 ♀ = Allocosa arenicola (Emerton) 1909
- „ bilobata Chamberlin 1908 = Allocosa insularis (Emerton) 1885
- „ browni Gertsch & Davis 1940 = Allocosa browni (Gertsch & Davis) 1940
- „ chamberlini Lessert 1927 = Piratula chamberlini (Lessert) 1927
- „ clercki Fox 1935 = Piratula clercki (Bösenberg & Strand) 1906
- „ elegans Stone 1890 et sequ. = Hogna montana (Emerton) 1885
- „ eugeni Roewer 1951 = Piratula eugeni (Roewer) 1951
- „ exigua Banks 1892 = Piratosa (pro Piratessa praeocc.) minuta (Emerton) 1885
- „ febriculosa Chamberlin 1908, Comstock 1912 = Pirata piraticus (Clerck) 1757
- „ felix Cambridge 1898, F. Cambridge 1902 = Allocosa felix (Cambridge) 1898
- „ garamantica Caporiacco 1936 = Arkalosula garamantica (Caporiacco) 1936
- „ gertschi Chamberlin & Ivie 1944 = Piratula gertschi (Chamberlin & Ivie) 1944
- „ gigantea Gertsch 1934 = Arkalosula gigantea (Gertsch) 1934
- „ grata Gertsch & Davis 1940 = Allocosa grata (Gertsch & Davis) 1940
- „ humicola Montgomery 1902, Chamberlin 1908 = Allocosa humicola (Montgomery) 1902
- „ hygrophilus Thorell 1872 et sequ. = Piratula hygrophila (Thorell) 1872
- „ hygrophilus Becker 1882 (nur ♂) = Pardosa amentata (Clerck) 1757
- „ insula Strand 1913 = Rothus aethiopicus (Pavesi) 1883
- „ insularis Emerton 1885, Chamberlin 1908 (o), Emerton 1909, Kaston 1938, 1948 = Allocosa insularis (Emerton) 1885
- „ insularis Chamberlin 1908 (♂), Comstock 1912 = Allocosa arenicola (Emerton) 1909
- „ knorri Simon 1876, Chyzer & Kulczynski 1891 et sequ. = Piratula knorri (Scopoli) 1763
- „ knorri Becker 1882 (nur ♂) = Pardosa amentata (Clerck) 1757
- „ knorri Becker 1882 (nur ♀) = Piratula hygrophila (Thorell) 1872
- „ lacustris Caporiacco 1924 = Arctosa lacustris (Simon) 1876
- „ latitans Thorell 1873 et sequ. = Piratula latitans (Blackwall) 1841
- „ leopardus Thorell 1872 = Megarctosa leopardus (Sundevall) 1832
- „ liber Montgomery 1902, 1904 = Allocosa insularis (Emerton) 1885
- „ longipedis Saito 1939 = Avicosa longipedis (Saito) 1939
- „ maculata Emerton 1909, Kaston 1938, 1948 = Allocosa maculata (Emerton) 1909
- „ marxi Stone 1890 et sequ. = Piratosa (pro Piratessa praeocc.) marxi (Stone) 1890
- „ mayaca Gertsch 1940 = Allocosa mayaca (Gertsch) 1940
- „ minuta Emerton 1885 et sequ. = Piratosa (pro Piratessa praeocc.) minuta (Emerton) 1885
- „ montana Emerton 1885 et sequ. = Hogna montana (Emerton) 1885
- „ montanoides Banks 1892, 1916 = Hogna montanoides (Banks) 1892
- „ nanata Gertsch 1940, Chamberlin & Ivie 1944 = Lycosa nanata (Gertsch) 1940
- „ nigromaculatus Montgomery 1904 = Hogna montana (Emerton) 1885
- „ oblongus Simon 1898 = Trochosa oblonga (C. L. Koch) 1848
- „ panamana Banks 1929 = Allocosa panamena Chamberlin 1925
- „ pilipes Karsch 1879 = Avicosa chinchoxensis (Strand) 1908
- „ piraticus Emerton 1885, 1902 = Pirata emertoni Dahl 1908
- „ pistia Caporiacco 1947 = Allocosa pistia (Strand) 1913

Pirata (Forts.):
„ praedo Kulczynski 1885 = Piratula praedo (Kulczynski) 1885
„ procursus Montgomery 1902 = Pardosa xerampelina (Keyserling) 1876
„ prodigiosa Keyserling 1876, Chamberlin 1908 = Pirata piraticus (Clerck) 1757
„ raptor Kulczynski 1885, Schenkel 1930 = Trochosa raptor (Kulczynski) 1885
„ sacra Simon 1898 = Diapontia sacra (C. L. Koch) 1848
„ sedentaria Montgomery 1904 = Piratula sedentaria (Montgomery) 1904
„ seminola Gertsch & Wallace 1935 = Piratula seminola (Gertsch & Wallace) 1935
„ subligata L. Koch 1877 = Hogna subligata (L. Koch) 1877
„ suwanea Gertsch 1940, Chamberlin & Ivie 1944 = Allocosa suwanea (Gertsch) 1940
„ sylvestris Emerton 1909 ♂ = Allocosa insularis (Emerton) 1885
„ sylvestris Emerton 1909 ♀ = Pirata piraticus (Clerck) 1757
„ tenuitarsis Simon 1876 = Pirata piraticus tenuitarsis (Simon) 1876
„ ternetzi Mello-Leitao 1939 = Geolycosa ternetzi (Mello-Leitao) 1939
„ uliginosus Müller & Schenkel 1893 = nicht zu deuten!
„ wacondana Crosby & Bishop 1928 = Pirata piraticus (Clerck) 1757

Pirithous:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Simaetha**
„ tenuior Keyserling 1883 = Simaethula tenuior (Keyserling) 1882

Pisaura:
„ brevipes Emerton 1911 = Pisaurina brevipes (Emerton) 1911
„ conspersa Simon 1885 = Ocyale conspersa Karsch 1879
„ listeri Dahl 1912, 1927, Reimoser 1932, Roewer 1928 = Pisaura mirabilis (Clerck) 1757
„ rufofasciata Kulczynski 1903, Strand 1908, 1915 = Pisaura mirabilis (Clerck) 1757

Pisaurina:
„ mira subinflata Bishop 1924 = Pisaurina subinflata (Hentz) 1850
„ undata Banks 1910 = Pisaurina mira (Walckenaer) 1837

Pisenorodes:
„ höhneli Pocock 1898 = Pisenor höhneli Simon 1890

Pistius:
„ acuminatus Thorell 1881 = Runcinia acuminata (Thorell) 1881
„ annulipes Thorell 1877 = Thomisus spectabilis Doleschall 1859
„ bipunctatus Thorell 1877 = Thomisus spectabilis Doleschall 1859
„ duriusculus Thorell 1877 = Thomisus duriusculus (Thorell) 1877
„ pustulosus Thorell 1881, Hasselt 1882 = Thomisus spectabilis Doleschall 1859

Pitiohyphantes:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Pityohyphantes**

Plaesiocraerus:
„ alpinus Simon 1884 = Plaesiocraerus latifrons (Cambridge) 1863
„ antepenultimus Simon 1884 = Silometopus antepenultimus (Cambridge) 1882
„ beckii Simon 1884, Becker 1896 = Lophocarenum turgidum (Blackwall) 1841
„ bicissus Simon 1884 = Colobocyba bicissa (Cambridge) 1872
„ castaneipes Simon 1884 = Plaesiocraerus fuscipes castaneipes (Simon) 1884
„ castaneus Simon 1884 = Minyriolus castaneus (Emerton) 1882
„ cirtensis Simon 1884 = Evansia cirtensis (Simon) 1884
„ congener Simon 1884 = Entelecara congenera (Cambridge) 1879
„ corsicus Simon 1884 = Colobocyba corsica (Simon) 1884
„ fallaciosus Simon 1884 = Diplocephalus fallaciosus (Bertkau) 1883
„ insectus Simon 1884 = Colobocyba insecta (L. Koch) 1869
„ kochii Simon 1884 = Plaesiocraerus leberti Roewer 1942
„ lobiceps Banks 1897 = Eridantes erigonoides (Emerton) 1882
„ montanus Simon 1884 = Sisicottus montanus (Emerton) 1882
„ permixtus Simon 1884 = Streptosphaenus permixtus (Cambridge) 1870
„ psilocephalus Simon 1884 = Cornicularia vigilax (Blackwall) 1853
„ pulicarius Simon 1884 = Diplocephalus pulicarius (Thorell) 1875

Plaesiocraerus (Forts.):
„ semiglobosis Simon 1884 = Diplocephalus semiglobosus (Westring) 1862
„ speciosus Cambridge 1895 = Entelecara speciosa (Cambridge) 1895
„ subelevatus Simon 1884 = Entelecara subelevata (L. Koch) 1869
„ subrostratus Simon 1884 = Evansia subrostrata (Cambridge) 1873
„ tauricus Simon 1884 = Diplocephalus tauricus (Thorell) 1875

Planadecta:
„ lyrata Simon 1892 = Harpactira lyrata (Simon) 1892

Plator:
„ cimicoides Simon 1880 = Doliomalus cimicoides (Nicolet) 1849
„ ixodinus Pocock 1899 = Plator indicus Simon 1897
„ laminus Simon 1880 = Doliomalus laminus (Nicolet) 1849
„ niger Simon 1880, Tullgren 1905 = Vectius niger (Simon) 1880

Platyarachne:
„ histrio Simon 1895 = Platyarachne histrix Simon 1895

Platycephala:
„ punctata Butler 1932 = Macedoniola punctata (Butler) 1932

Platyoides:
„ bidentatus Purcell 1907 = Platyoides bidentifer (Strand) 1908

Platyopis:
„ bicuspis Smith 1906 = Panamomops sulcifrons (Wider) 1834
„ biceros Smith 1906 = Saloca diceros (Cambridge) 1870
„ sulcifrons Menge 1868, Chyzer & Kulczynski 1894 = Panamomops mengei Simon 1926

Platyscelis:
„ savignyi Lucas 1846 = Palpimanus gibbulus (Dufour) 1820

Platyscelum:
„ savignyi Audouin 1827 = Palpimanus gibbulus (Dufour) 1820

Platythomisus:
„ cimex Karsch 1878 = Camaricus cimex (Karsch) 1878
„ homeyerii Karsch 1880 = Porropis homeyerii (Karsch) 1880
„ mechovi Karsch 1881 = Cynathea mechovi (Karsch) 1881
„ mimus Pavesi 1895 = Camaricus mimus (Pavesi) 1895
„ phryniformis Doleschall 1859 = Platythomisus octomaculatus (C. L. Koch) 1845
„ speciosus Thorell 1881 = Poecilothomisus speciosus (Thorell) 1881
„ striatipes Hasselt 1882 = Camaricus maugi (Walckenaer) 1837

Platyxysticus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Coriarachne**

Plectana:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Micrathena**
„ acuminata Walckenaer 1841 = Gasteracantha kuhlii C. L. Koch 1838
„ acuminata Doleschall 1859 = Gasteracantha diardi (Lucas) 1835
„ affinis Walckenaer 1841 = Chaetacis affinis (C. L. Koch) 1839
„ arcuata Walckenaer 1841, Doleschall 1859, Thorell 1890 = Gasteracantha arcuata (Fabricius) 1793
„ argiodes Doleschall 1857 = Phoroncidia argiodes (Doleschall) 1857
„ atlantica Walckenaer 1841 = Gasteracantha cancriformis (Linné) 1758
„ aureola Walckenaer 1841 = Chaetacis aureola (C. L. Koch) 1836
„ blackwallii Thorell 1890 = Gasteracantha hasseltii C. L. Koch 1838
„ bleekeri Doleschall 1857, Thorell 1878, 1890 = Gasteracantha audouini Guérin 1838
„ brevispina Doleschall 1857 = Gasteracantha mammosa C. L. Koch 1845
„ cancriformis Walckenaer 1841 = Gasteracantha cancriformis (Linné) 1758
„ centrum Doleschall 1857 = Gasteracantha sturii (Doleschall) 1857
„ clavatrix Walckenaer 1841 = Gasteracantha clavatrix (Walckenaer) 1841
„ clavatrix Karsch 1892 = Gasteracantha renifera Butler 1873
„ curvicauda Walckenaer 1841 = Gasteracantha arcuata (Fabricius) 1793
„ curvispina Walckenaer 1841 = Gasteracantha curvispina (Guérin) 1837

Plectana (Forts.):
„ cuspidata Waldkenaer 1841 = Gasteracantha cuspidata C. L. Koch 1838
„ elipsoides Waldkenaer 1841 = Gasteracantha cancriformis (Linné) 1758
„ flavida Doleschall 1859 = Gasteracantha mammosa C. L. Koch 1845
„ furcata Waldkenaer 1841 = Micrathena armata (Olivier) 1789
„ geminata Waldkenaer 1841 = Gasteracantha geminata (Fabricius) 1798
„ globulata Waldkenaer 1841 = Gasteracantha globulata (Waldkenaer) 1841
„ hasseltii Thorell 1887, 1890 = Gasteracantha hasseltii C. L. Koch 1838
„ hecata Waldkenaer 1841 = Gasteracantha hecata (Waldkenaer) 1841
„ hexacantha Waldkenaer 1841 = Gasteracantha cancriformis (Linné) 1758
„ incisa Waldkenaer 1841 = Chaetacis incisa (Waldkenaer) 1841
„ inversa Waldkenaer 1841 = Gasteracantha linnaei (Waldkenaer) 1841
„ irradiata Waldkenaer 1841 = Gasteracantha irradiata (Waldkenaer) 1841
„ lata Waldkenaer 1841 = Gasteracantha tetracantha (Linné) 1767
„ lepeletierii Waldkenaer 1841 = Gasteracantha lepeletierii (Guérin) 1825
„ leucomelas Doleschall 1859 = Gasteracantha kuhlii C. L. Koch 1838
„ linnaei Waldkenaer 1841 = Gasteracantha linnaei (Waldkenaer) 1841
„ lygeana Waldkenaer 1841 = Phoroncidia lygeana (Waldkenaer) 1841
„ macrocantha Waldkenaer 1841 = Micrathena schreibersii (Perty) 1833
„ mauricia Waldkenaer 1841 = Gasteracantha rhomboidea Guérin 1838
„ mediofusca Doleschall 1859 = Gasteracantha mammosa C. L. Koch 1845
„ mucronata Waldkenaer 1841 = Gasteracantha mucronata (Waldkenaer) 1841
„ paradoxa Waldkenaer 1847 = Ulesanis paradoxa (Lucas) 1846
„ penizoides Thorell 1899 = Gasteracantha penizoides (Simon) 1887
„ pentacantha Waldkenaer 1841 = Actinosoma pentacanthum (Waldkenaer) 1841
„ pentagona Waldkenaer 1841 = Gasteracantha pentagona (Waldkenaer) 1841
„ picta Waldkenaer 1841 = Chaetacis picta (C. L. Koch) 1836
„ praetextata Waldkenaer 1841, L. Koch 1871 = Gasteracantha theisi Guérin 1838
„ praetextata Doleschall 1857, 1859 = Gasteracantha lepeletierii (Guérin) 1825
„ quinqueserrata Waldkenaer 1841 = Gasteracantha cancriformis (Linné) 1758
„ reduviana Waldkenaer 1841 = Micrathena patruelis (C. L. Koch) 1839
„ roseolimbata Doleschall 1859 = Gasteracantha mammosa C. L. Koch 1845
„ sector Waldkenaer 1841 = Argyope sector (Forskal) 1776
„ servillii Waldkenaer 1841 = Gasteracantha servillei (Guérin) 1828
„ sexserrata Waldkenaer 1841 = Gasteracantha cancriformis (Linné) 1758
„ sloanii Waldkenaer 1841 = Argyope argentata (Fabricius) 1775
„ squammosa Waldkenaer 1841 = Micrthena sexspinosa (Hahn) 1822
„ stellata Waldkenaer 1841 = Acanthepeira stellata (Waldkenaer) 1805
„ sturii Doleschall 1857, 1859 = Gasteracantha sturii (Doleschall) 1857
„ taeniata Waldkenaer 1841 = Gasteracantha taeniata (Waldkenaer) 1841
„ tetraedra Waldkenaer 1841 = Gasteracantha tetraedra (Waldkenaer) 1841
„ transitoria Waldkenaer 1841 = Araneus transitorius (C. L. Koch) 1839
„ transversalis Waldkenaer 1841 = Gasteracantha audouini Guérin 1838
„ tricolor Doleschall 1859 = Cyrtarachne tricolor (Doleschall) 1859
„ tricuspidata Blackwall 1863 = Trithena tricuspidata (Blackwall) 1863
„ triserrata Waldkenaer 1841 = Gasteracantha tetracantha (Linné) 1767
„ variegata Waldkenaer 1841 = Gasteracantha fasciata Guérin 1838
„ velitaris Waldkenaer 1841 = Gasteracantha cancriformis (Linné) 1758
„ venusta Banks 1896 = Acanthepeira venusta (Banks) 1896
„ versicolor Waldkenaer 1841 = Gasteracantha versicolor (Waldkenaer) 1841

Plectreurys:
„ globosa Franganillo 1931, 1934 = nicht zu deuten!
„ suprenans Chamberlin 1920 = Kibramoa suprenans (Chamberlin) 1924

Plesiometa:
„ argyra F. Cambridge 1903 = Leucauge argyra (Waldkenaer) 1841

Plesiopelma:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Eurypelma**

Pleuromma:
„ molluccum Doleschall 1859 = Poltys illepidus C. L. Koch 1843

Plexippus (= Plexippa):
„ adansonii Simon 1868 = Hasarius adansonii (Audouin) 1827
„ albobimacaculata Simon 1864 = Bianor albobimaculatus (Lucas) 1846
„ albolineatus C. L. Koch 1846 = Carrhotus viduus (C. L. Koch) 1846
„ albopilosus Keyserling 1883 = Trite albopilosa (Keyserling) 1883
„ ardelio Thorell 1877 = Hasarius adansonii (Audouin) 1827
„ aureus C. L. Koch 1846 = Dendryphantes aurantius (Lucas) 1833
„ beccarii Thorell 1881 = Palpelius beccarii (Thorell) 1881
„ bernsteinii Thorell 1881 = Sandalodes bernsteinii (Thorell) 1881
„ bivittatus C. L. Koch 1846 = nicht zu deuten!
„ bleekeri Thorell 1878, 1881 = Euryattus bleekeri (Doleschall) 1859
„ brasiliensis Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ brocchus Thorell 1881 = Bathippus brocchus (Thorell) 1881
„ caeruleus Karsch 1880 = nicht zu deuten!
„ calcaratus Karsch 1878 = nicht zu deuten!
„ capillatus Urquhart 1889 = Trite auricoma (Urquhart) 1885
„ catellus Thorell 1891 = Cytaea catella (Thorell) 1891
„ cervus Thorell 1881 = Bathippus cervus (Thorell) 1881
„ chalcocephalus Thorell 1877 = Bindax chalcocephalus (Thorell) 1877
„ chrysis Simon 1864 = Dendryphantes aurantius (Lucas) 1833
„ cornutus Hasselt 1879 = Hyllus waldkenaerii (White) 1846
„ cothurnatus Gerstäcker 1873 = Hyllus cothurnatus (Gerstäcker) 1873
„ culicivorus Thorell 1887 = Plexippus paykullii (Audouin) 1827
„ cumulatus Karsch 1891 = Carrhotus viduus (C. L. Koch) 1846
„ curtus Simon 1877 = Pancorius curtus (Simon) 1877
„ daemelii Keyserling 1883 = Trite daemelii (Keyserling) 1883
„ dearmatus Thorell 1881 = Palpelius dearmatus (Thorell) 1881
„ dilanians Thorell 1881 ♂ = Bathippus dilanians (Thorell) 1881
„ dilanians Thorell 1881 ♀ = Dudasia fissidentata (Strand) 1911
„ dorcas Thorell 1881 = Canama dorcas (Thorell) 1881
„ doryphorus Thorell 1881 = Thorelliola doryphora (Thorell) 1881
„ elephus Thorell 1881 = Bathippus elephus (Thorell) 1881
„ ensifer Thorell 1877, 1878 = Thorelliola ensifera (Thorell) 1877
„ erythrocephalus C. L. Koch 1846 = Artabrus erythrocephalus (C. L. Koch) 1846
„ expectans Thorell 1881 = Cytaea expectans (Thorell) 1881
„ felis Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ flavoguttatus C. L. Koch 1846 = Phiale flavoguttata (C. L. Koch) 1846
„ frontaliger Thorell 1881 = Cytaea frontaligera (Thorell) 1881
„ furtiva Simon 1864 = Plexippus selectus C. L. Koch 1846
„ fuscoannulatus Strand 1911 = Palpelius fuscoannulatus (Strand) 1911
„ gausapatus Thorell 1890, 1892 = Evarcha gausapata (Thorell) 1890
„ gazellae Simon 1901 = Thiania gazellae (Karsch) 1878
„ gulosus Simon 1877 = Hyllus gulosus (Simon) 1877
„ guttatus C. L. Koch 1846 = nicht zu deuten!
„ hepaticus C. L. Koch 1846 = nicht zu deuten!
„ herbigradus Urquhart 1887, 1888 = Trite herbigrada (Urquhart) 1888
„ hinnuleus Thorell 1881 = Canama hinnulea (Thorell) 1881
„ honesta Simon 1864 = Dendryphantes honestus (C. L. Koch) 1846
„ hypatica Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ intermedius Karsch 1880 = nicht zu deuten!
„ iris Simon 1864 = Dendryphantes aurantius (Lucas) 1833
„ janthinus C. L. Koch 1846 = Hyllus janthinus (C. L. Koch) 1846
„ karschii Thorell 1881 = Pystira karschii (Thorell) 1881
„ lacerans Thorell 1881 = Canama lacerans (Thorell) 1881
„ lacertosus C. L. Koch 1846, Thorell 1892 = Hyllus lacertosus (C. L. Koch) 1846
„ latericius Thorell 1881 = Bathippus latericius (Thorell) 1881

Plexippus (Forts.):
„ laticeps Thorell 1878 = Cytaea laticeps (Thorell) 1878
„ lepidus Berland 1936, Denis 1945 = Plexippus marginellus (Simon) 1883
„ ligo C. L. Koch 1846 = Plexippus paykullii (Audouin) 1827
„ lividus Karsch 1880 = nicht zu deuten!
„ macrognathus Thorell 1881 = Bathippus macrognathus (Thorell) 1881
„ malayensis Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ mimicus C. L. Koch 1846 = Phiale mimica (C. L. Koch) 1846
„ mitellatus Thorell 1881 = Cytaea mitellata (Thorell) 1881
„ molossus Thorell 1881 = Bathippus molossus (Thorell) 1881
„ montrouzieri Lucas 1869, Thorell 1881 = Bathippus montrouzieri (Lucas) 1869
„ montrouzieri papuanus Thorell 1881 = Bathippus papuanus (Thorell) 1881
„ mutillarius C. L. Koch 1846 = Hyllus diardi (Walckenaer) 1837
„ myiopotami Thorell 1881 = Euryattus myiopotami (Thorell) 1881
„ nigrifrons C. L. Koch 1846 = nicht zu deuten!
„ nigrofusca Simon 1864 = Hasarius adansonii (Audouin) 1827
„ nimbatus Thorell 1881 = Cytaea nimbata (Thorell) 1881
„ notabilis Simon 1864 = Icius notabilis (Simon) 1871
„ nummularis Gerstäcker 1873 = Hyllus nummularis (Gerstäcker) 1873
„ obesus Thorell 1881 = nicht zu deuten!
„ oedonychus Thorell 1881 = Bathippus oedonychus (Thorell) 1881
„ orichalceus C. L. Koch 1846 = Dendryphantes aurantius (Lucas) 1833
„ oscitans Thorell 1881 = Bathippus oscitans (Thorell) 1881
„ pilosa Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ planiceps C. L. Koch 1846 = nicht zu deuten!
„ planipudens Karsch 1881 = Artabrus planipudens (Karsch) 1881
„ proterva Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ puerperus Peckham 1885, 1888 = Thiodina sylvana (Hentz) 1846
„ pumicatus Thorell 1881 = Sandalodes pumicatus (Thorell) 1881
„ putnamii Peckham 1888 = Dendryphantes putnamii (Peckham) 1883
„ regulus Thorell 1878 = Zenodorus lepidus (Guérin) 1834
„ ringens Thorell 1881 = Bathippus ringens (Thorell) 1881
„ ruber Thorell 1881 = Cytaea rubra (Walckenaer) 1837
„ rufus C. L. Koch 1846 = nicht zu deuten!
„ sannio Thorell 1877 = Eugasmia sannio (Thorell) 1877
„ sannio Hasselt 1882 = Eugasmia coronata (Simon) 1885
„ senegalensis C. L. Koch 1846 = Hyllus senegalensis (C. L. Koch) 1846
„ setosus Karsch 1880 = nicht zu deuten!
„ sexmaculatus C. L. Koch 1846 = Gangus sexmaculatus (C. L. Koch) 1846
„ signata Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ simplicissimus Karsch 1880 = nicht zu deuten!
„ sinuatus Thorell 1878 = Cytaea sinuata (Doleschall) 1859
„ speculator Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ stigmatias L. Koch 1875 = Hyllus stigmatias (L. Koch) 1875
„ succinctus C. L. Koch 1846 = Hyllus janthinus (C. L. Koch) 1846
„ sylvarus Urquhart 1891 = nicht zu deuten!
„ thalassina C. L. Koch 1846 = Cosmophasis thalassina (C. L. Koch) 1846
„ tricolor C. L. Koch 1846 = Dendryphantes tricolor (C. L. Koch) 1846
„ undatus C. L. Koch 1846 = Maevia vittata (Hentz) 1846
„ unicolor Karsch 1880 = nicht zu deuten!
„ validus Thorell 1877 = Pseudamycus validus (Thorell) 1877
„ veles Thorell 1878, 1881 = nicht zu deuten!
„ venustus Doleschall 1859 = Euryattus venustus (Doleschall) 1859
„ versicolor C. L. Koch 1846 = Chrysilla versicolor (C. L. Koch) 1846
„ viduus C. L. Koch 1846 = Carrhotus viduus (C. L. Koch) 1846
„ vittatus C. L. Koch 1846 = Telamonia vittata (C. L. Koch) 1846
„ vittatus Banks 1905 = Maevia poultonii Peckham 1901
„ wallacei Thorell 1881 = nicht zu deuten!

Pocadicnemis:
„ longituba Simon 1884 et sequ. = Pocadicnemis pumila (Blackwall) 1841
Pochytoides:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Pochyta**
Podophthalma:
„ affinitata Cambridge 1877 = Euprosthenops affinitatus (Cambridge) 1877
„ bayaoniana Brito Capello 1867 = Euprosthenops bayaonianus (Brito Capello) 1867
„ bayaoniana Karsch 1878 = Euprosthenops australis Simon 1898
„ bayaoniana Pavesi 1881 = Euprostehenops pavesii Lessert 1928
„ diversa Cambridge 1877 = Porrima diversa (Cambridge) 1877
„ ellioti Cambridge 1877 = Euprosthenops ellioti (Cambridge) 1877
„ hilaris Cambridge 1877 = Euprosthenops hilaris (Cambridge) 1877
„ incerta Cambridge 1877 = Ischalea incerta (Cambridge) 1877
Poecilochroa:
„ bilineata Emerton 1889, 1902 = Cesonia bilineata (Hentz) 1847
„ columbiana Emerton 1917 = Poecilochroa montana Emerton 1889
„ decipiens Bryant 1935 = Sergiolus decipiens Chamberlin 1929
„ montana Emerton 1909 = Sergiolus famulus Chamberlin 1922
„ pacifica Banks 1896, 1904 = Poecilochroa montana Emerton 1889
„ picta Simon 1878 = Poecilochroa albomaculata (Lucas) 1846
„ subincompta Strand 1908 = Poecilochroa incompta (Pavesi) 1880
„ unimaculata Barnes 1953 = Sergiolus unimaculatus Emerton 1915
„ variegata Emerton 1889, 1902, Simon 1892 = Sergiolus variegatus (Hentz) 1847
Poecilomigas:
„ abrahami Purcell 1905 = Caedmon abrahami (Cambridge) 1889
Poecilonephila:
„ constricta Dahl 1912 = Nephila constricta Karsch 1879
Poeciloneta:
„ globosa Lessert 1910, Jackson 1916, Hull 1932 = Poeciloneta variegata (Blackwall) 1841
Poltys:
„ bimaculatus Cambridge 1899 = Poltys furcifer Simon 1881
„ ideae Simon 1895 = Poltys idae (Ausserer) 1871
„ larvatus Simon 1881 = Cyphalonotus larvatus (Simon) 1881
„ madagascariensis Lenz 1886 = Poltys kochi Keyserling 1863
„ molluccum Thorell 1878 = Poltys illepidus C. L. Koch 1843
„ pygmaeus Thorell 1890 = Arachnura pygmaea (Thorell) 1890
Polyaspis:
„ acuminata Simon 1888 = Paculla acuminata (Simon) 1888
Polybetes:
„ maculatus Simon 1897 = Polybetes pythagoricus (Holmberg) 1875
„ minensis Mello-Leitao 1917 = Olios minensis (Mello-Leitao) 1917
Polydamna:
„ regina Thorell 1881 = Pediana regina (L. Koch) 1875
Porrhoclubiona:
„ clandestina Lohmander 1944 = Clubiona genevensis L. Koch 1866
Porrhomma:
„ adipatum Simon 1884 = Oreonetides vaginatum (Thorell) 1872
„ apertum Cambridge 1900 = Micrargus (Blaniargus herbigradus) (Blackwall) 1854
„ cacuminum Simon 1884 = Oreonetides glacialis (L. Koch) 1872
„ calcaratum Simon 1894 = Ceratinopsis laticeps Emerton 1882
„ cavernicola M. Dahl 1938 = Porrhomma profundum M. Dahl 1939
„ contritum Simon 1884 = Poeciloneta variegata (Blackwall) 1841
„ decens Simon 1884, F. Cambridge 1894 = Porrhomma microphthalmum (Cambridge) 1870
„ diabolicum Simon 1884 = Porrhomma proserpina (Simon) 1872

Porrhomma (Forts.):
- „ egeria Simon 1884, et sequ. außer Chyzer & Kulczynski = Porrhomma calypso (Bertkau) 1883
- „ egeria Chyzer & Kulczynski 1897 = Porrhomma moravicum Miller & Kratochvil 1840
- „ errans Simon 1884 = Porrhomma microphthalmum (Cambridge) 1870
- „ errans Kolosvary 1928 = Porrhomma profundum M. Dahl 1939
- „ formidabilis Simon 1884 = Leptorrhoptrum huthwaitii (Cambridge) 1861
- „ glacialis Simon 1884 = Oreonetides glacialis (L. Koch) 1872
- „ incertum Berland 1931 = Porrhomma emertoni Roewer 1942
- „ inerrans Cambridge 1885 = Pocadicnemis pumila (Blackwall) 1841
- „ interceptum Simon 1884 = Phaulothrix interceptus (Cambridge) 1873
- „ meadii F. Cambridge 1894 = Porrhomma microphthalmum (Cambridge) 1870
- „ microphthalmum Fage 1931 part. = Porrhomma profundum M. Dahl 1939
- „ montigena Simon 1884 = Hilaira montigena (L. Koch) 1872
- „ nigritum Bösenberg 1902 = Hylyphantes nigritus (Simon) 1881
- „ nigrum Cambridge 1891 = Hilaira montigena (L. Koch) 1872
- „ provocans Simon 1884 = Microerigone spetsbergensis (Thorell) 1871
- „ pygmaeum myops Miller & Kratochvil 1940 = Porrhomma myops Simon 1884
- „ pygmaeum proserpina Miller & Kratochvil 1940 = Porrhomma proserpina (Simon) 1872
- „ rosenhaueri Fage 1931 part. = Porrhomma kolosvaryi Kratochvil 1934
- „ rosenhaueri Kratochvil 1934 = Porrhomma profundum M. Dahl 1939
- „ scopiferum Simon 1884, 1894 = Porrhomma proserpina (Simon) 1872
- „ venator Simon 1884 = Hilaira vexatrix (Cambridge) 1877

Porrhopis:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Porropis**

Porrhopsis:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Porropis**

Porrima:
- „ callipoda Mello-Leitao 1933 = Porrimula vallipoda (Mello-Leitao) 1933

Portia:
- „ foveolata Strand 1912 = ? Portia semifimbriata (Simon) 1900

Potamia:
- „ argenteomarginata Simon 1864 = Pirata piraticus (Clerck) 1757
- „ nautica Simon 1864 = nicht zu deuten!
- „ palustris C. L. Koch 1848, 1850, 1850 = Piratula latitans (Blackwall) 1841
- „ piratica C. L. Koch 1848 = Pirata piraticus (Clerck) 1757
- „ piscatoria C. L. Koch 1848 = Piratula knorrii (Scopoli) 1763
- „ piscatoria Thorell 1856 = Pirata piscatorius (Clerck) 1757
- „ piscatoria Ohlert 1867 = Piratula hygrophila Thorell 1872
- „ triton Simon 1864 = Dolomedes triton (Walckenaer) 1837
- „ sericata Simon 1864 = Megarctosa leopardus (Sundevall) 1832
- „ uliginosa Thorell 1856 = Pirata uliginosa (Thorell) 1856

Pranopis:
- „ punctata Thorell 1891 = Corinna gulosa (Thorell) 1878

Prodalia:
- „ foxii Marx 1891 = Lathys foxii (Marx) 1891

Prodidomus:
- „ penicillatus Simon 1893, Strand 1915 = Zimirina penicillata (Simon) 1893

Pronemesia:
- „ caementaria Simon 1873 = Nemesia caementaria (Latreille) 1798
- „ carminans Simon 1914 = Nemesia carminans (Latreille) 1818

Pronopius:
- „ providus Menge 1869 = nicht zu deuten!

Pronous:
- „ chelifer Hasselt 1882 = Argyope catenulata (Doleschall) 1859

Prosoponcus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Diplocephalus**
„ frontatus Simon 1884 = Savignia frontata Blackwall 1833
„ thyrsiger Simon 1884 = Diplocephalus foraminifer thyrsiger (Simon) 1926
Prosopotheca:
„ brevicornis Simon 1884, 1894 = Cornicularia brevicornis Emerton 1882
„ communis Simon 1884, 1894 = Cornicularia communis Emerton 1882
„ directa Simon 1884, 1894 = Cornicularia directa (Cambridge) 1874
„ formosa Crosby 1905 = Ceratinopsidis formosa (Banks) 1892
„ indirecta Simon 1884, 1894 = Cornicularia indirecta (Cambridge) 1874
„ minuta Simon 1884, 1894 = Cornicularia minuta Emerton 1882
„ minuta Crosby & Bishop 1928 = Tapinocyba minuta (Emerton) 1908
„ pallida Simon 1894 = Cornicularia pallida (Emerton) 1882
„ spiralis Crosby & Bishop 1928 = Cornicularia spiralis (Emerton) 1882
„ tibialis Simon 1884, 1894 = Cornicularia tibialis Emerton 1882
Prostheclina:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Saitis**
„ aurata Banks 1893 = Corythalia aurata (Hentz) 1846
„ cambridgei Peckham 1888 = Corythalia aurata (Hentz) 1846
„ parvula Banks 1909 = Corythalia cubana Roewer 1951
„ portoricensis Petrunkevitch 1930 = Emathis illustris Banks 1901
„ pygmaea Peckham 1893 = Stoidis pygmaea (Peckham) 1893
„ signata Keyserling 1883 = Saitis signatus (Keyserling) 1883
„ signata Banks 1901 = Corythalia banksi Roewer 1951
Prosthesima:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Zelotes**
„ accepta Herman 1879 et sequ. = Zelotes villicus (Thorell) 1875
„ aenea Simon 1878 = Zelotes longipes (L. Koch) 1866
„ allionica Herman 1879 = Zelotes caucasicus (L. Koch) 1866
„ anauniensis Canestrini 1874 = Zelotes praeficus (L. Koch) 1866
„ arida Tullgren 1910 = Xerophaeus aridus Purcell 1907
„ arizonensis Banks 1901 = Drassyllus arizonensis (Banks) 1901
„ atra Pavesi 1875, Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ atra L. Koch 1877, Bösenberg 1902 = Zelotes latreillei (Simon) 1878
„ atra Emerton 1889 ♀, 1902 ♀ = Zelotes melancholicus (Thorell) 1877
„ barberi Banks 1902 = Haplodrassus barberi (Banks) 1902
„ bimaculata Keyserling 1884 = Zelotes bryantae Roewer 1951
„ bimaculata Chyzer & Kulczynski 1897 = Zelotes bimaculatus (C. L. Koch) 1837
„ blanda Banks 1892 = Drassyllus blandus (Banks) 1892
„ calceolata Herman 1879 = Zelotes villicus (Thorell) 1875
„ clivicola Simon 1878 part., Kulczynski 1887, 1897, Bösenberg 1902 ♂, Lessert 1910 = Zelotes clivicola (L. Koch) 1870
„ clivicola Simon 1878 part. = Zelotes gallicus Simon 1914
„ clivicola Bösenberg 1902 ♀ = Zelotes ater (Hentz) 1832
„ cockerelli Banks 1901 = Herpyllus cockerelli (Banks) 1901
„ conspicua Herman 1879 = Poecilochroa conspicua (L. Koch) 1866
„ decepta Banks 1900 = Haplodrassus signifer (C. L. Koch) 1839
„ depressa Emerton 1889 ♀, 1911 ♂, part., Banks 1904 = Drassylus depressus (Emerton) 1889
„ depressa Emerton 1911 ♂, part. = Drassylus pallens (Chamberlin) 1922
„ ecclesiastica Emerton 1889, 1902 = Herpyllus vasifer (Walckenaer) 1805
„ electa Thorell 1873, Dahl 1883, Chyzer & Kulczynski 1897 = Zelotes electus (C. L. Koch) 1839
„ electa Bösenberg 1902 = Zelotes exiguus (Müller & Schenkel) 1895
„ femella Simon 1878 ♀ = Zelotes femellus (L. Koch) 1866
„ femella Simon 1878 ♂ = Zelotes longipes (L. Koch) 1866
„ floridana Banks 1893 = Herpyllus floridanus (Banks) 1893
„ fortuita Simon 1878, Lessert 1904, 1910 = Zelotes civicus (Simon) 1878

Prosthesima (Forts.):
- „ frigida Banks 1892 = Drassyllus frigidus (Banks) 1892
- „ iaxartensis Kulczynski 1901 = Zelotes jaxartensis (Kroneberg) 1875
- „ immaculata Banks 1892 = Drassyllus rufulus (Banks) 1892
- „ incompta Pavesi 1880 = Poecilochroa incompta (Pavesi) 1880
- „ insularis Banks 1895 = Sosticus insularis (Banks) 1895
- „ jaffana Strand 1915 = ? Zelotes scutatus (Cambridge) 1872
- „ larifuga Simon 1878 = Zelotes rusticus (L. Koch) 1872
- „ latipes Simon 1878 = Zelotes carmeli (Cambridge) 1872
- „ latitans Simon 1878, Cambridge 1881 = Zelotes praeficus (L. Koch) 1866
- „ longipes Simon 1878 = Zelotes serotinus (L. Koch) 1866
- „ longipes Cambridge 1881, Chyzer & Kulczynski 1897 = Zelotes longipes (L. Koch) 1866
- „ lutea F. Cambridge 1899 = Zelotes luteus (F. Cambridge) 1899
- „ lutea Barrows 1919 = Litopyllus rupicolens Chamberlin 1922
- „ melancholica Thorell 1877 = Zelotes melancholicus (Thorell) 1877
- „ minima Banks 1892 = Drassyllus blandus (Banks) 1892
- „ mollis Cambridge 1874 = Echemus mollis (Cambridge) 1874
- „ nigrita Dahl 1883, Bösenberg 1902 = Zelotes pusillus (C. L. Koch) 1833
- „ nilotica Simon 1878 = Zelotes nilicola (Cambridge) 1874
- „ nova Banks 1895 = Drassyllus frigidus (Banks) 1892
- „ oceanica Simon 1883 = Zelotes lyonnetii (Audouin) 1827
- „ pallida Cambridge 1874 = Zelotes pallidus (Cambridge) 1874
- „ pallida Keyserling 1877 = Zelotes keyserlingi Roewer 1951
- „ parvula Pavesi 1884 = Setaphis lucasi Roewer 1951
- „ petiverii Pavesi 1873, 1875 = nicht zu deuten!
- „ petiverii Dahl 1883, Hansen 1885 = Zelotes subterraneus (C. L. Koch) 1833
- „ petiverii Bösenberg 1902 = Zelotes latreillei (Simon) 1878
- „ petivieri Lebert 1877 = nicht zu deuten!
- „ pilipes Kulczynski 1898 = Zelotes atrocoeruleus (Simon) 1878
- „ propinqua Keyserling 1887 = Herpyllus propinquus (Keyserling) 1887
- „ pulchra Thorell 1875 = Poecilochroa albomaculata (Lucas) 1846
- „ rufula Banks 1892, Emerton 1909 part., 1911 part. = Drassyllus rufulus (Banks) 1892
- „ rufula Emerton 1909 part. ♀ = Drassyllus niger (Banks) 1896
- „ rufula Emerton 1909 part. ♀ = Drassyllus virginianus Chamberlin 1922
- „ schwarzi Banks 1901 = Herpyllus schwarzi (Banks) 1901
- „ septemmaculata Strand 1909 = Drassodella septemmaculata (Strand) 1909
- „ setifera Simon 1883, Kulczynski 1899 = Zelotes longipes (L. Koch) 1866
- „ suavis Simon 1878 = Setaphis suavis (Simon) 1878
- „ subterranea Simon 1878 et sequ. = Zelotes ater (Hentz) 1833
- „ tantula Simon 1878 = Zelotes nilicola (Cambridge) 1874
- „ tarsalis Simon 1878 = Zelotes caucasicus (L. Koch) 1866
- „ tenera Soerensen 1904 = Echemus tener (Soerensen) 1904
- „ tragica Simon 1878 = Zelotes tragicus (Cambridge) 1872
- „ tragica Herman 1879 = Zelotes hermanii (Chyzer) 1897
- „ transversa Emerton 1911 = Drassyllus transversus (Emerton) 1911
- „ tridentina Canestrini 1874 = Zelotes serotinus (L. Koch) 1866
- „ valida Banks 1896 = Herpyllus validus (Banks) 1896
- „ vernalis L. Koch 1872, Simon 1878 = Zelotes pumilus (C. L. Koch) 1839
- „ vespertina Canestrini 1874, 1876 = Zelotes erebeus (Thorell) 1870
- „ vespertina Thorell 1875 = Zelotes vespertinus (Thorell) 1875
- „ vespertina Simon 1878 = Zelotes thorelli Simon 1914
- „ violacea L. Koch 1877 = Zelotes violaceus (C. L. Koch) 1839
- „ violacea Simon 1878 = Zelotes villicus (Thorell) 1875

Protadia:
- „ patula Simon 1892 = Argenna patula (Simon) 1894
- „ subnigra Kulczynski 1898, Lessert 1910 = Argenna subnigra (Cambridge) 1861

Protagroeca:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Agroeca**
Proxysticus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Xysticus**
Prusias:
„ chazaliae Simon 1898 = Tibellomma chazaliae (Simon) 1898
Psammitis:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Xysticus**
Psecas:
„ enoplus Chickering 1946 = Psecas euoplus Chamberlin & Ivie 1936
Pseudamycus:
„ bicoronatus Simon 1901 = Evarcha bicoronata (Simon) 1901
„ orientalis Szombathy 1915 = Kolomana (Roewer) 1951, orientalis (Szombathy) 1915
„ protervus Simon 1902 = Pancorius protervus (Simon) 1902
„ relucens Simon 1901 = Pancorius relucens (Simon) 1901
Pseudicius:
„ azoroticus Simon 1901 = Pseudicius asoroticus Simon 1890
„ binus Peckham 1894 = Hyctia bina (Hentz) 1846
„ harfordii Peckham 1888 = Dendryphantes harfordii (Peckham) 1888
„ rufithorax Simon 1901 = nom. nud.
Pseudophtalmus:
„ schmidtii Joseph 1882 = nicht zu deuten!
Pseudoplatyoides:
„ bidentatus Strand 1908 = Platyoides bidentatus Strand 1906
„ grandidieri Strand 1908 = Platyoides grandidieri Strand 1903
Pterartoria:
„ caldaria Purcell 1903 = Pterartoriola caldaria (Purcell) 1903
„ lativittata Purcell 1903 = Pterartoriola lativittata (Purcell) 1903
„ sagae Purcell 1903 = Pterartoriola sagae (Purcell) 1903
„ subcrucifera Purcell 1903 = Pterartoriola subcrucifera (Purcell) 1903
Pterelas:
„ schauinslandi Simon 1899 = Proernus schauinslandi (Simon) 1899
Pterinochilus:
„ nigrofulva Pocock 1898 = Idiothele nigrofulva (Pocock) 1898
„ vorax Pocock 1897 = Pteronochilus constrictus (Gerstäcker) 1873
„ vosseleri Strand 1907 = ? Pteronochilus murinus Pocock 1887
Pterinopelma:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Eurypelma**
Pterotricha:
„ aussereri Simon 1909, 1911 = Nomisia mauretanica Dalmas 1920
„ aussereri Simon 1914 = Nomisia aussereri (L. Koch) 1872
„ celerrima Simon 1914 = Nomisia celerrima (Simon) 1914
„ cinerea Simon 1914 = Berlandina cinerea (Menge) 1872
„ clypeolaria Simon 1907 = Crosbyellum clypeolarium (Simon) 1907
„ conspersa Simon 1908 = Crosbyellum santschi (Dalmas) 1921
„ corcyrea Kulczynski 1915 = Berlandina corcyrea (Cambridge) 1874
„ exornata Simon 1914, Lessert 1910 = Nomisia exornata (C. L. Koch) 1839
„ irrugata Simon 1907 = Crosbyellum irrugatum (Simon) 1907
„ lynx Simon 1907 = Crosbyellum lynx (Simon) 1885
„ nubivaga Simon 1914 = Berlandina nubivaga (Simon) 1878
„ plumalis Kulczynski 1911, Simon 1914 = Berlandina plumalis (Cambridge) 1872
„ pulchra Nosek 1905 = Nomisia pulchra (Nosek) 1905
„ ripariensis Kulczynski 1911, Simon 1916 = Nomisia ripariensis (Cambridge) 1872
„ satulla Simon 1909, Berland 1922, Lessert 1929 = Nomisia satulla (Simon) 1909
„ scioana Simon 1909 = Nomisia scioana (Pavesi) 1883
„ spinosissima Simon 1914 = Crosbyellum spinosissimum (Simon) 1878

Pycnacantha:
„ meadii Blackwall 1865 = Pycnacantha tribulus (Fabricius) 1781
Pylarus:
„ bicolor Hentz 1850 = Ariadna bicolor (Hentz) 1850
„ pumilis Hentz 1850 = Ariadna bicolor (Hentz) 1850
Pyresthesis:
„ cribrata Simon 1901 = Platypyresthesis cribrata (Simon) 1901
Pyroderes:
„ flaviventris Canestrini & Pavesi 1870 = Myrmarachne joblotii (Scopoli) 1763
„ formicarius Simon 1868 = Myrmarachne joblotii (Scopoli) 1763
„ formosanus Matsumura 1911 = Myrmarachne formosana (Matsumura) 1911
„ helveticus Canestrini & Pavesi 1870 = Myrmarachne joblotii (Scopoli) 1763
„ semirufus Canestrini & Pavesi 1870 = Myrmarachne semirufa (C. L. Koch) 1837
„ siciliensis Canestrini & Pavesi 1870 = Myrmarachne joblotii tyrolensis (C. L. Koch) 1846
„ tyrolensis Canestrini & Pavesi 1868 = Myrmarachne joblotii (Scopoli) 1763
„ venetiarum Canestrini & Pavesi 1868 = Myrmarachne joblotii (Scopoli) 1763
Pyrophorus (= Pyrophora):
Sämtliche hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Myrmarachne**
„ flaviventris Canestrini & Pavesi 1868 = Myrmarachne joblotii (Scopoli) 1763
„ helveticus C. L. Koch 1846 = Myrmarachne joblotii (Scopoli) 1763
„ siciliensis C. L. Koch 1846 = Myrmarachne joblotii (Scopoli) 1763
„ tyrolensis C. L. Koch 1846 = Myrmarachne joblotii tyrolensis (C. L. Koch) 1846
„ venetiarum Canestrini & Pavesi 1868 = Myrmarachne joblotii (Scopoli) 1763
Pythonissa:
„ arcifera Simon 1882, 1890 = Pterotricha arcifera (Simon) 1882
„ arenicolor Simon 1882 = Minosiella pallida (L. Koch) 1875
„ aussereri Simon 1878, Chyzer & Kulczynski 1897 = Nomisia aussereri (L. Koch) 1872
„ badia L. Koch 1866, 1872 = Gnaphosa badia (L. Koch) 1866
„ bicalcarata Simon 1882, 1890 = Crosbyellum bicalcaratum (Simon) 1882
„ bicolor C. L. Koch 1850 = Gnaphosa bicolor (Hahn) 1831
„ cambridgii Simon 1878 = Pterotricha cambridgii (Cambridge) 1872
„ chordivulvata Strand 1906, 1908 = Nomisia chordivulvata (Strand) 1906
„ cinerea Chyzer & Kulczynski 1897 = Berlandina cinerea (Menge) 1873
„ cinereoplumosa Simon 1878 = Berlandina plumalis (Cambridge) 1872
„ cinereoplumosa Simon 1885 = Crosbyellum irrugatum (Simon) 1907
„ clara Keyserling 1887 = Pterotricha clara (Keyserling) 1887
„ coerulea Holmberg 1876 = Zelotes coeruleus (Holmberg) 1876
„ comata Ohlert 1867 = Poecilochroa conspicua (L. Koch) 1866
„ concolor Simon 1878 part. = Callilepis nocturna concolor Simon 1914
„ conspersa Simon 1878 = Pterotricha conspersa (Cambridge) 1872
„ convexa Simon 1883, 1889 = Scotognapha convexa (Simon) 1883
„ corcyrea Simon 1878 = Berlandina corcyrea (Cambridge) 1874
„ dives Simon 1864 = Micariolepis dives (Lucas) 1846
„ excerpta Simon 1878 = Nomisia excerpta (Cambridge) 1872
„ exornata C. L. Koch 1839, L. Koch 1866, Simon 1878, Chyzer & Kulczynski 1897, Strand 1908 = Nomisia exornata (C. L. Koch) 1839
„ exornata Ohlert 1867 = Berlandina cinerea (Menge) 1872
„ fastuosa Simon 1864 = Micaria fulgens (Walckenaer) 1802
„ femoralis Westring 1862 = Gnaphosa bicolor (Hahn) 1831
„ femoralis L. Koch 1866 = Gnaphosa lucifuga (Walckenaer) 1802
„ flavitarsis Simon 1880 = Callilepis flavitarsis (Simon) 1880
„ fuliginea C. L. Koch 1837, 1843 = Gnaphosa bicolor (Hahn) 1831
„ fumosa C. L. Koch 1843, Westring 1862 = Gnaphosa fumosa (C. L. Koch) 1843
„ fumosa Giebel 1867 = nicht zu deuten!
„ fusca C. L. Koch 1837, 1839 = Gnaphosa lucifuga (Walckenaer) 1802

Pythonissa (Forts.):
- „ fusca C. L. Koch 1850 = Drassodes murinus (Hahn) 1834
- „ helvetica L. Koch 1866 = Gnaphosa leporina (L. Koch) 1866
- „ holobera C. L. Koch 1837 = Callilepis nocturna (Linné) 1758
- „ imbecilla Keyserling 1887, Emerton 1880, 1902 = Pterotricha imbecilla (Keyserling) 1887
- „ jucunda Simon 1878 = Pterotricha jucunda (Thorell) 1875
- „ kochii Simon 1878 = Pterotricha kochii (Cambridge) 1872
- „ lapponum L. Koch 1866 = Gnaphosa lapponum (L. Koch) 1866
- „ lentiginosa L. Koch 1866 = Pterotricha lentiginosa (C. L. Koch) 1837
- „ leporina L. Koch 1866 = Gnaphosa leporina (L. Koch) 1866
- „ linnaei Simon 1878 = Pterotricha linnaei (Audouin) 1827
- „ lucifuga C. L. Koch 1839, Westring 1862 part., L. Koch 1866, Ohlert 1867 = Gnaphosa lucifuga (Walckenaer) 1802
- „ lucifuga Westring 1862 part. = Gnaphosa montana (L. Koch) 1866
- „ lugubris C. L. Koch 1839, L. Koch 1866 = Gnaphosa lugubris (C. L. Koch) 1839
- „ lugubris Westring 1862 = Gnaphosa muscorum (L. Koch) 1866
- „ lutata Simon 1878 = Pterotricha lutata (Cambridge) 1872
- „ lynx Simon 1885 = Crosbyellum lynx (Simon) 1885
- „ maculata C. L. Koch 1839 = Callilepis nocturna (Linné) 1758
- „ marginata Simon 1878 = Nomisia marginata (Cambridge) 1874
- „ molendinaria L. Koch 1866 = Nomisia molendinaria (L. Koch) 1866
- „ montana L. Koch 1866 = Gnaphosa montana (L. Koch) 1866
- „ muscorum L. Koch 1866 = Gnaphosa muscorum (L. Koch) 1866
- „ musiva Simon 1889 = Nomisia musiva (Simon) 1889
- „ nana C. L. Koch 1843 = Gnaphosa nana (C. L. Koch) 1843
- „ nigra C. L. Koch 1837 = Gnaphosa lucifuga (Walckenaer) 1802
- „ nigromaculata Simon 1883 = Berlandina atlantica (Dalmas) 1921
- „ noturna Thorell 1856, L. Koch 1866, Simon 1878, Becker 1896 = Callilepis nocturna (Linné) 1758
- „ nomas Simon 1878 = Pterotricha nomas (Thorell) 1875
- „ nubivaga Simon 1878 = Berlandina nubivaga (Simon) 1878
- „ nyctalopa Simon 1864 = nicht zu deuten!
- „ occulta C. L. Koch 1839, Ohlert 1867 = Gnaphosa lucifuga (Walckenaer) 1802
- „ palaestina Simon 1878 = Nomisia excerpta (Cambridge) 1872
- „ passerina Simon 1884, 1905 = Berlandina plumalis (Cambridge) 1872
- „ plumalis Simon 1878, Kulczynski 1901, Tullgren 1910 part. = Berlandina plumalis (Cambridge) 1872
- „ plumalis Tullgren 1910 part. = Berlandina meruana (Dalmas) 1921
- „ procera Simon 1878 = Pterotricha procera (Cambridge) 1874
- „ punctata Kulczynski 1901 = Nomisia punctata (Kulczynski) 1901
- „ recepta Simon 1885 = Nomisia marginata (Cambridge) 1874
- „ ripariensis Simon 1878 = Nomisia ripariensis (Cambridge) 1872
- „ rufula L. Koch 1866 = Gnaphosa rufula (L. Koch) 1866
- „ schaefferi Simon 1878 = Pterotricha schaefferi (Audouin) 1827
- „ sericata L. Koch 1866 = Cylphosa bicolor (Hentz) 1847
- „ silacea Simon 1878, 1914 = Berlandina cinerea (Menge) 1872
- „ simplex Kulczynski 1901 = Nomisia simplex (Kulczynski) 1901
- „ spinigera Simon 1882 = Minosiella spinigera (Simon) 1882
- „ spinosissima Simon 1878 = Crosbyellum spinosissimum (Simon) 1878
- „ thorelli Lebert 1877 = Gnaphosa thorelli (Lebert) 1877
- „ thressa Simon 1884 = Pterotricha thressa (Pavesi) 1876
- „ trebax Simon 1878 = Pterotricha trebax (Thorell) 1875
- „ tricolor C. L. Koch 1839, L. Koch 1866, Ohlert 1867 = Gnaphosa bicolor (Hahn) 1831
- „ variana C. L. Koch 1839, Ohlert 1867 = Poecilochroa variana (C. L. Koch) 1839
- „ venatrix Simon 1878 = Berlandina venatrix (Cambridge) 1874
- „ verneaui Simon 1889 = Nomisia verneaui (Simon) 1889
- „ zonata Holmberg 1876 = Zelotes zonatus (Holmberg) 1876

Quekettia:
„ georgii Peckham 1902, 1903 = Quekettia georgia (Peckham) 1892
Rachodrassus:
„ flavus Chamberlin & Woodbury 1929 = Agroeca trivittata (Keyserling) 1887
„ monroensis Kaston 1938 = Agroeca ornata Banks 1892
Rachus:
„ quadrioculatus Canestrini 1868 = Spermophora senoculata (Dugès) 1836
„ quadripunctatus Walckenaer 1847 = Spermophora senoculata (Dugès) 1836
Ramnes:
„ semotus Cambridge 1892, Simon 1897, F. Cambridge 1900 = Prusias semotus (Cambridge) 1892
Regillus (= Regillulus):
Alle hier nicht genannten Arten s. unter gleichem Artnamen bei **Borboropactus**
„ cinerascens Strand 1907 = Borboropactus javanicola (Strand) 1913
Remmius:
„ megacephalus Simon 1897 = Palystes megacephalus (C. L. Koch) 1845
„ sordidatus Thorell 1899 = Remmius vultuosus (Simon) 1896
Rhabdoria:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Centromerus**
Rhadine:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Tama**
Rhaebothorax:
„ borealis thori Holm 1939 = Typhochraestus borealis thori (Holm) 1939
Rhane:
„ munda Cambridge 1896 = Zygoballus mundus (Cambridge) 1896
Rhanis:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Rhene**
„ cuprea Simon 1864 = Cylistella cuprea (Simon) 1864
Rhene:
„ cyanea Peckham 1895 = Agassa cyanea (Hentz) 1846
„ tamula Karsch 1879 = nicht zu deuten!
„ tricolor Karsch 1878 = nicht zu deuten!
Rhomalea:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Thelcticopis**
Rhombonotus:
„ gracilis L. Koch 1879, Peckham 1886 = Ligonipes illustris Karsch 1878
„ similis Hasselt 1882 = Ligonipes similis (Hasselt) 1882
Rhyncharachne:
„ dromodaria Bradley 1876 = Poltys dromodarius (Bradley) 1876
Rhynchognatha:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Monaeses**
Rimania:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Synema**
„ bimaculata Dahl 1907 = Firmicus bimaculatus (Simon) 1888
Robertus (für alle Arten durch **Ctenium** zu ersetzen):
„ astutus Cambridge 1879 = Ctenium (Robertus) neglectum (Cambridge) 1870
„ clarkii Lessert 1910 = Ctenium (Robertus) arundineti (Cambridge) 1870
„ monticola Simon 1914, Machado 1949 = Ctenium (Robertus) scoticum (Jackson) 1914
Robsonia:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Desis**
Roewerlana:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Hadites**
Rooseveltia:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Ogdenia**
Rothus:
„ catenulatus Strand 1908 = Rothus subcatenulatus Strand 1908
„ faradjensis Lessert 1928 = Pisaura faradjensis (Lessert) 1928

Rubrius:
„ falxiatus Hogg 1909 = Gohia falxiata (Hogg) 1909
„ mordax Cambridge 1898 = Zorocrates mistus Cambridge 1896

Runcinia:
„ aleatoria Banks 1892 = Misumenoides aleatorius (Hentz) 1847
„ annulipes Cambridge 1891 = Misumenoides annulipes (Cambridge) 1891
„ blanda Cambridge 1891 ♀ = Misumenoides blandus (Cambridge) 1891
„ blanda Cambridge 1891 ♂ = Misumenoides magnus (Keyserling) 1880
„ brendelii Keyserling 1880 = Misumenoides aleatorius (Hentz) 1847
„ californica Banks 1900 = Misumenops dubius (Keyserling) 1880
„ crassipes Keyserling 1880 = Misumenoides crassipes (Keyserling) 1880
„ depressa Cambridge 1891 ♂ = Misumenoides depressus (Cambridge) 1891
„ depressa Cambridge 1891 ♀ = Misumenoides rugosus (Cambridge) 1891
„ elongata Simon 1909 = Runcinia acuminata (Thorell) 1881
„ lateralis Simon 1878 et sequ. = Runcinia cerina (C. L. Koch) 1845
„ lutea Cambridge 1891 = Misumenoides blandus (Cambridge) 1891
„ magna Keyserling 1880 = Misumenoides magnus (Keyserling) 1880
„ nigromaculata Keyserling 1880 = Misumenoides nigromaculatus (Keyserling) 1880
„ parva Keyserling 1880 = Misumenoides parvus (Keyserling) 1880
„ propinqua Cambridge 1891 = Misumenoides magnus (Keyserling) 1880
„ rugosa Cambridge 1891 = Misumenoides rugosus (Cambridge) 1891
„ rutenbergi Karsch 1881 = Cynathea rutenbergi (Karsch) 1881
„ sagittata Cambridge 1891 = Misumenoides blandus (Cambridge) 1891
„ signata Cambridge 1891 = Misumenoides magnus (Keyserling) 1880
„ similis Keyserling 1882 = Misumenoides similis (Keyserling) 1882
„ tibialis Cambridge 1891 = Misumenoides tibialis (Cambridge) 1891
„ vigilans Cambridge 1890 = Misumenoides vigilans (Cambridge) 1890

Runciniopsis:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Runcinia**

Sadala:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Olios**
„ deserta Peckham 1894 = Cotinusa deserta (Peckham) 1894
„ distincta Peckham 1888, 1894 = Cotinusa distincta (Peckham) 1888
„ fenestrata Peckham 1894 = Cotinusa fenestrata (Taczanowski) 1878
„ gemmea Peckham 1894 = Cotinusa gemmea (Peckham) 1894
„ horatia Peckham 1894 = Cotinusa horatia (Peckham) 1894
„ magna Peckham 1894 = Cotinusa magna (Peckham) 1894
„ stolzmanni Peckham 1894 = Cotinusa stolzmanni (Taczanowski) 1878

Sagana:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Liocranum**

Sagella:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Sagellula**

Saitis:
„ canalis Chamberlin 1925 = Corythalia canalis (Chamberlin) 1925
„ ensifera Simon 1903 = Thorelliola ensifera (Thorell) 1877
„ minusculus Banks 1896 = Talavera minuta (Banks) 1895
„ nigricens Berland 1938 = Saitis berlandi Roewer 1951
„ parvula Banks 1895 = Habrocestum parvulum (Banks) 1895
„ piscula Rainbow 1911 = Cytaea piscula (L. Koch) 1867
„ pulex Peckham 1888, Emerton 1891, 1902 = Habrocestum pulex (Hentz) 1846
„ sapiens Peckham 1903 = Habrocestum sapiens (Peckham) 1903
„ splendens Simon 1901 = Saitis rainbowi Roewer 1951
„ x-notata Keyserling 1884 = Habrocestum pulex (Hentz) 1846

Salassia:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Edricus**

Salassina:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Edricus**
„ alobata Franganillo 1931, 1934 = nicht zu deuten (Edricus?)
„ formosa Pocock 1898 = Cyclosa formosa Karsch 1879

Salsula:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Sulsula**

Salticus (= Saltica):
„ abietis Hahn 1831 = Evarcha flammata (Clerck) 1757
„ activus Blackwall 1877 = Heliophanus activus (Blackwall) 1877
„ acutus Blackwall 1877 = Hasarius adansonii (Audouin) 1827
„ aeneus Hahn 1831 = Heliophanus muscorum (Walckenaer) 1802
„ aequipes Cambridge 1871 = Euophrys aequipes (Cambridge) 1871
„ aeratus Cambridge 1872 = nicht zu deuten!
„ affinis Lucas 1846 = Aelurillus affinis (Lucas) 1846
„ affinitatus Cambridge 1870 = Salticus olearii (Scopoli) 1763
„ agilis Hahn 1831 = Pseudeuophrys callida (Walckenaer) 1802
„ albifrons Lucas 1846 = Attulus albifrons (Lucas) 1846
„ albobarbatus Powell 1873 = nicht zu deuten!
„ albobimaculatus Lucas 1846 = Bianor albobimaculatus (Lucas) 1846
„ albocinctus C. L. Koch 1846 = Myrmarachne albocincta (C. L. Koch) 1846
„ albocinctus Peckham 1909, Simon 1901 = Saitis austinensis Gertsch 1936
„ albopalpis Urquhart 1884 = nicht zu deuten!
„ albotrimaculatus Lucas 1846 = Synageles albotrimaculatus (Lucas) 1846
„ albovittatus Lucas 1846 = Salticus scenicus (Linné) 1758
„ algerinus Lucas 1846 = Cyrba algerina (Lucas) 1846
„ alpinus Urquhart 1884 = nicht zu deuten!
„ alticeps Thorell 1890, 1892 = Myrmarachne alticeps (Thorell) 1890
„ amplectens Doleschall 1859 = nicht zu deuten!
„ angustus Thorell 1877 = Myrmarachne angusta (Thorell) 1877
„ annulipes Latreille 1819 = Ballus chalybeius (Walckenaer) 1802
„ appressus Powell 1873 = nicht zu deuten!
„ approximans Cambridge 1872 = Aelurillus approximans (Cambridge) 1872
„ arenarius Lucas 1846 = nicht zu deuten!
„ armatus Peckham 1892 = Myrmarachne armata (Peckham) 1892
„ ater Risso 1826 = nicht zu deuten!
„ atratus Powell 1873 = nicht zu deuten!
„ atricapillus Doleschall 1859 = nicht zu deuten!
„ attenuatus Cambridge 1901 = Myrmarachne attenuata (Cambridge) 1901
„ aubryi Lucas 1858 = Hyllus aubryi (Lucas) 1858
„ aurantius Lucas 1833 = Dendryphantes aurantius (Lucas) 1833
„ auricapillus Doleschall 1859 = nicht zu deuten!
„ baptizatus Butler 1876, 1878 = Cynapes baptizatus (Butler) 1876
„ basseletii Lucas 1846 = Aelurillus basseletii (Lucas) 1846
„ bellicosus Peckham 1892 = Myrmarachne maxillosa (C. L. Koch) 1846
„ berbruggeri Lucas 1846 = nicht zu deuten!
„ berolinensis C. L. Koch 1846 = Leptorchestes cinctus (Dugès) 1836
„ bicolor L. Koch 1879 = Myrmarachne bicolor (L. Koch) 1879
„ bicurvatus Cambridge 1869 = Myrmarachne bicurvata (Cambridge) 1869
„ biguttatus Blackwall 1867 = nicht zu deuten!
„ bivittatus Dufour 1831 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
„ blackwalli Clarck 1855, Blackwall = Marpissa pomatia (Walckenaer) 1802
„ blancardi Hahn 1831 = Evarcha flammata (Clerck) 1757
„ blandus Blackwall 1869 = Saitis barbipes (Simon) 1868
„ bleekeri Doleschall 1859 = Euryattus bleekeri (Doleschall) 1859
„ borealis Blackwall 1846 = Evarcha leucophaea (C. L. Koch) 1846
„ boryi Lucas 1846 = Icius hamatus (C. L. Koch) 1846
„ bovaei Lucas 1846 = Habrocestum bovaei (Lucas) 1846
„ bresnieri Lucas 1846 = Phlegra bresnieri (Lucas) 1846

Salticus (Forts.):

„ brevipes Hahn 1831 = Ballus chalybeius (Walckenaer) 1802
„ brevis Blackwall 1869 = nicht zu deuten!
„ bufo Doleschall 1859 = Rhene bufo (Doleschall) 1859
„ candidus Blackwall 1867 = nicht zu deuten!
„ catesbaei Latreille 1819 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
„ catus Blackwall 1867 = Dendryphantes catus (Blackwall) 1867
„ centralis Peckham 1892 = Myrmarachne centralis (Peckham) 1892
„ cephalicus Blackwall 1862 = nicht zu deuten!
„ cephalotes Doleschall 1859 = nicht zu deuten!
„ cephalotes Cambridge 1872 = Cyrba algerina (Lucas) 1846
„ chalybeus Hahn 1834 = Heliophanus cupreus (Walckenaer) 1802
„ cirtanus Lucas 1846 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
„ citus Cambridge 1863 = Hasarius adansonii (Audouin) 1827
„ clemens Cambridge 1872 = Euophrys clemens (Cambridge) 1872
„ coccinelloides Cambridge 1869 = Cylistella coccinelloides (Cambridge) 1869
„ coccociliatus Cambridge 1863 = Euophrys petrensis C. L. Koch 1837
„ coeruleostriatus Doleschall 1859 = Telamonia coeruleostriata (Doleschall) 1859
„ cognatus Cambridge 1872 = Aelurillus cognatus (Cambridge) 1872
„ collingwoodii Cambridge 1871 = Cosmophasis collingwoodii (Cambridge) 1871
„ compactus Urquhart 1884 = Bianor compactus (Urquhart) 1884
„ congener Cambridge 1872 = Hyctia congenera (Cambridge) 1872
„ conjunctus Simon 1937 = Salticus conjonctus (Simon) 1868
„ constrictus Blackwall 1877 = Myrmarachne constricta (Blackwall) 1877
„ contractus Karsch 1880 = nicht zu deuten!
„ conveniens Cambridge 1872 = Aelurillus conveniens (Cambridge) 1872
„ convergens Doleschall 1859 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
„ coronatus Blackwall 1861 = Evarcha flammata (Clerck) 1757
„ cornutus Blackwall 1866 = Hyllus cornutus (Blackwall) 1866
„ cruentatus Lucas 1857 = Phiale cruentata (Walckenaer) 1837
„ crux Hahn 1831 = Pellenes tripunctatus (Walckenaer) 1802
„ culicivorus Doleschall 1859 =Plexippus paykullii (Audouin) 1827
„ cupreus Hahn 1834, Blackwall 1861 = Heliophanus cupreus (Walckenaer) 1802
„ curvidens Cambridge 1872 = Heliophanus curvidens (Cambridge) 1872
„ curvus Urquhart 1884 = nicht zu deuten!
„ dalmaticus Keyserling 1863 = Synageles dalmaticus (Keyserling) 1863
„ decorus Blackwall 1846 = Pellenes decorus (Blackwall) 1846
„ delectus Cambridge 1872 = Heliophanus delectus (Cambridge) 1872
„ delicatus Blackwall 1862 = Amycus delicatus (Blackwall) 1862
„ dentatidens Cambridge 1872 = Heliophanus dentatidens (Cambridge) 1872
„ denticulatus Karsch 1880 = nicht zu deuten!
„ desertus Peckham 1892 = Myrmarachne myrmicaeformis (Lucas) 1870
„ devorans Cambridge 1872 = nicht zu deuten!
„ deyrollei Lucas 1858 = Hyllus deyrollei (Lucas) 1858
„ dilatatus Karsch 1880 = nicht zu deuten!
„ diligens Blackwall 1867 = Dendryphantes nidicolens (Walckenaer) 1825
„ discicollis Taczanowski 1878 = nicht zu deuten!
„ distinctus Blackwall 1841, 1861 = Pseudeuophrys callida (Walckenaer) 1802
„ diversus Blackwall 1868 = Plexippus paykulli (Audouin) 1827
„ dubius Peckham 1892 = Myrmarachne dubia (Peckham) 1892
„ dumicola Cambridge 1872 = Philaeus dumicola (Cambridge) 1872
„ duriaei Lucas 1846 = Pellenes duriaei (Lucas) 1846
„ edentatus Peckham 1892 = Myrmarachne edentata (Peckham) 1892
„ electricus Peckham 1892 = Myrmarachne electrica (Peckham) 1892
„ ephippiatus Peckham 1888, 1892 = Myrmarachne hentzi Banks 1913
„ ephippiatus Emerton 1891 = Myrmarachne albocincta (C. L. Koch) 1846
„ epularis Cambridge 1872 = Philaeus epularis (Cambridge) 1872

Salticus (Forts.):

- „ erraticus Lucas 1846 = Icius hamatus (C. L. Koch) 1846
- „ erythrogaster Lucas 1846 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
- „ eumenes Simon 1900 = Myrmarachne eumenes (Simon) 1900
- „ exilis Blackwall 1869 = nicht zu deuten!
- „ expers Cambridge 1870 = Heliophanus viriatus Simon 1869
- „ facetus Cambridge 1872 = Heliophanus facetus (Cambridge) 1872
- „ fallax Lucas 1846 = Philaeus fallax (Lucas) 1846
- „ fasciatus Hahn 1831 = Phlegra fasciata (Hahn) 1826
- „ fasciatus Cambridge 1872 = Langona redii (Audouin) 1827
- „ festivus Blackwall 1862 = nicht zu deuten!
- „ fimbriatus Doleschall 1859 = Linus fimbriatus (Doleschall) 1859
- „ flavescens Cambridge 1872 = Menemerus flavescens (Cambridge) 1872
- „ flavescentemaculatus Lucas 1846 = Mogrus flavescentemaculatus (Lucas) 1846
- „ flavipalpis Lucas 1853 = Pellenes flavipalpis (Lucas) 1853
- „ flavipalpus Risso 1826 = nicht zu deuten!
- „ flavipes Hahn 1831, 1836 = Heliophanus ritteri (Scopoli) 1763
- „ flavobilineatus Doleschall 1859 = nicht zu deuten!
- „ floricola Blackwall 1861 = Sitticulus saltator (Simon) 1868
- „ floricola Cambridge 1873 = Sitticus mancus (Thorell) 1875
- „ floricolus Doleschall 1859 = Cytaea sinuata (Doleschall) 1859
- „ forceps Doleschall 1859 = Canama forceps (Doleschall) 1859
- „ formicae Doleschall 1859 = Myrmarachne formicae (Doleschall) 1859
- „ formicaeformis Lucas 1849, Simon 1868 = Leptorchestes cinctus (Dugès) 1836
- „ formicaria Simon 1864 = Myrmarachne joblotii (Scopoli) 1763
- „ formicarius Sundevall 1832 et sequ. = Myrmarachne joblotii (Scopoli) 1763
- „ formosus Thorell 1890, 1892 = Myrmarachne formosa (Thorell) 1890
- „ frontalis Blackwall 1861 = Euophrys maculata (Wider) 1834
- „ fulgens Cambridge 1872 = Euophrys fulgens (Cambridge) 1872
- „ fuligineus Blackwall 1846 = Peckhamia scorpionia (Hentz) 1846
- „ fulviventris Lucas 1846 = Dendryphantes fulviventris (Lucas) 1846
- „ fulvopilosus Lucas 1846 = Neaetha fulvopilosa (Lucas) 1846
- „ fulvotrilineatus Lucas 1846 = Phlegra fulvotrilineata (Lucas) 1846
- „ fulvounilineatus Lucas 1846 = nicht zu deuten!
- „ fulvovittatus Doleschall 1859 = Cosmophasis viridifasciata (Doleschall) 1859
- „ fumosus Powell 1873 = nicht zu deuten!
- „ furcatus Cambridge 1872 = Heliophanus furcatus (Cambridge) 1872
- „ furcatus Karsch 1880 = nicht zu deuten!
- „ furvus Urquhart 1884 = nicht zu deuten!
- „ gervaisii Lucas 1846 = nicht zu deuten!
- „ gesticulator Lucas 1846 = Aelurillus gesticulator (Lucas) 1846
- „ gracilis Hahn 1831, Blackwall 1861 = Pseudeuophrys callida (Walckenaer) 1802
- „ gracilis Peckham 1892 = Myrmarachne peckhami Roewer 1951
- „ grossipes Latreille 1819, Hahn 1831 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
- „ guichenotii Lucas 1846 = nicht zu deuten!
- „ guyonii Lucas 1846 = Icius guyonii (Lucas) 1846
- „ heliophanoides Cambridge 1872 = Heliophanus heliophanoides (Cambridge) 1872
- „ hesperius Simon 1887 = Myrmarachne hesperia (Simon) 1887
- „ heterophthalmus Wider 1834 = Ballus chalybeius (Walckenaer) 1802
- „ hilarulus C. L. Koch 1846, Menge 1877, Dahl 1883 = Synageles venator (Lucas) 1835
- „ histrionicus Cambridge 1871 = Salticus scenicus (Clerck) 1757
- „ ichneumon Simon 1885, Peckham 1892, 1903 = Myrmarachne ichneumon (Simon) 1885
- „ igneus Perty 1833 = Amycus igneus (Perty) 1833
- „ imbellis Peckham 1892 = Myrmarachne imbellis (Peckham) 1892

Salticus (Forts.):

„ indistinctus Cambridge 1872 = Menemerus indistinctus (Cambridge) 1872
„ insignis Cambridge 1872 = Napoca insignis (Cambridge) 1872
„ intentus Blackwall 1869 = Menemerus semilimbatus (Hahn) 1829
„ interceptor Cambridge 1876 = Langona redii (Audouin) 1827
„ japonicus Karsch 1879 = Myrmarchne japonica (Karsch) 1879
„ jenysii Blackwall 1854, 1861 = nicht zu deuten!
„ jucundus Lucas 1846 = Evarcha jucunda (Lucas) 1846
„ latidens Doleschall 1859 = Ligurra latidens (Doleschall) 1859
„ latidens Simon 1901 = Salticus latidentatus Roewer 1951
„ lepidus Guérin 1834 = Zenodorus lepidus (Guérin) 1834
„ lepidus Blackwall 1865, Berland 1936 = Plexippus marginellus (Simon) 1883
„ leptognathus Thorell 1890, 1892 = Myrmarachne leptognatha (Thorell) 1890
„ leucogramma Latreille 1819 = Pseudicicius encarpatus (Walckenaer) 1802
„ leucomelas Lucas 1858 = Hyllus leucomelas (Lucas) 1858
„ levaillantii Lucas 1846 = Pellenes levaillantii (Lucas) 1846
„ lilliputanus Lucas 1846 = nicht zu deuten!
„ limbatus Hahn 1826 = Evarcha arcuata (Clerck) 1757
„ limbatus Lucas 1833 = nicht zu deuten!
„ littoralis Hahn 1831, 1836 = Sitticus littoralis (Hahn) 1831
„ luctuosus Lucas 1846 = Aelurillus luctuosus (Lucas) 1846
„ lugubris Kulczynski 1895 = Myrmarachne lugubris (Kulczynski) 1895
„ luridus Simon 1885 = Myrmarachne manducator (Westwood) 1831
„ macleayanus Bradley 1876 = Myrmarachne macleayana (Bradley) 1876
„ macrognathus Thorell 1894 = Myrmarachne macrognatha (Thorell) 1894
„ maculatus Wider 1834 = Euophrys maculata (Wider) 1834
„ manducator Westwood 1831 = Myrmarachne manducator (Westwood) 1831
„ mauritanicus Lucas 1846 = Menemerus semilimbatus (Hahn) 1829
„ melanocephalus Simon 1885 = Myrmarachne kochi Reimoser 1925
„ melanops Taczanowski 1871 = Myrmarachne melanops (Taczanowski) 1871
„ melanotarsus Grube 1861 = Aelurillus festivus (C. L. Koch) 1834
„ minax Blackwall 1862 = nicht zu deuten!
„ minax Powell 1873 = nicht zu deuten!
„ miniszechii Lucas 1858 = Hyllus miniszechii (Lucas) 1858
„ modestus Thorell 1892 = Myrmarachne maxillosa (C. L. Koch) 1846
„ moestus Lucas 1846 = Heliophanus moestus (Lucas) 1846
„ monardi Lucas 1846 = Aelurillus monardi (Lucas) 1846
„ mordax Cambridge 1872 = Heliophanus mordax (Cambridge) 1872
„ moreletii Lucas 1846 = Thyene moreletii (Lucas) 1846
„ mustilinus Powell 1873 = nicht zu deuten!
„ mutillaeformis Taczanowski 1878 = nicht zu deuten!
„ mutilloides Lucas 1846, Simon 1868 = Leptorchestes mutilloides (Lucas) 1846
„ myrmeciaeformis Lucas 1870 = Myrmarachne myrmeciaeformis (Lucas) 1870
„ myrmecoides Rossi 1846 = Synageles venator (Lucas) 1835
„ nemorensis Peckham 1892 = Myrmarachne nemorensis (Peckham) 1892
„ nepos Cambridge 1872 = nicht zu deuten!
„ nicoletii Lucas 1846 = Aelurillus monardi (Lucas) 1846
„ nidicolens Cambridge 1861 = Aeluriflus insignitus (Olivier) 1789
„ niger Peckham 1892 = Myrmarachne nigella Simon 1901
„ nigrifrons Lucas 1846 = nicht zu deuten!
„ nigripes Risso 1866 = nicht zu deuten!
„ nigrolimbatus Cambridge 1869, 1873 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831
„ nigromaculatus Lucas 1846 = Euophrys nigromaculata (Lucas) 1846
„ nitidiventris Lucas 1846 = Phlegra nitidiventris (Lucas) 1846
„ nitidus Lucas 1846 = Heliophanus nitidus (Lucas) 1846
„ nivoyi Lucas 1846 = Hyctia nivoyi (Lucas) 1846
„ notatus Blackwall 1852, 1861 = nicht zu deuten!
„ numidicus Lucas 1846 = Phlegra numidica (Lucas) 1846

Salticus (Forts.):

„ obisioides Doleschall 1859, Simon 1864 = Diolenius phrinoides (Walckenaer) 1837
„ obnixus Blackwall 1869 = Evarcha jucunda (Lucas) 1846
„ obscurus Blackwall 1850, 1861 = Ballus chalybeius (Walckenaer) 1802
„ oraniensis Lucas 1846 = Hasarius adansonii (Audouin) 1827
„ orseryi Lucas 1856 = nicht zu deuten!
„ particeps Cambridge 1872 = Phlegra particeps (Cambridge) 1872
„ pascualis Cambridge 1872 = nicht zu deuten!
„ patagiatus Cambridge 1872 = nicht zu deuten!
„ paviei Simon 1886, 1909 = Myrmarachne paviei (Simon) 1886
„ pavo Doleschall 1859 = nicht zu deuten!
„ pectorosus Thorell 1890, 1892 = Myrmarachne pectorosa (Thorell) 1890
„ peresii Simon 1868 = Leptorchestes peresii (Simon) 1868
„ petilus Blackwall 1870 = Dendryphantes petilus (Blackwall) 1870
„ phrynoides Simon 1864 = Diolenius phrinoides (Walckenaer) 1837
„ pini Hahn 1831, 1836 = Dendryphantes hastatus (Clerck) 1757
„ placidus Blackwall 1862 = nicht zu deuten!
„ plataleoides Cambridge 1869, Peckham 1892 = Myrmarachne plataleoides (Cambridge) 1869
„ politiventris Cambridge 1872 = Aelurillus politiventris (Cambridge) 1872
„ pratincola Cambridge 1870 = Sitticus truncorum (Linné) 1758
„ pravus Karsch 1880 = nicht zu deuten!
„ promptus Blackwall 1854, 1861 = Marpissa pomatia (Walckenaer) 1802
„ properus Blackwall 1862 = nicht zu deuten!
„ proruptus Blackwall 1862 = nicht zu deuten!
„ providens Peckham 1892 = Myrmarachne providens (Peckham) 1892
„ pubescens Hahn 1831 = Sitticus truncorum (Linné) 1758
„ pustulatus White 1841 = Homalattus pustulatus (White) 1841
„ putus Cambridge 1872 = Bianor putus (Cambridge) 1872
„ quadrimaculatus Guérin 1838 = Phiale quadrimaculata (Walckenaer) 1837
„ quinquepartitus Hahn 1833 = Aelurillus insignitus (Olivier) 1789
„ ravoisiaei Lucas 1846 = Neaetha ravoisiaei (Lucas) 1846
„ regulus Doleschall 1859 = Zenodorus lepidus (Guérin) 1834
„ repudiatus Cambridge 1876 = Synageles repudiatus (Cambridge) 1876
„ reticulatus Blackwall 1853, 1861 = Neon reticulatus (Blackwall) 1853
„ robustus Peckham 1892 = Myrmarachne robusta (Peckham) 1892
„ rodericensis Butler 1876, 1878 = Plexippus paykullii (Audouin) 1827
„ roseofasciatus Doleschall 1859 = nicht zu deuten!
„ ruficapillus Doleschall 1859 = nicht zu deuten!
„ ruficeps Taczanowski 1878 = Fluda ruficeps (Taczanowski) 1878
„ rufifrons Blackwall 1834 = Euophrys maculata (Wider) 1834
„ rufifrons Lucas 1846 = nicht zu deuten!
„ rufolimbatus Lucas 1846 = Menemerus soldanii (Audouin) 1827
„ rufolineatus Lucas 1846 = nicht zu deuten!
„ rumpfii Latreille 1806, Hahn 1831 = Marpissa muscosa (Clerck) 1757
„ sagraeus Lucas 1857 = Dendryphantes regius (C. L. Koch) 1846
„ saltator Cambridge 1870 = Sitticulus saltator (Simon) 1868
„ sanguinolentus Hahn 1831 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
„ scabellatus Butler 1876, 1878 = Hasarius adansonii (Audouin) 1827
„ scenicus Blackwall 1861 = Salticus cingulatus (Panzer) 1797
„ scitulus Blackwall 1862 = nicht zu deuten!
„ scolopax Wider 1834 = Sitticus truncorum (Linné) 1758
„ sedulus Blackwall 1865 = Dendryphantes sedulus (Blackwall) 1865
„ semiater Doleschall 1859 = nicht zu deuten!
„ senicus Comstock 1912 = Salticus scenicus (Clerck) 1757
„ sexpunctatus Doleschall 1859 = Bavia sexpunctata (Doleschall) 1859
„ simonii Cambridge 1872 = Pellenes simonii (Cambridge) 1872

Salticus (Forts.):
- simonis Herman 1879, Chyzer & Kulczynski 1891 = Myrmarachne simonis (Herman) 1879
- „ simplex Blackwall 1865 = Bianor simplex (Blackwall) 1865
- „ simplex Peckham 1892 = Myrmarachne simplexella Roewer 1951
- „ sinuatus Doleschall 1859 = Cytaea sinuata (Doleschall) 1859
- „ sloanii Latreille 1806 = Philaeus chrysops (Poda) 1761
- „ sparsus Blackwall 1834, 1861 = Sitticus truncorum (Linné) 1758
- „ speciosus Cambridge 1874 = Saitis speciosa (Cambridge) 1874
- „ spiniger Cambridge 1872 = Pseudicius spiniger (Cambridge) 1872
- „ spissus Peckham 1892 = Myrmarachne spissa (Peckham) 1892
- „ splendens Lucas 1856 = nicht zu deuten!
- „ staintonii Cambridge 1872 = Hyctia staintonii (Cambridge) 1872
- „ sternalis Lucas 1858 = nicht zu deuten!
- „ striatus Lucas 1853 = Hasarius adansonii (Audouin) 1827
- „ sublestus Blackwall 1867 = Chalcoscirtus sublestus (Blackwall) 1867
- „ sumptuosus Perty 1833 = Psecas sumptuosus (Perty) 1833
- „ sundevalli Blackwall 1846 = Marpissa undata (De Geer) 1778
- „ tabinus Urquhart 1884 = nicht zu deuten!
- „ tardigradus Blackwall 1861 = Marpissa muscosa (Clerck) 1757
- „ tenebricus Urquhart 1884 = nicht zu deuten!
- „ terrebratus Cambridge 1863 = Sitticus truncorum (Linné) 1758
- „ testaceolineatus Lucas 1846 = Icius testaceolineatus (Lucas) 1846
- „ theisii Lucas 1846 = nicht zu deuten!
- „ tigrinus Han 1831 = Pseudicius encarpatus (Walckenaer) 1802
- „ todillus Simon 1868, Cambridge 1872 = Synageles dalmaticus (Keyserling) 1863
- „ tristis Simon 1882, 1890, Peckham 1892 = Myrmarachne tristis (Simon) 1882
- „ trochilus Doleschall 1859 = Telamonia trochila (Doleschall) 1859
- „ truncorum Cambridge 1863 = Sitticus truncorum (Linnè) 1758
- „ tyrolensis Simon 1876 = Myrmarachne joblotii tyrolensis (C. L. Koch) 1846
- „ unifasciatus Risso 1826 = nicht zu deuten!
- „ vafer Blackwall 1867 = Pseudeuophrys vafra (Blackwall) 1867
- „ vaillantii Lucas 1846 = Plexippus paykullii (Audouin) 1827
- „ variegatus Risso 1826 = nicht zu deuten!
- „ variegatus Lucas 1833 = Dendryphantes variegatus (Lucas) 1833
- „ venator Lucas 1836, Simon 1868 = Synageles venator (Lucas) 1835
- „ venustus Doleschall 1859 = Euryattus venustus (Doleschall) 1859
- „ vigilans Blackwall 1867 = Dendryphantes nidicolens (Walckenaer) 1802
- „ viridifasciatus Doleschall 1859 = Cosmophasis viridifasciata (Doleschall) 1859
- „ v-notatus Powell 1873 = nicht zu deuten!
- „ volans Cambridge 1874 = Saitis volans (Cambridge) 1874
- „ wrightii Blackwall 1877 = Cynapes wrightii (Blackwall) 1877
- „ xanthogramma Blackwall 1851, 1861 = Carrhotus xanthogramma (Walckenaer) 1825
- „ zanthofrontalis Urquhart 1884 = nicht zu deuten!
- „ zebraneus Lessert 1910, Simon 1937 = Salticus olearii (Scopoli) 1763
- „ zostifer Doleschall 1859 = nicht zu deuten!

Saltuinus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Thaumasia**

Samuza:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Gayenna**

Santaremia:
- „ longipes F. Cambridge 1896 = Psalmopoeus cambridgei (Pocock) 1895
- „ pococki F. Cambridge 1896 = Ephebopus murinus (Walckenaer) 1837

Sarinda:
- „ formosa Banks 1929 = Zuniga formosa (Banks) 1929
- „ glabra Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
- „ pottsi Petrunkevitch 1911 = Sarinda laeta (Peckham) 1892

Sarotes:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Olios**
„ aulicus L. Koch 1878 = Heteropoda aulica (L. Koch) 1878
„ badius L. Koch 1875 = Heteropoda badiella Roewer 1951
„ callipygus Thorell 1887 = Olios punctipes Simon 1884
„ cervinus L. Koch 1875 = Heteropoda cervina (L. Koch) 1875
„ debilis L. Koch 1875 = Heteropoda debilis (L. Koch) 1875
„ forcipatus Karsch 1881 = Heteropoda forcipata (Karsch) 1881
„ invictus L. Koch 1878 = Heteropoda invicta (L. Koch) 1878
„ jugulans L. Koch 1876 = Heteropoda jugulans (L. Koch) 1876
„ longipes L. Koch 1875 = Heteropoda longipes (L. Koch) 1875
„ nobilis L. Koch 1875 = Heteropoda nobilis (L. Koch) 1875
„ peditatus Karsch 1881 = Heteropoda invicta (L. Koch) 1878
„ proceris L. Koch 1875 = Heteropoda procera (L. Koch) 1875
„ promptus Cambridge 1885 = Heteropoda prompta (Cambridge) 1885
„ regius L. Koch 1875 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ sartor L. Koch 1875 = Heteropoda sartrix (L. Koch) 1865
„ suspiciosus L. Koch 1875 = Heteropoda nobilis (L. Koch) 1875
„ truncus Mc Cook 1878 = Heteropoda truncus (Mc Cook) 1878
„ venatorius Mc Cook 1878 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ venustus Thorell 1887 = Olios punctipes Simon 1884
„ vulpinus Cambridge 1877 = Heteropoda vulpina (Cambridge) 1877

Sarpedon:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Sason**

Satricum:
„ gnaphosoides Cambridge 1892 = Zorocrates fuscus Simon 1888

Satzicus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Sason**

Savignyia (= Savignia):
„ crassiceps Dahl 1912 = Araeoncus crassiceps (Westring) 1862
„ frontata Simon 1926 = Savignia frontata Blackwall 1833
„ picina Dahl 1912, Roewer 1928, Hackman 1951 = Plaesiocraerus picinus (Blackwall) 1841
„ sulcifrons Dahl 1912, Roewer 1928 = Panamomops sulcifrons (Wider) 1834

Scaea:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Servaea**

Scalidognathus:
„ seticeps Karsch 1891 = Scalidognathus radialis (Cambridge) 1869
„ arenicola Banks 1904 = Geolycosa turricola (Treat) 1880

Scartes:
„ parvulus Menge 1879, Peckham 1886 = nicht zu deuten!

Scheniosceliss:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Schaenioscelis**

Schilleria:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Synema**

Schizocosa:
„ avida Gertsch & Wallace 1937, Chamberlin & Ivie 1942, Kaston 1948 = Avicosa avida (Walckenaer) 1837
„ bilineata Chamberlin 1908, Comstock 1912 et sequ. = Lycosa bilineata (Emerton) 1885
„ celerior Chamberlin 1910, Gertsch & Wallace 1937 = Allocosa parallela (Banks) 1898
„ crassipalpis Gertsch & Wallace 1937, Kaston 1948 = Schizocosa crassipalpata Roewer 1951
„ crassipes Petrunkevitch 1910, Gertsch & Wallace 1937, Chamberlin & Ivie 1944, Kaston 1948 = Hogna crassipes (Walckenaer) 1837
„ duplex Chamberlin 1925, Gertsch & Wallace 1937, Chamberlin & Ivie 1944 = Isohogna duplex (Chamberlin) 1923

Schizocosa (Forts.):
„ duplex Bryant 1935 = Isohogna episima (Chamberlin) 1924
„ episima Chamberlin 1924, Gertsch & Wallace 1937, Chamberlin & Ivie 1944 = Isohogna episima (Chamberlin) 1924
„ floridana Bryant 1934, Gertsch & Wallace 1937, Chamberlin & Ivie 1944 = Varacosa floridana (Bryant) 1934
„ kaieteurensis Gertsch & Wallace 1937 = Varacosa kaieteurensis (Gertsch & Wallace) 1937
„ langei Mello-Leitao 1947 = Pavocosa landei (Mello-Leitao) 1947
„ minnesotensis Gertsch & Wallace 1937, Chamberlin & Ivie 1942 = Avicosa minnesotensis (Gertsch) 1934
„ ocreata Chamberlin 1908, Comstock 1912 = Hogna crassipes (Walckenaer) 1837
„ parallela Gertsch & Davis 1940 = Allocosa parallela (Banks) 1898
„ retrorsa Gertsch & Wallace 1937 = Scaptocosa retrorsa (Banks) 1911
„ salsa Barnes 1953 = Isohogna salsa (Barnes) 1953
„ segregata Gertsch & Wallace 1937 = Varacosa segregata (Gertsch & Wallace) 1937
„ tristani Gertsch & Wallace 1937 = Schizogyna tristani (Banks) 1909
„ unica Gertsch & Wallace 1935 = Hesperocosa unica (Gertsch & Wallace) 1935
„ venustula Chamberlin 1904 = Schizocosa saltatrix (Hentz) 1844
„ wasatchensis Chamberlin & Ivie 1942, Levi 1951 = Avicosa wasatchensis (Chamberlin & Ivie) 1942

Schizopelma:
„ erichsoni Banks 1901 = Phormictopus cancerides (Latreille) 1806

Schoenobates:
„ pavesii Simon 1873 = Orchestina pavesii (Simon) 1873
„ walkeri Blackwall 1850, 1864 = nicht zu deuten!

Scirtetes:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Damoetas**

Scius:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Chalcoscirtus**

Sclerogaster:
„ pusillus Cavanna 1876 = Ulesanis paradoxa (Lucas) 1846

Scleroschema (= **Scleroschaema**):
„ hiemalis Hull 1911 = Troxochrus hiemalis (Blackwall) 1841
„ ignobilis Hull 1911 = Troxochrus ignobilis (Cambridge) 1870

Scodra:
„ aussereri Becker 1879 = Scodra calcarata (Fabricius) 1793

Scotargus:
„ inerrans Simon 1926 part. = Trichoncus inerrans (Cambridge) 1885
„ inerrans Simon 1926 part, Schenkel 1929, Miller 1936 = Scotargus pilosus Simon 1913

Scotina:
„ praelongipes Simon 1897 = Scotina gracilipes (Blackwall) 1859
„ paillardi Simon 1932 = Scotina pallardii (L. Koch) 1881
„ palliardi Reimoser 1937 = Scotina pallardii (L. Koch) 1881

Scotinella:
„ formidabilis Levi 1951 = Phruronellus formidabilis Chamberlin & Gertsch 1930
„ minnetonka Levi 1951 = Phruronellus minnetonka Chamberlin & Gertsch 1930
„ pelvicolor Levi 1951 = Phruronellus pelvicolor Chamberlin & Gertsch 1930
„ pintura Barnes 1953 = Phruronellus pinturus Ivie & Barrows 1935

Scotolathys:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Lathys**
„ alba Chamberlin & Ivie 1944 = Lathys albida Gertsch 1946
„ cavatica Bryant 1940 = Tugana cavatica (Bryant) 1940
„ maculata immaculata Chamberlin & Ivie 1944 = Lathys immaculata (Chamberlin & Ivie) 1944

Scotophaeus:
„ corruscus Strand 1908 = Xerophaeus corruscus (L. Koch) 1875
„ desertorum Caporiacco 1928 = Pseudodrassus desertorum (Caporiacco) 1928
„ isabellinus Lessert 1904 = Scotophaeus blackwallii isabellinus (Simon) 1878
„ javanus Kulczynski 1911 = Zelotes javanus (Kulczynski) 1911
„ pugnax Strand 1908 = Poecilochroa pugnax (Cambridge) 1874
„ quadridentatus Caporiacco 1928 = Pseudodrassus quadridentatus (Caporiacco) 1928
„ scutatus Simon 1893 = Scotophaeus scrutatus (Cambridge) 1872
„ subpugnax Strand 1908 = ? Poecilochroa pugnax (Cambridge) 1874

Scotynotylus:
„ ungavensis Jackson 1933 = Coryphaeolana holmgreni (Thorell) 1871

Scurria:
„ fasciata C. L. Koch 1850 = Poecilotheria fasciata (Latreille) 1804
„ fasciata Ausserer 1871 = Poecilotheria subfusca Pocock 1895
„ geniculata C. L. Koch 1850 = Acanthoscurria geniculata (C. L. Koch) 1842

Scylax:
„ walteri Simon 1889 = Theuma walteri (Simon) 1889

Scythropa:
„ maculata Keyserling 1883 = Bianor maculatus (Keyserling) 1883

Scytodes:
„ amarantha Vinson 1863 = Scytodes velutina Lowe 1836
„ atrofusca Strand 1915 = ? Scytodes fusca Walckenaer 1837
„ bizonata Risso 1826 = nicht zu deuten!
„ camerata Hentz 1850 = Scytodes thoracica (Latreille) 1804
„ delicatula Simon 1873, 1893, 1914 = Scytodes velutina delicatula (Simon) 1873
„ distincta Lucas 1846 = Loxoscelis distincta (Lucas) 1846
„ domestica Doleschall 1859, Kulczynski 1910, 1911, Dyal 1935 = Scytodes fusca Walckenaer 1837
„ erythrocephala C. L. Koch 1838 = Loxoscelis rufescens (Dufour) 1820
„ globulata Simon 1904 = Scytodes globula Nicolet 1849
„ guianensis Taczanowski 1873, Keyserling 1891 = Scytodes fusca Walckenaer 1837
„ italica Canestrini 1868 = nicht zu deuten!
„ kochii Cambridge 1876 = Scytodes velutina Lowe 1836
„ laeta Nicolet 1849 = Loxoscelis laeta (Nicolet) 1849
„ marmorata L. Koch 1872, Taczanowski 1873 = Scytodes longipes Lucas 1845
„ marmorella Strand 1906, 1915 = Scytodes longipes Lucas 1845
„ mithras Walckenaer 1837 = Uptiotes paradoxus (C. L. Koch) 1837
„ nigella Nicolet 1849 = Loxoscelis laeta (Nicolet) 1849
„ omosite Walckenaer 1837 = Loxoscelis rufipes (Lucas) 1834
„ pallida Blackwall 1865 = Loxoscelis rufescens (Dufour) 1820
„ rufescens Dufour 1820, Audouin 1827, Walckenaer 1837 = Loxoscelis rufescens (Dufour) 1820
„ rufipes Lucas 1834 = Loxoscelis rufipes (Lucas) 1834
„ rufipes Nicolet 1849 = Loxoscelis laeta (Nicolet) 1849
„ taczanowskii Keyserling 1891 = Scytodes longipes Lucas 1845
„ unicolor Canestrini 1868 = Scytodes velutina Lowe 1836

Segestria:
„ aequatoria Marx 1889 = nicht zu deuten!
„ atrata C. Koch 1874 = nicht zu deuten!
„ canities Mc Cook 1889 = Diguetia canities (Mc Cook) 1889
„ cellaria Latreille 1806, Dufour 1824 = Segestria florentina (Rossi) 1790
„ dentata Risso 1826 = Argyope lobata (Pallas) 1772
„ galapagoensis Marx 1889 = nicht zu deuten!
„ garbigliettii Canestrini & Pavesi 1870 = nicht zu deuten!
„ longipes C. Koch 1874 = nicht zu deuten!
„ mollis Holmberg 1876 = Ariadna mollis (Holmberg) 1876

Segestria (Forts.):
„ perfida Walckenaer 1805, Audouin 1827, Blackwall 1864 = Segestria florentina (Rossi) 1790
„ perfida Holmberg 1877 = Segestria ruficeps Guérin 1828
„ pulchra Risso 1826 = Argyope brünnichii (Scopoli) 1772
„ senoculata Lucas 1846 = Segestria florentina (Rossi) 1790
„ singularis Nicolet 1849 = Orsolobus singularis (Nicolet) 1849
„ snellemannii Hasselt 1882 = Ariadna snellemannii (Hasselt) 1882
„ suterii Urquhart 1891 = Periegops suterii (Urquhart) 1891
„ vulgarissima Holmberg 1876 = Ariadna mollis (Holmberg) 1876

Selabis:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Helvetia**

Selamia:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Storena**
„ unicolor Simon 1873 = Ceto laticeps (Canestrini) 1868

Selaophora:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Cosmophasis**

Selenocosmia:
„ albostriata Simon 1886 = Melopoeus albostriatus (Simon) 1886
„ doriae Thorell 1890 = Haplopelma doriae (Thorell) 1890
„ femoralis Kulczynski 1911 = Selenocosmia honesta Hirst 1909
„ greeffi Karsch 1884 = Hysterocrates greeffi (Karsch) 1884
„ nigroventris Marx 1893 = nicht zu deuten!
„ pugnax Gravely 1935 = Lyrognathus pugnax Pocock 1900
„ subinermis Giltay 1934 = Phlogiellus subinermis (Giltay) 1934

Selenops:
„ aculeatus Mello-Leitao 1941 = Selenops columbianus Roewer 1951
„ aegyptiaca Audouin 1827, Cambridge 1876 = Selenops radiatus Latreille 1819
„ aequalis Franganillo 1934 = nicht zu deuten!
„ aissus Petrunkevitch 1925 part. = Selenops lunatus Muma 1953
„ alacer Blackwall 1865 = Selenops radiatus Latreille 1819
„ annulipes Walckenaer 1837 = Selenops radiatus Latreille 1819
„ birmanicus Thorell 1895 = Selenops radiatus Latreille 1819
„ brasiliensis Walckenaer 1837 = Selenops spixii Perty 1833
„ brownii Marx 1893 = Selenops annulatus Simon 1876
„ büchneri Karsch 1881 = Selenops annulatus Simon 1876
„ confusus Petrunkevitch 1925 = Selenops aissus Walckenaer 1837
„ elusus Lawrence 1937 = Selenops stauntoni Pocock 1902
„ equadorensis Mello-Leitao 1918 = Selenops ecuadorensis Berland 1913
„ fraternus Mello-Leitao 1915 = Vectius fraternus (Mello-Leitao) 1915
„ latreillei Simon 1875 = Selenops radiatus Latreille 1819
„ longipes Petrunkevitch 1930 = Selenops lindborgi Petrunkevitch 1926
„ malabarensis Simon 1880 = Selenops radiatus Latreille 1819
„ montanus Caporiacco 1949 = Selenops roeweri Caporiacco 1949
„ omalosoma Dufour 1820, Walckenaer 1837 = Selenops radiatus Latreille 1819
„ peregrinator Walckenaer 1837, Simon 1880 = Selenops radiatus Latreille 1819
„ pusillus Mello-Leitao 1915 = Selenops radiatus albomaculatus Mello-Leitao 1917
„ sansibarica Gerstäcker 1873 = Selenops radiatus Latreille 1819
„ sector Karsch 1879 = Selenops annulatus Simon 1876
„ subatomarius Strand 1907 = ? Selenops atomarius Simon 1887
„ subradiatus Strand 1906, 1908 = Selenops atomarius Simon 1887
„ timidus Bryant 1940 = Selenops aissus Walckenaer 1837
„ werneri Simon 1906, Berland 1922 = Selenops vigilans Pocock 1898

Senoculus:
„ pallidus F. Cambridge 1903 = Senoculus gracilis (Keyserling) 1879
„ parallelus F. Cambridge 1903, Mello-Leitao 1927 = Senoculus gracilis (Keyserling) 1879
„ valentinei Petrunkevitch 1925 = Senoculus canaliculatus F. Cambridge 1902

Sergiolus:
„ capulatus Chamberlin & Ivie 1944 = Sergiolus variegatus (Hentz) 1847
„ clericus Chamberlin 1922 = Sergiolus unimaculatus Emerton 1915
„ montanus Bryant 1905 = Poecilochroa montana Emerton 1881
„ ocellaris Chamberlin & Ivie 1944 = Sergiolus decipiens Chamberlin 1922
Sericopelma:
„ breyerii Becker 1878 = Crypsidromus breyerii (Becker) 1878
„ panamana F. Cambridge 1897 = Sericopelma rubronitens Ausserer 1875
Setaphis:
„ parvula Simon 1893 = Setaphis lucasi Roewer 1951
Sicaria:
„ thomisoides Simon 1864 = nicht zu deuten!
Sicarioides:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Sicarius**
Sidusa:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Corythalia**
„ borealis Banks 1904, Peckham 1909, Muma 1944 = Hasarius adansonii (Audouin) 1827
„ dentichelis F. Cambridge 1901 = Tylogonus dentichelis (F. Cambridge) 1901
„ festiva F. Cambridge 1901 = Chapoda festiva Peckham 1896
„ fulvoguttata F. Cambridge 1901 = Corythalia opima (Peckham) 1885
„ inermis F. Cambridge 1901 = Chapoda inermis (F. Cambridge) 1901
„ lutea F. Cambridge 1901 = Corythalia parvula (Peckham) 1896
„ maxillosa F. Cambridge 1901 = Compsodecta maxillosa (F. Cambridge) 1901
„ minuta F. Cambridge 1901 = Tylogonus minutus (F. Cambridge) 1901
„ morosa Banks 1904 = Habrocestum morosum (Peckham) 1888
„ nigropicta F. Cambridge 1901 = Capidava nigropicta (F. Cambridge) 1901
„ tulineba Chamberlin & Ivie 1936 = Corythalia bicincta Petrunkevitch 1925
„ vittata F. Cambridge 1901 = Tylogonus vittatus (F. Cambridge) 1901
Sidyma:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Sidymella**
„ spinifera Mello-Leitao 1943 (nec 1929) = Sidymella multispinulosa (Mello-Leitao) 1944
Sillus:
„ concolor Petrunkevitch 1911 = Teudis concolor (Keyserling) 1891
„ conspersus Petrunkevitch 1911 = Anyphaena fraterna (Banks) 1893
Silometopus:
„ reussii Simon 1926 = Silometopus ater (Blackwall) 1841
Simaetha:
„ aheneola Simon 1885 = Ligurra aheneola (Simon) 1885
„ severa Peckham 1901 = Ligurra latidens (Doleschall) 1859
Singa:
„ abbreviata Karsch 1875 = Singa pygmaea (Sundevall) 1831
„ albomaculata Simon 1864 = Titanoeca albomaculata (Lucas) 1846
„ alveata Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ anthracina C. L. Koch 1845 = Singa pygmaea (Sundevall) 1831
„ calix Simon 1864 = Araneus calix (Walckenaer) 1841
„ conica C. L. Koch 1837, 1845, Ohlert 1867 = Cyclosa conica (Pallas) 1772
„ grammica Simon 1884 = Singa pygmaea (Sundevall) 1831
„ guianensis Taczanowski 1873 = Eustala guianensis (Taczanowski) 1873
„ heerii Westring 1862, Thorell 1870 = Singa pygmaea (Sundevall) 1831
„ heerii Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ heri Dahl 1883 = Singa heerii (Hahn) 1831
„ herii Menge 1866 = Singa pygmaea (Sundevall) 1831
„ hirsti Lessert 1915 = Araneus hirsti (Lessert) 1915
„ keyserlingi Mc Cook 1893 = Singa pratensis Emerton 1884
„ laurae Simon 1868 = Nemoscolus laurae (Simon) 1868
„ listeri Mc Cook 1893 = Singa pratensis Emerton 1884

Singa (Forts.):
- „ lutea Cambridge 1894 = Singa flava Cambridge 1894
- „ maculata Thorell 1875 = Singa pygmaea (Sundevall) 1831
- „ maculata Emerton 1884, Keyserling 1892, Mc Cook 1893 = Singa truncata Banks 1901
- „ melanocephala C. L. Koch 1836, Westring 1862 = Singa hamata (Clerck) 1757
- „ nigrifrons C. L. Koch 1845, Menge 1866 = Singa heerii (Hahn) 1831
- „ nigrifrons Lebert 1877 = nicht zu deuten!
- „ oculata L. Koch 1870 = Cyclosa oculata (Walckenaer) 1802
- „ prominens Westring 1862 = Cercidia prominens (Westring) 1851
- „ rubella Keyserling 1893 = Singa pratensis Emerton 1884
- „ rufula Simon 1874, Becker 1896 = Singa aussereri Thorell 1873
- „ sancti-benedicti Simon 1864 = Cyclosa sancti-benedicti (Vinson) 1863
- „ sanguinea Cambridge 1881, Chyzer & Kulczynski 1891 = Singa aussereri Thorell 1873
- „ schefferi Banks 1910 = Singa singaeformis (Scheffer) 1904
- „ scutifera Westring 1862 = Cercidia prominens (Westring) 1851
- „ serrulata C. L. Koch 1845, 1850 = Singa hamata (Clerck) 1757
- „ trifasciata C. L. Koch 1845, Ohlert 1867 = Singa pygmaea (Sundevall) 1831
- „ trituberculata Canestrini & Pavesi 1868 = Cyclosa insulana (Costa) 1834
- „ turbinata Simon 1864 = Cyclosa turbinata (Walckenaer) 1841

Sinis:
- „ fimbriatus Thorell 1878, 1881 = Linus fimbriatus (Doleschall) 1859
- „ fimbriatus Hasselt 1882 = Erasinus labiatus (Thorell) 1887
- „ hasseltii Thorell 1878 = Viciria hasseltii (Thorell) 1878

Sinnamora:

Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Margaromma**

Sintula:
- „ aeria Bösenberg 1902, Dahl 1912 = Aprolagus mollis (Cambridge) 1870
- „ aerius Simon 1884, Chyzer & Kulczynski 1894, Becker 1896 = Aprolagus mollis (Cambridge) 1870
- „ balteatus Simon 1884 = Centromerus serratus (Cambridge) 1875
- „ dilutus Simon 1884, Becker 1896 = Centromerus dilutus (Cambridge) 1875
- „ faustus Cambridge 1900 = Rhaebothorax faustus (Cambridge) 1900
- „ longulus Simon 1884 = Centromerus serratus (Cambridge) 1875
- „ nescia Cambridge 1900 = Microneta viaria (Blackwall) 1841
- „ nigrotibialis Cambridge 1900 = Trichoncus saxicola (Cambridge) 1861
- „ prominens Cambridge 1900 = Agyneta conigera (Cambridge) 1863
- „ pusio Simon 1884 = Aprolagus mollis (Cambridge) 1870
- „ simplicitarsis Lessert 1910 = Aprolagus simplicitarsus (Simon) 1884
- „ simplex Kulczynski 1898 = Aprolagus simplicitarsus (Simon) 1884
- „ succinus Simon 1884 = Centromerus succinus (Simon) 1884

Sittacus:

Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Sitticus**

Sitticus:
- „ albolineatus Kulczynski 1895 = Sitticus kulczynskii Roewer 1951
- „ floricola Simon 1901, 1937, Strand 1906, Lessert 1910 = Sitticus littoralis (Hahn) 1831
- „ imperialis Simon 1901 = Dendryphantes mannii Peckham 1901
- „ muralis Schenkel 1925, 1926 = Sitticus longipes (Canestrini) 1873
- „ niger Reimoser 1919 = Sitticus walckenaeri Roewer 1951
- „ niger Dyal 1935 = Sitticus dyali Roewer 1951
- „ penicillatus Kolosvary 1930 = Sitticulus penicillatus (Simon) 1870
- „ pubescens Simon 1901, 1937, Lessert 1910, Dahl 1926 = Sitticus truncorum (Linné) 1758
- „ saxicola Tullgren 1940 = Sitticus littoralis (Hahn) 1831
- „ viduus Reimoser 1919 = Sitticus sibiricus Roewer 1951

Smeringopus:
„ lyoni Thorell 1895 = Crossopriza lyoni (Blackwall) 1867
Smionia:
„ lineatipes Dalmas 1921 = Upognampa lineatipes (Purcell) 1908
Smitheria:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Hypomma**
Smodigoides:
„ rectangulata Crosby & Bishop 1936 = Aigola rectangulata (Emerton) 1913
Sobara:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Cosmophasis**
Solenothele:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Heterothele**
Sosippus:
„ californicus Simon 1898, Banks 1913 = Sosippinus californicus (Simon) 1898
„ mimus Chamberlin 1924 = Sosippinus mimus (Chamberlin) 1924
„ pragmaticus Chamberlin 1924 = Sosippinus pragmaticus (Chamberlin) 1924
„ oblongus Simon 1888 = Trochosa oblonga (C. L. Koch) 1848
Spadera:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Pseudicius**
Sparassus (Sparassa):
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Olios**
„ americanus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ ammanita Dufour 1863 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ amoenus Walckenaer 1847 = Castianeira amoena (C. L. Koch) 1842
„ angularis Urquhart 1884 = Sidymella angularis (Urquhart) 1884
„ angulatus Urquhart 1884 = Sidymella angulata (Urquhart) 1884
„ argelasius Walckenaer 1805 = Olios argelasius (Walckenaer) 1805
„ argelasius Walckenaer 1825, 1837, Simon 1875 = Eusparassus dufouri (Simon) 1932
„ beluinus Karsch 1881 = Cerbalus pulcherrimus (Simon) 1880
„ bicorniger Pocock 1898 = Eusparassus bicorniger (Pocock) 1898
„ boiei Doleschall 1859 = Parhedrus boiei (Doleschall) 1859
„ cambridgii Simon 1874 = Eusparassus walckenaerii (Audouin) 1827
„ cingulatus Walckenaer 1847 = Castianeira cingulata (C. L. Koch) 1842
„ cognatus Cambridge 1876 = Eusparassus cognatus (Cambridge) 1876
„ currax Blackwall 1858 = Eusparassus dufouri oraniensis (Lucas) 1846
„ doriae Simon 1874 = Eusparassus tersus (C. L. Koch) 1838
„ extensipes Karsch 1880 = Eusparassus walckenaerii (Audouin) 1827
„ ferrugineus Walckenaer 1847 = Textrix coarctata (Dufour) 1831
„ ferrugineus Keyserling 1880, Cambridge 1900 = Olios ferrugineus (C. L. Koch) 1834
„ fontanieri Simon 1880 = Eusparassus fontanieri (Simon) 1880
„ fornasinii Pavesi 1881 = Palystes fornasinii (Pavesi) 1881
„ fulvus Simon 1867 = Micromata rosea ornata (Walckenaer) 1802
„ funestus Keyserling 1880 ♂ = Olios fasciatus (Keyserling) 1880
„ funestus Keyserling 1880 ♀, Hasselt 1882 ♀ = Streptaedoea rapida (Keyserling) 1880
„ fuscus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ guttatus Blackwall 1877 = Rhacocnemis guttatus (Blackwall) 1877
„ haemorrhoidalis Thorell 1881 = Olios tamerlani Roewer 1951
„ letourneuxi Simon 1874 = Eusparassus letourneuxi (Simon) 1874
„ ligurinus C. L. Koch 1845 = Micromata ligurina (C. L. Koch) 1845
„ linnaei Kulczynski 1901 = Eusparassus walckenaerii (Audouin) 1827
„ longipes Giebel 1867 = nicht zu deuten!
„ longipes Pavesi 1897 = Olios longipedatus Roewer 1951
„ maculatus Blackwall 1862 = Olios maculatus (Blackwall) 1862
„ martius Keyserling 1880 = Polybetes martius (Nicolet) 1849
„ meynardi Pocock 1901 = Olios xerxes (Pocock) 1901

Sparassus (Forts.):
- „ montanus Waldkenaer 1847 = nicht zu deuten!
- „ montanus Keyserling 1880 = Olios peruvianus Roewer 1951
- „ nigricans Waldkenaer 1847 = Corinna nigricans (C. L. Koch) 1842
- „ oculatus Kroneberg 1875 = Eusparassus oculatus (Kroneberg) 1875
- „ oraniensis Simon 1874 = Eusparassus dufouri oraniensis (Lucas) 1846
- „ ornatus Waldkenaer 1805, 1837, C. L. Koch 1845, Westring 1862, Ohlert 1867, Prach 1866 = Micromata rosea ornata (Waldkenaer) 1802
- „ ornatus Thorell 1878 = Olios ornatus (Thorell) 1877
- „ pallipes Lucas 1858 = nicht zu deuten!
- „ pearsoni Pocock 1901 = Olios xerxes (Pocock) 1901
- „ pilosus Simon 1870 = Micromata ligurina (C. L. Koch) 1845
- „ potanini Simon 1895 = Eusparassus potanini (Simon) 1895
- „ psittacinus Doleschall 1857, 1859 = Clastes freycineti Waldkenaer 1837
- „ punctipes Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ punctipes Pocock 1900 = Olios punctipes Simon 1884
- „ rapidus Keyserling 1880, 1891, Tullgren 1905 = Streptaedoea rapida (Keyserling) 1880
- „ roseus Waldkenaer 1805 = Micromata rosea (Clerck) 1757
- „ rubripes Waldkenaer 1847 = Corinna rubripes C. L. Koch 1842
- „ serenus Karsch 1878 = nicht zu deuten!
- „ smaragdulus Waldkenaer 1805, 1837, Sundevall 1831, Blackwall 1861 = Micromata rosea (Clerck) 1757
- „ spinicrus Waldkenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ spongitarsis Simon 1874, 1875 = Olios argelasius (Waldkenaer) 1805
- „ suavis Cambridge 1876 = nicht zu deuten!
- „ tersus Simon 1880 = Eusparassus tersus (C. L. Koch) 1838
- „ tricolor Waldkenaer 1847 = Castianeira tricolor (C. L. Koch) 1842
- „ validus Thorell 1875 = Eusparassus validus (Thorell) 1875
- „ vestitus Waldkenaer 1847 = Textrix vestita C. L. Koch 1841
- „ virescens C. L. Koch 1837, 1845, 1850, Westring 1862, Prach 1866, Ohlert 1867 = Micromata rosea (Clerck) 1757
- „ waldkenaerii Simon 1880, Pavesi 1880 = Eusparassus waldkenaerii (Audouin) 1827

Spartaeus:

Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Boethus**

Spermophora:
- „ bicornis Keyserling 1891 = Metagonia bicornis (Keyserling) 1891
- „ comorensis Butler 1879 = Loxoscelis rufescens (Dufour) 1821
- „ placens Cambridge 1896, F. Cambridge 1902 = Pholcophorina placens (Cambridge) 1896
- „ placens Banks 1931 = Pholcophorina banksi Gertsch 1939

Sphasus:

Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Oxyopes**
- „ alexandrinus Audouin 1827 = Oxyopes heterophthalmus (Latreille) 1804
- „ gentilis C. L. Koch 1839 = Oxyopes lineatus Latreille 1806
- „ idiops Waldkenaer 1837 = Idiops fuscus Perty 1833
- „ italicus Waldkenaer 1837, Blackwall 1869 = Oxyopes lineatus Latreille 1806
- „ lineatus C. L. Koch 1836, Blackwall 1861 = Oxyopes lineatus Latreille 1806
- „ lineatus Waldkenaer 1837 = Oxyopes heterophthalmus (Latreille) 1804
- „ lineatus Westring 1862, Ohlert 1867 = Oxyopes ramosus (Panzer) 1804
- „ lineatus Lebert 1877 = nicht zu deuten!
- „ lucasii Vinson 1863 = Peucetia lucasii (Vinson) 1863
- „ luteus Blackwall 1862 = Oxyopes salticus Hentz 1845
- „ madagascariensis Vinson 1863 = Peucetia madagascariensis (Vinson) 1863
- „ poeyi Lucas 1857 = Peucetia poeyi (Lucas) 1857
- „ signifer Doleschall 1859 = Tapponia signifera (Doleschall) 1859
- „ similaris Stoliczka 1869 = Oxyopes lepidus (Blackwall) 1864

Sphasus (Forts.):
„ striolatus Doleschall 1859 = Oxyopes striatus (Doleschall) 1857
„ thalassina C. L. Koch 1848 = Peucetia thalassina (C. L. Koch) 1848
„ transalpinus Waldkenaer 1805 = ? Oxyopes lineatus Latreille 1806
„ variegatus C. L. Koch 1839, Ohlert 1867 = Oxyopes ramosus (Panzer) 1804
„ viridanus Stoliczka 1869 = Peucetia viridana (Stoliczka) 1869
„ vittatus Waldkenaer 1837 = Castianeira vittata (Waldkenaer) 1837

Sphecotypus:
„ formicarius Cambridge 1895 = Sphecotypus niger (Perty) 1833

Sphecozone:
„ drassoides Petrunkevitch 1911 = Wubana drassoides (Emerton) 1882

Sphedanus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe auch unter gleichem Artnamen bei **Nilus**
„ spadicarius Simon 1897 = Nilus spadicarius (Simon) 1897

Sphodros:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Atypus**
„ aedificatorius Waldkenaer 1841 = Ummidia (Pachylomerides) aedificatoria (Westwood) 1840
„ audouinii Waldkenaer 1841 = Ummidia (Pachylomerides) audouinii (Lucas) 1835
„ lucasii Waldkenaer 1837 = Actinopus rufipes (Lucas) 1834
„ pertyi Waldkenaer 1848 = Actinopus pertyi Lucas 1843
„ tarsalis Waldkenaer 1841 = Actinopus tarsalis Perty 1833

Spintharus:
„ affinis Cambridge 1896 = Spintharus flavidus Hentz 1850
„ elongatus Keyserling 1884 = Spintharus flavidus Hentz 1850
„ lineatus Cambridge 1896 = Spintharus flavidus Hentz 1850

Spiracme:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Xysticus**

Spiropalpus:
„ crosbyi Fage 1938 = Prosopotheca crosbyi (Fage) 1938
„ spiralis Emerton 1882 = Cornicularia spiralis (Emerton) 1882

Stalita:
„ gracilipes Kulczynski 1897 = Parastalita stygia (Joseph) 1882
„ hercegovinensis Nosek 1905, Reimoser 1929 = Stalita schiödtei Thorell 1870
„ spinosissima Kulczynski 1897 = Stalita taenaria Schiödte 1847
„ stygia Joseph 1882 = Parastalita stygia (Joseph) 1882
„ taenaria Keyserling 1862, Simon 1893 = Stalita schiödtei Thorell 1870

Stanneoclavis:
„ latronum Simon 1890 = Gasteracantha mammosa C. L. Koch 1845
„ mastoidea Karsch 1879 = Gasteracantha mammosa C. L. Koch 1845
„ studeri Karsch 1878 = Gasteracantha pentagona (Waldkenaer) 1841
„ suminata Karsch 1879 = Gasteracantha mammosa C. L. Koch 1845
„ tuberosa Karsch 1879 = Gasteracantha mucronata (Waldkenaer) 1841

Stasimopus:
„ rufitarsis Strand 1907 = ? Stasimopus schönlandi Pocock 1900
„ schönlandi spinosus Hewitt 1914 = Stasimopus spinosus (Hewitt) 1914

Stasina:
„ nigropicta Pocock 1899 = Stasina nalandica Karsch 1891

Stasippus:
„ inornatus Thorell 1887 = Cyrba algerina (Lucas) 1846

Stearodea:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Steatoda**

Steatoda (= **Steatodum**):
„ albomaculata F. Cambridge 1902 = Theridion albomaculatum (Cambridge) 1882
„ albovittata Thorell 1875 = Crustulina albovittata (Thorell) 1875
„ albula Cambridge 1898 = Theridion albulum (Cambridge) 1898
„ asperasa F. Cambridge 1902 = Theridion aspersum (F. Cambridge) 1902

Steatoda (Forts.):
„ braccata C. L. Koch 1850 = Dipoena braccata (C. L. Koch) 1841
„ caricis Fickert 1876 = Enoplognatha caricis (Fickert) 1876
„ castanea Thorell 1856, 1870 et sequ. = Teutana castanea (Clerck) 1757
„ cavipalpus F. Cambridge 1902 = Theridion cavipalpus (F. Cambridge) 1902
„ clarkii Cambridge 1879 = Teutana nobilis (Thorell) 1875
„ compressa F. Cambridge 1902 = Theridion rotundatum Petrunkevitch 1911
„ confraterna F. Cambridge 1902 = Theridion confraternum Banks 1898
„ convexa Thorell 1875 = Dipoena convexa (Blackwall) 1870
„ coracina C. L. Koch 1850 = Dipoena coracina (C. L. Koch) 1837
„ corollata Thorell 1856, Emerton 1882, 1902 = Lithyphantes albomaculatus (De Geer) 1778
„ denticulata Karsch 1873 = Theridion melanurum Hahn 1831
„ distincta Thorell 1877 = Lithyphantes medialis (Banks) 1898 (nec: distinctus Thorell 1877 sub Latrodectus)
„ elegans F. Cambridge 1902 = Theridion emendatum Roewer 1942
„ elevata F. Cambridge 1902 = Theridion texanum Banks 1910
„ florens F. Cambridge 1902 = Theridion florens Cambridge 1896
„ forda F. Cambridge 1873 = Tidarren fordum (Keyserling) 1884
„ formosa Karsch 1873 = Theridion lunatum (Clerck) 1757
„ fulvolunulata Simon 1873 = Teutana grossa (C. L. Koch) 1838
„ grossa C. L. Koch 1850, Fickert 1876 = Teutana grossa (C. L. Koch) 1838
„ guttata Thorell 1856 = Crustulina guttata (Wider) 1834
„ haematostigma Cambridge 1881 = Euryopis haematostigma (Blackwall) 1864
„ hispida F. Cambridge 1902 = Theridion hispidum Cambridge 1898
„ inornata L. Koch 1877 = Dipoena inornata (Cambridge) 1861
„ irrorata C. L. Koch 1850 = Theridion tinctum (Walckenaer) 1802
„ lineatum Simon 1864 = Theridion redimitum (Clerck) 1757
„ lineiventris Pavesi 1884 = Crustulina lineiventris (Pavesi) 1884
„ longistylum F. Cambridge 1902 = Theridion longistylum (F. Cambridge) 1902
„ lunata Thorell 1856, Menge 1867 = Theridion lunatum (Clerck) 1757
„ marmorata Emerton 1882 = Enoplognatha marmorata (Hentz) 1850
„ mixta F. Cambridge 1902 = Tidarren mixtum (Cambridge) 1896
„ molesta Pavesi 1883 = Crustulina molesta (Pavesi) 1883
„ morula F. Cambridge 1902 = Theridion morulum Cambridge 1898
„ munifex F. Cambridge 1902 = Theridion munifex Cambridge 1896
„ nigra Emerton 1882 = Dipoena nigra (Emerton) 1882
„ oblivia F. Cambridge 1902 = Theridion oblivium Cambridge 1896
„ oelandica Thorell 1875 = Enoplognatha oelandica (Thorell) 1875
„ picta C. L. Koch 1837, Menge 1868 = Theridion ornatum Hahn 1831
„ prona Cambridge 1875 = Dipoena prona (Menge) 1868
„ pulchella Menge 1868 = Theridion vittatum C. L. Koch 1836
„ pulchella Karsch 1873 = Theridion pulchellum (Walckenaer) 1802
„ pulchella Thorell 1875 = Teutana grossa (C. L. Koch) 1838
„ punctatula Menge 1868 = Theridion tinctum (Walckenaer) 1802
„ pura F. Cambridge 1902 = Theridion purum Cambridge 1894
„ pusulosa Keyserling 1877 = Teutana grossa (C. L. Koch) 1838
„ quadripunctata Sundevall 1830 = Steatoda bipunctata (Linné) 1758
„ redimita C. L. Koch 1837 = Theridion redimitum (Clerck) 1757
„ reticulata C. L. Koch 1850, Simon 1864 = Theridion bimaculatum (Linné) 1767
„ rostrata F. Cambridge 1902 = Theridion rostratum Cambridge 1896
„ rubicunda F. Cambridge 1902 = Theridion rubicundulum Roewer 1942
„ rufolineatum Simon 1864 = Theridion aulicum (C. L. Koch) 1838
„ rugosa Thorell 1875 = Crustulina rugosa (Thorell) 1875
„ saxatilis Menge 1868 = Theridion saxatile C. L. Koch 1834
„ scabripes Becker 1880 = Crustulina scabripes (Becker) 1880
„ sexmaculata F. Cambridge 1902 = Theridion sexmaculatum Keyserling 1884
„ signata Cambridge 1876 = Lithyphantes signatus (Cambridge) 1876

Steatoda (Forts.):
„ similis C. L. Koch 1850 = Theridion simile C. L. Koch 1836
„ sisyphia Menge 1868 = Theridion impressum L. Koch 1881
„ sisyphum C. L. Koch 1850 = Theridion notatum (Linné) 1758, jetzt: Theridion sisyphium (Clerck) 1757
„ spiralis F. Cambridge 1902 = Theridion spirale Emerton 1882
„ sticta Thorell 1873 = Crustulina sticta (Cambridge) 1861
„ taeniata F. Cambridge 1902 = Theridion taeniatum (F. Cambridge) 1902
„ tepidariorum Thorell 1856 = Theridion tepidariorum C. L. Koch 1841
„ thoracica Becker 1879 = Enoplognatha thoracica (Hahn) 1831
„ torva Thorell 1875 = Dipoena torva (Thorell) 1875
„ transversa F. Cambridge 1902 = Theridion transgressum Petrunkevitch 1911
„ triangulifera Simon 1873 = Teutana triangulosa (Walckenaer) 1802
„ triangulosa Thorell 1873 = Teutana triangulosa (Walckenaer) 1802
„ tristis C. L. Koch 1850, Thorell 1856 = Dipoena tristis (Hahn) 1831
„ undulata Menge 1868 = Theridion melanurum Hahn 1831
„ varians Menge 1868 = Theridion varians Hahn 1831
„ venustissima C. L. Koch 1850 = Teutana triangulosa (Walckenaer) 1802
„ versuta Thorell 1870 = Teutana grossa (C. L. Koch) 1838
„ viva F. Cambridge 1902 = Theridion vivum Cambridge 1899
„ voluta F. Cambridge 1902 = Theridion volutum (F. Cambridge) 1902

Stegodyphus:
„ adspersus Simon 1873 = Stegodyphus lineatus (Latreille) 1817
„ annulipes Strand 1907 = ? Stegodyphus dumicola Pocock 1898
„ gregarius Cambridge 1889, Pocock 1898 = Stegodyphus mimosarum Pavesi 1883
„ gregarius simplicifrons Strand 1907, 1908 = Stegodyphus simplicifrons Simon 1906
„ lineifrons Pocock 1898 = Stegodyphus africanus (Blackwall) 1866
„ molitor Simon 1873 = Stegodyphus lineatus (Latreille) 1817
„ molitor Strand 1908 = Stegodyphus dufourii (Audouin) 1827
„ semicinctus Strand 1906 = Stegodyphus dufourii (Audouin) 1827

Stegosoma:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Ulesanis**

Stemonyphantes:
„ bucculentus Karsch 1873, Emerton 1882 et sequ. = Stemonyphantes lineatus (Linné) 1758
„ trilineatus Menge 1866 = Stemonyphantes lineatus (Linné) 1758

Stenochilus:
„ crocatus Simon 1884 = Metronax crocatus (Simon) 1884
„ pusillus Simon 1893 = Colopea pusilla (Simon) 1893
„ raudus Simon 1884 = Metronax raudus (Simon) 1884

Stenoctenus:
„ gracilis Keyserling 1879 = Senoculus gracilis (Keyserling) 1879
„ pallidus F. Cambridge 1897 = Senoculus gracilis (Keyserling) 1879

Stenodina:
„ tenuilineata Simon 1900, 1901 = Copocrossa tenuilineata (Simon) 1900

Stephanopis (= Stephanopsis):
„ angulata Urquhart 1889 = Sidymella angulata (Urquhart) 1884
„ angusta L. Koch 1876 = Synalus angustus (L. Koch) 1876
„ benhami Hogg 1910 = Sidymella benhami (Hogg) 1910
„ bicuspidata L. Koch 1873, 1876, Strand 1907 = Sidymella bicuspidata (L. Koch) 1873
„ cambridgei Bradley 1871 = Stephanopis bradleyi Mello-Leitao 1929
„ camellina Cambridge 1869 = Tobias camellinus (Cambridge) 1869
„ cornuta Keyserling 1880 = Tobias cornutus (Taczanowski) 1872
„ echinata Keyserling 1880 = Onocolus echinatus (Taczanowski) 1872
„ edwardsii Keyserling 1880 = Coenypha edwardsii (Nicolet) 1849

Stephanopis (Forts.):
„ **hirsuta** L. Koch 1873, 1876 = Sidymella **hirsuta** (L. Koch) 1873
„ **hirsuta** Rainbow 1894 = **Stephanopis** vilosa Rainbow 1911
„ lobata L. Koch 1873, 1876 = Sidymella lobata (L. Koch) 1873
„ longipes L. Koch 1873 = Sidymella longipes (L. Koch) 1873
„ lucida Keyserling 1880 = Sidymella lucida (Keyserling) 1880
„ pentagona Keyserling 1880 = Onocolus pentagonus (Keyserling) 1880
„ rubrosignata L. Koch 1873, 1876 = Sidymella rubrosignata (L. Koch) 1873
„ rugosa Keyserling 1880 = Tobias taczanowskii Roewer 1951
„ trapezica L. Koch 1873, 1876, Simon 1908 = Sidymella trapezica (L. Koch) 1873
„ trispinosa Keyserling 1880 = Epicadinus trispinosus (Taczanowski) 1872

Stephanopoides:
„ cognatus Cambridge 1892 = Parastephanops cognatus (Cambridge) 1892

Stephanopsis siehe **Stephanopis:**

Stergusa:
„ orichalcea Simon 1903 = Stergusa aurichalcea Simon 1902

Stethorrhagus:
„ mandibulatus Franganillo 1930 = nicht zu deuten!

Stichius:
„ albomaculatus Thorell 1890, Simon 1903 = nicht zu deuten!

Stiphidion:
„ minutissimum Hogg 1909 = Stiphidiellum minutissimum (Hogg) 1909

Stoides:
„ aurata Peckham 1909 = Corythalia aurata (Hentz) 1846
„ canosa Chamberlin & Ivie 1944 = Corythalia aurata (Hentz) 1846

Storena:
„ annulipes Thorell 1892, Workman 1896 = Storena cinctipes Simon 1893
„ lauta Cambridge 1898 = Storena tinga F. Cambridge 1899
„ pseliphora Thorell 1894 = Storena cinctipes Simon 1893
„ spirafera Hasselt 1887 = Storena **hasselti** Simon 1892
„ vittata Thorell 1890 = Storena zebra Thorell 1881

Storenosoma:
„ lycosoides Hogg 1900 = Storena **hoggi** Roewer 1942

Stromatopelma:
„ alicapillatum Karsch 1881 = Scodra calceata (Fabricius) 1793

Strongylothorax:
„ cyclothorax André 1937 = Cyclothoracoides cyclothorax (Mello-Leitao) 1923

Strotarchus:
„ striatus Franganillo 1934 = nicht zu deuten!

Styloctetor:
„ broccha Simon 1884, Carpenter 1898, Lessert 1910 = Rhaebothorax broccha (L. Koch) 1872
„ inuncans Simon 1884, Roewer 1928 = Styloctetor romanus (Cambridge) 1872
„ stativus Hull 1932 = Anacotyle stativa (Simon) 1881
„ uncinus Cambridge 1905 = Rhaebothorax morulus (Cambridge) 1873

Stylophora:
„ albomaculata Menge 1866 = Stylophora concolor (Wider) 1834
„ pullata Simon 1929 = Stylophora flavipes (Blackwall) 1854

Stylothorax:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Oedothorax**

Sudabe:
„ pilula Karsch 1879 = Theridion pilulum (Karsch) 1879

Susarion:
„ neglectum Cambridge 1900 = Pocadicnemis pumila (Blackwall) 1841

Syedra:
„ atrotibialis Simon 1884 = Wideria atrotibialis (Cambridge) 1878
„ innotabilis Jackson 1912 = Syedrula innotabilis (Cambridge) 1863
„ ophthalmica Simon 1884, 1894, Lessert 1910 = Syedra gracilis (Menge) 1869

Syedra (Forts.):
„ pholcommoides Simon 1884, Jackson = Syedra gracilis (Menge) 1869
„ prolata Simon 1884 = Micronetа prolata (Cambridge) 1873
Sylvia:
„ abdominalis Nicolet 1849 = Sybota abdominalis (Nicolet) 1849
„ atra Nicolet 1849 = Sybota abdominalis (Nicolet) 1849
„ rubiginosa Nicolet 1849 = Sybota abdominalis (Nicolet) 1849
„ similis Nicolet 1849 = Sybota abdominalis (Nicolet) 1849
„ vittata Nicolet 1849 = Sybota abdominalis (Nicolet) 1849
Synaema siehe Synema:
Synaemosyne siehe Synemosyna:
Synageles:
„ americanus Peckham 1892 = Peckhamia americana (Peckham) 1892
„ confusus Kulczynski 1884 = Synageles venator (Lucas) 1835
„ hilarulus Chyzer & Kulczynski 1891 et sequ. = Synageles venator (Lucas) 1835
„ ludibundus Simon 1876 = Synageles venator (Lucas) 1835
„ picatus Peckham 1888, 1892, Emerton 1891 = Peckhamia picata (Hentz) 1846
„ scorpiona Peckham 1888, 1892, 1909 = Peckhamia scorpionia (Hentz) 1846
„ variegatus F. Cambridge 1900 = Peckhamia variegata (F. Cambridge) 1900
„ venator Chyzer & Kulczynski 1891 = Synageles lepidus Kulczynski 1897
Synema (= Synaema):
„ abnormis Lessert 1923 = Firmicus abnormis (Lessert) 1923
„ albolimbatum Dahl 1907 = Diaea albolimbata L. Koch 1875
„ bimaculatum Simon 1886, Dahl 1907 = Firmicus bimaculatus (Simon) 1886
„ bimaculatum Cambridge 1890, F. Cambridge 1900 = Synema haenschi Dahl 1907
„ bivittatum Lessert 1919 = Firmicus bivittatus Simon 1895
„ bragantinum Lessert 1919, 1928, 1930, 1936 = Firmicus bragantinus (Brito Capello) 1866
„ brasiliana Keyserling 1880 = Synema bipunctatum (Taczanowski) 1872
„ campestratum Lessert 1919, 1928 = Firmicus campestratus Simon 1907
„ cirripes Cambridge 1891, 1896 = Parasynema cirripes (Cambridge) 1891
„ culta Cambridge 1893 = Synema affinitatum Cambridge 1891
„ dewitzi Lessert 1919 = Synema multipunctatum dewitzi (Simon) 1899
„ diana Simon 1882, Dahl 1907, Lessert 1919 = Synema audouini Roewer 1951
„ globosum japonicum Dahl 1907, Saito 1934 = Synema japonicum Karsch 1879
„ imitator Dahl 1907, Lessert 1919, Caporiacco 1940 = Synema imitatrix (Pavesi) 1883
„ interrupta Cambridge 1893 = Synema affinitatum Cambridge 1891
„ marginatum Lessert 1919 = Firmicus marginatus Simon 1897
„ nigricans Dahl 1907 = Synema nigrum Keyserling 1880
„ nigromaculatum Keyserling 1880, Dahl 1907 = Synema parvulum (Hentz) 1847
„ ornatum Chyzer & Kulczynski 1891, Kulczynski 1901 = Synema plorator (Cambridge) 1872
„ polita Cambridge 1893, Mello-Leitao 1929 = Synema affinitatum Cambridge 1891
„ profuga Cambridge 1891, Dahl 1907 = Synema affinitatum Cambridge 1891
„ prosper Cambridge 1896 = Misumenops prosper (Cambridge) 1896
„ quadrinotatum Simon 1884 = Firmicus bragantinus (Brito Capello) 1866
„ rotundatum Simon 1864 = Synema globosum (Fabricius) 1775
„ varians Chamberlin & Ivie 1944 Synema parvulum (Hentz) 1847
Synemosyna (= Synaemosyne):
„ capito Thorell 1890, 1892 = Myrmarachne capito (Thorell) 1890
„ clavigera Thorell 1877 = Myrmarachne clavigera (Thorell) 1877
„ debilis Thorell 1890, 1892 = Myrmarachne debilis (Thorell) 1890
„ devipiens Thorell 1877 = Myrmarachne formicae (Doleschall) 1859
„ ephippiata Hentz 1846 = Peckhamia scorpionia (Hentz) 1846

Synemosyna (Forts.):
„ formica Thorell 1877 = Myrmarachne formicae (Doleschall) 1859
„ formica Banks 1909 = Synemosyna smithi (Peckham) 1893
„ laeta Thorell 1887 = Myrmarachne laeta (Thorell) 1887
„ laureta Mello-Leitao 1933 = Synemosyna lauretta Peckham 1892
„ lugens Thorell 1881 = Myrmarachne lugens (Thorell) 1881
„ lunata Chamberlin & Ivie 1944 = ? Synaemosyna formica Hentz 1846
„ lupata L. Koch 1879 = Myrmarachne lupata (L. Koch) 1879
„ melanocephala Hasselt 1882, Thorell 1892 = Myrmarachne kochi Reimoser 1925
„ moesta Thorell 1877 = Myrmarachne moesta (Thorell) 1877
„ nigra Thorell 1877 = Myrmarachne nigra (Thorell) 1877
„ nitidissima Thorell 1877 = Myrmarachne nitidissima (Thorell) 1877
„ noxiosa Hentz 1850 = Gertschia noxiosa (Hentz) 1850
„ opaca Karsch 1880 = Myrmarachne opaca (Karsch) 1880
„ picata Hentz 1845 = Peckhamia picata (Hentz) 1845
„ praelonga Thorell 1890 = Myrmarachne laeta praelonga (Thorell) 1890
„ procera Thorell 1877 = Myrmarachne maxillosa (C. L. Koch) 1846
„ prognatha Thorell 1887 = Myrmarachne prognatha (Thorell) 1887
„ pumilio Karsch 1880 = nicht zu deuten!
„ rufescens Thorell 1877 = Myrmarachne rufescens (Thorell) 1877
„ scorpionia Hentz 1846 = Peckhamia scorpionia (Hentz) 1846

Syrisca:
„ affinis Petrunkevitch 1911, Gertsch 1935 = Teminius affinis Banks 1897
„ agelenoides Franganillo 1926 = nicht zu deuten!
„ brasiliana Petrunkevitch 1911 = Teminius brasilianus Keyserling 1891
„ clarissa Franganillo 1926, 1936 = Teminius clarissa (Franganillo) 1926
„ continentalis Simon 1897 = Orodrassus coloradensis (Emerton) 1877
„ hirsuta Petrunkevitch 1925, 1926, 1930 = Teminius insularis Keyserling 1887
„ keyserlingi Simon 1897 = Teminius insularis Keyserling 1887
„ nigriceps Petrunkevitch 1911 = Haplodrassus signifer (C. L. Koch) 1839
„ pulchra Petrunkevitch 1925, 1930, Bryant 1940 = Teminius pulcher (Petrunkevitch) 1925

Tallonia:
„ picta Simon 1888 = Nilus pictus (Simon) 1888

Tanypus:
„ semirasus Keyserling 1882 = Margaromma semirasum (Keyserling) 1882

Taphiassa:
„ cingulata Reimoser 1925 = Stethopoma cingulatum Thorell 1890

Tapinasta:
„ biscrensis Simon 1884 = Centromerus biscrensis (Simon) 1884

Tapinattus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Menemerus**
„ melanognathus Thorell 1887, 1892 = Menemerus bivittatus (Dufour) 1831

Tapinauchenius:
„ reduncus Karsch 1880 = Psalmopoeus reduncus (Karsch) 1880

Tapinocyba:
„ affinis Lessert 1907, 1910 = Colobocyba affinis (Lessert) 1907
„ antepenultima Kulczynski 1898 = Silometopus antepenultimus (Cambridge) 1882
„ aquilonaris Simon 1884, Grese 1909 = Oedothorax aquilonaris (L. Koch) 1879
„ beckii Chyzer & Kulczynski 1894, Bösenberg 1902 = Lophocarenum turgidum (Blackwall) 1841
„ bicissa Bösenberg 1902 = Colobocyba bicissa (Cambridge) 1872
„ bilacunosa Simon 1884 = Tapinocyba bilacunata (L. Koch) 1881
„ buddebergii Bösenberg 1899 = Diplocephalus buddebergii (Bösenberg) 1899
„ cyclops Simon 1884, 1894 = Plaesianillus cyclops (Simon) 1881
„ graeca Simon 1884 = Entelecara graeca (Cambridge) 1872

Tapinocyba (Forts.):
„ incurvata Simon 1884 = Silometopus incurvatus (Cambridge) 1873
„ ingrata Simon 1884 = Tapinocyba praecox (Cambridge) 1873
„ insecta Chyzer & Kulczynski 1894, Bösenberg 1902, Jackson 1903, Cambridge 1905 = Colobocyba insecta (L. Koch) 1869
„ meadi Simon 1884 = Baryphyma pratensis (Blackwall) 1861
„ pallens Simon 1884 et sequ. = Colobocyba exilis (Blackwall) 1853
„ parisiensis Simon 1884 = Aulacocyba parisiensis (Simon) 1884
„ pygmaea Müller & Schenkel 1895 = Silometopus antepenultimus (Cambridge) 1882
„ subaequalis Simon 1881 = Nothocyba subaequalis (Westring) 1851
„ subitanea Simon 1884 et sequ. = Aulacocyba subitanea (Cambridge) 1875
„ tenella Bösenberg 1899 = Diplocephalus tenellus (Bösenberg) 1899

Tapinopa:
„ finitima Cambridge 1881 = Poeciloneta variegata (Blackwall) 1841
„ unicolor Cambridge 1875 = Tapinopa longidens (Wider) 1834

Tapinothele:
„ concolor Caporiacco 1947 = Tapinothelops concolor (Caporiacco) 1947
„ vittipes Caporiacco 1941 = Tapinothelops vittipes (Caporiacco) 1941

Tapponia:
„ cornifrons Thorell 1899 = Oxyopes cornifrons (Thorell) 1899

Taranucnus:
„ affirmatus Simon 1913 = Troglohyphantes affirmatus (Simon) 1913
„ cavernarum Enslin 1906 = Troglohyphantes cavernarum (L. Koch) 1872
„ cerberus Simon 1884, 1907 = Troglohyphantes cerberus (Simon) 1884
„ croaticus Chyzer 1894 = Troglohyphantes croaticus (Chyzer) 1894
„ dalmaticus Kulczynski 1914 = Troglohyphantes dalmaticus (Kulczynski) 1914
„ furcifer Simon 1884 = Troglohyphantes furcifer (Simon) 1884
„ ghidini Lessert 1906 = Troglohyphantes ghidini (Lessert) 1906
„ giromettai Kulczynski 1914 = Troglohyphantes giromettai (Kulczynski) 1914
„ herculanus Kulczynski 1894, 1914 = Troglohyphantes herculanus (Kulczynski) 1894
„ lephthyphantiformis Strand 1907 = Troglohyphantes lephthyphantiformis (Strand) 1907
„ lucifuga Simon 1884, Lessert 1910 = Troglohyphantes lucifugus (Simon) 1884
„ margerisoni Falconer 1919 = Troglohyphantes margerisoni (Falconer) 1919
„ marqueti Simon 1884, 1913 = Troglohyphantes marqueti (Simon) 1884
„ marqueti Simon 1910 = Troglohyphantes cerberus (Simon) 1884
„ orphaeus Simon 1884, 1894 = Troglohyphantes orphaeus (Simon) 1884
„ orphaeus Simon 1907 = Troglohyphantes marqueti (Simon) 1884
„ patellatus Absolon 1912, Kulczynski 1913 = Fageiella patellata (Absolon) 1912
„ phragmitis Simon 1884, 1894 = Troglohyphantes phragmitis (Simon) 1884
„ sordellii Simon 1884, Lessert 1910 = Troglohyphantes sordellii (Pavesi) 1875
„ troglodytes Kulczynski 1914 = Troglohyphantes troglodytes (Kulczynski) 1914

Tarantuloides:
„ boiei Karsch 1891 = ? Dolomedes boiei (Doleschall) 1859

Tarentula (= **Tarantula**):
„ aballicola (Strand) 1906, 1907 = Geolycosa aballicola (Strand) 1906
„ abyssinica Strand 1907 = Allocosa hirsuta (Bösenberg & Lenz) 1895
„ accentuata Simon 1864, Chyzer & Kulczynski 1891, Bösenberg 1903, Holm 1947 = Alopecosa barbipes (Sundevall) 1832
„ aculeata Thorell 1872, Menge 1879 o, Dahl 1883, 1908, 1927 et sequ. = Alopecosa aculeata (Clerck) 1757
„ aculeata Menge 1879 ♂ = Alopecosa barbipes (Sundevall) 1832
„ adolph-friederici Strand 1913 = Allocosa adolph-friederici (Strand) 1913
„ aequioculata Strand 1906, 1907 = Megarctosa aequioculata (Strand) 1906
„ affinis Simon 1864 = Lycosa affinis (Lucas) 1846
„ albofasciata Pavesi 1880, Chyzer & Kulczynski 1891, Giltay 1932 = Xerolycosa albofasciata (Brullé) 1832

Tarentula (Forts.):

„ albostriata Kulczynski 1908 = Alopecosa albostriata (Grube) 1861
„ algerica Roewer 1951 = Avicosa algerica (Roewer) 1951
„ alticeps Kroneberg 1875 = Hogna alticeps (Kroneberg) 1875
„ amylacea Bösenberg & Strand 1906 = Lycorma amylacea (C. L. Koch) 1889
„ andrenivora Simon 1864, Menge 1879 = Alopecosa pulverulenta (Clerck) 1757
„ andrenivora Thorell 1872, Cambridge 1881, Dahl 1883, Bösenberg 1903 = Alopecosa barbipes (Sundevall) 1832
„ andrenivora Fickert 1875 = Alopecosa aculeata (Clerck) 1757
„ annulipes Strand 1907 = Trochosomma annulipes (L. Koch) 1875
„ apuliae C. L. Koch 1850, Thorell 1870 = Lycosa tarentula (Rossi) 1790
„ apuliae Simon 1870 part. = Allocosa oculata (Simon) 1876
„ aquila Strand 1915 = Geolycosa aquila (Bösenberg) 1895
„ aquilonaris Fox 1940 = Pardosa glacialis (Thorell) 1872
„ arapensis Strand 1908 = Mimohogna arapensis (Strand) 1908
„ arenicola Mc Cook 1883 part. = Geolycosa turricola (Treat) 1880
„ armillata Simon 1864 = Alopecosa cuneata (Clerck) 1757
„ arua Strand 1911 = Avicosa arua (Strand) 1911
„ ashantica Strand 1915 = Geolycosa ashantica (Strand) 1915
„ asivak Emerton 1919, Chamberlin & Ivie 1947 = Alopecosa asivak (Emerton) 1919
„ astuta Pavesi 1881, Strand 1913 = Arctosa astuta (Gerstäcker) 1873
„ atramentata Strand 1913 = Hogna atramentata (Karsch) 1879
„ atriannulipes Strand 1906, 1907 = Gnatholycosa atriannulipes (Strand) 1906
„ atropos Strand 1906 = Lycosa atropos (L. Koch) 1878
„ auricoma Keyserling 1891 = Hogna auricoma (Keyserling) 1891
„ auroguttata Keyserling 1891 = Varacosa auroguttata (Keyserling) 1891
„ aussereri Keyserling 1876 = Arctosa aussereri (Keyserling) 1876
„ australicola Strand 1913 = Allocosa australicola (Strand) 1913
„ badia Keyserling 1876 = Lycorma badia (Keyserling) 1876
„ balearica Thorell 1872 ♀ = Hogna balearica (Thorell) 1872
„ balearica Thorell 1872 ♂ = Hogna radiata (Latreille) 1819
„ baltimoriana Keyserling 1876 = Geolycosa baltimoriana (Keyserling) 1876
„ barbipes Sundevall 1832, Dahl 1908, 1912, 1927 et sequ. = Alopecosa barbipes (Sundevall) 1832
„ barboae Strand 1916 = Allohogna pulchella (Thorell) 1881
„ baulnyi Strand 1907 = Allocosa baulnyi (Simon) 1876
„ beckeri Thorell 1875 = Alopecosa beckeri (Thorell) 1875
„ beckeri Keyserling 1878 = Hogna antiguiana **nom. nov.**
„ beniana Strand 1913 = Lycorma beniana (Strand) 1913
„ bergsoeii Thorell 1875 = Hogna bergsoeii (Thorell) 1875
„ berndti Strand 1913 = Avicosa berndti (Strand) 1913
„ bogotensis Keyserling 1876 = Arctosa bogotensis (Keyserling) 1876
„ brauni Strand 1916 = Arctosa brauni (Strand) 1916
„ brevispina Kulczynski 1908 = Tetrarctosa brevispina (Kulczynski) 1908
„ brunnea Bösenberg 1895 = Alopecosa brunnea (Bösenberg) 1895
„ bukobae Strand 1916 = Trochosa bukobae (Strand) 1916
„ calamarica Strand 1914 = Allocosa calamarica (Strand) 1914
„ campestris Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ captans Simon 1864 = Hogna radiata (Latreille) 1819
„ carolinensis Simon 1864, Strand 1915 = Hogna carolinensis (Walckenaer) 1805
„ chinchoxensis Strand 1908, 1913 = Avicosa chinchoxensis (Strand) 1908
„ chiragrica Thorell 1875 = Alopecosa chiragrica (Thorell) 1875
„ clavipes Ohlert 1867, Menge 1879 = Alopecosa cuneata (Clerck) 1757
„ clercki Bösenberg & Strand 1906 = Piratula clercki (Bösenberg & Strand) 1906
„ coelestis Bösenberg & Strand 1906 = Hogna coelestis (Bösenberg & Strand) 1906

Tarentula (Forts.):
- „ comotti Thorell 1887 = Allocosa comotti (Thorell) 1887
- „ concolorata Roewer 1951 = Pardosa concolorata (Roewer) 1951
- „ conspersa Thorell 1877 = Geolycosa conspersa (Thorell) 1877
- „ cronebergii Thorell 1875 = Alopecosa cronebergii (Thorell) 1875
- „ cruciata Sundevall 1832 = Alopecosa barbipes (Sundevall) 1832
- „ cuneata C. L. Koch 1850, Thorell 1872, Dahl 1908 et sequ. = Alopecosa cuneata (Clerck) 1757
- „ cuneata Menge 1879 ♀ = Alopecosa pulverulenta (Clerck) 1757
- „ cuneata Menge 1879 ♂ = Alopecosa aculeata (Clerck) 1757
- „ cursor C. L. Koch 1850, Chyzer & Kulczynski 1891 et sequ. = Alopecosa cursor (Hahn) 1831
- „ depectinata Bösenberg & Strand 1906, Strand 1918 = Arctosa depectinata (Bösenberg & Strand) 1906
- „ dufouri Strand 1915 = Allocosa dufouri (Simon) 1876
- „ dybowskii Kulczynski 1885 = Piratosa (pro Piratessa praeocc.) dybowskii (Kulczynski) 1885
- „ edax Thorell 1875 = Xerolycosa edax (Thorell) 1875
- „ eichwaldii Thorell 1875 et sequ. = Alopecosa eichwaldii (Thorell) 1875
- „ encarpata Simon 1864 = Teippus encarpatus (Walckenaer) 1837
- „ erratica Simon 1864 = Avicosa algerica (Roewer) 1951
- „ erythrostoma Simon 1864 = Scaptocosa raptoria (Walckenaer) 1837
- „ exasperans Cambridge 1877, Jackson 1933 = Alopecosa exasperans (Cambridge) 1877
- „ exsiccatella Strand 1915 = Hogna exsiccatella (Strand) 1915
- „ fabella Strand 1913 = Sosilaus fabella (Karsch) 1879
- „ fabrilis Sundevall 1832, C. L. Koch 1850 et sequ. = Alopecosa fabrilis (Clerck) 1757
- „ fabrilis Menge 1879 ♀ = Alopecosa schmidtii (Hahn) 1834
- „ famelica Simon 1870 = Hogna radiata (Latreille) 1819
- „ fasciiventris Thorell 1873 = Lycosa tarentula (Rossi) 1790
- „ feisica Strand 1914 = Pavocosa feisica (Strand) 1914
- „ ferox Strand 1915 = Lycorma ferox (Lucas) 1846
- „ feroxella Strand 1915 = Lycorma ferox (Lucas) 1846
- „ flavitibia Saito 1934 = Saitocosa flavitibia (Saito) 1934
- „ fragilis Thorell 1890, 1892 = Avicosa fragilis (Thorell) 1890
- „ frigens Kulczynski 1916 = Lycosa frigens (Kulczynski) 1916
- „ fulviventris Kroneberg 1875 = Lycosa fulviventris (Kroneberg) 1875
- „ fumigata Dahl 1908, 1927, Palmgren 1939 = Alopecosa pinetorum (Thorell) 1856
- „ funesta Simon 1864 = Alopecosa funesta (C. L. Koch) 1837
- „ fusca Keyserling 1876 = Arkalosula fusca (Keyserling) 1876
- „ fuscipes C. L. Koch 1848, Hadjissarandos 1940 = Alopecosa fuscipes (C. L. Koch) 1848
- „ gasteinensis Simon 1864 = Alopecosa pulverulenta (Clerck) 1757
- „ georgicola Simon 1864 = Allocosa georgicola (Walckenaer) 1837
- „ gertschi Schenkel 1951 = Alopecosa gertschi (Schenkel) 1951
- „ godeffroyi Strand 1907 = Geolycosa godeffroyi (L. Koch) 1865
- „ gracilis Bösenberg 1895, Strand 1911, Denis 1941 = Alopecosa gracilis (Bösenberg) 1895
- „ gracilis orotawensis Strand 1915 = Lynxosa orotawensis (Strand) 1915
- „ graeca Roewer 1951 = Hogna graeca (Roewer) 1951
- „ graminicola Simon 1864 = Alopecosa pulverulenta (Clerck) 1757
- „ granadensis Keyserling 1876 = Agalenocosa helvola (C. L. Koch) 1848
- „ grisea Simon 1864 = Hogna graeca (Roewer) 1951
- „ guaquiensis Strand 1908 = Trochosa guaquiensis (Strand) 1908
- „ hamiltoni Chamberlin & Ivie 1947 = Alopecosa hamiltoni (Chamberlin & Ivie) 1947
- „ hansi Strand 1915 = Orinocosa hansi (Strand) 1915

Tarentula (Forts.):

„ helvipes Keyserling 1876 = Hogna helluo (Walckenaer) 1837
„ hibernalis Strand 1906, 1907 = Lynxosa hibernalis (Strand) 1906
„ hirsuta Bösenberg & Lenz 1895, Strand 1907 = Allocosa hirsuta (Bösenberg & Lenz) 1895
„ hirta Kulczynski 1908, 1916 = Alopecosa hirta (Kulczynski) 1908
„ hirtipes Kulczynski 1907, 1908 = Alopecosa hirtipes (Kulczynski) 1907
„ hispanica Strand 1915 = Hogna hispanica (Walckenaer) 1837
„ horrida Keyserling 1876 Allohogna horrida (Keyserling) 1876
„ hsinglungshanensis Saito 1936 = Varacosa hsinglungshanensis (Saito) 1936
„ hugonis Strand 1911 = Allocosa hugonis (Strand) 1911
„ iaffa Strand 1913 = Geolycosa iaffa (Strand) 1913
„ illegalis Strand 1906, 1907 = Allocosa illegalis (Strand) 1906
„ incompta Kulczynski 1908 = Xerolycosa incompta (Kulczynski) 1908
„ inhonesta Keyserling 1876 = Hygrolycosa aspersa (Hentz) 1844
„ inimica Cambridge 1885 = Alopecosa inimica (Cambridge) 1885
„ inquilina C. L. Koch 1850, Thorell 1856, 1872 et sequ. = Alopecosa inquilina (Clerck) 1757
„ inquilina Ohlert 1867 = Alopecosa barbipes (Sundevall) 1832
„ insolita Jackson 1933 = Paratrochosina insolita (L. Koch) 1878
„ intermedia Caporiacco 1928 = Lycosa intermedialis **nom. nov.**
„ interstitialis Strand 1906, 1907 = Lycosa interstitialis (Strand) 1906
„ irascibilis Cambridge 1885 = Hogna irascibilis (Cambridge) 1885
„ ishikariana Saito 1934 = Ishicosa ishikariana (Saito) 1934
„ ituriana Strand 1913 = Allocosa ituriana (Strand) 1913
„ ituricola Strand 1913 = Geolycosa ituricola (Strand) 1913
„ japonica Bösenberg & Strand 1906 = Triccosta japonica (Bösenberg & Strand) 1906
„ juanensis Strand 1907, 1908 = Hogna juanensis (Strand) 1907
„ karissimbica Strand 1913 = Allocosa karissimbica (Strand) 1913
„ karschi Roewer 1951 = Hogna karschi (Roewer) 1951
„ kassengea Strand 1913 = Arctosa kassengea (Strand) 1913
„ kijabica Strand 1916 = Scaptocosa kijabica (Strand) 1916
„ kirkiana Strand 1913 = Arctosa kirkiana (Strand) 1913
„ kiwuana Strand 1913 = Arctosa kiwuana (Strand) 1913
„ kochii Keyserling 1876, Schenkel 1951 = Alopecosa kochii (Keyserling) 1876
„ konstantinovi Drenski 1929 = Alopecosa konstantinovi (Drenski) 1929
„ krynickii Thorell 1875 = Avicosa krynickii (Thorell) 1875
„ kulczynskii Bösenberg 1895 = Hesperocosa kulczynskii (Bösenberg) 1895
„ kulczynskii gomerae Strand 1911 = Hesperocosa gomerae (Strand) 1911
„ laeta Thorell 1881, Strand 1913 = Allocosa laeta (L. Koch) 1877
„ laeta Hasselt 1888 = nicht zu deuten!
„ laetella Strand 1907, 1908 = Allocosa laetella (Strand) 1907
„ lamperti Strand 1906 = Allocosa lamperti (Strand) 1906
„ landanae Strand 1907 = Hogna landanae (Simon) 1877
„ latifasciata Kroneberg 1875 = Alopecosa latifasciata (Kroneberg) 1875
„ leonhardii Strand 1913 Alopecosa leonhardii (Strand) 1913
„ leopardus Canestrini & Pavesi 1868 = Megarctosa leopardus (Sundevall) 1832
„ lepida Keyserling 1876 = Avicosa avida (Walckenaer) 1837
„ lesserti Cambridge 1912 = Hogna lesserti (Cambridge) 1912
„ leuckartii Thorell 1870 = Scaptocosa leuckartii (Thorell) 1870
„ levis Strand 1913 = Lycorma levis (Karsch) 1879
„ liguriensis Simon 1870, Thorell 1873, 1875 = Hogna radiata (Latreille) 1819
„ lindneri Strand 1913 = Scaptocosa lindneri (Karsch) 1879
„ lineatipes Nosek 1905 = Alopecosa lineatipes (Nosek) 1905
„ lombokiensis Strand 1913, 1915 = Allocosa lombokiensis (Strand) 1913
„ lucasi Roewer 1951 — Metatrochosina lucasi (Roewer) 1951
„ macedonica Giltay 1932, 1933 = Lycosa macedonica (Giltay) 1932

Tarentula (Forts.):

„ maderiana Simon 1864, Warburton 1892 = Isohogna maderiana (Walckenaer) 1837
„ magdalenensis Strand 1914 = Trochosa magdalenensis (Strand) 1914
„ malayana Giltay 1935 = Trochosippa malayana (Doleschall) 1859
„ manicola Strand 1906, 1907 = Hogna manicola (Strand) 1906
„ mariae Dahl 1908, 1912, 1927, Ermolajew 1928, Kolosvary 1934 = Alopecosa mariae (Dahl) 1908
„ martinicensis Strand 1910 = Allocosa martinicensis (Strand) 1910
„ masumbica Strand 1916 = Varacosa masumbica (Strand) 1916
„ mayi Strand 1911 = Arctosa mayi (Strand) 1911
„ medellina Strand 1914 = Hogna medellina (Strand) 1914
„ media Pocock 1889 = Hogna media (Pocock) 1889
„ melanogaster Thorell 1870 = Lycosa narbonensis Latreille 1806
„ melanogaster Strand 1915 = Arctosa lenzi (Roewer) 1951
„ meridiana Thorell 1872, Menge 1879 = Xerolycosa nemoralis (Westring) 1862
„ meridiana Dahl 1908 = Alopecosa aculeata (Clerck) 1757
„ millica Strand 1906 = Allocosa millica (Strand) 1906
„ minae Dönitz & Strand 1906 = Lycosa minae (Dönitz & Strand) 1906
„ miniata Chyzer & Kulczynski 1891, Bösenberg 1903 et sequ. = Xerolycosa miniata (C. L. Koch) 1848
„ mirabilis Strand 1906, 1907 = Allocosa mirabilis (Strand) 1906
„ modesta Keyserling 1876 = Allocosa modesta (Keyserling) 1876
„ modesta Thorell 1877 = Allocosa frondicola (Emerton) 1885
„ moesta Holmberg 1881 = Alopecosa moesta (Holmberg) 1876
„ molicola Strand 1906, 1908 = Allocosa molicola (Strand) 1906
„ mülleriana Strand 1908, 1915 = Hogna mülleriana (Strand) 1908
„ murinella Roewer 1951 = Paratrochosina murina (Mello-Leitao) 1941
„ mutabilis Kulczynski 1908, 1916, Grese 1909, Gertsch 1934 = Hesperocosa mutabilis (Kulczynski) 1908
„ naeviella Roewer 1951 = Hogna naeviella (Roewer) 1951
„ narbonensis C. L. Koch 1848, Thorell 1873, Strand 1907 = Lycosa narbonensis Latreille 1806
„ nebulosa Thorell 1872 = Pardosa nebulosa (Thorell) 1872
„ nemoralis Chyzer & Kulczynski 1891, Bösenberg 1903, Smith 1907 et sequ. = Xerolycosa nemoralis (Westring) 1862
„ nemurensis Strand 1907, 1909 = Avicosa nemurensis (Strand) 1907
„ nervosa Keyserling 1891 = Hogna nervosa (Keyserling) 1891
„ niccensis Strand 1907, 1909 = Hogna niccensis (Strand) 1907
„ nidifex Marx 1881, Mc Cook 1883 = Geolycosa turricola (Treat) 1880
„ nigrotibialis Thorell 1887, 1895, Strand 1909, Gravely 1924, Sinha 1951 = Allocosa phipsoni (Pocock) 1899
„ nigrotibiella Strand 1909 = Allocosa phipsoni (Pocock) 1899
„ nivalis Sundevall 1832, C. L. Koch 1850 = Alopecosa aculeata (Clerck) 1757
„ nivalis Ohlert 1867 = Xerolycosa nemoralis (Westring) 1862
„ nordmanni Thorell 1875 = Allocosa nordmanni (Thorell) 1875
„ nossibeensis Strand 1907, 1908 = Geolycosa nossibeensis (Strand) 1907
„ numida Lucas 1869 = Xerolycosa albofasciata (Brullé) 1832
„ nychthemera Bertkau 1880 = Hogna nychthemera (Bertkau) 1880
„ nyembeensis Strand 1916 = Arctosa nyembeensis (Strand) 1916
„ obscuroides Strand 1906 = Allocosa obscuroides (Strand) 1906
„ ocellaris Canestrini & Pavesi 1868 = Xerolycosa albofasciata (Brullé) 1832
„ opiphex Wagner 1891 = Mustelicosa opiphex (Wagner) 1891
„ ornata Simon 1864 = Hogna ornata (Perty) 1833
„ orophila Thorell 1887 = Orthocosa orophila (Thorell) 1887
„ orotavensis Strand 1915 = Lynxosa orotavensis (Strand) 1915
„ orycella Strand 1908 = Brevilabus oryx (Simon) 1885
„ oryx Strand 1908 = Brevilabus oryx (Simon) 1885

Tarentula (Forts.):

„ palus Dönitz & Strand 1906 = Pardosa sumatrana (Thorell) 1890
„ papakula Strand 1911 = Varacosa papakula (Strand) 1911
„ pardalina Bertkau 1880, Strand 1909 = Hogna pardalina (Bertkau) 1880
„ pardosella Strand 1906, 1907 = Trochosippa pardosella (Strand) 1906
„ parviguttata Strand 1906, 1907 = Crocodilosa parviguttata (Strand) 1906
„ pertyi Simon 1864 = Lycosa tarentuloides Perty 1833
„ phila Dönitz & Strand 1906 = Lycosa phila (Dönitz & Strand) 1906
„ philadelphiana Simon 1864 = Lycosa philadelphiana (Walckenaer) 1837
„ pia Bösenberg & Strand 1906 = Allocosa pia (Bösenberg & Strand) 1906
„ pictilis Gertsch 1934 = Avicosa pictilis (Emerton) 1885
„ picturella Strand 1906, 1907 = Arkalosula picturella (Strand) 1906
„ pikei Marx 1881 = Geolycosa pikei (Marx) 1881
„ pilipes Strand 1907 = Arctosa cinerea (Fabricius) 1776
„ pinetorum Thorell 1856, 1872 et sequ. = Alopecosa pinetorum (Thorell) 1856
„ pinnata Kulczynski 1908 = Alopecosa pinnata (Kulczynski) 1908
„ piochardi Kulczynski 1911 = Lycosa piochardi Simon 1876
„ piratella Strand 1907, 1909 = Pirata piratella (Strand) 1907
„ piratimorpha Strand 1908 = Piratula piratimorpha (Strand) 1908
„ piratoides Bösenberg & Strand 1906 = Piratula piratoides (Bösenberg & Strand) 1906
„ pistia Strand 1913 = Allocosa pistia (Strand) 1913
„ poecila Kulczynski 1908 = Alopecosa poecila (Kulczynski) 1908
„ poliostoma C. L. Koch 1848, Keyserling 1878, Bertkau 1880 = Scaptocosa poliostoma (C. L. Koch) 1848
„ praegrandis Strand 1907 = Lycosa praegrandis C. L. Koch 1836
„ procurva Bösenberg & Strand 1906 = Piratula procurva (Bösenberg & Strand) 1906
„ promontorii Strand 1907 = Arctosa promontorii (Pocock) 1900
„ pseudoannulata Bösenberg & Strand 1906, Strand 1918 = Avicosa pseudoannulata (Bösenberg & Strand) 1906
„ pseudofurva Strand 1908 = Varacosa pseudofurva (Strand) 1906
„ pudens Marx 1889 = Allocosa frondicola (Emerton) 1885
„ pugil Bertkau 1880 = Arctosa pugil (Bertkau) 1880
„ pugnatrix Keyserling 1876 = Allocosa pugnatrix (Keyserling) 1876
„ pulchella Keyserling 1876, Strand 1914 = Hogna pulchella (Keyserling) 1876
„ pulchra Keyserling 1876 = Scaptocosa pulchra (Keyserling) 1876
„ pulla Bösenberg & Lenz 1895 = Hogna pulla (Bösenberg & Lenz) 1895
„ pulla Strand 1907 = Hogna pulloides (Strand) 1907
„ pulloides Strand 1907 = Hogna pulloides (Strand) 1907
„ pulverulenta Sundevall 1832, Zimmermann 1871, Thorell 1872 et sequ. (excl. Bösenberg 1903) = Alopecosa pulverulenta (Clerck) 1757
„ pulverulenta Bösenberg 1903 = Alopecosa aculeata (Clerck) 1757
„ punctiventris Canestrini & Pavesi 1868 = Xerolycosa albofasciata (Brullé) 1832
„ punctiventralis Roewer 1951 = Lycosa punctiventralis (Roewer) 1951
„ quadripunctata Strand 1907 = Arctosa quadripunctata (Lucas) 1846
„ radiata Thorell 1872, Chyzer & Kulczynski 1891 = Hogna radiata (Latreille) 1819
„ raffrayi Strand 1906 = Hogna raffrayi (Simon) 1876
„ rainbowi Roewer 1951 = Lycosa rainbowi (Roewer) 1951
„ raptatorides Strand 1909 = Scaptocosa raptatorides (Strand) 1909
„ raptoria Keyserling 1876 = Scaptocosa raptoria (Walckenaer) 1837
„ reichardtiana Strand 1915 = Varacosa reichardtiana (Strand) 1915
„ reimoseri Kolosvary 1934 = Alopecosa reimoseri (Kolosvary) 1934
„ renidens Schenkel 1927 = Arctosa renidens (Simon) 1876
„ roeweri Rosca 1937 = Alopecosa roeweri (Rosca) 1937
„ rubicundocolorata Strand 1906, 1907 = Pirata rubicundocolorata (Strand) 1906

Tarentula (Forts.):
- „ rubiginosa Simon 1864 = Lycosa tarentula (Rossi) 1790
- „ rubrotaeniata Keyserling 1876 = Geolycosa rubrotaeniata (Keyserling) 1876
- „ rufimana Simon 1864 = Scaptocosa raptoria (Walckenaer) 1837
- „ rufimanoides Strand 1908 = Lycosa rufimanoides (Strand) 1908
- „ sagaphila Strand 1918 = Hyaenosa sagaphila (Strand) 1918
- „ sagitta Simon 1864 = Xerolycosa albofasciata (Brullé) 1832
- „ sagittifera Roewer 1951 = Paratrochosina sagittigera (Roewer) 1951
- „ samoana Roewer 1951 = Allocosa samoana (Roewer) 1951
- „ sanctae-helenae Strand 1909 = Xerolycosa sanctae-helenae (Strand) 1909
- „ sanisabel Strand 1909 = Hogna sanisabel (Strand) 1909
- „ sansibarensis Strand 1907, 1908 = Lycorma sansibarensis (Strand) 1907
- „ scalaris Thorell 1877 = Allocosa scalaris (Thorell) 1877
- „ schmidtii Dahl 1908, 1912, 1927, Schenkel 1936 = Alopecosa schmidtii (Hahn) 1834
- „ schubotzi Strand 1913 = Allocosa schubotzi (Strand) 1913
- „ schweinfurthi Strand 1906 = Arctosa schweinfurthi (Strand) 1906
- „ scopulitibiis Strand 1906, 1907 = Arkalosula scopulitibiis (Strand) 1906
- „ sepia Dönitz & Strand 1906 = Geolycosa sepia (Dönitz & Strand) 1906
- „ septembris Strand 1906, 1907 = Allohogna septembris (Strand) 1906
- „ seuberti Strand 1907 = Allocosa obscuroides (Strand) 1906
- „ sibirica Kulczynski 1908 = Alopecosa sibirica (Kulczynski) 1908
- „ sigridae Strand 1916 = Lycosa sigridae (Strand) 1916
- „ simonii Kulczynski 1908 = Alopecosa simonis (Thorell) 1872
- „ simonis Thorell 1873 = Alopecosa simonis (Thorell) 1872
- „ solitaria Herman 1879, Chyzer & Kulczynski 1891 et sequ. = Solicosa solitaria (Herman) 1879
- „ solitaria teschleri Kolosvary 1936 = Solicosa teschleri (Kolosvary) 1936
- „ solivaga Kulczynski 1901, 1916 = Alopecosa solivaga (Kulczynski) 1901
- „ sternalis Bertkau 1880 = Hogna sternalis (Bertkau) 1880
- „ strandi Rosca 1936, 1937 = Solicosa strandi (Rosca) 1936
- „ striatipes ? Thorell 1875, Chyzer & Kulczynski 1891, Kulczynski 1895, Bösenberg 1903, Dahl 1908, 1927, Saito 1934 = Alopecosa striata (Kulczynski) 1895
- „ striatipes mariae Kratochvil 1931 = Alopecosa mariae (Dahl) 1908
- „ stygia Keyserling 1876 = Allocosa implacida (Nicolet) 1849
- „ suahela Strand 1913 = Lycorma suahela (Strand) 1913
- „ subamylacea Bösenberg & Strand 1906, Saito 1939 = Hoggicosa subamylacea (Bösenberg & Strand) 1906
- „ subannulipes Strand 1906, 1908 = Pirata subannulipes (Strand) 1906
- „ subaustralis Strand 1908 = Hogna subaustralis (Strand) 1908
- „ subinermis Thorell 1885 = Geolycosa conspersa (Thorell) 1877
- „ subpiraticus Bösenberg & Strand 1906 = Piratula subpiratica (Bösenberg & Strand) 1906
- „ subvittata Strand 1907 = Scaptocosa subvittata (Pocock) 1900
- „ sulzeri Pavesi 1873, Dahl 1908, 1927 = Alopecosa sulzeri (Pavesi) 1873
- „ suspecta Simon 1864 = ? Dolomedes albineus Hentz 1845
- „ swakopmundensis Strand 1916 = Hogna swakopmundensis (Strand) 1916
- „ swatowensis Strand 1907, 1909 = Arctosa swatowensis (Strand) 1907
- „ sylvatica Roewer 1951 = Lycosa sylvatica (Roewer) 1951
- „ taeniata Thorell 1856, Ohlert 1867 = Alopecosa aculeata (Clerck) 1757
- „ taeniopus Kulczynski 1895 = Alopecosa taeniopus (Kulczynski) 1895
- „ tagax Thorell 1897 = Allocosa tagax (Thorell) 1897
- „ tanna Strand 1913, 1914 = Varacosa tanna (Strand) 1913
- „ tarentulina Simon 1864, Cambridge 1876, Strand 1907 = Allocosa tarentulina (Audouin) 1827
- „ tasmanica Roewer 1951 = Lycosa tasmanica (Roewer) 1951
- „ tenebrosa Thorell 1897 = Allocosa tenebrosa (Thorell) 1897
- „ tenera Strand 1913 = Avicosa tenera (Karsch) 1879

Tarentula (Forts.):
„ teranganicola Strand 1911 = Ishicosa teranganicola (Strand) 1911
„ teschleri Kolosvary 1934 = Solicosa teschleri (Kolosvary) 1934
„ thorellii Keyserling 1876, 1891, Strand 1909 = Lycorma thorellii (Keyslg.) 1876
„ tongatabuensis Strand 1911, 1914 = Scaptocosa tongatabuensis (Strand) 1911
„ trabalis Sundevall 1832 ♂ = Alopecosa inquilina (Clerck) 1757
„ trabalis Sundevall 1832 ♀, Thorell 1856, 1872, Menge 1879 et sequ. = Alopecosa trabalis (Clerck) 1757
„ tremens Cambridge 1876 = Allocosa tremens (Cambridge) 1876
„ trochosiformis Strand 1906, 1907 = Arctosomma trochosiformis (Strand) 1906
„ trucidatoria Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ truculenta Cambridge 1876 = Hogna truculenta (Cambridge) 1876
„ tula Strand 1913 = Allocosa tula (Strand) 1913
„ turricola Treat 1880 = Geolycosa turricola (Treat) 1880
„ urbana Strand 1907, 1908, 1913 = Geolycosa urbana (Cambridge) 1876
„ urbana molensis Strand 1908 = Pirata molensis (Strand) 1908
„ urbanides Strand 1907, 1908 = Gnatholycosa urbanides (Strand) 1907
„ uruguayensis Strand 1908 = Diapontia uruguayensis Keyserling 1876
„ uruguayaca Strand 1909 = Geolycosa uruguayaca (Strand) 1909
„ vafra C. L. Koch 1848 = Hogna helluo (Walckenaer) 1837
„ vagabunda Hasselt 1882 = Pardosa pinangensis (Thorell) 1890
„ velox Canestrini & Pavesi 1868 = Arctosa perita (Latreille) 1798
„ venefica Keyserling 1891 = Avicosa venefica (Keyserling) 1891
„ vittata Canestrini & Pavesi 1868 = Pardosa vittata (Keyserling) 1863
„ vivax Thorell 1875 = Vesubia vivax (Thorell) 1875
„ volxemi Bertkau 1880 = Hogna volxemi (Bertkau) 1880
„ vorax Sundevall 1832, Simon 1864, Ohlert 1867 = Alopecosa trabalis (Clerck) 1757
„ vulpina Simon 1864 = Hogna vulpina (C. L. Koch) 1848
„ vulvella Strand 1907, 1909 = Metatrochosina vulvella (Strand) 1907
„ workmani Strand 1909 = Hygrolycosa workmani (Strand) 1909
„ xylina Simon 1864 = Hogna radiata (Latreille) 1819
„ yauliensis Strand 1908 = Lynxosa yauliensis (Strand) 1908
„ yurae Strand 1908 = Avicosa yurae (Strand) 1908
„ zualella Strand 1907 = Allocosa zualella (Strand) 1907

Tariona:
„ maculata Franganillo 1930 = nicht zu deuten!

Tatacantha:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Gasteracantha**

Tectrix siehe **Textrix:**

Tegenaria:
„ annulipes Lucas 1844 = Miturga annulipes (Lucas) 1844
„ annulipes Cambridge 1872 = Tegenaria maronita Simon 1873
„ antipodiana White 1849, 1850 = Cambridgea antipodiana (White) 1849
„ arboricola Urquhart 1890 = Cambridgea antipodiana (White) 1849
„ argentata Doleschall 1859 = Psechrus argentatus (Doleschall) 1859
„ atrica Blackwall 1861, Simon 1875, Kulczynski 1911 = Tegenaria saeva Blackw. 1844
„ atrica Lebert 1877, Becker 1878, Getaz 1889 = nicht zu deuten!
„ australensis Walckenaer 1841 = nicht zu deuten!
„ berthae Becker 1879, 1896 = Tegenaria picta Simon 1870
„ bremi Pavesi 1875 = Tegenaria tridentina L. Koch 1873
„ brevis Emerton 1889 = Cicurina brevis (Emerton) 1889
„ californica Banks 1896 = Calymmaria californica (Banks) 1896
„ californica Exline 1936 = Calymmaria emertoni (Simon) 1897
„ campestris Heer 1846 = nicht zu deuten!
„ campestris Lebert 1877, Simon 1875 = Tegenaria silvestris L. Koch 1872
„ capra Simon 1875 = Tegenaria corsica Bremi-Wolff 1849
„ castro Chamberlin & Ivie 1942 = Tegenaria antrias Crosby 1926

Tegenaria (Forts.):
- „ cavicola Banks 1896, Roewer 1944 = Calymmaria cavicola (Banks) 1896
- „ cicurea C. L. Koch 1841 = Cicurina cicurea (Fabricius) 1793
- „ cinerea Thorell 1873, Dahl 1883 = Cicurina cicurea (Fabricius) 1793
- „ civilis Waldkenaer 1805 et sequ. = Tegenaria domestica (Clerck) 1757
- „ coarctata Waldkenaer 1841 = Textrix coarctata (Dufour) 1831
- „ complicata Emerton 1902 = Cicurina arcuata Keyserling 1887
- „ cretica Lucas 1853 = Tegenaria domestica (Clerck) 1757
- „ debilis Simon 1875 = Histopona debilis Thorell 1875
- „ derhamii Dahl 1883 et sequ. = Tegenaria domestica (Clerck) 1757
- „ detestabilis Cambridge 1877 = Tegenaria domestica (Clerck) 1757
- „ dolomedes Doleschall 1859 = Hygropoda dolomedes (Doleschall) 1859
- „ domestica Waldkenaer 1805, 1841, Audouin 1827, Blackwall 1861 = Tegenaria parietina (Fourcroy) 1785
- „ domestica C. L. Koch 1841, Westring 1862, Ohlert 1867, Dahl 1883, Hansen 1885, Chyzer & Kulczynski 1897, Lessert 1910, Saito 1937 = Tegenaria ferruginea (Panzer) 1804
- „ duellica Simon 1875 = Tegenaria saeva Blackwall 1844
- „ emaciata Waldkenaer 1841 = Histopona torpida (C. L. Koch) 1834
- „ emertoni Simon 1897, Banks 1913 = Calymmaria emertoni (Simon) 1897
- „ ericarum Simon 1875 = Tegenaria corsica Bremi-Wolff 1849
- „ foliata L. Koch 1872, Karsch 1878 = Cambridgea foliata (L. Koch) 1872
- „ fontium Simon 1875 (frontium Simon 1937) = Tegenaria domestica (Clerck) 1757
- „ fulginiea Lucas 1844 = Textrix denticulata (Olivier) 1789
- „ guyonii Guérin 1829, Lucas 1846, Warburton 1892 = Tegenaria parietina (Fourcroy) 1785
- „ guyonii Bösenberg 1902 = Tegenaria ferruginea (Panzer) 1804
- „ heteropalpa Lebert 1877 = Tegenaria pagana C. L. Koch 1841
- „ hibernica Cambridge 1891, 1893 = Tegenaria atrica C. L. Koch 1843
- „ intricata C. L. Koch 1841 = Tegenaria parietina (Fourcroy) 1785
- „ larva Simon 1875, Müller & Schenkel 1895, Lessert 1910, Kulczynski 1911, M. Dahl 1931 = Tegenaria atrica C. L. Koch 1843
- „ livoris Urquhart 1892, Dalmas 1917 = Urquhartia livoris (Urquhart) 1892
- „ longipalpis Lucas 1846 = nicht zu deuten!
- „ longipes C. L. Koch 1841 = Tegenaria domestica (Clerck) 1757
- „ longitarsis Emerton 1902 = Coras juvenilis (Keyserling) 1881
- „ luxurians Kulczynski 1897 = Histopona luxurians (Kulczynski) 1897
- „ lycosina Waldkenaer 1841 = Textrix denticulata (Olivier) 1789
- „ magnacava Exline 1936, 1938 = Tegenaria agrestis (Waldkenaer) 1802
- „ medicinalis Hentz 1821, Emerton 1902 = Coras medicinalis (Hentz) 1821
- „ minuta Simon 1870, 1875 = Tegenaria picta Simon 1870
- „ mirabilis L. Koch 1875 = Haemilla mirabilis (L. Koch) 1875
- „ modesta Keyserling 1877 = Tegenaria domestica (Clerck) 1757
- „ modesta Banks 1898 = Calymmaria modestella (Roewer) 1944
- „ morsitans Marx 1889 = nicht zu deuten!
- „ murina Waldkenaer 1805, 1841 = Tegenaria parietina (Fourcroy) 1785
- „ nana Simon 1897, Banks 1913, Exline 1936 = Calymmaria nana (Simon) 1897
- „ nemorensis Waldkenaer 1841 = Coras medicinalis (Hentz) 1821
- „ nervosa Simon 1870, 1875 = Tegenaria atrica C. L. Koch 1843
- „ notata C. L. Koch 1834 = Liocranum rupicola (Waldkenaer) 1825
- „ ochracea Doleschall 1859 = Fecenia ochracea (Doleschall) 1859
- „ pagana proxima Strand 1909 = Tegenaria proxima Cambridge 1873
- „ pallidula Simon 1875 = Tegenaria corsica Bremi-Wolff 1849
- „ patula Simon 1870 = Tegenaria bucculenta (L. Koch) 1868
- „ perita Simon 1875 = Tegenaria picta Simon 1870
- „ persica Hentz 1847 = Calymmaria persica (Hentz) 1847
- „ petrensis C. L. Koch 1841 = Tegenaria ferruginea (Panzer) 1804

Tegenaria (Forts.):
„ philoteichos Mc Cook 1876 = Dictyna sublata (Hentz) 1850
„ pusilla Simon 1875, Becker 1896, Bösenberg 1902, M. Dahl 1931 = Tegenaria picta Simon 1870
„ quadrata Exline 1936 = Calymmaria quadrata (Exline) 1936
„ scalaris Krynicki 1837 = Tegenaria domestica (Clerck) 1757
„ senegalensis Walckenaer 1841 = Syrisca senegalensis (Walckenaer) 1841
„ silvicola C. L. Koch 1834, Walckenaer 1847, Blackwall 1861 = Cryphoeca silvicola (C. L. Koch) 1834
„ similis Giebel 1867 = nicht zu deuten!
„ simplex Bryant 1936 = Tegenaria antrias Crosby 1926
„ stabularia C. L. Koch 1841 = Tegenaria ferruginea (Panzer) 1804
„ subtilis Simon 1870, Thorell 1875 = Tegenaria pagana C. L. Koch 1841
„ torpida C. L. Koch 1837 et sequ. = Histopona torpida (C. L. Koch) 1834
„ torva Cambridge 1869 = Psechrus torvus (Cambridge) 1869
„ tridentina Pavesi 1873 = Tegenaria ferruginea (Panzer) 1804
„ urbana Simon 1875, Becker 1896, Lessert 1910 = Tegenaria pagana urbana (Simon) 1875
„ variata Thorell 1875 = Tegenaria pagana C. L. Koch 1841
„ vicina Karsch 1878 = Uliodon frenatus (L. Koch) 1873

Teippus:
„ lamprus Chamberlin 1924 = Teippus pinicola (Hentz) 1850

Telamonia:
„ albonigra Franganillo 1925 = nicht zu deuten!

Teminius:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Syrisca**
„ continentalis Keyserling 1887 = Orodrassus coloradensis (Emerton) 1877
„ insularis Banks 1908 = Teminius clarissa (Franganillo) 1926
„ insularis Keyserling 1887 = Syrisca keyserlingi Simon 1897
„ nigriceps Banks 1895 = Haplodrassus signifer (C. L. Koch) 1839

Tenedos:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Storena**

Tentabunda:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Pseudosparianthis**

Tephlea:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Cithaeron**
„ agelenoides Simon 1878 = Cithaeron praedonius Cambridge 1872

Teratodes:
„ attalicus C. L. Koch 1839 = Filistata insidiatrix (Forskal) 1773
„ capitatus Hasselt 1888 = Filistata hibernalis Hentz 1842
„ depressus C. L. Koch 1842 = Filistata hibernalis Hentz 1842

Testudinaria:
„ quadripunctata Taczanowski 1879 = Gnolus quadripunctatus (Taczanowski) 1879

Tetracantha:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Gasteracantha**

Tetragnatha:
„ anguilla Thorell 1877, Gravely 1921 = Eucta anguilla (Thorell) 1877
„ arborea Urquhart 1890 = Orsinome lagenifera (Urquhart) 1887
„ argentata Cambridge 1869 = Leucauge argentata (Cambridge) 1869
„ argyra Walckenaer 1841 = Leucauge argyra (Walckenaer) 1841
„ armigera Blackwall 1846 = Tetragnatha elongata Walckenaer 1805
„ arundinii Bremi-Wolff 1849 = Tetragnatha extensa (Linné) 1758
„ banksi F. Cambridge 1903 = Tetragnatha intermedia Banks 1898
„ bengalensis Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ bidens F. Cambridge 1903 = Tetragnatha pallescens F. Cambridge 1903
„ bidens Mello-Leitao 1943 = Tetragnatha bidentata Roewer 1951
„ bigibbosa Keyserling 1863 = Leucauge bigibbosa (Keyserling) 1863

Tetragnatha (Forts.):
„ cabindae Brito-Capello 1866 = Leucauge cabindae (Brito-Capello) 1866
„ caudata Emerton 1884, Seely 1928 = Tetragnatha lacerta (Walckenaer) 1841
„ caudicula Bösenberg & Strand 1906 = Eucta caudicula (Karsch) 1879
„ celebesiana Walckenaer 1841, 1847 = Leucauge celebesiana (Walckenaer) 1841
„ chrysochlora Walckenaer 1841 = Tetragnatha extensa (Linné) 1758
„ chrysochlora Simon 1874, Becker 1896 = Tetragnatha obtusa C. L. Koch 1837
„ conica Grube 1861 = Eucta conica (Grube) 1861
„ conica L. Koch 1871, Keyserling 1887 = Tetragnatha protensa Walckenaer 1841
„ culta Cambridge 1869 = Leucauge culta (Cambridge) 1869
„ decorata Blackwall 1864, Cambridge 1869 = Leucauge decorata (Blackwall) 1864
„ deinognatha Walckenaer 1847 = Tetragnatha nitens (Audouin) 1827
„ digna Cambridge 1869 = Meta digna (Cambridge) 1869
„ ejuncida Simon 1874 = Tetragnatha nitens (Audouin) 1827
„ epeirides Walckenaer 1841 = Tetragnatha obtusa C. L. Koch 1837
„ eremita Chamberlin 1924 = Tetragnatha antillana Simon 1897
„ extensa Menge 1866 = Tetragnatha montana Simon 1874
„ extensa Nicolet 1849 = Tetragnatha americana Simon 1906
„ extensa punctipes Kulczynski 1885 = Tetragnatha punctipes Westring 1874
„ extensa Heer 1846, Sordelli 1868, Pavesi 1868, 1870, 1873, 1875, Lebert 1877, Becker 1878, Getaz 1889 = nicht zu deuten!
„ ferox L. Koch 1871 = Tetragnatha nitens (Audouin) 1827
„ ferox crossae Hogg 1911 = Tetragnatha nitens crossae (Hogg) 1911
„ festiva Blackwall 1866 = Leucauge festiva (Blackwall) 1866
„ filiformis Taczanowski 1872 = Tetragnatha filiformata Roewer 1942
„ fimbriata Walckenaer 1841 = Tetragnatha elongata Walckenaer 1805
„ flava Walckenaer 1841 = Tetragnatha walckenaeri Roewer 1942
„ fluviatilis Keyserling 1865 = Tetragnatha extensa (Linné) 1758
„ formosa Blackwall 1863 = Leucauge formosa (Blackwall) 1863
„ fronto Thorell 1890 = Tetragnatha ceylonica Cambridge 1869
„ fulva Walckenaer 1841 = Tetragnatha elongata Walckenaer 1805
„ gibba C. L. Koch 1837 = Tetragnatha extensa (Linné) 1758
„ gibba Taczanowski 1873 = Tetragnatha gibbula Roewer 1942
„ gibbosa Walckenaer 1847 = Tetragnatha obtusa C. L. Koch 1837
„ gracilis Lucas 1838 = Tetragnatha nitens (Audouin) 1827
„ gracilis Stoliczka 1869, Pocock 1900, Merian 1911, Gravely 1921 = Tetragnatha ceylonica Cambridge 1869
„ gracilis F. Cambridge 1903, Petrunkevitch 1929 = Tetragnatha cambridgei Roewer 1942
„ grallator Keyserling 1865, Hentz 1850, Emerton 1884 = Tetragnatha elongata Walckenaer 1805
„ granulata Walckenaer 1841 = Leucauge granulata (Walckenaer) 1841
„ gulosa L. Koch 1871 = Tetragnatha nitens (Audouin) 1827
„ herbigrada Urquhart 1889 = Orsinome lagenifera (Urquhart) 1887
„ illinoiensis Keyserling 1865, 1879 = Tetragnatha laboriosa Hentz 1850
„ indigna Cambridge 1869 = Meta digna (Cambridge) 1869
„ latifrons Thorell 1877 = Tetragnatha ceylonica Cambridge 1869
„ leptognatha Thorell 1877 = Tetragnatha mandibulata Walckenaer 1841
„ lineata Simon 1905, Gravely 1921 = Tetragnatha lineatula Roewer 1942
„ longa Cambridge 1889 = Tetragnatha mexicana Keyserling 1865
„ lunaris C. L. Koch 1839 = Uloborus lunaris (C. L. Koch) 1839
„ lupata L. Koch 1872 = Tetragnatha rubriventris Doleschall 1857
„ maculata Blackwall 1865 = Meta maculata (Blackwall) 1865
„ mandibulata Keyserling 1865 = Tetragnatha keyserlingi Simon 1890
„ mandibulata L. Koch 1871 = Tetragnatha kochi Thorell 1895
„ mandibulata Thorell 1890 = Tetragnatha maxillosa Thorell 1895

Tetragnatha (Forts.):
- „ minax Blackwall 1877 = Tetragnatha mandibulata Walckenaer 1841
- „ miniatoria Simon 1877, 1886 = Tetragnatha mandibulata Walckenaer 1841
- „ molesta Cambridge 1872 = Tetragnatha nitens (Audouin) 1827
- „ nitens Adams 1847 = nicht zu deuten!
- „ nitens Lawrence 1927 = Tetragnatha boydi Cambridge 1898
- „ nowickii L. Koch 1870 = Tetragnatha extensa (Linné) 1758
- „ obtusa Lebert 1877 = nicht zu deuten!
- „ ocellata Keyserling 1863 = Leucauge ocellata (Keyserling) 1863
- „ pachygnathoides Cambridge 1894 = Cyrtognatha pachygnathoides (Cambridge) 1894
- „ pallida Banks 1892 = Tetragnatha pallescens F. Cambridge 1903
- „ pallidula Comstock 1912 = Tetragnatha pallescens F. Cambridge 1903
- „ parva Bryant 1947 = Tetragnatha bryantae Roewer 1951
- „ pinicola Emerton 1915 ♂ = Tetragnatha pinea Seely 1925
- „ praedator Tullgren 1910 = Tetragnatha boydi Cambridge 1898
- „ pulchella Hasselt 1882 = Tetragnatha puella Thorell 1895
- „ punctipes Bösenberg 1901 = Tetragnatha obtusa major Kulczynski 1891
- „ quinquelineata Keyserling 1863 = Leucauge venusta (Walckenaer) 1841
- „ refulgens Adams 1847 = nicht zu deuten!
- „ rubra Risso 1826 = Tetragnatha extensa (Linné) 1758
- „ rubriventris Thorell 1876, 1881 ♂ = Tetragnatha fallax Thorell 1881
- „ rubromaculata Keyserling 1863 = Chrysometa rubromaculata (Keyserling) 1863
- „ seydi Strand 1908 = Tetragnatha laboriosa Hentz 1850
- „ solandri Thorell 1873 = Tetragnatha montana Simon 1874
- „ solandri Bösenberg 1901, Lessert 1910 = Tetragnatha extensa (Linné) 1758
- „ solandrii Lebert 1877 = nicht zu deuten!
- „ solandrii Chyzer & Kulczynski 1891, Kulczynski 1903 = Tetragnatha montana Simon 1874
- „ splendens Blackwall 1863 = Leucauge splendens (Blackwall) 1863
- „ tenella Urquhart 1892 = Ischalea spinipes L. Koch 1872
- „ tenuipes Keyserling 1863 = Chrysometa tenuipes (Keyserling) 1863
- „ tepicana Strand 1908 = Tetragnatha intermedia Banks 1898
- „ thorellii Blackwall 1877 = Leucauge thorellii (Blackwall) 1877
- „ trichodes mendax Franganillo 1910 = nicht zu deuten!
- „ tridens Thorell 1898 = Tetragnatha ceylonica Cambridge 1869
- „ typica Urquhart 1889 = Tetragnatha nitens (Audouin) 1827
- „ versicolor Walckenaer 1841 = Tetragnatha extensa (Linné) 1758
- „ violacea Walckenaer 1841 = Tetragnatha elongata Walckenaer 1805
- „ zorilla Walckenaer 1841 = Latrodectus mactans (Fabricius) 1775

Tetragonophthalma (= Tetragonophthalmus):
- „ bilineata Pavesi 1895, Strand 1908 = Maypacius bilineatus (Pavesi) 1895
- „ brevipes Strand 1906 = Perenethis brevipes (Strand) 1906
- „ diversa Keyserling 1891 = Porrima diversa (Cambridge) 1877
- „ fascigera Bösenberg & Strand 1906 = Perenethis fascigera (Bösenberg & Strand) 1906
- „ granadensis Keyserling 1891 = Porrima granadensis (Keyserling) 1876
- „ phylla Simon 1897 (nec Karsch 1878) = Perenethis simoni (Lessert) 1916
- „ simoni Lessert 1916 = Perenethis simoni (Lessert) 1916
- „ sindica Simon 1897 = Perenethis sindica (Simon) 1897
- „ stuhlmanni Bösenberg & Lenz 1895 = Maypacius stuhlmanni (Bösenberg & Lenz) 1895
- „ stuhlmanni Berland 1922 = Maypacius berlandi Roewer 1954
- „ symmetrica Lawrence 1927 = Perenethis symmetrica (Lawrence) 1927
- „ undulata Keyserling 1887 = Pelopatis undulatus (Keyserling) 1887
- „ unifasciatus Strand 1911 = Perenethis unifasciatus (Doleschall) 1859

Tetrilus:
„ arietinus Cambridge 1900 = Tetrilus macrophthalmus (Kulczynski) 1897
„ recisus Jackson 1913 = Tetrilus macrophthalmus (Kulczynski) 1897
Tetromma:
„ lutea Keyserling 1877 = nicht zu deuten!
Teudis:
„ censoria Petrunkevitch 1911 = Aysha censoria (Keyserling) 1891
„ fragilis Barnes 1953 = Anyphaena fragilis Banks 1897
„ gentilis Cambridge 1896 = Teudis geminus Petrunkevitch 1911
„ punctata Petrunkevitch 1911 = Aysha punctata (Keyserling) 1891
„ rubella Petrunkevitch 1911 = Osoriella rubella (Keyserling) 1891
„ variabilis Petrunkevitch 1911 = Teudis concolor (Keyserling) 1891
Teutana:
„ nitida Keyserling 1884 = Teutana grossa (Olivier) 1789
„ picea Thorell 1899 = Lithyphantes piceus (Thorell) 1899
„ zonata Cambridge 1902 = Teutana grossa (Olivier) 1789
Textrix (= Tectrix):
„ agilis Blackwall 1833, 1834 = Textrix denticulata (Olivier) 1789
„ ferruginea C. L. Koch 1837, 1841 = Textrix coarctata (Dufour) 1831
„ lycosina Sundevall 1830 et sequ. = Textrix denticulata (Olivier) 1789
„ moggridgei Cambridge 1873 = Textrix coarctata (Dufour) 1831
„ montana C. L. Koch 1841 = Histopona torpida (C. L. Koch) 1834
„ obscura Blackwall 1859, Franganillo 1926 = Textrix coarctata (Dufour) 1831
„ puta Cambridge 1872 = Textrix coarctata (Dufour) 1831
„ torpida C. L. Koch 1841 = Histopona torpida (C. L. Koch) 1834
„ vestiva Simon 1864 = Textrix vestita C. L. Koch 1841
Thalamia:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Oecobius**
„ floridana Banks 1896 = Platoecobius floridanus (Banks) 1896
Thalassius:
„ doleschalli F. Cambridge 1897 = Thalassius albocinctus (Doleschall) 1859
„ leonina Strand 1915 = Thalassius leo Strand 1907
„ marginellus Simon 1885 = Thalassius albocinctus (Doleschall) 1859
„ rubromaculatus Thorell 1899 = Thalassius guineensis (Lucas) 1858
„ spathularis Simon 1893 = Dolomedes spathularis Hasselt 1882
Thalerothele:
„ striatipes Franganillo 1936 = nicht zu deuten!
Thallumetus:
„ petrunkevichinus Gertsch 1945 = Thallumetus pineus (Chamberlin & Ivie) 1944
Thamphilus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Sphingius**
Thanata siehe **Thanatus:**
Thanatidius:
„ americanus Chamberlin & Ivie 1944 = ? Thanatidius tenuis (Hentz) 1847
„ parahybensis Mello-Leitao 1924 = Thanatidius proximus Mello-Leitao 1920
Thanatus (= Thanata):
„ antarcticus Marx 1889 = nicht zu deuten!
„ arenarius Pavesi 1873, Getaz 1889 = nicht zu deuten!
„ atratus Simon 1875 = Thanatus vulgaris atratus (Simon) 1875
„ canadensis Gertsch 1933 = Thanatus formicinus (Clerck) 1757
„ coloradensis Emerton 1918 = Thanatus peninsulanus Banks 1898
„ fabricii Pavesi 1895 = Thanatus rubicundus L. Koch 1875
„ fornicatus Simon 1897 = Thanatus albescens Cambridge 1885
„ gracilenta Simon 1864 = Tibellus oblongus (Walckenaer) 1802
„ graciosus Simon 1875 = Thanatus sabulosus (Menge) 1875
„ hirsutus Simon 1875, Cambridge 1878, 1881 = Thanatus striatus C. L. Koch 1845
„ lineatipes Cambridge 1876 = Tibellus lesserti Roewer 1951
„ longipes Cambridge 1896 = Apollophanes maculatipes (Cambridge) 1893

Thanatus (Forts.):
„ lycosoides Emerton 1892 et sequ. = Thanatus formicinus (Clerck) 1757
„ major Simon 1875 = Thanatus vulgaris major (Simon) 1875
„ maritimus Menge 1875 ♂ = Tibellus maritimus (Menge) 1875
„ maritimus Menge 1875 ♀ = Tibellus oblongus (Walckenaer) 1802
„ mundus Cambridge 1873, Simon 1932 = Thanatus arenarius Thorell 1872
„ oblongiusculus Simon 1874, Kulczynski 1899 = Paratibellus oblongiusculus (Lucas) 1846
„ oblongus Ohlert 1867, Thorell 1872, Menge 1875 ♂, Dahl 1883, Hansen 1885 = Tibellus oblongus (Walckenaer) 1802
„ oblongus Menge 1875 ♀ = Tibellus maritimus (Menge) 1875
„ oblongus Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ parallelus C. L. Koch 1837, 1838 = Tibellus oblongus (Walckenaer) 1802
„ pictus Müller & Schenkel 1895 = Thanatus formicinus (Clerck) 1757
„ praeceps Simon 1864 = Teippus praeceps Walckenaer 1837
„ punctiger Cambridge 1891 = Apollophanes punctipes (Cambridge) 1891
„ punctulatus Taczanowski 1872 = Tibellus punctulatus (Taczanowski) 1872
„ retentus Chamberlin 1920 = Thanatus peninsulanus Banks 1898
„ rhombicus Ohlert 1867 = Thanatus formicinus (Clerck) 1757
„ rubicundulus Simon 1887 = Thanatus rubicundus L. Koch 1875
„ rubicundus Keyserling 1880 = Thanatus rubicellus Mello-Leitao 1929
„ rufipes Simon 1875 = Thanatus lineatipes Simon 1870
„ taquarae Keyserling 1891, Strand 1908 = Cleocnemis taquarae (Keyserling) 1891
„ tenellus L. Koch 1876 = Tibellus tenellus (L. Koch) 1876
„ testaceus Thorell 1875 = Thanatus flavidus Simon 1875
„ trilineatus C. L. Koch 1837, 1850, Prach 1866 = Tibellus oblongus (Walckenaer) 1802
„ ursus Simon 1875 = Thanatus striatus C. L. Koch 1845
„ vittatus Thorell 1875 = Tibellus macellus Simon 1875
„ vulgaris Simon 1875 ♀ = Thanatus striatus C. L. Koch 1845
„ walteri Gertsch 1933 = Thanatus striatus C. L. Koch 1845

Thargalia:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Castianeira**
„ aurata Banks 1893 = Micaria aurata (Hentz) 1847
„ bivittata Marx 1889, Banks 1892 = Castianeira cingulata (C. L. Koch) 1842
„ crocata Marx 1889, Banks 1892 = Castianeira descripta (Hentz) 1847
„ fallax Banks 1892 = Castianeira descripta (Hentz) 1847
„ luctuosa Banks 1901 = Castianeira luctifera Petrunkevitch 1911
„ marmorata Marx 1889 = Castianeira amoena (C. L. Koch) 1842
„ ornata Marx 1889 = Castianeira amoena (C. L. Koch) 1842
„ perplexa Banks 1892 = Castianeira longipalpus (Hentz) 1847
„ pinnata Banks 1893, Marx 1889 = Castianeira longipalpus (Hentz) 1847
„ zonaria Marx 1889 = Castianeira cingulata (C. L. Koch) 1842

Thaumasia:
„ connexa Bryant 1940 = Tinus connexus (Bryant) 1940
„ nigrina Banks 1909 = Tinus nigrinus F. Cambridge 1901
„ pinicola Banks 1910 = Teippus pinicola (Hentz) 1850
„ triton F. Cambridge 1903 = Dolomedes triton (Walckenaer) 1837

Thaumatoncus:
„ lancearius Simon 1884 = Trachelocamptus lancearius (Simon) 1884
„ mystacinus Simon 1884 = Trachelocamptus mystacinus (Simon) 1884

Thelacantha:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Gasteracantha**

Thelcticopis (= Thelticopis):
„ birmanica Thorell 1895 = Thelcticopis canescens Simon 1887
„ nigropicta Pocock 1900 = Stasina nalandica Karsch 1891
„ paripes Pocock 1900 = Stasina paripes (Karsch) 1879

Thelcticopis (Forts.):
„ picta Simon 1897 = Seramba picta Thorell 1887
„ silagensis Thorell 1891 = Thelcticopis orichalcea (Simon) 1880
„ truculenta Karsch 1884 = Seramba truculenta (Karsch) 1884
Thelechoris:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Ischnothele**
„ australis Purcell 1903 = Allothele australis (Purcell) 1903
„ australis Tucker 1917 = Allothele caffer australis (Hewitt) 1917
Thelticopis siehe **Thelcticopis:**
Themeropis:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Thelcticopis**
„ brevipes Thorell 1881 = Thelcticopis papuana (Simon) 1880
„ granadensis Keyserling 1880 = Sparianthis granadensis (Keyserling) 1880
„ paripes Karsch 1879 = Stasina paripes (Karsch) 1879
Theoclia:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Theotima**
Theonoe:
„ cornix Simon 1881, Kolosvary 1938 = Theonina cornix (Simon) 1881
„ foliola Simon 1881, 1894 = Theonoe minutissima (Cambridge) 1879
„ longiseta Simon 1881 = Cepheia longiseta (Simon) 1881
Theragretes:
„ waldkenaerii Ausserer 1871 = Missulena nigripes (Lucas) 1834
Theraphosa:
„ blondii Karsch 1880, Simon 1892 = Theraphosa leblondii (Latreille) 1804
„ panamana Karsch 1880 = Sericopelma rubronitens Ausserer 1875
Theraphosia:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Sericopelma**
Theratoscirtus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Thiratoscirtus**
Theridiellum:
„ minutissimum Dahl 1912 = Theonoe minutissima (Cambridge) 1879
Theridion (= Theridio = Theridium):
„ abelardi Waldkenaer 1841 = Theridion varians Hahn 1831
„ acanthognathum Lucas 1858 = nicht zu deuten!
„ acuminatum Wider 1834 = Entelecara acuminata (Wider) 1834
„ acuminatum Lucas 1846 = Euryopis episinoides (Waldkenaer) 1847
„ acuminatum tarsalis Simon 1914 = Euryopis episinoides tarsalis (Pavesi) 1875
„ affine Wider 1834 = nicht zu deuten!
„ affine Strand 1899 = ? Theridion ohlerti (Thorell) 1870
„ albens Waldkenaer 1841 = Theridion pallens Blackwall 1834
„ albidum Berland 1929 = Theridion berlandi Roewer 1942
„ albocinctum Lucas 1846 = Lithyphantes albomaculatus (De Geer) 1778
„ albogullatum Urquhart 1886 = Dipoena blattea (Urquhart) 1885
„ albomaculatum Hahn 1831, Westring 1862 = Lithyphantes albomaculatus (De Geer) 1778
„ albomaculatum Sundevall 1831 = Stemonyphantes lineatus (Linné) 1758
„ albonotatum Taczanowski 1873, Keyserling 1884 = Theridion rufipes Lucas 1846
„ alveolus Waldkenaer 1805 = ? Tapinopa longidens (Wider) 1834
„ ambiguum L. Koch 1872 = Theridion kochi Roewer 1942
„ amoenum Thorell 1877 = Theridion mundulum L. Koch 1872
„ ampullaceum Waldkenaer 1837 = Linyphia pusilla Sundevall 1830
„ anchoratum Holmberg 1876 = Lithyphantes anchoratus (Holmberg) 1876
„ anchorum Hahn 1836 = Lithyphantes albomaculatus (De Geer) 1778
„ anglicanum Hentz 1850 = Ceratinopsis anglicana (Hentz) 1850
„ angulatum Blackwall 1836 = Episinus angulatus (Blackwall) 1836
„ anticum Wider 1834 = Wideria antica (Wider) 1834
„ aphane Waldkenaer 1805, 1841 = Ero aphana (Waldkenaer) 1802

Theridion (Forts.):

„ apicatum Thorell 1881 = Theridion apiculatum Roewer 1942
„ apicatum Urquhart 1890 = Theridion cruciferum Urquhart 1885
„ ardesiacum Dufour 1855 = Titanoeca quadriguttata (Hahn) 1831
„ argentatum Keyserling 1863 = Euryopsis laeta (Westring) 1862
„ argentatum Urquhart 1891 = Theridion argentatulum Roewer 1942
„ argenteoguttatum Tullgren 1910 = Thwaitesia argenteoguttata (Tullgren) 1910
„ argenteosquamatum Lenz 1891 = Thwaitesia argenteosquamata (Lenz) 1891
„ argentina Hasselt 1882 = Leucauge argentina (Hasselt) 1882
„ argus Lucas 1846 = Crustulina guttata (Wider) 1834
„ aureosignata Lenz 1891 = Thwaitesia aureosignata (Lenz) 1891
„ bajulans L. Koch 1875 = Theridion rufipes Lucas 1846
„ bellicosum Simon 1873, Jackson 1914 = Theridion instabile bellicosum (Simon) 1873
„ benignum Walckenaer 1805 et sequ. = Dictyna arundinacea (Linné) 1758
„ bertkaui Bösenberg 1899 = Theridion bösenbergi Strand 1904
„ bicolor Hahn 1831 = nicht zu deuten!
„ bicolor Lucas 1846 = nicht zu deuten!
„ bicorne Wider 1834 = Diplocephalus cristatus (Blackwall) 1833
„ bicorne Keyserling 1891 = Janula bicornigera (Simon) 1894
„ bipunctatum Westring 1862 = Steatoda bipunctata (Linné) 1758
„ bituberculatum Wider 1834 = Hypomma bituberculatum (Wider) 1834
„ bituberculatum Keyserling 1884 = Thymoites bigibbosus Roewer **nom nov.**
„ blandum Simon 1894, Lessert 1910 = Theridion vituperabile Petrunkevitch 1911
„ blatteum Urquhart 1885 = Dipoena blattea (Urquhart) 1885
„ borbonicum Vinson 1863 = Theridion rufipes Lucas 1846
„ boreale Hentz 1850 = Steatoda borealis (Hentz) 1850
„ braccatum C. L. Koch 1841 = Dipoena braccata (C. L. Koch) 1841
„ brachiatum Thorell 1870 = Theridion bimaculatum (Linné) 1767
„ brevis Wider 1834 = Ceratinella brevis (Wider) 1834
„ brunneafolium Urquhart 1888 = Theridion cruciferum Urquhart 1885
„ buitenzorgi Strand 1907 = ? Theridion spiniventre Cambridge 1869
„ callens Blackwall 1841 = Ero furcata (Villers) 1789
„ calyciferum Urquhart 1885 = Theridion cruciferum Urquhart 1885
„ cancellatum Hentz 1850 = Conopistha (Argyrodina) cancellata (Hentz) 1850
„ candefactum Walckenaer 1841 = nicht zu deuten!
„ carolineum Butler 1877 = Latrodectus mactans (Fabricius) 1775
„ carolinum Walckenaer 1805, Blackwall 1864 = Theridion bimaculatum (Linné) 1767
„ castaneum Sundevall 1832, Westring 1862 = Teutana castanea (Clerck) 1757
„ castaneum Franganillo 1931, 1934 = nicht zu deuten!
„ cellulanum Thorell 1858, Westring 1862 = Nesticus cellulanus (Clerck) 1757
„ cheliferum Wider 1834 = Gonatium rubens (Blackwall) 1833
„ cinereum Emerton 1913 = Theridion cinerascens Roewer 1942
„ civicum Lucas 1850 = Dictyna civica (Lucas) 1850
„ coeliferum L. Koch 1867, 1872 = Teutana grossa (C. L. Koch) 1838
„ comatum Wider 1834 = Centromerita bicolor (Blackwall) 1833
„ concinnum Blackwall 1869 = Theridion aulicum C. L. Koch 1838
„ congener Cambridge 1863 = Dipoena melanogaster (C. L. Koch) 1837
„ coniferum Blackwall 1862 = Thwaitesia conifera (Blackwall) 1862
„ conspersum Simon 1894 = Theridion compressum (Keyserling) 1884
„ conspicuum Cambridge 1872 = Crustulina conspicua (Cambridge) 1872
„ convexum Blackwall 1870 = Dipoena convexa (Blackwall) 1870
„ convexum Keyserling 1889 = Theridion convexellum Roewer 1942
„ coracinum C. L. Koch 1837, 1841 = Dipoena coracina (C. L. Koch) 1837
„ cornutum Wider 1834 = Walckenaeria acuminata Blackwall 1833
„ cornutum Drenski 1917 = Theridion botezati Rosca 1935
„ cristatum Wider 1834 = Trematocephalus cristatus (Wider) 1834
„ cruciatum Giebel 1869 = Steatoda bipunctata (Linné) 1758

Theridion (Forts.):

„ crypticolens Walckenaer 1805 = Nesticus cellulanus (Clerck) 1757
„ cuneatum Thorell 1875 = Theridion varians Hahn 1831
„ delicatum Blackwall 1869 = Theridion aulicum C. L. Koch 1838
„ delicatum Cambridge 1904 = Theridion delicatellum Roewer 1942
„ dentatum Wider 1834 = Gnathonarium dentatum (Wider) 1834
„ denticulatum Walckenaer 1805 et sequ. = Theridion melanurum Hahn 1831
„ dentipalpe Wider 1834 = Erigone dentipalpis (Wider) 1834
„ dispar Dufour 1824 = Lithyphantes paykullianus (Walckenaer) 1805
„ dispar Sundevall 1831 = Lithyphantes albomaculatus (De Geer) 1778
„ distinctum Nicolet 1849 = Ceratinopsis distincta (Nicolet) 1849
„ diurnum Vinson 1863 = nicht zu deuten!
„ domesticum Holmberg 1876 = Teutana grossa (C. L. Koch) 1838
„ dorsiger Hahn 1831 = Theridion bimaculatum (Linné) 1767
„ dromedarium Simon 1880 = Theridion tuberculatum Kroneberg 1875
„ dromedarium Simon 1894 = Theridion dromedariforme Roewer 1942
„ dysderoides Wider 1834 = Wideria dysderoides (Wider) 1834
„ elegans Taczanowski 1873 = Theridion emendatum Roewer 1942
„ elegans Blackwall 1862 = Theridion aulicum C. L. Koch 1838
„ elegans Saito 1933 = Theridion elegantissimum Roewer 1942
„ elevatum Banks 1898 = Theridion texanum Banks 1910
„ elongatum Wider 1834 = Lophocarenum elongatum (Wider) 1834
„ erebeum Bertkau 1883, Bösenberg 1902 = Theridion simile C. L. Koch 1836
„ erigoniformis Cambridge 1872 = Asagenella erigoniformis (Cambridge) 1872
„ erythrocephalus Walckenaer 1841 = Macrargus rufus (Wider) 1834
„ erythropus Lucas 1846 = Crustulina erythropus (Lucas) 1846
„ exornatum Urquhart 1887 = Theridion cruciferum Urquhart 1885
„ facetum Cambridge 1894 = Theridula faceta (Cambridge) 1894
„ fallax Blackwall 1865 = Lithyphantes fallax (Cambridge) 1865
„ fasciatum Holmberg 1876 = Theridion studiosum Hentz 1850
„ fictilium Hentz 1850 = Rhomphaea fictilia (Hentz) 1850
„ filipes Blackwall 1836, 1864 = Stylophora concolor (Wider) 1834
„ flavoaurantiacum Simon 1880 = Theridion rufipes Lucas 1846
„ flavomaculatum Westring 1851, 1862, Ohlert 1867 = Euryopis flavomaculata (C. L. Koch) 1836
„ floridense Banks 1904 = Theridion lyricum Walckenaer 1841
„ foliaceum Hentz 1850 = Dictyna foliacea (Hentz) 1850
„ fordum Keyserling 1884 = Tidarren fordum (Keyserling) 1884
„ formosum Blackwall 1837 = Theridion vittatum C. L. Koch 1836
„ formosum Westring 1862, Thorell 1870, Chyzer & Kulczynski 1894 = Theridion lunatum (Olivier) 1789
„ formosum simulans Thorell 1875 = Theridion simulans (Thorell) 1875
„ foxi Mc Cook 1893 = Mimognatha foxi (Mc Cook) 1893
„ frivaldszkyi Herman 1879 = Theridion nigrovariegatum Simon 1873
„ fulvolunulatum Lucas 1846 = Teutana grossa (C. L. Koch) 1838
„ funebre Hentz 1850 = Euryopis funebris (Hentz) 1850
„ fuscum Franganillo 1930 = nicht zu deuten!
„ gemmosum L. Koch 1877 = Theridosoma gemmosum (L. Koch) 1877
„ gibbosa Urquhart 1893 = nicht zu deuten!
„ gibbum Cambridge 1873 = Pholcomma gibbum (Westring) 1851
„ glaucescens Becker 1879, Keyserling 1884 = Theridion blandum Hentz 1850
„ gonygaster Simon 1873 = Theridula opulenta (Walckenaer) 1841
„ grossum C. L. Koch 1838, Walckenaer 1841 = Teutana grossa (C. L. Koch) 1838
„ guriae Strand 1916 = Theridion fungosum Keyserling 1886
„ guttatum Wider 1834 = Crustulina guttata (Wider) 1834
„ haematostigma Blackwall 1864 = Euryopis haematostigma (Blackwall) 1864
„ hamatum Westring 1851, 1862 = Teutana grossa (C. L. Koch) 1838
„ hamatum Canestrini & Pavesi 1868 = Lithyphantes paykullianus (Walck.) 1805

Theridion (Forts.):

„ hasseltii Thorell 1875 = Theridion blackwallii Cambridge 1870
„ heloisii Walckenaer 1841 = Theridion varians Hahn 1831
„ helveolum Urquhart 1887 = Theridion cruciferum Urquhart 1885
„ henricae Six 1858 = Lepthyphantes henricae (Six) 1858
„ hirsutum Cambridge 1898 = Theridion hispidum Cambridge 1898
„ honorum Cambridge 1893 = Theridion varians Hahn 1831
„ humile L. Koch 1867 = Araneus humilis (L. Koch) 1867
„ hypophyllum Fitch 1869 = Dictyna sublata (Hentz) 1850
„ immundum Keyserling 1884 = Thymoites immundus (Keyserling) 1884
„ inornatum Cambridge 1861, Blackwall 1864 = Dipoena inornata (Cambridge) 1861
„ inornatum Banks 1899 = Theridion conjunctum Gertsch & Mulaik 1936
„ inscriptum Cambridge 1872 = Euryopis inscripta (Cambridge) 1872
„ irroratum C. L. Koch 1838 = Theridion tinctum (Walckenaer) 1802
„ krasnojarskense Strand 1903 = Theridion undulatum Westring 1862
„ laetum Westring 1862 = Euryopis laeta (Westring) 1862
„ lascivulva Simon 1894 = Dipoena lascivulva (Keyserling) 1886
„ latens Walckenaer 1841 = Dictyna latens (Fabricius) 1775
„ laticeps Keyserling 1884 = Ctenium (Robertus) laticeps (Keyserling) 1884
„ leonardi Thorell 1898 = Teutana leonardi (Thorell) 1898
„ leoninum Hentz 1850 = Ero furcata (Villers) 1789
„ lepidum Thorell 1875, Becker 1896 = Theridion bimaculatum (Linné) 1767
„ lepidum Simon 1881, Chyzer & Kulczynski 1894, Lessert 1910 = Theridion instabile Cambridge 1870
„ lepidum Cambridge 1885 = Theridion torandae Strand 1916
„ leuconotum Hahn 1831 = Theridion varians Hahn 1831
„ leucoplagiatum Simon 1879 = Mysmena leucoplagiata (Simon) 1879
„ levipes Nicolet 1849 = Theridion spinipes Nicolet 1849
„ lichenes Wider 1834 = nicht zu deuten!
„ liliputanum Keyserling 1884 = Theridion nicoleti Keyserling 1886
„ lineamentum Mc Cook 1879 = Latrodectus mactans (Fabricius) 1775
„ lineatum Walckenaer 1805, Westring 1862, Blackwall 1864 = Theridion redimitum (Clerck) 1757
„ lineatum Hentz 1850 = Latrodectus mactans (Fabricius) 1775
„ liotheum Bremi-Wolff 1849 = Theridion saxatile C. L. Koch 1834
„ longimanum Sundevall 1831 = Theridion tinctum (Walckenaer) 1802
„ literatum Urquhart 1890 = Theridion cruciferum Urquhart 1885
„ longipalpe Wider 1834 = Tiso vagans (Blackwall) 1834
„ longipes Hasselt 1882 = Theridion rufipes Lucas 1846
„ longipes Keyserling 1884 = Theridion longipedatum Roewer 1942
„ luctuosum Lucas 1846 = nicht zu deuten!
„ lugubris Dufour 1820 = Latrodectus tredecimguttatus (Rossi) 1790
„ lunatum Sundevall 1831 = Theridion tepidariorum (C. L. Koch) 1841
„ lundbecki Soerensen 1898, Jackson 1930 = Theridion umbraticum L. Koch 1872
„ luteipes Cambridge 1869 = Theridion rufipes Lucas 1846
„ luteolum Blackwall 1859 = Theridion rufipes Lucas 1846
„ lyra Hentz 1850 = Theridion lyricum Walckenaer 1841
„ maculatum Walckenaer 1805 = Lithyphantes albomaculatum (De Geer) 1778
„ maculatum Bösenberg & Lenz 1895 = Theridion maculiferum Roewer 1942
„ maculipes Bryant 1948 = Theridion elizabethae Roewer 1951
„ maculopes Urquhart 1886 = Theridion cruciferum Urquhart 1885
„ mandibulare Lucas 1846 = Enoplognatha mandibularis (Lucas) 1846
„ margaritatum L. Koch 1872 = Euryopis margaritata (L. Koch) 1867
„ margaritarium Rainbow 1894 = Conopistha (Argyrodina) margaritaria (Rainbow) 1894
„ marginellum Wider 1934 = Minicia marginella (Wider) 1834
„ marmoratum Hentz 1850 = Enoplognatha marmorata (Hentz) 1850

Theridion (Forts.):

„ marmoreum Holmberg 1876 = Theridion tepidariorum C. L. Koch 1841
„ marxi Keyserling 1884 = Theridion sexpunctatum Emerton 1882
„ maxillare Brullé 1832 = Agelena labyrinthica (Clerck) 1757
„ maxillare Emerton 1913 = Theridion maxillatum Roewer 1942
„ maxillosum Hahn 1826, 1834 = Pachygnatha clerckii Sundevall 1823
„ melanogaster Cambridge 1870 = Dipoena melanogaster (C. L. Koch) 1837
„ melanozantha Urquhart 1886 = Latrodectus hasselti Thorell 1870
„ meruensis Tullgren 1910 = Thwaitesia meruensis (Tullgren) 1910
„ miniaceum Doleschall 1857 = Conopistha (Argyrodina) miniacea (Doleschall) 1857
„ minimum Wider 1834, Walckenaer 1841 = Theridion pallens Blackwall 1834
„ minimum Westring 1862 = Theridion ohlerti Thorell 1870
„ minusculum Nicolet 1849 = Theridion attritum Nicolet 1849
„ mirabile Holmberg 1876 = Latrodectus mactans (Fabricius) 1775
„ mirabile Keyserling 1884 = Theridion fungosum Keyserling 1886
„ mixtum Cambridge 1896 = Tidarren mixtum (Cambridge) 1896
„ modestum Nicolet 1849 = Ceratinopsis modesta (Nicolet) 1849
„ monoceros Wider 1834 = Prosopotheca monoceros (Wider) 1834
„ morologum Hentz 1850 = Dictyna foliacea (Hentz) 1850
„ morulum Simon 1907 = Theridion eugeni Roewer 1942
„ multimaculatum Grube 1859 = Euryopis flavomaculata (C. L. Koch) 1836
„ mystaceum L. Koch 1870, Bösenberg 1902 = Theridion melanurum Hahn 1831
„ nebulosum Hahn 1831 = nicht zu deuten!
„ nervosum Walckenaer 1802, 1805, 1841, Hahn 1831, Ohlert 1867 = Theridion notatum (Linné) 1758, jetzt: Theridion sisyphium (Clerck) 1757
„ nicoluccii Canestrini 1868 = Teutana grossa (C. L. Koch) 1838
„ nigerpunctillum Urquhart 1888 = Theridion cruciferum Urquhart 1885
„ nigrofolium Urquhart 1887 = Theridion veruculatum Urquhart 1885
„ nigromarginatum Lucas 1846 = Enoplognatha nigromaculata (Lucas) 1846
„ nitidum Holmberg 1876 = Teutana grossa (C. L. Koch) 1838
„ notatum Walckenaer 1841 = Titanoeca quadriguttata (Hahn) 1831
„ obscurum Walckenaer 1805, Hahn 1831 = Titanoeca quadriguttata (Hahn) 1831
„ oleatum Thorell 1887 = Theridion tamerlani Roewer 1942
„ opulentum Walckenaer 1841 = Theridula opulenta (Walckenaer) 1841
„ ornatum Walckenaer 1841 = Theridion ornatulum Roewer 1942
„ ovatum Walckenaer 1805, Sundevall 1831, Simon 1914 = Theridion redimitum (Clerck) 1757
„ oxyurum Thorell 1890 = Theridion nigrum (Cambridge) 1880
„ pallidum Bösenberg & Lenz 1895 = Floronia frenata (Wider) 1834; jetzt: Floronia bucculenta (Clerck) 1757
„ pallidum Bösenberg & Lenz 1895 = Theridion pallidulum (Roewer) 1942
„ palustre Pavesi 1880 = Theridion tuberculatum Kroneberg 1875
„ parallelum Wider 1834 = Lophocarenum parallelum (Wider) 1834
„ particeps Cambridge 1872 = Euryopis particeps (Cambridge) 1872
„ parvipalpe Wider 1834 = Macrargus rufus (Wider) 1834
„ paykullianum Walckenaer 1805 = Lithyphantes paykullianus (Walckenaer) 1805
„ pectitum Sundevall 1831 = Dictyna pectita (Sundevall) 1831
„ pellucidum Simon 1873 = Theridion bimaculatum pellucidum (Simon) 1873
„ peregrinum Walckenaer 1841 = Nicodamus peregrinus (Walckenaer) 1841
„ perspicillatum Thorell 1898 = Teutana perspicillata (Thorell) 1898
„ persubtile L. Koch 1877 = Theridion pallens Blackwall 1834
„ petraeum Bertkau 1883 = Theridion bösenbergi Strand 1904
„ phaeopus Walckenaer 1847 = Ceratinella brevis (Wider) 1834
„ pictum Walckenaer 1805 et sequ. = Theridion ornatum Hahn 1831
„ piligerum Frauenfeld 1867 = nicht zu deuten!
„ placens Keyserling 1884, Emerton 1825 = Theridion placidum Roewer 1942

Theridion (Forts.):

„ placidum Bryant 1948 = Theridion bryantae Roewer 1951
„ priapeium Walckenaer 1841 = Gongylidium rufipes (Linné) 1758
„ projectum Cambridge 1862 = Pholcomma gibbum (Westring) 1851
„ pronum Cambridge 1873 = Dipoena prona (Menge) 1868
„ pulchellum Lucas 1838 = Teutana grossa (C. L. Koch) 1838
„ pulchellum Westring 1862, Blackwall 1864 = Theridion vittatum C. L. Koch 1836
„ pullulum Hentz 1850 = Psilochorus pullulus (Hentz) 1850
„ punctatum Walckenaer 1841 = nicht zu deuten!
„ puniceum Lucas 1846 = Teutana triangulosa (Walckenaer) 1802
„ pusillulum Urquhart 1889 = Dipoena nana (Cambridge) 1879
„ pusillum Wider 1834 = Minyriolus pusillus (Wider) 1834
„ pusillum Keyserling 1884 = Theridion pusillanum Roewer 1942
„ pusillum Kulczynski 1905 = Theridion pusillatum Roewer 1942
„ pygmaeum Sundevall 1831 = Singa pygmaea (Sundevall) 1831
„ IV-guttatum Hahn 1831, 1836 = Titanoeca quadriguttata (Hahn) 1831
„ quadripunctatum Walckenaer 1805 et sequ. = Steatoda bipunctata (Linné) 1758
„ quadripunctum Keyserling 1886 = Theridula opulenta (Walckenaer) 1841
„ quadrisignatum Hahn 1831 = Asagena phalerata (Panzer) 1801
„ quinqueguttata Keyserling 1886 = Theridula opulenta (Walckenaer) 1841
„ quinquenotata Blackwall 1865 = Teutana quinquenotata (Blackwall) 1865
„ reticulatum Hahn 1834 = Stemonyphantes lineatus (Linné) 1758
„ reticulatum C. L. Koch 1845 = Theridion bimaculatum (Linné) 1767
„ reticulatum Muma 1944 = Theridion mumae Roewer 1951 (recte: mumai)
„ rhombiferum Grube 1861 = Steatoda rhombifera (Grube) 1861
„ riparium Blackwall 1834 et sequ. = Theridion saxatile C. L. Koch 1834
„ roscidum Hentz 1850 = Dictyna roscida (Hentz) 1850
„ rotundum Cambridge 1898 = Theridion rotundatum Petrunkevitch 1911
„ rubicundum Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ rubicundum Petrunkevitch 1911 = Theridion rubicundulum Roewer 1942
„ rubripes Hahn 1831 = Micryphantes graminicola (Sundevall) 1830
„ rufipes Hahn 1831 = nicht zu deuten!
„ rufithorax Lucas 1846 = Pachygnatha degeerii Sundevall 1829
„ rufolineatum Lucas 1846 = Theridion aulicum C. L. Koch 1838
„ rufum Wider 1834 = Macrargus rufus (Wider) 1834
„ rusticum Simon 1873, 1881 = Theridion varians rusticum (Simon) 1873
„ sagax Blackwall 1865 = Teutana sagax (Blackwall) 1865
„ salvum Cambridge 1912 = Theridion simile C. L. Koch 1836
„ sanguinolentum Walckenaer 1841 = Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer) 1841
„ scriptum Cambridge 1872 = Euryopis scripta (Cambridge) 1872
„ semiflavum L. Koch 1865 = Nicodamus semiflavus (L. Koch) 1865
„ sericum Urquhart 1885, 1889 = Theridion tepidariorum C. L. Koch 1841
„ serpentinum Hentz 1850 = Teutana triangulosa (Walckenaer) 1802
„ serratipes Westring 1862 = Asagena phalerata (Panzer) 1901
„ serratosignatum L. Koch 1879 = Enoplognatha serratosignata (L. Koch) 1879
„ setiger Urquhart 1885 = Dipoena blattea (Urquhart) 1885
„ setigerum Thorell 1898 = Theridion setiferum Roewer 1942
„ sexalbomaculatum Lucas 1846 = Euryopis sexalbomaculata (Lucas) 1846
„ signatum Walckenaer 1805 = Asagena phalerata (Panzer) 1801
„ signatum Hahn 1834 = Linyphia pusilla Sundevall 1830
„ signatum Simon 1894 = Theridion signatellum Roewer 1942
„ sisyphium Sundevall 1831, C. L. Koch 1841, Westring 1862, Thorell 1870, 1875 = Theridion notatum (Linné) 1758, jetzt: Theridion sisyphium (Clerck) 1757
„ sisyphium Sordelli 1868, Canestrini & Pavesi 1868, 1870, Pavesi 1873, 1875, Lebert 1877, Calloni 1889 = nicht zu deuten!

Theridion (Forts.):

„ sisyphium Thorell 1870 = Theridion notatum (Linné) 1758, jetzt: Theridion sisyphium (Clerck) 1757
„ sisyphium Simon 1881 = Theridion impressum L. Koch 1881
„ sisyphoides Waldkenaer 1841 = Theridion tepidariorum C. L. Koch 1841
„ sisyphum Waldkenaer 1805, Hahn 1836, Blackwall 1864 = Theridion lunatum (Clerck) 1757
„ sordidum Holmberg 1876 = Theridion studiosum Hentz 1850
„ speciosum Thorell 1898 = Teutana speciosa (Thorell) 1898
„ sphaerula Hentz 1850, Keyserling 1886 = Theridula opulenta (Waldkenaer) 1841
„ spirifer Cambridge 1863 = Theridion aulicum C. L. Koch 1838
„ splendidum Taczanowski 1874 = Theridiosoma splendidum (Taczanowski) 1874
„ splendidum Cambridge 1902 = Theridion splendens Roewer 1942
„ stictum Cambridge 1861 = Crustulina sticta (Cambridge) 1861
„ sublatum Hentz 1850 = Dictyna sublata (Hentz) 1850
„ sulcifrons Wider 1834 = Panamomops sulcifrons (Wider) 1834
„ sundaicum Doleschall 1859 = Conopistha (Argyrodina) sundaica (Doleschall) 1859
„ tepidariorum simulans Wiehle 1937 = Theridion simulans (Thorell) 1875
„ tepidatorium Keyserling 1884 = Theridion tepidariorum C. L. Koch 1841
„ terrestre Wider 1834 = nicht zu deuten!
„ terrestre Emerton 1924 = Theridion terrestrellum Roewer 1942
„ tesselatum Thorell 1899 = Theridion tesserulatum Roewer 1942
„ thoracicum Hahn 1831 = Enoplognatha thoracica (Hahn) 1831
„ thoracicum Wider 1834, L. Koch 1876 = Ero furcata (Villers) 1789
„ thorelli Petrunkevitch 1911 = Theridion adjacens Cambridge 1896
„ tibiale Hahn 1831 = nicht zu deuten!
„ transversum Cambridge 1898 = Theridion transgressum Petrunkevitch 1911
„ tredecimguttatus Latreille 1806 = Latrodectus tredecimguttatus (Rossi) 1790
„ triangulare Franganillo 1936 = nicht zu deuten!
„ triangularis Keyserling 1886 = Theridula opulenta (Waldkenaer) 1841
„ triangulifer Waldkenaer 1805 = Teutana triangulosa (Waldkenaer) 1802
„ tricornis Cambridge 1896 = Theridula opulenta (Waldkenaer) 1841
„ trigonum Hentz 1850 = Conopistha (Argyrodina) trigonum (Hentz) 1850
„ triloris Urquhart 1885 = Lithyphantes lepidus Cambridge 1879
„ triste Hahn 1831, Ohlert 1867 = Dipoena tristis (Hahn) 1831
„ triste Waldkenaer 1841 = Lithyphantes paykullianus (Waldkenaer) 1805
„ troglodytes Higgins & Petterd 1883 = Ectatosticta troglodytes (Higgins & Petterd) 1883
„ truncatum Urquhart 1887 = Lithyphantes lepidus Cambridge 1879
„ tubercula Urquhart 1886 = Dipoena blattea (Urquhart) 1885
„ undulatum Bösenberg 1902 = Theridion melanurum Hahn 1831
„ undulatum Berland 1938 = Theridion undulanotum Roewer 1942
„ urticae Waldkenaer 1841 = Theridion lunatum (Clerck) 1757
„ variatum Waldkenaer 1841 = nicht zu deuten!
„ variegatum Brullé 1832, Waldkenaer 1841, Blackwall 1864 = Ero furcata (Villers) 1789
„ varium Urquhart 1885 = Theridion tepidariorum C. L. Koch 1841
„ venosum Risso 1826 = nicht zu deuten!
„ ventillans Keyserling 1884 = Theridula opulenta (Waldkenaer) 1841
„ venustissimum C. L. Koch 1838 = Teutana triangulosa (Waldkenaer) 1802
„ venustulum Urquhart 1886 = Theridion flabelliferum Urquhart 1886
„ venustum Waldkenaer 1841 = Theridion redimitum (Clerck) 1757
„ verecundum Hentz 1850 = Latrodectus mactans (Fabricius) 1775
„ vernale Hahn 1834 = Pachygnatha degeerii Sundevall 1829
„ versutum Blackwall 1846 = Teutana grossa (C. L. Koch) 1838
„ vicinum Lucas 1846 = Enoplognatha mandibularis (Lucas) 1846

Theridion (Forts.):
„ viride Wider 1834 = Dictyna flavescens (Walckenaer) 1825
„ viride Nicolet 1849 = Theridion viridulum Roewer 1942
„ vittatum Nicolet 1849, Petrunkevitch 1911 = Theridion gayi Roewer 1942
„ vittatum F. Cambridge 1902 = Theridion cambridgei Petrunkevitch 1911
„ vulgare Hentz 1850 = Theridion tepidariorum C. L. Koch 1841
„ weyenberghii Holmberg 1876 = Ceratinopsis modesta (Nicolet) 1849
„ zebrina Urquhart 1886 = Latrodectus hasselti Thorell 1870
„ zickzack Karsch 1878 = Latrodectus geometricus C. L. Koch 1841

Theridionexus:
„ cavernicolus Petrunkevitch 1910 = Nesticus cavernicolus (Petrunkevitch) 1910

Theridiosoma:
„ argenteolum Cambridge 1879, 1881 = Theridiosoma gemmosum (L. Koch) 1877
„ radiosa Keyserling 1893, Mc Cook 1893, Comstock 1912 = Theridiosoma gemmosum (L. Koch) 1877

Theridium siehe **Theridion**

Theridula:
„ nigrovittata F. Cambridge 1902 = Theridula opulenta (Walckenaer) 1841
„ sphaerula Emerton 1882, 1902 = Theridula opulenta (Walckenaer) 1841

Therimachus:
„ robustus Thorell 1895 = Dendrolycosa robusta (Thorell) 1895

Theringia:
„ typica Mello-Leitao 1927 = Iheringia typica (Mello-Leitao) 1927

Therosa:
„ magniceps Keyserling 1882, Peckham 1886 = Saitis magniceps (Keyserling) 1882

Thiania:
„ albocincta Thorell 1877 = Cosmophasis viridifasciata (Doleschall) 1859
„ aurantia Simon 1864 = Dendryphantes aurantius (Lucas) 1833
„ suavis Simon 1885 = Telamonia suavis (Simon) 1885
„ sumptuosa C. L. Koch 1846 = Psecas sumptuosa (Perty) 1833
„ thalassina Simon 1864 = Cosmophasis thalassina (C. L. Koch) 1846
„ vittata Simon 1864 = Telamonia vittata (C. L. Koch) 1846

Thiene:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Thyene**

Thiodina:
„ iniquies Chamberlin & Ivie 1944 = Thiodina sylvana (Hentz) 1846
„ irrorata Chamberlin & Ivie 1944 = Thiodina puerpera (Hentz) 1846
„ elegans Simon 1901 = Thiodina nicoleti Roewer 1951
„ puerpera Simon 1901 = Thiodina sylvana (Hentz) 1846
„ retaria Banks 1909 = Thiodina sylvana (Hentz) 1846
„ retiaria Banks 1904 = Thiodina sylvana (Hentz) 1846

Thiratoscyrtus:
„ versicolor Simon 1902 = Thiratoscirtus versicolor (Simon) 1902

Thlaosoma:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Celaenia**

Tholia:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Dolophones**

Thomisoides:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Sicarius**

Thomisops:
„ pusio Karsch 1879, Simon 1895 = Thomisops pupa Karsch 1879

Thomisus (= Thomisa):
„ abbreviatus Walckenaer 1820, 1837, Blackwall 1861 = Thomisus onustus Walckenaer 1805
„ albimanus Simon 1870 = Xysticus bufo (Dufour) 1820
„ albinus Cantor 1842 = nicht zu deuten!

Thomisus (Forts.):

„ albus Chyzer & Kulczynski 1891 et sequ. = Thomisus onustus Walckenaer 1805
„ aleatorius Hentz 1847 = Misumenoides aleatorius (Hentz) 1847
„ amboinensis Doleschall 1857 = nicht zu deuten!
„ amoenus Blackwall 1870 = Runcinia cerina (C. L. Koch) 1845
„ angulatus Walckenaer 1837 = Tmarus angulatus (Walckenaer) 1837
„ angulatus Lucas 1858 = Thomisus angulatulus Roewer 1951
„ annulipes Lucas 1846 = Ozyptila annulipes (Lucas) 1846
„ arciger Grube 1861 = Misumena arcigera (Grube) 1861
„ asper Lucas 1838, C. Koch 1872, Bösenberg 1895 = Xysticus asper (Lucas) 1838
„ asperatus Hentz 1847 = Misumenops asperatus (Hentz) 1847
„ atomarius Walckenaer 1825, 1837 = Ozyptila atomaria (Panzer) 1801
„ atomarius Blackwall 1861 = Tmarus piger (Walckenaer) 1802
„ audax Blackwall 1861, Westring 1862 ♀ = Xysticus audax (Schrank) 1803
„ audax Westring 1862 ♂ = Xysticus luctuosus (Blackwall) 1836
„ aureolus Walckenaer 1805, Sundevall 1832, Hahn 1834 = Philodromus aureolus (Clerck) 1757
„ auriculatus Prach 1866 = Thomisus onustus Walckenaer 1805
„ bicoloratus Cantor 1842 = nicht zu deuten!
„ bifasciatus Blackwall 1843, 1861, Westring 1862 = Xysticus bifasciatus C. L. Koch 1837
„ bilineatus Walckenaer 1805, 1837 = Tmarus piger (Walckenaer) 1802
„ bivittatus Westring 1862 = Xysticus ulmi (Hahn) 1831
„ bragantinus Brito Capello 1866 = Firmicus bragantinus (Brito Capello) 1866
„ brevipes Hahn 1825, 1831, Walckenaer 1837, Blackwall 1861 = Ozyptila brevipes (Hahn) 1825
„ brevipes Westring 1851, 1862 ♂ = Ozyptila trux (Blackwall) 1846
„ brevipes Westring 1851, 1862 ♀ = Ozyptila praticola (C. L. Koch) 1837
„ brevipes Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ brevitarsis Simon 1870 = Xysticus robustus (Hahn) 1831
„ buffonii Audouin 1827, C. Koch 1873 = Heriaeus buffonii (Audouin) 1827
„ bufo Dufour 1820, Walckenaer 1837 = Xysticus bufo (Dufour) 1820
„ bufo Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ calcaratus Westring 1862 = Xysticus sabulosus (Hahn) 1831
„ calycinus Walckenaer 1805 et sequ. = Misumena calycina (Linné) 1758, jetzt: Misumena vatia (Clerck) 1757
„ cambridgii Blackwall 1859, 1861, Cambridge 1870 = Xysticus cambridgii (Blackwall) 1859
„ capparinus C. L. Koch 1845 = Diaea dorsata (Fabricius) 1781
„ castaneus Latreille 1819 = Damastes castaneus (Latreille) 1819
„ caudatus Hentz 1847 = Tmarus angulatus (Walckenaer) 1837
„ celer Hentz 1847 = Misumenops celer (Hentz) 1847
„ cerinus C. L. Koch 1845 = Runcinia cerina (C. L. Koch) 1845
„ chubbi Lessert 1919 = Thomisus malevolus Cambridge 1907
„ cinerascens Doleschall 1859 = Borboropactus cinerascens (Doleschall) 1859
„ cinereus C. L. Koch 1837, Westring 1862 = Xysticus audax (Schrank) 1803
„ cinereus Nicolet 1849 = Misumenoides nicoleti Roewer 1951
„ cinereus Blackwall 1861 = Xysticus sabulosus (Hahn) 1831
„ citreoides Taczanowski 1872 = Misumena citreoides (Taczanowski) 1872
„ citreus Walckenaer 1805 et sequ. = Misumena calycina (Linné) 1758, jetzt: Misumena vatia (Clerck) 1757
„ citreus georgiensis Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ claveatus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ claveatus Lucas 1846 = Ozyptila audouini Roewer 1951
„ claveatus Blackwall 1861 = Ozyptila blackwalli Simon 1875
„ claviger Cambridge 1872 = Ozyptila claviger (Cambridge) 1872
„ clerckii Audouin 1827 = Xysticus clerckii (Audouin) 1827

Thomisus (Forts.):
- „ comptulus Lebert 1877 = nicht zu deuten!
- „ conspergatus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ cordiformis Risso 1826 = nicht zu deuten!
- „ cornutus Taczanowski 1872 = Tobias cornutus (Taczanowski) 1872
- „ coronatus Grube 1861 = Xysticus coronatus (Grube) 1861
- „ cristatus Sundevall 1832, Blackwall 1861, Westring 1862, Lebert 1877 = Xysticus viaticus (Linné) 1758, jetzt: Xysticus cristatus (Clerck) 1757
- „ cristatus Giebel 1869 = nicht zu deuten!
- „ cruentatus Walckenaer 1837 = Misumenops cruentatus (Walckenaer) 1837
- „ cuneatus Walckenaer 1841 = Tmarus piger (Walckenaer) 1802
- „ dauci Walckenaer 1805, Hahn 1820, 1831 = Misumena calycina (Linné) 1758, jetzt: Misumena vatia (Clerck) 1757
- „ dauensis Strand 1907 = ? Thomisus albohirtus Simon 1884
- „ decipiens Forbes 1883, Jacobson 1921 = Phrynarachne decipiens (Forbes) 1883
- „ deformis Simon 1864 = nicht zu deuten!
- „ delicatulus Walckenaer 1805 = Misumenops tricuspidata (Fabricius) 1775
- „ delphinus Walckenaer 1837 = ? Misumenops celer (Hentz) 1847
- „ deplanatus Westring 1851 = Coriarachne depressa (C. L. Koch) 1837
- „ depressus C. L. Koch 1837, Westring 1862 = Coriarachne depressa (C. L. Koch) 1837
- „ depressus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ desidiosus Walckenaer 1837 = Misumenops desidiosus (Walckenaer) 1837
- „ devius C. L. Koch 1845 = Misumena calycina (Linné) 1758, jetzt: Misumena vatia (Clerck) 1757
- „ diadema Hahn 1831, 1836, C. L. Koch 1838 = Thomisus onustus Walckenaer 1805
- „ diana Walckenaer 1805, 1837, Hahn 1831, 1833, Ohlert 1867 = Misumenops tricuspidata (Fabricius) 1775
- „ diana Audouin 1827 = Synema audouini Roewer 1951
- „ dilatatus Doleschall 1859 = nicht zu deuten!
- „ dissimilis Doleschall 1859 = Phrynarachne dissimilis (Doleschall) 1859
- „ ditissimus Nicolet 1849 = Stephanopis ditissima (Nicolet) 1849
- „ diversus Blackwall 1870 = Xysticus diversus (Blackwall) 1870
- „ dorsatus Hahn 1831, 1833 et sequ. = Diaea dorsata (Fabricius) 1781
- „ dubius Hentz 1847 = Thanatidius dubius (Hentz) 1847
- „ duttoni Hentz 1847 = Tibellus duttoni (Hentz) 1847
- „ echinatus Taczanowski 1872 = Onocolus echinatus (Taczanowski) 1872
- „ edax Cambridge 1872 = Xysticus edax (Cambridge) 1872
- „ edwardsii Nicolet 1849 = Coenypha edwardsii (Nicolet) 1849
- „ elegans Blackwall 1869 = Ozyptila elegans (Blackwall) 1869
- „ elongatus Stoliczka 1869 = Runcinia elongata (Stoliczka) 1869
- „ episcopalis Taczanowski 1872 = Platyarachne episcopalis (Taczanowski) 1872
- „ erraticus Blackwall 1834, 1861 = Xysticus erraticus (Blackwall) 1834
- „ exaratus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ exiguus Nicolet 1849 = Stephanopis exigua (Nicolet) 1849
- „ exiguus Blackwall 1869 = Ozyptila elegans (Blackwall) 1869
- „ farinarius Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ fartus Hentz 1847 = Misumena calycina (Linné) 1758, jetzt: Misumena vatia (Clerck) 1757
- „ ferox Hentz 1847 = Xysticus ferox (Hentz) 1847
- „ flavescens Walckenaer 1837 = ? Misumenoides aleatorius (Hentz) 1847
- „ flavipes Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ floricolens Walckenaer 1805 et sequ. = Diaea dorsata (Fabricius) 1781
- „ foederatus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ foka Vinson 1863 = Phrynarachne rugosa (Latreille) 1804
- „ formosipes Walckenaer 1837 = ? Misumenoides aleatorius (Hentz) 1847
- „ formosus Blackwall 1850, 1861 = Diaea formosa (Blackwall) 1850

Thomisus (Forts.):

„ frontionotatus Strand 1907 = ? Thomisus daradioides Simon 1890
„ fucatus Waldkenaer 1837, Simon 1918 = nicht zu deuten!
„ fuliginosus Nicolet 1849 = Coenypha fuliginosa (Nicolet) 1849
„ fumosa Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ fuscatus Waldkenaer 1837 = ? Misumenops celer (Hentz) 1847
„ fuscus Grube 1861 = Ozyptila fusca (Grube) 1861
„ gibbosus Blackwall 1862 = Misumenops gibbosus (Blackwall) 1862
„ globosus Hahn 1831, 1833 = Synema globosum (Fabricius) 1775
„ gloveri Blackwall 1868 = Xysticus sabulosus (Hahn) 1831
„ graciosus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ graecus Doleschall 1852 = Xysticus graecus C. L. Koch 1838
„ graminicola Doleschall 1852 = Heriaeus hirtus (Latreille) 1819
„ griseus Hahn 1826, 1831 = Philodromus emarginatus (Schrank) 1803
„ guianensis Taczanowski 1872 = Misumenops guianensis (Taczanowski) 1872
„ hermanii Hahn 1833 = Misumenops tricuspidata (Fabricius) 1775
„ heterogaster Guérin 1829 = Epicadus heterogaster (Guérin) 1829
„ hirsutus Waldkenaer 1825, C. L. Koch 1837, Kulczynski 1903 = Heriaeus hirtus (Latreille) 1819
„ hirtus Latreille 1819 = Heriaeus hirtus (Latreille) 1819
„ hirtus Audouin 1827 = Ozyptila audouini Roewer 1951
„ hirtus C. L. Koch 1838 = Heriaeus orientalis Simon 1918
„ histrio Latreille 1819 = Philodromus histrio (Latreille) 1819
„ horridus C. L. Koch 1838, Prach 1866, Ohlert 1867 = Pistius truncatus (Pallas) 1772
„ horticola Westring 1862 = Ozyptila atomaria (Panzer) 1801
„ hystrix Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ hystrix Lawrence 1949 = Thomisus lawrencei Roewer 1951
„ incertus Blackwall 1846, 1861 = Ozyptila praticola (C. L. Koch) 1837
„ indiligens Waldkenaer 1837 = Xysticus indiligens (Waldkenaer) 1837
„ iners Waldkenaer 1837 = Misumenops iners (Waldkenaer) 1837
„ infumatus Waldkenaer 1837 = Ozyptila floridana (Banks) 1895
„ insularis Blackwall 1877 = Synema insulare (Blackwall) 1877
„ javanus Simon 1899 = Thomisus callidus (Thorell) 1890
„ jucundus Simon 1873 = Xysticus viaticus (Linné) 1758, jetzt: Xysticus cristatus (Clerck) 1757
„ kochii Lebert 1877 = Xysticus kochii Thorell 1872
„ laevipes Hahn 1826 = Philodromus laevipes (Linné) 1758, jetzt: Philodromus margaritatus (Clerck) 1757
„ laevipes Hahn 1831 = Philodromus poecilus (Thorell) 1872
„ lalandii Audouin 1827 = Xysticus lalandii (Audouin) 1827
„ lamarcki Latreille 1806 = Olios lamarcki (Latreille) 1806
„ lanio Doleschall 1852 = Xysticus lanio C. L. Koch 1845
„ lanio Westring 1862 = Xysticus cambridgii (Blackwall) 1859
„ lanio Lebert 1877 = nicht zu deuten!
„ lateralis Hahn 1831 = Xysticus audax (Schrank) 1803
„ lateralis C. L. Koch 1838, Cambridge 1876 = Runcinia cerina (C. L. Koch) 1845
„ lemniscatus Waldkenaer 1837 = ? Xysticus auctificus Keyserling 1880
„ lentus Waldkenaer 1837 part. = ? Coriarachne versicolor Keyserling 1880
„ lentus Waldkenaer 1837 part. = ? Xysticus ferox (Hentz) 1847
„ leucosius Waldkenaer 1805 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ liliputianus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
„ limbatus Hahn 1833 = Philodromus dispar Waldkenaer 1825
„ lineatus Westring 1851, 1862 = Xysticus lineatus (Westring) 1851
„ lucasii Nicolet 1849 = Coenypha lucasii (Nicolet) 1849
„ luctans C. L. Koch 1845 = Xysticus luctans (C. L. Koch) 1845
„ luctuosus Blackwall 1836, 1861 = Xysticus luctiosus (Blackwall) 1836
„ luteolus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!

Thomisus (Forts.):
- „ lyncheus Latreille 1806 = Tmarus piger (Walckenaer) 1802
- „ macrophthalma Simon 1864 = nicht zu deuten!
- „ malacostracea Walckenaer 1805, 1837 = Stephanopis malacostracea (Walckenaer) 1805
- „ marcidus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ marginatus Walckenaer 1837 (p. 503) = nicht zu deuten!
- „ marginatus Walckenaer 1837 (p. 512) = Philodromus emarginatus (Schrank) 1803
- „ martyni Audouin 1827 = Pistius truncatus (Pallas) 1772
- „ maugi Walckenaer 1837 = Camaricus maugi (Walckenaer) 1837
- „ morbillosus Mac Leay 1827, 1839 = Olios morbillosus (Mac Leay) 1827
- „ musculum Karsch 1880 = nicht zu deuten!
- „ nigripes Taczanowski 1872 = Misumena nigripes (Taczanowski) 1872
- „ nigrotrivittatus Simon 1870 = Xysticus nigrotrivittatus (Simon) 1870
- „ nobilis C. L. Koch 1837 = Thomisus onustus Walckenaer 1805
- „ nodosus Nicolet 1849 = Stephanopis nodosa (Nicolet) 1849
- „ numidus Lucas 1846 = Ozyptila numida (Lucas) 1846
- „ oblongus Walckenaer 1805, Hahn 1831, 1836 = Tibellus oblongus (Walckenaer) 1802
- „ obscurus Hahn 1831 = Xysticus robustus (Hahn) 1831
- „ octomaculatus C. L. Koch 1845 = Platythomisus octomaculatus (C. L. Koch) 1845
- „ onustus Simon 1880 = Thomisus onustoides Bösenberg & Strand 1906
- „ opportunus Cambridge 1873 = Talaus opportunus (Cambridge) 1873
- „ pallens Blackwall 1868 = nicht zu deuten!
- „ pallidus Blackwall 1846, 1861, Cambridge 1870 = Ozyptila atomaria (Panzer) 1801
- „ paradoxus Simon 1866 = Monaeses paradoxus (Lucas) 1846
- „ pardus Walckenaer 1837 = ? Misumenoides aleatorius (Hentz) 1847
- „ parvulus Hentz 1847 = Synema parvulum (Hentz) 1847
- „ pauxillus Simon 1870 = Ozyptila pauxilla (Simon) 1870
- „ peelianus Stoliczka 1869 = Phrynarachne peeliana (Stoliczka) 1869
- „ peronii Audouin 1827 = Thomisus onustus Walckenaer 1805
- „ phantasma Holmberg 1876 = nicht zu deuten!
- „ phrygiatus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ pictus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ piger Walckenaer 1837 = Tmarus piger (Walckenaer) 1802
- „ piger Hentz 1847, Petrunkevitch 1911 = nicht zu deuten!
- „ piger Blackwall 1865 = Xysticus blackwalli Roewer 1951
- „ pigrus Walckenaer 1805 = Tmarus piger (Walckenaer) 1802
- „ pilosus Risso 1826 = Heriaeus hirtus (Latreille) 1819
- „ pilosus Walckenaer 1837, Simon 1870 = Xysticus cribratus Simon 1885
- „ pini Hahn 1831 = Xysticus audax (Schrank) 1803
- „ pinnotheres Walckenaer 1805 = Palystes pinnotheres (Walckenaer) 1805
- „ piochardi Simon 1866, 1875 = Tmarus piochardi (Simon) 1866
- „ plagusius Walckenaer 1805 = Hemicloea plagusia (Walckenaer) 1805
- „ plorator Cambridge 1872 = Synema plorator (Cambridge) 1872
- „ praetextus L. Koch 1865 = Diaea praetexta (L. Koch) 1865
- „ pratensis Hahn 1831, 1833 = Misumena calycina (Linné) 1758, jetzt: Misumena vatia (Clerck) 1757
- „ prosper Cambridge 1873 = nicht zu deuten!
- „ pubescens Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ purpuratus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ quadrilineatus Hahn 1833 = Misumena calycina (Linné) 1758, jetzt: Misumena vatia (Clerck) 1757
- „ quinquetuberculatus Taczanowski 1872 = Stephanopis quinquetuberculata (Taczanowski) 1872
- „ rectilineus Cambridge 1872 = Xysticus rectilineus (Cambridge) 1872

Thomisus (Forts.):
- „ rhombiferens Walckenaer 1825, 1837 = Thanatus formicinus (Clerck) 1757
- „ rhomboicus Walckenaer 1805, Hahn 1831, 1836 = Thanatus formicinus (Clerck) 1757
- „ rigidus Cambridge 1872 = Ozyptila rigida (Cambridge) 1872
- „ robustus Hahn 1831, 1836 = Xysticus robustus (Hahn) 1831
- „ rotundatus Walckenaer 1805, 1825, 1837, Audouin 1827 = Synema globosum (Fabricius) 1775
- „ rufopictus Cambridge 1872 = Xysticus sabulosus (Hahn) 1831
- „ rugatus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ rugosus Latreille 1804, Walckenaer 1837 = Phrynarachne rugosa (Latreille) 1804
- „ rugosus Taczanowski 1872 = Tobias taczanowskii Roewer 1951
- „ sabulosus Hahn 1831 et sequ. = Xysticus sabulosus (Hahn) 1831
- „ sanctuarius Cambridge 1870 = Ozyptila sanctuaria (Cambridge) 1870
- „ sanguinolentus Walckenaer 1841 = Thomisus onustus Walckenaer 1805
- „ scabriculus Westring 1851, 1862 = Ozyptila scabricula (Westring) 1851
- „ scorpiformis Hahn 1833 = Misumena calycina (Linné) 1758, jetzt: Misumena vatia (Clerck) 1757
- „ secatus Walckenaer 1805, 1837 = Stephanopis secata (Walckenaer) 1805
- „ setiger Cambridge 1872 = Heriaeus setiger (Cambridge) 1872
- „ setosus Westring 1851, 1862 = Xysticus sabulosus (Hahn) 1831
- „ sexpunctatus Taczanowski 1872 = Onocolus echinatus (Taczanowski) 1872
- „ similis Wider 1834 = Ozyptila atomaria (Panzer) 1801
- „ simplex Cambridge 1872, 1873 = Ozyptila simplex (Cambridge) 1872
- „ spectrum Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ sphericus Walckenaer 1837 = Xysticus sphericus (Walckenaer) 1837
- „ sphinx Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ spinifer Blackwall 1862 = Misumena spinifera (Blackwall) 1862
- „ spinifer Cambridge 1872, 1876, Simon 1931, Lessert 1936, Millot 1941, Caporiacco 1941 = Thomisus citrinellus Simon 1875
- „ spinipes Brullé 1832 = Misumena calycina (Linné) 1758, jetzt: Misumena vatia (Clerck) 1757
- „ spissus Nicolet 1849 = Stephanopis spissa (Nicolet) 1849
- „ stellifer Doleschall 1859 = Camaricus maugi (Walckenaer) 1837
- „ stelloides Walckenaer 1837 = Stephanopis stelloides (Walckenaer) 1837
- „ stigmatisatus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ striatus Lebert 1877 = nicht zu deuten!
- „ sulcatus Nicolet 1849 = nicht zu deuten!
- „ tenuis Hentz 1847 = Thanatidius tenuis (Hentz) 1847
- „ terrosa Simon 1864 = nicht zu deuten!
- „ transversatus Walckenaer 1837 = ? Xysticus ferox (Hentz) 1847
- „ trematus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ triangularis Risso 1826 = Pistius truncatus (Pallas) 1772
- „ tricuspidatus Walckenaer 1805 = Misumenops tricuspidata (Fabricius) 1775
- „ trispinosus Taczanowski 1872 = Epicadinus trispinosus (Taczanowski) 1872
- „ tristrami Cambridge 1872 = Xysticus tristrami (Cambridge) 1872
- „ trituberculatus Taczanowski 1872 = Tobias trituberculatus (Taczanowski) 1872
- „ truncatus Hahn 1830 et sequ. = Pistius truncatus (Pallas) 1772
- „ trux Blackwall 1846, 1861 = Ozyptila trux (Blackwall) 1846
- „ tuberosus Blackwall 1864 = Phrynarachne tuberosa (Blackwall) 1864
- „ tuberosulus Karsch 1880 = Phrynarachne tuberosula (Karsch) 1880
- „ tumefactus Walckenaer 1837 = ? Xysticus funestus Keyserling 1880
- „ turgidus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
- „ ulmi Hahn 1831 = Xysticus ulmi (Hahn) 1831
- „ ulmi Westring 1862 ♂, part., Thorell 1872, Menge 1876 ? = Xysticus erraticus (Blackwall) 1834
- „ ulmi Simon 1875 part. = Xysticus tortuosus Simon 1932

Thomisus (Forts.):
„ umbratilis Blackwall 1852 = nicht zu deuten!
„ variabilis Nicolet 1849 = ? Synema parvulum (Hentz) 1847
„ varians Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ varius Cambridge 1872 = Xysticus varius (Cambridge) 1872
„ vastus Bösenberg & Lenz 1895 = Thomisops pupa Karsch 1879
„ vatius Thorell 1856, Westring 1862 = Misumena calycina (Linné) 1758
„ venatorius Latreille 1806 = Heteropoda venatoria (Linné) 1767
„ verrucosus Nicolet 1849 = Stephanopis verrucosa (Nicolet) 1849
„ versutus Blackwall 1853, 1861 = Ozyptila atomaria (Panzer) 1801
„ viaticus Hahn 1831 = Xysticus viaticus (Linné) 1758, jetzt: Xysticus cristatus (Clerck) 1757
„ viaticus Cambridge 1873 = Xysticus kochii Thorell 1872
„ villosus Walckenaer 1837 = Heriaeus hirtus (Latreille) 1819
„ villosus Lucas 1846 = Heriaeus buffonii (Audouin) 1827
„ violaceus Walckenaer 1837 = nicht zu deuten!
„ viridis Walckenaer 1837 = Misumena calycina (Linné) 1758, jetzt: Misumena vatia (Clerck) 1757
„ vulcanicus Doleschall 1859 = Borboropactus vulcanicus (Doleschall) 1859
„ vulgaris Hentz 1847 = Philodromus pernix Blackwall 1846
„ wagae Simon 1870 = Pistius truncatus (Pallas) 1772
„ westwoodii Cambridge 1870 = Xysticus ulmi (Hahn) 1831
„ yolophus Doumerc 1864 = Thomisus tripunctatus Lucas 1858

Thore:
„ decorata C. L. Koch 1850 = Freya decorata (C. L. Koch) 1846
„ trifasciata C. L. Koch 1850 = Freya decorata (C. L. Koch) 1845

Thorellia:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Thorelliola**
„ bitaeniata Keyserling 1882 = Saitis bitaeniata (Keyserling) 1882
„ nigriceps Keyserling 1882 = Saitis nigriceps (Keyserling) 1882

Thotmes:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Plexippus**
„ bicolor F. Cambridge 1901 = Menemerus bicolor Peckham 1896

Thrigmopoeus:
„ minor Strand 1907 = ? Thrigmopoeus truculentus Pocock 1899

Thwaitesia:
„ diversa Cambridge 1882 = Achaea trapezoidalis (Taczanowski) 1873
„ lepida Cambridge 1896 = Theridion cambridgei Petrunkevitch 1911
„ vittata Cambridge 1896 = Theridion cambridgei Petrunkevitch 1911

Thya:
„ imperialis Simon 1876, Thorell 1892 = Thyene imperialis (Rossi) 1846

Thyene:
„ bucculifera Strand 1909 = ? Thyene bucculenta (Gerstäcker) 1873
„ crudelis Peckham 1903, Lessert 1925 = Thyene coccineovittata crudelis (Peckham) 1903
„ leighii Peckham 1903 = Thyene ogdenii leighii (Peckham) 1903
„ ogdenii Peckham 1903 ♀, Lessert 1925 = Thyene coccineovittata crudelis (Peckham) 1903
„ semicuprea Simon 1885 = Sandalodes semicupreus (Simon) 1885
„ squamulata Simon 1885, Strand 1904 = Thyene inflata (Gerstäcker) 1873
„ squamuloides Strand 1909 = ? Thyene inflata (Gerstäcker) 1873

Thymoites:
„ bituberculatus Keyserling 1884 = Thymoites bigibbosus Roewer **nom. nov.**

Thyreobaeus:
„ laticeps Crosby 1905 = Ceraticelus laticeps (Emerton) 1894

Thyreosthenius:
„ beckii Simon 1926 = Lophocarenum turgidum (Blackwall) 1841
„ pecuarius Simon 1884 = Diastanillus pecuarius (Simon) 1884

Thysa:
„ pythonissaeformis Kempelen 1867 = Gnaphosa lucifuga (Walckenaer) 1802
Tibellomimus:
„ lineatus Gertsch 1933, 1934 = Philodromus bilineatus Bryant 1933
„ prolixus Simon 1906 = Thanatus prolixus (Simon) 1897
Tibellus:
„ duttoni Emerton 1893, 1902, Comstock 1912 = Tibellus oblongus (Walckenaer) 1802
„ lineatipes Lessert 1919 = Tibellus lesserti Roewer 1951
„ oblongiusculus Simon 1875 = Paratibellus oblongiusculus (Lucas) 1846
„ oblongiusculus Getaz 1889 = nicht zu deuten!
„ oblongus Simon 1875, Becker 1882, Chyzer & Kulczynski 1891 = Tibellus maritimus (Menge) 1875
„ oblongus Charitonow 1925 = Tibellus oblongus (Walckenaer) 1802
„ parallelus Chyzer & Kulczynski 1891, Simon 1932 = Tibellus oblongus (Walckenaer) 1802
„ prolixus Simon 1906 = Thanatus prolixus (Simon) 1897
„ propinquus Simon 1875, Becker 1882 = Tibellus oblongus (Walckenaer) 1802
„ propinquus Cambridge 1885 = Tibellus propositus Roewer 1951
„ punctipes Cambridge 1891 = Apollophanes punctipes (Cambridge) 1891
„ vittatus Chyzer & Kulczynski 1891 = Tibellus macellus Simon 1875
Tigellinus:
„ saxicola Simon 1884, Becker 1896, Dahl 1912 = Trichoncus saxicola (Cambridge) 1861
Tiso:
„ carpathicus Simon 1884 = Tiso aestivus (L. Koch) 1872
„ longimanus Bösenberg 1902 = Tiso vagans (Blackwall) 1834
„ spirotubus Banks 1895 = Spirembolus spirotubus (Banks) 1895
Titanidiops:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Idiops**
Titanoeca:
„ brunnea Emerton 1888 = Titanoeca americana Emerton 1888
„ funesta Keyserling 1883 = Auximus funestus (Keyserling) 1883
„ luteipes Keyserling 1891 = Auximus luteipes (Keyserling) 1891
„ obscura Simon 1914, Kratochvil 1932, Drenski 1940, Wiehle 1953 = Titanoeca quadriguttata (Hahn) 1831
„ seguerai Simon 1914 = Titanoeca sequerai Simon 1892
„ silvicola Chamberlin 1947 = Titanoeca nigrella (Chamberlin) 1930
Titurius:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Thalassius**
„ marginellus Simon 1884 = Thalassius albocinctus (Doleschall) 1859
Tivyna:
„ floridana Chamberlin 1948 = Dictyna pallida Keyserling 1887
„ pallidula Chamberlin 1948 = Dictyna pallida Keyserling 1887
Tmarus:
„ angulosus Mello-Leitao 1929 = Tmarus angulifer Simon 1895
„ caudatus Keyserling 1880, Emerton 1893, 1902 = Tmarus angulatus (Walckenaer) 1837
„ galbanatus Keyserling 1880 = Titidius galbanatus (Keyserling) 1880
„ griseus Keyserling 1884 = Tmarus rubromaculatus Keyserling 1880
„ griseus Worley & Pickwell 1927 = Tmarus angulatus (Walckenaer) 1837
„ magniceps Keyserling 1880 = Tmarus angulatus (Walckenaer) 1837
„ mendax Cambridge 1894 = Tmarus corruptus (Cambridge) 1892
„ punctatus Rainbow 1915 = Tmarus rainbowi Mello-Leitao 1929
„ pustulosus Simon 1901 = Monaeses pustulosus Pavesi 1895
„ rubrosignatus Keyserling 1880 = Titidius rubrosignatus (Keyserling) 1880
„ stolzmanni Keyserling 1880 = Onocolus stolzmanni (Keyserling) 1880

Tmeticus:

„ abnormis Simon 1884, Becker 1896 = Oreonetides abnormis (Blackwall) 1841
„ acuminatus Emerton 1913 = Sciastes acuminatus (Emerton) 1913
„ adeptus Cambridge 1906 = Centromerus sellarius (Simon) 1884
„ aestivalis Emerton 1911 = Catabrithorax oxypaederotipus (Crosby) 1905
„ affinis Simon 1894 et sequ. = Micryphantes affinis (Blackwall) 1855
„ alatus Emerton 1919 = Aduva alata (Emerton) 1919
„ arcanus Simon 1884 = Centromerus arcanus (Cambridge) 1873
„ armatus Banks 1905 = Zornella armata (Banks) 1905
„ auritus Fage 1938 = Micryphantes auritus (Fage) 1938
„ bicolor Simon 1884 et sequ. = Centromerita bicolor (Blackwall) 1883
„ bidentatus Emerton 1882 = Scotoussa bidentata (Emerton) 1882
„ bostoniensis Emerton 1882 = Sougambus bostoniensis (Emerton) 1882
„ brevidentatus Emerton 1909 = Erigone brevidentata (Emerton) 1882
„ brevipalpus Simon 1884 = Centromerus aequalis (Westring) 1862
„ brevipalpus Banks 1901 = Oedothorax brevipalpatus Roewer 1942
„ brunneus Emerton 1882, 1909 = Hilaira leviceps (L. Koch) 1879
„ campbelli Simon 1884 = Aprolagus lugubris (Blackwall) 1834
„ capucinus Simon 1884 = Centromerus capucinus (Simon) 1884
„ carpenteri Cambridge 1894 ♂ = Macrargus carpenteri (Cambridge) 1894
„ carpenteri Cambridge 1894 ♀ = Phaulothrix hardii (Blackwall) 1850
„ cinctus Simon 1884 = Centromerus cinctus (Simon) 1884
„ compar Simon 1884 = Gongylidiellum compar (Westring) 1862
„ concavus Emerton 1882 = Sciastes concavus (Emerton) 1882
„ concinnus Simon 1884, F. Cambridge 1891 = Centromerita concinna (Thorell) 1875
„ conicus Emerton 1914 = Oedothorax conicus (Emerton) 1914
„ contortus Emerton 1882 = Eperigone contorta (Emerton) 1882
„ contritus Cambridge 1900 = Poeciloneta variegata (Blackwall) 1841
„ corticarius Emerton 1909 = Soulgas corticarius (Emerton) 1909
„ cristatus Menge 1868 = Gnathonarium dentatum (Wider) 1834
„ cultriger Crosby & Bishop 1928 = Zornella cultrigera (L. Koch) 1879
„ debilis Banks 1902, Emerton 1909 = Tunagyna debilis (Banks) 1892
„ decipiens Simon 1884 = Oreonetides abnormis (Blackwall) 1841
„ defoei F. Cambridge 1899 = Centromerus defoei (F. Cambridge) 1899
„ delphinensis Simon 1884 = Centromerus granulosus (L. Koch) 1879
„ dentatus Menge 1868, Bösenberg 1902 = Gnathonarium dentatum (Wider) 1834
„ denticheliis Simon 1884 = Lessertia denticheliis (Simon) 1884
„ denticulatus Banks 1898 = Centromerus denticulatus (Banks) 1898
„ difficilis Kulczynski 1926 = Centromerus difficilis (Kulczynski) 1926
„ digitatus Emerton 1913 = Prosopotheca digitata (Emerton) 1913
„ distinctus Banks 1892, 1916 = Tapinocyba distincta (Banks) 1892
„ distinctus Banks 1893 = Gongylidiellum minutum (Banks) 1892
„ dubius Kulczynski 1926 = Centromerus dubius (Kulczynski) 1926
„ electus Simon 1884 = Centromerus prudens electus (Simon) 1884
„ emptus Cambridge 1907 = Centromerus levitarsis (Simon) 1884
„ ensifer Simon 1884 = Centromerus arcanus ensifer (Simon) 1929
„ entomologicus Emerton 1911 = Eperigone entomologica (Emerton) 1911
„ expertus Simon 1884 = Centromerus expertus (Cambridge) 1870
„ finitimus Cambridge 1900 = Poeciloneta variegata (Blackwall) 1841
„ firmus Cambridge 1900 = Oreonetides firmus (Cambridge) 1900
„ flaveolus Banks 1892, Emerton 1909 = Aduva flaveola (Banks) 1892
„ formidabilis Simon 1884 = Leptorrhoptrum huthwaitii (Cambridge) 1861
„ fortunatus Cambridge 1895, 1907 = Trichoncus inerrans (Cambridge) 1885
„ foveolatus Menge 1868 = Oedothorax retusus (Westring) 1851
„ frigidus Simon 1884, Soerensen 1898 = Hilaira frigida (Thorell) 1872
„ fuegianus Tullgren 1901 = Porrhomma fuegianum (Tullgren) 1901
„ gnavus Banks 1892, 1916 = Eperigone trilobata (Emerton) 1882

Tmeticus (Forts.):
- „ graminicola Menge 1868, Dahl 1886, Simon 1926 = Micryphantes graminicola (Sundevall) 1830
- „ granulosus Simon 1884 et sequ. = Centromerus granulosus (L. Koch) 1879
- „ hamipalpis Menge 1868 = Tiso vagans (Blackwall) 1834
- „ hardii Simon 1884 et sequ. = Phaulothrix hardii (Blackwall) 1850
- „ hipponensis Simon 1926 = Micryphantes hipponensis (Simon) 1926
- „ humilis Banks 1892 = Catabrithorax plumosus (Emerton) 1882
- „ huthwaitii Simon 1884 = Leptorrhoptrum huthwaitii (Cambridge) 1861
- „ hyperboreus Kulczynski 1916 (in Fig.) = Micryphantes affinis (Blackwall) 1855
- „ illibatus Simon 1884 ♂ = Centromerus aequalis (Westring) 1862
- „ illibatus Simon 1884 ♀ = Syedrula innotabilis (Cambridge) 1863
- „ incertus Banks 1898 = Centromerus incertus (Banks) 1898
- „ index Emerton 1914 = Eperigone index (Emerton) 1914
- „ leptocaulis Menge 1868 = Micryphantes affinis (Blackwall) 1855
- „ levinseni Soerensen 1898 = Meioneta nigripes (Simon) 1884
- „ levitarsis Simon 1884 = Centromerus levitarsis (Simon) 1884
- „ longisetosus Emerton 1882, 1909 = Aduva longisetosa (Emerton) 1882
- „ luxuosus Banks 1892 = Ceratinopsidis formosa (Banks) 1892
- „ maculatus Banks 1892 = Eperigone probata (Emerton) 1882
- „ maximus Emerton 1882 = Oedothorax maximus (Emerton) 1882
- „ microtarsus Emerton 1882 = Sciastes microtarsus (Emerton) 1882
- „ minutus Banks 1892, 1916 = Gongylidiellum minutum (Banks) 1892
- „ moestus Banks 1892 = Eperigone trilobata (Emerton) 1882
- „ montanus Emerton 1882 = Sisicottus montanus (Emerton) 1882
- „ multidentatus Emerton 1913 = Erigone brevidentata (Emerton) 1908
- „ neglectus Cambridge 1894 = Plaesiocraerus fuscipes (Blackwall) 1836
- „ niger F. Cambridge 1891 = Hilaira montigena (L. Koch) 1872
- „ nigricauda Cambridge 1907 = Ostearius melanopygius (Cambridge) 1879
- „ obscurus Banks 1892 = Catabrithorax plumosus (Emerton) 1882
- „ obtusus Emerton 1915 = Scylaceus obtusus (Emerton) 1915
- „ ornatus Bishop & Crosby 1935 = Micryphantes ornatus (Emerton) 1914
- „ pabulator Simon 1884, Becker 1896 = Centromerus pabulatrix (Cambridge) 1875
- „ pallidus Emerton 1882 = Scylaceus pallidus (Emerton) 1882
- „ palustris Banks 1892 = Eperigone trilobata (Emerton) 1882
- „ parvus Banks 1899 = Souessoula parva (Banks) 1899
- „ pectinatus Emerton 1894 = Catabrithorax perplexus (Keyserling) 1886
- „ perplexus Banks 1901 = Catabrithorax perplexus (Keyserling) 1886
- „ pertinens Emerton 1882 = Catabrithorax pertinens (Cambridge) 1875
- „ platei F. Cambridge 1899 = Leptorrhoptrum platei (F. Cambridge) 1899
- „ plumosus Emerton 1882 = Catabrithorax plumosus (Emerton) 1882
- „ pollicatus Tullgren 1901 = Haplinis pollicata (Tullgren) 1901
- „ probatus Emerton 1882 = Eperigone probata (Emerton) 1882
- „ probosus Simon 1884 = Centromerus serratus (Cambridge) 1875
- „ provocans Soerensen 1898 = Microerigone spetzbergensis (Thorell) 1871
- „ prudens Simon 1884 = Centromerus prudens (Cambridge) 1870
- „ rectangulatus Emerton 1915 = Eperigone rectangulata (Emerton) 1915
- „ reticulatus Emerton 1915 = Smodix reticulata (Emerton) 1915
- „ robustus Strand 1906 = Centromerus robustus (Westring) 1851
- „ rufus Simon 1884, Becker 1896 = Macrargus rufus (Wider) 1834
- „ rusticus Banks 1892, 1916 = Sisyrbe rustica (Banks) 1892
- „ satyrus Simon 1884 = Centromerus satyrus (Simon) 1884
- „ scopigera Simon 1884 = Mengea scopigera (Grube) 1859
- „ sellarius Simon 1884 = Centromerus sellarius (Simon) 1884
- „ serratus Simon 1884, Cambridge 1907 = Centromerus serratus (Cambridge) 1875
- „ silvaticus Simon 1884 = Centromerus sylvaticus (Blackwall) 1841

Tmeticus (Forts.):
„ silvicola Kulczynski 1887 = Centromerus silvicola (Kulczynski) 1887
„ similis Cambridge 1905 = Centromerus similis Kulczynski 1894
„ simplex F. Cambridge 1892 = Lessertia dentichelis (Simon) 1884
„ simplex Emerton 1913 = Eperigone simplicia Roewer 1942
„ sinus Simon 1884 = Centromerus sinus (Simon) 1884
„ spinipalpis Menge 1868 = Trachynella nudipalpis (Westring) 1851
„ tarsalis Emerton 1911 = Scironis tarsalis (Emerton) 1911
„ tenuipalpis Emerton 1911 = Erigone tenuipalpis (Emerton) 1911
„ terrestris Emerton 1882 = Sciastes terrestris (Emerton) 1882
„ tesselatus Simon 1884 = Centromerus tesselatus (Westring) 1862
„ thoracicus Emerton 1913 = Smodigoides thoracicus (Emerton) 1913
„ tibialis Emerton 1882 = Souidas tibialis (Emerton) 1882
„ timidus Simon 1884 = Centromerus timidus (Simon) 1884
„ tollii Kulczynski 1908 = Centromerus tollii (Kulczynski) 1908
„ tridentatus Emerton 1882 = Eperigone tridentata (Emerton) 1882
„ trilobatus Emerton 1882 = Eperigone trilobata (Emerton) 1882
„ truncatus Emerton 1882 = Sciastes truncatus (Emerton) 1882
„ unctus Simon 1884 = Centromerus unctus (L. Koch) 1870
„ unicornis Banks 1892 = Gnathonargus unicornis (Banks) 1892
„ vaginatus Simon 1884 = Oreonetides vaginatus (Thorell) 1872
„ warburtonii Cambridge 1889, F. Cambridge 1902 = Mengea warburtonii (Cambridge) 1889

Tobesoa:
„ theridioides Keyserling 1889 = Theridion theridioides (Keyserling) 1889

Tobias:
„ camelinus Simon 1895 = Tobias camellinus (Cambridge) 1869
„ quinquetuberculatus Simon 1895 = Stephanopis quinquetuberculata (Taczanowski) 1872
„ rugosus Simon 1895, F. Cambridge 1900, Mello-Leitao 1929 = Tobias taczanowskii Roewer 1951

Togacantha:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Gasteracantha**

Torania:
„ mbogensis Strand 1913 = ? Torania occidentalis (Simon) 1887

Tortembolus:
„ alpinus Crosby 1925 = Cochlembolus alpinus (Banks) 1896

Tortula:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Torania**

Tosyna:
Die hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Dictyna**
„ pior Chamberlin 1948 = Dictyna personata Gertsch & Mulaik 1936

Totmes:
„ bicolor F. Cambridge 1901 = Menemerus bicolor (F. Cambridge) 1901

Toxeus:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Myrmarachne**
„ formicarius Smith 1907 = Myrmarachne joblotii (Scopoli) 1763
„ procerus Thorell 1887 = Myrmarachne maxillosa (C. L. Koch) 1846

Trabaea (= Trabea):
„ aurantiaca Montgomery 1904, Chamberlin 1908 et sequ. = Pardosops aurantiaca (Emerton) 1885
„ australiensis L. Koch 1877 = Trabaeosa australiensis (L. Koch) 1877
„ bidentigera Strand 1906, 1908 = Pardosops bidentigera (Strand) 1906
„ heteroculata Strand 1913, Lessert 1926 = Trabaeosa heteroculata (Strand) 1913
„ jugorum Simon 1881 = Vesubia jugorum (Simon) 1881
„ lineata L. Koch 1877 = Trabaeosa lineata (L. Koch) 1877

Trabaea (Forts.):
- „ lineata Purcell 1903 = Trabaeosa purcelli (Roewer) 1951
- „ nigriceps Purcell 1903 = Trabaeosa nigriceps (Purcell) 1903
- „ purcelli Roewer 1951 = Trabaeosa purcelli (Roewer) 1951
- „ rubriceps Lawrence 1952 = Trabaeosu rubriceps (Lawrence) 1952
- „ unicolor Purcell 1903 = Trabaeosa unicolor (Purcell) 1903
- „ varia Purcell 1903 = Trabaeosa varia (Purcell) 1903

Trachelas:
- „ bicolor Petrunkevitch 1930 = Trachelas borinquensis Gertsch 1942
- „ cingulipes Simon 1886 = Trachelopachys cingulipes (Simon) 1886
- „ flavipes Keyserling 1891 = Trachelas keyserlingi Roewer 1951
- „ insolens Simon 1896 = Asadipus insolens (Simon) 1896
- „ madagascariensis Simon 1888 = Paccius madagascariensis (Simon) 1888
- „ nigricans L. Koch 1866 = Corinna nigricans C. L. Koch 1842
- „ nitescens L. Koch 1872, Bertkau 1880, Chyzer & Kulczynski 1897, Bösenberg 1902 = Ceto laticeps (Canestrini) 1868
- „ rayi Simon 1932 = Trachelas raji Simon 1876
- „ ruber Keyserling 1887, Simon 1897, Emerton 1889, 1902 = Trachelas tranquillus (Hentz) 1847
- „ sericeus Simon 1886 = Trachelopachys sericeus (Simon) 1886
- „ spinifer Petrunkevitch 1911 = Trachela spirifer F. Cambridge 1899

Trachelocamptus:
- „ indicator Simon 1894 = Thaumastoncus indicator Simon 1884
- „ monodon Reimoser 1919, Roewer 1928 = Acarthauchenius monodon (Cambridge) 1872
- „ rostratus Simon 1894, Comstock 1912 = Origanates rostratus (Emerton) 1882

Trachygnatha:
- „ dentata Chyzer & Kulczynski 1894, Dahl 1912 = Gnathonarium dentatum (Wider) 1834

Trachynotus:
- „ cuspidatus Dahl 1886 = Cornicularia cuspidata (Blackwall) 1833
- „ nudipalpis Dahl 1886, Simon 1926 = Trachynella nudipalpis (Westring) 1851
- „ obtusus Dahl 1886, Simon 1826 = Trachynella obtusa (Blackwall) 1836
- „ psilocephalus Dahl 1886 = Cornicularia vigilax (Blackwall) 1853
- „ unicornis Dahl 1886 = Cornicularia unicornis (Cambridge) 1861

Trachyzelotes:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Zelotes**

Tranquilinus:
- „ benefacius Mello-Leitao 1915 = Corinna benefacia (Mello-Leitao) 1915

Trechalea:
- „ convexa F. Cambridge 1902, 1903, Banks 1909 = Trechalea connexa (Cambridge) 1898
- „ habilis F. Cambridge 1902, 1903 = Hesydrus habilis (Cambridge) 1896
- „ protenta Karsch 1879 = Trechalea longitarsis (C. L. Koch) 1848

Trechona:
- „ auronitens Keyserling 1891 = Crypsidromus auronitens (Keyserling) 1891
- „ icterica C. L. Koch 1850 = Brachythele icterica (C. L. Koch) 1839
- „ pantherina Keyserling 1891 = Crypsidromus pantherinus (Keyserling) 1891
- „ valentina Thorell 1870 = Ischnocolus valentinus (Dufour) 1820
- „ zebra C. L. Koch 1850 = Trechona venosa (Latreille) 1830
- „ zebrata Pocock 1896 = Trechona venosa (Latreille) 1830

Trematocephalus:
- „ perforatus Dahl 1886, Bösenberg 1902 = Trematocephalus cristatus (Wider) 1834

Tricantha:
- „ albopunctata Taczanowski 1879 = Aranea albopunctata (Taczanowski) 1879
- „ scutellata Taczanowski 1879 = Trithena scutallata (Taczanowski) 1879
- „ tricornis Simon 1864 = Trithena tricuspidata (Blackwall) 1863

Tricca:
„ kansuensis Schenkel 1936 = Triccosta kansuensis (Schenkel) 1836
„ lutetiana Dahl 1908, 1912, 1927 = Triccosta lucorum (L. Koch) 1877
„ strandi Caporiacco 1940 = Triccosta strandi (Caporiacco) 1940
Trichoncus:
„ moebi Bösenberg 1902 = Trichoncus affinis Kulczynski 1894
„ scrofa Chyzer & Kulczynski 1894, Kulczynski 1898 = Trichoncus kulczynskii Miller 1935
„ strandi Schenkel 1929 = Trichoncus inerrans (Cambridge) 1885
Trichonephila:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Nephila**
Trichopterna:
„ blackwallii Chyzer & Kulczynski 1894, Dahl 1912 = Trichopterna cito (Cambridge) 1872
Triclaria:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Trechalea**
„ habilis Cambridge 1896, 1898 = Hesydrus habilis (Cambridge) 1896
Triptolemus:
„ benignus Peckham 1885 = Amycus benignus (Peckham) 1885
Tristichops:
„ aculeatus Karsch 1878 = Cydrela aculeata (Karsch) 1878
„ approximatus Karsch 1878 = Capheris approximata (Karsch) 1878
Trite:
„ lucida Simon 1902, 1903, Dalmas 1917 = Trite herbigrada (Urquhart) 1888
„ minax Bryant 1935 = Trite planiceps Simon 1899
„ vafra Dalmas 1917 = Trite auricoma (Urquhart) 1885
Trithena:
„ inuncans Simon 1867 = Trithena tricuspidata (Blackwall) 1863
Trivia:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Euophrys**
„ fulvolineata Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ humilis C. L. Koch 1850 = nicht zu deuten!
Trochosa:
„ abdita Barnes 1953 = Geolycosa abdita (Gertsch) 1934
„ albopelliata L. Koch 1875 = Arkalosula albopelliata (L. Koch) 1875
„ alpigena Kulczynski 1898 = Arctosa alpigena (Doleschall) 1852
„ amylacea Chyzer & Kulczynski 1891, Bösenberg 1903 = Lycorma amylacea (C. L. Koch) 1839
„ andalusiaca Pavesi 1880 = Lycorma ferox (Lucas) 1846
„ annulipes L. Koch 1875 = Trochosomma annulipes (L. Koch) 1875
„ approximata Cambridge 1885 = Allohogna approximata (Cambridge) 1885
„ aquila Bösenberg 1895 = Geolycosa aquila (Bösenberg) 1895
„ arctosina Caporiacco 1947, 1948 = Geolycosa arctosina (Caporiacco) 1947
„ atramentata Caporiacco 1949 = Hogna atramentata (Karsch) 1879
„ avara Keyserling 1876, Montgomery 1904 = Varacosa avara (Keyserling) 1876
„ biunguiculata Cambridge 1881 = Arctosa alpigena (Doleschall) 1852
„ bryantae Roewer 1951 = Agalenocosa bryantae (Roewer) 1951
„ cinerea Thorell 1870, Dahl 1883 et sequ. = Arctosa cinerea (Fabricius) 1776
„ colosii Caporiacco 1947 = Hogna colosii (Caporiacco) 1947
„ conspersa Thorell 1877 = Geolycosa conspersa (Thorell) 1877
„ contestata Montgomery 1904 = Allohogna pratensis (Emerton) 1885
„ dacica Pavesi 1898 = Citilycosa dacica (Pavesi) 1898
„ denisi Caporiacco 1947, 1948 = Agalenocosa denisi (Caporiacco) 1947
„ depuncta Cambridge 1876 = Arctosa depuncta (Cambridge) 1876
„ dimidiata Thorell 1875, Simon 1898 = Mustelicosa dimidiata (Thorell) 1875
„ dolosa Cambridge 1873 = Leaena dolosa (Cambridge) 1873
„ eugeni Roewer 1951 = Trochosippa eugeni (Roewer) 1951
„ floridiana Banks 1896 = Allocosa floridiana (Banks) 1896

Trochosa (Forts.):

„ frondicola Montgomery 1902, 1904 = Allocosa frondicola (Emerton) 1885
„ fulvolineata Caporiacco 1928, Locket & Millidge 1951 = Leaena fulvolineata (Lucas) 1846
„ grazianii Caporiacco 1939 = Trochosula grazianii (Caporiacco) 1939
„ guianensis Caporiacco 1947, 1948 = Allocosa guianensis (Caporiacco) 1947
„ guttata Pavesi 1881 = Ocyale atalanta (Audouin) 1827
„ hebes Cambridge 1885 = Avicosa hebes (Cambridge) 1885
„ herii Thorell 1875, Kulczynski 1899 = Hogna herii (Thorell) 1875
„ humicola Bertkau 1880 = Triccosta humicola (Bertkau) 1880
„ infernalis Thorell 1875, Chyzer & Kulczynski 1891 = Mimohogna vultuosa (C. L. Koch) 1839
„ ingens Kulczynski 1899 = Geolycosa ingens (Blackwall) 1857
„ inops Thorell 1890, 1892 = Lycorma inops (Thorell) 1890
„ inops lompobattangi Merian 1911 = Pterartoriola lompobattangi (Merian) 1911
„ inops masarangi Merian 1911 = Pterartoria masarangi (Merian) 1911
„ insignita Thorell 1872, Soerensen 1898 = Arctosa alpigena (Doleschall) 1852
„ intermixta Schenkel 1936 = Avicosa intermixta (Schenkel) 1936
„ intricaria C. L. Koch 1848 = Leaenella intricaria (C. L. Koch) 1848
„ kirkiana Caporiacco 1940 = Arctosa kirkiana (Strand) 1913
„ kolosvaryi Caporiacco 1947 = Gnatholycosa kolosvaryi (Caporiacco) 1947
„ lactea L. Koch 1875 = Ocyale atalanta (Audouin) 1827
„ lapidicola Dahl 1908 = Trochosa robusta (Simon) 1876
„ leopardus Cambridge 1881, Chyzer & Kulczynski 1891, Bösenberg 1903 = Megarctosa leopardus (Sundevall) 1832
„ lucorum Chyzer & Kulczynski 1897 = Triccosta lucorum (L. Koch) 1877
„ maculata L. Koch 1875 = Ocyale atalanta (Audouin) 1827
„ maderiana Thorell 1875 = Geolycosa blackwalli (Johnson) 1862
„ maderiana Kulczynski 1899 = Isohogna maderiana (Walckenaer) 1837
„ manicata Thorell 1875 = Trochosa hispanica Simon 1870
„ masumbica Caporiacco 1949 = Varacosa masumbica (Strand) 1916
„ meinerti Thorell 1875 = Bonacosa meinerti (Thorell) 1875
„ mexicana Banks 1898 = Arctosa mexicana (Banks) 1898
„ nigella Caporiacco 1940 = Allocosa nigella (Caporiacco) 1940
„ noctuabunda Montgomery 1904 = Allocosa noctuabunda (Montgomery) 1904
„ nyembeensis Caporiacco 1947 = Arctosa nyembeensis (Strand) 1916
„ orophila Chamberlin & Ivie 1947 = Allohogna pratensis (Emerton) 1885
„ paraguayensis Roewer 1951 = Allocosa paraguayensis (Roewer) 1951
„ pardala Strand 1909 = Allocosa pardala (Strand) 1909
„ partita Cambridge 1876 = Hippasa partita (Cambridge) 1876
„ parva Banks 1894, 1902 = Allocosa parva (Banks) 1894
„ perita Pavesi 1880, Chyzer & Kulczynski 1891 = Arctosa perita (Latreille) 1798
„ picta Thorell 1870, Cambridge 1881, Hansen 1885, Bösenberg 1903 = Arctosa perita (Latreille) 1798
„ pictipes Keyserling 1891 = Allohogna pictipes (Keyserling) 1891
„ praetecta L. Koch 1875 = Crocodilosa praetecta (L. Koch) 1875
„ pratensis Montgomery 1904, Kaston 1948 = Allohogna pratensis (Emerton) 1885
„ pratensis orophila Chamberlin & Ivie 1897 = Allohogna pratensis (Emerton) 1885
„ pulchella Thorell 1881 = Allohogna pulchella (Thorell) 1881
„ purcelli Montgomery 1904 = Varacosa gulosa (Walckenaer) 1837
„ rubicunda Keyserling 1876, Montgomery 1904 = Crocodilosa rubicunda (Keyserling) 1876
„ rubiginea Cambridge 1885 = Avicosa rubiginea (Cambridge) 1885
„ rubrofasciata Ohlert 1865, 1867, Thorell 1875, Bösenberg 1903, Simon 1937 et sequ. = Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert) 1865
„ rubromandibulata Cambridge 1885 = Lycorma rubromandibulata (Cambridge) 1885

Trochosa (Forts.):
- „ ruricola C. L. Koch 1848 part. = Trochosa robusta (Simon) 1876
- „ sabulonum Kulczynski 1898, Bösenberg 1903 = Lycorma sabulonum (L. Koch) 1877
- „ sabulosa Cambridge 1885 = Allohogna sabulosa (Cambridge) 1885
- „ septembris Caporiacco 1949 = Allohogna septembris (Strand) 1906
- „ sepulchralis Montgomery 1904 = Geolycosa sepulchralis (Montgomery) 1902
- „ shenandoa Barnes 1953 = Varacosa shenandoa Chamberlin & Ivie 1942
- „ singoriensis Chyzer & Kulczynski 1891 = Allohogna singoriensis (Laxmann) 1770
- „ spissa Bösenberg & Lenz 1895 = Ocyale atalanta (Audouin) 1827
- „ stictopyga Thorell 1895 = Lycorma stictopyga (Thorell) 1895
- „ stigmosa Thorell 1875, Chyzer & Kulcz. 1891 = Cynosa stigmosa (Thorell) 1875
- „ sublata Montgomery 1904 = Allocosa sublata (Montgomery) 1902
- „ sulzeri Thorell 1875, et suqu. = Alopecosa sulzeri (Pavesi) 1873
- „ terminalis Bertkau 1880 = Lycorma sabulonum (L. Koch) 1877
- „ terricola Thorell 1856, Menge 1879 part., Cambridge 1881 et sequ. = Trochosina terricola (Thorell) 1856
- „ terricola Menge 1879 part. = Trochosa ruricola (De Geer) 1778
- „ timorensis Thorell 1881 = Geolycosa timorensis (Thorell) 1881
- „ trabalis C. L. Koch 1848 part. = Lycorma sabulonum (L. Koch) 1877
- „ trabalis C. L. Koch 1848 part. = Trochosa robusta (Simon) 1876
- „ trabalis C. L. Koch 1848 part. = Trochosa ruricola (De Geer) 1778
- „ trabalis Ohlert 1867 = Trochosina terricola (Thorell) 1856
- „ tuberculipalpus Caporiacco 1940, 1947 = Allocosa tuberculipalpus (Caporiacco) 1940
- „ umbraticola C. L. Koch 1848, Ohlert 1867 = Pirata piscatorius (Clerck) 1757
- „ umtalica Caporiacco 1947 = Allocosa umtalica (Purcell) 1903
- „ urbana Cambridge 1876 = Geolycosa urbana (Cambridge) 1876
- „ variana Chyzer & Kulczyinski 1891 = Arctosa variana C. L. Koch 1848
- „ vigilans Bösenberg 1903 = Arctosa perita (Latreille) 1798
- „ virulenta Cambridge 1876 = Crocodilosa virulenta (Cambridge) 1876
- „ xylina Simon 1870 = Lycorma ferox (Lucas) 1846
- „ zavattarii Caporiacco 1941 = Pirata zavattarii (Caporiacco) 1941

Trochosina:
- „ arctosaeformis Caporiacco 1940 = Paratrochosina arctosaeformis (Caporiacco) 1940
- „ tremens Simon 1885 = Allocosa tremens (Cambridge) 1876

Troglohyphantes:
- „ afer Simon 1913 = Lepthyphantes afer (Simon) 1913
- „ balcanica Drenski 1931 = Centromerus bulgarianus (Drenski) 1931
- „ bulgarianus Drenski 1931 = Centromerus bulgarianus (Drenski) 1931
- „ cavernicola Simon 1894 = Porrhomma cavernicola (Keyserling) 1886
- „ ghidini Fage 1931 = Troglohyphantes gestroi Fage 1933
- „ incertus Simon 1894 = Porrhomma emertoni Roewer 1942
- „ lakatnikensis Drenski 1931 = Centromerus lakatnikensis (Drenski) 1931
- „ pyrenaeus Simon 1911 part. = Troglohyphantes cantabricus (Simon) 1911
- „ pyrenaeus Simon 1911 part. = Troglohyphantes simoni Fage 1919
- „ pyrenaeus anophthalmus Simon 1913 = Troglohyphantes coecus Fage 1919
- „ pyrenaeus cantabricus Simon 1911 = Troglohyphantes cantabricus (Simon) 1911
- „ similis dubius Kratochvil 1934 = Troglohyphantes similis Fage 1919

Troxochrus:
- „ exilis Hull 1932 = Colobocyba exilis (Blackwall) 1853
- „ insectus Hull 1932 = Colobocyba insecta (L. Koch) 1869
- „ kashmiricus Caporiacco 1935 = Troxochrota kashmirica (Caporiacco) 1935
- „ praecox Hull 1932 = Tapinocyba praecox (Cambridge) 1873
- „ scabriculus cirrifrons Simon 1884 = Troxochrus cirrifrons (Cambridge) 1870
- „ subitaneus Hull 1932 = Aulacocyba subitanea (Cambridge) 1875

Tryssoclitus:
„ bevisi Hewitt 1916 = Caesetius bevisi (Hewitt) 1916
Tryssothele:
„ subcalpetana Simon 1903 = Tryssothele subcalpeiana (Nicolet) 1849
Tuberta:
„ arietina Chyzer & Kulczynski 1897 = Tetrilus arietinus (Thorell) 1870
„ arietina macrophthalma Kulczynski 1897 = Tetrilus macrophthalmus (Kulczynski) 1897
„ insignipalpis Simon 1884, 1898 = Tuberta moerens (Cambridge) 1863
„ mirabilis Chyzer & Kulczynski 1897, Bösenberg 1902, M. Dahl 1937 = Tuberta moerens (Cambridge) 1863
Tunagyna:
„ tuoba Chamberlin & Ivie 1933 = Tachygyna tuoba (Chamberlin & Ivie) 1933
Turckheimia:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Cyclosa**
„ armata Cambridge 1893 = Wagneriana spicata (Cambridge) 1889
„ scelesta Cambridge 1894 = Cyclosa diversa (Cambridge) 1894
„ waldkenaerii Cambridge 1889 = Cyclosa waldkenaerii (Cambridge) 1889
Tusitala:
„ emertoni Lessert 1925 = Tusitala barbata Peckham 1902
„ hirsuta Peckham 1902, 1903 = Tusitala barbata Peckham 1902
„ braunsii Peckham 1903 = Tusitala barbata Peckham 1902
„ sansibarica Strand 1907, 1908 = Tusitala barbata Peckham 1902
Tutelina:
„ formicarius Chickering 1944 = Icius formicarius Emerton 1891
„ hartii Chickering 1944 = Icius hartii Emerton 1891
„ similis Chickering 1944 = Icius similis Banks 1895
Twaitesia:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Thwaitesia**
Tychicus:
„ plumipes Simon 1880 = Pandercetes plumipes (Doleschall) 1859
Tylogonus:
„ penicillatus Simon 1903 = Corythalia penicillata (F. Cambridge) 1901
Tylophora:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Castianeira**
Typhochlaena:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Avicularia**
„ pococki Mello-Leitao 1923 = Avicularia hirsuta (Pocock) 1901
Typhlonesticus:
„ speluncarum Kulczynski 1914 = Nesticus absoloni Kratochvil 1923
Typhloneta:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Troglohyphantes**
Typhochraestus:
„ paetulus Lessert 1910 = Rhaebothorax paetutus (Cambridge) 1875
„ paetutus Simon 1884, Roewer 1928 = Rhaebothorax paetutus (Cambridge) 1875
„ pallidus Simon 1884 = Cochlembolus pallidus (Emerton) 1882
„ simoni Lessert 1907, 1910 = Typhochraestus dorsuosus (Cambridge) 1875
„ spetzbergensis Kulczynski 1902, Emerton 1919 = Microerigone spetzbergensis (Thorell) 1871
Tyrrhus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Apochinomma**
Ulesanis:
„ chelys L. Koch 1871 et sequ. = Ulesanis personata L. Koch 1871
„ gayi Simon 1894 = Glyptogona gayi (Nicolet) 1849
„ pennata Simon 1894 = Glyptogona pennata (Nicolet) 1849
„ serrata Emerton 1913 = Paidisca marxi (Crosby) 1906

Uliodon:
„ hawkesi Hogg 1911 = Uliodon frenatus (L. Koch) 1873
„ madagascariensis Simon 1887 = Uduba madagascariensis (Vinson) 1863
Uloborus:
„ abdominalis Simon 1864 = Sybota abdominalis (Nicolet) 1849
„ albicans Simon 1903 = Ariston albicans Cambridge 1896
„ alboabdominalis Simon 1864 = Sybota abdominalis (Nicolet) 1849
„ americanus Walckenaer 1841 = ? Thanatidius tenius (Hentz) 1847
„ americanus Kulczynski 1908 = Uloborus plumipes Lucas 1846
„ americanus Petrunkevitch 1911, Kaston 1948 = Uloborus glomosus (Walckenaer) 1841
„ ater Simon 1864 = Sybota abdominalis (Nicolet) 1849
„ borbonicus Vinson 1863 = Uloborus geniculatus (Olivier) 1789
„ costae Thorell 1858 = Uloborus plumipes Lucas 1846
„ curvicaudus Cantor 1842 = nicht zu deuten!
„ domesticus Doleschall 1859 = Uloborus geniculatus (Olivier) 1789
„ erugimosus Simon 1864 = Sybota abdominalis (Nicolet) 1849
„ filiformis Walckenaer 1841 = Tetragnatha filiformis (Audouin) 1827
„ flavus Audouin 1827, Walckenaer 1841 = Tetragnatha flava (Audouin) 1827
„ flavescens Simon 1864 = Tetragnatha flava (Audouin) 1827
„ latreilleii Thorell 1858 = Uloborus geniculatus (Olivier) 1789
„ lugubris Berland & Millot 1940 = Uloborus berlandi Roewer 1951
„ manicatus Thorell 1895 = Uloborus humeralis Hasselt 1882
„ nasutus Thorell 1895 = Uloborus truncatus Thorell 1895
„ niloticus Simon 1884 = Uloborus plumipes Lucas 1846
„ omoedus Thorell 1895 = Uloborus humeralis Hasselt 1882
„ planipedellus Strand 1907 = ? Uloborus planipedus Simon 1896
„ plumipes Emerton 1888, 1902, Mc Cook 1893 = Uloborus glomosus (Walckenaer) 1841
„ plumipes Mello-Leitao 1943 = Uloborus plumipedatus Roewer 1951
„ productus Simon 1873, 1874 = Sybota producta (Simon) 1873
„ signatus Cambridge 1876 = Uloborus plumipes Lucas 1846
„ signatus Cambridge 1898, F. Cambridge 1902, Chamberlin 1938 = Uloborus signatellus Roewer 1951
„ vittatus Simon 1864 = Sybota abdominalis (Nicolet) 1849
„ walckenaerii Chyzer & Kulczynski 1891 = Uloborus walckenaerius Latreille 1806
„ zosis Walckenaer 1841, L. Koch 1872, Thorell 1878, Marx 1889 = Uloborus geniculatus (Olivier) 1789
Umfila:
„ cornuta Keyserling 1891 = Craspedisia cornuta (Keyserling) 1891
Ummidia (= Umidia Roewer 1942 err.**):**
„ picea Thorell 1875 = Ummidia (Pachylomerides) aedificatoria (Westwood) 1840
Uptiotes (= Uptiota):
„ anceps Walckenaer 1837 = Uptiotes paradoxus (C. L. Koch) 1837
„ longipes Giebel 1863 = nicht zu deuten!
„ mithras Simon 1864 = Uptiotes paradoxus (C. L. Koch) 1837
„ schreberi Walckenaer 1837 = Uptiotes paradoxus (C. L. Koch) 1837
Urgulania:
„ borneensis Thorell 1890, 1892 = Panaretus borneensis (Thorell) 1890
Uroctea:
„ limbata concolor Simon 1882, Caporiacco 1941 = Uroctea concolor (Simon) 1882
„ quinquemaculata Dufour 1820 = Uroctea durandi (Latreille) 1809
Utopiellum:
„ curvitarsis Chamberlin 1921, Bishop & Crosby 1935 = Utopiellum consimile (Cambridge) 1869
„ mirabile Strand 1901 = Utopiellum consimile (Cambridge) 1869

Valloa siehe **Velloa**
Varyna:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Dictyna**
Veleda:
„ gilva Blackwall 1869 = Uloborus gilvus (Blackwall) 1869
„ lineata Blackwall 1859, 1861 = Uloborus walckenaerius Latreille 1806
„ pallens Blackwall 1862 = Uloborus walckenaerius Latreille 1806
Velloa (in spec.) = **Valloa** (in gen.)
Vellutus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Cosmophasis**
Venator:
„ fuscus Hogg 1900 = Venatrix fusca (Hogg) 1900
Vendilgarda:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Wendilgarda**
Verrucosa:
„ undecimvariolata F. Cambridge 1904 = Verrucosa mexicana (Lucas) 1833
„ unistriata Mc Cook 1893 = Araneus unistriatus (Mc Cook) 1893
Vibrada:
„ longipes Simon 1894 = Wibrada longipes Keyserling 1886
Vibradellus:
„ carolinus Chamberlin 1925 = Gasteracantha cancriformis (Linné) 1758
Viciria:
„ albomarginata Simon 1903 = nicht zu deuten!
„ cristata Thorell 1887 = Viciria tenera (Simon) 1899
„ pulchra Thorell 1899 = Pochyta pulchra (Thorell) 1899
„ scoparia Simon 1886, 1907 = Viciria hasseltii (Thorell) 1878
„ tenuimana Simon 1893 = Baviola tenuimana (Simon) 1893
Viderius:
„ nigricens Smith 1905 = Tigellinus furcillatus (Menge) 1871
Vindima:
„ maculata Thorell 1895 = Astia maculata (Thorell) 1895
Vindullus:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Ollos**
Virada:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Wirada**
Viridasius:
„ pulchripes Simon 1888 = Vulsor fasciatus (Lenz) 1886
Vixia:
„ bacillifera Simon 1895 = Wixia bacillifera (Simon) 1895
„ infumata Banks 1898 = Wixia ectypa (Walckenaer) 1841
Voconia:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Isopeda**
„ maculata Keyserling 1880 = Polybetes pythagoricus (Holmberg) 1875
Vulfila:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Wulfila**
Wagneria:
„ tauricornis Mc Cook 1893 = Wagneriana tauricornis (Cambridge) 1889
Wala:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Hentzia**
„ albovittata Keyserling 1885, Peckham 1886 = Hentzia palmarum (Hentz) 1832
Walckenaeria (= Walckenaera):
„ affinitata Cambridge 1863, 1873 = Araeoncus crassipes (Westring) 1862
„ aggeris Cambridge 1860, 1874, Blackwall 1864 = Troxochrus scabriculus (Westring) 1851
„ altifrons Cambridge 1863, 1873, 1879 = Entelecara acuminata (Wider) 1834
„ antepenultima Cambridge 1882 = Silometopus antepenultimus (Cambridge) 1882
„ antica Cambridge 1879, Simon 1894 et sequ. = Wideria antica (Wider) 1834

Waldkenaeria (Forts.):

„ apicata Blackwall 1841 et sequ. = Wideria antica (Wider) 1834
„ atra Blackwall 1841, 1864 = Silometopus ater (Blackwall) 1841
„ atrotibialis Cambridge 1879 = Wideria atrotibialis (Cambridge) 1878
„ beckii Cambridge 1870, 1873, 1879 = Lophocarenum turgidum (Blackwall) 1841
„ bicissa Cambridge 1872 = Colobocyba bicissa (Cambridge) 1872
„ bicolor Blackwall 1841, 1861 = Wideria bicolor (Blackwall) 1841
„ bifrons Blackwall 1841, 1864, Cambridge 1879 = Dismodicus bifrons (Blackwall) 1841
„ bilobata Tullgren 1901 = Grammonota bilobata (Tullgren) 1901
„ blackwallii Cambridge 1872 = Trichopterna cito (Cambridge) 1872
„ borealis Cambridge 1862 = Entelecara erythropus (Westring) 1851
„ brevipes Cambridge 1873 = Ceratinella brevipes (Westring) 1851
„ brevis Cambridge 1879 = Ceratinella brevis (Wider) 1834
„ capito Simon 1884 ♂, 1894, Kulczynski 1894 = Wideria capito (Westring) 1862
„ capito Simon 1884 ♀ = Trachynella obtusa (Blackwall) 1836
„ cirrifrons Cambridge 1870, 1881 = Troxochrus cirrifrons (Cambridge) 1870
„ cito Cambridge 1872 = Trichopterna cito (Cambridge) 1872
„ congenera Cambridge 1879 = Entelecara congenera (Cambridge) 1879
„ corniculans Lessert 1910 = Prosopotheca corniculans (Cambridge) 1875
„ crassiceps Cambridge 1879, Dahl 1886 = Araeoncus crassiceps (Westring) 1862
„ cristata Blackwall 1833 et sequ. = Diplocephalus cristatus (Blackwall) 1833
„ cucullata Cambridge 1873 et sequ. = Wideria cucullata (C. L. Koch) 1836
„ cuspidata Blackwall 1833, 1834, 1864, Cambridge 1879 = Cornicularia cuspidata (Blackwall) 1833
„ cuspidata obsoleta Chyzer & Kulczynski 1894 = Cornicularia cuspidata obsoleta (Kulczynski) 1894
„ depressa Blackwall 1836, 1864 = Ceratinella brevis (Wider) 1834
„ diceros Cambridge 1870, 1879 = Saloca diveros (Cambridge) 1870
„ elegans Cambridge 1872, 1905 = Silometopus elegans (Cambridge) 1872
„ elongata Cambridge 1879 = Lophocarenum elongatum (Wider) 1834
„ erythropus Cambridge 1873 = Entelecara erythropus (Westring) 1851
„ exilis Blackwall 1853, 1864 = Colobocyba exilis (Blackwall) 1853
„ fastigata Blackwall 1874 = Entelecara thorellii (Westring) 1862
„ flavida Simon 1926, Roewer 1928 = Wideria flavida (Menge) 1868
„ flavipes Blackwall 1834, 1864, Thorell 1873 = Entelecara flavipes (Blackwall) 1834
„ fortuita Cambridge 1870 = Nothocyba subequalis (Westring) 1851
„ frontata Blackwall 1864, Cambridge 1879, Dahl 1886 = Savignia frontata Blackwall 1833
„ fugax Chyzer & Kulczynski 1894, Lessert 1904, 1910 = Wideria fugax (Cambridge) 1870
„ furcillata Cambridge 1873, Kulczynski 1898 = Tigellinus furcillatus (Menge) 1871
„ fusca Rosca 1935 = Wideria fusca (Rosca) 1935
„ fuscipes Blackwall 1836, 1864, Cambridge 1879 = Plaesiocraerus fuscipes (Blackwall) 1836
„ globipes Dahl 1886 = Trichopterna globipes (L. Koch) 1872
„ graeca Cambridge 1872 = Entelecara graeca (Cambridge) 1872
„ hardii Blackwall 1850, 1864 = Phaulothrix hardii (Blackwall) 1850
„ hasseltii Cambridge 1884 = Silometopus ater (Blackwall) 1841
„ hiemalis Blackwall 1841, 1864, Cambridge 1879 = Troxochrus hiemalis (Blackwall) 1841
„ humilis Blackwall 1841, 1864, Cambridge 1879, Dahl 1886 = Araeoncus humilis (Blackwall) 1841
„ ignobilis Cambridge 1879 = Troxochrus ignobilis (Cambridge) 1870
„ implana Cambridge 1870 = Entelecara flavipes (Blackwall) 1834

Walckenaeria (Forts.):
- „ incurvata Cambridge 1873, 1881 = Silometopus incurvatus (Cambridge) 1873
- „ inflexa Simon 1884 = Trachynella inflexa (Westring) 1862
- „ ingrata Cambridge 1881 = Tapinocyba praecox (Cambridge) 1873
- „ insolens Soerensen 1898 = Wideria insolens (Soerensen) 1898
- „ interjecta Cambridge 1888, 1889 = Silometopus ater (Blackwall) 1841
- „ jubata Roewer 1928 = Wideria jubata (L. Koch) 1881
- „ jucundissima Cambridge 1881, Simon 1884, 1894 = Wideria nodosa (Cambridge) 1873
- „ karpinskii Lessert 1910 = Cornicularia karpinskii (Cambridge) 1873
- „ kochii Chyzer & Kulczynski 1894, Casemir 1951 = Cornicularia kochii (Cambridge) 1872
- „ latifrons Cambridge 1863, 1873, 1879 = Plaesiocraerus latifrons (Cambridge) 1863
- „ laudata Cambridge 1881 = Nothocyba laudata (Cambridge) 1881
- „ ludicra Blackwall 1864, Cambridge 1861, Thorell 1870 = Peponocranium ludicrum (Cambridge) 1861
- „ lugens Simon 1884 = Wideria polita (Simon) 1881
- „ meadii Cambridge 1870 = Baryphyma pratensis (Blackwall) 1861
- „ melanocephala Cambridge 1881, 1882, Chyzer & Kulczynski 1894 = Wideria atrotibialis (Cambridge) 1878
- „ mengei Bösenberg 1902 = Wideria mengei (Bösenberg) 1902
- „ meruensis Tullgren 1910 = Wideria meruensis (Tullgren) 1910
- „ minima Cambridge 1863, 1873 = Minyriolus pusillus (Wider) 1834
- „ minutissima Cambridge 1879 = Theonoe minutissima (Cambridge) 1879
- „ miser Cambridge 1882 = Peponocranium ludicrum (Cambridge) 1861
- „ mitis Cambridge 1882 = Tapinocyba mitis (Cambridge) 1882
- „ mitrata Simon 1884 et sequ. = Wideria mitrata (Menge) 1868
- „ monoceros Blackwall 1864, Lessert 1910, Roewer 1928 = Prosopotheca monoceros (Wider) 1834
- „ monodon Cambridge 1872 = Acartauchenius monodon (Cambridge) 1872
- „ nasuta Cambridge 1879 = Trachelocamptus nasutus (Cambridge) 1879
- „ nemoralis Blackwall 1841, 1864, Cambridge 1884 = Lophocarenum nemorale (Blackwall) 1841
- „ nemoraloides Cambridge 1884 = Lophocarenum nemorale (Blackwall) 1841
- „ nequam Cambridge 1895 = Wideria cucullata (C. L. Koch) 1836
- „ nodosa Cambridge 1873, 1881 = Wideria nodosa (Cambridge) 1873
- „ nudipalpis Cambridge 1881, Simon 1884 et sequ. = Trachynella nudipalpis (Westring) 1851
- „ obscura Blackwall 1834, 1864, Cambridge 1879 = Cnephalocotes obscurus (Blackwall) 1834
- „ obtusa Blackwall 1836 et sequ. = Trachynella obtusa (Blackwall) 1836
- „ orbiculata Cambridge 1882 = Peponocranium ludicrum (Cambridge) 1861
- „ pallens Cambridge 1872 = Colobocyba exilis (Blackwall) 1853
- „ parallela Blackwall 1864 = Lophocarenum parallelum (Wider) 1834
- „ parva Blackwall 1841, 1864 = nicht zu deuten!
- „ patagonica Tullgren 1901 = Wideria patagonica (Tullgren) 1901
- „ penultima Cambridge 1882 = Diastanillus penultimus (Cambridge) 1882
- „ perforata Cambridge 1879 = Trematocephalus cristatus (Wider) 1834
- „ permixta Cambridge 1870, 1879 = Streptosphaenus permixtus (Cambridge) 1870
- „ picina Blackwall 1841, 1864, Cambridge 1879 = Plaesiocraerus picinus (Blackwall) 1841
- „ praecox Cambridge 1873, 1879 = Tapinocyba praecox (Cambridge) 1873
- „ praegracilis Cambridge 1872 = Entelecara flavipes (Blackwall) 1834
- „ pratensis Blackwall 1861, 1864, Cambridge 1881 = Baryphyma pratensis (Blackwall) 1861
- „ prominula Cambridge 1881 = Metopobactrus prominulus (Cambridge) 1872
- „ pumila Blackwall 1841, 1864, Thorell 1870, Cambridge 1879 = Pocadicnemis pumila (Blackwall) 1841

Waldkenaeria (Forts.):
„ punctata Blackwall 1841, 1864, Cambridge 1879 = Lophomma punctatum (Blackwall) 1841
„ pusilla Cambridge 1879, Dahl 1886 = Minyriolus pusillus (Wider) 1834
„ recurvata Strand 1906 = Cheniseo recurvata (Banks) 1900
„ saltuensis Cambridge 1872 = Abacoproeces saltuum (L. Koch) 1872
„ saxicola Cambridge 1861, 1879, Blackwall 1864 = Trichoncus saxicola (Cambridge) 1861
„ scabricula Cambridge 1879 = Troxochrus scabriculus (Westring) 1851
„ scabrosa Cambridge 1870 = Ceratinella scabrosa (Cambridge) 1870
„ scurrilis Cambridge 1872 = Acartauchenius scurrilis (Cambridge) 1872
„ similis Soerensen 1898 = Coryphaeolana holmgrenii (Thorell) 1871
„ simoni Cambridge 1872 = Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer) 1841
„ simplex Chyzer 1894 = Wideria simplex (Chyzer) 1894
„ sordidata Cambridge 1881 = Minyriolus pusillus (Wider) 1834
„ subaequalis Cambridge 1881 = Nothocyba subaequalis (Westring) 1851
„ subitanea Cambridge 1879 = Aulacocyba subitanea (Cambridge) 1875
„ suspecta Kulczynski 1894 = Wideria suspecta (Kulczynski) 1894
„ thorellii Cambridge 1875, 1881 = Entelecara thorellii (Westring) 1862
„ trifrons Cambridge 1863, 1873, 1879 = Entelecara trifrons (Cambridge) 1863
„ turgida Blackwall 1841 = Lophocarenum turgidum (Blackwall) 1841
„ unicornis Cambridge 1861 et sequ. = Cornicularia unicornis (Cambridge) 1861
„ vafra Blackwall 1856, 1864, Cambridge 1881 = nicht zu deuten!
„ vigilax Chyzer & Kulczynski 1894, Crosby & Bishop 1931 = Cornicularia vigilax (Blackwall) 1853
„ warburtonii Cambridge 1902 = Wideria fugax (Cambridge) 1870
„ westringi Strand 1903 = Wideria westringi (Strand) 1903

Wamba:
„ congenera Cambridge 1896 = Crustulina congenera (Cambridge) 1896

Weissella:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Synema**

Wendilgarda:
„ nigra Keyserling 1886 = Theridiosoma nigrum (Keyserling) 1886
„ obscura Keyserling 1886 = Theridiosoma obscurum (Keyserling) 1886

Wideria:
„ incerta Cambridge 1902 = Wideria cucullata (C. L. Koch) 1836
„ melanocephala Simon 1884, 1926, Becker 1896 = Wideria atrotibialis (Cambridge) 1878
„ nigriceps Cambridge 1900 = Tigellinus furcillatus (Menge) 1900
„ subita Cambridge 1902 = Prosopotheca monoceros (Wider) 1834

Willibaldia:
„ cavernicola Keyserling 1886 = Porrhomma cavernicola (Keyserling) 1886
„ incerta Keyserling 1886 = Porrhomma emertoni Roewer 1942

Wirada:
„ rotunda Keyserling 1889 = Ulesanis rotunda (Keyserling) 1889

Witica:
„ thalis Petrunkevitch 1930 = Witica talis Cambridge 1895

Wubana:
„ retrahens Chamberlin 1919 = Wubana drassoides (Emerton) 1882

Wulfila:
„ censoria Simon 1897 = Aysha censoria (Keyserling) 1891
„ cita Simon 1897 = Teudis citus (Keyserling) 1891
„ dubia Chickering 1937 = Sillus dubius (Chickering) 1937
„ parvula Banks 1903 = Temnida parvula (Banks) 1903
„ sanguinea Franganillo 1931, 1934 = nicht zu deuten!
„ tauricornea Franganillo 1934 = nicht zu deuten!
„ tincta Franganillo 1930 = nicht zu deuten!

Xenesthis:
„ colombiana Simon 1890 = Xenesthis immanis (Ausserer) 1875
Xerophaeus:
„ anomalus Hewitt 1915 = Poecilochroa anomala (Hewitt) 1915
„ delphinurus Purcell 1907 = Xerophaeus capensis Purcell 1907
„ gordonicus Hewitt 1915 = Xerophaeus hottentottus Purcell 1908
„ interrogator Purcell 1907 = Xerophaeus capensis Purcell 1907
„ poweri Hewitt 1915 = Xerophaeus aridus Purcell 1907
Xeropigo:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Corinna**
Xestaspis:
„ bipeltis Thorell 1895 = Gammasomorpha bipeltis (Thorell) 1895
„ inclusa Thorell 1887 = Gammasomorpha inclusa (Thorell) 1887
„ parmata Thorell 1890 = Gammasomorpha parmata (Thorell) 1890
Xysticus (= Xystica):
„ adustus L. Koch 1867 = Diaea adusta (L. Koch) 1867
„ adustus Cambridge 1890 = Parasynema cambridgei Roewer 1951
„ aequinoctialis Taczanowski 1872 = Synema aequinoctiale (Taczanowski) 1872
„ albimanus Simon 1932 = Xysticus bufo (Dufour) 1820
„ albobrunneus Urquhart 1892 = Cymbachina albobrunnea (Urquhart) 1892
„ anachoretus Holmberg 1876 = Misumenops anachoretus (Holmberg) 1876
„ ancistrophor Chamberlin & Gertsch 1929 = Xysticus cunctator Thorell 1877
„ annulipes Simon 1864 = Ozyptila annulipes (Lucas) 1846
„ atomarius Thorell 1872 = Ozyptila atomaria (Panzer) 1801
„ auctificus Worley 1932 = Xysticus pretiosus Gertsch 1934
„ balteatus Simon 1875, L. Koch 1882 = Xysticus nubilus Simon 1875
„ bicuspis Banks 1901 = Xysticus locuples Keyserling 1880
„ bimaculatus Emerton 1894, 1919 = Xysticus labradorensis Keyserling 1887
„ bipunctatus Taczanowski 1872 = Synema bipunctatum (Taczanowski) 1872
„ bivittatus Menge 1876 = Xysticus ulmi (Hahn) 1831
„ borealis Keyserling 1883 = Xysticus elegans Keyserling 1880
„ brevipes C. L. Koch 1850, Blackwall 1861, Prach 1866 = Ozyptila brevipes (Hahn) 1825
„ brevipes Thorell 1872 ♀, nec ♂ = Ozyptila praticola (C. L. Koch) 1837
„ brevipes Pavesi 1873, 1875 = nicht zu deuten!
„ brunneus Banks 1892 = Xysticus funestus Keyserling 1880
„ bufo Canestrini & Pavesi 1868, 1870 = nicht zu deuten!
„ calcaratus Thorell 1872, Tullgren 1942 = Xysticus sabulosus (Hahn) 1831
„ calcaratus Pavesi 1873 = Xysticus acerbus Thorell 1872
„ californicus Keyserling 1880 = Xysticus cunctator Thorell 1877
„ callitys Thorell 1875 = Ozyptila callitys (Thorell) 1875
„ cerinus Herman 1879 = Runcinia cerina (C. L. Koch) 1845
„ cinereus C. L. Koch 1838 = Xysticus audax (Schrank) 1803
„ cinereus Cambridge 1881 = Xysticus sabulosus (Hahn) 1831
„ cinereus Banks 1910 = Xysticus canadensis Gertsch 1934
„ coloradensis Bryant 1930 ♀ (nec ♂) = Xysticus lassanus Chamberlin 1925
„ comptulus Simon 1875 ♂, Schenkel 1918 = Xysticus cor Canestrini 1873
„ comptulus Simon 1873 ♀, 1875 ♂ = Xysticus nubilus Simon 1875
„ concinnus Bösenberg 1902 = Xysticus bösenbergi Charitonow 1928
„ confluens C. L. Koch 1845 = Ozyptila confluens (C. L. Koch) 1845
„ conspergata Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ convexus Thorell 1856 = Xysticus luctuosus (Blackwall) 1836
„ cor Pavesi 1875 = Xysticus nubilus Simon 1875
„ cristatus Thorell 1872 et sequ. excl. Warburton 1892 = Xysticus viaticus (Linné) 1758
„ cristatus Warburton 1892 = Xysticus maderianus Kulczynski 1899
„ crudelis Banks 1892 = Xysticus funestus Keyserling 1880
„ cunctator Banks 1895 = Xysticus quinquepunctatus Keyserling 1880

Xysticus (Forts.):

- cuneolus C. L. Koch 1838, Prach 1866 = Tmarus piger (Walckenaer) 1802
- defectus Cambridge 1873, Simon 1874 = Xysticus ninnii Thorell 1872
- deichmanni Soerensen 1898, Braendegaard 1940 = Xysticus labradorensis Keyserling 1887
- delphina Simon 1864 = nicht zu deuten!
- dentiger Simon 1878, Becker 1882 = Xysticus lineatus (Westring) 1851
- depressus C. L. Koch 1838 = Coriarachne depressa (C. L. Koch) 1837
- desidiosus Becker 1878 = nicht zu deuten!
- dimidiatus L. Koch 1867 = Diaea dimidiata (L. Koch) 1867
- discursans Chickering 1940 part. = Xysticus canadensis Gertsch 1934
- distinctus Banks 1892 = Xysticus ferox (Hentz) 1847
- ephippiatus Simon 1880 = Xysticus austerus L. Koch 1879
- ephippiatus Bösenberg & Strand 1906, Saito 1934, 1939 = Xysticus croceus Fox 1937
- evanidus L. Koch 1867 = Diaea evanida (L. Koch) 1867
- excellens Kulczynski 1885, Schenkel 1930, 1931 = Xysticus austerus L. Koch 1879
- farinaria Simon 1864 = nicht zu deuten!
- feroculus Keyserling 1881, Banks 1892 = Xysticus triguttatus Keyserling 1880
- ferox Chamberlin & Gertsch 1928 = Xysticus cunctator Thorell 1877
- ferrugineus Emerton 1894 = Xysticus durus (Soerensen) 1898
- fissilis Banks 1898 ♂ = Xysticus pellax Cambridge 1894
- fissilis Banks 1898 ♀ = Xysticus arizonicus Gertsch 1939
- flavescens Simon 1864 = nicht zu deuten!
- formosipes Simon 1864 = nicht zu deuten!
- formosus Banks 1892, Emerton 1893, Comstock 1912, Chamberlin 1933 = Xysticus punctatus Keyserling 1880
- frater Herman 1879, Chyzer & Kulczynski 1891 = Xysticus kempelenii Thorell 1872
- fucatus Thorell 1872 = Xysticus robustus (Hahn) 1831
- fucatus Bösenberg 1902 = Xysticus bufo (Dufour) 1820
- fuccatus Prach 1866, Canestrini & Pavesi 1868 = Xysticus robustus (Hahn) 1831
- fuscus C. L. Koch 1837 et sequ. = Xysticus robustus (Hahn) 1831
- glacialis L. Koch 1876, Lessert 1905, 1910 = Xysticus desidiosus Simon 1875
- graecus C. L. Koch 1845 ♂ = Xysticus thessalicus Simon 1916
- gramineus Banks 1893 = Xysticus bicuspis Keyserling 1887
- graminis Emerton 1893, Banks 1893, Chickering 1940 = Xysticus bicuspis Keyserling 1887
- grammicus C. L. Koch 1837, 1838, Cambridge 1873 = Runcinia grammica (C. L. Koch) 1837
- gratus Thorell 1875 = Ozyptila confluens (C. L. Koch) 1845
- hamatinus Banks 1910 = Xysticus fraternus Banks 1895
- hamatus Thorell 1875 = Xysticus nubilus Simon 1875
- hamatus Keyserling 1885, Banks 1913 = Xysticus fraternus Banks 1895
- hesperus Gertsch 1934 = Xysticus montanensis Keyserling 1887
- hirtus Cambridge 1876 = Ozyptila audouini Roewer 1951
- horticola C. L. Koch 1837 et auct. sequ. = Ozyptila atomaria (Panzer) 1801
- impavidus Thorell 1872 et sequ. = Xysticus cambridgii (Blackwall) 1859
- incertus Getaz 1889 = nicht zu deuten!
- incestus Thorell 1872 = Ozyptila praticola (C. L. Koch) 1837
- inornatus Emerton 1893 = Synema bicolor Keyserling 1883
- insulanus Thorell 1875, Simon 1883 ♂, Kulczynski 1899 = Xysticus nubilus Simon 1875
- jucundus Simon 1873 ♂ = Xysticus ninnii Thorell 1872
- keyserlingi Bryant 1930 = Xysticus durus (Soerensen) 1898
- lalandei Simon 1875 = Xysticus cribratus Simon 1885
- lanio C. L. Koch 1845, Fig. 1012 ♀, Menge 1876 = Xysticus robustus (Hahn) 1831

Xysticus (Forts.):

„ lanio C. L. Koch 1847, Prach 1866 = Xysticus bifasciatus C. L. Koch 1837
„ lateralis Thorell 1873, Kulczynski 1887, Chyzer & Kulczynski 1891, Bösenberg 1902, Lessert 1910 = Xysticus lanio C. L. Koch 1845
„ lateralis Bösenberg & Strand 1906 = Xysticus audax (Schrank) 1803
„ lemnisca Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ lemniscatus Chamberlin & Ivie 1944 = ? Xysticus auctificus Keyserling 1880
„ lenis Keyserling 1880 = Xysticus cunctator Thorell 1877
„ lentus Banks 1892 = Xysticus gulosus Keyserling 1880
„ lestus Thorell 1875 = Xysticus laetus Thorell 1875
„ limbatus Keyserling 1880 ♂ = Xysticus emertoni Keyserling 1880
„ limbatus Keyserling 1880 ♀, Banks 1913 = Xysticus elegans Keyserling 1880
„ lineatus Canestrini 1874 = Xysticus bufo (Dufour) 1820
„ lineatus Simon 1875, Becker 1882 = Xysticus kempelenii Thorell 1872
„ luctator L. Koch 1870, Simon 1875 ♂, Becker 1882, Bösenberg 1902, Lessert 1910 = Xysticus cambridgii (Blackwall) 1859
„ lugubris Kroneberg 1875 = Ozyptila lugubris (Kroneberg) 1875
„ lutulentus Gertsch 1934, 1939 = Xysticus pulverulentus Emerton 1894
„ maculatus Keyserling 1880 = Xysticus auctificus Keyserling 1880
„ maculatus Cambridge 1885, Caporiacco 1935 = Xysticus maculiger Roewer 1951
„ maculatus Banks 1892 = Xysticus ferox (Hentz) 1847
„ maculosa Simon 1864 = nicht zu deuten!
„ modestus Scheffer 1904 = Ozyptila modesta (Scheffer) 1904
„ moestus Banks 1910, Gertsch 1931 = Xysticus durus (Soerensen) 1898
„ mordax C. L. Koch 1835, 1845 = Xysticus audax (Schrank) 1803
„ morio C. L. Koch 1838, Ohlert 1867 = Xysticus robustus (Hahn) 1831
„ mysticus Chamberlin & Ivie 1942 = Xysticus lutulentus Gertsch 1939
„ nervosus Banks 1892, Emerton 1893, 1902, Comstock 1912 = Xysticus funestus Keyserling 1880
„ nervosus Chamberlin & Gertsch 1928 = Xysticus cunctator Thorell 1877
„ nigritus Thorell 1875 = Ozyptila nigrita (Thorell) 1875
„ norvegicus Strand 1900, 1901 = Xysticus bifasciatus C. L. Koch 1837
„ numida Simon 1864 = Ozyptila numida (Lucas) 1846
„ obscurus Rainbow 1898 = Xysticus rainbowi Strand 1901
„ ontariensis Emerton 1919 et sequ. = Xysticus pellax Cambridge 1894
„ onusta Simon 1864 = Thomisus onustus (Walckenaer) 1805
„ orizaba Gertsch 1934 part. = Xysticus paiutus Gertsch 1933
„ orizaba Gertsch 1934 part. = Xysticus robinsoni Gertsch 1953
„ paiutus Gertsch 1933 = Xysticus orizaba Banks 1898
„ pallidus Bryant 1930 = Xysticus banksi Bryant 1933
„ perileucus Simon 1876 = Xysticus ninnii Thorell 1872
„ perogaster Thorell 1872, Dahl 1883 = Xysticus striatipes L. Koch 1870
„ piger Blackwall 1865 = Xysticus blackwalli Roewer 1951
„ pini C. L. Koch 1850 et auct. sequ. = Xysticus audax (Schrank) 1803
„ praticola C. L. Koch 1837, 1838, Prach 1866, Cambridge 1881 = Ozyptila praticola (C. L. Koch) 1837
„ praticola Ohlert 1867 = Ozyptila trux (Blackwall) 1846
„ pullatus Thorell 1875 = Ozyptila pullata (Thorell) 1875
„ pulverulentus C. L. Koch 1837 = Ozyptila atomaria (Panzer) 1801
„ pulverulentus Emerton 1894 = Ozyptila lutulentus Gertsch 1934
„ pusio Thorell 1872 ♂ = Ozyptila simplex (Cambridge) 1862
„ pusio Thorell 1872 ♀ = Ozyptila brevipes (Hahn) 1825
„ pustulosus L. Koch 1867 = Thomisus spectabilis Doleschall 1859
„ quadrilineatus Keyserling 1880 et sequ. = Xysticus luctans (C. L. Koch) 1845
„ quinquepunctatus Marx 1892 = Xysticus banksi Bryant 1933
„ sabulosus embriki Kolosvary 1936 = Xysticus embriki Kolosvary 1935
„ scabriculus Thorell 1872 = Ozyptila scabricula (Westring) 1862

Xysticus (Forts.):
- „ setosus Thorell 1872, Tullgren 1942 = Xysticus sabulosus (Hahn) 1831
- „ simplicior Chamberlin & Gertsch 1929 = Xysticus lassanus Chamberlin 1925
- „ spinifer Simon 1883 = Misumena spinifera (Blackwall) 1862
- „ spinifer Nosek 1905 = Xysticus noseki Roewer 1951
- „ stomachosus Keyserling 1880, Emerton 1893, 1902 = Xysticus ferox (Hentz) 1847
- „ subclavatus Cambridge 1876 = Ozyptila subclavata (Cambridge) 1876
- „ terribilis Holmberg 1876 = Misumenops terribilis (Holmberg) 1876
- „ transversata Simon 1864 = nicht zu deuten!
- „ transversatus Chamberlin & Ivie 1944 = Xysticus ferox (Hentz) 1847
- „ transversus Banks 1892 = Xysticus ferox (Hentz) 1847
- „ trimaculatus Bryant 1933 = Xysticus auctificus Keyserling 1880
- „ tristrami Kulczynski 1908 ♀ = Xysticus similis Kulczynski 1911
- „ tuberosus Thorell 1875 = Ozyptila lugubris (Kroneberg) 1875
- „ tumefactus Chamberlin & Ivie 1944 = Xysticus funestus (Keyserling) 1880
- „ ulmi Simon 1875 part. = Xysticus tortuosus Simon 1932
- „ varians Simon 1864 = nicht zu deuten!
- „ varicus Simon 1874 = Ozyptila varica (Simon) 1874
- „ verecundus Gertsch 1934 ♀ (nec ♂) = Xysticus facetus Cambridge 1895
- „ vernalis Bryant 1930 = Xysticus discursans Keyserling 1880
- „ vernilis Keyserling 1881 = Xysticus benefactor Keyserling 1880
- „ versicolor Simon 1895, Emerton 1902 = Coriarachne versicolor Keyserling 1880
- „ versutus Cambridge 1878 = Ozyptila atomaria (Panzer) 1801
- „ viaticus C. L. Koch 1845, Ohlert 1867, Cambridge 1881, Dahl 1883 = Xysticus kochii Thorell 1872
- „ westringi Thorell 1873 = Ozyptila trux (Blackwall) 1846

Yllenus:
- „ brueggeri Lebert 1877 = nicht zu deuten!
- „ cervinus Thorell 1875 = Aelurillus cervinus (Thorell) 1875
- „ capreolus Simon 1884 = Aelurillus kochi Roewer 1951
- „ elegans Simon 1901 = Yllenus kronebergi Roewer 1951
- „ fasciatus Dahl 1883 = Phlegra fasciata (Hahn) 1826
- „ festivus Thorell 1873 = Aelurillus festivus (C. L. Koch) 1834
- „ gilvus Thorell 1875 = Aelurillus gilvus (Simon) 1868
- „ ogieri Pavesi 1878 = Aelurillus ogieri (Simon) 1868
- „ plumipes Thorell 1875 = Aelurillus plumipes (Thorell) 1865
- „ ranunculus Thorell 1875 = Aelurillus ranunculus (Thorell) 1875
- „ saliens Cambridge 1876 = Attulus saliens (Cambridge) 1876
- „ saltator Thorell 1873 = Sitticulus saltator (Simon) 1868
- „ univittatus Simon 1876 = Pseudomogrus univittatus (Simon) 1871
- „ v-insignitus Thorell 1873, Dahl 1883 = Aelurillus litera v-insignitus (Clerck) 1757

Yvesella:
- „ tennesseensis Arndt 1928 = Ivesia tennesseensis Petrunkevitch 1925

Zachria:
- „ oblonga L. Koch 1876 = Zachria haemorrhoidalis L. Koch 1875
- „ magnifica Järvi 1914 = Typostola magnifica Hogg 1902

Zanomys:
- „ montana Chamberlin 1948 = Lathys montana (Chamberlin) 1948

Zatapina:
- „ plumipes Karsch 1891 = Pandercetes plumipes (Karsch) 1891

Zelotes:
- „ aprilinus Banks 1904 = Drassyllus aprilinus (Banks) 1904
- „ arizonensis Petrunkevitch 1911, Chamberlin 1922 = Drassyllus arizonensis (Banks) 1901
- „ barberi Petrunkevitch 1911 = Haplodrassus barberi (Banks) 1902
- „ blandus Petrunkevitch 1911 = Drassyllus blandus (Banks) 1892

Zelotes (Forts.):
- „ cymbiolus Chamberlin 1936 = Zelotes lymnophilus Chamberlin 1936
- „ decepta Petrunkevitch 1911 = Haplodrassus signifer (C. L. Koch) 1839
- „ depressus Petrunkevitch 1911, Banks 1911 = Drassyllus depressus (Emerton) 1889
- „ ethops Chamberlin 1920 = Drassyllus ethops (Chamberlin) 1920
- „ femoralis Banks 1904 = Drassyllus femoralis (Banks) 1904
- „ fratis Chamberlin 1920 = Zelotes ater (Hentz) 1832
- „ hentzi Barrows 1945, Kaston 1948 = Zelotes melancholicus (Thorell) 1877
- „ irritans Chamberlin 1920 = Drassyllus irritans (Chamberlin) 1920
- „ lamprus Chamberlin 1920 = Drassyllus lamprus (Chamberlin) 1920
- „ longestylus Caporiacco 1936 = Zelotes caporiaccoi Roewer 1951
- „ maculatus Petrunkevitch 1911 = Haplodrassus maculatus (Banks) 1904
- „ niger Banks 1910 = Drassyllus niger (Banks) 1896
- „ novus Banks 1910, Petrunkevitch 1911 = Drassyllus frigidus (Banks) 1892
- „ pacifica Banks 1904 = Haplodrassus signifer (C. L. Koch) 1839
- „ pallidus Petrunkevitch 1911 = Zelotes keyserlingi Roewer 1951
- „ paulistus Roewer 1951 = Zelotes elytrogaster Mello-Leitao 1944
- „ piceus Simon 1914 = Zelotes reimoseri Roewer 1951
- „ razoumowskyi Simon 1914 = Zelotes rusticus (L. Koch) 1872
- „ rufipes Tucker 1923 = Zelotes tuckeri Roewer 1951
- „ rufulus Petrunkevitch 1911 = Drassyllus rufulus (Banks) 1892
- „ scutatus Mello-Leitao 1939, 1941 = Zelotes elytrogaster Mello-Leitao 1944
- „ shoshoneus Chamberlin 1936 = Zelotes puritanus Chamberlin 1922
- „ simoni Charitonow 1929 = Zelotes reimoseri Roewer 1951
- „ subterraneus Gistel 1848, Simon 1914 et sequ. = Zelotes ater (Hentz) 1832
- „ sylvanus Chamberlin & Ivie 1944 = Zelotes duplex Chamberlin 1922
- „ taibo Chamberlin 1920 = Haplodrassus taibo (Chamberlin) 1920
- „ tantulus Simon 1914 = Zelotes nilicola (Cambridge) 1874

Zenonina:
- „ squamulata Strand 1907 = ? Zenonina vestita Simon 1898

Zeugonephila:
Sämtliche Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Nephila**

Zilla:
- „ acalypha C. L. Koch 1839, Ohlert 1867, Cambridge 1878 = Mangora acalypha (Walckenaer) 1802
- „ albimacula C. L. Koch 1834, 1839 = Zilla diodia (Walckenaer) 1802
- „ alpina L. Koch 1870 = Zygiella montana (C. L. Koch) 1839
- „ antriada Simon 1864 = Meta merianae (Scopoli) 1763
- „ atrica Thorell 1856, 1870, Simon 1874, Dahl 1883, Hansen 1885, Emerton 1909 = Zygiella calophylla (Walckenaer) 1802
- atrica Lebert 1877 = nicht zu deuten!
- „ atrica Chyzer & Kulczynski 1891 = Zygiella keyserlingii (Ausserer) 1871
- „ aureola Keyserling 1884, 1893 = Zygiella aureola (Keyserling) 1884
- „ bösenbergi Keyserling 1878, 1893 = Zygiella bösenbergi (Keyserling) 1878
- californica Banks 1896, 1900 = Zygiella californica (Banks) 1896
- „ calophylla C. L. Koch 1839 = Zygiella litterata (Olivier) 1789, jetzt: Zygiella x-notata (Clerck) 1757
- „ calophylla Menge 1866 = Zygiella x-notata (Thorell) 1856, jetzt: Zygiella stroemi (Thorell) 1870
- „ calophylla Ohlert 1867 = Zygiella calophylla (Walckenaer) 1895
- „ colaphylla Giebel 1867, 1869 = nicht zu deuten!
- „ calyptrata Thorell 1895 = Zygiella calyptrata (Thorell) 1895
- „ caspica Simon 1889 = Zygiella caspica (Simon) 1889
- „ crucifera Thorell 1875 = Enoplognatha crucifera (Thorell) 1875
- „ decolorata Keyserling 1893 = Zygiella decolorata (Keyserling) 1893
- „ decora C. L. Koch 1837 = Mangora acalypha (Walckenaer) 1802

Zilla (Forts.):
- „ decemnotata Caporiacco 1934 = Zygiella litterata (Olivier) 1789, jetzt: Zygiella x-notata (Clerck) 1757
- „ dispar Kulczynski 1885 = Zygiella dispar (Kulczynski) 1885
- „ erythromela Holmberg 1876 = Mecynogea erythromela (Holmberg) 1876
- „ genistae C. L. Koch 1837 = Mangora acalypha (Walckenaer) 1802
- „ gigas Franganillo 1913 = Enoplognatha gigas (Franganillo) 1913
- „ guttata Keyserling 1880, 1893 = Zygiella guttata (Keyserling) 1880
- „ guyanensis Keyserling 1880, 1893 = Zygiella guyanensis (Keyserling) 1880
- „ hamata Thorell 1856 = Singa hamata (Clerck) 1757
- „ inclinata Sordelli 1868 = Meta reticulata (Linné) 1758, jetzt: Meta segmentata (Clerck) 1757
- „ keyserlingi Ausserer 1871 et auct. sequ. = Zygiella keyserlingii (Ausserer) 1871
- „ kochii Thorell 1870, Bösenberg 1901 = Zygiella kochii (Thorell) 1870
- „ melanocephala Keyserling 1880, 1893 = Zygiella melanocephala (Taczanowski) 1874
- „ montana C. L. Koch 1839, Westring 1862 et sequ. = Zygiella montana (C. L. Koch) 1839
- „ mordax Thorell 1875 = Enoplognatha mordax (Thorell) 1875
- „ pulcherrima Zawadsky 1902 = Zygiella pulcherrima (Zawadsky) 1902
- „ punctata Keyserling 1893 = Zygiella punctata (Keyserling) 1893
- „ reticulata C. L. Koch 1839, Ohlert 1867 = Meta reticulata (Linné) 1758, jetzt: Meta segmentata (Clerck) 1757
- „ rogenhoferi Keyserling 1877, 1892 = Zygiella rogenhoferi (Keyserling) 1877
- „ rossii Thorell 1870 = Enoplognatha mandibularis (Lucas) 1846
- „ stroemi Thorell 1870, Simon 1874 et sequ. = Zygiella x-notata (Thorell) 1856, jetzt: Zygiella stroemi (Thorell) 1870
- „ thorellii Ausserer 1871, Chyzer & Kulczynski 1891, Bösenberg 1901 = Zygiella thorellii (Ausserer) 1871
- „ x-notata Thorell 1856 = Zygiella x-notata (Thorell) 1856, jetzt: Zygiella stroemi (Thorell) 1870
- „ x-notata Westring 1862, Thorell 1870, Simon 1874, Dahl 1883 et sequ. = Zygiella litterata (Olivier) 1789, jetzt: Zygiella x-notata (Clerck) 1757
- „ x-notata Lebert 1877 = nicht zu deuten!

Zimiris:
- „ doriai Simon 1893, Dalmas 1918 = Zimiris doriae Simon 1892

Zobia:
- parvula Thorell 1895 = Zoica parvula (Thorell) 1895

Zodarion (= Zodarium):
- „ atriceps Kulczynski 1911 = Zodarion lutipes (Cambridge) 1872
- „ denisi Caporiacco 1940 = Zodarion caporiaccoi Roewer 1942
- „ isabellinum Caporiacco 1928 = Zodarion pileolonotatum Denis 1935
- „ isabellinum Caporiacco 1933 = Zodarion cyrenaicum Denis 1935
- „ italicum Chyzer & Kulczynski 1897 = Zodarion ludibundum Simon 1914
- „ longipes Thorell 1870 = Zodarion gallicum (Simon) 1873
- „ maderiana Kulczynski 1899, 1905 = Zodarion styliferum (Simon) 1870
- „ reticulatum Kulczynski 1908 = Zodarion granulatum Kulczynski 1908

Zora:
- „ algeriensis Simon 1864 = Zoropsis spinimana (Dufour) 1820
- „ australiensis L. Koch 1873 = Uliodon australiensis (L. Koch) 1873
- „ californica Marx 1889 = nicht zu deuten!
- „ dufourii Simon 1864 = Zoropsis spinimana (Dufour) 1820
- „ ferruginea L. Koch 1873 = Uliodon ferruginea (L. Koch) 1873
- „ frenata L. Koch 1873 = Uliodon frenata (L. Koch) 1873
- „ fusca L. Koch 1870 = Apostenus fuscus Westring 1851
- „ latithorax Marx 1889 = nicht zu deuten!

Zora (Forts.):
„ letifera Falconer 1912, Cambridge 1913 = Zora armillata Simon 1878
„ lutea Thorell 1875 = Zoropsis lutea (Thorell) 1875
„ maculata Thorell 1869, 1870, Dahl 1883, Hansen 1885, Bösenberg 1902 = Zora spinimana (Sundevall) 1832
„ maculata Menge 1875 = nicht zu deuten!
„ marmorea Hogg 1896 = Uliodon marmoreus (Hogg) 1896
„ ocreata C. L. Koch 1848, Thorell 1873 = Zoropsis spinimana (Dufour) 1820
„ silvestris Dahl 1912 = Zora manicata Simon 1878
„ spinimana Emerton 1911 = Zora pumila (Hentz) 1850
„ tarantulina L. Koch 1873 = Uliodon tarantilinus (L. Koch) 1873
„ torva L. Koch 1873 = Uliodon torvus (L. Koch) 1873

Zornella:
„ cultrigera Crosby & Bishop 1933 = Zornella armata (Banks) 1905
„ mathiseni Jackson 1932 = Zornella armata (Banks) 1905

Zoropsis:
„ albertisii Pavesi 1880, Dahl 1901 = Zoropsis spinimana (Dufour) 1820
„ libanica Simon 1884, Dahl 1901 = nicht zu deuten!
„ ocreata Simon 1878 et sequ. = Zoropsis spinimana (Dufour) 1820
„ wrighti Dahl 1901 = Zoropsis spinimana (Dufour) 1820

Zosis:
Alle hier nicht genannten Arten siehe unter gleichem Artnamen bei **Uloborus**
„ caraibe Walckenaer 1841, Taczanowski 1872 = Uloborus geniculatus (Olivier) 1789

Zygia:
„ atrica Menge 1866 = Zygiella calophylla (Walckenaer) 1802
„ calophylla Ohlert 1867 = Zygiella calophylla (Walckenaer) 1802

Zygiella:
„ atrica Simon 1895, 1929 = Zygiella calophylla (Walckenaer) 1802
„ decemnotata Caporiacco 1934 = Zygiella litterata (Olivier) 1789, jetzt: Zygiella x-notata (Clerck) 1757
„ litterata Wiehle 1931, Roewer 1942 = Zygiella x-notata (Clerck) 1757

Zygoballus:
„ parvus Banks 1898 = Dendryphantes capitatus (Hentz) 1846
„ rufipes F. Cambridge 1901 ♀ = Zygoballus mundus (Cambridge) 1896
„ strenuus Peckham 1896 = Zygoballus mundus (Cambridge) 1896
„ terrestris Emerton 1891, Peckham 1895, 1909, Simon 1903 = Zygoballus nervosus (Peckham) 1888

Berichtigung zum 1. Band.

(vergl. auch 1. Band, Seite 1038—1040.)

Seite 147, Zeile 36, lies statt: Pachylomerides Strand 1934
Gen. **Ummidia** Thorell 1834.

Seite 228, Zeile 14, lies statt: Cyclothoracides Strand 1929
Gen. **Cyclothoracoides** Strand 1929.

Seite 236, Zeile 3, lies statt **cristopheri** (Simon) 1909:
♀ **christopheri** (Simon) 1909.

Seite 298, Zeile 1 lies statt Gen. **Harpactes** Templeton 1835 (weil praeocc.):
Gen. **Harpactea** Bristowe 1939.

Seite 408, Zeile 36—37, lies statt: distinctus (Thorell) 1884
♀ **medialis** Banks 1898.
Steatoda distincta Thorell 1877, Bull. U. St. Geol. Surv. 3 (2) p. 485 (D ♀) (praeocc. Blackwall 1859 sub **Latrodectus**, vergl. 1. Band p. 404, Zeile 16).

Seite 409, Zeile 4, lies statt: Robertus Cambridge 1879
Gen. **Ctenium** Menge 1870.

Seite 428, Zeile 47—50, lies statt: bituberculatus (Keyserling) 1884 usw. . . .
♀ **bigibbosus** nom. nov. Amazonas, Peru
Theridion bituberculatum Keyserling 1884, Spinn. Amer. 2 (Therid. 1) p. 92 T 4 F. 60 (D ♀) (praeocc. Wider 1834).
Th. bituberculatum Keyserling 1884, Spinn. Amer. 2 (Therid. 1) p. 295 (N).

Seite 429, Zeile 40, lies statt: Gen. Argyrodina Strand 1926
Gen. **Conopistha** Karsch 1881.

Seite 490, Zeile 3, lies statt: asperum (F. Cambridge) 1902
♀ **aspersum** (F. Cambridge) 1902. Guatemala

Seite 712, Zeile 25, lies statt: Gen. Blaniargus Simon 1913
Gen. **Micrargus** Dahl 1886.

Seite 849, Zeile 30 und 31, lies statt: pallidula (Keyserling) 1863
♀ **palloides** nom. nov.
Epeira pallidula Keyserling 1863, S. B. Nat. Ges. Isis, Dresden p. 124 T. 4 F. 14—15 (D ♀) (praeocc. Clerck 1757 sub **Araneus**).

Berichtigung zum 2. Band, Abt. a.

Seite 43, nach Zeile 35 (vor latithorax) ist einzufügen:
Gen. **Asemostera** Simon 1898.

Seite 70, Zeile 26 bis 45: ♂♀ agrestis (Walckenaer) 1802 und Synonyma ist auf Seite 77 nach Zeile 33 bei den transgredierenden Arten einzusetzen.

Seite 77, Zeile 34, lies statt: domestica Clerck 1757
♂♀ **domestica** (Clerck) 1757.

Seite 87, Zeile 15, lies statt: Gen. Cybaeopsis Strand 1907
Gen. **Cybaeolus** Simon 1884.

Seite 185, Zeile ?, lies statt: **Marianan** **Marianen**

Seite 239: Versehentlich zum „Gen. Cynosa" gestellt, sind einzufügen:
stigmosa Thorell in das Gen. **Megarctosa** (Seite II a 278),
heterura Simon in das Gen. **Schizocosa** (nach Seite II a 294),
leucotaeniata Mello-Leitao in das Gen. **Lycosa** s. str. (nach Seite II a 273).

Seite 286, Zeile 30, lies statt: Gen. Piratessa (weil praeocc. Templ. 1835)
Gen. **Piratosa** gen. nov.

Seite 428, Zeile 17, lies statt: Gen. Parabona Mello-Leitao 1947
Gen. **Parabonna** Mello-Leitao 1947.

Seite 747, Zeile 38, lies statt: Gen. Reineckella Dahl 1907
Gen. **Reinickella** Dahl 1907.

Seite 751, Zeile 41, lies statt: Gen. Angaenus Thorell 1881
Gen. **Angaeus** Thorell 1881.

Seite 769, Zeile 25, lies statt: Gen. Cephyrina Simon 1895
Gen. **Gephyrina** Simon 1895.

Seite 827, Zeile 1, lies statt: 4. Gr. Porrhopeae
4. Gr. Porropeae

Seite 827, Zeile 3, lies statt: Porrhopis Mello-Leitao **Porrhopsis** Mello-Leitao

Seite 845, Zeile 19, lies statt: direythra (Thorell) 1890
♀ **dierythra** (Thorell) 1890.

Berichtigung zum 2. Band, Abt. b.

Seite 1196, Zeile 15, lies statt: Metaphidippus 1. Chickering 1946 usw. . . .
Metaphidippus latus Chickering 1946, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 97 p. 304

Seite 1211, Zeile 3, lies statt: D. sansalitanus Chamberlin 1925 usw. . . .
D. sausalitanus Chamberlin 1925 usw. . . .

Seite 1401, Zeile 12, lies statt: „jetzt: Araneus pallidula (Keyserling) 1863"
= Araneus palloides **nom. nov.**

Seite 1415, Zeile 5, lies statt ganygaster richtig: gonygaster

Seite 1556, nach Zeile 3 ist einzufügen:
„ christopheri Simon 1909 = Avicosa christopheri (Simon) 1909

Seite 1556, Zeile 36 ist zu eliminieren.

Seite 1558, nach Zeile 54 ist einzufügen:
„ furcillata L. Koch 1867, 1877 = Allocosa furcillata (L. Koch) 1867

Seite 1561, Zeile 14, lies statt Pterartoriella richtig: Pterartoriola

Seite 1563, nach Zeile 14 ist einzufügen:
„ lüderitzi Simon 1910 = Lycorma lüderitzi (Simon) 1910

Seite 1569, Zeile 7, lies statt Trochosina richtig: Trochosippa

Seite 1572, Zeile 4 ist hier zu eliminieren u. auf Seite 1571 nach Zeile 53 einzufügen.

Seite 1607, Zeile 43, lies statt Coneatara richtig: Goneatara

Seite 1637, nach Zeile 50 ist einzufügen:
Prominosia siehe **Crosbyellum**

Index der Familien und Gattungen.

Die Seitenzahlen hinter I, IIa und IIb beziehen sich auf den 1. Band, den 2. Band Abt. a und den 2. Band Abt. b; die eingeklammerten Seitenhinweise betreffen das Synonyma-Verzeichnis im 2. Band, Abt. b.

	Seite:
Abacoproeces	I 623
Abbotia	(II b 1380)
Abuzaida	(II b 1380)
Acacesia	I 763, (II b 1380)
Acantharachne	(II b 1380)
Acantharanea	I 899
Acantheis	II a 661
Acanthepeira	(II b 1380)
Acanthoceto	II a 581
Acanthoctenidae	II b 1286
Acanthoctenus	II b 1286, (II b 1380)
Acanthodon	(II b 1380)
Acanthognathus	(II b 1380)
Acanthogonatus	I 219
Acantholycosa	II a 151, (II b 1380)
Acanthonotus	(II b 1381)
Acanthopalpus	(II b 1381)
Acanthopelma	I 224
Acanthoscurria	I 246, (II b 1381)
Acartauchenius	I 697, (II b 1381)
Acattyma	I 189, (II b 1381)
Accola	I 208
Acentropelma	(II b 1381)
Acentroscelus	II a 810
Achaea	I 445, (II b 1381)
Achalaicola	II a 607
Achetopus	I 194
Acmaea	(II b 1381)
Acompse	(II b 1381)
Acontius	I 162
Acracanthosoma	(II b 1381)
Acracanthosoma	II a 742
Acragas	II b 958
Acroaspis	I 777
Acroniops	II a 153
Acropholius	I 217
Acrosoma	(II b 1381)
Acrosomoides	(II b 1381)
Actinacantha	(II b 1381)
Actinopus	I 186, (II b 1381)
Actinosoma	I 778
Actinoxia	I 165
Acusilas	I 752
Adcatomus	II a 476
Adelonychia	(II b 1383)
Adelphodrassus	II a 381
Admestina	II b 1185, (II b 1383)
Admirala	(II b 1383)
Adonea	II b 1291, (II b 1383)
Adoxoneta	(II b 1383)
Adoxotoma	II b 967

	Seite:
Adranochelia	I 225
Adrastidia	II a 802
Adrastis	II a 711
Aduva	I 632
Aebutina	II b 1300
Aebutinoides	II b 1300
Aelurillus	II b 1112, (II b 1383)
Aelurops	(II b 1383)
Aenigma	(II b 1383)
Aepycephalus	I 157
Aepygnatha	(II b 1383)
Aera	I 908
Aethriscus	I 894
Aethrodes	(II b 1383)
Aethrodiscus	I 895
Aetius	II a 607
Aetola	(II b 1383)
Aetrocantha	(II b 1383)
Afiola	II b 1075
Afracantha	(II b 1383)
Afraflacilla	II b 1253
Afrobeata	II b 1006
Agalena	(II b 1384)
Agalenocosa	II a 200
Aganippe	I 172
Agassa	II b 1229, (II b 1383)
Agathostichus	I 900
Agathostola	(II b 1383)
Agelena	II a 35, (II b 1384)
Agelenidae	II a 35
Agelenopsis	II a 41, (II b 1385)
Agelista	II b 967
Agersborgia	I 219
Aglaoctenus	II a 126
Agnyphantes	(II b 1386)
Agobardus	II b 1020
Agorius	II b 1041
Agriognatha	(II b 1386)
Agroeca	II a 559, (II b 1386)
Agroecina	II a 563
Agyneta	I 513
Aigola	I 514, (II b 1386)
Ajmonia	II b 1300
Akela	II b 1171, (II b 1386)
Akeloides	II b 1172
Alauximus	II b 1354
Alaxchelicera	I 714
Albaniana	I 174
Albionella	II b 968
Alcimochthes	II a 805
Alcimonotus	II b 1068

	Seite:
Alcimosphenus	I 998
Alcmena	II b 1229, (II b 1386)
Alfenus	II b 1075
Algidus	II a 153
Aliatypus	I 189
Alioranus	I 683
Alistra	II a 99
Allepeira	I 778
Allocosa	II a 201, (II b 1387)
Allodrassus	II a 382
Allohogna	II a 212
Allohyllus	II b 1043
Allomengea	(II b 1387)
Allopecosa	(II b 1387)
Allothele	I 202
Allotrochosina	II a 213
Almota	(II b 1387)
Alopecosa	II a 213, (II b 1387)
Alopecosella	II a 225
Alpaida	(II b 1387)
Altella	II b 1300, (II b 1387)
Altellela	II b 1301
Altellopsis	II b 1301, (II b 1387)
Althepus	I 331
Amamra	(II b 1387)
Amaurobiidae	II b 1354
Amaurobioides	(II b 1387)
Amaurobius	II b 1354, (II b 1387)
Amazula	(II b 1390)
Amblyocarenum	I 170
Amblyothele	II a 310
Amerotritte	II b 1029
Ammonius	I 219
Ammoxenidae	II a 474
Ammoxenus	II a 474
Amphidraus	II b 958
Amphigyriodes	II b 1360
Amphigyrum	(II b 1390)
Amphinecta	II a 108
Amphirape	(II b 1390)
Amphissa	(II b 1390)
Amphyrape	(II b 1390)
Amusia	II a 382
Amyciaea	II a 809
Amycle	(II b 1390)
Amycus	II b 959, (II b 1390)
Anachemmis	II a 607
Anacornia	I 659
Anacotyle	I 681
Anadiastothele	(II b 1390)
Anagraphis	II a 352
Anagrina	II a 352
Anahita	II a 666, (II b 1390)
Analtella	II b 1301
Aname	I 194
Anamosa	(II b 1391)
Anania	(II b 1391)

	Seite:
Anapis	I 1014, (II b 1391)
Anapogonia	I 1014
Anaptomecus	II a 712
Anarrhotus	II b 1075
Anatea	II a 607
Anaurus	II b 968
Anawixia	I 778
Anaxibia	II b 1301
Anchacantha	(II b 1391)
Anchognatha	II b 729
Anchonastus	II a 730
Ancocoelus	I 395
Ancylochiros	I 225
Ancylometes	II a 144, (II b 1391)
Ancylorrhanis	I 391
Ancylotrypa	I 162
Andasta	I 968
Andrasta	(II b 1391)
Andromma	II a 580
Androthelopsis	I 177
Anelosimus	(II b 1391)
Anemesia	I 177
Aneplasa	II a 355
Anepsia	I 892, (II b 1391)
Anepsiada	I 208
Anerigone	I 714
Anetes	(II b 1391)
Angaeus	II a 751, (II b 1391)
Angaenus .. (err.)	II a 751, (II b 1717)
Anglia	(II b 1391)
Anibontes	I 515
Anicius	II b 1012
Anidiops	I 173
Anisacate	II b 1302
Anisaedus	I 375
Anisaspis	I 275, (II b 1391)
Anisaspoides	I 275
Anitsia	I 633
Annandaliella	I 274
Anoka	(II b 1391)
Anomalaria	(II b 1391)
Anomalomma	II a 310, (II b 1391)
Anoploscelus	I 258
Anopsicus	I 333
Anoteropis	II a 126
Anthrobia	(II b 1391)
Antillattus	II b 1021
Antistea	II a 99, (II b 1391)
Antrobia	I 653, (II b 1391)
Antrochares	I 149
Antrodiaetus	I 189
Anyphaena	II a 522, (II b 1391)
Anyphaenella	II a 530 (II b 1393)
Anyphaenoides	II a 530
Anzacia	II a 382, (II b 1393)
Apamamia	II b 1172
Apatita	II b 1033

Seite:

Aphantaulax .... II a 408, (II b 1393)
Aphantochilidae ..... II a 923
Aphantochilus ... II a 923, (II b 1393)
Aphantopelma ..... I 225
Aphonopelma ..... (II b 1393)
Aphyctoschaema II b 1360, (II b 1393)
Apneumonella ..... I 314
Apochinomma ..... II a 607
Apodrassodes ..... II a 383
Apodrassus ..... II a 383
Apolania ..... II a 667
Apollophanes ..... II a 766
Aporatea ..... II a 531
Aporoptychus ..... I 515 (II b 1393)
Apostenus ..... II a 563, (II b 1393)
Aprolagus ..... (II b 1393)
Aprusia ..... I 275
Apsectromerus ..... (II b 1393)
Aptostichus ..... I 170, (II b 1393)
Apyre ..... (II b 1393)
Apyretina ..... II a 804
Arachne ..... (II b 1394)
Arachnomura ..... II b 975
Arachnotermes ..... II b 939
Arachnoura ..... (II b 1394)
Arachnura ..... I 751, (II b 1394)
Arachosia ..... II a 531
Aracus ..... II a 409, (II b 1394)
Araegeus ..... II b 1034
Araeoncus ..... I 683, (II b 1394)
Arandisa ..... II a 712
Aranea ..... I 778 (II b 1394)
Araneidae ..... I 733
Araneus ..... I 778 (II b 1405)
Aranoethra ..... I 895
Arasia ..... II b 968
Arbanitis ..... I 174
Archaea ..... I 1015
Archaeidae ..... I 1015
Archaeodictyna ..... II b 1302
Archemorus ..... I 909
Archipirata ..... II a 126
Architis ..... II a, 110, (II b 1410)
Archizelotes ..... (II b 1411)
Arcidius ..... (II b 1411)
Arctella ..... (II b 1411)
Arctilaria ..... I 653
Arctosa ..... II a 225, (II b 1411)
Arctosippa ..... II a 231
Arctosomma ..... II a 231
Arcys ..... (II b 1412)
Argenna ..... II b 1302, (II b 1412)
Argennina ..... II b 1303, (II b 1412)
Argiope ..... (II b 1412)
Argistes ..... IIa 564
Argoctenus ..... II a 636, (II b 1412)
Argus ..... (II b 1412)

Seite:

Argyope ..... I 733, (II b 1413)
Argyopes ..... (II b 1414)
Argyrodes ..... (II b 1415)
Argyrodina ..... I 429, (II b 1415)
Argyroelus ..... I 440
Argyroepeira ..... (II b 1416)
Argyroneta ..... II a 108, (II b 1416)
Argyronetidae ..... II a 108
Ariadna ..... I 304, (II b 1417)
Ariamnes ..... I 440 (II b 1417)
Arindas ..... II b 951
Aristerus ..... II a 581
Ariston ..... II b 1335
Arkalosula ..... II a 231
Arkys ..... I 909, (II b 1417)
Armadalia ..... I 162
Arocha ..... I 1017
Arochoides ..... I 1024
Arrecerus ..... (II b 1417)
Artabrus ..... II b 1075
Artama ..... (II b 1417)
Artamus ..... (II b 1417)
Artanes ..... (II b 1418)
Artema ..... I 333, (II b 1418)
Artonis ..... I 446
Artoria ..... II a 232, (II b 1418)
Artoriella ..... II a 233
Artoriellula ..... II a 233
Aruana ..... II b 968
Arushina ..... II b 1303
Asadipus ..... II a 581, (II b 1418)
Asagena ..... I 395, (II b 1418)
Asagenella ..... I 397
Asamonea ..... II b 927, (II b 1418)
Asaphobelis ..... II b 994
Asaracus ..... II b 1068
Ascalus ..... (II b 1418)
Asceua ..... (II b 1418)
Ascuris ..... (II b 1418)
Ascurisoma ..... II a 752
Ascyltus ..... II b 1023, (II b 1418)
Asemesthes ..... II a 355, (II b 1418)
Asemonea ..... (II b 1418)
Asemostera . [fehlt: II a 43] (II b 1715)
Ashantia ..... I 225
Ashtabula ..... II b 1185, (II b 1418)
Aspidolasius ..... I 893
Astaenorchestes ..... II b 985
Asthenargus ..... I 633
Asthenoctenus ..... II a 637
Astia ..... II b 968, (II b 1418)
Astratea ..... (II b 1418)
Atalia ..... (II b 1418)
Ataulfo ..... (II b 1419)
Atea ..... (II b 1419)
Atelacantha ..... (II b 1419)
Atelidea ..... I 999

Seite:

Atelolathys ..... II b 1303
Atelurius ..... II b 1184
Athamas ..... II b 993
Atigale ..... (II b 1419)
Atimiosa ..... I 923
Atkinsonia ..... (II b 1419)
Atmetochilus ..... I 165
Atmosphyrus ..... II b 1016
Atrax ..... I 207
Atrophothele ..... I 213
Atrytone ..... (II b 1419)
Atta ..... (II b 1419)
Attacobius ..... II a 581
Attidops ..... (II b 1419)
Attinella ..... II b 1240
Attulus ..... II b 1240, (II b 1419)
Attus ..... (II b 1419)
Atypa ..... (II b 1432)
Atypena ..... I 634
Atypidae ..... I 210
Atypoides ..... I 189, (II b 1432)
Atypus ..... I 210, (II b 1432)
Auchicybaeus ..... II a 85
Audifia ..... I 446
Augusta ..... (II b 1432)
Augustaea ..... II b 1033
Aulacocyba ..... I 711
Auletta ..... I 516
Aulonia ..... II a 233, (II b 1432)
Aussereria ..... (II b 1432)
Austrachelas ..... II a 582
Australaena ..... II a 531
Australoonops ..... I 276
Austrocantha ..... (II b 1432)
Austrodomus ..... II a 343
Austrohahnia ..... II a 100
Austrophaea ..... II a 582
Auximella ..... II b 1361
Auximus ..... II b 1361, (II b 1432)
Avakubia ..... II b 1143
Avelis ..... II a 827
Avella ..... (II b 1433)
Avellopsis ..... II b 1335
Avicosa ..... II a 234
Avicularia ..... I 253, (II b 1433)
Avicuscodra ..... I 256
Aviola ..... II a 100
Avitus ..... II b 1186
Axyracrus ..... II a 531
Aymarella ..... II b 1362
Aysenia ..... II a 476
Aysha ..... II a 532, (II b 1433)
Azilia ..... I 923

Bacelarella ..... II b 994
Bacillocnemis ..... II a 767
Badumna ..... II b 1362, (II b 1433)

Seite:

Baerella ..... II b 994, (II b 1433)
Baeriella ..... II a 580
Bagheera ..... II b 1186
Balla ..... (II b 1433)
Ballognatha ..... II b 971
Ballus ..... II b 971, (II b 1433)
Balmaceda ..... II b 1012, (II b 1433)
Bancroftiana ..... I 177
Banksetosa ..... II b 975
Barrisca ..... II a 43
Barronopsis ..... (II b 1433)
Barychelidae ..... I 213
Barychelus ..... I 213
Barylestis ..... II a 712
Baryphas ..... II b 1042
Baryphyma ..... I 685, (II b 1433)
Bassania ..... (II b 1433)
Bassaniana ..... II a 866
Bassaniodes ..... II a 866
Batesiella ..... I 258
Bathippus ..... II b 1075
Bathyphantes ..... I 569 (II b 1433)
Battalus ..... II a 383
Bavia ..... II b 979, (II b 1435)
Baviola ..... II b 980
Beata ..... II b 1006, (II b 1435)
Beccaria ..... II b 968
Bedriacum ..... (II b 1435)
Belippo ..... II b 939
Belisana ..... (II b 1435)
Belliena ..... II b 1022
Bellinda ..... (II b 1435)
Bellota ..... II b 1036
Bemmeris ..... I 164
Berinda ..... II a 383
Berlandia ..... II a 712, (II b 1435)
Berlandina ..... II a 357
Berlandiella ..... II a 767
Bertrana ..... I 776
Bessia ..... I 164
Bianor ..... II b 1230, (II b 1435)
Bigois ..... II a 100
Billima ..... I 968
Bindax ..... II b 991
Bion ..... (II b 1435)
Birabenia ..... II a 310
Bistrigus ..... I 219
Bizone ..... (II b 1435)
Bizonella ..... II b 939
Blabomma ..... II a 43
Blaisea ..... II b 1143
Blakistonia ..... I 173
Blaniargus ..... I 712, (II b 1435)
Blanioonops ..... I 276
Blechroscelis ..... I 347
Boagrius ..... I 375
Bocus ..... II b 939

Seite:

Boebe ..... (II b 1435)
Boethoportia ..... II b 933
Boethus ..... II b 933
Bokokius ..... II b 1023
Bolepthyphantes ..... (II b 1435)
Boliscodes ..... II a 827
Boliscus ..... II a 827
Bolostromus ..... I 164, (II b 1435)
Bolyphantes ..... I 538, (II b 1436)
Bomis ..... II a 828, (II b 1436)
Bona ..... (II b 1436)
Bonacosa ..... II a 237
Bonna ..... II a 410
Bootes ..... (II b 1436)
Borboropactus ..... II a 752
Boreoechemus ..... II a 410
Bothriocyrtum ..... I 157
Bothriogaster ..... (II b 1436)
Botryogaster ..... (II b 1436)
Brachyanillus ..... II a 564
Brachybothrium ..... I 189
Brachycentrum ..... (II b 1436)
Brachydrassodes ..... (II b 1436)
Brachyonopus ..... I 219
Brachyphaea ..... II a 582
Brachypelma ..... (II b 1436)
Brachythele ..... I 196, (II b 1436)
Brachytheliscus ..... (II b 1436)
Bradystichus ..... II a 314
Brancus ..... II b 1043
Brattia ..... I 705
Breda ..... II b 1253
Bredana ..... II b 1255
Bredops ..... II b 1255
Brettus ..... (II b 1437)
Brevilabus ..... II a 154
Bristowia ..... II b 1028
Brommella ..... (II b 1437)
Brontosauriella ..... I 393
Browningella ..... II a 806
Brucharachne ..... I 281
Bryantella ..... II b 1186
Bucranium ..... II a 923, (II b 1437)
Bueltia ..... (II b 1437)
Bunocrania ..... I 864
Butantania ..... I 225
Bythocrotus ..... II b 1108

Cabanadrassus ..... II a 359
Caedmon ..... I 193
Caelotes ..... (II b 1437)
Caerostris ..... I 887, (II b 1437)
Caesetius ..... I 372, (II b 1437)
Caira ..... (II b 1437)
Calamistrula ..... II b 1379
Calapnita ..... (II b 1437)
Calathotarsus ..... I 193

Seite:

Calculus ..... I 276
Caledonia ..... I 659
Calheirosia ..... I 311
Calilena ..... II a 44
Calilepis ..... (II b 1437)
Calisoga ..... I 171
Calleva ..... II b 1363
Callevophthalmus ..... II b 1363
Callevopsis ..... II b 1363
Calliethera ..... (II b 1437)
Callietherus ..... (II b 1437)
Callilepis ..... II a 380, (II b 1437)
Callinethis ..... (II b 1438)
Callioplus ..... II b 1363, (II b 1438)
Callitrichia ..... I 685
Callobius ..... II b 1364
Callyntropus ..... (II b 1438)
Caloctenus ..... II a 667, (II b 1438)
Calodipoena ..... I 417
Calommata ..... I 212, (II b 1438)
Calopelma ..... I 225
Calositticus ..... (II b 1438)
Calydna ..... (II b 1438)
Calymmaria ..... II a 45, (II b 1439)
Camaricus ..... II a 830, (II b 1439)
Cambalida ..... II a 609
Cambridgea ..... II a 109, (II b 1439)
Camilla ..... (II b 1439)
Camillana ..... (II b 1439)
Camillina ..... II a 410
Camponia ..... II b 1242
Campostichomma ..... II a 85
Campostichommides ..... II a 86
Camptoscaphiella ..... I 282
Camptotarsus ..... (II b 1439)
Canama ..... II b 1024, (II b 1439)
Cantuaria ..... I 166
Cantuarides ..... I 166
Caphaeris ..... (II b 1439)
Capheris ..... I 272
Capidava ..... II b 1077
Caponia ..... I 315
Caponiidae ..... I 315
Caponina ..... I 315
Carabella ..... II b 975
Caracladus ..... I 690, (II b 1439)
Carepalxis ..... I 864, (II b 1439)
Caridrassus ..... II a 411
Caripeta ..... (II b 1439)
Caripetella ..... II a 110
Carrhotus ..... II b 1043, (II b 1439)
Carteroniella ..... II a 476
Carteronius ..... II a 476
Caseola ..... (II b 1439)
Castaneira ..... (II b 1439)
Castanilla ..... II a 609
Castianeira ..... II a 609, (II b 1439)

Seite:

Castianeirodes .....(II b 1439)
Casturopoda ..... (II b 1440)
Catabrithorax ..... I 715, (II b 1440)
Cataxia ..... I 162
Catuna ..... II a 767
Cebrenis ..... (II b 1440)
Cebrenninus .... II a 753, (II b 1440)
Cebrennus ..... II a 688
Cedicus ..... II a 86, (II b 1440)
Ceglusa ..... II b 1149
Celaenia ..... I 907, (II b 1440)
Celaetycheus ..... II a 637
Celidotopus ..... (II b 1440)
Cenobiopelma ..... I 220
Centroctenus ..... II a 638
Centromeria ..... (II b 1440)
Centromerides ..... (II b 1440)
Centromerinus ..... (II b 1440)
Centromerita ..... I 525
Centromerus ..... I 525, (II b 1440)
Centropelma ..... (II b 1440)
Centrothele ..... II a 582
Cephalobares ..... I 446
Cepheia ..... I 393
Cephyrina .. [err. II a 769], (II b 1717)
Ceraaarachne ..... II a 742
Cerarachne ..... (II b 1440)
Ceraticelus ..... I 604, (II b 1440)
Ceratina ..... (II b 1440)
Ceratinella ..... I 607, (II b 1441)
Ceratinodes ..... (II b 1441)
Ceratinops ..... I 611
Ceratinopsidis ..... I 705
Ceratinopsis ..... I 705, (II b 1441)
Ceratogyrus ..... I 268
Ceratopholcus ..... I 334
Ceratoscelis ..... (II b 1441)
Cerbalus ..... II a 688
Cercetius ..... II a 689
Cercidia ..... I 865, (II b 1441)
Cercis ..... (II b 1441)
Cerinius ..... (II b 1441)
Ceriomura ..... II b 975
Cerionesta ..... II b 1255
Cerocida ..... I 446
Ceropelma ..... I 225
Ceryerda ..... II a 605
Cesonia ..... II a 412
Cestotrema ..... I 217
Cethegus ..... I 208
Ceto ..... II a 582, (II b 1441)
Cetonana ..... II a 584
Cetratus ..... II a 806
Cetuma ..... (II b 1441)
Chaco ..... I 220
Chacoca ..... I 417
Chaerea ..... II b 1303

Seite:

Chaetacis ..... I 951
Chaetopelma ..... I 225
Chaetorrhombus ..... I 226
Chalcolecta ..... II b 987
Chalcoscirtus ... II b 1237, (II b 1441)
Chalcotropis ..... II b 994
Chaleposa ..... II a 310
Chalinura ..... (II b 1441)
Chapoda ..... II b 995
Chariobas ..... I 354
Charippus ..... II b 699
Charis ..... (II b 1441)
Charitonowia ..... (II b 1441)
Charminus ..... II a 110
Chasidamna ..... (II b 1441)
Chasmocephalon ..... I 1014
Chedima ..... I 375
Cheiracanthium .. II a 476, (II b 1441)
Cheliferoides ..... II b 1186
Chemmis ..... II a 618, (II b 1442)
Cheniseo ..... I 659
Chenistonia ..... I 197, (II b 1442)
Chersis ..... (II b 1442)
Chiasmopes ..... II a 110
Chilobrachys ..... I 262
Chinestela ..... I 764
Chinoscopus ..... II b 927
Chira ..... (II b 1442)
Chiracanthium ..... (II b 1442)
Chiracanthops ..... II a 490
Chirotecia ..... II b 1037, (II b 1442)
Chirothecia ..... (II b 1442)
Chloridusa ..... II b 995
Chocorua ..... I 690
Chondronephila ..... (II b 1443)
Chorilycosa ..... II a 237
Chorizomma ..... II a 47, (II b 1443)
Chorizommoides ..... II a 47
Chorizopes ..... I 446
Chorizops ..... I 146
Chorizopsis ..... (II b 1443)
Chresiona ..... II a 86
Chrosioderma ..... II a 730
Chrosiothes ..... I 446, (II b 1443)
Chrysilla ..... II b 1149
Chrysometa ..... I 913, (II b 1443)
Chrysothrix ..... (II b 1443)
Chrysso ..... (II b 1443)
Cicirra ..... II a 47
Cicurata ..... (II b 1443)
Cicurella ..... (II b 1443)
Cicurina ..... II a 47, (II b 1443)
Cicurona ..... (II b 1443)
Cicurusta ..... (II b 1443)
Cicynethus ..... I 354
Cineas ..... II b 1033
Cineta ..... I 675

Seite:

Cinetomorpha ..... (II b 1443)
Ciniflella ..... II b 1304
Ciniflo ..... (II b 1443)
Ciris ..... (II b 1444)
Cispinilus ..... II a 110
Cispiolus ..... II a 111
Cispiomma ..... II a 111
Cispius ..... II a 111, (II b 1444)
Cithaeron ..... II a 475
Cithaeronidae ..... II a 475
Citharacanthus .... I 248, (II b 1444)
Citharischius ..... I 258
Citharoceps ..... I 308
Citharognathus ..... I 273
Citharoscelus ..... (II b 1444)
Citilycosa ..... II a 238
Cladomelea ..... I 900
Cladonotus ..... (II b 1444)
Cladycnis ..... II a 112
Clasta ..... (II b 1444)
Clastes ..... II a 729, (II b 1444)
Cleocnemis ..... II a 767
Clitistes ..... I 708
Clitolyna ..... I 708
Clitotrema ..... I 164
Closterochilus ..... I 190
Clotho ..... (II b 1444)
Clubiona ..... II a 490, (II b 1444)
Clubionidae ..... II a 476
Clubionina ..... II a 518
Cluilius ..... (II b 1448)
Clynotis ..... II b 1255
Clynotoides ..... II b 1256
Clytaetra ..... I 925
Cnephalocotes ..... I 673, (II b 1448)
Cnodalia ..... I 866
Cobanus ..... II b 961
Cocala ..... (II b 1449)
Cocalodes ..... II b 936
Cocalus ..... II b 934, (II b 1449)
Coccorchestes .. II b 1148, (II b 1449)
Cochlembolus ..... I 660
Codeta ..... II b 957
Coelogenium ..... I 268
Coelossia ..... I 903
Coelotes ..... II a 53, (II b 1449)
Coenoptychus .... II a 618, (II b 1450)
Coenothele ..... (II b 1450)
Coenypha ..... II a 753
Colaxes ..... II b 937
Coleosoma ..... (II b 1450)
Collacantha ..... (II b 1450)
Collina ..... I 866
Collinsia ..... I 653
Colobocyba ..... I 698, (II b 1450)
Colonus ..... (II b 1450)
Colopea ..... I 380

Seite:

Colophon ..... (II b 1450)
Colopsus ..... II b 1078
Colyttus ..... II b 1078
Comaroma ..... I 604
Commoris ..... II b 995
Compsodecta ..... II b 1143
Compsopus ..... I 375
Conopistha ..... I 429, (II b 1450)
Consingis ..... II b 989
Conothele ..... I 146
Copa ..... II a 619, (II b 1450)
Copocrossa ..... II b 986
Coptoprepes ..... II a 535, (II b 1450)
Corambis ..... II b 1256
Coras ..... II a 58, (II b 1450)
Corasoides ..... II a 61
Coreidon ..... II a 61
Coremiocnemis ..... I 264
Coreorgonal ..... I 621
Coressa ..... (II b 1450)
Coriarachne ..... II a 831, (II b 1450)
Corimaethes ..... II a 347
Corinna ..... II a 593, (II b 1450)
Corinnomma ..... II a 619, (II b 1451)
Corinoctenus ..... II a 671
Cornicularia ..... I 660, (II b 1451)
Corynethrix ..... II a 828, (II b 1451)
Coryphaeolana ..... I 653, (II b 1451)
Coryphaeolanus ..... (II b 1451)
Coryphaeus ..... (II b 1451)
Coryphasia ..... II b 995
Corypheus ..... (II b 1451)
Coryssiphus ..... II a 564
Coryssocnemis ..... I 348
Corythalia ..... II b 1099, (II b 1451)
Coscinida ..... I 447
Cosmopelma ..... I 220
Cosmophasis ... II b 1150, (II b 1451)
Cotinusa ..... II b 975
Cotyora ..... I 617
Cragus ..... II a 535, (II b 1451)
Craspedisia ..... I 397
Cratorrhagus ..... I 226, (II b 1451)
Cresmatoneta ..... I 568
Creugas ..... (II b 1451)
Crocodilosa ..... II a 238
Crosbyana ..... (II b 1451)
Crosbyarachne ..... I 699
Crosbyellum ..... II a 359
Crossopriza ..... I 334
Crozetulus ..... I 1014
Crulsia ..... II b 1187
Crustulina ..... I 397, (II b 1451)
Cryphoeca ..... II a 61, (II b 1451)
Crypsidromus ..... I 226, (II b 1452)
Cryptoceroides ..... II a 923
Cryptodrassus ..... II a 384

Seite:

Cryptoerithus ..... II a 343
Cryptoleptes ..... (II b 1452)
Cryptothele ..... I 355
Ctena ..... (II b 1452)
Ctenidae ..... II a 636
Ctenium ..... I 409, (II b 1452)
Cteniza ..... I 157, (II b 1452)
Ctenizidae ..... I 146
Ctenochelus ..... I 165
Ctenolophus ..... I 149, (II b 1452)
Ctenomma ..... II a 662
Ctenonemus ..... I 165
Ctenonima ..... II a 601
Ctenophora ..... (II b 1452)
Ctenophthalmus ..... (II b 1452)
Ctenus ..... II a 638, (II b 1452)
Cubanella ..... I 764
Cupa ..... II a 754
Cupiennius ..... II a 657, (II b 1453)
Curubis ..... II b 996
Cyathidea ..... I 967
Cyatholipus ..... I 968
Cybaeina ..... II a 86
Cybaeodamus ..... II a 87
Cybaeodes ..... II a 581
Cybaeolus . [fehlt: II a 87], (II b 1715)
Cybaeopsis ..... II a 87
Cybaeota ..... II a 87
Cybaeozyga ..... II a 88
Cybaeus ..... II a 88, (II b 1453)
Cybele ..... (II b 1454)
Cycais ..... II a 92
Cyclocosmia ..... I 146, (II b 1454)
Cycloctenus ..... II a 314, (II b 1454)
Cyclosa ..... I 752, (II b 1454)
Cyclosternum ..... I 227, (II b 1454)
Cyclothoracides [err. I 228], (II b 1715)
Cyclothoracoides .. I 228, (II b 1454)
Cyclothorax ..... (II b 1454)
Cydippe ..... (II b 1454)
Cydonia ..... (II b 1454)
Cydrela ..... I 373, (II b 1454)
Cydrelichus ..... I 374, (II b 1454)
Cylistella ..... II b 973
Cyllobelus ..... II b 1152, (II b 1454)
Cyllodania ..... II b 983
Cyllognatha ..... I 447
Cyllopodia ..... (II b 1454)
Cylphosa ..... II a 360, (II b 1454)
Cymbacha ..... II a 829
Cymbachina ..... II a 866
Cynapes ..... II b 980
Cynathea ..... II a 831
Cynosa ..... II a 239, (II b 1717)
Cyphagogus ..... (II b 1454)
Cyphalonotus ..... I 903
Cyphonephila ..... (II b 1454)

Seite:

Cyphonisia ..... I 213
Cyrba ..... II b 984, (II b 1455)
Cyrene ..... (II b 1455)
Cyriocosmus ..... I 228
Cyrioctea ..... II a 92
Cyriogonus ..... II a 836, (II b 1455)
Cyriopagopus ..... I 273
Cyrsillus ..... (II b 1455)
Cyrtarachne ..... I 895, (II b 1455)
Cyrtauchenius ..... I 166, (II b 1456)
Cyrtocarenum ..... I 157, (II b 1456)
Cyrtocephala ..... (II b 1456)
Cyrtocephalus ..... (II b 1456)
Cyrtogaster ..... (II b 1456)
Cyrtognatha ..... I 971
Cyrtogrammomma ..... I 214
Cyrtonota ..... (II b 1456)
Cyrtopholis ..... I 228, (II b 1456)
Cyrtophora ..... I 747, (II b 1456)
Cyrtosternum ..... (II b 1457)
Cytaea ..... II b 1024, (II b 1457)

Dactylopisthes ..... I 690, (II b 1457)
Damarchodes ..... I 171
Damarchus ..... I 171
Damastes ..... II a 671, (II b 1457)
Damoetas ..... II b 1037
Dandridgea ..... (II b 1457)
Dapanus ..... (II b 1457)
Daradius ..... (II b 1457)
Dasumia ..... I 291, (II b 1457)
Dasycyptus ..... II b 1078
Dasynephila ..... (II b 1457)
Dasyophrys ..... II b 962
Daturina ..... (II b 1457)
Davus ..... I 238
Decaphora ..... (II b 1457)
Decetia ..... (II b 1457)
Defectrix ..... II a 682
Deineresus ..... (II b 1457)
Deinognatha ..... (II b 1457)
Deinopidae ..... II b 1350
Deinopis ..... II b 1350, (II b 1457)
Deione ..... I 761
Dekana ..... I 197, (II b 1457)
Delectrix ..... (II b 1458)
Delena ..... II a 672, (II b 1458)
Deliana ..... (II b 1458)
Deliochus ..... I 925
Delopelma ..... (II b 1458)
Deloripa ..... II b 1256
Delorrhipis ..... I 621, (II b 1458)
Delozeugma ..... (II b 1458)
Deltoclita ..... II a 863
Dema ..... (II b 1458)
Demogenes ..... II a 866
Demolodes ..... II a 126

Seite:

Demonax ..... (II b 1458)
Demotarbus ..... (II b 1458)
Dendricon ..... (II b 1458)
Dendrolycosa .... II a 112, (II b 1458)
Dendryphantes . II b 1187, (II b 1458)
Depreissia ..... II b 1034
Dermochrosia ..... II a 730
Derxema ..... II b 1366
Descanso ..... II b 1037
Desidiopsis ..... II a 93
Desis ..... II a 93, (II b 1460)
Devade ..... II b 1304
Dexippus ..... II b 1256
Deza ..... (II b 1460)
Dia ..... (II b 1460)
Diactenus ..... II a 658
Diadocyrtus ..... I 176
Diaea ..... II a 867, (II b 1460)
Diagondas ..... II b 1045
Diahogna ..... II a 239
Diallomus ..... II a 662
Diana ..... (II b 1461)
Diaphorocellus ..... (II b 1461)
Diaphractus ..... II a 413, (II b 1461)
Diapontia ..... II a 240, (II b 1461)
Diaprocorus ..... I 447
Diaprograpta ..... II a 555
Diastanillus ..... I 699
Diblemma ..... I 282
Dicantha ..... (II b 1461)
Dicroneon ..... (II b 1461)
Dicrostichus ..... I 900
Dictis ..... (II b 1461)
Dictyna ..... II b 1304, (II b 1461)
Dictynidae ..... II b 1300
Dictynina ..... (II b 1463)
Dictynoides ..... (II b 1463)
Dictynomorpha ..... II b 1326
Dictyolathys ..... (II b 1463)
Dicymbium ..... I 622, (II b 1463)
Dicyphus ..... (II b 1463)
Diestus ..... II a 601
Dieta ..... II a 806
Dietopsa ..... II a 807
Dietopsis ..... (II b 1463)
Dietrichia ..... I 612
Diguetia ..... I 322
Dimazion ..... I 217
Dimizonops ..... II a 872
Dinamius ..... (II b 1463)
Dinattus ..... II b 1022
Dingosa ..... II a 240
Dinopis ..... (II b 1463)
Diolenella ..... (II b 1463)
Diolenius ..... II b 987, (II b 1463)
Diops ..... (II b 1464)
Diores ..... I 355

Seite:

Diotima ..... (II b 1464)
Diphya ..... I 924, (II b 1464)
Diplacanthopoda ..... II b 989
Diplocanthopoda ..... (II b 1464)
Diplocentria ..... I 575, (II b 1464)
Diplocephalus ..... I 690, (II b 1464)
Diploglena ..... I 315
Diplostyla ..... (II b 1465)
Diplothele ..... I 217
Diplothelopsis ..... I 218
Diplotychus ..... II a 807
Diplura ..... I 198, (II b 1465)
Dipluridae ..... I 194
Dipoena ..... I 417, (II b 1465)
Dipoenoides ..... I 424
Dipoenura ..... I 424, (II b 1465)
Dirksia ..... (II b 1465)
Dischiropus ..... (II b 1465)
Discocnemius ..... II b 988
Disembolus ..... I 664
Dismodicus ..... I 627, (II b 1465)
Dismodiscus ..... (II b 1465)
Distillus ..... (II b 1465)
Dixomys ..... (II b 1465)
Dolichognatha ..... I 924, (II b 1465)
Dolichoneon ..... II b 1238
Dolichoscaptus ..... (II b 1466)
Dolichosternum ..... I 210
Dolichothele ..... I 220
Doliomalus ..... II a 474
Dolomedes ..... II a 126, (II b 1466)
Dolopoeus ..... (II b 1467)
Dolophones ..... I 909
Dolopaeus ..... (II b 1467)
Dolothymus ..... (II b 1467)
Domatha ..... II a 805
Donacochara ..... I 536
Donaldius ..... II b 1012
Donatimus ..... II b 1033
Donoessus ..... II b 996
Donuca ..... (II b 1467)
Donuea ..... II a 620
Dorceus ..... II b 1291
Dorymetaecus ..... II a 518
Doryonychus ..... I 972
Dossenus ..... II a 136, (II b 1467)
Drances ..... (II b 1467)
Drapeta ..... (II b 1467)
Drapetisca ..... I 540, (II b 1467)
Drassina ..... II a 384
Drassinella ..... II a 384, (II b 1467)
Drassodella ..... II a 384, (II b 1467)
Drassodes ..... II a 384, (II b 1467)
Drassus ..... (II b 1468)
Drassyllochemmis ..... II a 620
Drassyllus ..... II a 413, (II b 1473)
Drepanephora ..... (II b 1473)

Seite:

Drepanodus ..... (II b 1473)
Dresserus ..... II b 1292
Drexelia ..... I 764
Drymusa ..... I 321
Dryphias ..... II b 1232, (II b 1473)
Dryptopelma ..... I 230
Dryptopelmides ..... I 230
Dudasia ..... II b 996
Dugesiella ..... I 238, (II b 1473)
Dyarcyops ..... I 176
Dyction ..... (II b 1473)
Dynamius ..... (II b 1473)
Dyomonomma ..... (II b 1473)
Dyrines ..... II a 136
Dyrinoides ..... II a 136
Dyschiriognatha ..... I 994
Dysdera ..... I 291, (II b 1473)
Dysderidae ..... I 291
Dysderina ..... I 282, (II b 1475)
Dysmonomma ..... (II b 1475)

Ebaea ..... (II b 1475)
Ebo ..... II a 768, (II b 1475)
Eboria ..... I 681
Ebrechtella ..... II a 746
Echelcus ..... I b 996
Echemella ..... II a 417
Echemoides ..... II a 418
Echemus ..... II a 418, (II b 1475)
Echinussa ..... II b 1154
Ectatosticta ..... II b 1278, (II b 1475)
Edenticosa ..... II a 241
Edricus ..... I 761, (II b 1475)
Efate ..... II b 1022
Egilona ..... (II b 1475)
Eidmannella ..... I 391
Eilica ..... II a 421, (II b 1475)
Eilicina ..... II a 421
Elaphidion ..... (II b 1475)
Elaphipus ..... (II b 1475)
Elaphopus ..... (II b 1475)
Elassoctenus ..... II a 668
Elaver ..... (II b 1475)
Eleleis ..... IIa 343
Emathis ..... II b 992, (II b 1475)
Emblyna ..... (II b 1475)
Emenista ..... I 536, (II b 1475)
Emertonius ..... II b 939
Emmenomma ..... II a 94
Emmenophrys ..... (II b 1475)
Empanda ..... II b 1013
Emplesiogonus ..... II a 807
Enacrosoma ..... I 952
Encolpius ..... II b 962
Encymachus ..... II b 996
Encyocratella ..... I 258
Encyocrates ..... I 258

Seite:

Encyocrypta ..... (II b 1475)
Encyosaccus ..... I 935
Enidia ..... (II b 1475)
Enna ..... II a 113
Enoploctenus ..... II a 662, (II b 1476)
Enoplognatha ..... I 400, (II b 1476)
Enoplomischus ..... II b 1035
Enrico ..... I 167
Entelecara ..... I 624, (II b 1476)
Enthorodera ..... I 403
Entomothele ..... (II b 1476)
Entypesa ..... I 198
Enyo ..... (II b 1476)
Eodelena ..... (II b 1476)
Eordea ..... I 699
Epecthina ..... I 1015
Epecthinula ..... I 1015
Epeciris ..... I 284
Epeira ..... (II b 1476)
Epeiroides ..... (II b 1491)
Epeirotypus ..... I 963
Eperigone ..... I 716, (II b 1491)
Epeus ..... (II b 1491)
Ephebopus ..... I 258
Ephippus ..... (II b 1492)
Epiblemum ..... (II b 1492)
Epicadinus ..... II a 754, (II b 1492)
Epicadus ..... II a 755, (II b 1492)
Epiceraticelus ..... I 610
Epicharitus ..... II a 421
Epicharmus ..... (II b 1492)
Epiciubiona ..... (II b 1492)
Epidelaxia ..... II b 997
Epidius ..... II a 755
Epikurtomma ..... II a 421
Epimecinus ..... II b 1366
Epinga ..... (II b 1492)
Epidesis ..... I 220
Episina ..... (II b 1492)
Episinopsis ..... I 447
Episinus ..... I 448, (II b 1492)
Epizelotes ..... (II b 1492)
Epocilla ..... II b 1154, (II b 1492)
Erasinus ..... II b 1068, (II b 1492)
Erasmia ..... (II b 1492)
Erematttus ..... (II b 1492)
Eresa ..... (II b 1492)
Eresidae ..... II b 1291
Eresus ..... II b 1293, (II b 1492)
Ergane ..... II b 997, (II b 1493)
Ergatis ..... (II b 1494)
Eriauchenus ..... (II b 1494)
Erica ..... II b 951
Ericulus ..... (II b 1494)
Eridantes ..... I 693
Erigone ..... I 719, (II b 1494)
Erigonella ..... (II b 1503)

Seite:

Erigonidium ..... (II b 1503)
Erigonoplus ..... I 617, (II b 1503)
Erigonopsis ..... I 699
Eriodon ..... (II b 1503)
Eriophora ..... I 866, (II b 1503)
Eripus ..... (II b 1504)
Eris ..... (II b 1504)
Erissoides ..... II a 746
Erissus ..... II a 746, (II b 1504)
Ero ..... I 1017, (II b 1504)
Ervig ..... (II b 1504)
Erycina ..... (II b 1504)
Erycinicola ..... I 576
Erygona ..... (II b 1504)
Erythrophora ..... (II b 1504)
Erythrophorus ..... (II b 1504)
Erythropoicila ..... I 258
Escambia ..... (II b 1505)
Estrandia ..... I 576
Eterosonycha ..... I 357
Ethilla ..... (II b 1505)
Ethobuella ..... II a 62
Euagrus ..... I 203
Euarcha ..... (II b 1505)
Euathlus ..... I 238
Eubrachycercus ..... I 220
Eucamptopus ..... II a 136
Eucharia ..... (II b 1505)
Eucharium ..... (II b 1505)
Eucratoscelus ..... I 268
Eucta ..... I 972, (II b 1505)
Eucteniza ..... I 167
Euctimena ..... (II b 1505)
Eucyrtops ..... (II b 1505)
Eudiplura ..... I 199
Euetria ..... (II b 1505)
Eugasmia ..... II b 1045
Euglyptila ..... I 903
Eugnatha ..... (II b 1505)
Euharmonicon ..... I 199
Eulabes ..... (II b 1506)
Eulaira ..... I 728
Eumenophorus ..... I 258
Eunesiotes ..... (II b 1506)
Euophrys ..... II b 1172, (II b 1506)
Euoplos ..... I 162
Eupalaestrus ..... I 250
Eupalia ..... (II b 1507)
Eupalina ..... II b 991
Euphrictus ..... I 230
Eupolis ..... I 516
Euprosthenonima ..... II a 113
Euprosthenops ... II a 113, (II b 1507)
Euryattus ..... II b 1026
Eurychoera ..... II a 115
Euryclubiona ..... (II b 1507)
Eurycorma ..... (II b 1507)

Seite:

Eurymachus ..... (II b 1508)
Euryopis ..... I 450, (II b 1508)
Eurypelma ..... I 238, (II b 1508)
Eurypelmella ..... I 243
Eurysoma ..... (II b 1508)
Eusamuzia ..... (II b 1508)
Eusparassidae ..... II a 671
Eusparassus ..... II a 672, (II b 1508)
Eustala ..... I 764, (II b 1509)
Eustichothryx ..... (II b 1509)
Eustirognathus ..... (II b 1509)
Eustiromastix .. II b 1079, (II b 1509)
Euthycaelus ..... I 220
Eutichides ..... I 167, (II b 1509)
Eutichurus ..... II a 518, (II b 1509)
Eutittha ..... (II b 1509)
Eutychides ..... (II b 1509)
Eutychuroides ... II a 518, (II b 1509)
Euxinella ..... I 404
Evagrella ..... I 203
Evagrus ..... (II b 1509)
Evansia ..... I 700, (II b 1509)
Evarcha ..... II b 1046, (II b 1509)
Evenus ..... (II b 1509)
Evetria ..... (II b 1509)
Evippa ..... II a 154, (II b 1509)
Evippella ..... II a 155
Evippomma ..... II a 155
Evophrys ..... (II b 1509)
Exechocentrus ..... I 903
Exechophysis ..... I 612, (II b 1509)
Exopalystes ..... II a 725

Fageia ..... II a 769
Fageiella ..... I 576
Faiditus ..... (II b 1510)
Falconeria ..... (II b 1510)
Favilla ..... (II b 1510)
Fecenia ..... II b 1376
Felsina ..... II a 828
Ferrieria ..... II a 570
Festucula ..... II b 1256
Filistata ..... II b 1278, (II b 1510)
Filistatidae ..... II b 1278
Filistatinella ..... II b 1282
Filistatoides ..... (II b 1510)
Firmicus ..... II a 833, (II b 1510)
Flacilla ..... (II b 1510)
Flacillula ..... II b 1253
Flanona ..... II a 241
Floricomus ..... I 610, (II b 1510)
Florinda ..... I 541
Floronia ..... I 541, (II b 1510)
Fluda ..... II b 956
Formicina ..... (II b 1510)
Formicinina ..... (II b 1510)
Formicinoides ..... I 454

Seite:

Forsythula ..... I 218
Freya ..... II b 1079, (II b 1510)
Frigga ..... (II b 1511)
Fritzia ..... (II b 1511)
Friula ..... I 897
Frontella ..... I 729
Frontina ..... (II b 1511)
Frontinella ..... (II b 1511)
Fuentes ..... II b 1013, (II b 1511)
Fufius ..... I 199

Gaius ..... I 173
Galapagosa ..... II a 241
Galena .....(II b 1511)
Galeosoma ..... I 150
Galliena ..... II a 314
Gallieniella ..... II a 605
Gamasomorpha .... I 284, (II b 1511)
Ganesa ..... (II b 1511)
Gangus ..... II b 1050
Garricola ..... I 455
Garritus ..... I 404
Gasteracantha ..... I 935, (II b 1511)
Gastromicans ..... II b 997
Gaucelmus ..... (II b 1515)
Gauroclubiona ..... (II b 1515)
Gayenna ..... II a 535, (II b 1515)
Gayennella ..... II a 540
Gayennina ..... II a 540
Gea ..... I 745, (II b 1515)
Gedea ..... II b 992
Gelanor ..... I 1024, (II b 1515)
Gelotia ..... II b 957, (II b 1515)
Gelotopoeus ..... (II b 1515)
Geminia ..... II a 712
Genysa ..... I 176
Genysochoera ..... I 177
Geodrassus ..... II a 398, (II b 1515)
Geolycosa ..... II a 241, (II b 1516)
Geotrecha ..... (II b 1516)
Gephyra ..... (II b 1516)
Gephyrella ..... (II b 1516)
Gephyrellula ..... II a 769
Gephyrina ..... II a 769, (II b 1516)
Gephyroctenus ..... II a 668
Gephyrota ..... II a 770
Geraesta ..... II a 756
Gerhardtia ..... (II b 1516)
Gerrosoma ..... (II b 1516)
Gertschia ..... II b 989
Gertschnusa ..... II b 977
Gippsicola ..... (II b 1516)
Giuiria ..... II b 1083
Glenognatha ..... I 995, (II b 1516)
Glieschiella ..... II a 246
Glyphesis ..... I 676
Glyptocranium ..... (II b 1516)

Seite:

Glyptogona ..... I 891, (II b 1516)
Gmogala ..... I 286
Gnaphosa ..... II a 360, (II b 1516)
Gnaphosidae ..... II a 347
Gnaphosoides ..... II a 473
Gnatholycosa .... II a 246, (II b 1518)
Gnathonargus ..... I 623
Gnathonarium ..... I 654, (II b 1518)
Gnathonaroides ..... I 655
Gnathopalystes ..... (II b 1518)
Gnoerichia ..... II a 811
Gnolus ..... I 911
Gnophomytis ..... I 386
Goajara ..... II b 1019
Goeldia ..... (II b 1518)
Gohia ..... II a 109, (II b 1518)
Goldia ..... (II b 1518)
Goleta ..... II b 981
Gonatium ..... I 628, (II b 1518)
Goneatara ..... I 634
Gongylidiellum .... I 634, (II b 1518)
Gongylidium.. .... I 636, (II b 1518)
Goniodontium ..... I 221
Gophoa ..... II b 1145
Gorgasella ..... II b 1023
Gorgyrella ..... I 151, (II b 1520)
Gosiphurus ..... II a 570
Goya ..... II b 1083
Goyena ..... (II b 1520)
Grammonota ..... I 730, (II b 1520)
Grammostola ..... I 243, (II b 1520)
Graphomoa ..... I 729
Graptartia ..... II a 620
Grauhara ..... (II b 1520)
Gypogyna ..... II b 983
Gytha ..... II a 564

Habrocestum ... II b 1117, (II b 1520)
Habronattus ..... (II b 1521)
Habronestes ..... (II b 1521)
Hadites ..... II a 62, (II b 1521)
Hadronyche ..... I 208
Hadrosoma ..... (II b 1521)
Hadrotarsus ..... I 287
Haedanula ..... II a 746
Haemilla ..... II b 1367
Hahnia ..... II a 100, (II b 1521)
Hahnistea ..... II a 106
Hahniidae ..... II a 99
Hahniops ..... II a 106
Halocryphoeca ..... II a 63
Halonoproctus ..... (II b 1522)
Halorates ..... I 655
Hamataliva ..... (II b 1522)
Hamataliwa ..... II a 315, (II b 1522)
Hamillus ..... (II b 1522)

Seite:

Hapalopinus ..... I 230
Hapalopus ..... I 230, (II b 1522)
Hapalothele ..... I 199, (II b 1522)
Hapalotremus ..... I 231
Haplinis ..... I 536
Haploclastus ..... I 274
Haplodrassus .... II a 398, (II b 1522)
Haplopelma ..... I 273
Haplotmarus ..... II a 811
Haptisus ..... II a 540, (II b 1522)
Harmochirus .... II b 1020, (II b 1522)
Harmonicon ..... I 199
Harpactea ..... I 298, (II b 1522)
Harpactes ..... I 298, (II b 1522)
Harpactira ..... I 269, (II b 1523)
Harpactirella ..... I 221
Harpactocrates .... I 300, (II b 1523)
Harpassa ..... I 302
Harpaxibius ..... (II b 1523)
Harpaxictis ..... I 231
Harpaxotheria ..... (II b 1523)
Hasarius ..... II b 997, (II b 1523)
Haterius ..... II b 937
Hebestatis ..... I 147
Hebrithele ..... II a 519
Hecaerge ..... (II b 1524)
Hedana ..... II a 747
Hedypsilus ..... I 335
Helicopis ..... (II b 1524)
Heligmomerus ..... I 151, (II b 1524)
Heliophana ..... (II b 1524)
Heliophanus ... II b 1155, (II b 1524)
Helophora ..... (II b 1525)
Helorus ..... (II b 1525)
Helpidius ..... (II b 1525)
Helpis ..... II b 969
Helvetia ..... II b 1257
Helvibis ..... I 455, (II b 1525)
Helvidia ..... I 968
Helvidius ..... (II b 1525)
Hemicloea ..... II a 347, (II b 1525)
Hemicloeina ..... II a 349
Hemiercus ..... I 231
Hemiphantes ..... (II b 1525)
Hemirrhagus ..... I 231
Hemistajus ..... (II b 1525)
Hentzia ..... II b 1217, (II b 1525)
Heptathela ..... I 146
Heptathelidae ..... I 146
Heraclea ..... (II b 1525)
Heradida ..... I 357
Heratemis ..... (II b 1525)
Heratemita ..... II b 1008
Herbessus ..... II a 864
Herennia ..... I 925, (II b 1526)
Heriaesynaema ..... II a 872
Heriaeus ..... II a 864, (II b 1526)

Seite:

Heribertus ..... (II b 1526)
Herilus ..... (II b 1526)
Hermacha ..... I 177, (II b 1526)
Hermachastes ..... (II b 1526)
Hermachola ..... I 178
Hermachura ..... I 178
Hermeas ..... I 178
Hermipella ..... I 380
Hermippoides ..... I 353
Hermippus ..... I 353
Hermosa ..... (II b 1526)
Hermotimus ..... II b 1023
Herpyllus ..... II a 421, (II b 1526)
Hersilia ..... I 381, (II b 1526)
Hersiliada ..... (II b 1526)
Hersilidia ..... (II b 1527)
Hersilliidae ..... I 381
Hersiliola ..... I 382
Hesperauximus ..... II b 1368
Hesperocosa ..... II a 247
Hestimodema ..... II a 669
Hesydrimorpha ..... II a 137
Hesydrus ..... II a 137, (II b 1527)
Hetaerica ..... I 357
Heterocephala ..... (II b 1527)
Heterochemmis ..... II a 621
Heteroclubiona ..... (II b 1527)
Heterodictyna ..... (II b 1527)
Heterognatha ..... (II b 1527)
Heteromigas ..... I 193
Heteromigella ..... I 194
Heteromma ..... (II b 1527)
Heterommides ..... (II b 1527)
Heteroonops ..... I 276
Heterophrictus ..... I 232
Heteropoda ..... II a 712, (II b 1527)
Heteroscodra ..... I 256
Heterothele ..... I 232
Heterozelotes ..... (II b 1528)
Hetschkia ..... I 455
Heurodes ..... (II b 1528)
Hewittia ..... II a 809
Hexablemma ..... I 391
Hexathele ..... I 209, (II b 1528)
Hexomma ..... (II b 1528)
Hexophthalma ..... (II b 1528)
Hexops ..... (II b 1528)
Hexura ..... I 210
Hiboka ..... I 177
Hicanodon ..... II a 63
Hilaira ..... I 655, (II b 1528)
Hildbolda ..... (II b 1528)
Hilke ..... (II b 1528)
Hillhousia ..... (II b 1528)
Hippasa ..... II a 311, (II b 1528)
Hippasella ..... II a 313
Hirrius ..... (II b 1528)

Seite:

Hirriusa ..... II a 770
Hirtia ..... (II b 1528)
Hispo ..... II b 985
Histagonia ..... I 391, (II b 1528)
Histopona ..... II a 63
Hivaoa ..... I 995
Hoedillus ..... II a 730
Hoggicosa ..... II a 247
Hogna ..... II a 247, (II b 1528)
Holcolaetis ..... II b 937, (II b 1529)
Holcolethis ..... (II b 1529)
Holconia ..... (II b 1529)
Holissus ..... I 302
Holocnemus ..... I 335, (II b 1529)
Hololena ..... II a 63, (II b 1529)
Holopelus ..... II a 828
Holoplatys ..... II b 1257
Holothele ..... I 204
Homalattoides ..... (II b 1529)
Homalattus .... II b 1232, (II b 1529)
Homalometa ..... I 914
Homalonychidae ..... II a 475
Homalonychus ... II a 475, (II b 1530)
Homalopoltys ..... I 903
Homoeomma ..... I 233, (II b 1530)
Homoeoplacis ..... I 214
Homoeothele ..... II a 404
Homogona ..... I 194
Homostola ..... I 167
Honunius ..... II a 605
Hoplolathys ..... II b 1326
Holplopholcus ..... I 336, (II b 1530)
Horcotes ..... I 676
Horioctenus ..... II a 669
Hormathion ..... I 637
Horodromoides ..... II a 770
Horodromus ..... II a 770
Hostus ..... II a 316
Hubba ..... (II b 1530)
Hummelia ..... I 637
Hurius ..... II b 1184
Huttonia ..... I 354
Hyaenosa ..... II a 260
Hyarachne ..... (II b 1530)
Hybocoptus ..... I 693, (II b 1530)
Hybosida ..... I 376
Hyctia ..... II b 1258, (II b 1530)
Hyctiota ..... II b 1259
Hyetussa ..... II b 1016
Hydrolycosa ..... II a 260
Hygrolycosa ..... II a 260
Hygropoda ..... II a 137
Hylla ..... (II b 1530)
Hyllothyene ..... II b 1108
Hyllus ..... II b 1050, (II b 1530)
Hylobihoggia ..... (II b 1531)
Hylobius ..... (II b 1531)

Seite:

Hyloclubiona ..... (II b 1531)
Hyltonia ..... II a 343
Hylyphantes ..... I 598
Hyocera ..... I 386
Hypaeus ..... II b 963
Hypobares ..... I 455
Hypoblemum ..... II b 1056
Hypochilidae ..... II b 1278
Hypochilus ..... II b 1278, (II b 1531)
Hypodrassodes ..... II a 404
Hypognatha ..... I 893
Hypomma ..... I 630, (II b 1531)
Hypophthalma ..... (II b 1531)
Hypoplatea ..... (II b 1531)
Hyposida ..... (II b 1531)
Hyposinga ..... (II b 1531)
Hypositticus ..... (II b 1531)
Hypsacantha ..... (II b 1531)
Hypselistes ..... I 708, (II b 1531)
Hypselistoides ..... I 709
Hypselomma ..... (II b 1531)
Hypsinotus ..... (II b 1531)
Hypsithyla ..... II a 138
Hypsorinus ..... I 349
Hyptimorpha ..... I 442
Hyptiotes ..... (II b 1531)
Hysterocratella ..... (II b 1531)
Hysterocrates ..... I 258, (II b 1531)
Hytanis ..... I 287

Iardinis ..... I 394
Iberina ..... II a 106
Icelus ..... (II b 1531)
Icidella ..... II b 1219
Icius ..... II b 1219, (II b 1532)
Ictidops ..... (II b 1532)
Ideocaira ..... I 903
Idioctis ..... I 214
Idiommata ..... I 214, (II b 1533)
Idionella ..... (II b 1533)
Idiophthalma ..... I 215
Idiops ..... I 152, (II b 1533)
Idiosoma ..... I 174
Idiothele ..... I 221
Iheringia ..... I 376
Ikuma ..... I 376
Ilarginus ..... II b 1092
Ilargus ..... II b 1092
Ildibaha ..... I 952
Ilipula ..... II a 139
Illenus ..... (II b 1533)
Inca ..... (II b 1533)
Incasoctenus ..... II a 658
Ino ..... (II b 1533)
Iola ..... (II b 1533)
Iona ..... II b 1166
Iphoctesis ..... II a 749
Iridopelma ..... (II b 1533)

Seite:

Irura ..... II b 1008
Isacantha ..... (II b 1533)
Isala ..... II a 756
Isaloides ..... II a 756
Ischalea ..... II a 115
Ischnapis ..... (II b 1533)
Ischnocolella ..... I 233
Ischnocolus ..... I 233, (II b 1533)
Ischnothele ..... I 204, (II b 1534)
Ischnothyreus ..... I 287
Ischnyphantes ..... (II b 1534)
Ishania ..... II a 95
Ishicosa ..... II a 261
Isigonia ..... (II b 1534)
Islandiana ..... I 729, (II b 1534)
Isoctenus ..... (II b 1534)
Isohogna ..... II a 261
Isopeda ..... II a 675, (II b 1534)
Isopoda ..... (II b 1534)
Isopus ..... (II b 1534)
Isoxia ..... (II b 1534)
Isoxya ..... (II b 1534)
Itata ..... II b 1145
Itatiaya ..... II a 658
Ithyomma ..... (II b 1534)
Itys ..... (II b 1534)
Itytis ..... I 700
Ivesia ..... I 509
Ixalus ..... (II b 1534)
Ixamatus ..... I 200
Ixeuticus ..... II b 1368

Jacaena ..... II a 605
Jacksonia ..... (II b 1534)
Jaluiticola ..... II b 1166
Janetschekia ..... I 637
Janigena ..... (II b 1534)
Janula ..... I 455
Janulus ..... (II b 1534)
Janus ..... (II b 1534)
Jasoda ..... (II b 1535)
Jelskia ..... (II b 1535)
Jollas ..... II b 1238
Jollecosa ..... II a 263
Josa ..... II a 541
Jotus ..... II b 1093, (II b 1535)
Justella ..... (II b 1535)

Kaira ..... I 904
Karschiola ..... II b 1057
Katadysas ..... (II b 1535)
Keyserlingella ..... II b 957
Keyserlingia ..... (II b 1535)
Kibramoa ..... I 322
Kijabe ..... I 287
Kima ..... II b 1035
Klamathia ..... II b 1109

Seite:

Kochia ..... (II b 1535)
Kolomana ..... II b 964
Kolosvarya ..... (II b 1535)
Kratochvilia ..... I 1025
Kratochviliella ..... I 612
Kulczynskiellum ..... (II b 1535)

Labdacus ..... (II b 1535)
Labulla ..... I 576
Labullula ..... I 577
Laches ..... (II b 1535)
Lachesana ..... I 357
Lachese ..... (II b 1535)
Lachesis ..... (II b 1535)
Ladissa ..... II a 423
Laestrigones ..... II a 316
Laetesia ..... I 577
Lagenicola ..... (II b 1535)
Lagnus ..... II b 969, (II b 1535)
Lampertia ..... II a 804
Lampona ..... II a 472, (II b 1535)
Lampropelma ..... I 273
Lampropodus ..... I 218
Landana ..... I 1016, (II b 1535)
Langbiana ..... I 357
Langona ..... II b 1121
Lanuarulla ..... (II b 1535)
Laperousea ..... I 577
Lapsias ..... II b 969
Larinia ..... I 768, (II b 1535)
Larinioides ..... I 772
Laronia ..... II a 381
Lasaeola ..... (II b 1536)
Lasiargus ..... I 676
Lasiocnemus ..... (II b 1536)
Lasiodora ..... I 250, (II b 1536)
Lasiopelma ..... I 244
Lathyarcha ..... II b 1327
Lathys ..... II b 1327, (II b 1536)
Latifrons ..... II a 811
Latona ..... (II b 1536)
Latonigena ..... II a 424, (II b 1536)
Latouchia ..... I 158
Latrodectus ..... I 424, (II b 1536)
Laudetia ..... II a 570
Laufeia ..... II b 1028
Lauharulla ..... II b 1094
Lauricius ..... II a 519, (II b 1537)
Lausus ..... II a 602
Leaena ..... II a 263, (II b 1537)
Leaenella ..... II a 264
Lechrictenus ..... I 147
Leimonia ..... (II b 1537)
Leitaoctenus ..... (II b 1538)
Lephthyphantes ..... (II b 1538)
Lepidemathis ..... II b 992
Leprolochus ..... I 358

Seite:

Lepthercus ..... I 178
Lepthyphantes .....I 541, (II b 1538)
Leptoctenus ..... (II b 1539)
Leptodrassus .... II a 404, (II b 1539)
Leptofischelia ..... I 245
Leptoneta ..... I 311, (II b 1539)
Leptonetidae ..... I 311
Leptopelma ..... I 222, (II b 1539)
Leptopholcus ..... I 351, (II b 1539)
Leptorchestes ... II b 1035, (II b 1539)
Leptorrhoptrum .... I 536, (II b 1540)
Leptosparassus ..... II a 678
Leptostylus ..... (II b 1540)
Leptothrix ..... (II b 1540)
Leptyphantes ..... (II b 1540)
Lessertia ..... I 658, (II b 1540)
Lessertina ..... II a 584
Lessertiola ..... (II b 1540)
Lethia ..... (II b 1540)
Letoia ..... II b 964
Leucauge ..... I 999, (II b 1540)
Libania ..... (II b 1540)
Licosa ..... (II b 1540)
Ligdus ..... II b 986
Liger ..... I 456
Ligonipes ..... II b 938
Ligurinus ..... (II b 1540)
Ligurra ..... II b 1008
Limoxera ..... (II b 1540)
Linothele ..... I 205
Linus ..... II b 935, (II b 1540)
Linyphia ..... I 577, (II b 1540)
Linyphiella ..... (II b 1547)
Linyphiidae ..... I 513
Linyphioides ..... I 593
Liocranoides ..... II a 565
Liocranum ..... II a 565, (II b 1548)
Liodrassus ..... II a 424
Lionephila ..... (II b 1548)
Liparochrysis ..... II a 621
Liparotoma ..... II a 541
Liphistius ..... (II b 1548)
Lipistiidae ..... I 145
Lipistius ..... I 145
Lipocrea ..... (II b 1548)
Lithyfantes ..... (II b 1548)
Lithyphantes ..... I 404, (II b 1548)
Litoporus ..... I 336, (II b 1549)
Litopyllus ..... II a 425, (II b 1549)
Lobetina ..... I 772
Loculla ..... II a 264
Lollianus ..... (II b 1549)
Longarenus ..... II b 999
Lophocarenum ..... I 612, (II b 1549)
Lophomma ..... I 713, (II b 1550)
Lophostica ..... II b 992
Loxobates ..... II a 807

Seite:

Loxomphalia ..... I 260
Loxonychia ..... I 456
Loxophobema ..... I 260
Loxoporetes ..... II a 836
Loxoptygella ..... I 260
Loxoptygus ..... I 260
Loxoscella ..... I 321
Loxosceles ..... (II b 1551)
Loxoscelis ..... I 319, (II b 1551)
Lucia ..... (II b 1551)
Lucrinus ..... I 709
Lurio ..... II b 1223
Lutica ..... I 353
Lycaena ..... (II b 1551)
Lycidas ..... (II b 1551)
Lycinus ..... I 275
Lycoctenus ..... (II b 1551)
Lycodia ..... (II b 1551)
Lycodrassus ..... (II b 1551)
Lycopus ..... II a 807
Lycorma ..... II a 264
Lycosa .... II a 267, (II b 1551, 1717)
Lycosella ..... II a 276, (II b 1575)
Lycosidae ..... II a 151
Lycosina ..... (II b 1575)
Lycosoides ..... (II b 1575)
Lycosula ..... II a 277
Lycotharses ..... (II b 1575)
Lygarina ..... I 675
Lygromma ..... II a 352
Lygrommatoides ..... II a 352
Lynxosa ..... II a 277
Lyrognathus ..... I 264
Lyroscelus ..... (II b 1575)
Lysania ..... (II b 1575)
Lysiteles ..... II a 825
Lyssomanes ..... II b 928, (II b 1575)
Lyssomanidae ..... II b 927
Lyssomonea ..... (II b 1575)
Lyssorthrus ..... II b 932
Lystrocteisa ..... II b 988

Macaria ..... (II b 1575)
Macedonia ..... (II b 1576)
Macedoniella ..... II a 581
Macedoniola ..... I 358
Macerio ..... II a 519
Machomenus ..... (II b 1576)
Macopaeus ..... II b 932
Macracantha ..... (II b 1576)
Macrargus ..... I 532, (II b 1576)
Macrinus ..... (II b 1576)
Macrobunus .... II b 1370, (II b 1576)
Macrophyes ..... II a 542
Macrothele ..... I 205, (II b 1576)
Madognatha ..... (II b 1576)
Maenola ..... II b 964

Seite:

Maeota ..... (II b 1576)
Maevia ..... II b 1014, (II b 1576)
Maeviobeata ..... II b 1009
Mago ..... II b 964
Magulla ..... I 235
Mahadeva ..... (II b 1577)
Mahadiva ..... (II b 1577)
Maileus ..... II b 993
Majella ..... (II b 1577)
Majellula ..... II a 923
Makthalia ..... II b 1083
Malalistata ..... II b 1282
Mallinella ..... I 353
Mallinus ..... I 354
Malloneta ..... II b 1083
Mallos ..... II b 1331, (II b 1577)
Maltecora ..... II b 1166
Malthonica ..... II a 66
Mandane ..... (II b 1578)
Mandaneta ..... II a 602
Manduculus ..... (II b 1578)
Mangora ..... I 772, (II b 1578)
Maniana ..... II a 425
Mantisatta ..... II b 986
Mantius ..... II b 999
Maoriana ..... (II b 1578)
Maratus ..... (II b 1578)
Marbellina ..... II b 1015
Marcellina ..... II a 542
Marchena ..... II b 1146
Mardonia ..... II a 570
Marengo ..... II b 938
Margaromma ... II b 1105, (II b 1758)
Marma ..... II b 1000
Marmarica ..... II a 689
Maro ..... I 533
Maroussa ..... (II b 1578)
Marpesia ..... (II b 1578)
Marpessa ..... (II b 1578)
Marpissa ..... II b 1259, (II b 1578)
Marpissus ..... (II b 1578)
Marptusa ..... (II b 1579)
Martella ..... (II b 1580)
Martus ..... II a 811
Marussenca ..... (II b 1580)
Marxia ..... (II b 1580)
Marxiellia ..... (II b 1580)
Maso ..... I 619, (II b 1580)
Masonetta ..... I 620
Massagris ..... II b 986
Massuria ..... II a 836
Masteria ..... I 209
Mastigosoma ..... (II b 1580)
Mastira ..... (II b 1580)
Mastophora ..... I 900
Mastostigmus ..... (II b 1580)
Matachia ..... II b 1378

Seite:

Matidia ..... II a 520
Matta ..... I 287
Maturna ..... (II b 1580)
Maypacius ..... II a 115, (II b 1580)
Mazax ..... (II b 1580)
Mecaphesa ..... II a 873
Mecicobothrium ..... I 210
Mecolaesthus ..... I 349, (II b 1580)
Mecopisthes ..... I 676, (II b 1581)
Mecostrabus ..... II a 811
Mecynargus ..... (II b 1581)
Mecynidis ..... I 456
Mecynogea ..... I 747
Mecynometa ..... I 1013
Mecysmaucheníus ..... I 1016
Medmassa ..... II a 602, (II b 1581)
Megadictyna ..... II b 1332
Megaera ..... (II b 1581)
Megaloremmius ..... II a 689
Megalosara ..... I 159
Megalostrata .... II a 604, (II b 1581)
Megamyrmaekion ..... II a 425
Megamyrmeceon ..... (II b 1581)
Megamyrmecion ..... (II b 1581)
Megaphobema ..... I 251
Megapyge ..... II a 475
Megarctosa ..... II a 277, (II b 1717)
Megatimus ..... (II b 1581)
Megullia ..... II a 316
Meioneta ..... I 516, (II b 1581)
Melaenosia ..... I 1025
Melanippe ..... (II b 1581)
Melanophora ..... (II b 1581)
Melicertus ..... (II b 1582)
Melicymnis ..... II a 427
Melloicosa ..... II a 278
Melocosa ..... II a 116
Melodeus ..... (II b 1582)
Melognathus ..... I 264
Melopoeus ..... I 273
Melos ..... (II b 1582)
Melpomene ..... II a 66
Melychiopharis ..... I 911
Memnon ..... (II b 1582)
Melanippe ..... (II b 1582)
Mendoza ..... (II b 1582)
Menemerus .... II b 1263, (II b 1582)
Mengea ..... I 593
Menneus ..... II b 1353
Meotipa ..... I 456
Merenius ..... II a 621
Meriola ..... (II b 1583)
Merizocera ..... I 331
Mermessus ..... I 729
Merothele ..... I 222
Mesida ..... I 1013
Mesilla ..... II a 542

Seite:

Mesiotelus ..... II a 566
Mesklia ..... II a 427
Mesobria ..... II a 570
Mesoctenus ..... (II b 1583)
Mesopneustes ..... (II b 1583)
Messapus ..... II a 621
Messua ..... (II b 1583)
Meta ..... I 914, (II b 1583)
Metabus ..... (II b 1584)
Metacleocnemis ..... II a 770
Metacyrba ..... (II b 1584)
Metadiaea ..... II a 873, (II b 1584)
Metafecenia ..... II b 1377
Metagonia ..... I 336
Metaltella ..... II b 1332
Metaphidippus ..... (II b 1584)
Metargiope ..... (II b 1585)
Metargyra ..... I 920
Metastenus ..... (II b 1585)
Metatobias ..... (II b 1585)
Metatrochosina ..... II a 278
Metazygia ..... I 867, (II b 1585)
Metella ..... I 920
Metepeira ..... I 868
Methesis ..... II a 622
Metimorpha ..... I 920
Metopobactrus ..... I 681
Metriopelma ..... (II b 1585)
Metronax ..... I 380
Mettus ..... (II b 1585)
Mevianes ..... II a 67
Mevianops ..... II a 67
Mexcala ..... II b 1038
Mezenia ..... (II b 1585)
Mezenina ..... II 542
Mezentia ..... (II b 1585)
Miagrammopes . II b 1347, (II b 1585)
Miaschistopus ..... (II b 1585)
Mica ..... (II b 1585)
Micalula ..... II b 1146
Micaria ..... II a 622, (II b 1585)
Micariaulax ..... (II b 1586)
Micariolepis ..... II a 632, (II b 1586)
Micariosoma ..... (II b 1586)
Micrargus ..... I 712, (II b 1586)
Micrathena ..... I 953, (II b 1586)
Microcentria ..... I 534
Microclubiona ..... (II b 1587)
Microctenonyx ..... (II b 1587)
Microctenus ..... (II b 1587)
Microcyllus ..... (II b 1587)
Microdipoena ..... (II b 1587)
Microdrassus ..... II a 405
Microepeira ..... (II b 1587)
Microerigone ..... I 700, (II b 1587)
Microhasarius ..... II b 993
Microhexura ..... I 210

Seite:

Microlinypheus ..... I 617
Micromata ..... II a 689, (II b 1587)
Micromerys ..... I 351
Micromesomma ..... I 192
Micrommata ..... (II b 1587)
Microneta ..... I 519, (II b 1587)
Micronetaria ..... (II b 1588)
Micronetata ..... I 523
Micropholcomma ..... I 392
Micropoltys ..... I 904
Microstigma ..... (II b 1588)
Microstigmata ..... I 194
Microstrandina ..... I 677
Micryphantes ..... I 637, (II b 1589)
Micryphantidae ..... I 603
Micryphantus ..... (II b 1589)
Micythus ..... II a 427
Midamus ..... (II b 1590)
Migas ..... I 190, (II b 1590)
Migidae ..... I 190
Milonia ..... I 869
Miltia ..... (II b 1590)
Mimetidae ..... I 1017
Mimetus ..... I 1020, (II b 1591)
Mimicosa ..... I 923
Mimognatha ..... I 995
Mimohogna ..... II a 279
Minicia ..... I 620, (II b 1591)
Minosia ..... (II b 1591)
Minosiella ..... II a 371
Minotauria ..... I 302
Minyrioloides ..... I 677
Minyriolus ..... I 678, (II b 1591)
Miopristis ..... (II b 1591)
Mioxena ..... (II b 1591)
Miranda ..... (II b 1591)
Mirandia ..... II b 1022
Misgolas ..... I 179
Missulena ..... I 188, (II b 1591)
Misumena ..... II a 836, (II b 1591)
Misumenoides ... II a 841, (II b 1593)
Misumenops .... II a 844, (II b 1593)
Misumessus ..... (II b 1593)
Mithion ..... II b 1268, (II b 1593)
Mithras ..... (II b 1593)
Mitoscelis ..... I 973
Mitothele ..... (II b 1593)
Mitura ..... (II b 1593)
Miturga ..... II a 556
Miturgina ..... (II b 1593)
Mizaga ..... II a 67
Mnesitheus ..... II b 1379
Modisimus ..... I 337, (II b 1593)
Modunda ..... II b 1223
Modysticus ..... (II b 1593)
Moebelia ..... (II b 1593)
Moenkhausiana ..... I 374

Seite:

Moero ..... I 457, (II b 1593)
Moggridgea ..... I 191, (II b 1593)
Mogrus ..... II b 1122, (II b 1593)
Molione ..... I 457
Molitorosa ..... II a 279
Mollica ..... (II b 1594)
Mollika ..... II b 1106
Molycria ..... II a 605
Monaeses ..... II a 811, (II b 1594)
Monaga ..... II b 1146
Monapia ..... II a 542, (II b 1594)
Monastes ..... (II b 1594)
Monclovia ..... (II b 1594)
Moneta ..... I 393
Monocentropella ..... I 260
Monocentropus ..... I 261
Monocephalus ..... (II b 1594)
Monoclova ..... (II b 1594)
Monodontium ..... I 224
Montebello ..... II a 632
Montilaira ..... (II b 1594)
Mopiopia ..... II b 1000, (II b 1594)
Mopsus ..... II b 1109, (II b 1594)
Moreno ..... II a 405
Morenilia ..... II a 405
Muizenbergia ..... II a 106
Mulicymnis ..... (II b 1594)
Murricia ..... I 383
Musaeus ..... (II b 1594)
Musagetes ..... (II b 1594)
Mustelicosa ..... II a 279
Mutina ..... (II b 1594)
Mutusca ..... (II b 1594)
Muziris ..... II b 1269
Myandra ..... II a 606
Mygalarachne ..... I 245
Mygale ..... (II b 1594)
Mygalodonta ..... (II b 1597)
Mygaloides ..... (II b 1597)
Mynoglenes ..... II a 95
Mynthes ..... (II b 1597)
Myostola ..... I 261, (II b 1597)
Myrmarachne ... II b 939, (II b 1597)
Myrmecia ..... (II b 1597)
Myrmeciaphila ..... (II b 1597)
Myrmecium ..... II a 633, (II b 1597)
Myrmecisca ..... (II b 1597)
Myrmecobius ..... (II b 1597)
Myrmecoscaphiella ..... I 288
Myrmecotypus ..... II a 634
Myrmekiaphila ..... I 168
Myrmeques ..... II a 635
Myrmidonella ..... I 352
Myrmopopaea ..... I 288
Myro ..... II a 95, (II b 1597)
Myropsis ..... (II b 1598)
Myrtale ..... (II b 1598)

Seite:

Mysmena ..... I 394, (II b 1598)
Mysmenopsis ..... I 394
Mystaria ..... II a 809
Mystes ..... I 352
Mythoplastoides ..... I 694

Nagaina ..... II b 1022, (II b 1598)
Naibena ..... I 358
Namopsillus ..... (II b 1598)
Nanahua ..... I 358
Nanavia ..... I 639
Nannenus ..... II b 1000
Nannonymphaeus ..... II a 106
Nanometa ..... I 1013
Napoca ..... II b 1233
Narcaeus ..... II a 873
Narcissus ..... I 593
Natta ..... (II b 1598)
Naubolus ..... II b 1270
Neaetha ..... II b 1123, (II b 1598)
Nealces ..... (II b 1598)
Neartema ..... I 338
Nebridia ..... II b 1000, (II b 1598)
Neera ..... (II b 1598)
Neischnocolus ..... I 235
Nematogmus ..... I 709, (II b 1598)
Nemesia ..... I 179, (II b 1598)
Nemesiellus ..... I 176
Nemesioides ..... I 183
Nemesiothele ..... I 183, (II b 1598)
Nemoscolus ..... I 762, (II b 1598)
Nemospiza ..... I 763
Neoanagraphis ..... II a 567
Neoantistea ..... II a 106, (II b 1598)
Neoaviola ..... II a 107
Neochilobrachys ..... I 264
Neocteniza ..... I 189
Neoctenus ..... II a 669
Neodiplothele ..... I 218
Neodiplura ..... (II b 1598)
Neohahnia ..... II a 107
Neomatachia ..... II b 1379
Neon ..... II b 1238, (II b 1598)
Neonella ..... II b 1240
Neophanes ..... (II b 1599)
Neoporteria ..... II a 67
Neoprolochus ..... I 923
Neoscona ..... (II b 1599)
Neosconella ..... (II b 1599)
Neosparassus ..... (II b 1599)
Neostorena ..... I 358
Neostothis ..... I 222
Neothereutes ..... (II b 1599)
Neottiura ..... (II b 1599)
Neozimiris ..... (II b 1599)
Nephila ..... I 926, (II b 1599)
Nephilengys ..... I 933, (II b 1601)

Seite:

Nephrochirus ..... I 288
Neriene ..... (II b 1601)
Nesiergus ..... I 235
Nesis ..... (II b 1602)
Nesticidae ..... I 509
Nesticus ..... I 509, (II b 1602)
Neuquenia ..... II b 1332
Nicodamus ..... I 429
Nicthyphantes ..... (II b 1605)
Nicylla ..... II b 1146
Nidivalvata ..... (II b 1605)
Nilacantha ..... (II b 1605)
Nilakantha ..... II b 977, (II b 1605)
Nilus ..... II a 116, (II b 1605)
Ninetis ..... I 352
Nisueta ..... II a 691
Nodocion ..... II a 427, (II b 1605)
Noegus ..... II b 966
Nomisia ..... II a 371
Nonianus ..... II a 691
Nops ..... I 316, (II b 1605)
Nopsides ..... I 316
Nossibea ..... I 218
Nothocyba ..... I 714
Nothroctenus ..... II a 662
Notiodrassus ..... II a 406
Notiomaso ..... I 621
Notionella ..... (II b 1605)
Notioscopus ..... I 686, (II b 1605)
Notocentria ..... (II b 1605)
Notolathys ..... II b 1333
Novalena ..... II a 67
Nuctobia ..... (II b 1605)
Nukuhiva ..... II a 139
Nurscia ..... II b 1370
Nyctimus ..... II a 805
Nydia ..... (II b 1605)
Nyssa ..... (II b 1605)
Nyssus ..... (II b 1605)

Oarces ..... I 1023
Oberarius ..... I 222
Obrima ..... (II b 1605)
Obrimana ..... I 593
Ochyrocera ..... I 331, (II b 1605)
Ochyroceratidae ..... I 331
Ocnotelus ..... II b 1000
Ocrepeira ..... (II b 1605)
Ocrisiona ..... II b 1270
Ocyala ..... (II b 1605)
Ocyale ..... II a 280, (II b 1605)
Ocyllus ..... II a 874
Ocypete ..... (II b 1606)
Ocyptila ..... (II b 1606)
Odo ..... II a 669, (II b 1606)
Odomasta ..... II a 670
Oecobiidae ..... II b 1286

Seite:

Oecobius ..... II b 1286, (II b 1606)
Oecophloeus ..... (II b 1607)
Oedignatha ..... II a 591
Oedipus ..... (II b 1607)
Oedothorax ..... I 639, (II b 1607)
Oeta ..... (II b 1608)
Ogdenia ..... II b 1001
Ogulnius ..... I 968
Ohilimia ..... II b 1028
Olbophthalmus ..... II a 542
Olbus ..... II a 730, (II b 1608)
Oletera ..... (II b 1608)
Oligoctenus ..... (II b 1608)
Oligoxystre ..... I 235
Oligophthalmus ..... (II b 1608)
Olios ..... II a 692, (II b 1608)
Oltacloea ..... II a 349
Omanus ..... (II b 1609)
Ommatauxesis ..... II a 96
Omoedus ..... II b 1148
Omosita ..... (II b 1609)
Omothymus ..... (II b 1609)
Omura ..... (II b 1609)
Onesinda ..... (II b 1609)
Oningis ..... II b 1094
Onocolus ..... II a 757, (II b 1609)
Onomastus ..... II b 932
Onondaga ..... (II b 1609)
Onychocryptus ..... (II b 1609)
Oonopidae ..... I 275
Oonopinus ..... I 276
Oonops ..... I 276, (II b 1609)
Oophora ..... (II b 1609)
Opas ..... (II b 1609)
Opisthoncana ..... II b 1029
Opisthoncus ..... II b 1029
Opistoncus ..... (II b 1609)
Opisthoxys ..... I 599, (II b 1609)
Opitis ..... (II b 1610)
Opopaea ..... (II b 1610)
Opopoea ..... I 288
Opsaltella ..... II b 1333
Orcevia ..... (II b 1610)
Orchestina ..... I 279, (II b 1610)
Ordgarius ..... I 902, (II b 1610)
Oreagnaphosa ..... (II b 1610)
Oreoneta ..... (II b 1610)
Oreonetides ..... I 534, (II b 1610)
Origanates ..... I 700
Origes ..... II a 678
Orinocosa ..... II a 281
Orinomana ..... II b 1336, II a 281
Orinomus ..... (II b 1610)
Orithya ..... (II b 1610)
Ornithoctonus ..... I 274, (II b 1610)
Ornithoscatoides ..... (II b 1610)
Orodrassus ..... II a 406

Seite:

Oroodes ..... (II b 1610)
Orphnaecus ..... I 264
Orphnoecus ..... (II b 1610)
Orsima ..... II b 1167
Orsinome ..... I 921, (II b 1610)
Orsolobus ..... I 302
Orthobula ..... II a 571
Orthocosa ..... II a 281
Orthonops ..... I 316
Orthops ..... (II b 1610)
Orthotrichus ..... (II b 1610)
Orthrus ..... II b 932
Orus ..... (II b 1610)
Orvilleus ..... II b 970
Oryphantes ..... (II b 1610)
Osericta ..... II b 1038
Oserictops ..... II b 1039
Osoriella ..... II a 543
Ostanes ..... II a 807
Ostearius ..... I 646, (II b 1610)
Otacilia ..... II a 571
Otiothops ..... I 376
Oxyopa ..... (II b 1610)
Oxyopedon ..... (II b 1610)
Oxyopeidon ..... II a 316, (II b 1610)
Oxyopes ..... II a 318, (II b 1610)
Oxyopidae ..... II a 315
Oxyptila ..... (II b 1611)
Oxysoma ..... II a 543, (II b 1611)
Oxytate ..... II a 808
Ozaleus ..... (II b 1611)
Ozopactus ..... I 235, (II b 1611)
Ozyptila ..... II a 874, (II b 1611)

Paccius ..... II a 584
Pachiloscelis ..... (II b 1612)
Pachistopelma ..... I 256
Pachomius ..... (II b 1612)
Pachyballus ..... II b 974
Pachydactylus ..... (II b 1612)
Pachygnatha ..... I 996, (II b 1612)
Pachyidiops ..... (II b 1612)
Pachylomerides .... I 147, (II b 1612)
Pachylomerus ..... (II b 1613)
Pachyloscelis ..... (II b 1613)
Pachyonomastus ..... II b 933
Pachypelma ..... I 248
Pachypleuracantha ..... (II b 1613)
Pachypoessa ..... II b 1057
Pachyptile ..... (II b 1613)
Pachypus ..... (II b 1613)
Pacificana ..... II a 96
Pactates ..... II a 826
Paculla ..... I 391
Padilla ..... II b 981, (II b 1613)
Padillothorax ..... II b 981
Paenula ..... II a 678

Seite:

Pagida ..... II a 826
Pagiopalpus ..... II a 802
Pagomys ..... II b 1333, (II b 1613)
Paidisca ..... I 392
Palaephatus ..... (II b 1613)
Palaestina ..... I 358, (II b 1613)
Palaestrina ..... (II b 1613)
Palaetyra ..... II a 571
Palaevagrus ..... I 206
Pales ..... (II b 1613)
Palfuria ..... I 358
Palicanus ..... II a 568
Palpelius ..... II b 1083
Palpimanidae ..... I 375
Palpimanus ..... I 377, (II b 1613)
Palystella ..... II a 725
Palystes ..... II a 725, (II b 1613)
Palystodes ..... (II b 1613)
Pamphobeteus ..... I 251, (II b 1613)
Panachraesta ..... II b 951
Panamomops ..... I 677, (II b 1613)
Panaretella ..... II a 723, (II b 1614)
Panaretidius ..... II a 721
Panaretus ..... II a 721, (II b 1614)
Pancorius ..... II b 1084
Pandeus ..... (II b 1614)
Pandercetes ..... II a 722, (II b 1614)
Pandisus ..... II b 933
Pandora ..... (II b 1614)
Panysinus ..... II b 1001, (II b 1614)
Paoningia ..... I 409
Papakula ..... II a 139
Paphlagon ..... (II b 1614)
Parabomis ..... II a 828
Parabona .. [err. II a 428], (II b 1717)
Parabonna ..... II a 428, (II b 1717)
Parachemmis ..... II a 635
Paracleocnemis ..... II a 770
Paraclubiona ..... (II b 1614)
Paracornicularia ..... I 664
Paractenonyx ..... (II b 1614)
Paradamoetas ..... II b 1223
Paradescanso ..... II b 1039
Paradesis ..... (II b 1614)
Paradiestus ..... (II b 1614)
Paradossenus ..... II a 139
Paraebius ..... I 922
Parafluda ..... II b 952
Paragonatium ..... I 632
Paraharmochirus ..... II b 1020
Parahentzia ..... II b 1224
Parajotus ..... II b 1094
Paraleptoneta ..... I 313, (II b 1614)
Paralinyphia ..... I 594
Paralophostica ..... II b 993
Paraltellopsis ..... (II b 1614)
Paramarpissa ..... (II b 1614)

	Seite:
Paramatachia	II b 1379
Parameta	I 922
Paramigas	I 193
Paramodunda	II b 1271, (II b 1614)
Paramyrmecion	II a 428
Paramystaria	II a 809
Paranaia	II b 1145
Paraneaetha	II b 1124
Paranetella	(II b 1614)
Paranetus	(II b 1614)
Paraphidippus	(II b 1614)
Paraphysa	I 245
Paraplectana	I 897, (II b 1614)
Paraplectanoides	I 893
Parapostenus	II a 568
Pararaneus	I 869, (II b 1615)
Parasintula	(II b 1615)
Parastalita	I 302
Parastephanops	II a 748, (II b 1615)
Parastrophius	II a 743, (II b 1615)
Parasynema	II a 884, (II b 1615)
Parathalerothele	I 200
Paratheuma	II a 353
Parathiodina	II b 977
Paratibellus	II a 771
Paratobias	(II b 1615)
Paratrochosina	II a 282
Paratropidae	I 275
Paratropis	I 275, (II b 1615)
Paratus	II a 568
Paratyle	II a 568
Parauximus	(II b 1615)
Paraverrucosa	I 870
Paravulsor	II a 658
Parawixia	I 870
Parazilia	I 923
Pardessus	(II b 1615)
Pardosa	II a 156, (II b 1615)
Pardosella	II a 196
Pardosops	II a 196
Parepeira	I 871
Parerigone	(II b 1618)
Parhedrus	II a 723
Parkella	II b 1272
Parnaeus	(II b 1618)
Paro	II a 96
Paromostola	I 168
Paronocolus	II a 758
Parthenia	(II b 1618)
Partona	(II b 1618)
Pasias	II a 808
Pasiasula	II a 808
Pasilobus	I 898
Pasithea	(II b 1618)
Passiena	II a 198
Patiscana	I 354
Patiscus	(II b 1618)

	Seite:
Patrera	II a 544
Paurotylus	I 386
Pavocosa	II a 282
Peckhamia	II b 989, (II b 1618)
Pedanostethus	(II b 1618)
Pediana	II a 679
Pedina	(II b 1618)
Pedinella	I 594, (II b 1618)
Pedinopistha	(II b 1618)
Pedo	(II b 1618)
Pelayo	II a 544
Pelecodon	(II b 1618)
Pelecopsides	I 617
Pelecopsis	(II b 1618)
Pelegrina	(II b 1619)
Pelicinus	I 289
Pelidida	II a, 69
Pelinobius	I 261, (II b 1619)
Pella	(II b 1619)
Pellenes	II b 1124, (II b 1619)
Pelmatorycter	I 168
Pelmopoda	(II b 1619)
Pelopatis	II a 117
Peltorrhynchus	(II b 1619)
Peltosoma	(II b 1619)
Penestomus	II b 1300
Penictis	I 457
Penionomus	II b 1085, (II b 1619)
Peniza	(II b 1619)
Pensacola	II b 1144
Peplometus	II b 974
Peponocranium	I 674, (II b 1619)
Perania	I 457
Perenethis	II a 118, (II b 1620)
Pergassus	(II b 1620)
Pericuris	II a 346
Periegops	I 331
Perilla	I 934
Perimones	I 621
Perissoblemma	(II b 1620)
Perissopmeros	I 358
Peritraeus	II a 805
Pertica	I 323
Perytraeus	(II b 1620)
Pescennina	II a 607
Petrichus	II a 771
Petricus	II a 771
Petropolisia	I 183
Petrunkevitchia	II b 1336
Peucetia	II a 334, (II b 1620)
Pezionyx	(II b 1620)
Phaeacius	II b 935
Phaedima	(II b 1620)
Phaenopoma	II a 808
Phaenothele	(II b 1620)
Phaeocedus	II a 428
Phaeoclita	I 164

Seite:

Phaetoticus ..... I 457
Phalaea ..... (II b 1620)
Phalaeopsis ..... II a 118
Phalangium ..... (II b 1620)
Phalops ..... (II b 1620)
Phanetta ..... I 535
Phanias ..... II b 1272
Phanoptilus ..... (II b 1620)
Phanotea ..... II a 96
Phantyna ..... (II b 1620)
Pharacocerus ..... II b 1085
Pharta ..... II a 758
Phaulostylus ..... II b 1086
Phaulothrix ..... I 537, (II b 1620)
Phausina ..... II b 1001
Pherecydes ..... II a 813
Pherenice ..... I 872
Phiale ..... II b 1057, (II b 1620)
Phidippia ..... (II b 1621)
Phidippus ..... (II b 1621)
Phidyle ..... (II b 1622)
Philaeus ..... II b 1064, (II b 1622)
Philarcus ..... (II b 1623)
Philates ..... II b 938
Philesius ..... (II b 1623)
Philia ..... (II b 1623)
Philisca ..... II a 520
Phillyra ..... (II b 1623)
Philodamia ..... II a 813
Philodroma ..... (II b 1623)
Philodromoides ..... II a 772
Philodromops ..... II a 772
Philodromus ..... II a 772, (II b 1623)
Philoeca ..... (II b 1625)
Philogaeus ..... II a 864
Philoica ..... (II b 1626)
Philoicides ..... II a 69
Philoponella ..... (II b 1626)
Philoponus ..... (II b 1626)
Philotheroides ..... II b 1138
Philotherus ..... (II b 1626)
Philto ..... I 457
Phintella ..... II b 1167
Phintia ..... (II b 1626)
Phintodes ..... II b 1167
Phireza ..... II a 884
Phlattothrata ..... I 701
Phlegra ..... II b 1138, (II b 1626)
Phloeodrassus ..... (II b 1626)
Phloeoides ..... (II b 1626)
Phlogiellus ..... I 264, (II b 1626)
Phlogiodes ..... I 235
Phlogius ..... (II b 1626)
Phobetinus ..... I 1024
Phoebe ..... (II b 1626)
Pholcidae ..... I 333
Pholcomma ..... I 392, (II b 1626)

Seite:

Pholcophora ..... I 338
Pholcophorina ..... I 349
Pholcus ..... I 338, (II b 1626)
Pholeuon ..... (II b 1627)
Phoneutria ..... (II b 1627)
Phoneyusa ..... I 261, (II b 1628)
Phonognatha ..... I 934
Phonotimpus ..... II a 571
Phormictopus ..... I 248
Phormingochilus ..... I 274
Phoroncidia ..... I 386, (II b 1628)
Phricotelus ..... I 969
Phrictus ..... (II b 1628)
Phrissaecia ..... (II b 1628)
Phrixotrichus ..... I 245, (II b 1628)
Phrurolithum ..... (II b 1628)
Phrurolithus ..... II a 571, (II b 1628)
Phruronellus ..... II a 577, (II b 1629)
Phrurotimpus ..... II a 577, (II b 1629)
Phryganoporus ..... II b 1370
Phrynarachne ..... II a 749, (II b 1629)
Phryssaecia ..... (II b 1629)
Phryxotrichus ..... (II b 1629)
Phyaces ..... II b 1009
Phyale ..... (II b 1629)
Phycosoma ..... I 457
Phycus ..... (II b 1629)
Phylaeus ..... (II b 1629)
Phylarchus ..... I 457
Phylarcus ..... (II b 1629)
Phylloeca ..... (II b 1629)
Phylloneta ..... (II b 1629)
Phyllonethis ..... (II b 1629)
Phymatoctenus ..... II a 663
Phyrnoides ..... (II b 1629)
Physcoa ..... (II b 1629)
Physiola ..... (II b 1629)
Physocyclus ..... I 342
Physoglenes ..... I 352
Physoplatys ..... II a 884
Phyxelida ..... II b 1370
Phyxioschaema ..... (II b 1629)
Phyxioschema ..... I 206
Piabuna ..... II a 579
Piesocalus ..... I 646
Pikeliana ..... II b 1282
Pilia ..... II b 1028
Pimus ..... II b 1371
Pionaces ..... II a 97
Pionothele ..... I 183
Piranthus ..... II b 982
Pirata ..... II a 283, (II b 1629)
Piratessa ..... II a 286, (II b 1717)
Piratosa ..... II a 286, (II b 1717)
Priatula ..... II a 287
Pirithous ..... (II b 1631)
Pisaura ..... II a 119, (II b 1631)

Seite:

Pisauridae ..... II a 110
Pisaurina ..... II a 121, (II b 1631)
Pisenor ..... I 216
Pisenorodes ..... (II b 1631)
Pistius ..... II a 851, (II b 1631)
Pitharatus ..... I 911
Pitiohyphantes ..... (II b 1631)
Pityohyphantes ..... I 594
Plaesianillus ..... I 701
Plaesiocraerus ..... I 694, (II b 1631)
Plagiobothrus ..... I 216
Planadecta ..... (II b 1632)
Plancinus ..... II a 852
Plastonomus ..... II a 804
Platoecobius ..... II b 1290
Plator ..... II a 474 (II b 1632)
Platoridae ..... II a 474
Platyarachne .... II a 864, (II b 1632)
Platycephala ..... (II b 1632)
Platyoides ..... II a 349, (II b 1632)
Platyopis ..... (II b 1632)
Platypyresthesis ..... II a 884
Platyscelis ..... (II b 1632)
Platyscelum ..... (II b 1632)
Platythomisus ... II a 835, (II b 1632)
Platyxysticus ..... (II b 1632)
Plectana ..... (II b 1632)
Plectochetos ..... I 617
Plectophanes ..... I 322
Plectoptilus ..... I 289
Plectreurys ..... I 322, (II b 1633)
Pleorotus ..... II a 683
Plesiometa ..... (II b 1633)
Plesiopelma ..... (II b 1633)
Plesiophrictus ..... I 235
Pleuromma ..... (II b 1634)
Plexippa ..... (II b 1634)
Plexippus ..... II b 1086 (II b 1634)
Plocamis ..... I 458
Plotius ..... II b 1027
Pocadicnemis ..... I 673, (II b 1636)
Pochyta ..... II b 1089
Pochytoides ..... (II b 1636)
Pocobletus ..... I 595
Podophthalma ..... (II b 1636)
Poecilarcys ..... I 912
Poecilipta ..... II a 635
Poecilochroa .... II a 429, (II b 1636)
Poecilomigas ..... I 192, (II b 1636)
Poecilomephila ..... (II b 1636)
Poecileta ..... I 562, (II b 1636)
Poecilopachys ..... I 899
Poecilorchestes ..... II b 1148
Poecilotheria ..... I 271
Poecilothomisus ..... II a 836
Poessa ..... II b 1069
Poikilomorpha ..... I 202

Seite

Polemus ..... II b 1042
Policha ..... II b 957
Poltys ..... I 904, (II b 1636)
Polyaspis ..... (II b 1636)
Polybaea ..... II a 122
Polybetes ..... II a 679, (II b 1636)
Polydamna ..... (II b 1636)
Porius ..... II b 974
Porrhoclubiona ..... (II b 1636)
Porrhomma ..... I 599, (II b 1636)
Porrhopis ..... (II b 1637)
Porrhopsis ..... (II b 1637)
Porrhothele ..... I 207
Porrima ..... II a 313, (II b 1637)
Porrimula ..... II a 313
Porropis ..... II a 827
Porteria ..... II a 97
Portia ..... II b 933, (II b 1637)
Potamia ..... (II b 1637)
Pothaeus ..... II a 758
Poultonella ..... II b 1015
Poultonia ..... II b 1094
Pranopis ..... (II b 1637)
Prasonica ..... I 775
Prepotelus ..... II a 758
Prionolaema ..... I 973
Prionosternum ..... II a 375
Priperia ..... I 710
Priscula ..... I 347
Pristobaeus ..... II b 993
Prochora ..... II a 557
Procleocnemis ..... II a 790
Procopius ..... II a 584
Prodalia .....(II b 1637)
Prodida ..... II a 343
Prodidomidae ..... II a 343
Prodidomus ..... II a 344, (II b 1637)
Proernus ..... II a 803
Proevippa ..... II a 199
Prolochus ..... I 924
Prolycosides ..... II a 289
Prominosia ..... (II b 1717)
Pronarachne ..... I 872
Pronemesia ..... (II b 1637)
Pronoides ..... I 967
Pronophaea ..... II a 585
Pronopius ..... (II b 1637)
Pronous ..... I 967, (II b 1637)
Propostira ..... I 458
Prorachias ..... I 183
Proshapalopus ..... I 236
Prosharmonicon ..... I 200
Proshermacha ..... I 183
Prosoponcus ..... (II b 1638)
Prosopotheca ..... I 664, (II b 1638)
Prostheclina ..... (II b 1638)
Prosthesima ..... (II b 1638)

Seite:

Protadia ..... (II b 1639)
Protagroeca ..... (II b 1640)
Proxysticus ..... (II b 1640)
Prusias ..... II a 730, (II b 1640)
Prychia ..... II a 729
Psalistopoides ..... I 222
Psalistops ..... I 222
Psalmopoeus ..... I 256
Psammitis ..... (II b 1640)
Psecas ..... II b 982, (II b 1640)
Psechridae ..... II b 1376
Psechrus ..... II b 1377
Pselcis ..... II b 1029
Pselligmus ..... I 165
Psellocoptus ..... II a 635
Psellonus ..... II a 803
Pseudamphidraus ..... II b 967
Pseudamyciaea ..... II a 809
Pseudamycus ... II b 1090, (II b 1640)
Pseudanapis ..... I 1015
Pseudartonis ..... I 911
Pseudattulus ..... II b 1242
Pseudauximus ..... II b 1333
Pseudemathis ..... II b 993
Pseudeuophrys ..... II b 1182
Pseudevippa ..... II a 199
Pseudicius ..... II b 1224, (II b 1640)
Pseudidiops ..... I 156
Pseudoatrax ..... I 208
Pseudoceto ..... II a 585
Pseudocorinna ..... II a 604
Pseudocorythalia ..... II b 1107
Pseudoctenus ..... II a 671
Pseudodrassus ..... II a 432
Pseudofluda ..... II b 957
Pseudogonatium ..... I 632
Pseudohapalopus ..... I 236
Pseudohermacha ..... I 183
Pseudohermachura ..... I 184
Pseudohomoeomma ..... I 236
Pseudohostus ..... II a 339
Pseudolygromma ..... II a 353
Pseudomaevia ..... II b 1015
Pseudomarengo ..... II b 951
Pseudometa ..... I 922
Pseudomicrommata ..... II a 680
Pseudomogrus ..... II b 1242
Pseudophthalmus ..... (II b 1640)
Pseudoplatyoides ..... (II b 1640)
Pseudoplexippus ..... II b 1091
Pseudoporrhopis ..... II a 804
Pseudopsellonus ..... II a 803
Pseudopsyllo ..... I 776
Pseudoscaphiella ..... I 289
Pseudosparianthis ..... II a 683
Pseudotegenaria ..... II a 69
Psilochorus ..... I 350

Seite:

Psiloderces ..... I 332
Psyllo ..... I 776
Pterartoria ..... II a 289, (II b 1640)
Pterartoriola ..... II a 289
Pterelas ..... (II b 1640)
Pterinochilides ..... I 270
Pterinochilus ..... I 270, (II b 1640)
Pterinopelma ..... (II b 1640)
Pterotricha ..... II a 374, (II b 1640)
Pterotrichina ..... II a 379
Ptocasius ..... II b 1002
Pycnacantha ..... I 907, (II b 1641)
Pycnaxis ..... II a 747
Pycnoctenus ..... II a 146
Pycnothele ..... I 275
Pycnothelidae ..... I 275
Pylarus ..... (II b 1641)
Pyresthesis ..... II a 884, (II b 1641)
Pyrnus ..... II a 351
Pyroderes ..... (II b 1641)
Pyrophora ..... (II b 1641)
Pyrophorus ..... (II b 1641)
Pystira ..... II b 1107
Pythonissa ..... (II b 1641)

Quechuella ..... II a 545
Quekettia ..... II b 1036, (II b 1643)
Quemedice ..... II a 790

Rabidosa ..... II a 290
Rachias ..... I 184
Rachodrassus .... II a 406, (II b 1643)
Rachus ..... (II b 1643)
Radulphius ..... II a 557
Raecius ..... II b 1283
Ramboia ..... II b 994
Ramnes ..... (II b 1643)
Rarahua ..... II b 1020
Rebilus ..... II a 351
Regillulus ..... (II b 1643)
Regillus ..... (II b 1643)
Reineckella . [err. II a 747], (II b 1717)
Reinickella ..... II a 747, (II b 1717)
Remmius ..... II a 711, (II b 1643)
Retiro ..... II b 1333
Rhabdoria ..... (II b 1643)
Rhacocnemis ..... II a 683
Rhadine ..... (II b 1643)
Rhaebobates ..... II a 747
Rhaeboctesis ..... II a 568
Rhaebothorax ..... I 646, (II b 1643)
Rhane ..... (II b 1643)
Rhanis ..... (II b 1643)
Rhechostica ..... I 245
Rhene ..... II b 1233, (II b 1643)
Rhetenor ..... II b 1017
Rhianus ..... I 224

	Seite
Rhion	II b 1334
Rhitymna	II a 680
Rhode	I 302
Rhoicinaria	II a 99
Rhoicinus	II a 99
Rhomalea	(II b 1643)
Rhombonotus	(II b 1643)
Rhomphaea	I 442
Rhondes	II b 1167
Rhyncharachne	(II b 1643)
Rhynchognatha	(II b 1643)
Rhyphelia	II b 1184
Rhytidicolus	I 162
Rhytidura	II a 808
Rimania	(II b 1643)
Risdonius	I 1015
Ritalena	I a 69
Robertus	I 409, (II b 1643)
Robsonia	(II b 1643)
Roeweriana	(II b 1643)
Roeweriella	II b 1002
Rogmocrypta	II b 970
Romitia	II b 1236
Rooseveltia	(II b 1643)
Rothus	II a 122, (II b 1643)
Rualena	II a 69
Rubrius	II a 97, (II b 1644)
Rudra	II b 1016
Runcinia	II a 853, (II b 1644)
Runcinioides	II a 855
Runciniopsis	(II b 1644)
Saccodomus	II a 885
Sadala	(II b 1644)
Sagana	(II b 1644)
Sagella	(II b 1644)
Sagellula	II a 683
Saitidops	II b 1142
Saitis	II b 1095, (II b 1644)
Saitissus	II b 1098
Saitocosa	II a 290
Salassia	(II b 1644)
Salassina	(II b 1645)
Saloca	I 701
Salpesia	II b 1099
Salsula	(II b 1645)
Saltica	(II b 1645)
Salticidae	II b 933
Salticus	II b 1272, (II b 1645)
Saltonia	II a 70
Saltuinus	(II b 1650)
Sampaiosia	II a 681
Samuza	(II b 1650)
Sancus	I 922
Sandalodes	II b 1066
Sanogasta	II a 604
Santaremia	(II b 1650)
Sarascelis	I 379
Sarinda	II b 952, (II b 1650)
Sarindoides	II b 1036
Sarotes	(II b 1651)
Sarotesius	II a 711
Sarpedon	(II b 1651)
Sason	I 224
Sasonichus	I 216
Sassacus	II b 1227
Satilatlas	I 621
Satricum	(II b 1651)
Satzicus	(II b 1651)
Savignia	I 623, (II b 1651)
Savignyia	(II b 1651)
Scaea	(II b 1651)
Scalidognathus	I 176, (II b 1651)
Scaphiella	I 289
Scaptocosa	II a 290
Scartes	(II b 1651)
Scelidocteus	I 379
Scelidomachus	I 380
Schaenioscelis	II a 399
Schenioscelis	(II b 1651)
Schenkelia	II b 1002
Schenkeliella	I 512
Schiapellia	II a 604
Schilleria	(II b 1651)
Schismatothele	I 207
Schizocosa	II a 294, (II b 1651, 1717)
Schizogyna	II a 199
Schizopelma	I 236, (II b 1652)
Schoenobates	(II b 1652)
Sciastes	I 647
Scirites	I 648
Scironis	I 649
Scirtetes	(II b 1652)
Scius	(II b 1652)
Sclerogaster	(II b 1652)
Scleroschaema	I 686, (II b 1652)
Sceroschema	(II b 1652)
Scodra	I 257, (II b 1652)
Scoloderus	I 872
Scolopembolus	I 649
Scopelobates	I 237
Scopocira	II b 983
Scopodes	II a 432
Scopticus	II a 808
Scorteccia	II a 604
Scotargus	I 658, (II b 1652)
Scotina	II a 568
Scotinella	II a 569, (II b 1652)
Scotinoecus	I 210
Scotocesonia	II a 432
Scotognapha	II a 379
Scotolathys	(II b 1652)
Scotoneta	I 732
Scotophaeus	II a 432, (II b 1653)

	Seite
Scotophinus ..... II a	438
Scotopsilus ..... II a	108
Scotoussa I	649
Scoturius ..... II b	1184
Scotussa I	649
Scotynotylus ..... I 686, (II b	1653)
Scurria ..... (II b	1653)
Scylaceus I	649
Scylax ..... (II b	1653)
Scyletria I	649
Scythropa ..... (II b	1653)
Scytodes ..... I 323, (II b	1653)
Sebastira ..... II b	1039
Sedasta I	458
Segestria ..... I 308, (II b	1653)
Segestriella I	311
Segestrioides I	330
Segregara I	156
Selabis ..... (II b	1654)
Selamia ..... (II b	1654)
Selaophora ..... (II b	1654)
Selenocosmia ..... I 265, (II b	1654)
Selenogyrus I	237
Selenopidae ..... II a	731
Selenops ..... II a 731, (II b	1654)
Selenostholus I	268
Selenotypus I	268
Selimus ..... II b	1228
Selkirkiella I	912
Semiopyla ..... II b	1240
Semljicola I	658
Semnolius ..... II b	1002
Semora ..... II b	1039
Semorina ..... II b	1039
Senoculidae ..... II a	341
Senoculifer ..... II a	803
Senoculus ..... II a 341, (II b	1654)
Seothyra ..... II b	1297
Seramba ..... II a	684
Sergiolus ..... II a 438, (II b	1655)
Sericopelma ..... I 253, (II b	1655)
Servaea ..... II b	1019
Sesieutes ..... II a	580
Setaphis ..... II a 440, (II b	1655)
Shira ..... II b	1069
Sicaria ..... (II b	1655)
Sicariidae I	317
Sicarioides ..... (II b	1655)
Sicarius I	317
Sidusa ..... II b 1003, (II b	1655)
Sidyma ..... (II b	1655)
Sidymella ..... II a	758
Sigytes ..... II b	1091
Siler ..... II b	1027
Silerella ..... II b	1028
Sillemia ..... II a	441
Sillus ..... II a 545, (II b	1655)

	Seite
Siloca ..... II b	1004
Silometopus ..... I 679, (II b	1655)
Simaetha ..... II b 1009, (II b	1655)
Simaethula ..... II b	1010
Simalio ..... II a	521
Simonella ..... II b	953
Simorcus ..... II a	742
Simprulla ..... II b	1033
Simprulloides ..... II b	1033
Singa ..... I 872 (II b	1655)
Singotypa I	934
Sinis ..... (II b	1656)
Sinnamora ..... (II b	1656)
Sinoria I	650
Sintula ..... I 537, (II b	1656)
Sipalolasma I	216
Sisenna ..... II a	123
Sisicottus I	650
Sisicus I	650
Sisis I	650
Sisyrbe I	650
Sitalcas I	658
Sittacus ..... (II b	1656)
Sitticulus ..... II b	1242
Sitticus ..... II b 1243, (II b	1656)
Smeringopus ..... I 343, (II b	1657)
Smermisia I	536
Smionia ..... II a 379, (II b	1657)
Smitheria ..... (II b	1657)
Smodicinus ..... II a	813
Smodigoides ..... I 651, (II b	1657)
Smodix I	651
Sobara ..... (II b	1657)
Sobasina ..... II b	957
Soelteria ..... II a	885
Solenothele ..... (II b	1657)
Solenysa I	569
Solicosa ..... II a	295
Sonoita ..... II b	937
Sorata I	245
Sosilaus ..... II a	296
Sosippinus .... II a	313
Sosippus ..... II a 314, (II b	1657)
Sosticus ..... II a	441
Sostogeus ..... II a	441
Souceron I	651
Soudinus I	651
Souessa I	651
Souessoula I	651
Sougambus I	651
Souidas I	652
Soulgas I	652
Spadera ..... (II b	1657)
Sparassa ..... (II b	1657)
Sparassus ..... (II b	1657)
Sparianthina ..... II a	684
Sparianthis ..... II a	684

	Seite
Spariolenus	II a 723
Spartaeus	(II b 1658)
Spatala	II a 711
Spelobion	I 444
Spencerella	II a 123
Speocera	I 332
Spermophora	I 345, (II b 1658)
Sphaerobothria	I 245
Sphasus	(II b 1658)
Sphecotypus	II a 635, (II b 1659)
Sphecozone	I 710, (II b 1659)
Sphedanus	(II b 1659)
Sphingius	II a 606
Sphodros	(II b 1659)
Sphyrotinus	I 458
Spilargis	II b 991
Spilasma	I 776
Spintharidius	I 776
Spintharus	I 444, (II b 1659)
Spinurius	II b 1185
Spiracme	(II b 1659)
Spirembolus	I 665
Spiroctenus	I 184
Spiropalpus	(II b 1659)
Staberius	II a 124
Stagetillus	II b 983
Staianus	II a 730
Stajus	I 687
Stalita	I 302, (II b 1659)
Stalitella	I 303
Stalitochara	I 303
Stanneoclavis	(II b 1659)
Stanwellia	I 207
Stasimopus	I 159, (II b 1659)
Stasina	II a 685, (II b 1659)
Stasinoides	II a 685
Stasippus	(II b 1659)
Stearodea	(II b 1659)
Steassa	I 411
Steatoda	I 412, (II b 1659)
Steatodum	(II b 1659)
Stegodyphus	II b 1297, (II b 1661)
Stegosoma	(II b 1661)
Stemmops	I 459
Stemonyphantes	I 595, (II b 1661)
Stenaelurillus	II b 1142
Stenochilus	I 380, (II b 1661)
Stenoctenus	(II b 1661)
Stenodeza	II b 983
Stenodina	(II b 1661)
Stenoonops	I 280
Stenoterommata	I 172
Stenygrocercus	I 207
Stephanopis	II a 761, (II b 1661)
Stephanopoides	II a 749, (II b 1662)
Stephanopsis	(II b 1662)
Stergusa	II b 1010, (II b 1662)
Steriphopus	I 380
Sternodes	I 354
Sterrhochrotus	I 162
Stertinius	II b 1011
Stethopoma	I 414
Stethorrhagus	II a 604, (II b 1662)
Sthelota	I 523
Stichius	(II b 1662)
Stichoplastus	I 237
Stictogaster	I 165
Stictoxena	I 459
Stipax	II a 686
Stiphidiellum	II b 1378
Stiphidion	II b 1378, (II b 1662)
Stiphropella	II a 744
Stiphropus	II a 744
Stoides	(II b 1662)
Stoidis	II b 1107
Stoliczka	II a 124
Storena	I 358, (II b 1662)
Storenomorpha	I 354
Storenosoma	(II b 1662)
Storkaniella	II 1300
Stothis	I 223
Strandiellum	II a 686
Stratius	II a 585
Streptaedoea	II a 681
Streptosphaenus	I 697
Stridulattus	II b 1167
Strigoplus	II a 743
Stromatopelma	(II b 1662)
Strongyliceps	I 675
Strongylothorax	(II b 1662)
Strophaeus	I 216
Strophius	II a 743
Strotarchus	II a 522, (II b 1662)
Stygopholcus	I 346
Styloctetor	I 682, (II b 1662)
Stylophora	I 596, (II b 1662)
Stylothorax	(II b 1662)
Styphlopis	I 208
Styposis	I 392
Suaruna	II b 970
Sudabe	(II b 1662)
Suemus	II a 790
Suffucia	I 365
Sulcia	I 314
Sulsula	I 281
Sungenia	I 200
Supunna	II a 635
Susarion	(II b 1662)
Sybota	II b 1336
Syedra	I 523, (II b 1662)
Syedrula	I 524
Syilligma	II a 810
Sylvia	(II b 1663)
Symmigma	I 617

	Seite
Symopagia	I 387
Symphanodes	II a 473
Symphytognatha	I 1015
Symphytognathidae	I 1014
Symposia	II a 98
Synaema	(II b 1663)
Synaemops	II a 885
Synaemosyne	(II b 1663)
Synageles	II b 1040, (II b 1663)
Synagelides	II b 1041
Synalus	II a 764
Synaphris	I 394
Synema	II a 885, (II b 1663)
Synemosyna	II b 955, (II b 1663)
Synotaxus	I 445
Synothele	I 218
Synstrophius	II a 744
Syntrechalea	II a 139
Syrisca	II a 557, (II b 1664)
Syroloma	II a 296
Syrorisa	II b 1371
Syspira	II a 558
Systaria	II a 522
Systenita	I 347
Systenoplacis	I 374

Tachygyna	I 729
Tachyskarthmos	II b 1004
Taczanowskia	I 908
Tacuna	II b 1236
Taeoma	II b 1099
Tafana	II a 546
Tagulinus	II a 803
Tagulis	II a 804
Taivala	II b 1092
Talanites	II a 406
Talaus	II a 826
Talavera	II b 1229
Tallonia	(II b 1664)
Talthybia	I 890
Tama	I 383
Tambouriniana	I 176
Tandil	II b 1334
Tanna	II b 936
Tanybelus	II b 1017
Tanypus	(II b 1664)
Taphiassa	I 414, (II b 1664)
Tapinasta	(II b 1664)
Tapinattus	(II b 1664)
Tapinauchenius	I 257, (II b 1664)
Tapinesthis	I 281
Tapinillus	II a 339
Tapinocyba	I 701, (II b 1664)
Tapinopa	I 563, (II b 1665)
Tapinothele	II a 139, (II b 1665)
Tapinothelella	II a 139
Tapinothelops	II a 140

Tapponia	II a 340, (II b 1665)
Tara	II b 1028
Taranucnus	I 598, (II b 1665)
Tarantula	(II b 1665)
Tarantuloides	(II b 1665)
Tarantula	(II b 1665)
Tarentula	(II b 1665)
Tariona	II b 1004, (II b 1672)
Tarne	II b 1005
Tarodes	II b 988
Tarrocanus	II a 805
Tarsiphantes	I 564
Tarsonops	I 317
Tasata	IIa 546
Tasmanoonops	I 281
Tatacantha	(II b 1672)
Tatari	II b 1023
Taunayella	I 200
Taupoa	II b 1033
Taurongia	II b 1371
Tecmessa	I 951
Tectrix	(II b 1672)
Tedia	I 303
Tegenaria	II a 70, (II b 1672)
Teippus	II a 140, (II b 1674)
Tekella	I 459
Telamonia	II b 1167, (II b 1674)
Telchius	I 281
Telema	I 314
Telemidae	I 314
Temecula	II b 1334
Teminius	II a 407 (II b 1674)
Temnida	II a 546
Tenedos	(II b 1674)
Tengella	II b 1379
Tengellidae	II b 1379
Tennesseellum	I 603
Tentabunda	(II b 1674)
Tephlea	(II b 1674)
Teratodes	(II b 1674)
Terupis	II a 547
Testudinaria	I 911, (II b 1674)
Tetrablemma	I 289
Tetracantha	(II b 1674)
Tetragnatha	I 973, (II b 1674)
Tetragnathidae	I 971
Tetragonophthalma	II a 124, (II b 1674)
Tetralycosa	II a 296
Tetrarctosa	II a 296
Tetrilus	II a 79, (II b 1677)
Tetromma	(II b 1677)
Teudis	II a 547, (II b 1677)
Teutamus	II a 580
Teutana	I 414, (II b 1677)
Textrix	II a 80, (II b 1677)
Thaida	II a 98
Thalamia	(II b 1677)

	Seite
Thalassiops	II a 146
Thalassius	II a 146, (II b 1677)
Thalerommata	I 223
Thalerothele	I 200, (II b 1677)
Thallumetus	II b 1334, (II b 1677)
Thamphilus	(II b 1677)
Thammaca	II b 1229
Thanata	(II b 1677)
Thanatidius	II a 125, (II b 1677)
Thanatus	II a 790, (II b 1677)
Thapsagus	I 687
Thargalia	(II b 1678)
Tharpyna	II a 834
Tharrhalea	II a 748
Thasyraea	II a 671
Thaumasia	II a 140, (II b 1678)
Thaumatochilus	I 355
Thaumatoncus	I 703, (II b 1679)
Thelacantha	(II b 1678)
Thelcticopis	II a 686, (II b 1678)
Thelechoris	(II b 1679)
Thelticopis	(II b 1679)
Themarcys	II b 1379
Themeropis	(II b 1679)
Theoclia	(II b 1679)
Theonina	I 524
Theonoe	I 394, (II b 1679)
Theotima	I 332
Theragretes	(II b 1679)
Theraphosa	I 249, (II b 1679)
Theraphosia	(II b 1679)
Theraphosidae	I 224
Theratoscirtus	(II b 1679)
Theridiella	I 459
Theridiellum	(II b 1679)
Theridiidae	I 386
Theridilella	I 459
Theridio	(II b 1679)
Theridion	I 459, (II b 1679)
Theridionexus	(II b 1686)
Theridiosoma	I 969, (II b 1686)
Theridium	(II b 1686)
Theridula	I 505, (II b 1686)
Therimachus	(II b 1686)
Theringia	(II b 1686)
Therosa	(II b 1686)
Theuma	II a 353
Theumella	II a 355
Thianella	II b 1146
Thiania	II b 1146, (II b 1686)
Thianioides	II b 1148
Thianitara	II b 1148
Thiene	(II b 1686)
Thiodina	II b 977, (II b 1686)
Thiratoscirtus	II b 1092
Thiratoscyrtus	(II b 1686)
Thlaosoma	(II b 1686)

	Seite
Tholia	(II b 1686)
Thomasettia	II a 688
Thomisa	(II b 1686)
Thomisidae	II a 742
Thomisoides	(II b 1686)
Thomisops	II a 829, (II b 1686)
Thomisus	II a 855, (II b 1686)
Thonastica	I 507
Thoracites	I 893
Thore	(II b 1692)
Thorellia	(II b 1692)
Thorelliola	II b 991
Thoriosa	II a 659
Thotmes	(II b 1692)
Thrigmopoeus	I 274, (II b 1692)
Thwaitesia	I 507, (II b 1692)
Thya	(II b 1692)
Thyene	II b 1109, (II b 1692)
Thyenillus	II b 1112
Thyenula	II b 1112
Thymoites	I 428, (II b 1692)
Thyreobaeus	I 611, (II b 1692)
Thyreosthenius	I 703, (II b 1692)
Thyropoeus	I 193
Thysa	(II b 1693)
Thysanina	II a 570
Thysema	II b 993
Tibellinus	II a 797
Tibelloides	II a 797
Tibellomimus	(II b 1693)
Tibellomma	II a 731
Tibellus	II a 797, (II b 1693)
Tibitanus	II a 801
Tidarren	I 508
Tigellinus	I 666, (II b 1693)
Tigidia	I 216
Tijuca	I 365
Timonoe	I 923
Tinus	II a 141
Tiso	I 687, (II b 1693)
Titanattus	II b 970
Titanebo	II a 802
Titanidiops	(II b 1693)
Titanoeca	II b 1371 (II b 1693)
Titidiops	II a 814
Titidius	II a 814
Titiotus	II a 659
Titurius	(II b 1693)
Titus	II a 441
Tivodrassus	II a 408
Tivyna	(II b 1693)
Tmarus	II a 815, (II b 1693)
Tmesiphantes	I 237
Tmeticides	I 652
Tmeticus	(II b 1694)
Tobesoa	(II b 1696)
Tobias	II a 765, (II b 1696)

	Seite
Togacantha	(II b 1696)
Toloella	II b 989
Tolophus	II a 552
Tomis	II b 1252
Tomocyrba	II b 970
Tomopisthes	II a 552
Tomoxena	I 509
Torania	II a 724, (II b 1696)
Tortembolus	I 667, (II b 1696)
Tortolena	II a 83
Tortula	(II b 1696)
Tosyna	(II b 1696)
Totmes	(II b 1696)
Totua	I 970
Toxeus	(II b 1696)
Toxopidae	II a 99
Toxops	II a 99
Trabaea	(II b 1696)
Trabaeosa	II a 297
Trabea	II a 199, (II b 1696)
Trachelas	II a 585, (II b 1697)
Trachelocamptus	I 703, (II b 1697)
Trachelopachys	II a 590
Trachycosmus	II a 408
Trachygnatha	(II b 1697)
Trachynella	I 667
Trachynotus	(II b 1697)
Trachytrema	II a 408
Trachyzelotes	(II b 1697)
Traematosisis	I 652
Tranquilinus	(II b 1697)
Trapezocephalus	II b 1278
Trasyphoberus	I 249
Trechalea	II a 142, (II b 1697)
Trechona	I 201, (II b 1697)
Trematocephalus	I 632, (II b 1697)
Trephopoda	II a 379
Triaeris	I 289
Tricantha	(II b 1697)
Tricca	II a 297, (II b 1698)
Triccassa	II a 297
Triccosta	II a 298
Trichocharis	I 890
Trichocyclus	I 347
Tricholathys	II b 1335
Trichoncus	I 732, (II b 1698)
Trichonephila	(II b 1698)
Trichopagis	II a 751
Trichopelma	I 223
Trichopterna	I 618, (II b 1698)
Trichothyse	II a 441
Trichursa	I 912
Triclaria	(II b 1698)
Tricongius	II a 381
Trigonobothrys	I 387
Triptolemus	(II b 1698)
Tristichops	I 375, (II b 1698)
Trite	II b 1031, (II b 1698)
Trithena	I 388, (II b 1698)
Trittame	I 217
Trivia	(II b 1698)
Trochanteria	II a 351
Trochosa	II a 298, (II b 1698)
Trochosina	II a 302, (II b 1700)
Trochosippa	II a 303
Trochosomma	II a 304
Trochosula	II a 304
Troglohyphantes	I 564, (II b 1700)
Troglonata	I 395
Troglothele	I 223
Troxochrota	I 688
Troxochrus	I 688, (II b 1700)
Tructicus	I 219
Trujillina	II a 671
Trygetus	I 365
Tryssoclitus	I 375, (II b 1701)
Tryssothele	I 202, (II b 1701)
Tuberta	II a 83, (II b 1701)
Tugana	II b 1375
Tuganobia	I 598
Tularosa	II b 1005
Tullgrenella	II b 1184
Tulpius	II b 1229
Tunabo	II a 143
Tunagyna	I 652, (II b 1701)
Turckheimia	(II b 1701)
Tusitala	II b 1005, (II b 1701)
Tutaibo	I 710
Tutelina	II b 1170, (II b 1701)
Tuticanus	II a 659
Twaitesia	(II b 1701)
Tychicus	II a 728, (II b 1701)
Tylogonus	II b 1005, (II b 1701)
Tylophora	(II b 1701)
Tylorida	I 1013
Typhistes	I 710
Typhlochlaena	(II b 1701)
Typhlonesticus	I 513, (II b 1701)
Typhloneta	(II b 1701)
Typhlonyphia	I 568
Typhlorhode	I 303
Typhochraestus	I 704, (II b 1701)
Typostola	II a 682
Tyrrhus	(II b 1701)
Uahuka	I 729
Uapou	I 729
Uduha	II b 1283
Ulesanis	I 388, (II b 1701)
Uliodon	II a 659, (II b 1702)
Uloborella	II b 1336
Uloboridae	II b 1335
Uloborus	II b 1336, (II b 1702)
Ulocymus	II a 742

	Seite
Uluella ..... II b	990
Umfila ..... I 392, (II b	1702)
Umangia I	262
Umidia ..... (II b	1702)
Ummidia ..... [II b	1702], (II b 1715)
Upognampa ..... II a	379
Uptiota ..... (II b	1702)
Uptiotes ..... II b 1346, (II b	1702)
Uraaradne ..... II a	863
Urgulania ..... (II b	1702)
Uroballus ..... II b	1012
Uroctea ..... I 385, (II b	1702)
Urocteidae I	385
Urothele I	219
Urozelotes ..... II a	441
Urquhartia ..... II a	109
Ursa I	912
Uruchus I	202
Usofila I	333
Uthina I	347
Utopiellum ..... I 658, (II b	1702)
Uxuma ..... II b	1006

Vacchellia ..... II a	802
Vagellia ..... II a	98
Vailima ..... II b	1020
Valcheta ..... II a	98
Valloa ..... II b 1236, (II b	1703)
Varacosa ..... II a	304
Varyna ..... (II b	1703)
Vatovia ..... II b	1012
Vectius ..... II a	474
Veleda ..... (II b	1703)
Velloa ..... (II b	1703)
Vellutus ..... (II b	1703)
Venator ..... II a 307, (II b	1703)
Venatrix ..... II a	307
Venonia ..... II a	307
Vendilgarda ..... (II b	1703)
Verrucosa ..... I 879, (II b	1703)
Vesubia ..... II a	307
Vibrada ..... (II b	1703)
Vibradellus ..... (II b	1703)
Viciria ..... II b 1070, (II b	1703)
Viderius ..... (II b	1703)
Vindima ..... (II b	1703)
Vindullus ..... (II b	1703)
Vinnius ..... II b	1074
Virada ..... (II b	1703)
Viridasius ..... (II b	1703)
Viroqua ..... II b	1006
Vixia ..... (II b	1703)
Voconia ..... (II b	1703)
Voraptipus ..... II a	143
Voraptus ..... II a	144
Vulfila ..... (II b	1703)
Vulsor ..... II a	660

Wadotes ..... II a	83
Wagneria ..... (II b	1703)
Wagneriana I	880
Wala ..... (II b	1703)
Walckenaera ..... (II b	1703)
Walckenaeria ..... I 668, (II b	1703)
Wallaba ..... II b	967
Walmus ..... II b	1375
Wamba ..... (II b	1706)
Wanops I	281
Wechselia ..... II a	866
Weissella ..... (II b	1706)
Wendilgarda ..... I 971, (II b	1706)
Whittickius ..... II a	863
Wibrada I	390
Wideria ..... I 669, (II b	1706)
Willibaldia ..... (II b	1706)
Wirada ..... I 392, (II b	1706)
Witica ..... I 894, (II b	1706)
Wixia I	881
Wubana I	710
Wulfila ..... II a 553, (II b	1706)

Xenesthis ..... I 253, (II b	1707)
Xenoctenus ..... II a	661
Xerolycosa ..... II a	308
Xerophaeus ..... II a 442, (II b	1707)
Xeropigo ..... (II b	1707)
Xestaspis ..... I 290, (II b	1707)
Xingusiella ..... II a	144
Xylethrus I	951
Xyphinus I	290
Xystica ..... (II b	1707)
Xysticus ..... II a 895, (II b	1707)

Yllenus ..... II b 1252, (II b	1710)
Yorima ..... II a	84
Yumates I	290
Yvesella ..... (II b	1710)

Zachria ..... II a 682, (II b	1710)
Zametopias ..... II a	805
Zametopina ..... II a	805
Zanomys ..... II b 1376, (II b	1710)
Zantheres ..... II a	310
Zatapina ..... (II b	1710)
Zavattarica ..... II a	473
Zelotes ..... II a 444, (II b	1710)
Zenodorus ..... II b	1107
Zenonina ..... II a 200, (II b	1711)
Zeugonephila ..... (II b	1711)
Zeuxippus ..... II b	1236
Zigana I	883
Zilephus I	524
Zilla ..... I 883, (II b	1711)
Zimirina ..... II a	346
Zimiris ..... II a 347, (II b	1712)

	Seite
Zimiromus ..... II a	355
Zobia ..... (II b	1712)
Zodariidae I	353
Zodarion ..... I 365, (II b	1712)
Zodariops I	372
Zodarium ..... (II b	1712)
Zoica ..... II a	99
Zophoryctes I	217
Zora ..... II a 663, (II b	1712)
Zornella ..... I 652, (II b	1713)
Zorocrates ..... II b	1283
Zorodictyna ..... II b	1284
Zoroides ..... II a	665
Zoropsidae ..... II b	1283
Zoropsis ..... II b 1284, (II b	1713)
Zosis ..... (II b	1713)
Zuniga ..... II b	1034
Zygia ..... (II b	1713)
Zygiella ..... I 883, (II b	1713)
Zygoballus .... .II b 1017, (II b	1713)
Zygometis ..... II a	863
Zygopelma I	223