

Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique

BULLETIN

Tome XXVIII, n° 29.
Bruxelles, avril 1952.

Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen

MEDEDELINGEN

Deel XXVIII, n° 29.
Brussel, April 1952.

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES HOMOPTERES.

II. — Détermination d'Homoptères
de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique,

par Victor LALLEMAND et Henri SYNAVE (Bruxelles).

Famille *CICADIDÆ*.

Sous-famille *GEANINÆ*.

Genre *Mogannia* AMYOT et SERVILLE.

AMYOT, C. J. B. et SERVILLE, J. G. A., 1843, Hist. nat.
Hémipt., p. 467.

Mogannia effecta DISTANT.

DISTANT, W. L., 1892, Ann. Mag. Nat. Hist., sér. 6, vol. 9,
p. 316.

1 ex: Laos, 26-III-1920 (R. VITALIS DE SALVAZA).

Famille *EURYMELIDÆ*.

Sous-famille *EURYMELINÆ*.

Genre *Eurymela* LEPELETIER et SERVILLE.

LEPELETIER, A. L. M. et SERVILLE, J. G. A., 1828, Encycl.
Méthod., 10, p. 603.

Eurymela pulchra SIGNORET.

SIGNORET, V., 1850, Ann. Soc. Ent. France, vol. 8, p. 508.
2 ex. : Sans localité.

Famille *ÆTHALIONIDÆ*.

Genre *Darthula* KIRKALDY.

Urophora GRAY, G. R., 1832, Griff. Ed. Anim. Kingd., Ins. II, p. 261.

Darthula KIRKALDY, G. W., 1900, Canad. Ent., p. 242.

Darthula hardwickii GRAY.

Urophora hardwickii GRAY, G. R., 1832, Griff. Ed. Anim. Kingd., Ins. II, p. 261, tab. 90, fig. 3; tab. 138, fig. 5 a, d.
1 ex. : Bengale, Kurseong.

Famille *CERCOPIDÆ*.

Sous-famille *APHROPHORINÆ*.

Tribu **Ptyelini**

A. — Genre **Ptyelus** LEPELETIER et SERVILLE.

LEPELETIER, A. L. M. et SERVILLE, J. G. A., 1825, Enc. Méth., vol. 10, p. 608.

1. — **Ptyelus goudoti bifasciatus** SIGNORET.

SIGNORET, V., 1860, Ann. Soc. Ent. France (3), vol. 8, p. 183.
9 ex. : Marinavivo, Madagascar (Coll. LE MOULT).

2. — **Ptyelus flavescens** (FABRICIUS).

Tettigonia flavescens FABRICIUS, J. C., 1794, Ent. Syst., vol. 4, p. 24.

1 ex. : Usambara, Nguelo.

3. — **Ptyelus flavescens olivaceus** (FABRICIUS).

Tettigonia flavescens var. *olivaceus* FABRICIUS, J. C., 1794, Ent. Syst., vol. 4, p. 25.

13 ex. : Congo Français (Coll. LE MOULT).

4. — *Ptyelus grossus* (FABRICIUS).

Cercopis grossus FABRICIUS, J.C., 1794, Ent. Syst., vol. 4, p. 47.

3 ex.: Fort Sibut, Haut-Chari, Congo Français (Coll. LE MOULT); Mongoumba, Moyen Congo Français.

B. — Genre *Ptyelinellus* LALLEMAND.

LALLEMAND, V., 1946, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., Tome LXXXII, p. 190.

1. — *Ptyelinellus nebulosus* (FABRICIUS).

Cercopis nebulosus FABRICIUS, J. C., 1794, Syst. Entom., vol. 4, p. 50.

1 ex.: Barway (P. CARDON).

2. — *Ptyelinellus præfractus* (DISTANT).

Ptyelus præfractus DISTANT, W. L., 1907, Fauna Brit. Ind., vol. 4, p. 89, fig. 69.

3 ex.: Saïgon, Cochinchine, 29-VII-1924, 27-IX-1923, 7-X-1923 (R. VITALIS DE SALVAZA).

C. — Genre *Philænus* STÅL.

STÅL, C., 1864, Stett. Ent. Zeit., vol. 25, p. 66.

1. — *Philænus spumarius* (LINNÉ).

Cicada spumaria LINNÉ, C., 1761, Faun. Suec. (éd. 2), p. 240.

2 ex.: Dalmatie (STROBL).

2. — *Philænus spumarius leucocephalus* (LINNÉ).

Cicada spumaria var. *leucocephala* LINNÉ, C., 1761, Faun. Suec. (édit. 2), p. 240.

2 ex.: Styrie, Alpes (STROBL).

3. — *Philænus spumarius vittatus* (FABRICIUS).

Cercopis spumarius var. *vittatus* FABRICIUS, J. C., 1803, Syst. Rhyng., p. 96.

1 ex.: Berlin (H. ROLL.).

D. — Genre *Cephisus* STÅL.

STÅL, C., 1866, Hem. Afric., vol. 4, p. 67.

Cephisus siccifolius (WALKER).

Aphrophora siccifolia WALKER, F., 1851, List. Hom. Ins., vol. 3, p. 698.

2 ex.: St-Laurent du Maroni, Guyane Française (Coll. LE MOULT); Villa Rica, Paraguay.

E. — Genre *Poophilus* STÅL.

STÅL, C., 1866, Hem. Afric., vol. 4, p. 72.

1. — *Poophilus conspersus* STÅL.

STÅL, C., 1866, Hem. Afric., vol. 4, p. 73.

3 ex.: Fort Sibut, Haut-Chari, Congo Français (Coll. LE MOULT).

2. — *Poophilus costalis* (WALKER).

Ptyelus costalis WALKER, F., 1851, List. Hom. Ins., vol. 3, p. 707.

5 ex.: Biafra, Alem, V-1919 (ESCALERA); Fort Sibut, Haut-Chari, Congo Français (Coll. LE MOULT).

F. — Genre *Clovia* STÅL.

STÅL, C., 1866, Hem. Afric., vol. 4, p. 68.

1. — *Clovia perroti* LALLEMAND.

LALLEMAND, V., 1920, Ann. Soc. Ent. France, vol. 88, p. 281.

3 ex.: Madagascar (Coll. LE MOULT).

2. — *Clovia varia* (WALKER).

Perinoia varia WALKER, F., 1851, List. Hom. Ins., vol. 3, p. 730.

1 ex.: Mt. Makiling, Luzon (BAKER).

3. — *Clovia conifera* (WALKER).

Ptyelus conifer WALKER, F., 1851, List. Hom. Ins., vol. 3, p. 711.

2 ex.: Cochinchine, 31-I-1921 (R. VITALIS DE SALVAZA).

G. — Genre *Philagra* STÅL.

STÅL, C., 1862, Trans. Ent. Soc. Lond. (3), vol. 1, p. 593.

1. — *Philagra albinotata* UHLER.

UHLER, P. R., 1896, Proc. U. S. Nat. Mus. Wash., vol. 19, p. 286.

1 ex.: Chuzenii, Japon, 4.000-5.000 pieds, juillet-août 1913 (F. MUIR).

2. — *Philagra parva* (DONOVAN).

Fulgora parva DONOVAN, E., 1805, Ins. New Holl. Hem., pl. I, fig. 2.

1 ex.: Tweed Heads, Queensland, VII-1919 (Coll. F. MUIR).

Sous-famille *CERCOPINÆ*.

Tribu *Callitettigini*.

A. — Genre *Callitettix* STÅL.

STÅL, C., 1865, Ofv. K. Vet.-Akad. Förh., p. 152.

1. — *Callitettix versicolor* (FABRICIUS).

Cicada versicolor FABRICIUS, J. C., 1794, Ent. Syst., vol. 4, p. 50.

3 ex.: Cochinchine, 19-X-1923 (R. VITALIS DE SALVAZA); Saïgon, 10-IX-1920 (R. VITALIS DE SALVAZA).

2. — *Callitettix collarti* sp. n.

Postclypéus bombé, à carène médiane longitudinale, vue de côté, formant angle rentrant avec l'antéclypéus. Pronotum long, à peu près aussi long que large entre les angles scapulaires, ses bords latéro-antérieurs sont droits et plus longs que les latéro-postérieurs qui sont légèrement concaves, sa surface est finement ponctuée en avant et granuleuse en arrière, elle montre 2 grandes fossettes latéro-antérieures. Sur l'écusson, 3 fossettes, une grande médiane et 2 petites latéro-antérieures. Sur les élytres, longs, les nervures médiane et cubitale sont soudées. Fémurs antérieurs plus longs que les autres. Noir; yeux bruns; sur les élytres, 2 taches, une petite, blanche,

transversale, au niveau de la réunion des nervures médiane et cubitale, une grande, rouge, au bord costal, au niveau de la pointe du clavus.

Longueur : 13 mm.

Type : 1 ♀ : Indochine, juin 1938 (Coll. LALLEMAND).

Paratypes : 2 ex. ♀♀ : Cochinchine, 13-VI-1924 (R. VITALIS DE SALVAZA).

Cette espèce se distingue de *C. versicolor* FABRICIUS (à laquelle elle ressemble fortement par la coloration et le dessin des élytres) par la taille et surtout la forme des anté- et postclypéus. Chez *C. collarti*, le postclypéus est bombé; vu de côté, il dessine un angle droit très arrondi dont les 2 côtés sont à peu près égaux, et forme avec l'antéclypéus un angle rentrant, tandis que chez *C. versicolor*, le postclypéus, vu de côté, dessine un angle obtus dont le bord antérieur convexe est nettement plus court que le postérieur qui est droit; à partir de l'angle, la surface médiane est aplatie et se continue en ligne droite avec la médiane de l'antéclypéus, aplatie elle aussi.

Nous dédions cette espèce à M. A. COLLART, Directeur de laboratoire à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

B. — Genre *Abidama* DISTANT

DISTANT, W. L., 1907, Fauna Brit. India, vol. 4, p. 114.

Abidama cochinchinensis sp. n.

Tête, pronotum, écusson, pro- et mésosternum, noirs, recouverts d'une villosité dense; métasternum et abdomen rouges, brun-rougeâtre clair ou brun clair; rostre, pattes antérieures et médianes brun noirâtre; pattes postérieures de même couleur que le métasternum. Elytres noirs ou brun noirâtre, partie apicale plus brune; 4 taches rouges sur les élytres, deux sur la moitié antérieure dont une sur le clavus, l'autre sur la corie, un peu plus en arrière; les deux autres au devant de l'apex, l'une au niveau de la pointe du clavus, plus petite, l'autre beaucoup plus grande, en face, au bord costal. Postclypéus, à milieu étroit, transversalement arrondi (plus ou moins en forme de bourrelet), à faces latérales obliques, brillantes, légèrement striées; vu de côté, son bord antérieur (formé par la ligne médiane) est droit et se continue directement avec celui de l'antéclypéus; il dessine un angle obtus avec le prolongement

du front; celui-ci est séparé du vertex et des tempes par des sillons bien nets; la tête se prolonge vers l'avant en forme de cône chez les ♂♂. Sur le vertex, une élévation médiane sur laquelle se trouvent les deux ocelles, qui sont séparés par une carène longitudinale; leur écartement est un peu moins grand que leur distance des yeux. Pronotum très légèrement granuleux, sans carène, long, à bords latéro-antérieurs droits, bord postérieur à peine concave. Ecusson finement strié, à fossette médiane faiblement marquée; deux petites dépressions latérales à son bord antérieur. Elytres longs et étroits, 2 1/2 fois aussi longs que larges. Fémurs antérieurs longs, beaucoup plus longs que les autres, une forte épine sur les tibias postérieurs.

♂ : Lames latérales étroites à la base, fortement mais progressivement élargies vers l'apex, terminées par un prolongement long et mince; bord externe convexe, l'interne légèrement concave; bord apical avec dépression médiane et de ce fait bilobé. Styles génitaux, vus de côté, présentant à la base, une petite saillie anguleuse vers l'intérieur, bord externe convexe,




Fig. 1. — *Abidama cochinchinensis* sp. n. : a, lame latérale gauche, vue ventrale (env. $\times 45$); b, style génital gauche, vue latéro-ventrale gauche (env. $\times 45$).

bord interne concave, apex bilobé, le lobe interne très long, en forme de protubérance.

Longueur totale : ♂, 8 mm ; ♀, 9 mm.

Type : 1 ♂ : Annam, Dalat, 29-X-1920 (R. VITALIS DE SALVAZA).

2 paratypes ♂♂ : Cochinchine, Than-Moï, 20-V-1923 (R. VITALIS DE SALVAZA).

C. — Genre *Caloscarta* BREDDIN,

BREDDIN, G., 1903, Soc. Ent. Zur., vol. XVIII, p. 99.

Caloscarta capitata (STÅL).

Callitettix capitata STÅL, C., 1865, Ofv. K. Vet. Akad. Förh., vol. 22, p. 152.

1 ex. : Peradeniva, Ceylan, 14/18-XII-1910 (A. LUTHER).

Tribu Tomaspidini

A. — Genre *Tomaspis* AMYOT et SERVILLE.

AMYOT, C. J. B. et SERVILLE, J. G. A., 1843, Hist. Nat. Hém., p. 560.

Tomaspis furcata (GERMAR).

Cercopis furcata GERMAR, E. F., 1821, Mag. Ent., vol. 4, p. 302.

1 ex. : Petropolis, Brésil.

B. — Genre *Phymatostetha* STÅL (1).

STÅL, C., 1870, Ofv. K. Vet.-Akad. Förh., vol. 27, p. 721.

Phymatostetha stellata (GUÉRIN).

Cercopis stellata GUÉRIN, F. E., 1838, Icon. Règne Animal, p. 368.

1 ex. : Gunong Kledang, Perak, nov. 1916.

(1) Le genre *Phymatostetha*, par suite de la position de ses ocelles qui sont beaucoup plus près l'un de l'autre que des yeux et par l'absence de carène sur le postelypéus, doit faire partie de la tribu des *Tomaspidini*.

Tribu *Eoscartini*A. — Genre *Eoscarta* BREDDIN,

BREDDIN, G., 1902, Soc. Ent. Zur., vol. 17, p. 58.

1. — Sous-Genre *Eoscarta* s. str. LALLEMAND.

LALLEMAND, V., 1949, Mém. Inst. roy. Sc. nat. Belg., Rév. Cercop., sér. 2, fasc. 32, p. 41.

Eoscarta borealis (DISTANT).

Cosmoscarta borealis DISTANT, W. L., 1878, Trans. Ent. Soc., p. 131.

1 ex. : Laos, 17-III-1920 (R. VITALIS de SALVAZA).

2. — Sous-Genre *Paræoscarta* LALLEMAND.

LALLEMAND, V., 1949, Mém. Inst. roy. Sc. nat. Belg., 2^e série, fasc. 32, p. 48.

Paræoscarta liternoides laosensis SCHMIDT.

Eoscarta laosensis SCHMIDT, E., 1908, Stett. Ent. Zeit., vol. 79, p. 203.

1 ex. : Saïgon, Cochinchine, 20-XII-1923 (R. VITALIS DE SALVAZA).

Tribu *Rhinaulacini*.Sous-Tribu *Liternina*.Genre *Amberana* DISTANT.

DISTANT, W. L., 1908, Ann. Mag. Nat. Hist., sér. 8, vol. 12, p. 313.

1. — *Amberana marginata* (FALLOU).

Sphenorhina marginata FALLOU, G., 1890, Rev. Ent., vol. IX, p. 351.

15 ex. : Madagascar (Coll. LE MOULT).

2. — *Amberana pygmæa* SCHMIDT.

SCHMIDT, E., 1919, Arch. f. Naturg., vol. 85, A, p. 101.

7 ex. : Tananarive, Madagascar (Coll. LE MOULT).

3. — *Amberana melanops* (JACOBI).

Dauphina melanops JACOBI, A., 1917, Zik. Madagascar und Comoren, p. 543.

3 ex. : Tananarive, Madagascar, septembre (Coll. LE MOULT).

Sous-Tribu Pœciloterpina.

Genre Mioscarta BREDDIN,

BREDDIN, G., 1901, Abh. Naturf. Ges., Halle, vol. 24, p. 123.

Mioscarta forcipata BREDDIN,

BREDDIN, G., 1901, Abh. Naturf. Ges., Halle, vol. 24, p. 123.

5 ex. : S. Célèbes, Lompa-Battan, 3.000 m, févr. 1896 (H. FRÜHSTORFER) ; Bua Kraeng, S. Célèbes, 5.000 m, févr. 1896 (H. FRÜHSTORFER).

Tribu Locridini.

Genre Locris STÅL.

STÅL, C., 1866, Hem. Afr., vol. IV, pp. 56 et 57.

1. — *Locris rubra* (FABRICIUS).

Cercopis rubra FABRICIUS, J. C., 1794, Ent. Syst., vol. 4, p. 48.

3 ex. : Kaolak, Sénégal (Coll. LE MOULT).

2. — *Locris rubra rubens* (ERICKSON).

Cercopis rubra var. *rubens* ERICKSON, W. F., 1842, Preisverz. v. v. Doubl., p. 12.

18 ex. : Kaolak, Sénégal (Coll. LE MOULT).

3. — *Locris flava lutea* LALLEMAND.

LALLEMAND, V., 1910, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. LIV, p. 46.

1 ex. : Kaolak (Coll. LE MOULT).

4. — *Locris intermedia* SCHOUTEDEN.

SCHOUTEDEN, H., 1901, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. XIV, p. 118.

8 ex. : Fort Sibut, Haut-Chari, Congo Français (Coll. LE MOULT).

5. — *Locris transversa* (THUNBERG).

Cercopis transversa THUNBERG, C. P., 1822, Hem. Rostr. Cap.,
vol. I, p. 4.

1 ex. : Sans localité.

6. — *Locris areata* WALKER.

WALKER, F., 1851, List. Hom. Ins., vol. 3, p. 675.

42 ex. : Maevatanana, Madagascar (Coll. LE MOULT).

7. — *Locris areata hamulata* JACOBI.

JACOBI, A., 1921, Arch. f. Naturg., vol. 87, A, p. 36.

1 ex. : Nguelo.

8. — *Locris maculata* FABRICIUS.

FABRICIUS, J. C., 1794, Ent. Syst., vol. 4, p. 48.

61 ex. : Fort Crampel, Congo Français (Coll. LE MOULT) ;
Nola, Congo Français (Coll. LE MOULT) ; Fort Sibut, Haut-
Chari, Congo Français (Coll. LE MOULT) ; Mongoumba, Congo
Français (Coll. LE MOULT) ; Haut-Chari-Tchad, Fort Sibut.
(Coll. LE MOULT) ; riv. Lobaye, Congo Français ; Côte d'Ivoire,
Dimbroko ; Sierra Leone (GONNELLE).

Tribu Ischnorhinini.

A. — Genre *Baetkia* SCHMIDT.

SCHMIDT, E., 1920, Stett. Ent. Zeit., vol. 81, p. 73.

Baetkia compressa LEPELETIER et SERVILLE.

Tomaspis compressa LEPELETIER, A.L.M. et SERVILLE, J.G.A.,
1825, Encyclop. Méthod., vol. X, p. 606.

5 ex. : St-Laurent du Maroni, Guyane Française (Coll. LE
MOULT).

B. — Genre *Laccogrypota* SCHMIDT.

SCHMIDT, E., 1920, Stett. Ent. Zeit., vol. 81, p. 75.

Laccogrypota valida (DISTANT).

Ischnorhina valida DISTANT, W. L., 1909, Ann. Mag. Nat. Hist.,
sér. 8, vol. 3, p. 81.

1 ex. : St-Jean du Maroni, Guyane Française (Coll. LE
MOULT).

C. — Genre *Typeschata* SCHMIDT.

SCHMIDT, E., 1920, Stett. Ent. Zeit., vol. 81, p. 84.

1. — *Typeschata intermedia* SCHMIDT.

SCHMIDT, E., 1920, Stett. Ent. Zeit., vol. 81, p. 86.

1 ex. : Etat de Sao-Paulo, Brésil.

2. — *Typeschata acuta* (STÅL).

Sphenorhina acuta STÅL, C., 1858, Rio Jan. Trach. Hem. Faun.,
vol. 2, p. 14.

1 ex. : Sans localité.

D. — Genre *Ischnorhina* STÅL.

STÅL, C., 1869, Hem. Fabric., vol. 2, p. 14.

Ischnorhina surinamensis SCHMIDT.

SCHMIDT, E., 1920, Stett. Ent. Zeit., vol. 81, p. 91.

3 ex. : Roches de Kourou, Guyane Française (Coll. LE MOULT) ;
Nouveau Chantier, Guyane Française (Coll. LE MOULT) ; St-Jean
du Maroni, Guayne Française (Coll. LE MOULT).

Tribu Cercopini.

Sous-Tribu Cercopina.

A. — Genre *Cercopis* FABRICIUS.

FABRICIUS, J. C., 1775, Syst. Ent., p. 688.

Cercopis sanguinolenta intermedia KIRSCHBAUM.

KIRSCHBAUM, C. L., 1868, Cig. Geg. Wiesb. und Frankf.,
p. 62.

1 ex. : Amchit, Liban.

B. — Genre *Hemitricphora* LALLEMAND.

LALLEMAND, V., 1949, Mém. Inst. roy. Sc. nat. Belg., Rév.
Cercop., sér. 2, fasc. 32, p. 172.

Hemitriecphora haglundii (SCHOUTEDEN).

Tomaspis haglundii SCHOUTEDEN, H., 1901, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. XLV, p. 118.

1 ex. : Mwene-Huku, Katanga, Congo Belge, nov. 1925 (Coll. LE MOULT).

C. — Genre **Triecphora** AMYOT et SERVILLE.

AMYOT, C. J. B. et SERVILLE, J. G. A., 1843, Hist. Nat. Hém., p. 562.

Triecphora lineola (FABRICIUS).

Cercopis lineola FABRICIUS, J. C., 1803, Syst. Rhyn., p. 94.

3 ex. : Roches de Kourou, Guyane Française (Coll. LE MOULT).

Tribu **Cosmoscartini**.A. — Genre **Cosmoscarta** STÅL.

STÅL, C., 1869, Hem. Fabr., vol. 2, p. 11.

1. — **Cosmoscarta uchidæ** MATSUMURA.

MATSUMURA, S., 1905-1906, Trans. Sapporo Agr. Coll., vol. I, p. 30; pl. I, fig. 4.

3 ex. : Taïnan, Formose.

2. — **Cosmoscarta fictilis** BUTLER.

BUTLER, A. G., 1874, Cist. Ent., vol. 1, p. 259.

4 ex. : Laos, 12-V-1919 (R. VITALIS DE SALVAZA).

3. — **Cosmoscarta bispecularis** WHITE.

WHITE, A., 1844, Ann. Mag. Nat. Hist., vol. 14, p. 426.

3 ex. : Hong-Kong; Tonkin, Montes Manson, de 2 à 3.000 m, avril-mai (H. FRÜHSTORFER).

4. — **Cosmoscarta imitata** HAUPT.

HAUPT, H., 1918, Stett. Ent. Zeit., vol. 79, p. 90.

6 ex. : Laos, 24-IX-1918 (R. VITALIS DE SALVAZA).

5. — *Cosmoscarta dimidiata* (DALLAS).

Cercopis dimidiata DALLAS, W. L., 1850, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 11.

1 ex.: Khao Ram, Siam, 750-1.200 m, 23-II-1922.

6. — *Cosmoscarta dimidiata discrepans* (WALKER).

Cercopis dimidiata discrepans WALKER, F., 1857, Journ. Linn. Soc. Zool., vol. 1, p. 95.

1 ex.: Langkat, Sumatra, IX-X.

7. — *Cosmoscarta trigona* (WALKER).

Cercopis trigona WALKER, F., 1851, List. Hom. Ins., vol. 3, p. 660.

1 ex.: Laos, 4-IV-1918 (R. VITALIS DE SALVAZA).

B. — Genre *Leptataspis* SCHMIDT.

SCHMIDT, E., 1911, Stett. Ent. Zeit., vol. 72, p. 81.

1. — *Leptataspis progne* (BREDDIN).

Cosmoscarta progne BREDDIN, G., 1903, Deutsche Ent. Zeitschr., p. 84.

4 ex.: Sumbawa, Tambora, 1897 (Coll. FRÜHSTORFER).

2. — *Leptataspis frühstorferi* (SCHMIDT).

SCHMIDT, E., 1927, Ent. Rundsch., vol. 44, p. 10.

52 ex.: Than-Moi, Tonkin, juin-juillet (H. FRÜHSTORFER); Tonkin (R. VITALIS DE SALVAZA); Sikkim (H. FRÜHSTORFER); Montes Manson, Tonkin, de 2 à 3.000 m, avril-mai (H. FRÜHSTORFER).

3. — *Leptataspis helena* (BREDDIN).

Cosmoscarta helena BREDDIN, G., 1903, Deutsche Ent. Zeitschr., p. 95.

4 ex.: Médan, Dolok Baros, Estate Sumatra (Coll. LE MOULT).

4. — *Leptataspis costalis* SCHMIDT.

SCHMIDT, E., 1911, Stett. Ent. Zeit., vol. 72, p. 91.

4 ex. : Médan, Dolok Baros, Estate Sumatra (Coll. LE MOULT) ;
Médan, envir. de Dolok Baros, 2^e semestre 1905 (M. MOISSINAC).

5. — *Leptataspis fuscipennis plana* (WALKER).

Cercopis fuscipennis plana WALKER, F., List. Hom. Ins., vol. 3,
p. 653.

3 ex. : Soekaboemi, Java (Coll. LE MOULT) ; Sumatra, Médan.

6. — *Leptataspis nigripennis* (FABRICIUS).

Cercopis nigripennis FABRICIUS, J. C., 1803, Syst. Rhyng., p. 90.

3 ex. : Padang Pandjang, O. Sumatra (H. ROLLE) ; Médan,
envir. de Dolok Baros, 2^e semestre 1905 (H. MOISSINAC) ; Su-
matra (W. MORTON).

7. — *Leptataspis sumatrana* SCHMIDT.

SCHMIDT, E., 1911, Stett. Ent. Zeit., vol. 72, p. 85.

7 ex. : Médan, Dolok Baros, Sumatra (Coll. LE MOULT) ;
Sumatra ; envir. de Dolok Baros, 2^e semestre 1905 (M. MOIS-
SINAC) ; Sumatra (Coll. SCHULTZ).

8. — *Leptataspis similis* SCHMIDT.

SCHMIDT, E., 1911, Stett. Ent. Zeit., vol. 72, p. 87.

1 ex. : Sumatra, Médan, envir. Dolok Baros (H. MOISSINAC).

C. — Genre *Ectemnonotum* SCHMIDT.

SCHMIDT, E., 1909, Stett. Ent. Zeit., vol. 70, p. 294.

Ectemnonotum bivittatum LEPELETIER et SERVILLE.

LEPELETIER, A. L. M. et SERVILLE, J. G. A., 1827, Enc.
Méth., vol. 10, p. 605.

5 ex. : Laos, Paklay, 9-VIII-1918 (R. VITALIS DE SALVAZA).

D. — Genre *Suracarta* SCHMIDT.

SCHMIDT, E., 1919, Stett. Ent. Zeit., vol. 70, p. 166.

1. — *Suracarta tricolor rubroplagiata* SCHMIDT.

SCHMIDT, E., 1909, Stett. Ent. Zeit., vol. 70, pp. 174 et 177.

4 ex. : Sumatra, Médan, envir. de Dolok-Baros, 2^e semestre 1905 (H. MOISSINAC) ; Langkat, Sumatra ; Balei Gadjah (Coll. LE MOULT) ; Laos, Paklay, 9-VIII-1918 (R. VITALIS DE SALVAZA).

2. — *Suracarta tricolor borneensis* SCHMIDT.

SCHMIDT, E., 1909, Stett. Ent. Zeit., vol. 70, p. 180.

1 ex. : Borneo, 23-IX-1925 (H. C. CIEBERS).

Tribu Monecphorini

A. — Genre *Monecphora* AMYOT et SERVILLE.

AMYOT, C. J. B. et SERVILLE, J. G. A., 1843, Hist. Nat. Hém., p. 562.

1. — *Monecphora flavopicta* STÅL.

STÅL, C., 1854, Ofv. K. Vet.-Akad., Förh., vol. XI, p. 250.

2 ex. : Brésil, Etat de Sao-Paulo.

2. — *Monecphora integra* WALKER.

WALKER, F., 1858, Insect. Saunders., p. 86.

1 ex. : Esper. Santo, X-1920 au II-1921.

3. — *Monecphora cœrulea* LALLEMAND.

LALLEMAND, V., 1924, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 383.

2 ex. : Brésil, St-Paul.

4. — *Monecphora fimbriolata* STÅL.

STÅL, C., 1854, Ofv. K. Vet.-Akad. Förh., vol. XI, p. 250.

1 ex. : Brésil St-Paul.

5. — *Monecphora incarnata* WALKER.

WALKER, F., 1851, List. Hom. Ins., vol. 3, p. 677.

1 ex. : Mt. Tunguragura, Equateur, 11.000 pieds, 9-I-1923.

6. — *Monecphora humeralis* LEPELETIER et SERVILLE.

LEPELETIER, A. L. M. et SERVILLE, J. G. A., 1825, Enc. Méthod., vol. 10, p. 606.

2 ex. : Rép. Argentine, Haut Parana, San Ignacio (Coll. LE MOULT) ; Etat de Sao-Paulo, Brésil (Coll. LE MOULT).

7. — *Monecphora flexuosa* WALKER.

WALKER, F., 1851, List. Hom. Ins., vol. 3, p. 667.

3 ex. : Brésil.

8. — *Monecphora fluvialis* LALLEMAND.

LALLEMAND, V., 1924, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 380.

1 ex. : Rép. Argentine, Chaco de Santiago, Del Estera, Rio Salado (Coll. WAGNER).

9. — *Monecphora knoblauchii* (BERG).

Tomaspis knoblauchii BERG, C., 1879, Hem. Argent., p. 236.

26 ex. : Chaco de Santiago, Del Estero, Rio Salado (Coll. WAGNER).

B. — Genre *Phytozamia* FENNAH.

FENNAH, R. G., 1948, Ann. Mag. Nat. Hist. (sér. 12), vol. 1, p. 610.

1. — *Phytozamia erigena* (BREDDIN).

Tomaspis erigena BREDDIN, G., 1904, Soc. Ent. Zürich, vol. 19, p. 58.

1 ex. : Baños (R. HAENSCH).

2. — *Phytozamia proserpina* (DISTANT).

Tomaspis proserpina DISTANT, W. L., 1909, Ann. Mag. Nat. Hist. Lond. (8), vol. 3, p. 202.

1 ex. : Sans localité.

3. — *Phytozamia rubra rubra* (LINNÉ).

Cicada rubra LINNÉ, C., 1767, Syst. Nat., vol. 1 (2), p. 711.

3 ex. : Roches de Kourou, Guyane Française (Coll. LE MOULT) ; Guyane Britannique.

4. — *Phytozamia rubra sororia* (GERMAR).

Cercopis rubra sororia GERMAR, E. F., 1821, Mag. Ent., vol. 3, p. 41.

26 ex. : Mendès, 92 km de Rio de Janeiro, Brésil (Coll. LE MOULT); Theresopolis, Brésil; Santa Leopoldina, Brésil (H. ROLLE); Etat de Sao-Paulo, Brésil (Coll. LE MOULT).

C. — Genre *Delassor* FENNAH.

FENNAH, R. G., 1948, Ann. Mag. Nat. Hist. (sér. 12), vol. 1, p. 611.

1. — *Delassor tristis tristis* (FABRICIUS).

Cercopis tristis FABRICIUS, J. C., 1803, Syst. Rhyng., p. 90.

8 ex. : St-Jean du Maroni, Guyane Française (Coll. LE MOULT); les Hattes, Bas-Maroni, Guyane Française (Coll. LE MOULT); Nouveau Chantier, Guyane Française (Coll. LE MOULT).

2. — *Delassor tristis stali* (LALLEMAND).

Tomaspis tristis stali LALLEMAND, V., 1912, Gen. Ins., Cercop., fasc. 143, p. 98.

45 ex. : Charvein, Guyane Française, Bas Maroni (Coll. LE MOULT); Nouveau Chantier, Guyane Française (Coll. LE MOULT); St-Laurent du Maroni (Coll. LE MOULT); les Hattes, Bas Maroni (Coll. LE MOULT).

3. — *Delassor consita* (MELICHAR).

Triecphora consita MELICHAR, L., 1915, Verh. K. K. Zool. Bot. Ges. Wien, vol. 65, p. 12.

1 ex. : Rép. Argentine, territoire des Missions (Coll. LE MOULT).

D. — Genre *Zulia* FENNAH.

FENNAH, R. G., 1948, Ann. Mag. Nat. Hist., sér. 12, vol. 1, p. 616.

Zulia pubescens (FABRICIUS).

Cercopis pubescens FABRICIUS, J. C., 1803, Syst., Rhyng., p. 93.

22 ex. : St-Laurent du Maroni, Guyane Française (Coll. LE MOULT) ; Nouveau Chantier, Guyane Française (Coll. LE MOULT) ; St-Jean du Maroni, Guyane Française (Coll. LE MOULT) ; Chaco de Santiago, Rép. Argentine, Del Estero, Rio Salado ; La Forestière, Haut Maroni (Coll. LE MOULT) ; Guyane Britannique.

E. — Genre *Sphenoclypeana* LALLEMAND et SYNAVE.

LALLEMAND, V. et SYNAVE, H., 1952, Bull. Inst. roy. Sc. Nat. Belg., Tome XXVIII, n° 7, p. 8.

Sphenoclypeana parana (DISTANT).

Tomaspis parana DISTANT, W. L., 1909, Ann. Mag. Nat. Hist. (8), vol. 3, p. 193.]

3 ex. : Colonia Hansa, Sta. Catharina (H. ROLLE).

Famille *FULGORIDÆ* (2).

Sous-famille *POIOCERINÆ*.

Tribu *Lystrini*.

Genre *Lystra* FABRICIUS.

FABRICIUS, J. C., 1803, Syst. Rhyng., p. 56.

Lystra lanata (LINNÉ).

Cicada lanata LINNÉ, C., 1758, Syst. Nat., éd. 10, vol. 1, p. 438.

10 ex. : Maños, Rio Negro, Brésil (Coll. Le MOULT) ; Surinam ; St-Jean du Maroni, Guyane Française.

Tribu *Poiocerini*.

Sous-Tribu *Poiocerina*.

Genre *Acræphia* STÅL.

STÅL, C., 1866, Hem. Afric., vol. 4, p. 136.

(2) La nomenclature suivie dans le présent travail, est celle préconisée par METCALF (Gen. Catal. Hemiptera, part. IX, *Fulgoridæ*, 1947).

Acræphia perspicillata (FABRICIUS).

Cicada perspicillata FABRICIUS, J. C., 1781, *Species Insect*, 2, p. 322.

1 ex. : Charvein, Guyane Française, Bas Maroni (Coll. LE MOULT).

Sous-Tribu Calyptoproctina**Genre Polydictya GUÉRIN.**

GUÉRIN, F. E., 1844, *Iconogr. Règne Animal*, p. 358.

Polydictya sp.

1 ex. : Laos, 24-X-1918 (R. VITALIS DE SALVAZA).

Sous-famille AMYCLINÆ.**Tribu Amyclini.****Genre Druentia STÅL.**

STÅL, C., 1866, *Hem. Afric.*, vol. 4, p. 144.

Druentia variegata (SPINOLA).

Enchophora variegata SPINOLA, M., 1839, *Ann. Soc. Ent. France*, vol. 8, p. 225, pl. 12, figs. 3a, b.

1 ex. : Fort Crampel, Congo Français (Coll. LE MOULT).

Tribu Enchophorini.**Genre Enchophora SPINOLA.**

SPINOLA, M., 1839, *Ann. Soc. Ent. France*, vol. 8, pp. 221, 222, 242.

1. — Enchophora tuba (GERMAR).

Fulgora tuba GERMAR, E. F., 1830, *Thon's Entomolog. Archiv.*, vol. 2, p. 46.

4 ex. : Minas Geraes ; Har de Hespaulsa ; Rio de Janeiro.

2. — Enchophora tuberculata (OLIVIER).

Fulgora tuberculata OLIVIER, G. A., 1789, *Encyclop. Méthod.*, vol. 6, p. 569.

2 ex. : Nouveau Chantier, Guyane Française (Coll. LE MOULT).

Tribu Aphænini.

A. — Genre *Penthicodes* BLANCHARD.

BLANCHARD, E., 1845, Hist. Insect., vol. 2, p. 424.

1. — *Penthicodes caja* (WALKER).

Aphæna caja WALKER, F., 1851, List. Hom. Ins., vol. 2, p. 278.

1 ex. : Laos, Phong Daly, août 1920 (R. VITALIS DE SALVAZA).

2. — *Penthicodes variegata* (GUÉRIN).

Aphæna variegata GUÉRIN, F. E., 1829, Iconogr. Règne Animal, pl. 58, fig. 3.

1 ex. : Cochinchine, 20-VIII-1929 (R. VITALIS DE SALVAZA).

3. — *Penthicodes atomaria* (WEBER).

Cicada atomaria WEBER, F., 1801, Observ. Entom., p. 113.

4 ex. : Cochinchine, 29-VIII-1924 (R. VITALIS DE SALVAZA) ;
Laos, 23-III-1920 (R. VITALIS DE SALVAZA).

B. — Genre *Scamandra* STÅL.

STÅL, C., 1863, Stett. Ent. Zeit., vol. 24, pp. 232 et 234.

Scamandra sp.

1 ex. : Laos, 7-V-1921 (R. VITALIS DE SALVAZA).

C. — Genre *Aphæna* GUÉRIN.

GUÉRIN, F. E., 1834, Voy. Indes Orient., p. 451.

Aphæna discolor GUÉRIN.

GUÉRIN, F. E., 1834, Voy. Indes Orient., p. 452, pl. 3, fig. 2.

1 ex. Laos, Thalan 30-XI-1918 (R. VITALIS DE SALVAZA).

D. — Genre *Anecphora* KARSCH.

KARSCH, F. A. F., 1890, Berl. Ent. Zeit., vol. 35, p. 63.

Anecphora sanguisparsa SCHMIDT.

SCHMIDT, E., 1910, Stett. Ent. Zeit., vol. 71, p. 305

1 ex. : Dibongo sur Sanaga, Sud Cameroun.

E. — Genre *Kalidasa* KIRKALDY.

Phoronis STÅL, C., 1867, Stett. Ent. Zeit., vol. 24, p. 233.

Kalidasa KIRKALDY, G. W., 1900, Entomologist, 33, p. 243.

1. — *Kalidasa paulinia* (SIGNORET).

Aphæna (*sic*) *paulinia* SIGNORET, V., 1862, Ann. Soc. Ent.

France (4), vol. 2, p. 123.

1 ex. : Sans localité.

2. — *Kalidasa* sp.

1 ex. : Cochinchine, 15-XI-1924 (R. VITALIS DE SALVAZA).

Sous-famille *FULGORINÆ*.

Tribu *Laternariini*.

A. — Genre *Saïva* DISTANT.

DISTANT, W. L., 1906, Fauna Brit. Ind., vol. 3, p. 192.

Saïva gemmata (WESTWOOD).

Fulgora (*Hotina*) *gemma* WESTWOOD, J. O., 1848, The Cabinet of Oriental Entomology, vol. 4, p. 7, pl. III, fig. 2.

6 ex. : Than Moï, juin-juillet (H. FRÜHSTORFER).

B. — Genre *Laternaria* LINNÉ.

LINNÉ, C., 1764, Museum Ulricæ 1764, p. 152.

1. — *Laternaria sultana* (ADAMS).

Fulgora (*Hotinus*) *sultana* ADAMS, A., 1847, Ann. Mag. Nat. Hist., vol. 20, p. 204.

2 ex. : Jakalar, Célèbes.

2. — *Laternaria candelaria* (LINNÉ).

Cicada candelaria LINNÉ, C., 1767, Syst. Naturæ, éd. 10, vol. 1, p. 434.

1 ex. : Long Tchéou, Chine.

Tribu Fulgorini.

Sous-Tribu Fulgorina.

Genre Fulgora LINNÉ.

LINNÉ, C., 1767, Systema Naturæ, éd. 12, vol. 1, p. 703.

1. — Fulgora lucifera GERMAR.

GERMAR, E. F., 1821, Mag. Ent., vol. 4, p. 100.
13 ex. : Sans localité.

2. — Fulgora lampetis BURMEISTER.

BURMEISTER, H. C. C., 1845, Gen. Insect., vol. 1, p. 3.
1 ex. : Buenavista, Bolovie, dép. Santa Cruz (Coll. LE MOULT).

Tribu Zannini

Genre Zanna KIRKALDY.

Pyrops AMYOT C. J. B. et SERVILLE, J. G. A. (nec SPINOLA),
1843, Hist. Nat. Ins., Hem., p. 491.

Zanna KIRKALDY, G. W., 1902, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.,
vol. 14, p. 47.

Zanna madagascariensis (SIGNORET).

Pyrops madagascariensis SIGNORET, V., 1860, Ann. Soc. Ent.
France, vol. 8, p. 183.

1 ex. : Vohemar, Madagascar (Coll. LE MOULT).

Famille FLATIDÆ.

Tribu Phromniini.

A. — Genre Phromnia STÅL.

Flata FABRICIUS, J. C., 1798, Entom. Syst., Suppl., pp. 517
et 551.

Phromnia STÅL, C., 1860, Rio Jan. Hem., vol. 2, p. 68.

1. — *Phromnia marginella* (OLIVIER).

Fulgora marginella OLIVIER, G. A., 1791, Enc. Méthod., vol. 6, p. 575.

2 ex. : Cochinchine, Tayminh, 29-XI-1924 (R. VITÁLIS DE SALVAZA) ; Pakneun, Laos, 24-IX-1918 (R. VITÁLIS DE SALVAZA).

2. — *Phromnia tricolor* (WHITE).

Pæcilopectera tricolor WHITE, A., 1846, Ann. Mag. Nat. Hist., vol. XVIII, p. 26.

1 ex. : Tayminh, Cochinchine, 18-XII-1923 (R. VITÁLIS DE SALVAZA).

3. — *Phromnia rubra* (SIGNORET).

Flata rubra SIGNORET, V., 1860, Ann. Soc. Ent. France, sér. 3, vol. VIII, p. 200.

7 ex. : Madagascar (Coll. LE MOULT).

4. — *Phromnia rubra crocea* (MELICHAR).

Flata rubra crocea MELICHAR, L., 1901, Ann. Hofmus. Wien, vol. XVI, p. 210.

1 ex. : Madagascar (Coll. LE MOULT).

5. — *Phromnia intacta* (WALKER).

Flata intacta WALKER, F., 1851, List. Hom. Ins., vol. 2, p. 435.

1 ex. : Laos, 26-V-1915 (R. VITALIS DE SALVAZA).

B. — Genre *Pæcilopectera* LATREILLE.

LATREILLE, P. A., 1796, Précis de caract. génér., p. 83.

1. — *Pæcilopectera phalænoides* (LINNÉ).

Cicada phalænoides LINNÉ, C., Syst. Nat., vol. 2, pp. 40 et 710.

13 ex. : Roches de Kourou, Guyane Française (Coll. LE MOULT) ; Santa Cruz, Bolivie Sud ; Surinam ; S. Ant. de Barra, Brésil ; St-Laurent du Maroni (Coll. LE MOULT).

2. — *Pæcilopectera fritillaria* ERICHSON.

ERICHSON, W. F., 1848, Schumb. Reis., vol. 3, p. 614.

4 ex. : Macas, Equateur.

Tribu Ceryniini.

A. — Genre *Cerynia* STÅL.

STÅL, C., 1866, Hem. Afric., vol. 4, p. 235.

Cerynia maria (WHITE).

Pæcilopectera maria WHITE, A., 1846, Ann. Mag. Nat. Hist.,
vol. 18, p. 25, pl. I, fig. 3.

3 ex. : Madère.

B. — Genre *Copsyrna* STÅL.

STÅL, C., 1866, Hem. Afric., vol. 4, p. 237.

Copsyrna maculata (GUÉRIN).

Pæcilopectera maculata GUÉRIN, F. E., 1834, Voy. Bélang., p. 470.

1 ex. : Sumatra.

C. — Genre *Bythopsyryna* MELICHAR.

MELICHAR, L., 1901, Ann. Nat. Hofmus. Wien, vol. 16, p. 224.

Bythopsyryna circulata (GUÉRIN).

Pæcilopectera circulata GUÉRIN, F. E., 1838, Icon. Règne Anim.,
Ins., p. 361.

1 ex. : Soekaranda, janv. 1894 (DOHRN).

Tribu Scarpantini.

Genre *Colobesthes* AMYOT et SERVILLE.

AMYOT, C. J. B. et SERVILLE, J. G. A., 1843, Hist. Nat. Hem.,
p. 522.

Colobesthes falcata (GUÉRIN).

Pæcilopectera falcata GUÉRIN, F. E., 1834, Voy. Bélanger, p. 469,
pl. 3, fig. 5.

1 ex. : Medan, Doloc Baros, Estate Sumatra (Coll. LE MOULT).

Tribu Lawanini.

Genre Lawana DISTANT.

DISTANT, W. L., 1906, Faun. Brit. Ind., vol. 3, p. 420.

1. — *Lawana conspersa* (WALKER).

Colobesthes conspersa WALKER, F., 1851, List. Hom. Ins.,
vol. 2, p. 440.

5 ex. : Cochinchine, 30-III-1922 (R. VITALIS DE SALVAZA).

2. — *Lawana arguta* (MELICHAR).

Phyma arguta MELICHAR, L., 1902, Ann. Nat. Hofmus. Wien,
vol. 17, p. 49.

13 ex. : An-Do-Tay, Annam (Coll. LE MOULT).

Tribu Flatoidesini

Genre Flatosaria MELICHAR.

MELICHAR, L., 1923, Gen. Insect., fasc. 182, p. 112.

Flatosaria cyrta (MELICHAR).

Flatoides cyrtus MELICHAR, L., 1902, Ann. Nat. Hofmus. Wien,
vol. 17, p. 211.

1 ex. : Sans localité.

Famille RICANIIDÆ.

Tribu Ricaniini.

A. — Genre *Pochazia* AMYOT et SERVILLE.

AMYOT, C. J. B. et SERVILLE, J. G. A., 1843, Hist. Nat. Hem.,
p. 528.

Pochazia fuscata (FABRICIUS).

Cicada fuscata FABRICIUS, J. C., 1794, Entom. Syst., vol. 4,
p. 28.

5 ex. : Soekaboemi, Java (Coll. LE MOULT) ; Laos, 10-VI-1920 (R. VITALIS DE SALVAZA) ; Cochinchine, 3-IX-1924 (R. VITALIS DE SALVAZA).

B. — Genre *Ricania* GERMAR.

GERMAR, E. F., 1818, Mag. Ent., vol. 3, p. 221.

Ricania speculum (WALKER).

Flatoides speculum WALKER, F., 1851, List. Hom. Ins., vol. 2, p. 406.

2 ex. : Paklay, Laos, 9-VIII-1918 (R. VITALIS DE SALVAZA).

Tribu Nogodinini.

A. — Genre *Mindura* STÅL.

STÅL, C., 1873, Ofv. K. Vet.-Akad. Förh., vol. 27, p. 770.

Mindura nubecula MELICHAR.

MELICHAR, L., 1898, Ann. Naturh. Mus. Wien, vol. 13, p. 303.

1 ex. : B. N. Pot, 13-V-1920 (R. VITALIS DE SALVAZA).

B. — Genre *Nogodina* STÅL.

STÅL, C., 1859, Berl. Ent. Zeit., vol. 3, p. 326.

Nogodina reticulata (FABRICIUS).

Flata reticulata FABRICIUS, J. C., 1803, Syst. Rhyng., p. 47.

6 ex. : Guyane Française, Charvein (Coll. LE MOULT) ; St-Laurent du Maroni, Guyane Française (Coll. LE MOULT).

C. — Genre *Probletomus* GERSTAECKER.

GERSTAECKER, C. E. A., 1895, Mitt. Nat. Ver. Neu Vorpomm. Greifswald, vol. 27, p. 29.

Probletomus sublineatus WALKER.

WALKER, F., 1870, Journ. Linn. Soc. Lond., Zool., pp. 167 et 213.

1 ex. : Laos, 24-IV-1920 (R. VITALIS DE SALVAZA).

Famille *LOPHOPIDÆ*.Genre *Elamoscelis* SPINOLA.

SPINOLA, M., 1839, Ann. Soc. Ent. France, vol. 8, p. 388.

1. — *Elamoscelis cimicoides* SPINOLA.

SPINOLA, M., 1839, Ann. Soc. Ent. France, vol. 8, p. 391 ;
tab. XVI, fig. 4.

2 ex. : Fort Crampel, Congo Français (Coll. LE MOULT).

2. — *Elamoscelis trimaculata* WALKER.

WALKER, F., 1851, List. Hom. Ins., vol. 2, p. 403.

1 ex. : Fort Crampel ; Congo Français (Coll. LE MOULT).

Famille *EURYBRACHIDÆ*.Genre *Ancyra* WHITE.

WHITE, A., 1845, Ann. Mag. Nat. Hist., vol. 15, p. 34.

Ancyra vicina LALLEMAND.

LALLEMAND, V., 1928, Ann. Mag. Nat. Hist., sér. 10, vol. 1,
p. 248.

1 ex. : Tonkin, 13-V-1920 (R. VITALIS DE SALVAZA).

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE.