

Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique

BULLETIN

Tome XXXI, n° 11
Bruxelles, avril 1955.

Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen

MEDEDELINGEN

Deel XXXI, n° 11
Brussel, April 1955.

MISSION E. JANSSENS ET R. TOLLET EN GRECE
(JUILLET-AOUT 1953)

5^{me} NOTE,
COLEOPTERA-SCARABÆIDÆ,

par André JANSSENS (†) et Emile JANSSENS (Bruxelles).

Notre regretté collègue et ami André JANSSENS avait entrepris la détermination des espèces dont on trouvera la liste ci-dessous. Il avait terminé les Laparostictiques lorsqu'il fut enlevé à notre amitié par un mal dont la soudaineté nous laisse encore interdits. La disparition aussi prématurée de cet éminent coléoptérologue est une perte cruelle pour notre discipline, et le présent travail n'est pas seulement une contribution posthume aux publications de l'Institut : nous souhaitons qu'on le considère aussi comme un hommage modeste et fidèle que nous adressons à la mémoire de notre collègue disparu.

Il restait à traiter les Pleurostictiques, où les *Cetoninæ* constituaient le plus gros effectif. Nous tenons à remercier notre ami J. DE WALSCHE pour l'aide qu'il nous a apportée dans cette partie du travail.

I. LUCANIDÆ.

1. *Lucanus cervus* var. *capreolus* SÜLZER.

1 ex. ♂ du Pélion occidental : Drakia (Khani Zisi), alt. 1200 m, 28-31.VII.53.

2. *Dorcus parallelipedus* LINNÉ.

1 ex. du Pélion oriental, Zagora, alt. 250 m, 1-5.VIII.53.

II. SCARABÆIDÆ.

Laparostictiques.

A. COPRINÆ.

Scarabæini.

1. *Gymnopleurus Geoffroyi* FUESSLY.

9 ex. de Litochoron (E. Olympe), alt. 350 m, 17-24.VII.53;
2 ex. du Pélion occidental, Drakia (Khani Zisi), alt. 1200 m,
28-31.VII.53.

2. *Gymnopleurus Mopsus* PALLAS.

1 ex. de Litochoron (E. Olympe), alt. 350 m, 17-24.VII.53.

3. *Sisyphus Schæfferi* LINNÉ.

43 ex. de Litochoron (E. Olympe), alt. 350 m, 17-24.VII.53.

Onitini.

Chironitis hungaricus HERBST.

1 ex. de la même localité.

Oniticellini.

Euoniticellus fulvus GOEZE.

38 ex. de la même localité.

Onthophagini.

1. *Onthophagus Amyntas* OLIVIER.

4 ex. de Litochoron (E. Olympe), alt. 350 m, 17-24.VII.53;
1 ex. du Pélion occidental, Drakia (Khani Zisi), alt. 1200 m,
28-31.VII.53.

2. *Onthophagus furcatus* FABRICIUS.

20 ex. de Litochoron (E. Olympe), alt. 350 m, 17-24.VII.53;
3 ex. du Pélion occidental, Drakia (Khani Zisi), alt. 1200 m,
28-31.VII.53.

3. *Onthophagus gibbosus* SCRIBA.

4 ex. de Litochoron (E. Olympe), alt. 350 m, 17-24.VII.53;
16 ex. du Pélion occidental, Drakia (Khani Zisi), alt. 1200 m,
28-31.VII.53.

4. *Onthophagus illyricus* SCOPOLI.

33 ex. de Litochoron (E. Olympe), alt. 350 m, 17-24.VII.53.
A. JANSSENS a souligné l'erreur de nombreux auteurs qui ont
confondu jusqu'ici cette espèce avec *O. taurus* SCHREBER. Cette
confusion explique peut-être qu'on doive considérer *O. illyricus*
comme n. sp. pour la faune grecque.

5. *Onthophagus lemur* FABRICIUS.

1 ex. du Pélion occidental, Drakia (Khani Zisi), alt. 1200 m,
28-31.VII.53.

6. *Onthophagus opacicollis* D'ORBIGNY.

1 ex. de Litochoron (E. Olympe), alt. 350 m, 17-24.VII.53.

7. *Onthophagus ovatus* var. *ruficapillus* BRULLÉ.

3 ex. de la même localité.

8. *Onthophagus taurus* SCHREBER.

5 ex. de la même localité.

9. *Onthophagus vacca* LINNÉ.

3 ex. de la même localité.

10. *Onthophagus verticicollis* LAICHARTING.

2 ex. de la même localité.

11. *Caccobius Schreberi* LINNÉ.

4 ex. de la même localité; 1 ex. du Pélion occidental, Drakia (Khani Zisi), alt. 1200 m, 28-31.VII.53.

12. *Caccobius histeroides* MÉNÉTRIER.

1 ex. de Litochoron (E. Olympe), alt. 350 m, 17-24.VII.53.

B. APHODIINÆ.

Heptaulacus carinatus GERMAR.

1 ex. de l'Olympe occidentale (Stavros à Prioni), alt. 1000 m, 21-22.VII.53. A notre connaissance, cette espèce n'a pas encore été signalée de Grèce.

C. TROGINÆ.

Trox hispidus PONTOPPIDAN.

1 ex. de Zagora (E. Pélion), alt. 350 m, 1-5.VIII.53.

D. GEOTRUPINÆ.

Geotrupes spiniger MARSHAM.

1 ex. de Litochoron (E. Olympe), alt. 350 m, 17-24.VII.53.

Pleurostictiques.

A. RUTELINÆ.

1. *Anomala vitis* FABRICIUS.

1 ex. de Zagora (E. Pélion), alt. 350 m, 1-5.VIII.53.

2. *Anomala aurata* FABRICIUS.

1 ex. de la même localité.

3. *Anomala solida* ERICHSON.

2 ex. de Portaria (W. Pélion), alt. 650 m, 27.VII.53.

B. MELOLONTHINÆ.

1. *Homalopia ruricola* FABRICIUS.

1 ex. du Pélion occidental, Drakia (Khani Zisi), alt. 1200 m, 28-31.VII.53.

2. *Haplidia transversa* FABRICIUS.

4 ex. de Zagora (E. Pélion), alt. 350 m, 1-5.VIII.53.

C. CETONINÆ.

1. *Oxythyrea cinctella* SCHAUM.

2 ex. de Litochoron (E. Olympe), alt. 350 m, 17-24.VII.53;
1 ex. d'Ano Volo (W. Pélion), alt. 250 m, 6.VIII.53 : ce dernier
exemplaire est plus petit et plus étroit que ceux de l'Olympe.

2. *Oxythyrea funesta* PODA.

26 ex. de Zagora (E. Pélion), alt. 350 m, 1-5.VIII.53; 1 ex.
du Pélion occidental, Drakia (Khani Zisi), alt. 1200 m,
28-31.VII.53.

3. *Cetonia aurata* LINNÉ (forme typique).

21 ex. de Litochoron (E. Olympe), 350 m, 17-24.VII.53;
40 ex. de Zagora (E. Pélion), alt. 350 m, 1-5.VIII.53; 1 ex.
de Koukouvitzza (W. Parnasse), alt. 900 m, 8-11.VIII.53 :
ce dernier plus large, plus massif, a le dessous moins rutilant que
les exemplaires de l'Olympe et du Pélion.

De plus, l'un des exemplaires de l'Olympe, assez remarquable
par sa petite taille, présente une particularité absolument excep-
tionnelle. La saillie prosternale, au lieu de se terminer en boule
vers l'avant, est interrompue dans son inclinaison générale par
une rupture de pente très accusée, l'extrémité antérieure étant
ainsi située à un niveau différent du reste de l'organe. Cependant,
la partie de la saillie restant dans le plan sternal ne se termine
pas par une troncature, mais forme une extrémité en fer de
lance dont les côtés rejoignent en biseau le plan de la bosse
apicale. Cette disposition, à la fois très élaborée et très régulière,
exclut toute déformation accidentelle. Pour le reste, l'exemplaire
possède tous les caractères de la forme typique.

4. *Cetonia aurata*, var. *pisana* HEER.

2 ex. de Zagora (E. Pélion), alt. 350 m, 1-5.VIII.53; 1 ex. de Litochoron (E. Olympe), alt. 350 m, 17-24.VII.53.

5. *Cetonia aurata* var. *purpurata* HEER.

1 ex. de Litochoron (E. Olympe), alt. 350 m, 17-24.VII.53.

6. *Cetonia aurata*, var. *tunicata* REITTER.

10 ex. de Zagora (E. Pélion), 1-5.VIII.53; 7 ex. de Litochoron (E. Olympe), alt. 350 m, 17-24.VII.53; 1 ex. de Koukouvitza (W. Parnasse), alt. 900 m, 8-11.VIII.53.

7. *Cetonia aurata*, var. *viridiventris* REITTER.

8 ex. de Zagora (E. Pélion), alt. 350 m, 1-5.VIII.53; 4 ex. de Litochoron (E. Olympe), alt. 350 m, 17-24.VII.53; 1 ex. de Koukouvitza (W. Parnasse), alt. 900 m, 8-11.VIII.53.

8. *Potosia* (s. str.) *affinis* ANDERSCH.

1 ex. de Koukouvitza (W. Parnasse), alt. 900 m, 8-11.VIII.53.

9. *Potosia* (s. str.) *angustata* GERMAR.

10 ex. de Litochoron (E. Olympe), alt. 350 m, 17-24.VII.53.

10. *Potosia* (s. str.)*cuprea*, var. *obscura* ANDERSCH.

1 ex. du Pélion occidental, Drakia (Khani Zisi), alt. 1200 m, 28-31.VII.53.

11. *Potosia* (*Netocia*) *vidua* GORY & PERCHERON.

1 ex. de la même localité



