

Institut royal des Sciences  
naturelles de Belgique

BULLETIN

Tome XXXI, n° 32  
Bruxelles, juillet 1955.

Koninklijk Belgisch Instituut  
voor Natuurwetenschappen

MEDEDELINGEN

Deel XXXI, n° 32  
Brussel, Juli 1955.

---

MISSION E. JANSSENS ET R. TOLLET EN GRÈCE  
(JUILLET-AOÛT 1953)

9<sup>e</sup> NOTE

UNE ESPÈCE NOUVELLE  
DE DIPTÈRE (ASILIDÆ) DU PÉLION,

par Emile JANSSENS (Bruxelles).

---

Après la publication d'une liste d'*Asilidæ* capturés en Grèce pendant l'été de 1953 (1), le matériel non préparé a livré encore un exemplaire de cette famille. Il s'agit d'une ♀ du genre *Stilpnogaster* LOEW. Il n'est point permis de douter que notre exemplaire appartienne à ce genre, dont il présente tous les caractères. Les difficultés commencent dès qu'il s'agit de la détermination spécifique. Ce n'est pas qu'il y ait encombrement d'espèces, et tout particulièrement d'espèces paléarctiques dans le genre *Stilpnogaster*. A vrai dire, il n'y en a probablement qu'une, car SEGUY (2) est seul à distinguer encore *S. æmula* MEIGEN et *S. stabilis* ZELLER, et nous ne le suivrons pas dans cette façon de voir. Nous nous rangerons plus volontiers à l'avis d'ENGEL (3) qui considère *S. stabilis* comme synonyme d'*æmula*.

(1) 1954, Inst. roy. Sc. nat. Belg., Bull. XXX, n° 19, pp. 15-17.

(2) 1927, Faune de France, n° 17, pp. 124-126.

(3) In LINDNER, 1938, Die Fliegen der pal. Reg. n° 24, pp. 60-61; Id. in DAHL, 1926, Tierw. Deutschl. n° 26, V, pp. 140-141.

Cette espèce paraît présenter une variabilité assez étendue pour ce qui concerne la coloration des pattes. Quelle que soit la répartition des teintes noires ou rousses sur les fémurs et les tibias, ces deux organes offrent généralement à chaque paire des alternances de coloration : il n'est jamais question de pattes entièrement noires, mais par contre on observe que les limites et les proportions des deux teintes sont extrêmement variables d'un exemplaire à l'autre.

D'autre part, alors que SEGUY attribue à *S. æmula* une taille de 10 à 14 mm et de 11 à 14 mm à *S. stabilis* ENGEL qui, ne l'oublions pas, ne conserve qu'une seule espèce (*S. æmula*), lui reconnaît par deux fois une longueur supérieure : 14-16 mm.

Or, l'exemplaire que je présente ici (fig.), originaire du Pélion, ne mesure que 9 mm jusqu'à l'extrémité de l'oviscapte bien étiré; de plus, il a tous les appendices d'un noir profond, sans le moindre soupçon de roux ni de fauve. Des différences sensibles apparaissent également dans le dessin du mésonotum, et d'autres détails me déterminent à instituer une espèce nouvelle que j'appellerai *S. argonauticus*. L'insecte a été capturé tout près de la caverne légendaire de Chiron, près de la crête du Pélion qui a fourni, d'après la mythologie, le bois du vaisseau Argo qui porta Jason et les Argonautes à la conquête de la Toison d'Or.

### *Stilpnogaster argonauticus* n. sp.

Face et renflement d'un noir brillant vers le milieu, la pubescence étant limitée au voisinage des yeux. Mystax noir. Antennes noires; 3<sup>me</sup> article à peine plus long que les deux premiers réunis. Soies occipitales assez rudes, courtes, mêlées d'une collerette longue et blanche se développant en barbe vers le bas. Palpes noirs comme la trompe.

Mésonotum couvert sur les côtés d'une pubescence d'un gris jaunâtre qui semble disparaître dès qu'on examine l'insecte de profil. La bande médiane uniformément noire ne contient pas de trait longitudinal plus clair, et n'arrive pas jusqu'à l'écusson, ni même au bord postérieur du mésonotum. L'écusson porte deux soies noires longues et fortes, alors que *S. æmula* en compte normalement quatre ou six.

Ailes uniformément mais très légèrement fumées, avec des nervures bien nettes, sans la légère marge brune de *S. æmula*. Haltères d'un jaune brunâtre.

Les trois paires de pattes entièrement noires depuis les hanches jusqu'aux griffes, sans la moindre tache rousse ou fauve. Tibias postérieurs garnis à l'extrémité apicale interne d'une pubescence mordorée envahissant la face inférieure du métatarse. Quelques soies blanches éparses sur les hanches antérieures.



Fig. 1. — *Stilpnogaster argonauticus* n. sp. Type ♀.

Abdomen noir; tergites élevés en toit et présentant une mince bande grise au bord apical. Oviscapte aplati latéralement, d'un noir brillant.

Longueur. — 9 mm.

Habitat. — Mont Pélion, versant ouest, Drakia (Khani Zisi), alt. 1200 m (28-31.VII.1953).

Type. — Une ♀ à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

\* \* \*

Il convient également de signaler un exemplaire de *Conopidæ* de la même localité retrouvé comme le précédent dans le matériel

non encore préparé. Il s'agit d'une ♀ d'*Ocemyia melanopus* RONDANI. Cette espèce est propre à la région méditerranéenne. On la connaît de Corse, d'Afrique du Nord, d'Asie antérieure et centrale. A notre connaissance, on ne l'avait pas encore signalée de Grèce. Je me permets de protester contre l'appellation spécifique *melanopa* utilisée par les auteurs. Ce n'est pas un adjectif latin en *us, a, um*, mais bien un adjectif composé grec de la 2<sup>e</sup> classe : double raison pour conserver la forme *μελανόπους*, génitif *μελανόποδος*.

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE.