

Institut royal des Sciences Koninklijk Belgisch Instituut
naturelles de Belgique voor Natuurwetenschappen

BULLETIN

Tome XXXVI, n° 26
Bruxelles, mars 1960.

MEDEDELINGEN

Deel XXXVI, n° 26
Brussel, maart 1960.

DIE ARTEN DER GATTUNG LESTEVA LATR.
(COLEOPTERA STAPHYLINIDAE)
DER IBERISCHEN HALBINSEL,

von Gustav Adolf LOHSE (Hamburg).

Über die *Lesteva*-Arten der iberischen Halbinsel liegen nur sehr unzureichende Informationen vor. 1850 beschrieb KIESENWETTER *Lesteva fontinalis* vom Mont Serrat; 1954 J. JARRIGE die *Lesteva mateui* aus der Sierra Nevada; ferner meldet JARRIGE Funde von *L. longelytrata* GOEZE und *L. fontinalis* KIESW. von dort; 1955 konnte ich *L. hansenii* m. aus den Pyreneen hinzufügen und *L. lusitana* von Cavilhão beschreiben. Damit waren 5 *Lesteva*-arten von dort bekannt.

In den Jahren 1957 und 1958 erbeutete G. FAGEL umfangreicheres Material dieser Gattung an verschiedenen Punkten der Halbinsel, darunter *L. sicula* ER., *L. pubescens* MANNH. sowie eine bisher unbekannte Rasse der *L. fontinalis* KIESW. und eine noch unbeschriebene Art. Ferner fand sich noch *L. monticola* KIESW. im Material von mir untersuchter Museumssammlungen, so dass nunmehr die stattliche Zahl von 9 Arten vorliegt und damit wohl die gesamte Lesteven-fauna der Halbinsel erfasst ist. Es wäre lediglich denkbar, dass noch die im benachbarten Frankreich vorkommenden Arten *L. punctata* ER. und *L. luctuosa* FAUV. festzustellen wären, doch hat diese Annahme wenig Wahrscheinlichkeit.

Im Folgenden unternehme ich es, durch eine Tabelle der Lesteven der iberischen Halbinsel die Bestimmung innerhalb dieser Gattung zu ermöglichen, und die neu festgestellten Formen zu beschreiben. Auch gebe ich kurze Notizen über die sehr lückenhaft bekannte Verbreitung der Arten dieser Gattung.

BESTIMMUNGSTABELLE :

- 1" Hinterschienen mehr als doppelt so lang wie die Hintertarsen. Halsschild an jeder Seite mit einem Grübchen. Oberseite grob punktiert *L. sicula* ER.
- 1' Hinterschienen höchstens doppelt so lang wie die Hintertarsen. Halsschild ohne Seitengrübchen; Oberseite schwächer punktiert.
- 2" Fühler kräftiger; Glied 10 bis $1\frac{1}{2}$ mal so lang wie vor der Spitze breit. Punktur auf Halsschild und Flügeldecken mässig stark. Basalglied der Hintertarsen nicht länger als Glied 2 und 3 zusammengezogenen.
- 3" Endglied der Hintertarsen länger als das Basalglied. Hinterrand der Flügeldecken gerade abgeschnitten. Penis klein, mit deutlichem Längskiel *L. longelytrata* GZE.
- 3' Endglied der Hintertarsen nicht länger als das Basalglied, Hinterränder der Flügeldecken miteinander einen stumpfen Winkel bildend.
- 4" Kleinere, dunkel pechbraune Art von 3,2 mm Länge. Flügeldecken nach hinten schwach erweitert, etwas zottig, gelb behaart. 1. Glied der Hintertarsen so lang wie Glied 2 und 3 zusammen. Penis stark konisch, ungekielt, Basalteil ballonförmig *lusitana* LOHSE.
- 4' Grössere, meist rothbraune Art von etwa 4 mm Länge. Flügeldecken nach hinten sehr deutlich erweitert, Behaarung einfach, Glied 1 der Hintertarsen deutlich kürzer als Glied 2 und 3 zusammen. Penis langgestreckt, gekielt, Basalteil normal *monticola* KIESW.
- 2' Fühler gestreckt. Glied 10 mindestens 2 mal so lang wie vor der Spitze breit. Punktur der Oberseite fein, Glied 1 der Hintertarsen länger als Glied 2 und 3 zusammengenommen.
- 5" Augen von oben gesehen so lang oder länger als die Schläfen; Oberseite glänzend.
- 6" Schwarze, sehr glänzende Art. Mindestens die Schenkelspitzen dunkel. Seitenrand der Flügeldecken in der Mitte deutlich breiter abgesetzt. Halsschild sehr glänzend, weitläufig punktiert. Penis völlig ungekielt, kahl *hanseni* LOHSE.
- 6' Braune Arten mit einfarbig hellbraunen Beinen. Seitenrand der Flügeldecken gleichmässig schmal abgesetzt. Halsschild schwach glänzend.
- 7" Flügeldecken länger als an der breitesten Stelle zusammen breit; mehr als 2 mal so lang wie der Halsschild. Augen gross, wesentlich länger als die Schläfen.
- 8" Etwas kleinere (3,8-4,1 mm) und dunkler braun gefärbte Art. Augen stärker vorspringend, Stirn flacher. Fühler etwas kürzer, Glied 10 $2\frac{1}{4}$ mal so lang wie breit. Penis behaart, in seiner ganzen Länge scharf gekielt *fageli* sp. n.

- 8' Etwas grössere (4,0-4,3 mm) und heller braun gefärbte Art. Augen schwächer vorspringend, Stirn etwas gewölbter. Fühler schlanker, Glied 10 mindestens $2 \frac{1}{2}$ so lang wie breit. Penis kahl *fontinalis* KIESW.
- 7' Flügeldecken höchstens so lang wie an der breitesten Stelle zusammen breit, weniger als doppelt so lang wie der Halsschild. Augen bedeutend kürzer, so lang wie die Schläfen (von oben gesehen). Kleiner (3,4-3,7 mm) *fontinalis* KIESW, *truncata* n. ssp.
- 5' Augen kürzer als die Schläfen, Oberseite matter.
- 9'' Schläfen fast doppelt so lang wie die Augen. Penis kahl, nicht der ganzen Länge nach scharf gekielt. Halsschild weniger quer *mateui* JARRIGE.
- 9' Schläfen länger als die Augen, aber nicht doppelt so lang wie diese. Halsschild breiter, Penis behaart, der ganzen Länge nach scharf gekielt *pubescens* MANNH.

L. sicula ER. Mediterran und west-mitteleuropäisch verbreitete Art. Von der Iberischen Halbinsel sah ich Stücke aus den Pyreneen (Mus. FREY, Tutzing), La Estrella/Sierra Nevada (Britisches Mus.), Sierra Nevada (Zool. Sammlung München), Estremadura/Guadalupe, Fuente del Trincho (FAGEL leg.,) sowie Castilla/Puerto de Bejar (FAGEL leg.).

Die 4 aus Guadalupe vorliegenden Stücke sind auffallend robust; der Halsschild dieser Tiere ist wesentlich breiter als bei den anderen spanischen Tieren, beziehungsweise bei Material aus dem restlichen Verbreitungsgebiet der Art. Im Übrigen zeichnen sich die Tiere aus Spanien durch kurze, aber breite Flügeldecken aus. Sie ähneln darin den aus Nordafrika bekannten Formen dieser Art. Die West-mitteleuropäischen und französischen *L. sicula* (ssp. *heeri* FAUV.) sind zierlicher und haben schmälere Flügeldecken; Stücke aus Italien, Sizilien und Corsica (*L. sicula sicula* ER.) haben vielfach längere Flügeldecken. Wegen der fliessenden Übergänge zwischen den Lokalformen dieser Art sehe ich davon ab, die spanische Form der *L. sicula* als besondere Rasse zu bezeichnen.

L. longelytrata GZE. Gesamteuropäische Art. Von der Iberischen Halbinsel sah ich Stücke von « Spanien » (Britisches Mus.), Escorial (Coll. LOHSE), Guadarrama (Mus. FREY, Tutzing) Ausserdem wird sie gemeldet von P. del Lobo (JARRIGE).

Die Stücke stimmen vollkommen mit der in Frankreich und Mitteleuropa vorkommenden Form überein.

L. lusitana LOHSE. Ausser den der Beschreibung zugrunde liegenden 2 Exx. von Covilhão (Zool. Sammlg. München und Coll. LOHSE) sah ich noch ein Stück vom gleichen Fund (Mus. FREY, Tutzing) Diese Art scheint auf der Iberischen Halbinsel endemisch zu sein und nur ein geringes Verbreitungsareal zu besitzen.

L. monticola KIESW. (*pandellei* FAUV. ex p.) Bisher liegt nur ein Stück der Sammlung STIERLIN (Deutsches Ent. Inst. Berlin-Friedrichshagen) vor, das nur mit « Pyreneen » bezeichnet ist, dessen Herkunft aus dem französischen Teil dieses Gebirges daher durchaus möglich ist. Es besteht aber kein Grund zu der Annahme, dass diese Art auf der Südseite der Pyreneen fehlen sollte. Das vorliegende Stück ist im Vergleich mit den mitteleuropäischen Vertretern dieser Art ausserordentlich gross und breit gebaut. Das Vorliegen nur eines Stückes lässt aber keinen Schluss drüber zu, ob diese Form eine besondere Rasse darstellt, oder eine individuelle Erscheinung ist. Ich neige mehr zu der zweiten Annahme, da sich in der Sammlung FAUVEL (« Institut royal des Sciences naturelles de Belgique », Brüssel) Exemplare von *L. monticola* KIESW. aus den franz. Pyreneen (Gavarnie, PANDELLÉ leg.) befinden, welche von besonders zierlicher Gestalt sind. Diese Tiere sind als Cotyphen von *L. pandellei* FAUV. bezeichnet! Es sei mir deshalb an dieser Stelle gestattet, über die Art *L. pandellei* FAUV. einige Ausführungen zu machen: FAUVEL beschreibt *L. pandellei* in Bull. Soc. Linn. Norm. 1869, 18, nach Stücken, die PANDELLÉ in Gavarnie erbeutete. Die Kontrolle (einschliesslich Genitaluntersuchung) der von diesem Ort vorliegenden Exemplare der Coll. FAUVEL (« Institut royal des Sciences naturelles de Belgique », Brüssel), die als Cotyphen bezeichnet waren, ergab zweifelsfrei *L. monticola* KIESW. Später jedoch bezeichnet FAUVEL (Faun. Gallo-rhén. 111, 103) mit dem Namen *L. pandellei* jene Art, welche wir *L. fontinalis* KIESW. nennen. (Als *fontinalis* bezeichnet FAUVEL dafür jene Art, die ich später mit dem Namen *L. hansi* belegte) So besteht denn auch das Material der Sammlung FAUVEL, welches als *L. pandellei* bezeichnet ist, durchweg aus Stücken von *L. fontinalis* KIESW., ausgenommen die von Gavarnie stammenden Typen dieser Art.

Auffällig ist, dass JARRIGE der Art *L. pandellei* einen behaarten Penis zuerkennt. Diese Angabe ist nur zu verstehen, wenn man annimmt, dass JARRIGE mit diesem Namen jene Art belegt, welche weiter unten mit dem Namen *L. fageli* sp. n. belegt wurde.

L. hansi LOHSE (*fontinalis* FAUV. non KIESW.) Westmediterran-westmitteleuropäisch verbreitete Art, deren Areal in Europa weitgehend mit dem der *L. sicula* übereinstimmt. Die Tiere der Iberischen Halbinsel gleichen habituell völlig den mir aus Nordafrika und Mitteleuropa bekannten Stücken dieser Art. Ich sah Tiere von: Hautes Pyrénées (Mus. Berlin), Jaen (KIESENWETTER, SEYDLITZ in Zool. Sammlg. München), Sierra Nevada (Zool. Sammlg. München), Malaga (CAMERON, Brit. Mus.), Andalousie: Ronda, Puente de la Ventilla (FAGEL).

L. fageli sp. n. Ausser von den Fundstellen in Guidalupa/Estremadura (FAGEL) hat mir diese Art noch von S. Estrella (Museum Budapest) vorgelegen. Vermutlich weiter verbreitet und bisher nicht von *L. fontinalis* KIESW. getrennt.

L. fontinalis KIESW. (*pandellei* FAUV. ex p.) Südwesteuropäisch verbreitete Art. In Spanien vermutlich die häufigste Art der Gattung. Auf der Iberischen Halbinsel in 2 Formen vertreten.

L. fontinalis fontinalis KIESW. (Größere, langgeflügelte und grossäugige Normalform) Mt. Serrat (Typus, Zool. Sammlung München), Jaen (SEYDLITZ), Sierra Nevada (KIESW., Zool. Samml. München) Escorial (JARRIGE), Castille/Puerto de Béjar (FAGEL), Bilbao (Coll. LOHSE).

L. fontinalis truncata ssp. n. (Kleine, kurzflügelige und kleinäugige Rasse) Bisher nur von den in der Beschreibung erwähnten Fundorten in Estremadura : Guadalupe (FAGEL leg.) vorliegend. Möglicherweise in der Verbreitung auf dieses Gebiet beschränkt.

L. mateui JARRIGE. Nach den Angaben des Autors an mehreren Punkten der Sierra Nevada in der Umgebung von Grenada aufgefunden. Mir hat diese Art bisher noch nicht vorgelegen.

L. pubescens MANNH. (*subaptera* REY). Die mir bisher aus Spanien bekannten Stücke stimmen mit der mittel- und nordeuropäischen Nominatform weitgehend überein. Diese Nominatform (aus Schweden beschrieben) ist kurzflügelig, mit rudimentären Hautflügeln. Sie wurde später von REY, der die langflügelige Form dieser Art als die Nominatform betrachtete, noch einmal als var. *subaptera* beschrieben. Das Vorkommen langflügeliger Tiere mit entwickelten Hautflügeln, wie sie aus Frankreich und Teilen der Alpen vorliegen, ist mir von der Iberischen Halbinsel bisher nicht bekannt geworden. Ich sah *L. pubescens* bisher von : Pyreneen (Brit. Museum), Tragacete (Brit. Museum) Castille : Puerto de Béjar (FAGEL).

NEUBESCHREIBUNGEN :

Lesteva fontinalis truncata nova.

Lesteva fontinalis KIESENWETTER (Stett. Ent. Zeitg. 1850, 222) *truncata* n. ssp. Im Körperbau so weitgehend mit der Nominatform übereinstimmend, dass es ausreicht, die charakteristischen trennenden Merkmale anzugeben.

Hell kastanienbraun, Kopf merklich dunkler pechbraun. Oberseite fein, etwas abstehend gelblich behaart. Länge 3,4-3,7 mm, also geriuger als die Länge der Nominatform, die 4,0-4,3 mm misst. Die Augen sind auffällig kleiner als bei der Nominatform, nur knapp Schläfenlang, die Schläfen etwas stärker backenförmig ausgebildet. Punktur der Oberseite wie bei der Nominatform; auch der Halsschild entsprechend gebaut.

Flügeldecken wesentlich kürzer: 1 $\frac{3}{4}$ mal so lang wie der Halsschild und zusammen fast kürzer als breit. (Bei der Nominatform sind die Flügeldecken 2 mal so lang wie der Halsschild und um 1/10 länger als breit.)

Die Fühler sind durchschnittlich etwas kürzer, Glied 10 knapp $2\frac{1}{2}$ mal so lang wie breit.

Der Penis entspricht dem der Nominatform.

Durch die kleinen Augen und die kurzen Flügeldecken wird diese Rasse im Aussehen einer etwas glänzenden *L. pubescens* MANNH. ähnlicher als den normalen Stücken von *L. fontinalis*. Die Genitalbildung weist jedoch deutlich auf die Zugehörigkeit zu *fontinalis* hin. Diese Rasse liegt in einer Reihe von 24 Exemplaren von verschiedenen Stellen der Umgebung von Guadalupe (Estremadura) vor, welche Herr G. FAGEL im Mai 1958 dort erbeutete. Der Holotypus, ein ♂, und 7 Paratypoide stammen vom Rio Guadalupejo; weitere 5 Paratypoide von Mirabel, von Fuente del Trincho (5 Paratypoide), Canal scierie (1 Paratypoid), Arroyo del Aguila (2 Paratypoide) sowie Puente del Cerezo (3 Paratypoide). Der Typus und Paratypoide befinden sich in der Sammlung G. FAGEL, Paratypoide in « Institut royal des Sciences naturelles de Belgique » und Sammlung LOHSE.

Diese Form scheint in ihrem Verbreitungsgebiet die Normalform der *Lesteva fontinalis* KIESW. auszuschliessen.

Lesteva fageli sp. n.

Diese Art ist der *Lesteva fontinalis* KIESW. ausserordentlich ähnlich, aber dunkler pechbraun bis schwarz; Flügeldecken oft heller pechbraun. Fühler und Beine gelbbraun. Oberseite etwas abstehend, fein gelblich behaart. Länge 3,8-4,1 mm.

Kopf mit tiefen, zwischen den Augen parallelen Stirnfurchen; der von diesen eingeschlossene Mittelwulst flacher als bei *L. fontinalis*.

Augen gross und kräftig gewölbt, die Schläfen $\frac{2}{3}$ der Augenlänge messend, (von oben gesehen) etwas stärker gewölbt als bei *L. fontinalis*. Die Punktur des Kopfes auf dem Mittelwust und den Seitenteilen gleichartig (nicht auf den Seitenteilen dichter als in der Mitte, wie bei *L. fontinalis*) Der Untergrund glänzend.

Halsschild relativ breiter als bei *L. fontinalis*, $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{5}$ breiter als lang, am Ende des vorderen Viertels am breitesten, zur Basis flach ausgeschweift verengt. Hinterwinkel fast rechteckig. Vor der Basis befindet sich ein kleiner Quereindruck, jederseits neben der Halsschildmitte ein meist undeutlicher Längseindruck. Die Punktur ist mässig fein und mässig dicht (weitläufiger und etwas kräftiger als bei *fontinalis*) und der Punktur des Kopfes entsprechend. Vor dem Halsschildhinterrand ist sie kräftiger.

Flügeldecken $2\frac{1}{3}$ mal so lang wie der Halsschild, nach hinten mässig erweitert und um $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{5}$ länger als breit. Die Hinterränder stehen schwach stumpfwinklig zueinander. Die Punktur entspricht in ihrer Stärke derjenigen des Halsschildes. Die Grösse der Punktzwischen-

räume entspricht aber im Durchschnitt der Punktgrösse. Der Untergrund ist glänzend.

Hinterleib äussert fein punktiert und etwas undeutlich maschig chagriniert, schwach glänzend.

Fühler schlank, aber nicht so fadenförmig wie bei *L. fontinalis*. Glied 7 knapp 2 ½ mal so lang wie breit, die Endglieder wesentlich kürzer und dicker werdend als bei der Vergleichsart.

Erstes Glied der Hinterläufe nur wenig länger als Glied 2 und 3 zusammen; das Klaenglied wesentlich kürzer als das Basalglied.

Der Aedoeagus entspricht in seiner Form völlig dem der *L. pubescens* MANNH., ist aber deutlich kleiner als dieser (0,64 mm gegenüber, 0,75 mm bei *pubescens*). Er ist deutlich behaart und auf der Seite der Parameren in seiner ganzen Länge scharf gekielt.

Von dieser, bisher nicht beschriebenen Art lagen mir 13 Exemplare vor, von denen 11 von Herrn G. FAGEL in der Umgebung von Guadalupe (Extremadura) im Mai 1958 gefunden wurden. 2 weitere Tiere befinden sich in der Sammlung des Museums in Budapest und sind bezettelt S. Estrella.

Der Holotypus, ein ♂, und 4 weitere Exemplare sind von Puente del Cerezo, 4 Paratypoide vom Canal scierie und 2 Paratypoide vom Rio Guadalupejo. Holotypus und Paratypoide befinden sich in der Sammlung G. FAGEL, Paratypoide in « Institut royal des Sciences naturelles de Belgique » und Sammlung LOHSE.

Ich benenne diese Art zu Ehren des verdienstvollen Erforschers der Iberischen Staphylinidenfauna Herrn Gaston FAGEL in Brüssel.

RÉSUMÉ.

L'auteur discute l'identité des *Lesteva* de la faune ibérique et en donne une table dichotomique. Il y ajoute la description d'une espèce et d'une race nouvelles, dont des paratypes figurent dans les collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

LITERATURVERZEICHNIS.

ERICHSON : Gen. et spec. Staph.

FAUVEL : Faune gall.-rhen. III. 101 ff.

JEANNEL et JARRIGE : Arch. d. Zool. Exp. et gener. 56, 1949, 255 ff.

JARRIGE : Consejo superior de Investigaciones científicas. Col de Sierra Nevada, Almeria 1954, 77-78.

KIESENWETTER : Stett. Ent. Zeitg. 1850, 22.

LOHSE : Ent. Meddel. 26, 1953, 587 ff.

— : Mitt. Münchener Ent. Ges. 44/45. 1954-1955, 503 ff.

AD. GOEMAERE, Imprimeur du Roi, 21 rue de la Limite, Bruxelles-3

Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique

Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen

BULLETIN

Tome XXXVI, n° 27
Bruxelles, mars 1960.

MEDEDELINGEN

Deel XXXVI, n° 27
Brussel, maart 1960.

GENETIQUE ET ANTHROPOLOGIE DE LA SENSIBILITE
A LA PHENYLTHIOCARBAMIDE.

I. — Fréquence du gène dans la population belge,

par André LEGUEBE (Bruxelles).

INTRODUCTION.

La variabilité de la sensibilité à la phénylthiocarbamide (Fox, 1932), la connaissance du mécanisme héréditaire de la transmission de ce caractère (SNYDER, 1932, et BLAKESLEE, 1932), la liaison soupçonnée avec certains aspects pathologiques (KITCHIN et al., 1959, SALDANHA, 1957), la diversité des fréquences géniques dans les groupes humains rendent ce caractère extrêmement utile pour l'anthropologue et le généticien (ROBERTS, 1958).

En vue de compléter des données déjà nombreuses, mais encore insuffisantes, j'ai essayé de déterminer la fréquence de ce gène dans la population belge en testant 425 personnes, 225 hommes et 200 femmes. L'échantillon est composé de membres du personnel de l'Institut (81 ♂, 4 ♀), d'étudiants et d'étudiantes de l'Université libre de Bruxelles (42 ♂, 135 ♀) de candidats officiers de réserve de la Caserne Commandant Dony à Nivelles (102 ♂) et d'élèves de la Hogere School voor lichamelijke Opvoeding de Bruxelles (61 ♀). Tous sont de nationalité belge et issus de parents nés belges, les sujets étant en proportions à peu près égales d'expression française et d'expression néerlandaise.

L'expérience a été conduite selon la technique préconisée par HARRIS et KALMUS (1949) qui consiste à réaliser une échelle de quatorze solutions à base d'eau ordinaire bouillie, la première solution contenant 1,300 gr de PTC par litre, chacune des suivantes résultant de dilutions successives selon une progression géométrique de raison, un demi. Le sujet goûte

des solutions de plus en plus concentrées jusqu'au moment où il décèle une différence. Le seuil exact de gustation est alors précisé en soumettant le sujet à une ou plusieurs épreuves consistant à distinguer dans huit échantillons, quatre échantillons d'eau et quatre échantillons de solutions de concentrations décroissantes. Immédiatement après ce test, le sujet répète le même type d'épreuve au moyen d'une échelle de seize solutions de sulfate de quinine. La solution numéro 1 contient 0,187 gr de sulfate de quinine par litre. Chacune des solutions suivantes est préparée en mélangeant trois quarts de la solution qui la précède dans l'échelle à un quart d'eau bouillie. Dans l'ignorance où nous sommes des modifications de goût que peuvent subir avec le temps les différentes solutions, seules des solutions fraîchement préparées ont été utilisées. On constate d'une façon générale que la succession des épreuves tend à produire en cours d'examen un émoussement de la faculté de distinguer par l'accumulation et la persistance de l'effet astringent des produits sur les papilles. Le détail des résultats individuels est donné en annexe ($x = \text{PTC}$; $y = \text{quinine}$; $z = \text{âge}$).

EXAMEN DES RESULTATS.

Les données sont rassemblées, séparément pour les hommes et les femmes, en un tableau à double entrée (PTC et quinine) (tableaux 1 et 2). Les histogrammes correspondants (fig. 1, 2, 3, 4) présentent pour la PTC l'aspect habituel d'une courbe bimodale (SETTERFIELD et al., 1936). On y trouve notamment la dissemblance constatée déjà par d'autres auteurs, entre les femmes où apparaît une solution de continuité nette et les hommes où le passage des goûteurs aux non-goûteurs se fait par un antimode qui est beaucoup moins prononcé (PONS, 1955).




Fig. 1. — Histogramme des fréquences absolues des différents seuils de sensibilité à la P.T.C. chez 225 hommes.




Fig. 2. — Histogramme des fréquences absolues des différents seuils de sensibilité à la quinine chez 225 hommes.




Fig. 3. — Histogramme des fréquences absolues des différents seuils de sensibilité à la P.T.C. chez 200 femmes.




Fig. 4. — Histogramme des fréquences absolues des différents seuils de sensibilité à la quinine chez 200 femmes.

Les valeurs des coefficients de corrélation entre la PTC et la quinine sont :

n	Sexe	$r \pm \frac{1 - r^2}{\sqrt{n - 1}}$	
225	♂	0,344 ± 0,059	différent de zéro
200	♀	0,161 ± 0,069	à peine différent de zéro
425	♂ + ♀	0,242 ± 0,046	différent de zéro

qu'il est possible de comparer à celui obtenu par KALMUS (1958) au cours d'une enquête semblable :

212	171 ♂ 41 ♀	0,208 ± 0,066	différent de zéro
-----	---------------	---------------	-------------------

Les résultats des tableaux 1 et 2 sont repris sous forme de graphiques par points (fig. 5 et 7) qui permettent mieux de départager à vue chaque échantillon en deux populations (goûteurs \bar{T} et non goûteurs \bar{t}), séparation qui sera précisée dans une autre partie de ce travail. Les coefficients de corrélation entre la PTC et la quinine pour chacune des subdivisions établies valent :

Tableau 1. — Corrélation entre la PTC et la quinine (Hommes).

Quinine	PTC															Total
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
16			1		1	1										3
15		1		4	5	3										15
14				5	6	5										20
13		1		5	4	6	3									23
12		3		4	4	6	4	2	2	3	1	1	2	2	1	29
11		2		3	4	8	6	6	2	1	4	2	2	3	1	42
10				4	4	8	4			1		1	2	1	2	26
9		1				4	4	3	1	1	1	2	1	1	1	19
8					1	7	3	1	2	1	1	3		1	1	14
7						3								3	3	17
6						2								2		5
5															1	6
4															1	4
3																1
2																
1																
0																1
Total :		1	9	23	30	56	28	16	5	8	8	14	9	11	7	225

Tableau 2. — Corrélation entre la PTC et la quinine (Femmes).

Quinine	PTC															Total	
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
16																8	
15																13	
14																19	
13																31	
12																30	
11																28	
10																21	
9																16	
8																9	
7																12	
6																4	
5																6	
4																3	
3																0	
2																	
1																	
0																	
Total :		3	13	44	43	38	11	4			1	6	10	13	12	2	200

	<i>n</i>	Sexe	$r \pm \frac{1 - r^2}{\sqrt{n - 1}}$
\bar{T}	164	♂	0,329 \pm 0,070
	156	♀	0,279 \pm 0,074
\bar{t}	320	♂ + ♀	0,255 \pm 0,052
	137	♂ + ♀	0,290 \pm 0,078 (KALMUS 1958)
\bar{t}	61	♂	0,522 \pm 0,094
	44	♀	0,009 \pm 0,152
	105	♂ + ♀	0,394 \pm 0,086
	75	♂ + ♀	0,454 \pm 0,092 (KALMUS 1958)

Distinction entre goûteurs et non-goûteurs.

L'examen de la figure 5, qui donne la répartition par points en un graphique à double entrée, conduit à constater que ces points se répartissent en deux amas. On trace, à vue, une droite provisoire passant par les points de moindre fréquence, droite qui sépare les deux nuages. Les coordonnées de cette droite fournissent une fonction linéaire de la forme $X = ax + b$. Un histogramme de X pour tous les sujets s'avère bimodal. Il est donc légitime de considérer comme réelle la séparation des sujets en deux groupes (E. DEFRISE, 1952) et on calcule la fonction $X = 6,333x - y$, qui permet la meilleure discrimination entre les deux groupes.

L'équation de la droite de meilleure séparation est :

$$y - 10,384 = 6,333(x - 5,928)$$

dont les coordonnées en deux points sont, par exemple :

$$\begin{aligned} x &= 4,3; y = 0 \\ \text{et} \\ x &= 6,8; y = 16 \end{aligned}$$

La valeur des X nous permet de préciser la position des individus de la catégorie PTC 6 selon qu'ils sont supérieurs ou inférieurs à :

$$\frac{\bar{X}_1 + \bar{X}_2}{2} = 47,565.$$

Ceux qui, parmi eux, appartiennent aux catégories 12 (2 individus) et 11 (2 individus) pour la quinine, doivent donc être classés avec les non-goûteurs (population 1). Le dernier individu (quinine 7) se range du côté des goûteurs (population 2).




Fig. 5. — Corrélation entre les seuils de sensibilité à la P.T.C.
et à la quinine chez 225 hommes
et droite de meilleure séparation entre goûteurs et non-goûteurs.

Les valeurs moyennes des seuils de sensibilité à la quinine pour chacune des catégories de PTC sont données sur la figure 6.

On peut constater que la droite qui représente la fonction discriminante, D, de l'échantillon étudié est d'une part un peu plus inclinée que celle de KALMUS et que, d'autre part, elle est décalée vers les non-goûteurs d'une catégorie environ. Pour faciliter la comparaison, la valeur obtenue par KALMUS a été reportée sur la figure 6 (F).




Fig. 6. — Variation du seuil moyen de sensibilité à la quinine en fonction du seuil pour la P.T.C. chez 225 hommes.

Les 225 individus de sexe masculin se répartissent donc en 61 individus phénotypiquement non-goûteurs et 164 phénotypiquement goûteurs.

En considérant l'histogramme des fréquences pour la PTC (fig. 3), on serait tenté de diviser l'échantillon des femmes en deux populations en utilisant comme démarcation la catégorie PTC 6 qui ne contient aucun individu. Le calcul de l'équation de la droite de meilleure séparation pour cet échantillon :

$$y = 8,242 x - 40,018$$

dont les coordonnées en deux points sont :

$$\begin{aligned} x &= 5, \quad y = 1,20 \\ \text{et} \\ x &= 6,07, \quad y = 10,06 \end{aligned}$$

confirme cette division et l'individu appartenant aux catégories 5 pour la PTC et 3 pour la quinine, doit être considéré comme non-goûteur, son X étant égal à 38,212 ($< 40,018$).

L'échantillon féminin de 200 individus se divise ainsi en 44 individus phénotypiquement non-goûteurs (population 1) et 156 phénotypiquement goûteurs (population 2).

La figure 8 représente les valeurs moyennes des seuils de sensibilité à la quinine pour chacune des catégories de la PTC.




Fig. 7. — Corrélation entre les seuils de sensibilité à la P.T.C.
et à la quinine chez 200 femmes
et droite de meilleure séparation entre goûteurs et non-goûteurs.




Fig. 8. — Variation du seuil moyen de sensibilité à la quinine
en fonction du seuil pour la P.T.C. chez 200 femmes.

Les résultats de l'enquête sont donc :

Sexe	♂	♀	♂ + ♀ (KALMUS 1958)
<i>n</i>	225	200	212
âge	18 - 71 ans	14 - 26 ans	étudiants
fréq. <i>t</i>	61	44	75
% <i>t</i>	27,11	22,00	35,38 (2)
gène <i>t</i>	0,521	0,469	0,595 (2)
P.T.C.	\bar{x} (éch. tot.)... d. s.	$7,498 \pm 0,217$ 3,261	$8,320 \pm 0,247$ 3,472
	$x_1 (\bar{t})$... d. s.	$2,738 \pm 0,225$ 1,755	$2,205 \pm 0,180$ 1,179
	$x_2 (\bar{T})$... d. s.	$9,268 \pm 0,107$ 1,371	$10,045 \pm 0,100$ 1,242
Quinine	\bar{y} (éch. tot.)... d. s.	$10,680 \pm 0,190$ 2,840	$10,180 \pm 0,197$ 2,782
	$y_1 (\bar{t})$... d. s.	$9,803 \pm 0,381$ 2,952	$9,705 \pm 0,438$ 2,881
	$y_2 (\bar{T})$... d. s.	$11,006 \pm 0,213$ 2,726	$10,314 \pm 0,220$ 2,738

(1) valeur égale à $\frac{s}{\sqrt{n-1}}$.

(2) valeur non calculée par KALMUS (1958).

CRETEUR (1952) a obtenu, en utilisant les anciennes techniques, 28,8 % de non-goûteurs parmi 697 Belges examinés.

Influence du sexe.

La considération des histogrammes (fig. 1 et 3) et des graphiques de répartition par points (fig. 5 et 7) suggère très nettement une différence de capacité à goûter la PTC entre les sexes. En vue de réduire

l'influence du facteur âge, nous avons sélectionné parmi les hommes un échantillon composé uniquement d'individus ayant entre 18 et 28 ans et nous l'avons comparé à l'échantillon féminin. La différence d'âge moyen est ainsi grandement réduite et ne semble plus devoir être à l'origine des différences observées. HARRIS et KALMUS (1949) ont évalué la réduction du seuil de sensibilité à une division pour vingt ans chez les hommes.

Un test de Chi carré, avec 9 degrés de liberté, sur le tableau suivant :

Sexe	14-12	11	10	9	8	7-6	5-4	3	2	1-0	Totaux
♂	8	17	20	35	21	18	14	14	4	7	158
♀	16	44	43	38	11	4	7	10	13	14	200
Total:	24	61	63	73	32	22	21	24	17	21	358

donne une valeur très nettement significative ($\chi^2 = 40,905$) confirmée par l'application des tests de Student aux moyennes des goûteurs et des non-goûteurs, qui conduisent à admettre avec une probabilité de 99 % que les échantillons masculins et féminins sont tirés de deux populations différentes sous ce rapport (pour les non-goûteurs, $t = 3,258$; pour les goûteurs $t = 5,04$).

		♂	♀	Diff. ♂ - ♀
<i>n</i>		158	200	
âge		18 - 28 ans	14 - 26 ans	
âge moyen	d. s.	22,7 2,1	18,7 2,0	4
fréq. <i>t</i>		41	44	
% <i>t</i>		25,95	22,00	3,95
P.T.C.	\bar{x} (éch. tot.)...	7,646 3,034	8,320 3,472	- 0,674
	\bar{x}_1 (\bar{t})	3,171 1,513	2,205 1,179	0,966
	\bar{x}_2 (\bar{T})	9,214 1,467	10,045 1,242	- 0,831

KALMUS (1958), admet que la différence de sensibilité entre les sexes est de 0,73 division et qu'elle est constante pour tous les seuils de gustation, hypothèse non confirmée par le résultat de cette enquête.

Influence de l'usage du tabac.

258 individus (218 membres de l'échantillon général et 40 autres sujets qui n'ont pas été testés au moyen de la quinine) ont été questionnés sur l'usage qu'ils faisaient du tabac. Ils ont été répartis en trois catégories :

- 1) les non-fumeurs (-);
- 2) les fumeurs occasionnels et ceux fumant moins de 10 cigarettes par jour (f);
- 3) ceux qui fument dix cigarettes et plus par jour (F).

Un test de χ^2 a été appliqué en vue de vérifier l'influence de ce facteur sur la capacité de goûter :

a) la phénylthiocarbamide :

Nombre de cigarettes	PTC		
	Goûteurs 14 - 6	Non-goûteurs 5 - 0	
0	% 76,54 $a_1 = 62$ % 32,63	α_1 % 23,45 $a_2 = 19$ % 27,94	81
1 - 9	% 71,74 $b_1 = 33$ % 17,37	β_1 % 28,26 $b_2 = 13$ % 19,12	46
10	% 72,52 $c_1 = 95$ % 50,00	γ_1 % 27,48 $c_2 = 36$ % 52,94	131
	190	68	258

$\chi^2 = 0,522$ est, pour 2 degrés de liberté, non significatif, résultat confirmant ceux obtenus précédemment, tout particulièrement ceux de FALCONER (1947).

b) la quinine :

Nombre de cigarettes	Quinine			
	16 - 13	12 - 9	8 - 0	
0	$a_1 = 16$ α_1	$a_2 = 38$ α_2	$a_3 = 13$ α_3	67
1 - 9	$b_1 = 14$ β_1	$b_2 = 21$ β_2	$b_3 = 8$ β_3	43
10	$c_1 = 31$ γ_1	$c_2 = 51$ γ_2	$c_3 = 26$ γ_3	108
*	61	110	47	218

$\chi^2 = 2,147$ pour 4 degrés de liberté, n'est pas significatif.

Influence de l'âge.

L'âge a été fréquemment soupçonné comme étant une cause de modification de l'aptitude à goûter la phénylthiocarbamide. J'ai donc essayé de préciser quel a pu être son rôle en ce qui concerne les hommes soumis au test. Les tableaux 3 et 4 donnent la répartition par âges des différents seuils de réaction à la PTC.

Le coefficient de corrélation PTC-âge vaut :

$$r_{xz} = -0,044 \pm 0,067$$

et celui de la quinine et de l'âge :

$$r_{yz} = 0,018 \pm 0,067.$$

Ils ne sont pas significatifs. Le coefficient de régression du seuil de

gustation avec l'âge pour la PTC, $r \frac{s_x}{s_z}$ serait égal dans cet échantillon à $-0,013$. HARRIS et KALMUS (1949) ont trouvé pour ce coefficient une valeur de $-0,0577 \pm 0,006$ dans un échantillon de 441 hommes.

Tableau 3.

Ages	PTC																Total
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
18																	1
19																	11
20																	14
21																	17
22																	28
23																	30
24																	29
25																	14
26																	8
27																	3
28																	3
29																	1
30																	2
31																	1
32																	5
33																	2
34																	1
35																	1
36																	1
37																	4
38																	5
39																	3
40 - 44																	8
45 - 49																	19
50 -																	14
Total :																	225
	1	9	23	30	56	28	16	5	8	8	14	9	11	7			

Tableau 4.

Ages	PTC															Total
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
14																1
15																14
16																13
17																24
18																32
19																52
20																33
21																17
22																6
23																5
24																1
25																1
26																1
Total :	3	13	44	43	38	11	4	—	1	6	10	13	12	2		200

En envisageant séparément les goûteurs et les non-goûteurs, j'obtiens comme coefficients de corrélation avec l'âge les résultats suivants :

δ	Non goûteurs $n_1 = 61$	$P = 0,05$	Goûteurs $n_2 = 164$	$P = 0,05$
PTC	$r_{x_1z_1} = -0,390 \pm 0,109$	Significatif	$r_{x_2z_2} = 0,032 \pm 0,078$	Non signif.
Quinine	$r_{y_1z_1} = -0,147 \pm 0,109$	Non signif.	$r_{y_2z_2} = 0,079 \pm 0,078$	Non signif.
X	$r_{X_1z_1} = -0,394 \pm 0,109$	Significatif	$r_{X_2z_2} = 0,008 \pm 0,078$	Non signif.

Donc, caractère significatif de la corrélation avec l'âge, dans le groupe des non-goûteurs, de la sensibilité à la PTC et de la fonction X, mais caractère non significatif des autres corrélations avec l'âge.

Toutefois, l'échantillon ne m'a pas paru pouvoir se prêter à un calcul suffisamment précis de la fonction de régression du seuil de sensibilité à la PTC par rapport à l'âge. Il semble préférable de recueillir les résultats d'un plus grand nombre de tests.

Il existe pour chacun des groupes goûteurs et non-goûteurs, une corrélation entre PTC et quinine. Cette corrélation subsiste quand l'effet de l'âge est éliminé; elle vaut :

pour les 61 non-goûteurs :

$$r_{x_1y_1.z_1} = 0,510 \pm 0,096$$

pour les 164 goûteurs :

$$r_{x_2y_2.z_2} = 0,328 \pm 0,070$$

La corrélation entre PTC et quinine est donc réelle et ne dépend pas de l'âge.

Mécanisme héréditaire.

Il est généralement admis que la faculté de goûter la phénylthiocarbamide dépend des gènes portés par une paire de chromosomes, gènes dont les deux allèles, l'un goûteur et dominant, l'autre non-goûteur et récessif, donneraient lieu par le jeu de leurs combinaisons à trois génotypes TT, Tt et tt, et à deux phénotypes, \bar{T} et \bar{t} . Cette conception a trouvé dans la répartition bimodale des résultats des tests, un argument qui lui a été nettement favorable. L'accord n'est toutefois pas complet et

BOTSZTEJN (1942) a avancé une explication mettant en jeu trois allèles, $G > g_1 > g_2$, de la combinaison desquels résulteraient 6 génotypes et 3 phénotypes. Son enquête ne repose malheureusement que sur quelques familles et a été conduite selon les anciennes techniques. HARRIS et KALMUS (1951) et DAS (1956) ont examiné respectivement 384 et 128 fratries et ont comparé les résultats obtenus à la probabilité théorique de rencontrer les différentes combinaisons entre \bar{t} et \bar{T} chez des paires de frères issus de mariages d'individus répondant aux différents génotypes. Ils ont abouti à la conclusion que les faits ne concordent de façon satisfaisante avec l'hypothèse de deux allélosomorphes que dans le cas des goûteurs extrêmes et des non-goûteurs extrêmes. L'examen de 127 familles par DAS (1958) l'a amené à revoir son jugement et à admettre que l'hypothèse de BLAKESLEE (1932) et SNYDER (1932) est satisfaisante en première approximation et qu'elle peut être utilisée du point de vue génétique. Des ajustements minimes pourraient suffire et il suggère d'avoir recours à une pénétrance incomplète de l'allèle dominant, pénétrance incomplète qu'il évalue approximativement à 90 %.

MERTON (1958) se rallie également à l'hypothèse initiale d'un seul gène.

Le problème génétique reste donc largement ouvert sur deux points au moins : le premier concerne la détermination du nombre d'allèles entrant en jeu et l'explication de la différence des fréquences géniques chez les hommes et chez les femmes; le second, la distinction parmi les phénotypes goûteurs entre homozygotes et hétérozygotes, essentielle pour mettre en évidence l'éventuelle hétérosis que peut conférer ce gène.

En ce qui concerne le mécanisme héréditaire lui-même, il est d'un intérêt tout particulier d'étudier les divers histogrammes en fonction de leur conformité avec la distribution normale théorique. Les différents histogrammes (fig. 9 à 12) sont donc soumis à un test de conformité dont les résultats sont :

$\chi^2 = 1$ degré de liberté	δ		φ	
	\bar{t}	\bar{T}	\bar{t}	\bar{T}
X (PTC — quin.)	$n_1 = 41$ 3,529 ($P = 0,06$)	$n_2 = 117$ 0,962	$n_1 = 44$ 1,913	$n_2 = 156$ 0,550
x (PTC)	$n_1 = 41$ 2,355	$n_2 = 117$ 2,778	$n_1 = 44$ 0,706	$n_2 = 156$ 2,465
X (PTC — quin.)	$n_1 = 61$ 8,861 ($P = 0,01$)	$n_2 = 164$ 1,023		
x (PTC)	$n_1 = 61$ 2,410	$n_2 = 164$ 5,431 ($P = 0,05$)		




Fig. 9. — Histogramme des fréquences absolues des différents seuils de sensibilité à la P.T.C. chez 158 hommes de 18 à 28 ans.




Fig. 10. — Histogramme des fréquences absolues des valeurs de la fonction X chez 225 hommes.




Fig. 11. — Histogramme des fréquences absolues des valeurs de la fonction X chez 158 hommes de 18 à 28 ans.




Fig. 12. — Histogramme des fréquences absolues des valeurs de la fonction X chez 200 femmes.

Avec certaines restrictions dues au fait qu'il n'a pas toujours été possible d'avoir au moins dix sujets par classe, le chi carré relatif à la distribution des X chez les non-goûteurs mâles (échantillon total et échantillon de 18-28 ans) a une valeur telle, qu'avec un coefficient de sécurité de 0,06 ou 0,01, on peut se refuser à imputer les divergences à de simples fluctuations dues au hasard. On est donc amené à attribuer un caractère de réalité à l'aspect bimodal de la distribution des non-goûteurs, ainsi que LUGG l'a précédemment suggéré (1955).

Un autre chi carré significatif au seuil des 0,05 est celui de la distribution des seuils de la sensibilité à la phénylthiocarbamide chez les goûteurs mâles pour lesquels on observe effectivement un trop grand nombre de réponses au seuil 9 (fig. 1).

CONCLUSION.

L'enquête menée sur 425 sujets de la population belge confirme un certain nombre de points mis en évidence par d'autres auteurs. Le rôle du sexe et de l'âge des sujets est de toute première importance et il conviendra de mieux préciser leur intervention. La connaissance de leur influence est, en effet, fondamentale si on veut aborder l'étude plus approfondie du mécanisme héréditaire qui semble loin d'avoir la simplicité qu'on s'est primitivement plu à lui accorder. Seules des enquêtes familiales complémentaires, spécialement poursuivies à cet effet, pourraient résoudre les problèmes qui se posent; elles permettraient en outre de vérifier si, comme SALDANHA et GUINSBURG (1954) l'ont proposé, il s'agit d'un caractère lié au sexe dans une certaine mesure, avec une pénétrance plus accentuée chez les femmes que chez les hommes, ou si les parents non-goûteurs ont plus de fils que de filles et vice versa.

Je tiens en terminant, à remercier les nombreuses personnes dont la collaboration m'a permis de rassembler la documentation nécessaire et de mener à sa conclusion cette recherche : M. le docteur Fr. TWIESSELMANN, qui a suivi et participé à toutes les étapes du travail, M^{me} E. DEFRISE-GUSSENHOVEN, dont les directives m'ont été si précieuses sur le plan statistique, M^{me} L. VAN DE POEL, du Centre national de Radiobiologie et de Génétique, qui a effectué l'ensemble des calculs, et tous ceux qui ont bien voulu servir de sujets pour cette expérience.

Aux personnes qui ont bien voulu m'accueillir dans les locaux des institutions dont la gestion leur est confiée : la Révérende Mère Marie-Bernard, directrice de l'*Instituut voor Lichamelijke Opvoeding* à Bruxelles, M. F. STAELENS, directeur de la Maison des Etudiants de l'Université Libre de Bruxelles, le colonel-médecin FRANÇOIS, le colonel ULENS, commandant de l'Ecole des candidats officiers de réserve à NIVELLES et ses adjoints, le major HUBIN, le capitaine STAINIER et le docteur LAGNEAU, j'adresse l'expression de ma profonde gratitude.

SUMMARY.

A test with PTC and quinine was performed on 425 Belgians (225 males and 200 females). The distribution of tasters and non-tasters is carried out by way of FISHER's linear discriminant function. Correlation coefficients are calculated for each group (pp. 2 and 5). Results, gene frequencies and means are given on page 7. The influence of sex is revealed by a test of STUDENT (p. 9) and the part played by age is analysed (p. 14). Chi square tests introduce uncertainties about the absolute normality of distribution, in first order, for the non-tasters (p. 16) for which the histograms of the absolute frequencies show a clear bimodality at the level $P = 0,01$ for male subjects between 18 and 28 years.

ZUSAMMENFASSUNG.

Die P. T. C. und Chinin-Geschmacksempfindung wurde bei 225 Belgischen Männer und 220 Belgischen Frauen durchgeföhrt mittels der HARRIS und KALMUS Methode. Der Unterschied im Schmecken bzw. Nichtschmecken wurde mit Hilfe der FISHERS « linear discriminant » Funktion vollbracht (s.S. 5). Korrelationskoeffiziente wurden für jede Gruppe ausgerechnet. Die Ergebnisse, die Genfrequenzen und die Mittelwerte sind in einer Tafel zusammengebracht (s.S. 7). Einfluss des Geschlechtes hat sich deutlich hervorgehoben beim Anwenden des « Students significance test », und ebenso war der Einfluss des Altertumunterschiedes deutlich zu merken. Bei der χ^2 Analyse der Variation erscheint die Normalität der Frequenzkurve als unsicher, während die Treppenkurve der Nichtschmecker zweigipflig (Wahrscheinlichkeitswert $P = 0,01$) bleibt bei Gepfrüften von 18 bis 28 Jahre (s.S. 16).

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.

AKESSON, H. O.

1959. *Taste deficiency for phenyl-thio-urea in Southern Sweden.* (Acta Genet. Med. Gemell., 8 (4) : 431-433.)

BLAKESLEE, A. F.

1932. *Genetics of sensory thresholds-taste for phenyl-thio-carbamide with some data on the inheritance.* (Proc. Nat. Acad. Sci. Wash., 18 : 120-130.)

BOTSZTEJN, Ch.

1942. *Zur Kenntnis der Geschmacksblindheit gegenüber Phenylthiocarbamid (P.T.C.) in der Zürcher Bevölkerung und deren Erbgang.* (Arch. J. Klaus Stift., 17 : 109-123.)

CRETEUR, Chr.

1952. *Le test à la phénylthiocarbamide (PTC - Test).* (Rev. méd. Liège, 7 (13) : 415-419.)

DAS, S. R.

1956. *A contribution to the heredity of the P.T.C. taste character based on a study of 845 sibpairs.* (Ann. Hum. Genet., 20 (4) : 334-343.)

1958. *Inheritance of the P.T.C. taste character in man: an analysis of 126 Rahri Brahmin families of West Bengal.* (Ann. Hum. Genet., 22 (3) : 200-212.)

DEFRISE-GUSSENHOVEN, E.

1952. *Discrimination de populations voisines. Etude biométrique.* (Bull. Inst. r. Sci. nat. Belgique, 28 (46) : 1-34.)

FALCONER, D. S.

1947. *Sensory thresholds for solutions of phenyl-thio-carbamide.* (Ann. Eugen., 13 : 211-222.)

HARRIS, H. et KALMUS, H.

1949. *Measurement of taste sensitivity to phenyl-thio-urea.* (Ann. Eugen., 15 : 24-31.)

1951. *The distribution of taste thresholds for phenyl-thio-urea of 384 sibs-pairs.* (Ann. Eugen., 16 (3) : 226-230.)

KALMUS, H.

1958. *Improvements in the classification of taster genotypes.* (Ann. Hum. Genet., 22 (3) : 222-230.)

KITCHIN, F. D., HOWEL-EVANS, A., CLARKE, C. A., McCONNELL, R. B.

and SHEPPARD, P. M.

1959. *The P.T.C. taste response and thyroid disease.* (Brit. Med. J., 1 : 1.069.)

LUGG, J. W. H. et WHYTE, J. M.

1955. *Taste thresholds for PTC of some population groups. I.* (Ann. Hum. Genet., 19 (4) : 290-311.)

LUGG, J. W. H.

1957. *Taste thresholds for PTC of some population groups. II.* (Ann. Hum. Genet., 21 (3) : 244-253.)

MERTON, B. B.

1958. *Taste sensitivity to P.T.C. in 60 Norwegian families with 176 children. Confirmation of the hypothesis of single gene inheritance.* (Acta Genet., 8 : 114-128.)

PONS, J.

1955. *Taste sensitivity to phenylthiourea in Spaniards.* (Hum. Biol., 27 (3) : 153-160.)

ROBERTS, J. A. Fraser.

1958. *Contribution of genetics to physical anthropology.* (J. Roy. Anthropol. Inst., 88 (2) : 115-129.)

SALDANHA, P. H. et GUINSBURG, S.

1954. *Taste thresholds for phenylthiourea among students in Rio de Janeiro.* (Rev. Brasil. Biol., 14 (3) : 285-290.)

SETTERFIELD, W., SCHOTT, R. G., SNYDER, L. H.

1936. *The bimodality of the thresholds curve for the taste of phenyl-thio-carbamide.* (Ohio J. Sci., 36 : 231-235.)

SNYDER, L. H.

1932. *Studies in human inheritance. IX. The inheritance of taste deficiency in man.* (Ohio J. Sci., 32 : 436-440.)

♂. — RESULTATS INDIVIDUELS DES TESTS.

	Age	PTC	Q	Tabac		Age	PTC	Q	Tabac
1	18	1	7	F	56	22	9	14	F
2	19	2	10	F	57		9	12	—
3		5	12	F	58		8	10	—
4		12	12	—	59		10	10	F
5		10	11	—	60		9	5	F
6		11	13	—	61		5	13	—
7		7	11	—	62		7	7	F
8		7	11	—	63		9	13	F
9		9	6	F	64		8	8	—
10		12	11	f	65		11	10	F
11	20	12	9	F	66		9	10	—
12		10	12	—	67		10	15	F
13		10	12	F	68		5	12	—
14		9	8	F	69		9	11	—
15		9	8	F	70		3	9	F
16		1	5	f	71		9	16	f
17		13	8	F	72		11	14	F
18		11	13	F	73		9	7	F
19		9	5	F	74		10	16	—
20		6	7	—	75		10	14	F
21		7	13	F	76		9	12	—
22		6	12	f	77		8	8	F
23	21	10	14	—	78		4	11	—
24		6	11	F	79		8	11	F
25		8	11	F	80		9	13	F
26		9	9	F	81		8	10	F
27		8	13	F	82		7	5	F
28		3	9	F	83		11	15	f
29		7	6	—	84		3	14	F
30		4	11	—	85		8	11	—
31		3	10	—	86		3	7	F
32		3	14	—	87		9	10	—
33		2	12	—	88		8	8	F
34		12	12	F	89		7	9	—
35		10	7	F	90		11	13	F
36		10	14	—	91		11	15	F
37		4	11	—	92		2	9	f
38		3	15	—	93		8	9	F
39		11	6	—	94		3	7	f
40		1	10	F	95		3	5	F
41		12	15	f	96		8	12	—
42		8	9	F	97		9	9	f
43		8	9	F	98		3	11	F
44		9	11	F	99		5	11	—
45		11	15	f	100		7	11	F
46		3	15	f	101		9	11	f
47		8	11	F	102		10	14	F
48		9	14	—	103		11	11	—
49		10	15	—	104		8	10	F
50		3	11	f	105		5	13	—
51		9	7	F	106		5	12	f
52		9	10	F	107		7	7	F
53		9	15	F	108		4	11	—
54		11	11	—	109		4	9	f
55		7	11	—	110		7	9	F

♂. — RESULTATS INDIVIDUELUS DES TESTS (suite).

	Age	PTC	Q	Tabac		Age	PTC	Q	Tabac
111	24	8	4	F	166	37	5	10	F
112		9	9	f	167	9	9	12	f
113		0	0	F	168	9	9	9	F
114		7	11	—	169	1	7	7	—
115		7	12	f	170	8	12	12	—
116		1	8	f	171	7	9	9	—
117		9	8	—	172	1	5	5	—
118		9	10	F	173	10	8	8	F
119		8	11	—	174	8	7	7	F
120		9	14	—	175	1	10	10	—
121		11	10	—	176	0	12	12	F
122		11	10	f	177	9	12	12	—
123		4	8	—	178	40	2	11	F
124		10	14	—	179	42	9	8	—
125	25	9	11	—	180	6	12	F	F
126		9	10	f	181	43	2	12	F
127		9	12	F	182	10	13	13	—
128		9	10	—	183	44	9	15	—
129		9	14	—	184	9	15	15	F
130		7	11	—	185	11	6	F	F
131		11	13	F	186	45	9	13	F
132		11	15	f	187	1	7	7	f
133		10	13	f	188	0	7	F	F
134		0	7	—	189	10	10	f	f
135		10	13	—	190	10	13	F	F
136		1	11	F	191	9	6	—	F
137		10	15	—	192	46	9	13	F
138		3	12	F	193	9	10	F	F
139	26	2	10	—	194	11	14	F	F
140		8	12	F	195	47	1	9	F
141		8	14	—	196	2	13	f	F
142		9	11	F	197	8	4	f	F
143		9	8	—	198	12	16	F	F
144		11	14	f	199	8	13	F	F
145		11	11	F	200	48	0	7	F
146	27	5	9	F	201	9	4	F	F
147		8	11	—	202	8	12	F	F
148		4	12	F	203	49	9	11	—
149	28	7	12	—	204	8	9	F	F
150		9	11	F	205	51	9	13	F
151		8	10	f	206	0	9	F	F
152	29	8	13	f	207	52	9	11	F
153	30	6	11	F	208	53	12	13	F
154		10	11	—	209	56	10	15	—
155	31	9	8	F	210	57	4	14	F
156	32	2	11	—	211	59	10	11	—
157		11	14	F	212	9	7	f	F
158		11	14	—	213	60	10	14	F
159		1	3	F	214	62	10	15	F
160		2	11	F	215	63	0	4	F
161	33	11	13	F	216	10	12	F	F
162		9	13	F	217	68	9	14	F
163	34	9	12	F	218	71	9	10	F
164	35	9	8	—	219	19	12	11	—
165	36	11	10	f	220	10	11	11	F

♂. — RESULTATS INDIVIDUELS DES TESTS (suite).

	Age	PTC	Q	Tabac		Age	PTC	Q	Tabac
221	20	10	10		244		6		/
222		12	12		245		6		F
223	22	10	12		246		9		f
224	23	10	10		247		9		F
225	26	3	7		248		10		F
226	19	8			249		10		F
227		3			250		8		/
228		6			251		8		F
229		9			252		9		F
230		3			253		9		F
231	20	10			254		4		f
232		8			255		4		F
233		3			256		9		F
234		7			257		8		F
235		7			258		3		F
236		10			259		3		F
237	21	8			260		9		F
238		3			261		6		F
239		9			262		9		/
240	22	4			263		3		F
241		1			264		8		/
242		9			265		4		/
243		8							

♀. — RESULTATS INDIVIDUELS DES TESTS.

	Age	PTC	Q	Tabac		Age	PTC	Q	Tabac
1	14	10	9	/	20		2	10	/
2	15	9	9	/	21		3	6	/
3		9	11	/	22		4	13	/
4		11	8	/	23		1	10	/
5		1	11	/	24		10	14	/
6		3	12	/	25		11	8	/
7		9	6	/	26		7	7	/
8		10	9	/	27		11	6	/
9		9	9	/	28		2	12	/
10		9	9	/	29		10	9	/
11		1	9	/	30		11	13	/
12		11	13	/	31		11	10	/
13		10	10	/	32		10	7	/
14		11	14	/	33		12	10	/
15		10	13	/	34		9	12	/
16	16	10	11	/	35		9	11	/
17		11	11	/	36		10	9	/
18		9	10	/	37		9	13	/
19		3	8	/	38		10	13	/

♀. — RESULTATS INDIVIDUELS DES TESTS (suite).

	Age	PTC	Q	Tabac		Age	PTC	Q	Tabac
39	18	10	12	—	94	19	11	8	F
40		11	11	—	95		2	3	F
41		2	10	—	96		2	4	—
42		8	9	—	97		12	13	f
43		2	9	—	98		4	11	—
44		10	7	—	99		7	4	F
45		10	10	f	100		12	11	—
46		3	10	—	101		3	12	—
47		10	8	—	102		11	12	—
48		9	11	—	103		11	10	—
49		8	13	—	104		9	10	F
50		9	8	f	105		9	7	F
51		11	4	F	106		8	10	F
52		3	13	—	107		9	9	f
53		11	12	—	108		9	10	—
54		13	11	—	109		9	13	F
55		11	7	—	110		13	14	—
56		9	11	—	111		11	8	—
57		1	11	—	112		9	7	—
58		10	10	—	113		9	12	—
59		8	13	—	114		7	11	F
60		9	11	—	115		2	12	—
61		10	11	—	116		9	5	—
62		11	12	—	117		2	11	—
63		9	10	—	118	20	10	7	—
64		8	12	—	119		11	14	—
65		10	12	—	120		10	12	f
66		11	6	—	121		3	11	f
67		11	15	—	122		11	14	—
68		2	9	f	123		11	8	—
69		12	10	—	124		12	15	F
70		11	9	—	125		9	5	F
71		10	12	f	126		1	8	—
72		11	11	—	127		10	9	—
73		12	13	f	128		8	10	—
74		11	8	f	129		0	6	F
75		10	10	—	130		3	7	—
76		10	4	—	131		9	11	—
77		4	12	f	132		11	9	—
78		11	12	f	133		12	5	—
79		10	11	f	134		1	6	—
80		11	11	f	135		4	12	f
81		12	15	—	136		11	10	—
82		2	10	f	137		11	13	—
83		10	9	f	138		12	14	F
84		11	15	—	139		2	12	—
85		9	12	—	140		9	9	—
86		9	12	—	141		8	12	f
87		10	6	—	142		8	12	—
88		9	5	—	143		10	6	—
89		10	11	—	144		8	4	f
90		11	11	—	145		12	12	—
91		10	10	—	146		12	9	—
92		1	10	—	147		9	12	—
93		10	8	f	148		11	15	—

♀. — RESULTATS INDIVIDUELS DES TESTS (suite).

	Age	PTC	Q	Tabac		Age	PTC	Q	Tabac
149	20	11	15	—	175	21	12	10	F
150		10	13		176		10	12	F
151		11	15	f	177		12	14	—
152		9	12	F	178		13	12	—
153		3	6	—	179		3	4	—
154		9	8	—	180		9	8	f
155		9	8	—	181		11	11	f
156		9	6	—	182		10	13	—
157		4	12	—	183		9	13	—
158		10	14	f	184	22	11	11	—
159		10	9	—	185		10	8	—
160		11	11	F	186		9	13	—
161		2	12	—	187		10	14	—
162		1	9	F	188		11	11	f
163		7	6	f	189	23	0	10	—
164		10	10	—	190		10	14	F
165		8	10	—	191		5	3	—
166		1	14	—	192		2	15	—
167	21	8	3	F	193		10	7	—
168		11	14	—	194	24	4	10	f
169		9	11	f	195	25	10	13	—
170		11	9	f	196	26	10	6	F
171		11	11	—	197	19	11	10	—
172		1	11	f	198	19	11	12	—
173		1	13	f	199	20	9	12	—
174		10	14	f	200	22	1	8	—

AD. GOEMAERE, Imprimeur du Roi, 21 rue de la Limite, Bruxelles-3