

CATALOGUE DES DERMAPTERA
DES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES
DE L'INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES
DE BELGIQUE

PAR

Paul VANSCHUYTBROECK (Bruxelles)

AVANT-PROPOS

Les collections de « *Forficulidae* » de l'Institut n'ont fait l'objet d'autre mise en ordre que celle établie à la publication du *Synonymic Catalogue of Orthoptera* de W. F. KIRBY, 1904.

Tout comme les autres Orthoptéroides de l'Institut, la collection de Dermaptères a été formée, entre autres, par l'apport de diverses collections et de dons de récolteurs.

La présente mise en ordre, la recherche et l'authentification des types ont été réalisés par l'examen de tous les spécimens des diverses collections et les descriptions originales et ultérieures; cette mise en ordre est basée sur le tout récent travail de POPHAM, 1965 et POPHAM & BRINDLE, 1966-1969 (1).

La collection de Dermaptères comporte 21 espèces typiques, 57 genres, 121 espèces, classés en 8 familles.

(1) J. POPHAM, 1965, *The Entomologist*, vol. 98, n° 1225, pp. 126-136. J. POPHAM & A. BRINDLE, 1966-1969, *The Entomologist*, vol. 99, n° 1236, pp. 126-136; n° 1241, pp. 241-246; n° 1242, pp. 269-278; 1967 : vol. 100, n° 1245, pp. 35-38; n° 1253, pp. 255-262; 1968 : vol. 101, n° 1260, pp. 105-108; n° 1261, pp. 133-136; n° 1264, pp. 196-201; n° 1267, pp. 276-280; 1969 : vol. 102, n° 1270, pp. 61-66.

I. — Super-famille des KARSCHIELLOIDEA

1. — Famille des KARSCHIELLIDAE

Karschiellidae VERHOEFF, 1902, Zool. Anz., 25, p. 183.

a. — *Karschiellinae* BURR, 1909, Dtsch. Ent. Zeits., p. 322.

Cette sous-famille est confinée à l'Afrique tropicale; espèces aptères; antennes d'au moins 25 articles (4 à 6 plus épais); prosternum triangulaire; fémurs comprimés et en massue.

1) Genre *Karschiella* VERHOEFF, 1902, Zool. Anz., 25, p. 185.

Type du genre : *K. buttneri* (KARSCH), 1886 (*Pygidicrana*).

1. — *camerunensis* VERHOEFF, 1902 (*Karschiella*).

(= *lictor* BURR, 1907 (*Bormansia*) : HINCKS, 1959).

1 exemplaire : Mukonje Farm : Kameroun : R. RHODE. (*Bormansia lictor* BURR : det. : BURR).

II. — Super-famille des PYGIDICRANOIDEA

2. — Famille des DIPLATYIDAE

Diplatyidae VERHOEFF, 1902, Zool. Anz., 25, p. 187.

a. — *Diplatyinae* BURR, 1909, Dtsch. Ent. Zeits. 2, pp. 321-322.
(= *Cylindrogastrinae* MACCAGNO, 1929).

Distribution : Amérique du Sud, Afrique orientale, Madagascar, Indes. De taille moyenne à petite; corps cylindrique; yeux généralement grands; antennes courtes et sétuleuses, de 15 à 25 segments.

Trois genres, dont un seul est représenté, dans les collections : *Diplatys* SERVILLE (HINCKS, 1955, 1959).

2) Genre *Diplatys* SERVILLE, 1831, Ann. Sci. nat. 22 (85) p. 33.

Type du genre : *Forficula macrocephala* P. DE BEAUVOIS, 1805.

(= *Nannopygia* DOHRN, 1863; *Dyscritina* WESTWOOD, 1881; *Verhoeffella* ZACHER, 1910; *Paradiplatys* ZACHER, 1910).

2. — *macrocephala* (PALISOT DE B.), 1805 (*Forficula*).

3 exemplaires : Boma : TSCHOFFEN (det. : BURR); Bhamo (Birmanie (det. : BURR)).

3. — *rufescens* (KIRBY), 1896 (*Cylindrogaster*).
 (= *longisetosa* WESTWOOD, partim (HINCKS, 1955).
 = *falcatus* BURR, partim (HINCKS, 1955).
 1 exemplaire : Calcutta, Punjab (det. : BURR).

3. — Famille des PYGIDICRANIDAE

Pygidicranidae VERHOEFF, 1902, Zool. Anz., 25, pp. 188-202.

a. — *Pygidicraninae* BURR, 1908, Ann. Nat. Hist. Mag., 8, 2, p. 383.

Généralement grandes espèces; antennes pileuses d'au moins 25 articles; scutellum visible chez les espèces ailées; élytres présentes : chez *Pyge* BURR (raccourcies) et *Acnodes* BURR (absentes); fémurs comprimés et en massue (HINCKS, 1955, 1959).

Trois genres représentés dans les collections : *Cranopygia* BURR; *Tagalina* DOHRN et *Dacnodes* BURR.

3) Genre **Cranopygia** BURR, 1908, Ann. Mag. nat. Hist., (8) 2, pp. 384-389.

Type du genre : *Pygidicrana cumingi* DOHRN, 1863.

4. — *modesta* (BORMANS), 1894 (*Pygidicrana*).
 1 exemplaire : Ex-Typis — Carin-Chebà, 900-1.100 m ;
 L. FEA, V/XII-1888; étiquette de détermination manuscrite :
 DE BORMANS-*Pygidicrana modesta* DE BORMANS. SYNTYPE.
 5. — *picta* (GUÉRIN), 1838 (*Pygidicrana*).
 2 exemplaires : Calcutta (det. : BURR).
 6. — *cumingi* (DOHRN), 1863 (*Pygidicrana*).
 1 exemplaire : Sumatra : Indrapoera, mâle (det. : BORELLI,
 1923) étiquette de détermination manuscrite.
 7. — *valida* (DOHRN), 1867 (*Pygidicrana*).
 1 exemplaire : Laos, 1/4-III-1932 : Prince LÉOPOLD (det. :
 CAUDELL, 1933).
 8. — *marmoricrura* (SERVILLE), 1839 (*Pygidicrana*).
 8 exemplaires : Java Occid. : Pengalengan, 4000 f, 1893;
 Sukabumi 2000 f, 1893 : FRUHSTORFER-3-48; Java :
 Coll. A. FINOT, V-1938.

4) Genre **Dacnodes** BURR, 1907, Ent. Mon. Mag., (2) 18, p. 60.

Type du genre : *Dacnodes wellmani* BURR, 1907.

(= *Dicrana* BURR, 1908; *Picrania* BURR, 1908; *Acnodes* BURR,
 1911).

9. — *biaffra* (BORMANS), 1903 (*Pygidicrana*).
 2 exemplaires : Kamerun : Mukonje-Farm, R. RHODE (det. :
 BURR).

10. — *frontalis* (KIRBY), 1903 (*Pygidicrana*).
1 exemplaire : Mukonje-Farm, Kamerun, R. RHODE (det. : BURR).

5) Genre **Tagalina** DOHRN, 1863, Stett. Ent. Ztg., 24, p. 44.

Type du genre : *Forficula grandiventris* BLANCHARD.

11. — *semperi* DOHRN, 1863 (*Tagalina*).
(= *grandiventris* BURR nec BLANCHARD).
(= *papua* BORMANS (*Pygidicrana*)).
8 exemplaires : Nouvelle-Guinée : Siwi, III-1929, Prince LÉOPOLD (det. : BORELLI, 1930).

b. — *Echinosomatinae* BURR, 1910, Fn. British India : Dermaptera : 67, 69.

Corps court et épais; pronotum plus large que long; abdomen court et large; sous-famille tropicale; élytres développés (HINCKS, 1955, 1959).

6) Genre **Echinosoma** SERVILLE, 1838, Hist. nat. Orthopt., p. 34.

Type du genre : *Forficula afra* PALISOT DE BEAUVOIS, 1805.

12. — *sumatranum* (DE HAAN), 1842 (*Forficula*).
(= *westermanni* DOHRN, 1863).
6 exemplaires : Tenasserim : Thagata; Carin-Chebà; Birmanie : Bhamo, FEA, 1886-1897 (det. : BORMANS).
13. — *bolivari* RODZIAK, 1897 (*Echinosoma*).
2 exemplaires : Madagascar : Margancetra : Coll. A. FINOT, XII-1847.
14. — *wahlbergi* DOHRN, 1863 (*Echinosoma*).
(= *distanti* BURR; *rufum* BORELLI).
3 exemplaires : Popocabana : E. Loos; Ligunda, L. MARESSE; Léopoldville : CLAVEAU (det. : BURR).

c. — *Pyagrinae* BURR, 1909, Dtsch. Ent. Ztg., pp. 324-325.

De taille petite à moyenne; pubescent et sétuleux, sombres; corps plus ou moins déprimé; antennes sétuleuses de 25 à 40 segments; ailes bien développées; sous-famille néo-tropicale, orientale et éthiopienne (HINCKS, 1955, 1959).

7) Genre **Pyragra** SERVILLE, 1831, Ann. Sci. nat., 22, p. 34.

Type du genre : *Pyragra fuscata* SERVILLE, 1831.

15. — *brasiliensis* (GRAY), 1832 (*Forficula*).
(= *fuscata* BURR, nec SERVILLE; *opaca* BURMEISTER; *aspera* STÅL).

7 exemplaires : Coll. VAN VOLXEM (sans localité) (det. : BURR); Sn. Catharina : LINDEN (det. : BORELLI, 1923).

16. — *fuscata* SERVILLE, 1831 (*Pyragra*).

(= *saussurei* DOHRN; *chontalia* SCUDDER; *brasiliensis* BURR; *barberi* CAUDELL).

5 exemplaires : Mexique : comme étant le *Thermastris saussurei* DOHRN (det. : BORELLI, 1923); Colombie, LINDEN-*Pyragra saussurei* DOHRN (det. : BURR).

III. — Super-famille des LABIOIDEA

4. — Famille des CARCINOPHORIDAE

a. — *Parisolabinae* VERHOEFF, 1904, Arch. f. nat., p. 120.

Dermaptères complètement aptères; antennes multisegmentées; abdomen dilaté ou non; pattes fines.

8) Genre ***Idolopsis*** BORELLI, 1910, Bull. Mus. Hist. nat. Paris, p. 156.

Type du genre : *Idolopsis riveti* BORELLI, 1910.

17. — *azteca* (DOHRN), 1862, (*Forcinella*)-(DE BORMANS et KRAUSS, 1900).

1 exemplaire : Sn Catharina : LINDEN (det. : BURR; rev. BORELLI, 1923).

b. — *Brachylabinae* BURR, 1909, Deutsch. Ent. Zeitsch., p. 324 (POPHAM et BRINDLE, 1966).

Sous-famille caractérisée par l'absence d'organes de vol; pattes fines et longues : seul le segment deux est allongé; corps cylindrique; dermaptères sétuleux et même densément pubescent.

9) Genre ***Brachylabis*** DOHRN, 1864, Stett. Ent. Zeit., vol. 15, p. 292.

Type du genre : *Forficula chilensis* BLANCHARD.

18. — *chilensis* (BLANCHARD), 1851 (*Forficula*).

(= *testaceicornis* BLANCHARD).

3 exemplaires : Therezopolis-Entre-Rios : Coll. C. VAN VOLXEM; M. R. Belg. : *Anisolabis chilensis* BLANCHARD (det. : BORELLI, 1923).

10) Genre ***Isolabis*** VERHOEFF, 1902, Sitzungsber ges. naturf. Fr., p. 11.

Type du genre : *Isolabis braueri* VERHOEFF, 1902.

(= *Metisolabis* BURR, 1910; *Ctenisolabis* VERHOEFF, 1902; *Leptisolabis* VERHOEFF, 1902; *Antisolabis* BURR).

19. — *punctata* (DUBRONY), 1879 (*Brachylabis*).
 5 exemplaires : Carin-Chebà (PELON); Birmanie : Teizo, FEA, 1887 (*Pachylabis punctata* DUBRONY (det. : DE BORMANS)).

c. — *Carcinophorinae* BURR, 1911, Genera Insect., 122, p. 27.

Antennes à segments nombreux, les 4^e, 5^e et 6^e raccourcis; élytres et ailes complètes ou faisant totalement défaut; pattes courtes, mais fortes. (BURR, 1911 et POPHAM et BRINDLE, 1966).

11) Genre **Euborellia** BURR, 1910, Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 38, p. 448.

Type du genre : *Euborellia moesta* (GÉNÉ), 1839.
 (= *Mongolabis* ZACHER, 1911; *Heterolabis* BORELLI, 1912; *Gelotolabis* ZACHER, 1911).

20. — *staeli* (DOHRN), 1864 (*Forcinella*).
 3 exemplaires : Amboine : SUYCKERBUYK; M. R. Belg. (det. : DE BORMANS, comme *Anisolabis staeli* DOHRN); Madagascar (det. : BORELLI, 1923 : *Euborellia*); Bombay : FEA, 1885 (det. : DE BORMANS : *Anisolabis*).

21. — *annulipes* (LUCAS), 1847 (*Forcinella*).
 (= *annulicornis* BLANCHARD, 1851, *Forficula*).
 28 exemplaires : Env. de Gênes : Coll. DE SELYS (det. : DE BORMANS; BURR, 1913; BORELLI, 1923); Malaga : Coll. C. VAN VOLXEM; M. R. Belg. (det. : DE BORMANS); Carin-Chebà; FEA, 1896; Popocabacca : F. Loos; Antigoa : Coll. C. VAN VOLXEM (det. : DE BORMANS); Pérou (det. : BURR).

24. — *moesta* (GÉNÉ), 1839 (*Forficesila*).
 6 exemplaires : Sn Catharina : LINDEN (det. : DE BORMANS et KRAUSS, 1900; BORELLI, 1923); Pérou : Coll. DE SELYS LONGCHAMPS (det. : BORELLI, 1923; BURR).

23. — *femoralis* (DOHRN), 1863 (*Labidura*).
 4 exemplaires : Birmanie : Rangon, FEA, 1886 (det. : DE BORMANS : *Psalis*).
 24. — *moesta* (GÉNÉ), 1839 (*Forficesila*).
 41 exemplaires : Madrid : Coll. SELYS (det. : BURR, 1933); Rome; Cannes : Coll. A. FINOT; J. MULLER.

12) Genre **Gonolabis** BURR, 1900, Ann. Soc. Ent. Belg., 44, p. 48.

Type du genre : *Gonolabis javana* (BORMANS), 1883 (*Anisolabis*).
 (= *Anisolabella* ZACHER, 1911) — POPHAM, 1966.

25. — *javana* (BORMANS), 1883 (*Anisolabis*).
 1 exemplaire : Lombok, 1896 : FRUHSTORFER (det. : BURR).

26. — *tasmanica* (BORMANS), 1880 (*Anisolabis*).

1 exemplaire : Tasmanie : Coll. C. VAN VOLXEM; M. R. Belg. — 206 — étiquette « Type »; étiquette de détermination manuscrite : DE BORMANS : *Anisolabis tasmanica* BORMANS. HOLOTYPE.

13) Genre ***Anisolabis*** FIEBER, 1853, Lotos, 3, p. 257.

Type du genre : *Anisolabis maritima* (GÉNÉ), 1832 (*Forficula*).

(= *Spondox* BURR, 1914; *Labidurodes* DUBRONY, 1879; *Logicolabis* ZACHER, 1911; *Parapsalis* BORELLI, 1921; *Homoeolabis* BORELLI, 1911; *Paralabis* BURR, 1915).

27. — *maritima* (GÉNÉ), 1832 (*Forficula*).

41 exemplaires : Japon; Carin-Chebà; St-Bartolemy : Coll. C. VAN VOLXEM, Coll. SELYS, J. BOLIVAR, DELAKEY, VAN LANSBERG (det. : DE BORMANS, BURR, BORELLI).

28. — *mauritanica* (LUCAS), 1846 (*Forficesila*).

15 exemplaires : Algérie : Coll. C. VAN VOLXEM (det. : BURR); Alger : Coll. SELYS (det. : BURR); Oran : Chabat el Amuir : Coll. A. FINOT, 1885.

14) Genre ***Carcinophora*** SCUDDER, 1876, Proc. Boston Soc. nat. Hist., vol. 18, p. 291.

Type du genre : *Carcinophora americana* (PALISOT DE BEAUVOIS), 1817 (*Forficula*).

(= *Mandex* BURR, 1915; *Notolabis* HINCKS, 1927; *Spandex* BURR, 1915; *Metalabis* BURR, 1915; *Apolabis* BURR, 1915; *Epilabis* BURR, 1915).

29. — *americana* (BEAUVOIS), 1817 (*Psalis*).

6 exemplaires : Colombie : LINDEN; Colombie : MUZO : Coll. J. MULLER.

30. — *marginalis* (DOHRN), 1864 (*Forcinella*) (BORMANS et KRAUSS, 1900).

3 exemplaires : Batavia (det. : BORELLI, 1923).

31. — *laeta* (GERSTAECKER), 1869 (*Brachylabis*).

1 exemplaire : Tenasserim, 1.000-1.300 m, FEA, Ap. 1887 (det. : DE BORMANS).

15) Genre ***Anophthalmolabis*** BRINDLE, 1966, in Miss. Scient. belg. aux Iles Galapagos — I. R. S. N. B. — 1 part., pp. 171-176 (1968).

Type du genre : *Anophthalmolabis leleupi* BRINDLE, 1966.

32. — *leleupi* BRINDLE, 1966, loc. sit.

4 exemplaires + nymphes : Iles Galapagos : N. LELOUP, 27-XII-64/XI-65 : HOLOTYPE & PARATYPES (det. BRINDLE).

d. — *Platylabinae* BURR, 1910, Fauna Brit. India, Dermapt., p. 67.

Corps fortement déprimé; antennes composées de 20 à 30 segments ou anneaux; tarses petits; le troisième segment plus long que le premier et le deuxième réunis.

16) Genre **Platylabia** DOHRN, 1867, Stettin Ent. Ztg., 28, p. 347.

Type du genre : *Platylabia major* DOHRN, 1867.

33. — *major* DOHRN, 1867 (*Platylabia*).

9 exemplaires : Ceylan; Java Occid. : Pengalengem, 4.000', 1893 : FRUHSTORFER; Carin-Chebà : FEA, V/XII-88 (det. : DE BORMANS et BURR).

5. — Famille des *LABIIDAE*

Labiidae BURR, 1909, Deut. Ent. Zeitschr., p. 323.

Antennes ne comptant pas plus de 25 segments; deuxième segment du tarse cylindrique; fémurs non comprimés.

a. — *Spongiphorinae* BURR, 1911, Deut. Ent. Zeitschr., vol. 1, p. 59.

Tête grande, large à sutures marquées, profondes; les yeux grands et proéminents.

17) Genre **Spongiphora** SERVILLE, 1831, Ann. Sc. Nat., vol. 32, p. 31.

Type du genre : *Spongiphora croceipennis* SERVILLE, 1831.

34. — *croceipennis* SERVILLE, 1831 (*Spongiphora*).

(= *parallela* WESTWOOD, 1837).

6 exemplaires : Sta Cruz-Rio grande do Sul : STIEGLMAYER (Coll. BRUNNER v. W.) (det. : BURR); Theresopolis (Sn. Catharina)-Rio Capivary : FRUHSTORFER, 1888 (det. : BURR : *parallela* WESTWOOD).

18) Genre **Vostox** BURR, 1911, Deutsch. Ent. Nat. Bibli., vol. 2, p. 59.

Type du genre : *Vostox brunneipennis* (SERVILLE), 1839 (*Psalidophora*).

35. — *brunneipennis* (SERVILLE), 1839 (*Psalidophora*).

3 exemplaires : Mexique (Sn. Catharina) : LINDEN (det. : BURR).

19) Genre **Apovostox** HEBARD, 1927, Proc. Acad. nat. Sci., Philad., 79, p. 29.

Type du genre : *Apovostox pygidiatus* (DUBRONY), 1897 (*Labia*).

36. — *pygidiatus* (DUBRONY), 1879 (*Labia*).

5 exemplaires : Carin-Chebà, 900-1.100 m : L. FEA, V/XII-88 (det. : DE BORMANS); Sn. Catharina : LINDEN (det. : BURR).

20) Genre **Spongovostox** BURR, 1911, Dtsch. Ent. Nation. Bibl., 2 (8), p. 59.

Type du genre : *Spongovostox quadrimaculatus* (STÅL), 1855 (*Forficula*).

37. — sp. larves.

2 exemplaires : Australie : H. FRENCH (det. : BORELLI, 1923).

38. — *eichelbaumi* BORELLI, 1932 (*Spongovostox*).

1 exemplaire : Kivu : J. VERBEKE, 1953 (det. : HINCKS, 1959).

39. — *aloyssi-sabaudiae* (BORELLI), 1906 (*Spongovostox*).

1 exemplaire : Kivu : J. VERBEKE, 1953 (det. : HINCKS, 1959).

40. — *stigma* (DOHRN), 1867 (*Psalidophora*).

1 exemplaire : Bahia; M. R. Belg. : DE LACERDA (det. : DE BORMANS).

21) Genre **Laprobia** HINCKS, 1960, Proc. R. Ent. Soc. London, sér. B, vol. 29, pp. 155-157.

Type du genre : *Forficula unidentata* PALISOT DE BEAUVOIS, 1805.

(= *Prolabia* BURR, 1911 (partim) : HINCKS, 1960).

41. — *unidentata* (PALISOT DE BEAUVOIS), 1805 (*Forficula*).

(= *guttata* SCUDDER).

1 exemplaire : Guanoxuato : E. DAGÈS; M. R. Belg. 229 (det. DE BORMANS).

b. — *Labinae* BURR, 1911, Deutsche Ent. nat. Bibli., vol. 2, p. 60,

De taille généralement petite; corps quelque peu déprimé; tête lisse, saillante et les sutures peu ou pas distinctes; les yeux petits.

22) Genre **Chaetospania** KARSCH, 1886, Berl. Ent. Zeitschr., vol. 30, p. 87.

Type du genre : *Chaetospania inornata* KARSCH, 1886.

(= *Platylabia* (partim) DOHRN; *Labidophora* (partim) SCUDDER; *Sparattina* VERHOEFF).

42. — *fæae* BORMANS, 1894 (*Chaetospania*).
 3 exemplaires : Ex-Typis : Carin-Chebà-Asciuii, 1.200-1.300 m; Carin-Chebà, 900-1.000 m : L. FEA, II-88; V/XII-88; étiquette « Type » et étiquette de détermination manuscrite : DE BORMANS. SYNTYPES.
43. — *thoracica* (DOHRN), 1867 (*Platylabia*).
 (= *gestroi* DUBRONY; *nigriceps* KIRBY; *fallax* BORMANS; *tricuspidata* BURR).
 1 exemplaire : Carin-Chebà, 900-1.000 m, L. FEA, V/XII-88 (det. : DE BORMANS : *Platylabia fallax* BORMANS, 1894); étiquette « Type » et étiquette de détermination manuscrite : DE BORMANS. SYNTYPE.
- 23) Genre **Sphingolabis** BORMANS, 1883, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 27, p. 58.
 Type du genre : *Sphingolabis semi-fulva* (BORMANS), 1884 (*Sparatta*).
 (= *furcifera* BORMANS).
44. — *hawaiensis* (BORMANS), 1882 (*Forficula*).
 1 exemplaire : Sunda Insel : Lombok, 2.000', Ap. 1896 : FRUHSTORFER (det. : BURR).
- 24) Genre **Labia** LEACH, 1813, Brewster's Edimb. Encycl., vol. 9, p. 118.
 Type du genre : *Labia minor* (LINNÉ), 1758 (*Forficula*).
 (= *Copiscelis* FIEBER).
45. — *curvicauda* (MOTSCHELSKY), 1863 (*Forficesila*).
 (= *glabricula* KIRBY).
 7 exemplaires : Brésil : S. Paul : LINDEN (det. : BURR) : *glabricula* KIRBY; Katha; Carin-Chebà-Asciuii, 1.200-1.300 m, L. FEA, XII-87 (det. DE BORMANS).
46. — *minor* (LINNÉ), 1758 (*Forficula*).
 68 exemplaires : Kinshasa; Genève; Algérie; Paris; Bucarest : Coll. DE SELYS; H. TOURNIER; Coll. A. FINOT; A. C. MONTENDON (det. : BURR et DE BORMANS).
47. — *marginalis* (THUNBERG), 1827 (*Forcinella*).
 (= *ochropus* STAL).
 1 exemplaire : Léopoldville, V-VI-1889 : E. CLAVAREAU (det. : BURR).
48. — *lutea* (BORMANS), 1894 (*Spongophora*).
 2 exemplaires : Carin-Chebà, 1.200-1.300 m, L. FEA, I-88; étiquette de « Type » et étiquette de détermination manuscrite : DE BORMANS. SYNTYPES.
49. — *mucronata* (STÅL), 1800 (*Forficula*).
 4 exemplaires : Birmanie : Bhamo, L. FEA, VIII-85 (det. : DE BORMANS).

50. — *nigrella* DUBRONY, 1879 (*Labia*).
 (= *fasciata* BORMANS, 1894).
 1 exemplaire : Carin-Chebà, 900-1.100 m, L. FEA, V/XII-88
 (det. : DE BORMANS : *L. fasciata* BORMANS). Etiquette
 « Type » et étiquette de détermination manuscrite : DE
 BORMANS de : *Labia fasciata*. TYPE.
51. — *ridens* BORMANS, 1894 (*Labia*).
 4 exemplaires : Carin-Chebà, 900-1.100 m, L. FEA,
 V/XII-88; étiquette « Type » et étiquette de détermination
 manuscrite : DE BORMANS. SYNTYPES.
52. — *ridens* var. *cyclolabia* BORMANS, 1894 (*Labia*).
 2 exemplaires : Carin-Chebà, 900-1.1000 m, L. FEA,
 V/XII-88; étiquette « Type » et étiquette de détermination
 manuscrite : DE BORMANS. SYNTYPES.
53. — *brunnea* SCUDDER, 1876 (*Labia*).
 3 exemplaires : St-Barthélemy; M. R. Belg. 282 (det. :
 DE BORMANS).
54. — *dorsalis* (BURMEISTER), 1839 (*Forficula*).
 (= *chalybea* DOHRN).
 1 exemplaire : Porto Nuovo da Cio : Coll. C. VAN VOLXEM,
 M. R. Belg. 280 (det. : DE BORMANS).
55. — *severini* BURR, 1900 (*Labia*).
 1 exemplaire : Colombie : LINDEN, Mus. Brux.; étiquette
 « Type » et étiquette de détermination manuscrite de :
 BURR. HOLOTYPE.

25) Genre **Marava** BURR, 1911, Dtsch. Ent. nat. Bibli., 2, pp. 59-60.

Type du genre : *Marava grandis* (DUBRONY), 1879 (*Labia*).
 (= *Prolabia* BURR, 1911 : type : *Forficula arachidis* YERSIN).
 (= *Andex* BURR, 1911 : type : *Labia nigroflavida* REHN) (HINCKS,
 1954).

56. — *arachidis* (YERSIN), 1860 (*Forficula*).
 (= *nigripennis* MOTSCHULSKY : *Forficula*).
 (= *gravidula* GESTAECKER : *Apterygida*).
 (= *wallacei* DOHRN : *Labia*).
 (= *grandis* DUBRONY : *Labia*).
 (= *nigroflavida* REHN : *Labia*) (HINCKS, 1954).
 4 exemplaires : Fort Dairison : Coll. C. VAN VOLXEM;
 M. R. Belg. (det. DE BORMANS).

c) **Sparattinae** BURR, 1911, Deutsche Ent. nat. Bibli., vol. 2, p. 60.

Corps fortement déprimé; tête aplatie; yeux petits; élytres non carénées;
 ailes généralement développées.

26) Genre **Sparatta** SERVILLE, 1839, Hist. nat. Orthopt., p. 51.

Type du genre : *Sparatta pelvietra* SERVILLE, 1839.

57. — *clarkii* KIRBY, 1896 (*Sparatta*).

4 exemplaires : S. Catharina : LINDEN (det. : BURR).

58. — *pelvimetra* SERVILLE, 1839 (*Sparatta*).

(= *rufina* STÅL; *dentifera* REHN).

1 exemplaire : Therezopolis : Coll. C. VAN VOLXEM (det. : DE BORMANS).

27) Genre **Parasparatta** BURR, 1911, Deutsche Ent. nat. Bibli., vol. 2, p. 61.

Type du genre : *Parasparatta nigrina* (STÅL), 1855 (*Sparatta*).

59. — *nigrina* (STÅL), 1855 (*Sparatta*).

1 exemplaire : mâle : Rio de Janeiro : Coll. C. VAN VOLXEM; M. R. Belg.; étiquette « Type »; étiquette de détermination manuscrite : DE BORMANS, 1880. ALLOTYPE mâle.

d) *Nesogastrinae* VERHOEFF, 1902, Zool. Anzeig., n° 665, p. 191.

Elytres complètes avec carène pointue; ailes entièrement développées ou absentes; fémurs épaisse principalement les antérieurs; tarses petits à segments courts; antennes avec segments coniques ou sub-coniques.

28) Genre **Nesogaster** VERHOEFF, 1902, Zool. Anzeig., n° 665, p. 111.

Type du genre : *Nesogaster dolichus* (BURR), 1897 (*Labia*).

60. — *amoenus* (STÅL), 1855 (*Forficula*).

1 exemplaire : Java : mâle (det. : DE BORMANS).

61. — *ericksoni* (DOHRN), 1862 (*Forficula*).

1 exemplaire : Tasmanie : Coll. ALLPOST; M. R. Belg. (det. : DE BORMANS).

IV. — Super-famille des FORFICULOIDEA

6. — Famille des *LABIDURIDAE*

Labiduridae VERHOEFF, 1902, Zool. Anzeig., n° 665, p. 189.

Tête généralement convexe postérieurement et plus ou moins saillante; fémurs non comprimés, ni en forme de massue.

a) *Labidurinae* BURR, 1909, Deutsche Ent. Zeitschr., p. 425.

Corps non déprimé; antennes avec nombreux segments, dont les 4^e, 5^e et 6^e sont plus courts; élytres généralement carénées; pattes longues et fines; tarses allongés.

- 29) Genre **Nala** ZACHER, 1910, Ent. Rundsch., vol. 27, p. 29.

Type du genre : *Nala lividipes* (DUFOUR), 1828 (*Forficula*).
 (= *Paralabidura* BURR).

62. — *lividipes* (DUFOUR), 1828 (*Forficula*).

(= *pallipes* DUFOUR; *castanea* SERVILLE; *meridionalis* SERVILLE; *dufourii* DESMARET).

25 exemplaires : Lagos; Portugal; Coll. C. VAN VOLXEM (det. : BURR) : Ceylan; Bengale; Birmanie (Rangoon) : FEA, 1888; Bali : Prince LÉOPOLD, IV-1932 (det. : CAUDELL, 1933); Bali : Singaradja : Prince LÉOPOLD, 1929 (det. : BORELLI, 1930). Détermination de : BURR; DE BORMANS : *Labidura dufourii* DESMARET.

- 30) Genre **Labidura** LEACH, 1815, Edinburgh Encycl., vol. 9, p. 48.

Type du genre : *Labidura riparia* (PALLAS), 1773 (*Forficula*).
 (= *Forcicesila* SERVILLE, 1831; *Demogorgon* KIRBY, 1891).

63. — *riparia* (PALLAS), 1773 (*Forficula*).

(= *gigantea* FABRICIUS; *bengalensis* DOHRN; *longipennis* BORELLI; *allipes* FABRICIUS).

115 exemplaires : Calcutta (det. : BURR : *bengalensis* DOHRN); Kinshasa (det. : BORELLI, 1923 : *bengalensis* DOHRN); Sahara : LAMERE; Portinao : Coll. C. VAN VOLXEM : France; Java; Boma : Coll. J. MULLER; Coll. J. SELYS (det. : A. FINOT; BURR; BORELLI; DE BORMANS); Congo : Miss. Tanganika (det. : HINCKS).

- 31) Genre **Forcipula** BOLIVAR, 1897, Ann. Soc. Ent. Fr., vol. 66, p. 283.

Type du genre : *Forcipula quadrispinosa* (DOHRN), 1863
 (*Labidura*).

64. — *quadrispinosa* (DOHRN), 1863 (*Labidura*).

1 exemplaire : Calcutta (det. : BURR).

65. — *congo* BURR, 1900, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 44, p. 44.

1 exemplaire : Béni-Bendi (Sankuru), L. CLOETENS, 1/95; étiquette « Type »; étiquette de détermination manuscrite de BURR. HOLOTYPE.

66. — *gariazzoi* BORELLI, 1889 (*Forcipula*).

1 exemplaire : Lingunda : MAIRESSE (det. : BORELLI).

Quelques exemplaires de la Miss. K. E. A. (det. : HINCKS).

67. — *tanganyikae* HINCKS, 1957, Expl. Hydrobiolog. Tanganika, vol. 111, Fasc. 6, p. 42.

9 exemplaires : Lac Tanganika : Baie de Kasoje, riv. Lubungu : Miss. Tanganika. HOLOTYPE : mâle; ALLOTYPE : femelle; PARATYPES : femelles.

b) *Apachyinae* BURR, 1910, Faun. Brit. India Dermapt., p. 31.

Corps fortement aplati; scutellum largement découvert; pattes minces.

32) Genre **Apachyus** SERVILLE, 1831, Ann. Nat. Sci., vol. 22, p. 35.

Type du genre : *Apachyus depressa* (PALISOT DE BEAUVOIS), 1805 (*Forficula*).
 (= *Apachya* SERVILLE).

68. — *feae* (BORMANS), 1894 (*Apachya*).

2 exemplaires : Carin-Chebà, 900-1.100 m; L. FEA, V/XII-88; exemplaires typiques; étiquette « Type » et étiquette de détermination manuscrite : DE BORMANS.
 SYNTYPES.

69. — *murrayi* (DOHRN), 1863 (*Apachya*).

1 exemplaire : Luki, 1900 : E. WILVERTH (det. : BURR).

70. — *reichardi* (KARSCH), 1900 (*Apachya*).

1 exemplaire : Congo : Stanleyville 236; M. R. Belg. : Coll. J. MULLER.

c) *Allostethinae* POPHAM, 1965, Entomologist, 98, pp. 126-136.

Corps généralement cylindrique par rapport aux espèces des Apachyinae ayant le corps déprimé; élytres complètes avec ou sans marques ou encore réduites ou manquantes; ailes présentes.

33) Genre **Allostethus** VERHOEFF, 1904, Arch. f. naturg., p. 116.

Type du genre : *Allostethus indicum* (BURMEISTER), 1838 (*Forficula*).

71. — *indicum* (BURMEISTER), 1838 (*Forficula*).

(= *magnificus* REHN).

5 exemplaires : Java Occid. : FRUHSTORFER (det. : BURR).

72. — *lombokianum* VERHOEFF, 1904.

1 exemplaire : Lombok, Sapit 2.000', IV-1888 : FRUHSTORFER (det. : BURR).

73. — *minor* (BORMANS), 1900 (*Psalis*).

1 exemplaire : Java : FRUHSTORFER (det. : BURR).

34) Genre **Gonolabidura** ZACHER, 1910, Ent. Rundsch., vol. 27, p. 28.

Type du genre : *Gonolabidura volzi* ZACHER, 1910.

(= *Anisolabis piligera* BORMANS).

74. — *piligera* (BORMANS), 1900 (*Anisolabis*).

3 exemplaires : Pontianae : BOLLEN (det. : DE BORMANS); Fort Koch (Sumatra) : Prince LÉOPOLD (det. BORELLI, 1930).

7. — Famille des *FORFICULIDAE*

Forficulidae BURR, 1907, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 93.

Corps généralement quelque peu déprimé ou cylindrique ou convexe. Antennes de 12 à 15 segments, cylindriques ou subcylindriques; quatrième segment d'égale longueur ou plus court que le troisième. Elytres présentes, bien développées ou rudimentaires. Pattes courtes.

a) *Anechurinae* BURR, 1907, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 94.

Corps déprimé et dilaté; élytres complètes ou non, carénées ou non; ailes parfaites ou non.

35) Genre **Anechura** SCUDDER, 1876, Proc. Boston Soc. nat. Hist., vol. 18, p. 289.

Type du genre : *Anechura bipunctata* (FABRICIUS), 1781 (*Forficula*).

75. — *japonica* (BORMANS), 1880 (*Forficula*).

1 exemplaire : Japon (det. : BURR).

76. — *bipunctata* (FABRICIUS), 1781 (*Forficula*).

(= *biguttata* FABRICIUS; var. *orientalis* KRAUSS).

10 exemplaires : Arménie (det. : BORELLI, 1923); Saxe; France : Coll. C. VAN VOLXEM; E. ROUSSEAU; Coll. J. MULLER (det. : BORELLI, 1923; BURR; BOREMANS).

36) Genre **Chelidura** LATREILLE, 1825, in Latreille, Fam. Règne anim., p. 410.

Type du genre : *Chelidura aptera* (MEGERLÉ), 1825 (*Forficula*).

77. — *aptera* (MEGERLÉ), 1832 (*Forficula*).

20 exemplaires : Haute Cerdagne; Suisse; Grand St-Bernard : Coll. A. FINOT; DE BORMANS; P. PELLET (det. : BURR, DE BORMANS).

78. — *aptera* var. *simplex* (LA FRESNAYE), 1825 (*Forficula*).

(= *dilatata* LA FRESNAYE).

7 exemplaires : France : Pic du Midi; Bagnère de Bigorre : Coll. A. FINOT et divers (det. : BURR).

79. — *pyrenaica* (GENÉ), 1830 (*Forficula*).

7 exemplaires : Pic du Midi; Bagnère : Coll. A. FINOT.

80. — *thoracica* FISCHER, 1846 (*Chelidura*).

1 exemplaire : Cpabarop, 24-III-84 : Coll. DE SELYS (det. : BURR).

37) Genre **Mesochelidura** VERHOEFF, 1902, Zool. Anzeig., n° 665, p. 187.

Type du genre : *Mesochelidura bolivari* (DUBRONY), 1878 (*Chelidura*).

81. — *peringueyi* BURR, 1903 (*Mesochelidura*).

11 exemplaires : Cape Colony : Stellenbosch, Thelema Haven (Don BURR). Etiquettes « Type »; étiquettes de détermination manuscrites : BURR. SYNTYPES.

38) Genre **Allodahlia** VERHOEFF, 1902, Zool. Anzeig., n° 665, p. 194.

Type du genre : *Allodahlia scabricula* (SERVILLE), 1839 (*Forficula*).

82. — *scabricula* (SERVILLE), 1839 (*Forficula*).

7 exemplaires : Carin-Chebà; Carin-Asciuui : L. FEA, I-88, V/XII-88; Kosempo : SCUTER; Java Occid., 4.000', 1893 : FRUHSTORFER (det. : BURR).

83. — *macropyga* (WESTWOOD), 1839 (*Forficula*).

(= *ancylura* DOHRN).

3 exemplaires : Carin-Chebà, 900-1.100 m, FEA, V-1886; Birmanie : Bhamo, IX-1886 (det. : DE BORMANS).

39) Genre **Pseudochelidura** VERHOEFF, 1902, Zool. Anzeig., n° 665, p. 187.

Type du genre : *Pseudochelidura sinuata* (LAFRESNAYE), 1824 (*Forficula*).

84. — *sinuata* (LAFRESNAYE), 1824-1837 (*Forficula*).

(= *dufourii* SERVILLE).

11 exemplaires : Cauteret; Bagnère de Bigorre : Coll. DE SELYS; Coll. A. FINOT (det. : DE BORMANS; BURR); sans localité : Coll. DE SELYS (det. : BURR : *dufourii* SERVILLE).

40) Genre **Eulithus** HINCKS, 1935, Ent. Mon. Mag., 71, p. 275.

Type du genre : *Lithinus analis* (RAMBUR), 1838 (*Forficula*). (= *Lithinus* BURR, 1909, n. n.), HINCKS, 1935.

85. — *analis* (RAMBUR), 1838 (*Forficula*).

7 exemplaires : Sierra Nevada : P. DE VELETA, 14-IX-1935 (det. : BURR, 1935).

b) *Forficulinae* BURR, 1907, Trans. Soc. Ent. Lond., p. 109.

Corps légèrement déprimé et élargi au-delà du milieu; antennes composées de 12 à 15 segments, cylindriques ou coniques, courts, ayant le quatrième plus court que le troisième; élytres complètes ou raccourcies.

41) Genre **Chelidurella** VERHOEFF, 1902, Zool. Anzeig., n° 665, p. 187.

Type du genre : *Chelidurella acanthopygia* (GENÉ), 1832 (*Forficula*).

86. — *acanthopygia* (GENÉ), 1832 (*Forficula*).

(= *xanthopygia* SCHMIDT; *aptera* SCHMIDT).

42 exemplaires : Peney; Genève; Cassovie, V-78 : Coll. C. VAN VOLXEM; Coll. A. FINOT (det. : BURR et de BORMANS).

42) Genre **Doru** BURR, 1907, Ent. Soc. London, p. 123.

Type du genre : *Doru lineare* (ESCHSCHERICH), 1822 (*Forficula*).

87. — *lineare* (ESCHSCHERICH), 1822 (*Forficula*).

(= *suturalis* SERVILLE; *taeniata* DOHRN).

46 exemplaires : Bolivie : DE PEGNY (det. : BORELLI, 1923); Santa Fé de Bogota : Coll. BRUNNER v. W. (det. : BRUNNER et BURR); Coll. MULLER; Cuba : Coll. C. VAN VOLXEM, M. R. Belg. (det. : de BORMANS : *suturalis* SERVILLE); Santa Catharina; Theresopolis; Guanaxuato; Minas Geraes : Coll. A. FINOT; Coll. C. VAN VOLXEM, M. R. Belg. E. DUGÈS (det. : BURR et de BORMANS : *taeniata* DOHRN).

88. — *luteipennis* (SERVILLE), 1839 (*Forficula*).

(= *vellicans* SCUDDER).

2 exemplaires : Coll. C. VAN VOLXEM; M. R. Belg. (det. : de BORMANS).

43) Genre **Apterygida** WESTWOOD, 1840, Introd. Class. Insect., vol. 2, Gen. Synop., p. 44.

Type du genre : *Apterygida pedestris* (GENÉ), 1832 (*Forficula*) (Syn. = *media* HAGENBACH, 1822).

89. — *media* (HAGENBACH), 1822 (*Forficula*).

(= *albipennis* MEGERLÉ; *pedestris* GENÉ).

48 exemplaires : France; Genève; Peney; Algérie : Coll. C. VAN VOLXEM; M. R. Belg.; TOURNIER; Coll. SELYS; Coll. FINOT (det. : BURR).

44) Genre **Forficula** LINNÉ, 1758, Syst. nat. Ed. 10, vol. 1, p. 423.

Type du genre : *Forficula auricularia* LINNÉ, 1758.

90. — *auricularia* LINNÉ, 1758 (*Forficula*).

(= *forcipata* STEPHENS; *borealis* STEPHENS; *media* MARSHAM).

var. *cyclolabia* FIEBER; var. *macrolabis* FIEBER.

77 exemplaires : Koesen; Sicile; Calabre; Marghnia; Bucarest; Weimar; Cintra; Leria; Palerme; Gratz; Palma; Madrid : A. DE BORRE; Coll. A. FINOT; Coll. DE SELYS; Coll. C. VAN VOLXEM; JOLIVET; TH. LE COMTE; sans localité (det. : BURR : *media* MARSCHAM); sans localité (det. : BURR : *borealis* STEPHENS); sans localité (det. : BURR : *forcipata* STEPHENS); Tasmanie : Coll. SELYS (det. : BORELLI, 1923 : *cyclolabia* FIEBER); sans localité (det. : BORELLI, 1923 : *macrolabia* FIEBER).

91. — *beelzebub* (BURR), 1900 (*Chelisoches*).
1 exemplaire : Kurseong : P. BRAET; M. R. Belg.; exemplaire typique : étiquette « Type » et étiquette de détermination manuscrite : BURR. HOLOTYPE.
92. — *ruficollis* FABRICIUS, 1798 (*Forficula*).
1 exemplaire : Coll. C. VAN VOLXEM 255 (det. : BORELLI).
93. — *interrogans* BURR, 1905 (*Forficula*).
1 exemplaire : Barway : P. CARDON (det. : BORELLI, 1923).
94. — *pubescens* GENÉ, 1839 (*Forficula*).
(var. *yersini* YERSIN).
39 exemplaires : Carregado; Gênes : Coll. C. VAN VOLXEM; A. DE BORMANS; Coll. A. FINOT (det. : BURR et DE BORMANS).
95. — *lesnei* FINOT 1887 (*Forficula*).
4 exemplaires : Folkestone; St-Arnoult; Loire Inf. : Coll. A. FINOT; BURR (det. : BURR).
96. — *decipiens* GENÉ, 1832 (*Forficula*).
11 exemplaires : Hyères; Schelderode; Coll. A. FINOT; VERBEKE (det. : BURR p. p.).
97. — *albertisi* DUBRONY, 1879 (*Forficula*).
1 exemplaire : Waigiou, M. R. Belg. (det. : DE BORMANS).
98. — *senegalensis* SERVILLE, 1839 (*Forficula*).
3 exemplaires : Sénégal : Dakar : Coll. A. FINOT.
99. — *smyrnensis* SERVILLE, 1839 (*Forficula*).
1 exemplaire : sans localité : Coll. SELYS (det. : BURR).

c) *Eudohrninae* BURR, 1907, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 91.

Abdomen cylindrique et corps généralement non déprimé; antennes avec segments petits, dont le quatrième est souvent plus court que le troisième; ailes et élytres non carénées, présentes; pattes courtes.

45) Genre **Eudohrnia** BURR, 1907, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 91.

Type du genre : *Eudohrnia metallica* (DOHRN), 1864 (*Forficula*).

100. — *metallica* (DOHRN), 1864 (*Forficula*).
9 exemplaires : Indes : Tenasserim : Thagatà, IV-1887, L. FEA (det. : DE BORMANS).

d) *Neolobophorinae*.

Abdomen cylindrique, corps ni déprimé ni épaisse; antennes avec les segments courts; petites élytres; ailes vestigiales; pattes courtes.

- 46) Genre **Neolobophora** SCUDDER, 1875, Proc. Boston Soc. nat. Hist., vol. 17, p. 281.

Type du genre : *Neolobophora bogotensis* SCUDDER.

101. — *bogotensis* SCUDDER, 1875 (*Neolobophora*).

2 exemplaires : Therezopolis : Coll. C. VAN VOLXEM; M. R. Belg. (det. : DE BORMANS).

102. — *ruficeps* (BURMEISTER), 1838 (*Forficula*).

(= *volsella* SCUDDER).

3 exemplaires : Guatemala : GISQUIÈRE; Coll. BALLION ex Coll. PULS (det. : BURR); sans localité : M. R. Belg. (det. : DE BORMANS : *volsella* SCUDDER).

- e) *Ancistrogastrinae* BURR, 1907, Trans. ent. Soc. Lond., p. 105.

Antennes à segments longs et fins; troisième et quatrième segments antennaires, généralement d'égale longueur; élytres complètes ou raccourcies, lisses ou carénées; abdomen souvent dilaté, les bords de certains segments portent des crochets ou des épines.

- 47) Genre **Ancistrogaster** STÅL, 1855, Oefv. Vet. Akad. Förh., vol. 12, p. 349.

Type du genre : *Ancistrogaster luctuosus* STÅL (1854).

103. — *spinax* DOHRN, 1862 (*Ancistrogaster*).

1 exemplaire : Mexique (det. : BURR).

- f) *Opisthocosminae* VERHOEFF, 1902, Zool. Anzeig., n° 665, p. 195.

Antennes longues et fines; quatrième segment antennaire presque ou aussi long que le troisième; abdomen quelque peu déprimé; face dorsale convexe dilaté vers le milieu; pattes longues et fines.

- 48) Genre **Cosmiella** VERHOEFF, 1902, Zool. Anzeig., vol. 25, p. 195.

Type du genre : *Cosmiella rebus* (BURR) 1900.

104. — *rebus* (BURR), 1900 (*Opisthocosmia*).

1 exemplaire : Java Orientalis : Monts Tegger, 4.000'; Mus. Brux., FRUHSTORFER; étiquette « Type » rouge; étiquette de détermination manuscrite : BURR : *Opisthocosmia rebus* BURR. HOLOTYPE.

- 49) Genre **Timomenus** BURR, 1907, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 96.

Type du genre : *Timomenus oannes* (BURR), 1900 (*Opisthocosmia*).

105. — *lugens* (BORMANS), 1894 (*Opisthocosmia*).

2 exemplaires : Carin-Chebà, 900-1.100 m, L. FEA, V/XII-88; étiquette « Type » à bords rouges; étiquette de détermination manuscrite : DE BORMANS. HOLOTYPE mâle et ALLOTYPE femelle.

- 50) Genre **Eparchus** BURR, 1907, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 120.

Type du genre : *Eparchus insignis* (HAAN), 1842 (*Forficula*).

106. — *insignis* (DE HAAN), 1842 (*Forficula*).

19 exemplaires : Java : Pengalengan, Mts Tengu; Sukabumi : Cap. von ENDE (det. : BURR); Carin-Chebà, 900-1.100 m, L. FEA, V/XII-88; Coll. A. FINOT; FRUHSTORFER (det. : BURR).

107. — *tenellus* (HAAN), 1848 (*Forficula*).

2 exemplaires : Sumatra : Pegeralam, 1929 : Prince LÉOPOLD (det. : BORELLI, 1930).

108. — *dux* (BORMANS), 1894 (*Opisthocosmia*).

1 exemplaire : Carin-Chebà, 900-1.100 m, L. FEA, V/XII-88; étiquette « Type » et étiquette de détermination manuscrite : DE BORMANS : *Opisthocosmia dux* n. sp. HOLOTYPE.

- 51) Genre **Narberia** BURR, 1911, Gen. Insect., fasc. 122, p. 94.

Type du genre : *Narberia biroi* (BURR), 1900 (*Opisthocosmia*).

109. — *biroi* (BURR), 1900 (*Opisthocosmia*).

6 exemplaires : Nouvelle-Guinée : Sakoemi, 1929 : Prince LÉOPOLD (det. : BORELLI, 1930).

110. — *simplex* (BORMANS), 1894 (*Opisthocosmia*).

3 exemplaires : Carin-Chebà, Asciuui, 1.200-1.300 m, L. FEA, III/IV-88; étiquette « Type » et étiquette de détermination manuscrite : DE BORMANS : *Opithocosmia simplex* DE BORMANS. HOLOTYPE, mâle et 2 PARATYPES.

- 52) Genre **Cordax** BURR, 1910, Fauna Brit. India, Derm., p. 184.

Type du genre : *Cordax armatus* (DE HAAN), 1842 (*Forficula*).

111. — *forcipata* (DE HAAN), 1842 (*Forficula*).

2 exemplaires : Java Occid. : Pengelendam, 4.000', 1893, FRUHSTORFER (det. : BURR).

g) *Diaperasticinae* BURR, 1907, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 93.

Tous les segments antennaires longs et minces; pattes courtes; abdomen déprimé et quelque peu élargi.

53) Genre **Diaperasticus** BURR, 1907, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 98.

Type du genre : *Diaperasticus sansibaricus* (KARSCH), 1886 (*Sphingolabis*).

112. — *sansibaricus* (KARSCH), 1886 (*Sphingolabis*).

Nombreux exemplaires : Congo : lac Edouard, 1953-1954, J. VERBEKE (det. : HINCKS, 1957).

113. — *erythrocephala* (OLIVIER), 1791 (*Forficula*).

Nombreux exemplaires : Bena-Dilebe, juillet 1932 : Prince LÉOPOLD (det. : CHOPARD, 1929); Stanleyville : Coll. J. MULLER; Cape Colony; Madagascar : Coll. FINOT; Kinshasa; Boma; Kivu; Banane : TSCHOFFEN; WAELBROECK; GILMONT; J. VERBEKE (det. : BURR; HINCKS).

8. — Famille des CHELIOSCHIDAE

Chelisochidae BURR, 1907, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 125.

Antennes avec éléments cylindriques ou subcylindriques dont le quatrième segment est généralement plus court que le troisième; élytres complètement développées ou raccourcies; ailes grandes.

54) Genre **Exypnus** BURR, Trans. Ent. Soc., London, p. 128.

Type du genre : *Exypnus pulchripennis* (BORMANS), 1883 (*Chelisoches*).

114. — *pulchripennis* (BORMANS), 1883 (*Chelisoches*).

6 exemplaires : Carin-Chebà, 900-1.100 m, L. FEA, V/XII-88 (det. : BORMANS).

55) Genre **Proreus** BURR, 1907, Trans. Soc. Ent. Lond., p. 129.

Type du genre : *Proreus simulans* (STÅL), 1860 (*Forficula*).

115. — *simulans* (STÅL), 1860 (*Forficula*).

2 exemplaires : Sumatra : Indrapoera : WEYERS; Birmanie : Rangoon : FEA, XII-88 (det. : DE BORMANS).

116. — *ludekingi* (DOHRN), 1865 (*Lobophora*).

1 exemplaire : Calcutta (det. : BURR).

56) Genre **Chelisoches** SCUDDER, 1876, Proc. Boston Soc. Nat. Hist., vol. 28, p. 292.

Type du genre : *Chelisoches morio* (FABRICIUS), 1775 (*Forficula*).

117. — *morio* (FABRICIUS), 1775 (*Forficula*).
 Nombreux exemplaires : Java : Coll. A. FINOT; FRUHSTORFER; Coll. BRUNNER v. W. (det. : BURR); Nouvelle-Guinée : Siwi (Forêt), 1929, Prince LÉOPOLD (det. BORELLI 1923, p. p.).
118. — *plagiatus* (FAIRMAIRE), 1858 (*Forficula*).
 6 exemplaires : Mukonje Farm (Kameroun) : R. RHODE (det. : BURR).
119. — *fuscipennis* (DE HAAN), 1842 (*Psalidophora*).
 2 exemplaires : Java; M. R. Belg. (det. : DE BORMANS).
120. — *flavipennis* (FABRICIUS), 1793 (*Forficula*).
 2 exemplaires : Chutes de Samlia : Riv. N. Gamie : Mocque-reys (det. : BURR).
- 57) Genre **Hamaxas** BURR, 1907, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 133.
 Type du genre : *Hamaxas feae* (BORMANS), 1904 (*Chelisoches*).
 121. — *feae* (BORMANS), 1904 (*Chelisoches*).
 1 exemplaire : Carin-Chebà, 900-1.100 m, L. FEA, X/XII-88; étiquette « Type » et étiquette de détermination manuscrite : DE BORMANS. HOLOTYPE.

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE.

AD. GOEMAERE, Imprimeur du Roi, Rue de la Limite 21 — 1030 Bruxelles