

DESCRIPTION
DE
TROIS NOUVELLES ESPÈCES D'OISEAUX

RAPPORTÉES

DES ENVIRONS DU LAC TANGANYKA (AFRIQUE CENTRALE)

PAR LE CAPITAINE ÉM. STORMS;

PAR

le Docteur G. HARTLAUB, de Brême.

1. TURDUS STORMSI, Hartl.

(Pl. III.)

1 ex. adulte.

Supra unicolor fusco-olivascens, subtus a mento ad subcaudales usque intense vulpino-rufescens; jugulo pectoreque superiore nonnihil dorsi colore adumbratis; mento gulaque ochraceis, linea nigricante angusta utrinque circumscripte marginatis; remigum pogoniis internis pallide fulvo marginatis; tectricibus alarum, minoribus et majoribus, macula apicali rufescente-fulva minus distincte terminatis; subalaribus rufis; cauda unicolore fusca; rostro sordide flavido, apice obscuro; pedibus pallidis.

Long. tot. circa	200 millim.
— rostri a fr.	18 —
— alae.	117 —
— cauda	80 —
— tarsi	30 —

Espèce typique.

Les plumules brunes des joues ont leur tige de couleur pâle, ce qui produit un effet faiblement striolé. La coloration uniforme des parties inférieures est très caractéristique pour cette nouvelle

espèce. Il est bien possible que les taches fauves et peu marquées que l'on observe à la pointe des couvertures alaires disparaissent chez les individus d'un âge plus avancé (1).

2. PLOCEUS DUBOISI, Hartl.

(Pl. IV, fig. 1.)

1 ex. adulte (♂?). La pointe du bec cassée.

Capite toto circumscripse nigerrimo; dorso olivascente-flavido; collo postico et laterali, uropygio et supracaudalibus, pectore et abdomine cum infracaudalibus flavissimis; cauda olivaceo-virente; alarum tectricibus scapularibusque fuscis, late flavido marginatis; remigibus 1^{mi} et 2^{di} ordinis fuscis, limbo externo strictissimo internoque latiore flavidis; subalaribus flavis; rostro plumbeo, pedibus rubellis.

Long. tot. circa	138 millim.
— alae.	75 —
— cauda	45 —
— tarsi.	26 —

Espèce typique.

Les bordures jaunâtres des tectrices alaires ne sont pas circonscrites. Il n'y a pas de roux ou d'orangé autour du noir de la tête et du haut de la poitrine.

N'oublions pas d'ajouter que le Dr Reichenow, l'auteur d'une excellente monographie des Plocéidés publiée récemment, a reconnu cette espèce comme nouvelle. Elle trouvera sa place systématique tout près du *Ploceus capitalis*, Lath.

(1) Un second spécimen de la même espèce, mais qui n'a pas été communiqué à M. le Dr Hartlaub, présente les mêmes caractères que le type décrit ci-dessus; les taches fauves des couvertures alaires sont tout aussi distinctes, mais l'oiseau est un peu plus petit; il est probable que c'est une femelle et que le type est un mâle.

Voici les dimensions de ce second spécimen :

Long. tot.	190 millim.
Bec	16 —
Ailes	116 —
Queue	73 —
Tarses	30 —

Cet oiseau portait une étiquette de la main de M. Storms avec cette mention : « iris et bec bruns, pattes couleur chair; Mpala le 6 juin 1884. »

ALPH. DUBOIS.

3. LAGONOSTICTA NITIDULA, Hartl.

(Pl. IV, fig. 2.)

♂ *ad.* — Supra ex olivascente-fusco pallescens; superciliis in fronte strictissime conjunctis, capitis lateribus gulaque dilute vinaceo-rubentibus; pectore in fundo vinaceo-rubente maculis minutis rotundatis albis confertim notato; abdomine magis cinerascens, postice pallidior; *uropygio et supracaudalibus dorso concoloribus*; cauda unicolore fusca; remigibus fuscis; subalaribus ochroleucis; rostro ex aurantiaco rubente, dextro et culmine obscuris.

Long. tot. circa	97 millim.
— rostri a fr.	9 —
— alae	52 —
— cauda	35 —
— tarsi	16 —

Jun. av. — Supra unicolor et dilute fuscescens; subtus pallidior, abdomine fulvescente; gula conspicue rubente variegata.

Ce sont des taches peu distinctes, d'un rouge vineux pâle, que l'on voit sur la gorge du jeune.

Cette petite espèce ressemble beaucoup au *Lagonosticta rufopicta* de Fraser. Elle en diffère par l'absence totale du rouge au milieu du front, sur les couvertures supérieures de la queue et sur les rectrices. Le milieu de l'abdomen et les sous-caudales sont aussi plus pâles que chez le *L. rufopicta*.

Parmi les espèces peu connues de la collection Storms, il se trouve deux jeunes d'une espèce excessivement rare, connue seulement par un exemplaire unique du mâle adulte conservé au Musée de Berlin. C'est la *Spermospiza niveoguttata* de Peters. J'ajoute la description du plumage encore inconnu du jeune :

Jun. — Supra obscure fusco-olivascens, pileo parum obscuriore; alis dorso concoloribus; supracaudalibus distincte rubentibus; mento fulvescente; gutture fuscescente, rubente lavato; *pectore et abdomine in fundo nigricante-fusco maculis parvis, rotundatis albis* parcius notatis; abdomine imo, crisso et subcaudalibus fuscis; subalaribus albidis; rectricibus nigris, vix conspicue rubentibus; rostro caerulescente-plumbeo; pedibus fuscescentibus.

Une autre espèce remarquable de la collection Storms, c'est le

Monticola brevipes de Waterhouse, dont il y a un exemplaire presque adulte et un autre très jeune. Le plumage de l'individu presque adulte m'a paru si curieux que j'ai cru longtemps qu'il s'agissait d'une espèce nouvelle. Mais après avoir comparé cet exemplaire à un individu rapporté de Caconda par le voyageur portugais d'Anchiesa et conservé dans la superbe collection de mon ami le capitaine S. L. Shelley, je me suis persuadé que c'est bien un état de transition du *Monticola brevipes*.

Chez l'oiseau adulte (Mus. Brême, Coll. Shelley, Mus. Berl., etc.) le dessus du corps est d'un gris bleuâtre uniforme et assez vif. Chez l'oiseau du capitaine Storms et chez un individu de la collection Shelley provenant de Caconda, ce fond bleuâtre est élégamment et très irrégulièrement varié et marqué de taches noires en forme de bandes interrompues et en zigzag. En voici la diagnose :

Juv. — Supra in fundo cinereo nigricante irregulariter maculatus et fasciolatus; uropygio et supræcaudalibus laete rufis, nigro-fasciatis; macula utrinque frontali latiuscula alba; fascia utrinque mystacali brevi, lata, albida, tenuissime nigro fasciolata; gula media alba, lateraliter nigro marginata; gutture et pectore in fundo dilute rufo maculis minutis nigris vel nigricantibus irregulariter notatis; subalaribus dilute rufis; abdomine pallide fulvo; hypochondriis rufescentibus, irregulariter nigro fasciatis vel maculatis; rectricibus mediis fuscis, vix conspicue fasciatis, reliquis intense rufis, fasciis irregularibus obliquis nigris pulchre notatis; remigibus fuscis, minoribus limbo apicali albido, omnibus margine interno pallide fulvescentibus; rostro nigro, pedibus fuscis (1).

(1) Les types des oiseaux qui viennent d'être décrits, ainsi qu'un grand nombre d'autres espèces déjà connues et dont la liste suit, se trouvent actuellement au Musée royal d'histoire naturelle de Belgique, M. le capitaine Storms ayant fait don à l'État belge de la majeure partie des collections qu'il a rapportées du Congo.





Dubois, ad. nat. del. lith.

lith. G. Severegris, Bruxelles

TURDUS STORMSI.



A. Dubois, ad. nat. del. lith.

lith. G. Severeys, Bruxelles.

1. PLOCEUS DUBOISI. 2. LAGONOSTICTA NITIDULA

