

BULLETIN

DU

Musée royal d'Histoire
naturelle de Belgique

Tome IX, n° 12.

Bruxelles, avril 1933.

MEDEDEELINGEN

VAN HET

Koninklijk Natuurhistorisch
Museum van België

Deel IX, n° 12.

Brussel, April 1933.

HÉTÉROMÈRES (ALLECULIDAE) NOUVEAUX
(INSECTES COLÉOPT.),
par M. Prc (Digoin).

Les nouveautés décrites ci-dessous m'ont été communiquées par mon estimable collègue A. d'Orchymont et font partie des collections du Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique.

Lobopoda sulcaticollis n. sp.

Elongata, subopaca, luteo-griseo pubescens, nigro-picea, capite antice, palpis, antennis pedibusque pro parte testaceis, elytris apice rufis.

Allongé, presque opaque, orné d'une pubescence couchée d'un gris jaunâtre, noir de poix, extrémité des élytres roussâtres, devant de la tête, palpes, antennes, cuisses et tarses en partie testacés, tibias diversement bruns ou roux. Tête à ponctuation médiocre et écartée, yeux écartés; prothorax court et large, un peu rétréci en avant, droit sur les côtés postérieurs, sillonné au milieu et légèrement triimpressionné postérieurement, à ponctuation fovéolée moyenne, écartée; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, atténués postérieurement, striés, les stries ponctuées de points moyens; pattes robustes, tibias postérieurs un peu arqués. Long. 10 mill.

Cuba : De la vieille collection J. THOMSON.

Peut se placer près de *L. catopina* PERTY.

Il n'y a pas, à ma connaissance, de *Lobopoda* SOL. décrit de Cuba. Cette nouveauté se distingue de l'espèce cubaine *Allecula*

flavipes J. DUVAL, au moins (ex description) par le prothorax sillonné et non densément ponctué.

Lobopoda boliviensis v. nov. *columbiana*.

Elongata, nitida, glabra, nigra aut piceo-metallica, elytris viridi-metallicis, antennis piceis, pedibus rufis.

Tête à ponctuation éparsée avec les yeux assez rapprochés; prothorax court et large, un peu rétréci en avant, triimpressionné postérieurement, à ponctuation fine et écartée; élytres atténués à l'extrémité, finement striés, les stries s'oblitérant vers l'extrémité, celles-ci ayant des points allongés peu profonds et écartés, avec des impressions sur les côtés et vers l'extrémité des élytres; pattes un peu robustes, simples. Long. 11 mill.

Colombie. De la vieille collection J. THOMSON.

Cette variété diffère, à première vue, de *L. boliviensis* PIC, par la coloration non verdâtre, mais noire du prothorax et les pattes plus claires.

Lobopoda jamesi n. sp.

Elongata, subnitida, luteo pubescens, rufa, capite postice, scutello et infra corpore pro parte piceis, membris testaceis.

Allongé, peu brillant, orné d'une pubescence jaunâtre couchée, roux avec la tête postérieurement, l'écusson, le dessous du corps en partie foncés, les membres testacés. Tête à ponctuation forte, écartée, yeux assez rapprochés; prothorax court et large, un peu atténué en avant, droit sur les côtés, à ponctuation moyenne, non confluyente, sillonné au milieu, marqué de trois impressions postérieures et de deux discales en forme de fossettes larges; élytres à peu près de la largeur du prothorax, allongés, atténués postérieurement, assez fortement striés-crênelés, intervalles subconvexes, finement ponctués; pattes assez robustes, tibias presque droits. Long. 9 mill.

Brésil. De la vieille collection J. THOMSON.

Peut se placer près de *L. clarki* PIC, dont il se distingue par le prothorax multiimpressionné en dessus et à ponctuation non confluyente.

Allecula thomsoni n. sp.

Elongata, nitida, griseo pubescens et hirsuta, rufo-testacea, membris luteis, femoribus anticis et posticis brunneo-notatis.

Allongé, brillant, orné d'une pubescence grise assez longue avec de longs poils redressés sur les élytres, roux-testacé; membres jaunes, extrémité de quelques articles rembrunie, fémurs antérieurs et postérieurs marqués de brun. Tête assez longue, à ponctuation forte et rapprochée, yeux un peu distants; prothorax assez étroit, plus long que large, à ponctuation pupilleuse, rapprochée; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, atténués postérieurement, assez fortement striés, stries à points médiocres, intervalles subconvexes, peu ponctués; pattes assez robustes, tibias intermédiaires courbés. Long. 8 mill.

Brésil. De la vieille collection THOMSON.

Ressemble un peu à *L. spadicea* ER. mais prothorax plus allongé et d'ailleurs bien distinct par le dessus du corps pubescent.

GOEMAERE, imprimeur du Roi, Bruxelles.