

BULLETIN

DU

Musée royal d'Histoire
naturelle de Belgique

Tome XV, n° 24.

Bruxelles, mai 1939.

MEDEDEELINGEN

VAN HET

Koninklijk Natuurhistorisch
Museum van België

Deel XV, n° 24.

Brussel, Mei 1939.

GALERUCINAE DU CONGO BELGE,

par V. LABOISSIÈRE (Paris).

Les collections du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique renferment une petite série de Galérucines recueillies au Congo belge par M. H. J. Brédo. Ces insectes ayant fait l'objet d'observations biologiques, je crois utile d'en donner la liste complète:

Megaleruca triloba FAB., *Ent. Syst.*, 2, 21-37 (*Crioceris*).

Kaniama : 3-II-1939 (n° 972), sur Caféier Arabica, plantation Buyse.

Hyperacantha Kraatzi JAC., *Deutsch. Ent. Zeit.*, 1895, p. 184.

Kaniama : 2-II-1939 (n° 927), sur le Mûrier. Cette espèce m'a été signalée comme nuisible au Cotonnier.

Bonesia montana GAH., *Trans. Zool. Soc. Lond.*, XIX, 1909, p. 220.

Kaniama : 2-II-1939 (n° 936), sur le Mûrier.

Candezea zeae n. sp.

Noir. Tête noire; mandibules jaunes à la base; antennes brunes ou noires avec le premier article testacé; pronotum, élytres et pattes jaune citron, un peu plus foncé sur le pronotum; troisième article de tous les tarses, parfois l'extrême sommet des premier et deuxième articles, noir, onychium brun plus sombre à son extrémité; ongles roux.

Tête peu brillante, garnie de pubescence peu serrée jusque sur le vertex ; calus surantennaires densément réticulés ; vertex couvert de points serrés, ruguleux ; antennes filiformes atteignant le milieu des élytres, le troisième article de moitié plus long que le deuxième ; le quatrième presque aussi long que les deux précédents réunis.

Pronotum près de deux fois aussi large à la base que long dans son milieu, bords latéraux droits, nettement convergents vers le sommet, angles antérieurs tronqués obliquement, les postérieurs obtus ; surface densément et finement réticulée à ponctuation nulle. Ecusson en triangle équilatéral, lisse.

Elytres à peine plus larges que le pronotum à la base, presque parallèles ; surface finement et peu densément ponctuée avec des poils dressés blanchâtres peu serrés, plus visibles en arrière et sur les côtés.

Le prosternum présente en arrière des hanches un lobe large, épais sur les extrémités duquel s'arrêtent les pointes épimériques, chez certains individus il reste un espace plus ou moins grand. Métatarse postérieur pas plus grand que les trois articles suivants réunis. Long. : 4.75-5 mm.

♂, sommet de l'abdomen trilobé.

Le pronotum large et trapézoïdal donne à cette espèce l'apparence d'un *Barombiella*, mais chez ceux-ci le prosternum est élevé entre les hanches.

Congo belge : Bukama (H. J. Brédo, I-1929) ; vit sur le Maïs (n° 946) ; douze spécimens typiques, y compris le holotype.

GOEMAERE, Imprimeur du Roi, Bruxelles.