

BULLETIN

DU

Musée royal d'Histoire
naturelle de Belgique

Tome XXII, n° 21.

Bruxelles, décembre 1946.

MEDEDEELINGEN

VAN HET

Koninklijk Natuurhistorisch
Museum van België

Deel XXII, n° 21.

Brussel, December 1946.

NOTES SUR LA FAUNE ORNITHOLOGIQUE
DE L'AFRIQUE CENTRALE.

VI. — Description d'un nouveau Strigidé
du Congo belge,

par René VERHEYEN (Bruxelles).

Parmi les oiseaux réunis par M. J. DE WILDE, Conservateur du secteur Nord du Parc National Albert (Kivu) et dont l'étude m'a été confiée par l'Institut des Parcs Nationaux du Congo belge, j'ai trouvé un Strigidé nouveau qui se rattache à l'espèce *Glaucidium tephronotum* SHARPE et pour lequel je propose le nom de

Glaucidium tephronotum kivuense subsp. nov.

DESCRIPTION. — Toutes les parties supérieures de la tête et du corps, le croupion et les sus-caudales brun-noir foncé, teinté de bleu grisâtre, principalement sur la tête. Les couvertures de la nuque ont des racines blanches qui sont partiellement visibles. Couvertures sus-alaires d'un brun chaud foncé. Rémiges de même, mais barrées de plus clair sur les vexilles externes et de blanc sur les vexilles internes. Bande frontale indistincte, tache sous-oculaire, menton et gorge blancs. Région auriculaire comme le bonnet, mais avec des racines blanches apparentes. Parties inférieures du corps blanches, parsemées de grosses taches noires en forme de goutte et bordées de teinte isabelle. Bande pectorale

interrompte vers le milieu et côtés du corps brun marron chaud, les tibias plus clairs, plutôt brun noisette. Sous-alaires blanches avec çà et là une strie noire. Axillaires blanches avec un peu de brun marron. Dessus des rectrices comme le dos et chaque rectrice porte sur le vexille interne quatre taches blanches arrondies.

DIMENSIONS. — Longueur de l'aile 113 mm. et celle de la queue 81 mm.

DATE ET LIEU DE CAPTURE. — Forêt de Kambatule-Bwanandeki (Kivu) ; 1.100 m. alt. ; collection J. DE WILDE, n° 218 ; 14-IX-1940.

SEXE ET ÉTAT GÉNÉRAL DE LA LIVRÉE. — Mâle adulte en plumage frais.

CARACTÈRES DISTINGUANT LA NOUVELLE SOUS-ESPÈCE DES AUTRES FORMES FAISANT PARTIE DE L'ESPÈCE *Glaucidium tephronotum* SHARPE :

diffère de *Gl. t. medje* CHAPIN, par :

1° le brun roux des côtés du corps et des deux côtés du haut de la poitrine beaucoup plus foncé ;

2° les taches en forme de goutte beaucoup plus grandes et plus foncées ;

3° la longueur de l'aileron plus petite ;

de *Gl. t. pyrcrafti* BATES, par :

1° le brun roux des côtés du corps et des deux côtés du haut de la poitrine plus étendu ;

2° la longueur de l'aileron ainsi que celle de la queue plus grande ;

de *Gl. t. tephronotum* SHARPE, par :

1° les parties supérieures du corps moins distinctement teintées de grisâtre ;

2° les taches du dessous du corps non roussâtres mais noires ;

de *Gl. t. lukolelae* CHAPIN, par :

1° la taille plus petite et

2° les taches du dessous du corps noires ;

de *Gl. t. elgonense* GRANVIK, par la taille plus petite.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — Il est à présumer que cette nouvelle forme habite la grande forêt à l'ouest du lac Edouard et le cours supérieur de la Semliki.