

# REVUE DES OISEAUX OBSERVÉS EN BELGIQUE ;

PAR

M. ALPH. DUBOIS,

Docteur en sciences, Conservateur au Musée royal d'histoire naturelle.

---

## INTRODUCTION.

Les délégués belges du Comité ornithologique international et permanent ont adressé récemment un appel à tous les amateurs et connaisseurs d'oiseaux, afin d'établir des stations d'observations ornithologiques dans les différentes parties du pays; cet appel est accompagné d'un questionnaire indiquant tout ce qui est à observer (1).

Si l'on connaît les divers oiseaux qui peuplent la Belgique, on est loin encore de savoir tout ce qui a rapport à leurs migrations et à leur séjour parmi nous; bien des espèces passent pour rares ou accidentelles, alors que, peut-être, elles visitent régulièrement certaines régions peu étudiées ou qu'elles s'y trouvent en plus ou moins grande abondance. Chaque espèce a ses endroits de prédilection : elle reste et se multiplie là où le pays lui convient; il en résulte que tel oiseau est commun dans une localité, tandis qu'il est complètement absent à une lieue ou deux plus loin. Il suffit d'un accident de terrain, d'une rivière, d'un bois, ou même de la présence de certains végétaux, pour attirer ou éloigner certaines espèces d'oiseaux, en un mot, pour modifier la faune d'une région.

Ce n'est donc que par des observations constantes dans tous les points du pays qu'on parviendra à connaître, dans un temps plus ou moins prochain, tout ce qui peut intéresser l'histoire naturelle de nos oiseaux indigènes.

Les questions posées par le Comité ornithologique international, et qui seront résolues dans tous les pays, ont donc un but scientifique de la plus haute valeur : connaître les oiseaux européens, leurs mœurs, leur reproduction, la route qu'ils suivent dans leurs migrations, leur importance au point de vue agricole.

Nous engageons donc instamment tous les amateurs et con-

(1) L'appel en question a paru dans le numéro du 15 février dernier de la revue *Ciel et Terre* et a été reproduit par le journal *Chasse et pêche* (nos 25 et 26). Nous en tenons gratuitement des tirés à part à la disposition des amateurs.

naisseurs d'oiseaux de bien vouloir collaborer au travail qui nous est demandé.

Dans l'appel paru dernièrement, il a été dit qu'une liste générale des oiseaux observés en Belgique serait bientôt publiée et que les collaborateurs sont priés de la suivre pour le système et les dénominations latines. Cette liste, nous la donnons aujourd'hui en la faisant accompagner des noms français et flamands, ainsi que de quelques détails concernant le séjour des oiseaux parmi nous (1). Cette dernière partie présente nécessairement des lacunes; c'est à nos collaborateurs à la compléter, car nous n'avons pu indiquer que ce qui nous est connu. Nous attirons particulièrement l'attention sur les espèces qui visitent les bords de la mer, chez lesquelles il y a encore beaucoup à observer.

Les collaborateurs sont priés de nous adresser leurs manuscrits en janvier afin qu'ils puissent être publiés en février dans le *Bulletin du Musée royal d'histoire naturelle*.

On a observé jusqu'ici dans notre pays trois cent trente-six espèces, y compris les races ou variétés climatériques. Ces oiseaux peuvent se diviser de la manière suivante :

Oiseaux sédentaires. . . . .	70
— d'été. . . . .	57
— d'hiver . . . . .	39
— de passage régulier . . . . .	49
— de passage irrégulier ou accidentel . . . . .	105
Variétés climatériques . . . . .	16
	<hr/>
	336

Suivant leur classement nous avons :

Grimpeurs. . . . .	8
Passereaux. . . . .	139
Pigeons. . . . .	4
Rapaces. . . . .	32
Gallinacés . . . . .	9
Échassiers . . . . .	52
Hérodians . . . . .	12
Palmipèdes. . . . .	80
	<hr/>
	336

Passons maintenant à la revue des espèces indigènes.

(1) On trouvera des figures coloriées, des descriptions complètes et tous les détails connus sur les oiseaux indigènes, dans notre grand ouvrage en cours de publication et intitulé : *Faune illustrée des Vertébrés de Belgique*, série des Oiseaux.

1<sup>re</sup> SOUS-CLASSE : GYMNOPAIDES.

Cette sous-classe comprend tous les oiseaux qui naissent nus et faibles.

## ORDRE I : GRIMPEURS.

1. CUCULUS CANORUS, Lin. — Coucou ordinaire. — *De Koekoek*.  
Commun. Arrive du 8 avril au 2 mai; émigre en août et en septembre.
2. COCCYZUS AMERICANUS, Lin. — Coucou américain. — *De Amerikaansche koekoek*.  
Pris une fois près de Bois-de-Lessines le 22 octobre 1874 (1).
3. PICUS MAJOR, Lin. — Pic épeiche. — *De Bonte specht*.  
Commun et sédentaire.
4. PICUS MEDIUS, Lin. — Pic à tête rouge. — *De Middelste bonte specht*.  
Très rare; se montre parfois dans les Ardennes.
5. PICUS MINOR, Lin. — Pic épeichette. — *De Kleine bonte specht*.  
Rare, de passage irrégulier.
6. GECINUS VIRIDIS, Lin. — Pic vert. — *De Groene specht*.  
Commun et sédentaire.
7. GECINUS CANUS, Gm. — Pic à tête cendrée. — *De Kleine groene specht*.  
Très rare. Se montre accidentellement dans les Ardennes; mâle et femelle ont été pris aux environs de Bruxelles en septembre 1883 et un autre individu a été pris, également près de Bruxelles, en mars 1884.
8. YUNX TORQUILLA, Lin. — Torcol verticille. — *De Draaihals*.  
Assez rare. Arrive à la fin d'avril ou au commencement de mai, émigre en septembre.

## ORDRE II : PASSEREAUX.

1<sup>o</sup> Anisodactyles.

9. CORACIAS GARRULA, Lin. — Rollier commun. — *De Scharrelaar*.  
Se montre accidentellement de loin en loin, mais on ne connaît que quatre ou cinq captures. Il a été pris près de Namur; dans les parties boisées des bords de l'Ourthe, et un individu a été capturé près de Bruxelles en 1872 ou 1873.
10. MEROPS APIASTER, Lin. — Guêpier vulgaire. — *De Gewoone wespeneter*.  
Un individu a été pris près de Dinant; trois autres ont été vus près de Tongres le 23 mai 1856, dont un fut abattu; enfin, le 6 mai 1871, une petite troupe de six sujets fut observée près de Louvain et un chasseur en tua quatre.
11. UPUPA EPOPS, Lin. — Huppe vulgaire. — *De Hop*.  
Peu commune. Arrive du 6 au 15 avril, émigre entre le 18 et le 30 août.

(1) Voy. A. DUBOIS, dans le *Bull. de l'Acad. roy. de Belg.*, t. XXXIX, p. 40 (1875).

12. *ALCEDO ISPIDA*, Lin. — Martin-pêcheur. — *De Ijsvogel*.  
Commun et sédentaire.
13. *CAPRIMULGUS EUROPÆUS*, Lin. — Engoulevent vulgaire. — *De Dwaasvogel*.  
Commun. Arrive à la fin d'avril ou en mai, émigre à la fin de septembre ou au commencement d'octobre.
14. *CYPSELUS APUS*, Lin. — Martinet noir. — *De Steenzwaluw*.  
Commun. Revient du 10 avril au 5 mai, émigre entre le 20 juillet et le 20 août.

2<sup>o</sup> *Chanteurs.*

15. *TURDUS MERULA*, Lin. — Merle noir. — *De Zwarte lijster*.  
Commun. Sédentaire et de passage.
16. *TURDUS TORQUATUS*, Lin. — Merle à plastron. — *De Beflijster*.  
De passage du 10 au 20 avril et en octobre à partir du 6; paraît avoir niché en 1884 près de Wavre, où l'on a trouvé des jeunes.
17. *TURDUS ATRIGULARIS*, Tem. — Merle à gorge noire. — *De Zwartkeel lijster*.  
Un jeune a été pris près de Namur en 1844.
18. *TURDUS SIBIRICUS*, Pall. — Merle sibérien. — *De Siberische lijster*.  
Un jeune mâle a été pris en septembre 1877 près de Neufchâteau (1).
19. *TURDUS VARIUS*, Pall. — Grive dorée. — *De Goudlijster*.  
A été prise, à notre connaissance, six fois en Belgique; la dernière capture a été faite près de Termonde en octobre 1870.
20. *TURDUS VISCIVORUS*, Lin. — Grive draine. — *De Grootte lijster*.  
Commune et sédentaire; la plupart arrivent cependant en octobre pour émigrer en mars ou en avril.
21. *TURDUS PILARIS*, Lin. — Grive litorne. — *De Kramsvogel*.  
Commune à son double passage en octobre et novembre et en mars ou avril; un petit nombre hiverne dans le pays.
22. *TURDUS FUSCATUS*, Pall. — Grives à ailes rousses. — *De Rosvleugellijster*.  
Cette espèce n'a été prise que deux ou trois fois en Belgique, dont une fois près de Namur.
23. *TURDUS ILIACUS*, Lin. — Grive mauvis. — *De Koperwiek*.  
De passage régulier en octobre et en mars.
24. *TURDUS MUSICUS*, Lin. — Grive chanteuse. — *De Zanglijster*.  
Sédentaire et de passage; passe en très grand nombre du 25 septembre au 20 novembre, et au printemps du 11 mars au 12 avril.
25. *TURDUS SWAINSONI* var. *USTULATUS*, Nutt. — Grive de Swainson. — *De Swainson's lijster*.  
Cette espèce américaine a été prise une fois près de Namur en octobre 1847.
26. *TURDUS OBSCURUS*, Gm. (*pallidus*, Tem.). — Grive pâle. — *De Vale lijster*.  
Prise deux fois aux environs de Namur.

(1) Voy. A. DUBOIS, dans le *Bull. de l'Acad. roy. de Belg.*, t. XLVII, p. 827 (1879).



27. *MONTICOLA SAXATILIS*, Briss. — Pétrrocincle de roche. — *De Rotslijster*.  
Rare et de passage accidentel. Il paraît qu'il niche quelquefois dans le Luxembourg belge.
28. *MONTICOLA CYANA*, Lin. — Pétrrocincle bleu. — *De Blaauwe rotslijster*.  
Une seule capture connue dans le pays, aux environs de Couvin en septembre 1877.
29. *SAXICOLA CENANTHE*, Lin. — Motteux cendré. — *De Gewone tapuit*.  
Assez commun. Arrive du 7 au 12 avril, émigre du 11 au 26 août.
30. *PRATINCOLA RUBETRA*, Lin. — Traquet tarier. — *Het Paapje*.  
Commun. Arrive du 7 au 20 avril, émigre en septembre.
31. *PRATINCOLA RUBICOLA*, Lin. — Traquet rubicole. — *De Roodborst-tapuit*.  
Sédentaire et migrateur. Arrive du 17 mars au 20 avril, émigre en octobre; hiverne en petit nombre dans le pays.
32. *RUTICILLA PHENICURA*, Lin. — Rouge-queue de muraille. — *Het Gekraagde roodstaartje*.  
Très commun. Arrive du 22 mars au 2 mai, émigre en octobre.
33. *RUTICILLA TITYS*, Scop. — Rouge-queue titys. — *De Zwarte roodstaart*.  
Très commun. Arrive du 13 mars au 15 avril, émigre en octobre.
34. *RUTICILLA CÆRULECULA*, Pall. (*suecica*, L. part.).  
Gorge bleue à tache rousse. De passage très accidentel en été.
35. *RUTICILLA CÆRULECULA* var. *CYANECULA*, Wolf. — Gorge bleue. — *Het Blaauwborstje*.  
Gorge bleue à tache blanche. Assez rare; arrive en avril, émigre en septembre.
36. *ERITHACUS RUBECULA*, Lin. — Rouge-gorge. — *Het Roodborstje*.  
Très commun et sédentaire.
37. *ERITHACUS LUSCINIA*, Lin. — Rossignol. — *De Nachtegaal*.  
Commun. Arrive du 6 au 15 avril, émigre en septembre.
38. *ACCENTOR COLLARIS*, Scop. (*alpinus*, Gm.). — Accenteur des Alpes. — *De Alpen winterzanger*.  
De passage très accidentel; un individu a été pris près de Bruxelles en 1884.
39. *ACCENTOR MODULARIS*, Lin. — Accenteur mouchet. — *De Bastaard-nachtegaal*.  
Très commun et sédentaire.
40. *SYLVIA ATRICAPILLA*, Lin. — Fauvette à tête noire. — *De Zwartkop*.  
Commune. Arrive du 4 au 22 avril, émigre en octobre.
41. *SYLVIA HORTENSIS*, Lin. — Fauvette des jardins. — *De Tuinfluiter*.  
Également commune. Arrive entre le 18 et le 27 avril, émigre en septembre.
42. *SYLVIA GARRULA*, Briss. (*curruca*, Lin.). — Fauvette babillarde. — *De Braamsluiper*.  
Commune. Revient entre le 18 avril et le 2 mai, émigre en septembre.
43. *SYLVIA CINEREA*, Briss. — Fauvette grisette. — *De Grasmusch*.  
Commune. Arrive du 19 au 25 avril, émigre en septembre.
44. *HYPOLAIS ICTERINA*, Vieill. — Hypolais contrefaisant. — *De Spotvogel*.  
Commun. Revient du 5 au 13 mai, émigre en septembre.

45. *HYPOLAIS POLYGLOTTA*, Vieill. — Hypolais polyglotte. — *De Kortvleugelige spotvogel*.  
Ne se montre que très accidentellement dans le pays.
46. *ACROCEPHALUS AQUATICUS*, Gm. — Rousserolle aquatique. — *De Water-rietzanger*.  
Rare et de passage irrégulier en été, mais il paraît qu'on la voit chaque année dans les environs de Hasselt.
47. *ACROCEPHALUS SCHÆNOBÆNUS*, Lin. (*phragmitis*, Bechst.). — Rousserolle phragmite. — *De Rietzanger*.  
Assez commune. Arrive du 5 au 15 avril, émigre en septembre.
48. *ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS*, Briss. 1760; Lin. 1766 (*turdoïdes*, Mey.). — Rousserolle turdoïde. — *De Karekiet*.  
Assez abondante. Revient entre le 24 avril et le 7 mai, émigre en septembre.
49. *ACROCEPHALUS PALUSTRIS*, Bechst. — Rousserolle des marais. — *De Bosch-rietzanger*.  
Assez commune. Arrive du 9 au 27 mai, émigre en septembre.
50. *ACROCEPHALUS STREPERUS*, Vieill. (*arundinacea*, Light. nec Lin.). — Rousserolle des roseaux. — *De Kleine karekiet*.  
Plus ou moins abondante suivant les localités, assez commune près d'Anvers. Revient entre le 30 avril et le 16 mai, émigre en septembre.
51. *LOCUSTELLA LUSCINOIDES*, Savi. — Rousserolle luscinoïde. — *De Nachtegaal-rietzanger*.  
Ne se montre que très accidentellement dans le pays.
52. *LOCUSTELLA NÆVIA*, Briss. — Rousserolle tachetée. — *De Sprinkhaan-rietzanger*.  
Ne se montre aussi que très accidentellement.
53. *PHYLLOSCOPUS SIBILATRIX*, Bechst. — Pouillot siffleur. — *De Fluiter*.  
Commun. Arrive du 10 au 22 avril, émigre au commencement de septembre.
54. *PHYLLOSCOPUS TROCHILUS*, Lin. — Pouillot fitis. — *De Fitis*.  
Commun. Arrive entre le 19 mars et le 6 avril, émigre en septembre.
55. *PHYLLOSCOPUS RUFUS*, Bechst. — Pouillot vélocé. — *De Tjif-tjaf*.  
Tout aussi commun. Arrive du 15 mars au 13 avril, émigre fin août.
56. *REGULUS CRISTATUS*, Koch. — Roitelet huppé. — *Het Goudhaantje*.  
Assez commun. Sédentaire et de passage.
57. *REGULUS IGNICAPILLUS*, Tem. — Roitelet tête de feu. — *Het Vuur-goudhaantje*.  
Oiseau d'hiver nichant peut-être dans certaines forêts du pays.
58. *TROGLODYTES PARVULUS*, Koch. — Troglodyte mignon. — *De Winterkoning*.  
Commun et sédentaire.
59. *CERTHIA FAMILIARIS*, Lin. — Grimpereau familier. — *Het Boomkruipertje*.  
Abondant et sédentaire.
60. *TICHODROMA MURARIA*, Lin. — Tichodrome échelette. — *De Roode murenlooper*.  
Très rare et de passage accidentel.
61. *SITTA EUROPEA* var. *CÆSIA*, Mey. et W. — Sittelle torche-pot. — *De Boomklever*.  
Assez commune et sédentaire.

62. CINCLUS AQUATICUS, Bechst. — Cincle d'eau. — *De Waterspreeuw*.  
Sédentaire mais peu abondant.
63. MOTACILLA CINEREA, Briss. (*alba*, Lin.). — Hoche-queue gris. — *De Griijze kwikstaart*.  
Sédentaire et de passage; arrive en grand nombre du 20 février au 17 mars et émigre en partie en octobre.
64. MOTACILLA CINEREA *var.* LUGUBRIS, Tem. (*Yarrellii*, Gould).  
De passage accidentel.
65. MOTACILLA BOARULA, Lin. 1771 (*melanope*, Pall. 1776). — Hoche-queue boarule. — *De Grootte gele kwikstaart*.  
Sédentaire mais peu commun.
66. MOTACILLA FLAVA, Lin. — Bergeronnette printanière. — *De Gele kwikstaart*.  
Commune. Arrive du 16 mars au 13 avril, émigre dans la première quinzaine de septembre.
67. ? MOTACILLA FLAVA *var.* MELANOCEPHALA, Licht.  
Cette variété aurait été prise dans le pays d'après M. de Selys-Longchamps, mais il est probable que l'individu capturé se rapporte au
68. MOTACILLA FLAVA *var.* CINEREOCAPILLA, Savi.  
De passage accidentel.
69. MOTACILLA FLAVA *var.* FLAVEOLA, Tem. 1835 (*Rayi*, Bp. 1838).  
Se montre très accidentellement dans le pays.
70. ANTHUS SPINOLETTA, Lin. (*aquaticus*, Bechst.). — Pipit aquatique. — *De Waterpieper*.  
Peu commun; apparaît en octobre et en novembre, émigre en mars.
71. ANTHUS SPINOLETTA *var.* OBSCURA, Lath.  
Se montre irrégulièrement sur nos côtes maritimes au printemps et en automne.
72. ANTHUS PRATENSIS, Briss. — Pipi des prés. — *De Graspieper*.  
Arrive du 17 mars au 14 avril, émigre en octobre. Commun aux époques des passages, un petit nombre seulement niche dans le pays.
73. ANTHUS CERVINUS, Pall. — Pipi gorge-rousse. — *De Roskeelige graspieper*.  
Très rare; deux ou trois individus seulement ont été pris en Belgique.
74. ANTHUS ARBOREUS, Briss. — Pipi des arbres. — *De Boompieper*.  
Commun. Arrive du 24 mars au 12 avril, émigre entre le 11 août et le 12 septembre.
75. ANTHUS CAMPESTRIS, Briss. — Pipi des champs. — *De Duinpieper*.  
Assez rare. Passe par petites troupes en avril et en septembre; je crois que quelques couples nichent dans le pays.
76. ANTHUS RICHARDI, Vieill. — Pipi Richard. — *De Grootte pieper*.  
Très rare et de passage accidentel.
77. ALAUDA ARVENSIS, Lin. — Alouette des champs. — *De Leeuwerik*.  
Commune et sédentaire.
78. ALAUDA ARBOREA, Lin. — Alouette des bois ou lulu. — *De Boomleeuwerik*.  
Commune et sédentaire. Passe en grand nombre en mars et en octobre.

79. GALERIDA CRISTATA, Lin. — Cochevis huppé. — *De Kuifleeuwerik*.  
Rare en hiver, peu commun en été, mais niche aux environs de Bruxelles et dans les dunes. De passage irrégulier en octobre.
80. OTOCORIS ALPESTRIS, Lin. — Alouette alpine. — *De Bergleeuwerik*.  
Très rare; on en prend tous les deux ou trois ans en hiver.
81. CALANDRELLA BRACHYDACTYLA, Leisl. — Calandrelle brachydactyle. — *De Kleine kalander-leeuwerik*.  
Se montre accidentellement de loin en loin.
82. MELANOCORYPHA CALANDRA, Lin. — Calandre à taches noires. — *De Kalander-leeuwerik*.  
Un individu a été capturé près de Bruxelles en octobre 1854; deux autres ont été pris au filet, en 1882, avec des alouettes et également près de Bruxelles.
83. MELANOCORYPHA SIBIRICA, Gm. — Calandre sibérienne. — *De Siberische kalander-leeuwerik*.  
Pris deux fois seulement en Belgique : près de Liège en 1855 et près de Namur en 1870.
84. PARUS MAJOR, Lin. — Mésange charbonnière. — *De Koolmees*.  
Commune et sédentaire.
85. PARUS ATER, Lin. — Mésange noire. — *De Mastmees*.  
Arrive en octobre et émigre en février; niche en petit nombre dans le pays.
86. PARUS CÆRULEUS, Lin. — Mésange bleue. — *De Pimpelmees*.  
Commune et sédentaire.
87. PARUS CÆRULEUS *var.* PLESKEI, Cab.  
Cette rare variété a été prise au trébuchet dans un jardin à Liège en décembre 1878, suivant M. le baron de Selys-Longchamps.
88. PARUS CRISTATUS, Lin. — Mésange huppée. — *De Kuifmees*.  
Assez rare, mais sédentaire.
89. PARUS PALUSTRIS, Lin. — Mésange nonnette. — *De Zwartkopmees*.  
Commune et sédentaire.
90. ACREDULA CAUDATA, Lin. — Mésange à longue queue. — *De Staartmees*.  
Se montre en petit nombre en hiver (1).
91. ACREDULA CAUDATA *var.* LONGICAUDA, Briss. (*rosea*, Blyth).  
Très commune et sédentaire.
92. PANURUS BARBATUS, Briss. (*biarmicus*, Lin.). — Mésange à moustaches. — *De Baardmees*.  
Très rare; se montre quelquefois dans les marais des Flandres et de la province d'Anvers, où elle nichait jadis régulièrement.
93. LANIUS EXCUBITOR, Lin. — Pie-grièche grise. — *De Klapekster, Steenekster*.  
Assez commune et sédentaire.

(1) La Mésange à longue queue présente deux variétés parfaitement distinctes : le type *caudatus* de Linné a la tête complètement blanche et ne se montre en Belgique qu'en hiver; la variété *Longicauda* de Brisson diffère de la forme précédente par une large bande noire située au-dessus des yeux et allant se perdre dans le noir du dos. (Voy. A. Dubois, *Faune ill. Vert. de Belg.*, I, p. 444, pl. CV et CVb.)

94. *LANIUS EXCUBITOR* var. MAJOR, Pall. (1).  
M. de Selys-Longchamps possède un spécimen de cette variété pris près de Liège pendant l'hiver de 1829; M. A. Croegaert me signale une seconde capture faite près d'Anvers en novembre 1884.
95. *LANIUS MINOR*, Gm. — Pie-grièche d'Italie. — *De Kleine klaauwier*.  
Prise une fois près de Bruxelles en 1845; plusieurs captures ont été faites, dans ces dernières années, près de Bernissart.
96. *LANIUS COLLURIO*, Lin. — Pie-grièche écorcheur. — *De Graauwe klaauwier*.  
Commune. Arrive à la fin d'avril, émigre en octobre.
97. *LANIUS RUFUS*, Briss. — Pie-grièche rousse. — *De Roodkoppige klaauwier*.  
Également commune; revient en avril et nous quitte en octobre.
98. *ORIOIUS GALBULA*, Lin. — Lorient jaune. — *De Wielwaal*.  
Très commun. Se montre parfois dès le 3 avril et nous quitte en septembre.
99. *BOMBYCILLA BOHEMICA*, Briss. (*Ampelis garrula*, Lin.). — Jaseur de Bohême. — *De Pestvogel*.  
Se montre accidentellement en automne et en hiver, et alors parfois en très grand nombre.
100. *MUSCICAPA NIGRA*, Briss. — Gobe-mouche noir. — *De Zwartgraauwe vliegen-vanger*.  
Peu commun. Passe du 22 avril au 18 mai et repasse en septembre; un petit nombre niche dans le pays.
101. *MUSCICAPA COLLARIS*, Bechst. — Gobe-mouche à collier. — *De Witgehalsde vliegenvanger*.  
Rare, mais on en prend chaque été; niche parfois dans la forêt de Soignes.
102. *MUSCICAPA GRISOLA*, Lin. — Gobe-mouche gris. — *De Graauwe vliegenvanger*.  
Commun; arrive du 29 avril au 9 mai, émigre fin de septembre.
103. *CHELIDON URBICA*, Lin. — Hirondelle de fenêtre. — *De Huiszwaluw*.  
Commune. Arrive du 4 au 29 avril, émigre entre le 25 août et le 23 septembre; des individus isolés ont été vus jusqu'au 18 octobre.
104. *HIRUNDO DOMESTICA*, Briss. (*rustica*, Lin.). — Hirondelle de cheminée. — *De Boerenzwaluw*.  
Commune. Revient entre le 2 et le 10 avril, émigre entre le 21 août et le 29 septembre. Des individus isolés ont été observés jusqu'au 20 octobre (2).
105. *COTYLE RIPARIA*, Lin. — Hirondelle de rivage. — *De Oeverzwaluw*.  
Commune. Arrive à partir du 28 mars jusqu'au 11 avril, émigre au commencement de septembre.
106. *CORVUS CORAX*, Lin. — Corbeau ordinaire. — *De Raaf*.  
Sédentaire mais peu commun; habite particulièrement les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg.

(1) Diffère du vrai *excubitor* par l'absence de miroir blanc sur les rémiges secondaires.

(2) On a remarqué en 1866, lors de l'épidémie du choléra, que les hirondelles abandonnaient complètement les localités envahies, pour se rendre dans celles épargnées par l'épidémie.



107. *CORVUS CORONE*, Lin. — Corneille noire. — *De Kraai*.  
Très commune et sédentaire.
108. *CORVUS CINEREUS*, Briss. (*cornix*, Lin.). — Corneille mantelée. — *De Bonte kraai*.  
Commune en hiver. Apparaît du 26 septembre au 19 octobre, émigre du 15 mars au 10 avril.
109. *CORVUS FRUGILEGUS*, Briss. — Corneille freux. — *De Roek*.  
Sédentaire et de passage; passe en grand nombre en octobre.
110. *CORVUS MONEDULA*, Lin. — Choucas des clochers. — *De Kaauw*.  
Commun et sédentaire.
111. *PICA CAUDATA*, Lin. — Pie ordinaire. — *De Ekster*.  
Très commune et sédentaire.
112. *GARRULUS GLANDARIUS*, Lin. — Geai commun. — *De Vlaamsche gaai*.  
Commun et sédentaire.
113. *NUCIFRAGA CARYOCATACTES*, Lin. — Casse-noix. — *De Notenkraker*.  
Se montre parfois en Belgique lors des hivers rigoureux et toujours par troupes.
114. *GRACULUS EREMITA*, Lin. — Crave ordinaire. — *De Steenkraai*.  
Se montre très accidentellement dans les rochers des bords de la Meuse, mais on ne connaît que deux ou trois captures.
115. *PASTOR ROSEUS*, Lin. — Martin roselin. — *De Rose spreeuw*.  
De passage très accidentel. Un individu a été pris près de Tournai en juillet 1837, un autre a été signalé près d'Anvers; plus récemment, en 1882, un jeune a été tué près de Bruxelles, et le 14 novembre 1884, un autre jeune a été capturé à Ciergnon-lez-Dinant.
116. *STURNUS VULGARIS*, Lin. — Étourneau commun. — *De Spreeuw*.  
Commun et en partie sédentaire.
117. *PLECTROPHANES LAPPONICA*, Lin. — Plectrophane montain. — *De Ijsgors*.  
Très rare, mais on en prend presque chaque hiver près d'Anvers.
118. *PLECTROPHANES NIVALIS*, Lin. — Plectrophane de neige. — *De Sneeuwgor*.  
Commun sur nos côtes maritimes pendant les hivers rigoureux et on l'observe en plus ou moins grand nombre presque chaque hiver, mais très rarement, à l'intérieur du pays.
119. *MILIARIA EUROPEA*, Swains. — Bruant proyer. — *De Graauwe gors*.  
En partie sédentaire; passe en avril et en octobre.
120. *EMBERIZA CITRINELLA*, Lin. — Bruant jaune. — *De Geelgors*.  
Commun et sédentaire.
121. *EMBERIZA CIRCUS*, Lin. — Bruant zizi. — *De Cirlgors*.  
Très rare; on le prend parfois aux environs de Namur.
122. *EMBERIZA CIA*, Lin. — Bruant fou. — *De Grijze gors*.  
Comme le précédent; un individu a été pris aux environs de Bruxelles.
123. *EMBERIZA HORTULANA*, Lin. — Bruant ortolan. — *De Ortolaan*.  
Commun; arrive du 14 au 22 avril, émigre en septembre.



124. *EMBERIZA SCHÆNICLUS*, Lin. — Bruant des roseaux. — *De Rietgors*.  
Arrive vers le 15 avril, émigre en octobre; observé en 1885 près d'Anvers dès le 9 mars.
125. *EMBERIZA PUSILLA*, Pall. — Bruant nain. — *De Dwerggors*.  
Pris une fois au Kiel près d'Anvers le 8 octobre 1876 et une fois près de Wyneghem en octobre 1883.
126. *PASSER DOMESTICUS*, Briss. — Moineau domestique. — *De Huismusch*.  
Très commun et sédentaire.
127. *PASSER MONTANUS*, Briss. — Moineau friquet. — *De Boommusch*.  
Commun et sédentaire.
128. *PETRONIA STULTA*, Briss. (*Fringilla petronia*, Lin.). — Moineau soulcie. — *De Rotsmusch*.  
De passage très accidentel; la dernière capture a été faite aux environs d'Alost vers 1876 ou 1877.
129. *LIGURINUS CHLORIS*, Lin. — Verdier ordinaire. — *De Groenling*.  
Commun et sédentaire.
130. *FRINGILLA CŒLEBS*, Lin. — Pinson ordinaire. — *De Vink*.  
Commun et sédentaire.
131. *FRINGILLA MONTIFRINGILLA*, Lin. — Pinson d'Ardenne. — *De Kweeker*.  
Assez commun en hiver, arrive du 11 au 21 octobre, émigre en février ou mars.
132. *SERINUS HORTULANUS*, Koch. — Serin cini. — *Het Geel sijsje*.  
Très rare et de passage accidentel.
133. *CARPODACUS ERYTHRINUS*, Pall. — Carpodaque cramoyse. — *De Rooskleurige goudvink*.  
Se montre très accidentellement en hiver; une capture a été faite près de Tournai.
134. *CANNABINA LINOTA*, Gm. — Linotte ordinaire. — *Het Kneutje*.  
Sédentaire, mais peu commune en dehors de l'époque des passages; niche dans les parties montagneuses et boisées.
135. *CANNABINA FLAVIROSTRIS*, Lin. — Linotte de montagnes. — *De Steenkneuter*.  
Assez rare; arrive régulièrement en hiver dans certaines localités, surtout dans le nord de la province d'Anvers.
136. *LINARIA BOREALIS*, Vieill. (*Fringilla linaria*, Lin.). — Sizerin boréal. — *De Vlasvink*.  
Arrive irrégulièrement, et souvent par bandes énormes, au commencement de novembre; émigre vers la fin de février.
137. *LINARIA BOREALIS* var. *RUFESCENS*, Vieill. — *Het Barmsijsje*.  
Arrive et part avec le précédent, mais cette variété est plus commune que l'espèce type.
138. *LINARIA BOREALIS* var. *HOLBÖLLII*, Brm.  
De passage très accidentel en hiver.
139. *CARDUELIS ELEGANS*, Steph. — Chardonneret élégant. — *De Distelvink*.  
Sédentaire et assez commun.
140. *CHRYSOMITRIS SPINUS*. — Tarin ordinaire. — *Het Sijsje*.  
Commun en hiver; arrive en octobre, émigre en mars.

141. PYRRHULA EUROPÆA, Vieill. — Bouvreuil vulgaire. — *De Goudvink*.  
Sédentaire dans les Ardennes et dans les provinces de Liège et de Namur.
142. PYRRHULA EUROPÆA *var.* MAJOR, Brm. (*P. coccinea*, de Selys).  
De passage accidentel en hiver.
143. PINICOLA ENUCLEATOR, Lin. — Dur-bec des pins. — *Masten-dikbek*.  
Une seule capture connue faite en 1845.
144. LOXIA CURVIROSTRA, Lin. — Bec-croisé ordinaire. — *De Kruisbek*.  
De passage irrégulier à différentes époques de l'année, mais on ne l'a jamais vu pendant les mois de mai et de juin.
145. LOXIA PITYOPSITTACUS. — Bec-croisé perroquet. — *De Groote kruisbek*.  
Se montre très accidentellement en hiver.
146. LOXIA LEUCOPTERA *var.* BIFASCIATA, Brm. — Bec-croisé bifascié. — *De Witbandige kruisbek*.  
Quelques individus isolés ont été pris en hiver aux environs de Liège, d'Anvers et de Loenhout.
147. COCCOTHAUSTES VULGARIS, Pall. — Gros-bec ordinaire. — *De Appelvink*.  
Sédentaire, mais en général peu commun.

## ORDRE III : PIGEONS.

148. COLUMBA PALUMBUS, Briss. — Pigeon ramier. — *De Woudduif*.  
Commun et sédentaire.
149. COLUMBA LIVIA, Briss. — Colombe de roche. — *De Steenduif*.  
Très rare et de passage accidentel. C'est la souche de nos pigeons domestiques.
150. COLUMBA CENAS, Lin. — Colombe colombin. — *De Kleine boschduif*.  
De passage en automne et en mars; niche en petit nombre dans les grands bois et dans la forêt de Soignes.
151. PERISTERA TURTUR, Briss. — Tourterelle ordinaire. — *De Tortelduif*.  
Arrive par couples en avril, émigre en octobre; elle est peu commune.

2<sup>e</sup> SOUS-CLASSE : PTILOPAIDES.

Cette sous-classe comprend les oiseaux qui naissent couverts de duvet.

## ORDRE IV : RAPACES.

152. BUBO IGNAVUS, Forst. (*Strix bubo*, Lin.) — Grand-duc. — *De Groote hoornuil*.  
Sédentaire mais peu commun. Habite les rochers des bords de la Meuse et les grandes forêts de l'Ardenne.
153. ASIO OTUS, Lin. — Hibou moyen-duc. — *De Ransuil*.  
Assez commun et sédentaire.
154. ASIO ACCIPITRINUS, Pall. (*brachyotus*, Forst.). — Hibou brachyote. — *De Velduil*.  
Très commun lors de son passage, qui dure depuis la fin de septembre jusqu'en décembre; repasse en mars et en avril.
155. SCOPS GIU, Scop. — Scops d'Europe. — *De Kleine hoornuil*.  
Très rare : on ne connaît que quatre ou cinq captures.

156. STRIX FLAMMEA, Lin. — Effraie commune. — *De Kerkuil*.  
Commune et sédentaire.
157. SYRNIUM ALUCO, Lin. — Hulotte. — *De Boschuil*.  
Assez rare; habite les bois de la Campine et des Ardennes; on ne la voit que rarement ailleurs.
158. ATHENE NOCTUA, Scop. — Chevêche. — *De Steenuil*.  
Commune et sédentaire.
159. NYCTALE TENGMALMI, Gm. — Chouette Tengmalm. — *De Glatkopuil*.  
Pris une fois près d'Arlon, d'après M. de Selys-Longchamps.
160. SURNIA ULULA, Lin. — Surnie caparacoch. — *De Havikuil*.  
On ne connaît que deux captures : l'une près de Tournai en 1830, l'autre à Vieux-Heverlé en 1871.
161. CIRCUS RUFUS, Briss. — Busard des marais. — *De Bruine kuikendief*.  
En partie sédentaire, mais la plupart émigrent; commun dans les marais de la Campine et des Flandres.
162. CIRCUS CYANEUS, Lin. — Busard Saint-Martin. — *De Blaauwe kuikendief*.  
Assez rare; passe au printemps et en automne.
163. CIRCUS MACRURUS, Gm. (*pallidus*, Syk.). — Busard pâle. — *De Vale kuikendief*.  
Trois captures connues : près de Verviers en 1858 et près de Liège en 1869.
164. CIRCUS CINERACEUS, Mont. — Busard Montagu. — *De Graauwe kuikendief*.  
Peu commun; arrive au printemps et émigre en automne. Niche en Campine et dans les Polders.
165. ACCIPITER NISUS, Lin. — Épervier commun. — *De Sperwer*.  
Commun et sédentaire.
166. ASTUR PALUMBARIUS, Lin. — Autour épervier. — *De Havik*.  
Peu commun; niche dans les Ardennes et même près de Bruxelles.
167. CERCHNEIS TINNUNCULUS, Lin. — Cresserelle des clochers. — *De Krijter*.  
Commune et sédentaire.
168. FALCO ÆSALON, Briss. — Faucon émerillon. — *Het Smelleken*.  
Arrive en petit nombre en automne pour passer l'hiver en Belgique; quelques couples nichent dans le pays.
169. FALCO SUBBUTEO, Lin. — Faucon hobereau. — *De Baillet*.  
Peu commun, depuis avril jusqu'en septembre; plus abondant lors des passages en automne et au printemps.
170. FALCO COMMUNIS, Gm. — Faucon pèlerin. — *De Slechtvalk*.  
Sédentaire mais peu commun; niche dans l'Ardenne et en Campine.
171. HIEROFALCO GYRFALCO, Lin. — Faucon gerfaut. — *De Giervalk*.  
Un jeune individu a été pris près d'Anvers, suivant M. de Selys-Longchamps.
172. MILVUS REGALIS, Briss. — Milan royal. — *De Wouw*.  
Passe régulièrement en octobre et en novembre, repasse au printemps; niche parfois aux environs de Suxy.
173. MILVUS NIGER, Briss. — Milan noir. — *De Zwartbruine wouw*.  
De passage très accidentel.

174. ELANUS CÆRULEUS, Desf. — Elanion blanc. — *De Zwartvleugelvalk*.  
Pris une fois à Boitsfort en mai 1847.
175. PERNIS APIVORUS, Lin. — Bondrée apivore. — *De Wespendif*.  
Rare; se montre en été et niche parfois dans les Ardennes et dans la forêt de Mormal.
176. BUTEO VULGARIS, Leach. — Buse vulgaire. — *De Gewone buizerd*.  
Très commune et sédentaire.
177. ARCHIBUTEO LAGOPUS, Brün. — Archibuse pattue. — *De Ruigpoot-buizerd*.  
Oiseau d'hiver mais rare.
178. CIRCAETOS GALLICUS, Gm. — Circaète Jean-le-blanc. — *De Slangenarend*.  
De passage très accidentel.
179. AQUILA CHRYSÆTOS, Lin. — Aigle doré ou fauve. — *De Steen-arend*.  
De passage accidentel, mais ne niche jamais dans le pays.
180. AQUILA NÆVIA, Briss. — Aigle criard. — *De Basterd-arend*.  
Se montre accidentellement à l'époque des passages.
181. AQUILA FASCIATA, Vieill. — Aigle Bonelli. — *De Bonelli-arend*.  
Un individu a été pris, d'après M. Miedel, en septembre 1879 près de Feche-reux-Esneux.
182. HALIAETUS ALBICILLA, Lin. — Pygargue à queue blanche. — *De Zee-arend*.  
On l'observe encore assez fréquemment à l'époque des passages, surtout sur nos côtes maritimes.
183. PANDION HALIAETUS, Lin. — Balbuzard fluviatile. — *De Visch-arend*.  
Assez rare, de mars en octobre; niche parfois sur les bords de la Meuse et aux environs de Suxy.

## ORDRE V : GALLINACÉS.

184. ?LAGOPUS MUTUS, Leach. — Lagopède alpin. — *Het Sneewhoen*.  
Trois individus auraient été tués près de Jurbise il y a quelques années. N'ayant pu obtenir un de ces lagopèdes en communication pour m'assurer de son identité, il y a lieu d'admettre qu'avec doute cette espèce dans notre faune; il est fort possible que ce ne sont que des lagopèdes d'Écosse (*L. scoticus*) échappés des Ardennes, où l'on a essayé de les acclimater il y a peu d'années.
185. TETRAO UROGALLUS, Lin. — Grand coq de bruyère. — *Het Grootte korhoen*.  
A disparu de notre pays; mais il paraît qu'on le prend encore accidentellement et de loin en loin sur la frontière prussienne.
186. TETRAO TETRIX, Lin. — Tétras à queue fourchue. — *Het Korhoen*.  
Très rare, mais sédentaire aux environs de Vieil-Salm et dans certains bois du Luxembourg belge.
187. BONASIA BETULINA, Scop. — Gélinoite des coudriers. — *Het Hazelhoen*.  
Assez rare; sédentaire dans certains bois du Sud de l'Ardenne.
188. PHASIANUS COLCHICUS, Lin. — Faisan ordinaire. — *De Gewone faisant*.  
Introduit. Se multiplie dans la plupart des grands bois du pays.

189. *PERDIX RUBRA*, Briss. — Perdrix rouge. — *De Roode patrijs*.  
Une ou deux captures ont été faites dans le Hainaut.
190. *STARNA CINEREA*, Briss. — Perdrix grise. — *De Patrijs, Veldhoen*.  
Commune et sédentaire.
191. *COTURNIX COMMUNIS*, Bonn — Caille commune. — *De Kwartel*.  
Commune. Arrive à la fin d'avril ou dans les premiers jours de mai, émigre en septembre ou en octobre.
192. *SYRRHAPTES PARADOXUS*, Pall. — Syrrhapte paradoxal. — *Het Siberische zandhoen*.  
C'est une espèce asiatique dont on a pris, en 1863, six à huit individus dans différentes parties du pays.

## ORDRE VI : ÉCHASSIERS.

193. *OTIS TARDA*, Lin. — Outarde barbue. — *De Grootte trap*.  
Rare; se montre irrégulièrement en hiver.
194. *OTIS TETRAX*, Lin. — Outarde canepetière. — *De Kleine trap*.  
Visite accidentellement les parties méridionales du pays; un individu a été tué à Corroy-le-Grand en août 1884.
195. *OTIS MACQUEENI*, Gray. — Outarde de Macqueen. — *De Aziatische kraagtrap*.  
Espèce asiatique dont trois spécimens ont été pris en Belgique : près de Virton en 1842, près de Louvain en 1844 et aux environs de Bruxelles en 1845.
196. *OEDICNEMUS SCOLOPAX*, Gm. (*crepitans*, Tem.). — Oedicnème criard. — *De Griel*.  
De passage irrégulier au printemps et en automne.
197. *CHARADRIUS PLUVIALIS*, Lin. (*auratus*, Suck.). — Pluvier doré. — *De Goudplevier*.  
De passage régulier et assez commun au printemps et en automne.
198. *EUDROMIAS MORINELLUS*, Lin. — Pluvier guignard. — *De Morinelplevier*.  
Passe régulièrement sur nos côtes maritimes à la fin d'août et en septembre et repasse en mars.
199. *ÆGIALITIS HIATICULA*, Lin. — Pluvier à collier. — *De Bontbekplevier*.  
Commun sur les côtes maritimes à l'époque des passages; plus rare près des cours d'eau de l'intérieur du pays.
200. *ÆGIALITIS CURONICA*, Gm. (*minor*, M. et W.). — Pluvier gravelotte. — *De Kleine plevier*.  
Peu commun; arrive en mars et en avril, émigre en automne.
201. *ÆGIALITIS CANTIANA*, Lath. — Pluvier à demi-collier. — *De Strandplevier*.  
Commun au printemps et en automne sur les bords de la mer, très rare dans l'intérieur du pays; paraît nicher en petit nombre sur nos côtes.
202. *SQUATAROLA HELVETICA*, Lin. — Vanneau suisse. — *De Zilverplevier*.  
Commun lors des passages dans les Flandres et la province d'Anvers.
203. *VANELLUS CRISTATUS*, Lin. — Vanneau huppé. — *De Kievit*.  
Commun; niche dans les prairies marécageuses des Flandres et de la Campine.  
Il arrive en mars et en avril et émigre en automne.

204. HÆMATOPUS OSTRALEGUS, Lin. — Huîtrier pie. — *De Zeeekster*.  
Assez abondant au printemps et en automne sur nos côtes maritimes ; des individus isolés se montrent parfois près de l'Escaut et de la Meuse.
205. STREPSILAS INTERPRES, Lin. — Tourne-pierre commun. — *De Steenlooper*.  
Passe régulièrement sur nos côtes au printemps et en automne ; se montre très rarement à l'intérieur du pays.
206. ?GLAREOLA TORQUATA, Briss. — Glaréole à collier. — *De Zwaluw-plevier*.  
Aurait été pris une ou deux fois en Belgique.
207. CALIDRIS ARENARIA, Lin. — Sanderling des sables. — *De Drieteenige strandlooper*.  
De passage régulier sur nos côtes maritimes au printemps et en automne.
208. TRINGA CANUTUS, Briss. — Bécasseau maubèche. — *De Kanoet-strandlooper*.  
Commun sur nos côtes à l'époque des passages et parfois pendant une partie de l'hiver ; rare à l'intérieur du pays.
209. TRINGA MARITIMA, Brün. — Bécasseau violet. — *De Paarse-strandlooper*.  
Peu abondant, et seulement à l'époque des passages, près de la mer et des bouches de l'Escaut.
210. TRINGA SUBARQUATA, Guld. — Bécasseau cocorli. — *De Krombek-strandlooper*.  
Très commun sur nos côtes maritimes au printemps et en août et septembre.
211. TRINGA CINCLUS, Briss. — Bécasseau cincle. — *De Bonte strandlooper*.  
Très commun sur nos côtes au printemps et à la fin de l'été ; assez rare sur les eaux de l'intérieur du pays.
212. TRINGA CINCLUS *var.* SCHINZII, Bp.  
Assez rare et se montre aux mêmes époques que le précédent.
213. TRINGA MINUTA, Leisl. — Bécasseau minule. — *De Kleine strandlooper*.  
Assez rare sur nos côtes maritimes et seulement aux époques des passages au printemps et à la fin de l'été.
214. TRINGA TEMMINCKI, Leisl. — Bécasseau de Temminck. — *De Kleinste strandlooper*.  
De passage sur nos côtes aux mêmes époques que le précédent.
215. LIMICOLA PLATYRHYNCHA, Tem. — Bécasseau platyrhynque. — *De Platbek strandlooper*.  
De passage accidentel sur nos côtes.
216. MACHETES PUGNAX, Briss. — Combattant querelleur. — *De Kempphaan*.  
De passage au printemps. Assez abondant dans les prairies marécageuses de la province d'Anvers et de la Campine.
217. TOTANUS GRISEUS, Briss. (*glottis*, Bechst.). — Chevalier aboyeur. — *De Groenpootige ruiter*.  
Peu commun ; passe au printemps et en août dans le voisinage de la mer et n'est alors pas rare près de l'Escaut à Anvers.
218. TOTANUS STAGNATILIS, Bechst. — Chevalier stagnatile. — *De Poel ruiter*.  
Rare et de passage irrégulier.
219. TOTANUS FUSCUS, Briss. — Chevalier brun. — *De Zwarte ruiter*.  
Commun lors des passages en avril et en août, aussi bien sur nos côtes maritimes que près des cours d'eau et dans les marais.



220. TOTANUS CALIDRIS, Lin. — Chevalier gambette. — *De Tureluur*.  
Assez commun près de la mer, des cours d'eau et dans les marais en avril et à la fin de l'été.
221. TOTANUS GLAREOLA, Lin. — Chevalier sylvain. — *De Boschruiter*.  
Rare, mais se montre régulièrement dans les marais des environs de Burght et de la Campine.
222. TOTANUS OCHROPUS, Lin. — Chevalier cul-blanc. — *Het Witgatje*.  
De passage en avril et en août et se tient alors près des eaux douces.
223. ACTITIS HYPOLEUCOS, Lin. — Guignette commune. — *De Oeverlooper*.  
Arrive dans les premiers jours de mai, émigre dans le courant du mois d'août jusqu'au 1<sup>er</sup> septembre; niche sur les îlots de l'Escaut et de la Meuse.
224. GALLINAGO MAJOR, Lin. — Grande bécassine. — *De Poelsnip*.  
Assez rare; on l'observe en mars, en avril et en automne dans les marais de la Campine et de l'Ardenne.
225. GALLINAGO GALLINULA, Lin. — Bécassine Jacquet. — *De Doover*.  
Commune dans les marais lors des passages au printemps et en automne.
226. GALLINAGO CÆLESTIS, Frenz. 1801 (*media*, Leach, 1816). — Bécassine ordinaire. — *De Watersnip*.  
Commune dans les marais lors des passages; niche dans les grandes fanges de l'Ardenne.
227. SCOLOPAX RUSTICOLA, Lin. — Bécasse ordinaire. — *De Houtsnip*.  
De passage régulier en octobre et en novembre, repasse en mars. Si l'hiver est doux, une partie hiverne dans le pays; niche dans quelques marais, surtout dans les hautes fanges de l'Ardenne, mais en petit nombre.
228. LIMOSA ÆGOCEPHALA, Lin. — Barge commune. — *De Grutto*.  
De passage régulier en mars et à la fin de l'été.
229. LIMOSA RUFÀ, Briss. — Barge rousse. — *De Rosse-grutto*.  
Assez rare; de passage sur nos côtes maritimes au printemps et en automne, se montre exceptionnellement près des eaux douces de l'intérieur du pays.
230. NUMENIUS ARQUATUS, Lin. — Courlis cendré. — *De Grootte wulp*.  
De passage régulier en mars, en avril et en automne; commun et presque sédentaire sur nos côtes maritimes, où il niche probablement.
231. NUMENIUS TENUIROSTRIS, Vieill. — Courlis à bec grêle. — *De Dunbek-wulp*.  
De passage très accidentel. Un individu a été tiré à Lillo près d'Anvers, le 5 février 1884 par M. L. van Delft.
232. NUMENIUS PHÆOPUS, Lin. — Courlis corlieu. — *De Regenwulp*.  
De passage sur nos côtes en avril, en mai et en octobre.
233. PHALAROPUS RUFESCENS, Briss. (*platyrhynchus*, Tem.). — Phalarope dentelé. — *De Rosse franjepoot*.  
Très rare. On le voit accidentellement sur nos côtes et dans les marais de la Campine.
234. PHALAROPUS CINEREUS, Briss (*hyperboreus*, Lath.). — Phalarope hyperboré. — *De Graauwe franjepoot*.  
Très rare. On l'observe accidentellement sur nos côtes lors des hivers très rigoureux.

235. *RECURVIROSTRA AVOCETTA*, Lin. — Avocette. — *De Kluit*.  
Assez rare; on l'observe parfois, à l'époque des passages, sur nos côtes et dans les marais des Flandres.
236. *HIMANTOPUS CANDIDUS*, Bonn. — Échasse ordinaire. — *De Steltkluit*.  
Très rare et de passage accidentel.
237. *RALLUS AQUATICUS*, Briss. — Râle d'eau. — *De Waterral*.  
Assez commun; arrive en mars, émigre en automne; il est possible qu'il hiverne en partie dans le pays.
238. *CREX PRATENSIS*, Bechst. — Râle de genêt. — *De Kwartelkoning*.  
Assez répandu; arrive en avril ou mai, émigre à la fin de septembre.
239. *PORZANA MARUETTA*, Leach. — Marouette tachetée. — *Het Porceleinhoentje*.  
Assez commune, arrive à la fin de mars ou en avril, émigre en septembre.
240. *PORZANA PARVA*, Scop. (*pusillus*, Bechst.). — Marouette poussin. — *Het Kleinste waterhoen*.  
Très rare; on ne la voit que de temps en temps en été.
241. *PORZANA BAILLONII*, Vieill. — Marouette Baillon. — *Het Baillon waterhoen*.  
Très rare; observée accidentellement, en été, dans les marais des Flandres et de la Campine.
242. *GALLINULA CHLOROPUS*, Lin. — Poule d'eau ordinaire. — *Het Waterhoentje*.  
Commune et sédentaire.
243. *FULICA ATRA*, Lin. — Foulque commune. — *De Meerkoet*.  
Assez commune; arrive en avril, émigre en automne.
244. *GRUS COMMUNIS*, Bechst. (1793). — Grue cendrée. — *De Kraan*.  
Passe par troupes en mars et repasse en octobre et en novembre, mais ne s'arrête que peu ou point dans le pays.

## ORDRE VII : HÉRODIENS.

245. *ARDEA CINEREA*, Briss. — Héron cendré. — *De Blaauwe reiger*.  
Commun et sédentaire.
246. *ARDEA PURPURASCENS*, Briss. (*purpurea*, Lin.). — Héron pourpré. — *De Purperreiger*.  
Très rare et de passage irrégulier.
247. *HERODIAS ALBA*, Lin. — Héron aigrette. — *De Grootte zilverreiger*.  
On ne connaît que deux captures : l'une près de Tongres, l'autre aux environs de Mons en mai 1855.
248. *HERODIAS GARZETTA*, Lin. — Héron garzette. — *De Kleine zilverreiger*.  
Très rare et on ne connaît que quelques captures, dont une près de Namur en 1857.
249. *ARDEOLA RALLOIDES*, Scop. — Héron crabier. — *De Ralreiger*.  
Très rare; il a été tué accidentellement aux environs de Tournai, de Huy, de Namur et dans les Ardennes.

250. ARDETTA MINUTA, Lin. — Héron blongios. — *De Kleine puitoor*.  
Assez rare; de passage au printemps et en automne, mais niche en petit nombre chaque année dans les Polders près d'Anvers et aux environs de Louvain.
251. BOTAURUS STELLARIS, Lin. — Butor ordinaire. — *De Roerdomp*.  
Assez commun dans les Polders et dans les marais de la Campine.
252. NYCTICORAX GRISEUS, Briss. (*europæus*, Step.). — Bihoreau gris. — *De Nachtreiger*.  
Très rare et de passage accidentel; paraît nicher quelquefois en Ardenne, où l'on a pris des jeunes.
253. PLATALEA LEUCORHODIA, Lin. — Spatule blanche. — *De Levelaar*.  
De passage régulier au printemps et en automne sur nos côtes maritimes et se montre alors souvent dans les marais des Flandres et de la province d'Anvers.
254. FALCINELLUS CASTANEUS, Briss. (*Ibis falcinellus*, Lin.). — Ibis falcinelle. — *De Ibis*.  
Très rare et accidentel.
255. CICONIA ALBA, Bechst. — Cigogne blanche. — *De Ooievaar*.  
De passage régulier en mars et avril, repasse en août; ne niche pas dans le pays.
256. CICONIA FUSCA, Briss. (*nigra*, Lin.). — Cigogne brune. — *De Zwarte ooievaar*.  
Très rare et de passage accidentel.

## ORDRE VIII : PALMIPÈDES.

257. BERNICLA LEUCOPSIS, Bechst. — Bernache à joues blanches. — *De Brandgans*.  
Se montre régulièrement sur nos côtes de novembre à mars.
258. BERNICLA BRENTA, Briss. (*torquatus*, Bechst.). — Bernache cravant. — *De Rotgans*.  
Oiseau de passage; se montre régulièrement en hiver sur nos côtes maritimes et près des bouches de l'Escaut.
259. ANSER CINEREUS, Mey. et W. — Oie cendrée. — *De Wilde gans*.  
Se montre chaque hiver dans les Polders près d'Anvers.
260. ANSER BRACHYRHYNCHUS, Bail. — Oie à bec court. — *De Kleine rietgans*.  
On l'observe accidentellement en hiver aux environs d'Anvers près de l'Escaut.
261. ANSER SYLVESTRIS, Briss. (*segetum*, Gm.). — Oie des moissons. — *De Rietgans*.  
Passe régulièrement depuis l'automne jusqu'au printemps.
262. ANSER ALBIFRONS, Scop. — Oie à front blanc. — *De Kolgans*.  
On la rencontre en hiver près des bouches de l'Escaut où elle est commune, mais elle se montre rarement dans l'intérieur du pays.
263. ANSER ALBIFRONS *var.* ERYTHROPUS, Lin. (*Temminckii*, Boie).  
Très rare et de passage accidentel.
264. CYGNUS MUSICUS, Bechst. — Cygne sauvage. — *De Wilde zwaan*.  
Rare et n'apparaît que pendant les hivers rigoureux.

265. *CYGNUS OLOR*, Gm. — Cygne tuberculé. — *De Gewone zwaan*.  
Très rare et de passage accidentel en hiver.
266. *CYGNUS MINOR*, Pall. (*Bewickii*, Yarr.). — Cygne de Bewick. — *De Kleine zwaan*.  
Très rare; on l'observe de loin en loin pendant les hivers très rigoureux.
267. *TADORNA CORNUTA*, Gm. — Canard tadorne. — *De Bergeend*.  
De passage régulier en hiver sur nos côtes maritimes, commun pendant les grands froids.
268. *SPATULA CLYPEATA*, Lin. — Canard ou Souchet spatule. — *De Slobeend*.  
De passage régulier au printemps et en automne.
269. *ANAS FERA*, Briss. (*boschas*, Lin.). — Canard sauvage. — *De Wilde eend*.  
Sédentaire; commun lors des migrations.
270. *CHAULELASMUS STREPERUS*, Lin. — Canard ridenne. — *De Kraakeend*.  
Assez commun en hiver dans les Polders.
271. *MARECA FISTULARIS*, Briss. (*penelope*, Lin.). — Canard siffleur. — *De Smient*.  
De passage en mars et en automne; assez commun en hiver dans les Polders.
272. *DAFILA LONGICAUDA*, Briss. (*acuta*, Lin.). — Canard pilet. — *De Pijlstaart*.  
Assez commun en hiver dans les Polders.
273. *QUERQUEDULA CIRCIA*, Lin. — Sarcelle d'été. — *De Zomertaling*.  
Commune lors des passages en automne et en mars; sédentaire dans certains marais.
274. *QUERQUEDULA CRECCA*, Lin. — Sarcelle d'hiver. — *De Wintertaling*.  
Passe en automne et au printemps; commune en hiver sur les étangs et les rivières.
275. *FULIGULA RUFINA*, Pall. — Morillon roussâtre. — *De Krooneend*.  
On l'observe de temps en temps dans les marais des Flandres.
276. *FULIGULA CRISTATA*, Leach. — Morillon huppé. — *De Kuifeend*.  
Très commun en hiver dans les marais des Polders et de la Campine ainsi que sur les rivières.
277. *FULIGULA MARILA*, Lin. — Morillon milouinan. — *De Toppereend*.  
Très commun en automne et en hiver sur nos côtes maritimes, rare sur les rivières de l'intérieur du pays.
278. *FULIGULA FERINA*, Lin. — Morillon milouin. — *De Tafeleend*.  
Très commun en hiver sur nos côtes et dans les marais des Polders et de la Campine.
279. *FULIGULA NYROCA*, Guld. — Morillon à iris blanc. — *De Witoogeend*.  
De passage irrégulier au printemps; paraît avoir niché à Dilsen en 1879.
280. *CLANGULA GLAUCION*, Lin. — Garrot vulgaire. — *De Brilduiker*.  
Commun lors des migrations; on le voit en hiver sur les eaux qui ne gèlent pas.
281. ? *CLANGULA HISTRIONICA*, Lin. — Garrot histrion. — *De Bonte duiker*.  
Se montre, dit-on, sur nos côtes très accidentellement et de loin en loin pendant les hivers très rigoureux.
282. *HARELDA GLACIALIS*, Lin. — Miquelon glacial. — *De Ijseend*.  
On ne l'observe sur nos côtes que pendant les hivers très rigoureux, mais il arrive alors parfois en assez grand nombre.

283. *SOMATERIA MOLLISSIMA*, Lin. — Eider commune. — *De Eidereend*.  
De passage accidentel sur nos côtes, mais seulement en hiver.
284. ? *SOMATERIA SPECTABILIS*, Lin. — Eider royale. — *De Grootte eidereend*.  
Il paraît que des jeunes de cette espèce ont été observés sur nos côtes pendant les grands froids, mais j'en doute.
285. *OIDEMIA NIGRA*, Lin. — Macreuse noire. — *De Zwarte zeeëend*.  
Commune en hiver sur nos côtes maritimes.
286. *OIDEMIA FUSCA*, Lin. — Macreuse brune. — *De Grootte zeeëend*.  
Se montre sur nos côtes au printemps et en hiver, mais en petit nombre.
287. ? *OIDEMIA PERSPICILLATA*, Lin. — Macreuse à lunettes. — *De Brillen zeeëend*.  
Paraît avoir été prise sur nos côtes.
288. *MERGUS ALBELLUS*, Lin. — Harle piette. — *Het Nonnetje*.  
Commun en hiver dans les marais des Polders et de la Campine, et se montre même sur l'Escaut et sur la Meuse.
289. *MERGUS MERGANSER*, Lin. — Harle bièvre. — *De Grootte zaagbek*.  
De passage sur nos côtes en hiver; durant les gelées on le voit souvent sur les rivières de l'intérieur du pays.
290. *MERGUS CRISTATUS*, Briss. (*serrator*, Lin.). — Harle huppé. — *De Middelste zaagbek*.  
Se montre en petit nombre, en hiver, sur nos côtes et dans les Polders.
291. *STERNA CASPIA*, Pall. — Sterne (1) tschegrava. — *De Reus-zeezwaluw*.  
Rare et de passage accidentel sur nos côtes. Un individu a été capturé près de Tournai. D'après M. Vincent un individu aurait même été tué sur l'étang du quartier de l'Est à Bruxelles le 24 juillet 1865.
292. *STERNA ANGLICA*, Mont. — Sterne hansel. — *De Lach-zeezwaluw*.  
Assez rare sur nos côtes, accidentellement sur l'Escaut.
293. *STERNA CANTIACA*, Gm. — Sterne caugek. — *De Grootte zeezwaluw*.  
Commune sur nos côtes en été.
294. *STERNA HIRUNDO*, Lin. — Sterne Pierre-garin. — *Het Vischdiefje*.  
Commune sur les bords de la mer et sur l'Escaut.
295. *STERNA DOUGALLI*, Mont. — Sterne de Dougall. — *De Dougall zeezwaluw*.  
Se montre accidentellement sur nos côtes en été.
296. *STERNA FLUVIATILIS*, Naum. — Sterne fluviale. — *De Vloed zeezwaluw*.  
Assez rare sur nos côtes et seulement en mai et en août.
297. *STERNA MINUTA*, Lin. — Sterne naine. — *De Dwerg-zeezwaluw*.  
Assez commune en été sur nos côtes et sur l'Escaut, accidentellement sur la Meuse.
298. *HYDROCHELIDON NIGRA*, Briss. — Hydrochélidon épouvantail. — *De Zwarte-zeezwaluw*.  
Assez commun, durant toute l'année, dans les marais de la Campine et se montre souvent sur l'Escaut et sur la Meuse.

1) Sternes ou Hirondelles de mer.

299. HYDROCHELIDON LEUCOPTERA, Meisn. — Hydrochélidon leucoptère. — *De Wit-vleugelige zeezwaluw*.  
On ne connaît de cette espèce qu'une ou deux captures; un individu a été tué dans un marais près de Tournai.
300. HYDROCHELIDON HYBRIDA, Pall. — Hydrochélidon moustac. — *De Graauwe zeezwaluw*.  
De passage très accidentel; pris une fois près d'Anvers.
301. ? XEMA SABINEI, Leach. — Mouette (1) de Sabine. — *De Sabine's zeemeeuw*.  
Il paraît que cette espèce a été capturée accidentellement sur nos côtes pendant un hiver rigoureux; un individu a été tué sur la Meuse près de Maestricht.
302. LARUS GLAUCUS, Brün. — Mouette bourgmestre. — *De Burgemeester*.  
Se montre accidentellement sur nos côtes en hiver.
303. LARUS LEUCOPTERUS, Faber. — Mouette leucoptère. — *De Kleine burgemeester*.  
On l'observe aussi accidentellement sur nos côtes en hiver.
304. LARUS MARINUS, Lin. — Mouette à manteau noir. — *De Mantelmeeuw*.  
Assez commune sur nos côtes pendant l'hiver, et après les tempêtes on la voit souvent sur l'Escaut jusqu'à Anvers.
305. LARUS FUSCUS, Lin. — Mouette à pieds jaunes. — *De Kleine mantelmeeuw*.  
De passage en automne et elle est alors assez commune sur nos côtes.
306. LARUS ARGENTATUS, Brün. — Mouette argentée. — *De Zilvermeeuw*.  
Commune et sédentaire sur nos côtes; se montre parfois sur l'Escaut et même sur la Meuse.
307. LARUS CANUS, Lin. — Mouette cendrée. — *De Kleine zeemeeuw*.  
Très commune sur les côtes de Flandre et sur l'Escaut.
308. LARUS RIDIBUNDUS, Lin. — Mouette rieuse. — *De Kapmeeuw*.  
Très commune sur nos côtes, dans les Polders et sur l'Escaut; on a même déjà tué de ces mouettes sur les étangs des environs de Bruxelles.
309. LARUS MINUTUS, Pall. — Mouette pygmée. — *De Dwergmeeuw*.  
Rare; se montre accidentellement sur nos côtes et sur l'Escaut.
310. RISSA TRIDACTYLA, Lin. — Mouette tridactyle. — *De Drieteenige meeuw*.  
Commune en hiver sur l'Escaut et dans les marais environnants, moins commune sur nos côtes.
311. ? PAGOPHILA EBURNEA, Lin. — Mouette sénateur. — *De Witte zeemeeuw*.  
Paraît avoir été observée sur nos côtes.
312. STERCORARIUS FUSCUS, Briss. (*catarrhactes*, Lin.). — Stercoraire brun. — *De Grootte jager*.  
Se montre très accidentellement sur nos côtes après de violentes tempêtes.
313. STERCORARIUS POMARINUS, Tem. — Stercoraire pomarin. — *De Middelste jager*.  
Se montre après les tempêtes et pénètre parfois jusqu'à l'intérieur du pays.
314. STERCORARIUS CREPIDATUS, Banks (1773), *parasiticus*, Bodd. (1783). — Stercoraire des rochers. — *De Kleine jager*.  
Se montre accidentellement sur nos côtes après les tempêtes d'automne.

(1) Mouettes ou Goélands.



315. STERCORARIUS LONGICAUDUS, Briss. (*parasiticus*, Lin.). — Stercoraire à longue queue. — *De Kleinste jager*.  
Se montre irrégulièrement sur nos côtes en hiver; un individu a été tué à Dilsen (Limbourg) en novembre 1879.
316. PROCELLARIA GLACIALIS, Lin. — Pétrel fulmar. — *De Noordsche stormvogel*.  
On l'observe accidentellement sur nos côtes en hiver après les tempêtes.
317. THALASSIDROMA PELAGICA, Lin. — Thalassidrome tempête. — *Het Stormvogeltje*.  
Se montre irrégulièrement sur nos côtes en hiver, parfois en grand nombre, et on en voit alors souvent sur l'Escaut; un individu a été pris en novembre 1878 sur la chaussée de Waterloo près de Bruxelles.
318. THALASSIDROMA LEUCORRHOA, Vieill. — Thalassidrome de Leach. — *Het Vale stormvogeltje*.  
On le voit accidentellement sur nos côtes pendant les tempêtes, et le vent le chasse alors parfois jusqu'à l'intérieur du pays, mais plus rarement que le précédent.
319. PUFFINUS ANGLORUM, Tem. — Puffin manks. — *De Noordsche pijlstormvogel*.  
Apparaît accidentellement sur nos côtes après les tempêtes d'hiver.
320. SULA BASSANA, Briss. — Fou de Bassan. — *De Jan van Gent*.  
Cet oiseau n'est pas rare en automne et en hiver, sur nos côtes et sur l'Escaut.
321. PHALACROCORAX CARBO, Lin. — Cormoran ordinaire. — *De Aalscholver*.  
Commun et sédentaire sur les côtes maritimes et près des bouches de l'Escaut; très rare sur les eaux de l'intérieur du pays.
322. PHALACROCORAX CRISTATUS, Fab. — Cormoran huppé. — *De Gekuijfte aalscholver*.  
Se montre très accidentellement sur nos côtes.
323. COLYMBUS GLACIALIS, Lin. — Plongeon glacial. — *De Ijsduiker*.  
Très rare et ne se montre sur nos côtes que pendant les hivers très rigoureux.
324. COLYMBUS ARCTICUS, Lin. — Plongeon lumme. — *De Parelduiker*.  
Encore plus rare que le précédent.
325. COLYMBUS SEPTENTRIONALIS, Lin. — Plongeon à gorge rousse. — *De Roodkelige zeeduiker*.  
Commun sur nos côtes en hiver et au printemps, de même que sur l'Escaut et dans les marais des Polders.
326. URIA GRYLLE, Lin. — Guillemot grylle. — *De Zwarte zeekoet*.  
Très rare sur nos côtes et seulement en hiver.
327. URIA TROILE, Lin. — Guillemot à capuchon. — *De Zeekoet*.  
Commun sur nos côtes en hiver.
328. URIA TROILE *var.* RHINGVIA, Brün. — Guillemot bridé.  
Peu commun.
329. MERGULUS ALLE, Lin. — Mergule nain. — *De Kleine alk*.  
On l'observe quelquefois en hiver après de fortes tempêtes, mais il est toujours rare.
330. ALCA TORDA, Lin. — Pingouin torda. — *De Alk*.  
Pas rare sur nos côtes en automne et en hiver.

331. FRATERCULA ARCTICA, Lin. — Macareux moine. — *De Papegaaiduiker*.  
Rare sur nos côtes; on l'observe seulement en hiver, surtout quand la saison est rigoureuse.
332. PODICEPS CRISTATUS, Briss. — Grèbe huppé. — *De Kuifduiker*.  
On l'observe en petit nombre en hiver, aussi bien sur nos côtes que sur l'Escaut, la Meuse et dans les marais des Flandres.
333. PODICEPS GRISEGENA, Bodd. — Grèbe jougris. — *De Roodhalsfuut*.  
Aux passages en automne et au printemps, sur l'Escaut et dans les grands marais, mais toujours assez rare.
334. PODICEPS NIGRICOLLIS, Brm. — Grèbe cornu. — *De Hoornduiker*.  
Rare; de passage irrégulier au printemps et en automne.
335. PODICEPS AURITUS, Lin. — Grèbe oreillard. — *De Geoorde fuut*.  
On l'observe accidentellement dans les grands marais des Flandres et près de l'Escaut à l'époque des passages.
336. PODICEPS FLUVIATILIS, Briss. (*minor*, Gm.). — Grèbe castagneux. — *De Dodaars*.  
Commun et sédentaire dans les marais et près des rivières.

