

BULLETIN

DU

Musée royal d'Histoire
naturelle de Belgique

Tome IX, n° 19.

Bruxelles, juin 1933.

MEDEDEELINGEN

VAN HET

Koninklijk Natuurhistorisch
Museum van België

Deel IX, n° 19.

Brussel, Juni 1933.

DEUX NOUVEAUX *ALLECULIDAE* AFRICAINS
[COL. HETEROMERES]

par M. PIC (Digoïn).

Eutrapelodes suturalis n. sp.

Angustata, nitida, griseo-holosericeo pubescens, nigra, capite toto, aut antice, thoraceque rufis, elytris testaceis, sutura nigra, pedibus testaceis.

Étroit, atténué aux extrémités, brillant, orné d'une pubescence grise soyeuse fine, noir, devant de la tête et thorax, celui-ci parfois un peu rembruni au milieu, roux, élytres testacés, étroitement noirs sur la suture, pattes testacées. Tête assez courte, densément ponctuée, yeux écartés l'un de l'autre; antennes longues et grêles, à 2^e article court, 3^e et suivants longs, dernier subacuminé au sommet; thorax un peu plus long que large, rétréci et subarqué en avant, sinué postérieurement, densément et assez finement ponctué; écusson très petit; élytres nettement plus larges que le prothorax, longs, atténués postérieurement, à stries indistinctes, finement et irrégulièrement ponctués; pattes longues avec les cuisses un peu robustes. Long. 7 mill.

Transvaal (ex FRUHSTORFER), Musée Royal d'Hist. Nat. de Belgique et coll. PIC.

Voisin des *E. gracillima* FRM., s'en distingue par la forme moins allongée, le prothorax plus rétréci en avant, les élytres avec une étroite bordure suturale noire.

Eutrapelodes scutellaris n. sp.

Elongata, postice attenuata, nitida, breve griseo pubescens, nigra, capite antice, thorace, scutello et abdomine pro parte rufis, elytris luteis, antice ad suturam nigro-metallico vittatis, vitta antice valde dilatata, postice attenuata, pedibus testaceis, femoribus piceo notatis.

Allongé, atténué postérieurement, brillant, orné d'une courte pubescence grise, noir, tête antérieurement, thorax, écusson et base de l'abdomen roux, élytres d'un jaune paille ayant, sur la suture en avant, une bande noire à reflets métalliques, très élargie à la base, atténuée en arrière, effacée postérieurement, pattes testacées avec les cuisses foncées vers leur extrémité, ou en dessus. Tête assez courte, densément ponctuée, yeux écartés l'un de l'autre; antennes grêles à la base (cassées); thorax un peu plus long que large, rétréci et subtronqué en avant, inégal en dessus, densément et ruguleusement ponctué; élytres convexes, nettement plus larges que le prothorax, longs, atténués postérieurement, finement mais nettement striés-ponctués, intervalles subconvexes, densément ponctués; dessous du corps bicolore, noir et roux; pattes assez grêles et peu longues. Long. 8 mill.

Erythrée (coll. Pic).

Par sa coloration se rapproche du précédent, mais avec une bande foncée suturale très large en avant; en diffère par le thorax inégal en dessus, les élytres nettement convexes, moins étroits et moins longs.



GOEMAERE, imprimeur du Roi, Bruxelles.