

Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. Bull. K. Belg. Inst. Nat. Wet.	Bruxelles Brussel	31-VIII-1980
52	ENTOMOLOGIE	18

**DIE DIAPRIINEN UND BELYTINEN
 AUS DEM KÖNIGLICH-BELGISCHEN INSTITUT
 FÜR NATURWISSENSCHAFTEN**
 (HYMENOPTERA PROCTOTRUPOIDEA: FAMILIE DIAPRIIDAE)
 3. und 4. BEITRAG ZUR KENNTNIS EUROPÄISCHER ZEHRWESPEN)

3. Beitrag — Die Diapriinen und Belytinen der Sammlung
 von Prof. Dr. H. R. DEBAUCHE (1904-1971) (Louvain/Löwen)

4. Beitrag — Diapriinen und Belytinen aus der allgemeinen Sammlung
 des Königlich-Belgischen Instituts für Naturwissenschaften

VON

Ingmar WALL (*)

Im Sommer 1973 erhielt ich durch die freundliche Vermittlung von Herrn Dr. P. DESSART die Diapriiden-Sammlung von Prof. DEBAUCHE aus dem Königlich-Belgischen Institut für Naturwissenschaften in Bruxelles. Ich beabsichtigte zunächst, nur einige von DEBAUCHE's Typen zu studieren, entschloss mich aber schliesslich, das gesamte Material zu überarbeiten. Die Sammlung ist auf fünf Kästen verteilt und mit insgesamt 242 Exemplaren nicht sehr umfangreich. Sie enthält hauptsächlich Diapriinen, nur wenige Belytinen. Insgesamt konnte ich 12 Gattungen mit 46 Arten ermitteln. Das von DEBAUCHE verwendete System (nach KIEFFER, 1916) habe ich in den Kästen belassen und zusätzlich sämtliche Exemplare zur besseren Auffindung numeriert. Die Sammlung wurde zwischen 1940 und 1946 zusammengetragen. Fast alle Individuen stammen aus der Umgebung von Louvain. Eine Art erwies sich als für die Wissenschaft neu: *Trichopria debauchi* sp. nov. [= *T. manevali* DEBAUCHE, in litt./TYPE (?)].

* Anschrift des Verfassers: BRD. 7769 Mühlingen-2/Hegau 8, Sonnhalde.

Über Hubert Robert DEBAUCHE, der am 20. Oktober 1971 in Loches (Frankreich) im Alter von 66 Jahren verstarb, liegt ein Nachruf von seinem Nachfolger Prof. Philippe LEBRUN (Louvain-La-Neuve) vor (Rev. Écol. Biol. Sol., 1972, 9 (2) : 141-144), der auch seine wichtigsten Publikationen bringt. Und hier ist Prof. DEBAUCHE durch seine Arbeiten über die *Trichogrammatiden* (1942), *Scelioniden* (1947) und besonders die *Mymariden* (1948) der belgischen Fauna als Hymenopteren-Spezialist hervorgetreten.

Bei der Bestimmung schwieriger Arten half mir Herr Dr. W. HELLÉN (Helsinki), indem er mir eine kleine Kollektion mit Diapriiden leihweise überliess, wofür ich ihm an dieser Stelle herzlich danken möchte.

I. DIAPRIINAE

1. Gattung : *Trichopria* ASHMEAD (1893)

[=*Phaenopria* ASHM., 1893; *Planopria* KIEFF., 1910;
Ashmeadopria KIEFF., 1911; ? *Monelata* FÖRST., 1856]

1. *T. (Ashmeadopria) carinata* THOMS. (1858) (= ? *lignicola* KIEFF., 1911; ? *sociata* KIEFF., 1905)

Nr. 1, ♀ : Godinne (dazu Präparat Nr. 16/1947), 25.V.1942.

Nr. 2, ♀ : Vossem (Louvain), 18.V.1941.

Nr. 7, ♀ : Vossem (Louvain), 26.IV.1946 (*Ashmeadopria sociata* KIEFF., 1905).

Nr. 19, ♂ : Eegenhoven (Louvain), 4.IX.1941 (*Ashmeadopria stilata* KIEFF., 1911).

Nr. 20, ♂ : Forêt de Loverval, 14.VIII.1941 (*Ashmeadopria « stillata »* KIEFF., 1911).

Nr. 24, ♀ : Tervueren, 24.III.1945 (*Ashmeadopria lignicola* KIEFF., 1911; det. 1946).

Nr. 25, ♂ : Héverlé (Louvain), 19.IX.1941 (*Ashmeadopria ?armata* MANEVAL).

N. 77 + 79, 2 ♂ : Forêt de Loverval, 10.VIII.1941 (*T. (Planopria) morio morio* THOMS., 1858).

Nr. 80, ♂ : Kessel-Loo (Louvain), 27.VIII.1945 (*T. (Planopria) morio morio* THOMS., 1858).

Nr. 81, ♂ : Vossem (Louvain), 21.VI.1944 (*T. (Planopria) morio* THOMS., 1858).

2. *T. (Ashmeadopria) debauchei* nov. spec.

Nr. 3, ♀ :

H O L O T Y P E : Héverlé (Louvain), 9.X.1942 (*Ashmeadopria manevali* DEBAUCHE in litt./Type ») (in coll. Inst. Roy. Sci. Nat. Bruxelles).

P A R A T Y P E N in coll. mea (M. BONESS leg.; Rheinland).
 A L L O T Y P E (δ) in coll. mea (HOLO-ALLOTYPE) (M.
 BONESS leg.; Rheinland).

Nr. 82, δ : Vossem (Louvain), 21.VI.1944 (*T. (Planopria) morio*
 THOMS., 1858).

Beschreibung :

♀ : Kopf und Abdomen dunkel rotbraun, Thorax und Petiolus heller rotbraun. Beine und Fühlerglieder 1 bis 8 oder 9 vollständig hellgelb, nur der Scapus an beiden Enden schwach gebräunt. Fühlerkeule 4-gliedrig. Das 1. Glied der Keule ist das kleinste und in der Färbung hellste, deutlich dicker als das längliche 8. Fühlerglied und rundlich geformt. Glied 10 grösser als 9 und sehr deutlich kleiner als 11, dunkler als Glied 9. Glieder 11 und 12 auffallend grösser als 10 und schwarz gefärbt. Form und Farbe der Antenne sind typisch und sehr konstant. — Kopf (von oben betrachtet) etwas quer, so breit wie der Thorax an seiner breitesten Stelle, seitlich gesehen annähernd quadratisch. Scutellum auf seiner ganzen Länge mitten fein gekielt; der Kiel erstreckt sich mehr oder weniger in die Scutellargrube, diese ist gross und breit. Abdomen im letzten Drittel langsam verengt und fein zugespitzt. — Länge : 1,5-2 mm.

♂ : Färbung wie beim ♀. Antennen gelb, der verdickte Mittelteil der Fühlerglieder ist im Ansatzbereich der Wirtel jeweils etwas dunkler. Wirtelhaare lang, etwa doppelt so lang wie die Fühlerglieder, an denen sie sitzen. Glied 4 proximal ausgerandet, am Distalende der Ausrandung mit Zahn. Antennen etwa so lang wie der Körper; die Flügel den Körper etwa um die Länge des Abdomens überragend. Scutellarkiel manchmal undeutlich.

Anmerkung : Ich besitze eine ganze Reihe von Exemplaren dieser Art. Von Dr. M. BONESS (Bergisch-Neukirchen/Rheinland) wurde sie mehrfach aus Puparien von *Scaptomyza sp.* (Dipt. Drosophilidae) gezogen.

3. *T. (Ashmeadopria) verticillata* LATREILLE (1805) [A. ? *variipes* KIEFF., 1911 (?), *P. ? thomsoni* KIEFF., 1911 (δ)]

Nr. 4, ♀ : Eeghenhoven (Louvain), 4.IX.1941 (*Ashmeadopria variipes* KIEFF., 1911).

Nr. 8/9, δ / ♀ : Eeghenhoven (Louvain), 4.IX.1941 (*Ashmeadopria verticillata* LATR., 1805).

Nr. 10 + 11, 2 δ : Forêt de Loverval, 10.VIII.1941 (*Ashmeadopria verticillata* LATR., 1805).

Nr. 12, δ : Héverlé (Louvain), 19.IV.1941 (*Ashmeadopria verticillata* LATR., 1805).

Nr. 13, δ : Forêt de Loverval, 14.VIII.1941 (*Ashmeadopria verticillata* LATR., 1805).

- Nr. 14, 15, 16, 3 ♀ : Vossem (Louvain), 18.V.1941 (*Ashmeadopria verticillata* LATR., 1805).
- Nr. 17, ♀ : Héverlé (Louvain), 1.VI.1941 (*Ashmeadopria verticillata* LATR., 1805).
- Nr. 18, ♀ : Tervueren, 16.V.1945.
- Nr. 71, 72, 73, 3 ♂ : Héverlé (Louvain), 31. + 14.VIII.1942 [T. (*Planopria*) *thomsoni* KIEFF., 1911].
- Nr. 75, ♂ : Héverlé (Louvain), 8.VIII.1942 [T. (*Planopria*) *thomsoni* KIEFF., 1911].
- Nr. 74 + 76, 2 ♂ : Forêt de Loverval, 14.VIII.1941 [T. (*Planopria*) *thomsoni* KIEFF., 1911].
4. T. (*Ashmeadopria*) *oogaster* THOMSON (1858) (A. ? *melanopa* KIEFF., 1911)
- Nr. 5 + 6, 2 ♂ : Héverlé (Louvain), 19.IV. und 19.IX.1941 (*Ashmeadopria melanopa* KIEFF., 1911).
- Nr. 83, ♂ : Kessel-Loo (Louvain), 22.VIII.1945 [T. (*Planopria*) *morio* THOMS., 1858].
- Nr. 84, ♂ : Héverlé (Louvain), 4.IX.1941 [T. (*Planopria*) *morio* *morio* THOMS., 1858].
5. T. (*Ashmeadopria*) *tritoma* THOMSON (1858) [A. ? *stilata* KIEFF., 1911]
- Nr. 21, ♂ : Eengenhoven, 4.IX.1941 (*Ashmeadopria stilata* KIEFF., 1911).
- Nr. 22, ♂ : Forêt de Loverval, 14.VIII.1941 (*Ashmeadopria* « *stillata* » KIEFF., 1911).
- Nr. 23, ♂ : Héverlé (Louvain), 19.IX.1941 (*Ashmeadopria tritoma* THOMS., 1858).
- Nr. 85 + 86, 2 ♂ : Vossem (Louvain), 21.VI.1944 [T. (*Planopria*) *morio* THOMS., 1858].
6. T. *nigra* NEES (1834) (sensu DEBAUCHE) [d. h. Fühlerkeule der Antenne des Weibchens 4-5gliedrig : Glied 8 dicker als 7 und dünner als 9. Kopf (von oben gesehen) quer, distal erweitert. Thorax höher als breit. Scutellargrube quer. Beine braun]
- Nr. 60 + 61, 2 ♀ : Gîte de taupe, Maransart, 12.I.1946 (N. LELEUP leg.) (*T. Nigra* NEES, 1834).
- Nr. 62, ♀ : Héverlé (Louvain), 1.X.1941 [T. (*Ceratopria*) *nigra* NEES, 1834].
7. T. *nigra* NEES (1834) (sensu HELLEN, 1963) (d. h. Thorax abgeflacht. Fühlerkeule des Weibchens 4-gliedrig. Scutellargrube mit der Tendenz zur Teilung in zwei getrennte Schildchengruben) (= ? *bipunctata* KIEFF., 1911)
- Nr. 63 + 64, 2 ♀ : Eengenhoven, 4.IX.1941 [T. (*Ceratopria*) *nigra* NEES, 1834].

Nr. 65, ♀ : Vossem (Louvain), 26.IV.1946 (*T. bipunctata* KIEFF., 1911).

Nr. 66, ♀ : Héverlé (Louvain), 28.VI.1941 (*T. spinosa* KIEFF., 1911).

8. *T. ciliaris* KIEFFER (1911)

Nr. 40, ♀ : Héverlé (Louvain), 31.VIII.1942 (*Trichopria* spec.).

Nr. 67, ♂ : Eyzer, 8.VIII.1944 [*T. (Ceratopria) « vois. de spinosa* KIEFF. »].

Nr. 69 + 70, 2♀ : Héverlé, 26.IV.1945 und 26.X.1942 [*T. (Ceratopria) ciliaris* KIEFF., 1911].

9. *T. hyalinipennis* THOMSON (1858)

Nr. 54 + 55, 2♂ : Vossem (Louvain), 18.V.1941 (*T. bipunctata* KIEFF., 1911).

Nr. 56, ♂ : Eeghenhoven, 4.IX.1941 [*T. (Ceratopria) spec.*].

Nr. 68, ♂ : Eeghenhoven, 4.IX.1941 [*T. (Ceratopria) spinosa* KIEFF., 1911].

10. *T. picicornis* NEES (1834) (= ? *tenuicornis* THOMS., 1858)

Nr. 78, ♀ : Vossem (Louvain), 21.VI.1944 [*T. (Planopria) picicornis* NEES, 1834].

11. *T. parvula* NEES (1834) (= *Phaenopria cameroni* KIEFF., 1911; *P. ? subimpressa* KIEFF., *P. minima* MASI, 1931)

Nr. 26, ♀ : Héverlé (Louvain), 14.VIII.1942 (*Phaenopria ? subimpressa* KIEFF., 1911).

Nr. 27, ♀ : Vossem (Louvain), 21.VI.1944 (*Phaenopria subimpressa* KIEFF., 1911).

Nr. 28, ♀ : Tervueren, Etang du Mérisier, 7.VIII.1945 (*Ph. subimpressa* KIEFF., 1911).

Nr. 29, ♀ : Forêt de Loverval, 10.VIII.1941 (*Ph. subimpressa* KIEFF., 1911).

Nr. 30, ♀ : Héverlé (Louvain), 19.IX.1941 (*Phaenopria cameroni* KIEFF., 1911).

Nr. 31, 32, 37/2 ♀, 1♂ : Forêt de Loverval, 14.VIII.1941 (*Ph. cameroni* KIEFF., 1911).

Nr. 33 + 35, 2♀ : Héverlé (Louvain), 1.VI.1941 (*Ph. cameroni* KIEFF., 1911).

Nr. 34, ♀ : Vossem (Louvain), 13.V.1941 (*Ph. cameroni* KIEFF., 1911).

Nr. 39, ♀ : Tervueren, 23.VIII.1944 (*Phaenopria minima* MASI, 1931).

Nr. 36 + 38, 2♀ : 3.VIII. und 8.VIII.1944 (*Ph. cameroni* KIEFF., 1911).

Nr. 41-47 und 49-51, 9♀ : Eyzer, 8.VIII.1944.

Nr. 48, ♀ : Héverlé, 31.VII.1942 (*Phaenopria* spec.).

Nr. 52, ♀ : Forêt de Loverval, 14.VIII.1941.

12. *T. ciliipes* KIEFFER (1909) (= ? *bipunctata* KIEFF., 1911)

Nr. 42, ♀ : Eyzer, 8.VIII.1944.

Nr. 57, ♀ : Eaux Douces, 10.V.1944 (*T. bipunctata* KIEFF., 1911).

Nr. 58, ♀ : Héverlé, 30.VII.1942 (*T. bipunctata* KIEFF., 1911).

Nr. 59, ♂ : (Stellung hier unsicher !) Eegenhoven, 4.IX.1941 (*T. longicaudarum* KIEFF., 1911).

13. *T. aptera* RUTHE (1859) [= *Diapria suspecta* (NEES, 1834) s.

THOMS. (1858); *Loxotropa laticeps* KIEFF. (1911); *Loxotropa thomsoni* KIEFF. (1911); *Trichopria balli* (♂) MANEVAL (1937); *Trichopria brachyptera* (♀) MANEVAL (1937)]

Nr. 53, ♂ : Tervueren, Etang du Mérisier, 7.VIII.1945 (*Trichopria balli* MANEVAL, 1937).

2. Gattung : *Diapria* LATREILLE (1796)14. *Diapria conica* FABRICIUS (1775)

Nr. 151, 154, 155, 157/4 ♀ : Héverlé (Louvain), 1.VI.1941 (*Diapria conica conica* FBR., 1775).

Nr. 152 + 153, 2 ♀ : Vossem (Louvain), 18.V.1941 (*Diapria conica* FBR., 1775).

Nr. 156, 162, 167/3 ♀ : Tervueren, 28.VIII.1944 und 20.VI.1944 (*Diapria conica* FBR., 1775).

Nr. 158 + 159, 2 ♀ : Héverlé (Louvain), 18.X.1940 (*Diapria conica* FBR., 1775).

Nr. 160 + 161, 2 ♀ : Héverlé, 9.X.1942 (*Diapria conica* FBR., 1775).

Nr. 163, ♀ : Eegenhoven, 4.IX.1941 (*Diapria conica* FBR., 1775).

Nr. 164, 165, 166/3 ♀ : Héverlé, 19.IX.1941, 6.XI.1942 und 26.X.1942 (*D. conica* FBR., 1775).

Nr. 168, ♀ : Héverlé, 28.VIII.1942.

3. Gattung : *Basalys* WESTWOOD (1833)

[= *Loxotropa* auct. nec FÖRST., *Ceratopria* ASHM. (1893),
Acidopria KIEFF. (1913), *Loxotropa* MANI (1941)
(nach MASNER in Entomophaga 9 (1), 1964, p. 85)]

15. *B. (Loxotropa) cursitans* KIEFFER (1911) [= *B. ? luteipes* KIEFF. (1911), *Loxotropa ? ruficornis* THOMS. (1858), *L. ? suecica* KIEFF. (1911), *L. ? pedestris* KIEFF. (1907)]

Nr. 87, ♀ : Forêt de Loverval, 14.VIII.1941 (*Loxotropa ruficornis* THOMS., 1858).

- Nr. 90, ♀ : Eegenhoven, 4.IX.1941 (*Loxotropa crassiceps* KIEFF., 1911).
 Nr. 94, ♀ : Eegenhoven, 4.IX.1941 (*Loxotropa pedestris* KIEFF., 1907).
 Nr. 95, 96, 118/2 ♀, 1 ♂ : Tervueren, 20.VI.1942 und 31.V.1945.
 Nr. 103, 105, 116, 117/3 ♂, 1 ♀ : Héverlé (Louvain), 19.IX.1941, 22.VII.1942 und 17.X.1944.
 Nr. 104, ♂ : Héverlé, 22.VII.1942 (*Loxotropa crassiclava* KIEFF., 1908).
 Nr. 110, ♂ : Héverlé, 28.VI.1941 (*Loxotropa unifoveata* KIEFF., 1911).
 Nr. 111, ♂ : Tervueren, Etang du Mérissier, 18.VIII.1945 (*Lox. unifoveata* KIEFF., 1911).
 Nr. 113-115, 3 ♀ : Forêt de Loverval, 16.VI.1942 (*Loxotropa suecica* KIEFF., 1911).
 Nr. 129, ♂ : Eegenhoven, 4.IX.1941 (*Basalys luteipes* KIEFF., 1911).
 Nr. 133, ♂ : Campenhart, 5.IX.1941 (*Basalys erythropus* KIEFF., 1911).
 Nr. 130, ♂ : Forêt de Loverval, 14.VIII.1941 (*Basalys luteipes* KIEFF., 1911).

16. B. (*Loxotropa*) *stramineipes* KIEFFER (1911)

- Nr. 88, ♀ : Héverlé, 9.X.1942 (*Loxotropa stramineipes* KIEFF., 1911).
 Nr. 92 + 93, ♂/♀ : Eegenhoven, 4.IX.1941 (*Loxotropa pedestris* KIEFF., 1907).
 Nr. 102 + 120, 2 ♂ : Eyzer, 8.VIII.1944 (*Loxotropa crassiclava* KIEFF., 1908).
 Nr. 112, ♂ : Tervueren, Etang du Mérissier, 4.VII.1945 (*Loxotropa ciliata* KIEFF., 1911).
 Nr. 119, ♀ : Héverlé, 17.X.1944 (*Loxotropa spec.*).
 Nr. 121, ♂ : Tervueren, 21.VI.1944.
 Nr. 128, ♂ : Eegenhoven, 4.IX.1941 (*Basalys formicarius* KIEFF., 1904).

17. B. (*Loxotropa*) *abruptus* THOMSON (1858) [= *Loxotropa* ? *crassiclava* KIEFF. (1908), *L.* ? *sulcata* KIEFF. (1911)]

- Nr. 89, ♀ : Forêt de Loverval, 14.VIII.1941 (*Loxotropa crassiceps* KIEFF., 1911).
 Nr. 97 + 98, 2 ♀ : Tervueren, 31.V.1945 (*Loxotropa sulcata* KIEFF., 1911).
 Nr. 99 + 100, 2 ♂ : Héverlé (Louvain), 19.IV.1941 und 14.VIII.1942 (*Loxotropa crassiclava* KIEFF., 1908 und *L. spec. prope crassiclava* KIEFF.).
 Nr. 101, ♂ : Eegenhoven, 4.IX.1941 (*Loxotropa crassiclava* KIEFF., 1908).
 Nr. 131, ♂ : Héverlé, 19.IV.1941 (*Basalys luteipes* KIEFF., 1911).

18. *B. (Loxotropa) longipennis* KIEFFER (1911) (= *Loxotropa ? crassiceps* KIEFF., 1911)
 Nr. 91, ♀ : Eeghenhoven, 4.IX.1941 (*Loxotropa crassiceps* KIEFF., 1911).
19. *B. (Loxotropa) tritoma* THOMSON (1858)
 Nr. 106, ♀ : Tervueren, 31.V.1945.
 Nr. 107 + 122, 2 ♀ : Héverlé, 19.IV.1941.
 Nr. 108, ♂ : Tienne des Rotty (Tellin) M. REMONT leg. 16.VI.1945.
 Nr. 123, ♀ : Eeghenhoven, 23.VI.1942 (*Loxotropa spec.*).
 Nr. 124, ♂ : Vossem (Louvain), 21.VI.1944.
 Nr. 125, ♂ : Eyzer, 8.VIII.1944.
 Nr. 132, ♂ : Forêt de Loverval, 11.VIII.1941 (*Basalys erythropus* KIEFF., 1911).
20. *B. (Loxotropa) unifoveata* KIEFFER (1911) (♂)
 Nr. 109, ♀ : (wahrscheinlich das Weibchen zu KIEFFER's *unifoveata*)
 Tienne des Rotty (Tellin), M. REMONT leg. 19.VI.1945 (*Loxotropa spec. prope ? crassiclava* KIEFF.).
21. *B. (Basalys) fumipennis* WESTWOOD (1833) [= ? *thomsoni* KIEFF. (1911), ? *erythropus* KIEFF. (1911), ? *bipunctatus* KIEFF. (1911)]
 Nr. 134, ♂ : Tervueren, 23.VI.1945.
 Nr. 135, ♂ : Tervueren, 29.VI.1942 (*Basalys erythropus* KIEFF., 1911).
 Nr. 136, 138, 140/3 ♂ : Héverlé (Louvain), 19.IV.1941, 31.VII.1942 und 7.VIII.1942 (*Basalys erythropus* KIEFF., 1911).
 Nr. 137, ♂ : Eyzer, 8.VIII.1944 (*Basalys erythropus* KIEFF., 1911).
 Nr. 139, ♂ : Forêt de Loverval, 14.VIII.1941 (*Basalys erythropus* KIEFF., 1911).
 Nr. 141, ♂ : (Revoz) Mirwart, M. REMONT leg. 19.VI.1945.
 Nr. 142, ♂ : Tervueren, Etang du Mérissier, 4.VII.1945 (*Basalys erythropus* KIEFF., 1911).
 Nr. 143, ♂ : Tervueren, 23.VI.1945 (*Basalys fumipennis*, WESTW., 1833).
 Nr. 144, 146-148, 150/5 ♂ : Eeghenhoven, 4.IX.1941 (*Basalys fumipennis* WESTW., 1833).
 Nr. 145, ♂ : Héverlé, 19.IV.1941 (*Basalys fumipennis* WESTW., 1833).
 Nr. 149, ♂ : Kessel-Loo (Louvain), 27.VIII.1945 (*Basalys fumipennis* WESTW., 1833).
22. *B. (Basalys) ? formicarius* KIEFFER (1904)
 Nr. 126, ♂ : (Bestimmung unsicher) Héverlé, 14.VIII.1942 (*B. formicarius* KIEFF., 1904).
 Nr. 127, ♂ : (Bestimmung unsicher) Eeghenhoven, 4.IX.1941 (*B. formicarius* KIEFF., 1904).

4. Gattung : Entomacis FÖRSTER (1856)
 (= *Hemilexis* FÖRSTER, 1856)
23. *E. (Hemilexis) perplexa* HALIDAY (1857) (= *E. subtruncata* KIEFF., 1909)
- Nr. 169, 170, 172/3 ♀ : Héverlé (Louvain), 31.VII., 14.VIII. und 9.X.1942 (*Entomacis subtruncata* KIEFF., 1909).
 Nr. 171, ♀ : Héverlé, 1.X.1941 (*E. subtruncata* var. anglaise cf. KIEFF.) (vgl. KIEFFER « Das Tierreich », 1916, p. 43).
 Nr. 187, ♀ : Forêt de Loverval, 2.VIII.1941 (*Entomacis biguttata* KIEFF., 1911).
 Nr. 188-192/5 ♀ : Héverlé (Louvain), 22.VII., 14.VIII. und 9.X.1942 (*E. biguttata* KIEFF., 1911).
 Nr. 195, ♀ : Héverlé, 14.VIII.1942 (*Hemilexis bipunctata* KIEFF., 1911).
24. *Entomacis cordata* KIEFFER (1911)
- Nr. 173-175/ 3 ♀ : Héverlé (Louvain), 22.VII., 14.VIII und 9.X.1942.
25. *Entomacis platypitera* HALIDAY (1857)
- Nr. 176, ♀ : Héverlé (Louvain), 9.X.1942 (*Entomacis cordata* KIEFF., 1911).
26. *Entomacis biguttata* KIEFFER (1911)
- Nr. 177, ♀ : Héverlé, 26.X.1942 (*Entomacis bipunctata* KIEFF., 1911).
 Nr. 178, ♀ : Héverlé, 30.X.1942 (*Entomacis bipunctata* KIEFF., « Allotype ♀ »).
 Nr. 179, 180/2 ♂ : Héverlé, 31.VII. und 14.VIII.1942.
 Nr. 181, ♀ : Tervueren, 21.VI.1944 (*Entomacis biguttata* KIEFF., 1911).
 Nr. 182, 183/2 ♀ : Héverlé, 14.VIII. und 9.X.1942 (*Entomacis biguttata* KIEFF., 1911).
 Nr. 184, ♀ : Héverlé, 30.X.1942 (*Entomacis*, « spec. extr. sans notaui »).
 Nr. 185, 186 ♂, ♀ : Héverlé, 9.X. und 28.VIII.1942 (*Entomacis biguttata* KIEFF., 1911).
 Nr. 193, ♂ : Campenhart, 5.IX.1941 (*Hemilexis atriceps* DEBAUCHE in litt., TYPE).
27. *Entomacis bipunctata* KIEFFER (1911) (= *Hemilexis bipunctata* KIEFF., 1911)
- Nr. 194, ♀ : Héverlé (Louvain), 14.VIII.1942 (*Hemilexis bipunctata* KIEFF., 1911).

5. Gattung : *Corynopria* HALIDAY (1857)(= *Entomopria* KIEFF., 1911; *Monelata* auct. nec FÖRST.)28. *C. ? solida* THOMSON (1858)Nr. 196, ♀ : Kessel-Loo (Louvain), 27.VIII.1945 (*Entomopria solida* THOMS., 1858).29. *C. rufipes* KIEFFER (1910)Nr. 200, ♀ : Kessel-Loo (Louvain), 2.VI.1942 (*Monelata cincta* HAL., 1858).Nr. 201, ♀ : Héverlé, 19.IX.1941 (*Monelata cincta* HAL., 1858).Nr. 202, ♀ : Vossem (Louvain), 18.V.1941 (*Monelata cincta* HAL., 1858).Nr. 203, ♀ : Tervueren, 23.VIII.1944 (*Monelata rufipes* KIEFF., 1910).6. Gattung : *Idiotypa* FÖRSTER (1856)30. *I. rufiventris* THOMSON (1858)Nr. 197, 198/♂, ♀ : Forêt de Loverval, 14.VIII.1941 (*Idiotypa rufiventris* THOMS., 1858).Nr. 199, ♀ : Tervueren, 28.VIII.1944 (*Idiotypa rufiventris* THOMS., 1858).7. Gattung : *Spilomicrus* WESTWOOD (1832)[= *Loxotropa* FÖRST. (1856) non auct., *Eriopria* KIEFF. (1910),
Tritopria KIEFF. (1910), *Scutellipria* SZABO (1961)]
(nach MASNER, 1964)31. *S. thomsoni* KIEFFER (1911) (= *stigmatical* THOMS., 1858)

Nr. 204, ♂ : Héverlé (Louvain), 14.V.1941.

32. *S. hemipterus* T. A. MARSHALL (1868)Nr. 205, ♀ : Héverlé (Louvain), 14.V.1941 (*Spilomicrus hemipterus* MARSH., 1868).33. *S. basalyformis* T. A. MARSHALL (1858)Nr. 206, ♂ : Gîte de taupe, Maransart, 12.I.1946 (N. LELEUP leg.)
(*Spilomicrus basalyformis* MARSH., 1858).Nr. 207, ♀ : Héverlé, 26.X.1942 (*Spilomicrus basalyformis* MARSH., 1858).

34. *S. nigripes* THOMSON (1858) (= ? *tripartitus* KIEFF., 1911)
 Nr. 208, ♂ : Vossem (Louvain), 18.V.1941 (*Spilomicrus basalyformis* MARSH., 1858).
35. *S. annulicornis* KIEFF. (♀) (1911)
 Nr. 209, ♂ : Héverlé, 19.IX.1941 (*Spilomicrus carinatus* KIEFF., 1911).
 (= ? *autumnalis* KIEFF., 1911).
36. *S. integer* THOMSON (1858)
 Nr. 210, ♀ : Vossem (Louvain), 26.IV.1946 (*Spilomicrus integer variicornis* KIEFF., 1911).

8. Gattung : *Paramesius* WESTWOOD (1832)

37. *P. elongatus* THOMSON (1858) (= ? ♂ *inermis* KIEFF., 1910)
 Nr. 213, ♀ : Vossem (Louvain), 18.V.1941 (*Paramesius rufipes* WESTW., 1832).
 Nr. 214-217/4 ♀ : Héverlé (Louvain), 9.VII. und 14.VIII.1942; 22.VII. und 28.VIII.1943 (*Paramesius elongatus* THOMS., 1858).
 Nr. 229, ♂ : Eyzer, 8.VIII.1944 (*Paramesius inermis* KIEFF., 1910).
 Nr. 230, 232, 234/3 ♂ : Tervueren, Etang du Mérisier, 28.VIII.1944; 18.VIII.1945; 16.VIII.1946 (*Paramesius inermis* KIEFF., 1910).
 Nr. 231, 233/2 ♂ : Héverlé, 2.VII. und 22.VII.1942 (*Paramesius inermis* KIEFF., 1910).
38. *P. tenuicornis* THOMSON (1858) [= ? *angustipennis* KIEFF. (1911), ? *belytoides* MARSH. (1867)]
 Nr. 211, 212, 2♂ : Héverlé (Louvain), 14.VIII.1942 (*Paramesius rufipes* WESTW., 1832).
 Nr. 218, ♂ : Héverlé, 14.VIII.1942 (*Paramesius tenuicornis* THOMS., 1858).
 Nr. 220-227/8 ♂ : Héverlé, 14.VIII.1942 (*Paramesius tenuicornis* THOMS., 1858).
 Nr. 219, ♂ : Forêt de Loverval, 11.VIII.1941.
39. *P. longicornis* KIEFFER (1911) (♂)
 Nr. 228, ♂ : St. Priest- Ligoure (Hte. Vienne), VII.1940 (*P. longicornis* KIEFF., 1911).

9. Gattung : *Psilus* PANZER (1801) (= *Galesus* CURTIS, 1831)

40. *P. cornutus* PANZER (1801)
 Nr. 235, ♂ : Eeghenhoven, 6.IX.1941 [G. (*Galesus*) *villosum* KIEFF., 1911].

10. Gattung : *Aneurhynchus* WESTWOOD (1832)[= *Mythras* BRULLÉ (1846), *Glyptonota* FÖRST. (1856)]41. *A. ruficornis* THOMSON (1858) (? *denticornis* I. WALL, 1971)Nr. 236, ♂ : Forêt de Loverval, 16.VI.1942 (A. « spec. prope *nodicornis* » MARSH., 1867).Nr. 239, ♂ : Héverlé (Louvain), 22.VII.1943 (*Aneurhynchus ruficornis* THOMS., 1858).42. *A. galesiformis* WESTWOOD (1832)

Nr. 237, ♂ : Héverlé, 19.IX.1941.

43. *A. gracilicornis* I. WALL (1971)

Nr. 238, ♂ : Héverlé, 19.IX.1941.

II. BELYTINAE

11. Gattung : *Synacra* FÖRSTER (1856) (= *Neuropria* KIEFF., 1904)44. *S. brachialis* NEES (1834) [= *holconota* KIEFF. (1910) sensu NIXON (1957)]Nr. 240, ♀ : Tervueren, 31.V.1945 (*Synacra elongata* DEBAUCHE in litt., TYPE).45. *S. (Prosynacra) holconota* KIEFFER (1910)Nr. 241, ♀ : Héverlé, 28.VIII.1943 (*Synacridaea staneri* DEBAUCHE in litt., TYPE).12. Gattung : *Cardiopsilus* KIEFFER (1908) (= *Acanosema* KIEFF., 1908)46. *C. nervosus* THOMSON (1858)Nr. 242, ♀ : Héverlé (Louvain), 19.IX.1941 (*Europsilus monilicornis* DEBAUCHE, gen. et spec. nov., in litt., TYPE).

LITERATUR

ANDRÉ, E., (KIEFFER, J.-J.)

1911. Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie, Vol. 10, Beaune : Côte-d'Or.

ASHMEAD, W. H.

1893. Monograph of the North American Proctotrypidae. — *Bull. U.S. Nat. Mus.* Washington, 45.

BACHMAIER, F.

1958. Beitrag zur Terminologie der Lebensweise der entomophagen Parasitenlarven. — *Beitr. z. Ent.*, 8 : 1-8.

BERLAND, L.

1958. Atlas des Hyménoptères de France, Belgique, Suisse, Vol. II. — Paris.

BISCHOFF, H.

1927. Biologie der Hymenopteren. — Berlin.

BONESS, M.

1961. Über die Proctotrupiden Schleswig-Holsteins (Hym.). — *Bombus*, 2 : 112-115.

BRULLÉ, M. A.

1837-46. Histoire Naturelle des Insectes. — M. le C. A. LEPELETIER de S.-F./ M. A. BRULLÉ (4 Bände). — Paris.

CAVRO, E.

1954. Catalogue des Hyménoptères du Département du Nord et des Régions Limítrophes, III (Térébrants). — Lille.

CEBALLOS, G.

1941. Las tribus de los Himenópteros de España. — Madrid.

CEBALLOS, G., u. a.

1956. Catalogo de los Himenópteros de España. — Madrid.

CHAMBERS, V. H.

1969. Records of Belytinae (Hymenoptera, Proctotruipoidea : Diapriidae), mainly from Bedfordshire. — *Ent. month. Mag.*, 104 : 217-218.1971. Large populations of Belytinae (Hym. Diapriidae). — *Ent. month. Mag.*, 106 : 149-154.1974. Taxonomic notes on the Belytinae, with a new species of Pantoclis FÖRST. (Hymenoptera, Proctotruipoidea : Diapriidae). — *Journ. Ent. (B)*, 42 (2) : 127-131.

CLAUSEN, C. P.

1940. (Reprint 1962), Entomophagous Insects. — New York.

DESSART, P.

1966. Contribution à l'étude des Hyménoptères Proctotruipoidea XIII : Deux Proctotrupides de la Collection BOYER de FONSCOLOMBE (Scelionidae; Diapriidae). — *Bull. Inst. roy. sci. Belg.*, 42 : 1-4.1974. Corrections mineures à la nomenclature de quelques Proctotruipoidea. — *Bull. Ann. Soc. r. belge Ent.*, 110/7-12 : 225-232.

DONISTHORPE, H. S. J. K.

1927. The Guests of British Ants, their Habits and Life-Histories. — London.

ELLIOTT, E. A. & MORLEY, C.

1907. On hymenopterous parasites of Coleoptera. — *Trans ent. Soc. Lond.* : 7-75.1911. On hymenopterous parasites of Coleoptera, 1. Suppl. — *Trans. ent. Soc. Lond.*, 452-496.

FABRITIUS, K.

1968. Ambositridae n. fam., eine neue Hymenopterenfamilie aus Afrika, Madagaskar und Südamerika (Hym. Proct.). — *Ann. hist. nat. Mus. nat. Hung.*, 60 : 213-218.1968. Antipapria n. gen., eine neue Diapriiden-Gattung aus Argentinien (Hym. Proctotruipoidea). — *Trav. du Mus. d'Hist. nat.*, « Grigore Antipa », VIII : 841-844.

1972. Contributii la studiul Belytinelor din Romania (Hym., Diapriidae, Belytinae). — *Lucr. stiint; Zool. Constanta*, 49-52.
- FERRIERE, CH.
1927. Note sur un Diapriide (Hym.), hôte de *Solenopsis fugax* LATR. — *Konowia*, 6 : 282-286.
- FÖRSTER, A.
1856. Hymenopterologische Sudien, V/2. — Aachen.
- GAULLE, J. de
1908. Catalogue systématique et biologique des Hyménoptères de France. — Paris.
- GHEŚQUIÈRE, J.
1934. Un Diapriide (Hym. Proct.) nouveau du Congo belge et clef des espèces éthiopiennes. — *Bull. Mus. Hist. nat. Belgique*, 10/23 :1-3.
1941. Contribution à l'étude des Hyménoptères du Congo belge - VII. Nouveaux Prototropoidea Diapriidae. — *Rev. Zool. Bot. afr.*, 34/3-4 : 353-362.
- GREGOR, F.
1939. Deux Proctotrupides nouveaux (*Sinaris roubali* sp. nov. und *Idiotypa mariae* spec. nov.). — *Šborn. ent. odd. Nar. Mus. v Praze*, 132-135.
- HELLÉN, W.
1956. [Kurze Notiz (schwedisch) über *Glyptonota subpilosa* KIEFF. und *Polypeza foersteri* KIEFF]. — *Not. ent.*, 36 : 82-83.
1963. Die Diapriiden Finnlands (Hym. Proct.). — *Fauna fenn.*, 18,35 pp.
1964. Die Ismarinen und Belytinen Finnlands. — *Fauna fenn.*, 18, 70 pp.
- HÖLLODOBLER, K.
1928. Zur Biologie der diebischen Zwergameise (*Solenopsis fugax*) und ihrer Gäste. — *Biol. Zentralbl.*, 48 : 129-142.
- HONDA, M.
1968. Study on the Japanese *Aneurhynchus* WESTW. (Hym. Diapriidae). — *J. Fac. Agric., Kyushu Univ.*, 14 (4) : 613-627.
1969. Descriptions of two new species of Diapriidae (Hym.) parasitic on *Eristalis* sp. and *Lathyrophthalmus ocularis* COQU. (Dipt. Syrphidae). — *Mushi*, 42 (13) : 155-162.
- HUGGERT, L.
1979. *Cryptoserphus* and *Belytinae* wasps (Hym. Proct.) parasitizing fungus- and soilinhabiting Diptera. — *Not. Ent.* 59 : 139-144.
- JANSSON, A.
1939. Studier över svenska proctotrupider I. — *Ent. Tidskr.*, 60 : 155-175.
1944. Studier över svenska proctotrupider II/III. — *Ent. Tidskr.*, 65 : 190-198.
1953. *Viennopria* nov. gen. (Hym. Diapriidae). — *Ent. Tidskr.*, 74 : 3.
1955. *Phaenopria incrassata* n. sp. und *Galesus intermedius* n. sp., zwei neue Diapriiden aus Schweden. — *Ent. Tidskr.*, 76 : 1-3.
- KELNER-PILLAULT, S.
1958. Les Diapriinae (Hym. Prototrupidae) des Iles Philippines provenant de la collection de l'Abbé J.-J. KIEFFER. — *Bull. Mus. Hist. nat. Paris*, 2 sér., 30 (5) : 418-421.
1959. Les Bethylidae et les Belytinae (Insectes Hyménoptères) provenant de la collection de l'Abbé J.-J. KIEFFER. — *Bull. Mus. Hist. nat. Paris*, 2 sér., 31 (5) : 410-422.
- KIEFFER, J.-J.
1912. Ceraphronidae, Serphidae, Belytidae, Diapriidae, Platygasteridae und Bethylidae, in STRAND : Neue Beiträge zur Arthropodenfauna Norwegens. — *Nyt. Mag. Naturvid.*, 50 : 15-22.
1916. Diapriidae, in : Das Tierreich (Lief. 44). — Berlin.
- KLUG, B., (P. OSMUND, O. F. M.)
1965. Die Hymenopteren am Tuniberg, im Mooswald und Riessefeld; eine vergleichend faunistisch-ökologische Untersuchung dreier extremer Biotope des südlichen Oberheintales. — *Ber. nat. Ges. Freiburg*, 55 : 5-225.
- LEBRUN, PH.
1972. Hubert Robert DEBAUCHE. — *Rev. Ecol. Biol. Sol*, 11 (2) : 141-144.

LECLERCQ, J.

1952. Proctotrupoidea (Serphoidea) récolté en Belgique. — *Lambillionea*, 52 : 71-72.
MANEVAL, H.

1937. Serphoidea de la Faune Belge. — *Bull. Mus. r. Hist. nat. Belg.*, 13 : 1-28.
1940. Proctotrupides, in: La Faune de la France, VII (Hym.). — Paris.

MARSHALL, T. A.

1873. A catalogue of the British Hymenoptera Oxyura. — London.

MASI, L.

1931. Sue due specie inedite di Phaenopria. — *Boll. Soc. ent. Ital.*, 68 : 69-72.

MASNER, L.

1957. Klíč zvířený ČSR, II (J. KRATOCHVIL, Herausg.) (Bestimmungsschlüssel zur Fauna der ČSR), darin Proctotrupoidea. — Praha.

1957. First preliminary report on the occurrence of genera of the groupe Prototrupoidea in Czechoslovakia (2. part). Superfam. Proctotrupoides s. str. — *Act. faun ent. Mus. nat. Pragae*, 2 : 83-107.

1959. A revision of ectophilous Diapriid-genus Mimopria HOLMGR. (Hym. Proct.). — *Ins. sociaux*, 6 (4) : 361-367.

MASNER, L. & SUNDHOLM, A.

1959. Some nomenclatorial problems in Diapriidae (Hym. Proct.) — *Act. Soc. ent. čech.*, 56 (2) : 161-168.

MASNER, L.

1961. Ambositrinae, a new subfamily of Diapriidae from Madagascar and Central Africa. — *Mém. de l'Inst. sci. de Madag.*, E/XII : 289-295.

1964. A comparision of some Nearctic and Palearctic genera of Proctotrupoidea (Hym.) with revisional notes. — *Act. Soc. ent. čech.*, 61 (2) : 123-155.

1964. A redescription of three species of Proctotrupoidea from JURINE's collection. — *Entomophaga*, 9 (1) : 81-89.

1965. The types of Proctotrupoidea (Hym.) in the British Museum (Nat. Hist.) and the Hope Department of Entomology, Oxford. — *Bull. Brit. Mus. nat. Hist.*, Suppl. 1.

1965. The types of Proctotrupoidea (Hym.) in the CHARLES T. BRUES collection at the Museum of Comparative Zoology. — *Psyche*, 72 (4) : 295-304.

MASNER, L. & MUESEBECK, C. F. W.

1968. The types of Proctotrupoidea (Hym.) in the United States Nat. Museum. — *U. S. nat. Mus. Bull.*, 270, 143 pp.

MASNER, L.

1969. The PROVANCHER species of Proctotrupoidea (Hym.). — *Nat. canad.*, 96 : 775-784.

1969. Two new genera of Diapriidae (Hym. Prototrupoidea) with transantarctic relationships. — *Psyche*, 76 (3) : 311-325.

MEYER, K. O.

1961. Hymenoptera, Proctotrupoidea. — *Bombus*, 2 : 89-90 und 94-96.

1963. Proctotrupiden aus Sonderburg und Satrup, gesammelt von W. WÜSTNEI in den Jahren 1881-1902. — *Bombus*, 2 : 143-144.

MÓCZÁR, L.

1938. Xenotoma Szelenyii spec. nov., eine neue Microhymenoptera aus Ungarn. — *Zool. Anz.*, 121 (1/2) : 45-47.

MUESEBECK, C. F. W., KROMBEIN, K. V. und TOWNES, H. K.

1951. Hymenoptera of America North of Mexico (Synopt. Cat.); darin : Proctotrupoidea. — *U. S. Print. Off., Wash.*

1958. Suppl. 1; darin : PECK, O., Proctotrupoidea. — *Loc. cit. supra*.

1967. Suppl. 2; darin : MUESEBECK, C. F. W. & MASNER, L., Proctotrupoidea. — *Loc. cit. supra*.

MUESEBECK, C. F. W. & WALKLEY, L. M.

1956. Type species of the genera and subgenera of parasitic wasps comprising the superfamily Proctotrupoidea. — *Proc. U. S. nat. Mus.*, 105.

MUESEBECK, C. F. W.

1965. A new Diapriid (Hym. Diapriidae) from termite nests from South Africa. — *Journ. ent. Soc. S. Afr.*, 27 (2) : 188-190.

NEES ab ESENBECK, C. G.

1834. Hymenopterorum Ichneumonibus affinium Monographiae, genera Europaea et species illustrantes (2 Bände). — Stuttgart und Tübingen.

NIXON, G. E. J.

1957. Hymenoptera Proctotrupoidea Diapriidae, subfamily Belytinae. — *Handb. for Identif. of Brit. Ins.*, VIII/3. — *Roy. Ent. Soc. London*.

OGLOBIN, A.

1927. A new species of *Loxotropa* FÖRST. (Hym. Diapriidae) from Carpathian Russia in Czechoslovakia. — *Sborn. Ent. odd. Nar. Mus. v Praze*, 43 : 115-117.

PRIESNER, H.

1953. Further studies in Proctotrupoidea (Phaenopria, Monelata, Diapria). — *Bull. Soc. Fouad 1^{er} Ent. Egypte*, 37 : 441-457.

PSCHORN-WALCHER, H.

1956. Zur Kenntnis der Diapriidae (Hym. Proct.). — *Mitt. schweiz. ent. Ges.*, 29 (1) : 58-68.

1957. Zur Kenntnis der Diapriinae der WASMANN-Sammlung. — *Mitt. schweiz. ent. Ges.*, 30 : 73-88.

RICHARDS, O. W.

1956. Hymenoptera, Introduction and Keys to Families. — *Handb. for Identif. Brit. Ins.*, Vol. VI, part. 1. — *Roy. Ent. Soc. London*.

RISBEC, J.

1950. Contribution à l'étude des Proctotrupidae. — *Trav. Lab. Ent. Sect. soudan. Rech. Agron.*, 511-639.

RÖHRS, M.

1959. Neue Ergebnisse und Probleme der Allometrieforschung. — *Z. Wiss. Zool.*, 162 : 1-95.

1961. Allometrieforschung und biologische Formanalyse. — *Z. Morph. u. Anthropol.*, 51 : 289-321.

SCHMIEDEKNECHT, H. O.

1914. Die Schlupfwespen Mitteleuropas, insbesondere Deutschlands; in : SCHRÖDER, Insekten Mitteleuropas, Band II (pp. 226-235). — Stuttgart.

1930. Die Hymenopteren Nord- und Mitteleuropas, mit Einschluss von England, Südschweiz, Südtirol und Ungarn (2. Aufl., pp. 457-467). — Jena.

SEDLAG, U.

1959. Hautflügler III (Schlupf- und Gallwespen). — Die Neue BREHM-Bücherei, Heft 242, 77 pp.

STELLWAAG, F.

1921. Die Schmarotzerwespen (Schlupfwespen) als Parasiten. — *Monogr. angew. Ent.* (Beiheft z. angew. Ent.), 6, 100 pp.

SUNDHOLM, A.

1959. A redescription of *Trichopria pentaplasta* ASHM. (Hym. Diapriidae). — *Opusc. ent.*, 24 (3) : 246-248.

1960. Recension zu G. E. J. NIXON's « Hymenoptera Proct. Diapr., subfam. Belytinae » (1957). — *Opusc. ent.*, 25 (1/2) : 81-82.

1960. On *Diapria* LATR. and allied genera (Hym. Diapriidae). — *Opusc. ent.*, 25 (3) : 215-223.

SZABÓ, J. B.

1959. A new species of the family Belytoidae from Italy (Hym. Proctotrupoidea). — *Boll. Soc. ent. ital.*, 89 : 122-123.

1959. Notes on a gynandromorph Diapriid wasp from Hungary (Hym. Proct. Diapriidae). — *Fol. ent. hung.*, 12 (33) : 495-496.

1960. Neue Diapriiden aus Ungarn (Hym. Proct.). — *Ann. hist. nat. Mus. nat. Hung.*, 52 : 363-365.

1961. Neue paläarktische Gattungen und Arten der Diapriiden in der Sammlung des Ungarischen Naturw. Museums (Hym. Proct. Diapriidae). — *Ann. hist. nat. Mus. nat. hung.*, 53 : 491-494.

1974. Neue Arten der Diapriiden aus der Sammlung des Naturhist. Museums in Wien, Österreich. — *Ann. Nat. Mus. Wien*, 78 : 495-498.
1974. Neue Arten und Gattungen der Diapriiden aus der Mongolei (Hym. Diapriidae). — *Ann. hist. nat. Mus. nat. hung.*, 66 : 353-358.
- THOMSON, C. G.
1858. Skandinaviens Proctotruper. Belytinae, Ismarinae. — *Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl.*
1858. Sveriges Proctotruper, IV: Diapriini. — *Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl.*
- TOMŠIK, B.
1946. Rody Galesus HAL. a Schizogalesus gen. nov. — *Ent. Listy* (Fol. Ent.), 9.
1947. Rod Spilomicrus WESTW. — *Ent. Listy* (Fol. Ent.), 10.
- WALL, I.
1963. Erster Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung der mitteleuropäischen Proctotrupoidea : 1. Diapriidae : Belytinae. — *Beitr. Ent.*, 13 : 902-911.
1967. Die Ismarinae und Belytinae der Schweiz (Ismarinen und Belytinen des Zoologischen Museums in Lausanne/Schweiz); zweiter Beitrag zur Kenntnis der mitteleuropäischen Proctotrupoidea und deren Verbreitung. — *Ent. Abb. Mus. f. Naturk. Dresden*, 35 (2) : 123-265/53 Tafeln.
- WESTWOOD, J. O.
- 1839/40. An Introduction to the Modern Classification of Insects. — (2 Bände), London.
- WING, M. W.
1951. A new genus and species of myrmecophilous Diapriidae with taxonomic and biological notes on related forms. — *Trans roy. ent. Soc. London*, 102 : 195-210.

(4. Beitrag zur Kenntnis europäischer Zehrwespen)

Im Zusammenhang mit der Diapriiden-Sammlung von H. R. DEBAUCHE studierte ich 1974 eine recht umfangreiche weitere Kollektion dieser Insektengruppe aus dem Königlich-Belgischen Institut für Naturwissenschaften in Brüssel. Auch hier beabsichtigte ich zunächst nur, wenige schwierige Formen genauer zu untersuchen, entschloss mich aber schlusslich zur Bearbeitung des gesamten Materials.

Die in fünf Kästen untergebrachte Sammlung enthält 639 Exemplare in 19 Gattungen und 61 Arten, von denen die Mehrzahl den *Diapriinen* zuzurechnen ist und nur ein geringer Teil auf die *Belytinen* entfällt. Alle Individuen wurden geordnet und zur leichteren Auffindung numeriert. Die hier zusammengetragenen *Diapriiden* stammen aus den Sammlungen verschiedener Entomologen : WESMAEL, TOSQUINET, TOURNIER, FÖRSTER, GHESQUIÈRE, CRÈVECOEUR, BALL, MANEVAL, LELEUP, FAGEL, DESSART u.a. Einige der Tiere wurden bereits in der 2. Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gesammelt und sind infolgedessen mehr oder weniger stark beschädigt. Die Fundorte liegen meist in Belgien bzw. in Frankreich; einzelne Exemplaren stammen aus dem Congo-Gebiet. Fundorte, die sich nur in sehr gekürzter Fassung auf den Etiketten fanden und in Klammern gesetzt wurden, beziehen sich auf Stadtteile von Anvers bzw. Bruxelles (z.B. Berch. = Anvers-Berchem; And. = Bruxelles-Anderlecht; Hobkn. = Anvers-Hoboken; Boits. = Bruxelles-Watermael-Boitsfort; Wlrck. = Anvers-Wilrijk; St. Andr. = Bruges-St-André).

Auch am Schluss dieser kurzen Einführung möchte ich es nicht ver-säumen, Herrn Dr. P. DESSART für die freundliche Vermittlung des Materials bzw. Herrn Dr. W. HELLÉN für die leihweise Überlassung einer kleinen Kollektion schwieriger Arten herzlich zu danken.

I. DIAPRINAE

1. Gattung : *Trichopria* ASHMEAD (1893)

[= *Phaenopria* ASHM. (1893), *Planopria* KIEFF. (1910),
Ashmeadopria KIEFF. (1911), ? *Monclata* FÖRST. (1856)]

1. *T. (Ashmeadopria) verticillata* LATREILLE (1805)

- Nr. 193, ♀ : Forest. inond., 18.XII.1915, A. KOLLER leg.
- Nr. 194, ♀ : Rhod., 15.XI.1881, coll. CLAVAREAU.
- Nr. 195, ♀ : Nantes, ex coll. EMERY.
- Nr. 196, ♀ : Kalmphout (Belgique), 17.V.1947, G. FAGEL, leg. (I. G. 15620).
- Nr. 197, ♀ : Anvers (Belgique), Fauchage prairie, 14.IX.1967, P. DESSART leg.
- Nr. 198, ♀ : (Roelofs [leg.]/Hobokn., III.1937), *Ashmeadopria verticillata* LATR. (1805) (MANEVAL det. 1939), coll. A. CRÈVE-CŒUR/Nr. 22333.
- Nr. 199, ♀ : (Roelofs, Mai), *Ashmeadopria verticillata* NEES (!), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.
- Nr. 200, ♀ : (Roelofs/Fldr., 5.XI.1911), *Ashmeadopria verticillata* LATR. (1805) (MANEVAL det. 1937), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.
- Nr. 201, ♀ : (Roelofs/T. Fl., 4.III.1938), *Ashmeadopria verticillata* LATR. (1805) (MANEVAL det. 1939), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.
- Nr. 202, ♀ : (Beaumt., 28.III.1930), *Ashmeadopria sp.* (L. MASI det.), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.
- Nr. 203, ♀ : Genève, coll. H. TOURNIER.
- Nr. 204, ♀ : Pied du Jura, IX.1874, coll. H. TOURNIER.
- Nr. 205, ♀ : Envir. de Genève, coll. H. TOURNIER.
- Nr. 206/07, 2 ♀ : Keerbergen, 13.IV.1947, G. FAGEL leg. (sans l. mousses et callunes des pineraies) (I. G. 15620).
- Nr. 208/09, 2 ♀ : Insepré, 26.VII.1947, J. GHESQUIÈRE leg.
- Nr. 210, ♀ : Gr. de la Gare/Onoz.-Spy., 9.VIII.1942, A. COLLART leg. (I. G. 23001).
- Nr. 211-228, 18 ♀ : Lierre (Inondations), 10.X.1930, A. BALL Leg.; *Trichopria ciliaris* KIEFF. (1911) (MANEVAL det. 1936) (I. G. 9451).
- Nr. 229, ♂ : St. Croix, 15.IX.1874, coll. Dr. J. TOSQUINET.

- Nr. 230, ♂ : (Roelofs/Berchem, 24.V.1940), coll. A. CRÈVECOEUR/
Nr. 22333.
- Nr. 231, ♂ : (Roelofs/Hobokn., 27.VIII.1939), coll. A. CRÈVE-
COEUR/Nr. 22333.
- Nr. 232, ♂ : (Michel [leg.]/Wemmel., 17.IX.1938), *Ashmeadopria ver-*
ticillata LATR. (1805) (MANEVAL det. 1939), coll. A. CRÈVE-
COEUR/Nr. 22333.
- Nr. 233/234, 2 ♂ : (ohne Fundort und Datum), coll. A. CRÈVE-
COEUR/Nr. 22333.
- Nr. 235-238, 4 ♂ : Belgique; *Psilus elegans* JURINE (1807), coll.
WESMAEL (det. C. WESMAEL), *Ashmeadopria verticillata* LATR.
(1805) (J. GHESQUIÈRE det. 1947).
- Nr. 239, ♂ : (« Wlrck », VIII./Roelofs), *Ashmeadopria verticillata*
NEES (!), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.
- Nr. 240, ♂ : (« Oostkp. », 9.VIII.1938), *Ashmeadopria verticillata*
LATR. (MANEVAL det. 1939), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.
- Nr. 241, ♂ : (« S. Andr. », VIII.1932), *Ashmeadopria verticillata*
LATR. (MANEVAL det. 1939), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.
- Nr. 242, ♂ : Broût-Vernet, H. du BUYSSON leg. (I. G. 1911159).
- Nr. 243-268, 26 ♂ : Lierre (Inondations), 10.X.1930, A. BALL leg.
(I. G. 9451).
- Nr. 269-274, 6 ♂ : Nespeky (ČSL), Fauchage prairie, 2.VIII.1967, P.
DESSART leg.
- Nr. 275, ♂ : Tervueren (Belgique), 1.VIII.1962, Fauchage prairie, P.
DESSART leg.
- Nr. 276-281, 6 ♂ : Moressée/Heure (Belgique), 6. und 26.VIII.1966,
Fauchage prairie, P. DESSART leg.
- Nr. 282, ♂ : Forêt de Soignes, 21.I.1965 (Humus/Berlese), P. DESSART
leg. (I. G. 23222).
- Nr. 283, ♂ : Insepré, 26.VII.1947, J. GHESQUIÈRE leg.
- Nr. 284 + 285, 2 ♂ : Hamois (Belgique), Fauchage prairie,
15.VIII.1967, P. DESSART leg.
- Nr. 286-290, 5 ♂ : Uzès (France), Fauchage prairie, 11.VII.1966, P.
DESSART leg.
- Nr. 291-298, 8 ♂ : Anvers (Belgique), Fauchage prairie, 14.IX.1967,
P. DESSART leg.
2. T. (*Ashmeadopria*) *carinata* THOMSON (1858) [= ? *lignicola* KIEFF.
(1911), ? *sociata* KIEFF. (1905)]
- Nr. 299, ♀ : Bois de Malchamps (Nid de guêpe N. I.), 2.I.1913, G.
SÉVERIN leg.
- Nr. 300, ♀ : Lierre (Inondations), 10.X.1930, A. BALL leg. (I. G.
9451).
- Nr. 301, ♀ : Mirwart (Bords du Marsaut), 27.VIII.1948, R. DELVI-
GNE leg. (I. G. 16012).

Nr. 302, ♂ : Aix-la-Chapelle (Aachen), A. FÖRSTER leg.; *Diapria elegans* NEES (1834) (coll. WESMAEL) (det. C. WESMAEL); *Ashmeadopria verticillata* LATR. (1805) (det. J. GHESQUIÈRE 1947).

Nr. 303, ♂ : (ohne Fundort und Datum), coll. CAMILLE VAN VOIXEM.

Nr. 304, ♂ : (ohne Fundort und Datum), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.

Nr. 305-311, 7 ♂ : Lierre (Inondations), 10.X.1930, A. BALL leg. (I. G. 9451).

Nr. 312, ♂ : Bruxelles-Uccle, VIII.1927; *Ashmeadopria carinata* THOMS. (1858) (MANEVAL det.), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.

Nr. 313, ♂ : Rixensart, VIII.1927; *Ashmeadopria armata* MANEV. (MANEVAL det.).

Nr. 314, ♂ : Breznicze (Polen), 1.IV.1880, DE HORVATH leg.

Nr. 315 + 316, 2 ♂ : La Hulpe/Buissons (Belgique), 21.VII.1966, P. DESSART leg.

Nr. 317-320, 4 ♂ : Moressé/Heure (Belgique), Fauchage prairie, 26.VIII.1966, P. DESSART leg.

Nr. 321-326, 6 ♂ : Mirwart (Bords du Marsaut), 27.VIII.1948, R. DELVIGNE leg. (I. G. 16012).

Nr. 327 + 328, 2 ♂ : Genève (Suisse), 29.VII.1949, J. GHESQUIÈRE leg. (Nr. 12) (I. G. 17726).

Nr. 329, ♂ : Bruxelles-Uccle (Belgique), 12.IX.1946, J. PASTEELS leg. (I. G. 15638).

Nr. 330, ♂ : Hockai (Anc. frontière), 10.IX.1948, A. COLLART leg. (I. G. 15983).

Nr. 331, ♂ : Mantes (France) (S. O.), X.1950, J. GHESQUIÈRE leg. (I. G. 17149).

3. T. (*Ashmeadopria*) *tritoma* THOMSON (1858)

Nr. 332, ♂ : Hoesselt [recte : Hoeselt], 18.VIII.1874, MAURISSEN leg.

Nr. 333, ♂ : Rixensart, VIII.1927; *Ashmeadopria armata* MANEV. (MANEVAL det.), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.

4. T. (*Ashmeadopria*) *debauchi* WALL (1980) (*manevali* DEBAUCHE in litt.)

Nr. 338, ♀ : Orth (Belgique), 15.IX.1868, coll. Dr. J. TOSQUINET.

5. T. (*Ashmeadopria*) *oogaster* THOMSON (1858)

Nr. 374, ♀ : Gand, 25.VI.1868, coll. Dr. J. TOSQUINET.

Nr. 375, ♀ : Moressé/Heure (Belgique), Fommilière, 6.VIII.1966, P. DESSART leg.

Nr. 376, ♀ : Le Zwyn (Belgique), 17.VII.1962, Fauchage prairie, P. DESSART leg.

Nr. 377, ♀ : Dinant/Neffe (Belgique), 24.VIII.1946, G. FAGEL leg. (I. G. 15620).

6. *T. (Ashmeadopria) ? morio* THOMSON (1858)

Nr. 381, ♂ : (Santvl./Roelofs, 23.VI.1937), coll. A. CRÈVECOEUR/ Nr. 22333.

Nr. 382, ♂ : Hamois (Belgique), Fauchage prairie, 15.VIII.1967, P. DESSART leg.

7. *T. ? cilipes* KIEFFER (1909) [= *? bipunctata* KIEFF. (1911)]

Nr. 1-187, 187 ♀ : Lierre (Inondations), 10.X.1930, A. BALL leg.; *T. bipunctata* KIEFF. (1911) (MANEVAL det.) (I. G. 9451).

Nr. 188, ♀ : Anvers (riv. gauche) (Belgique), 23.V.1948, G. FAGEL leg. (dans le sable) (I. G. 16012).

Nr. 189, ♀ : Mantes (France/S. O.), « ex galles violettes », X.1950, J. GHESQUIÈRE leg. (I. G. 17149).

Nr. 190, ♀ : Aix-les-Bains (France/Savoyen), X.1950, J. GHESQUIÈRE leg. (I. G. 17726).

Nr. 191, ♀ : Mousses lâches (Wavreille), 27.VIII.1947, N. LELEUP leg.

Nr. 192, ♀ : Mantes (France/S. O.), « ex galles violettes », X.1950, J. GHESQUIÈRE leg (I. G. 17149).

8. *T. hyalinipennis* THOMSON (1858)

Nr. 334, ♀ : Tervueren (Belgique), 23.IV.1961 (maison), P. DESSART leg.

Nr. 335, ♂ : (dunkle Form ohne Scutellarkiel : *? hyalinipennis* THOMS.); Mousses lâches (Wavreille), 27.VIII.1947, N. LELEUP leg.

Nr. 336, ♂ : Mousses lâches (Wavreilles), 27.VIII.1947, N. LELEUP leg.

Nr. 337, ♂ : Bunde, 22. - 27.VII.1874, coll. MAURISSEN.

9. *T. ? elongata* THOMSON (1858)

Nr. 339, ♀ : Brezsnicze (Polen), 1.IV.1880, coll. DE HORVATH.

10. *T. collarti* GHESQUIÈRE (1934)

Anmerkung : vgl. SUNDHOLM, 1960, p. 220. — Das rotbraun gefärbte Pronotum mit weisser kragenartiger Behaarung ist keine Besonderheit, die eine andere Gattung für diese Art rechtfertigen würde. Dass die Maxillarpalpen tatsächlich 3-gliedrig sind, lässt sich an der Type kaum nachweisen. Vermutlich gehört die Art zu *Trichopria* und hier in die Nähe von *verticillata* LATR. oder *ciliaris* KIEFF.

Nr. 340, ♀ : Stanleyville (Belg. Congo), 4.XII.1929, A. COLLART leg.; *Phaenopria collarti* GHESQUIÈRE; TYPE (I. G. 10239).

11. *T. evanescens* KIEFFER (1911)

Nr. 341, ♀ : (Roelofs/Berchem.), 5.IX.1939, coll. A. CRÈVECOEUR/

Nr. 22333 : *Idiotypa* sp.

Nr. 342, ♀ : Wavreille, 26.VIII.1947, N. LELEUP leg., *Trichopria* sp. (P. DESSART det. 1967) (I. G. 15638).

Nr. 343, ♀ : Lierre (Inondations), 10.X.1930, A. BALL leg.; *Trichopria evanescens* KIEFF. (1911) (MANEVAL det.) (I. G. 9451).

Nr. 344, ♀ : Lierre (Inondations), 10.X.1930, A. BALL leg., *Trichopria bipunctata* KIEFF. (1911) (MANEVAL det.) (I. G. 9451).

Nr. 345 - 348, 4 ♀ : Lierre (Inondations), 10.X.1930, A. BALL leg.; *Trichopria evanescens* KIEFF. (1911) (MANEVAL det.) (I. G. 9451).

Nr. 349, ♀ : Mantes (France/S. O.), « ex galles violettes », X.1950, J. GHESQUIÈRE leg. (I. G. 17149).

Nr. 350, ♀ : Catalogne (Seo de Urgel/España), V.1962, G. FAGEL leg. (I. G. 23163).

12. *T. ciliaris* KIEFFER (1911)

Nr. 351, ♀ : Minsk (Weissrussland/UdSSR), coll. WANKOWICZ.

Nr. 352, ♀ : (S. Andr./VIII.1932); coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333 : *Idiotypa* sp.

Nr. 353, ♀ : (S. Andr./4.X.1941); coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.

Nr. 354, ♀ : Keerbergen, 13.IV.1947, G. FAGEL leg. (dans les mousses et callunes d. pineraies) (I. G. 15620).

Nr. 355 - 366, 12 ♀ : Lierre (Inondations), 10.X.1930, A. BALL leg.; *Trichopria ciliaris* KIEFF. (1911) (MANEVAL det. 1936).

Nr. 367, ♀ : Hodister (Belgique), 24.IX.1961, Fauchage prairie, P. DESSART leg.

Nr. 368, ♀ : Uzès (France), 11.VII.1966, Fauchage prairie, P. DES-SART leg.

Nr. 369, ♀ : Moressée/Heure (Belgique), 26.VIII.1966, Fauchage prairie, P. DESSART leg.

Nr. 370 + 371, 2 ♂ : Moressée/Heure (Belgique), 26.VIII.1966, Fauchage prairie, P. DESSART leg.

Nr. 372, ♂ : Tervueren (Belgique), 1.VIII.1962, Fauchage prairie, P. DESSART leg.

Nr. 373, ♂ : Hamois (Belgique), 15.VIII.1967, Fauchage prairie, P. DESSART leg.

13. *T. picicornis* NEES (1834) [= ? *tenuicornis* THOMS. (1858)]

Nr. 378, ♀ : Gand (Belgique), 15.VI.1868, coll. Dr. J. TOSQUINET.

Nr. 379, ♀ : Penant, 31.VII.1947, COOREMAN leg. (sur mousses) (I. G. 15984).

Nr. 380, ♀ : Malines (Belgique), 12.V.1966, Fauchage prairie, P. DESSART leg.

14. *T. ? nigra* NEES (1834)

Nr. 383, ♀ : Lierre (Inondations), 10.X.1930, A. BALL leg. (I. G. 9451).

Nr. 384, ♀ : Mt. St. Pierre [Lixhe : Montagne St-Pierre], 29.VIII.1947, A. COLLART leg. (I. G. 15552).

Nr. 385, ♀ : Wavreille (mousses lâches), 5.XI.1947, N. LELEUP leg.

Nr. 386, ♂ : Breznicze (Polen), 1.IV.1880, coll. DE HORVATH.

Nr. 387, ♂ : (Hoboken/Roelofs; 5.IX.1938), coll. A. CRÈVECOEUR/ Nr. 22333.

Nr. 388, ♂ : (Stockl., 31.VII.1938), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333 : *Idiotypa* sp.

Nr. 389 - 391, 3 ♂ : Tervueren, VII.1927; *Tropidopria* sp., coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.

15. *T. aptera* RUTHE (1859) [= *Diapria suspecta* NEES (1834) sensu THOMS. (1858), *Loxotropa laticeps* KIEFF. (1911), *Loxotropa thomsoni* KIEFF. (1911), *Trichopria brachyptera* (♀) MANEV. (1937), *T. balli* (♂) MANEVAL (1937)]

Nr. 392, ♀ : Thulin, 19.XI.1881, A. DUVILIER leg.

Nr. 393, ♀ : Lierre (Inondations), 10.X.1930, A. BALL leg.; *Trichopria brachyptera* MANEVAL (1937)/TYPE (I. G. 9451). (Lit. : XII/22 (1937), p. 11 à 13, fig. 26).

Nr. 394, ♂ : Lierre (Inondations), 10.X.1930, A. BALL leg.; *Trichopria balli* MANEVAL (1937)/TYPE (I. G. 9451). (Lit. : XIII/22 (1937), p. 13 à 16, fig. 27, 32 à 34); *T. aptera* RUTHE (HELLÉN in litt. 12.I.1965).

16. *T. parvula* NEES (1934) [= *Phaenopria cameroni* KIEFF. (1911), *Pb. minima* MASI (1931), *Pb. ? subimpressa* KIEFF. (1911)]

Nr. 395 + 396, 2 ♀ : Nantes (France), coll. EMERY.

Nr. 397, ♀ : Lierre (Inondations), 10.X.1930, A. BALL leg., *Phaenopria minima* MASI (1931) (MANEVAL det. 1936) (I. G. 9451).

Nr. 398/99, 2 ♀ : Lierre (Inondations), 10.X.1930, A. BALL leg.; *Phaenopria cameroni* KIEFF. (1911) (I. G. 9451).

Nr. 400, ♀ : Mt. St. Pierre, 29.VIII.1947, A. COLLART leg. (I. G. 15552).

Nr. 401, ♀ : Salève (France Hte./Savoyen) (1200 m), J. GHESQUIÈRE leg. (Nr. 10) (I. G. 17726).

Nr. 402, ♀ : Dinant/Neffe, 24.VIII.1946, G. FAGEL leg. (I. G. 15620).

Nr. 403, ♀ : Anvers (Belgique), Fauchage prairie, 14.IX.1967, P. DES-SART leg.

17. *T. tetratoma* KIEFFER (1911)

Nr. 404, ♂ : Mt. Ventoux (France), 15.VI.1965, P. DU MERLE (ex pupe Dipt. indet.); *Trichopria* ? *tetratoma* KIEFF. (1911), A. SUNDHOLM det.

Nr. 405, ♂ : Caussols (France), 4.VIII.1963, P. DU MERLE (ex pupe ? *Sarcophagidae*, Dipt.); *Trichopria* ? *tetratoma* KIEFF. (1911), A. SUNDHOLM det.

Nr. 406/07, 2 ♂ : Col de Ferrier (France), 2.VII.1964, P. DU MERLE (ex pupe *Compsilura concinnata* MEIG., parasit. *Thaumatopoea pityocampa* SCHIFF.).

Nr. 408/09, 2 ♂ : Mt. Ventoux (France), 15.VI.1965, P. DU MERLE (ex pupe Dipt. indet.).

Nr. 410/11, 2 ♀ : vgl. 406/07.

Nr. 412, ♀ : vgl. Nr. 405.

18. *T. (Tetramopria) ? aurocincta* WASMANN (1899)

Nr. 413, ♀ : Le Puy, 2.IV.1936, MANEVAL leg. (avec *Tetramorium caespitum*, Hym. Formicidae) (I. G. 11159) (Präparat fehlt).

2. Gattung : *Lepidopria* KIEFFER (1910/11)19. *L. pedestris* KIEFFER (1911) [= *Solenopsis castanea* KIEFF. (♂) (1911)]

Nr. 414, ? ♀ : Le Puy, 11.V.1935, MANEVAL leg. (bei *Solenopsis fugax* LATR./Hym. Formicidae); *Temnopria serva* (♀) MANEV. (HOLOTYPE/PARATYPE) (I. G. 11159) (Präparat fehlt).

Nr. 415, ♀ : Le Puy, 11.V.1935, MANEVAL leg. (bei *Solenopsis fugax* LATR./Hym. Formic.); *Temnopria serva* (♂) (!) MANEV. (HOLOALLOTYPE/PARATYPE) (I. G. 11159).

3. Gattung : *Viennopria* JANSSON (1953)20. *V. lacustris* (SCHULZ, 1910) [= *Ceratopria lacustris* SCHULZ (1910), *Viennopria priesneri* JANSS. (1953)]

Nr. 416 A, ♀ : LECTOTYPE; See von Overmeire, 26.VII.1907; E. ROUSSEAU leg.; *Ceratopria lacustris* SCHULZ (« ex typis ») (W.A. SCHULZ det.); *Trichopria lacustris* SCHULZ (1910), J. GHESQUIÈRE rév. 1951. — vgl. J.-J. KIEFFER, 1916, p. 110/111.

Nr. 416 B, 417 - 447, 32 ♂ : vgl. Nr. 416 A (COTYPEN).

4. Gattung : *Diapria* LATREILLE (1796)

21. *D. conica* FABRICIUS (1775)

- Nr. 448-451, 4 ♀ : coll. C. WESMAEL; *D. conica* LATR. (1796) (det. C. WESMAEL); *D. conica* FABR. (1775), J. GHESQUIÈRE rév. 1947.
- Nr. 452-458, 7 ♀ : Gand (Belgique), 10.V.1868, coll. Dr. J. TOSQUINET.
- Nr. 459 + 460, 2 ♀ : (S. Andr., VIII.1935 und 20.V.1934); *D. conica* FABR. (MANEVAL det. 1937), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.
- Nr. 461, ♀ : Rixensart, VIII.1927; *Diapria conica* FBR., coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.
- Nr. 462, ♀ : (Berchem./Roelofs), *Diapria* sp., coll. A. CRÈCECOEUR/ Nr. 22333; *Diapria conica* LATR. (G. E. J. NIXON det. 1968).
- Nr. 463, ♀ : (Boitsf., 4.VI.1939), *Diapria conica* FABR., coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.
- Nr. 464, ♀ : (O. Yss., 7.V.1936), *D. conica* FBR. (MANEVAL det. 1937), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.
- Nr. 465, ♀ : (S. Andr., 23.V.1937), *D. conica* FABR. (MANEVAL det. 1937), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.
- Nr. 466 + 467, 2 ♀ : Bruxelles-Uccle, 12.V.1934; *D. conica* FABR. (MANEVAL det. 1937), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.
- Nr. 468, ♀ : (Wesemb., 20.V.1939), *Idiotypa* sp., coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.
- Nr. 469, ♀ : (Sterbk., 1.VI.1941), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.
- Nr. 470, ♀ : (Berchem./Roelofs, 27.IV.1940), coll. A. CRÈVECOEUR/ Nr. 22333.
- Nr. 471, ♀ : Beyne, 1.VII.1941 (Fenêtre), *D. conica* LATR. (GRANGER det.).
- Nr. 472, ♀ : Beyne, 3.VI.1940, *D. conica* LATR. (GRANGER det.).
- Nr. 473-475, 3 ♀ : Beyne, 10.X.1940, 14.VIII und 18.VIII.1941; *D. conica* LATR. (GRANGER det.).
- Nr. 476, ♀ : Weusage, 3.V.1936; *D. conica* LATR. (GRANGER det.).
- Nr. 477-483 und 485-490, 13 ♀ : Beyne, 4.XII.1938, 5.X.1940, 1.VII.1940, 14. und 30.VIII.1941, VIII.1943; *Diapria conica* FABR. (1775) (GRANGER det.); Nr. 480/81 und 487/88 gezogen aus *Eristalis tenax* (*Dipt. Syrphidae*).
- Nr. 484, ♀ : Thun/St. Martin, 25.V.1940; *D. conica* FABR. (GRANGER det.).
- Nr. 491-494, 4 ♀ : Lierre (Inondations), 10.X.1930, A. BALL leg.; *Diapria conica* FABR. (1775) (MANEVAL det.) (I. G. 9451).
- Nr. 495-497, 3 ♀ : Minsk (Weissrussland/UdSSR), coll. WANKOWICZ.
- Nr. 498, ♀ : Breznicze (Polen), 1.IV.1880, coll. DE HORVATH.

- Nr. 499, ♀ : Anvers (Belgique) (riv. gauche), 23.V.1948, G. FAGEL leg. (dans le sable) (I. G. 16012).
- Nr. 500, ♀ : Keerbergen, 13.IV.1947, G. FAGEL leg. (s. les mousses et callunes d. pineraies) (I. G. 15620).
- Nr. 501, ♀ : Wavreille (mousses lâches), 27.VIII.1947, N. LELEUP leg.
- Nr. 502, ♀ : Mantes (France) (S. O.), X.1950, J. GHESQUIÈRE leg. (I. G. 17149).
- Nr. 503, ♀ : Bruxelles-Uccle, 12.IX.1946, J. PASTEEELS leg. (I. G. 15638).
- Nr. 504, ♀ : Bouny, 10.X.1946; *D. conica* LATR. (1796) (G. E. J. NIXON det. 1968) (I. G. 17497).
- Nr. 505 + 506, 2 ♀ : Coxyde, 23.VIII.1946, J. PASTEEELS leg. (s. *Pastinaca*) (I. G. 15638).
- Nr. 507, ♀ : coll. CAMILLE VAN VOIXEM.
- Nr. 508-510, 3 ♀ : Catalogne (Seo de Urgel/España), V.1962, G. FAGEL leg. (I. G. 23163).
- Nr. 511 + 512, 2 ♀ : Mt. St. Pierre, 29.VII. und 25.V.1947, A. COLLART leg. (I. G. 15552).
- Nr. 513, ♂ : (Michels./Wmeerb., 22.VII.1938); *Diapria conica* FBR. (MANEVAL det. 1939), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.
- Nr. 514, ♂ : (Sterrebeek, VIII.1927); *D. conica* FABR. (1775), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.

5. Gattung : Basalys WESTWOOD (1833)

[=*Loxotropa* auct non FÖRST., *Ceratopria* ASHMEAD (1893),
Acidopria KIEFF. (1913)]

22. B. (*Loxotropa*) *stramineipes* KIEFFER (1911)

Nr. 554, ♀ : Hockai (Hautes-Fagnes; dans Sphagnum), 16.IX.1947, N. LELEUP leg.; *Phaenopria sphagni* GHESQUIÈRE (HOLOTYPE).

23. B. (*Loxotropa*) *abruptus* THOMSON (1858) [= *Loxotropa* ? *crassiclava* KIEFF. (1908), *L.* ? *sulcata* KIEFF. (1911)]

Nr. 555, ♀ : Hautes-Fagnes (Moûpas), 15.VIII.1938, A. COLLART leg. (I. G. 11519).

Nr. 556, ♀ : Hautes-Fagnes (Moûpas, sur les plantes basses d'une chênaie), 21.X.1938, A. COLLART leg. (I. G. 11519).

Nr. 557, ♂ : La Hulpe (Belgique) (Buissons), 21.VII.1966, P. DES-SART leg.

Nr. 558, ♂ : Nespeky (ČSL), Fauchage prairie, 2.VIII.1967, P. DES-SART leg.

Nr. 559, ♂ : Anvers (Belgique), Fauchage prairie, 14.IX.1967, P. DES-SART leg.

24. *B. (Loxotropa) cursitans* KIEFFER (1911) [= *Basalys ? luteipes* KIEFF. (1911), *Loxotropa ? ruficornis* THOMS. (1858), *Loxotropa ? suecica* KIEFF. (1911), *Loxotropa ? pedestris* KIEFF. (1907)]

Nr. 560, ♀ : F. Sgns. [Forêt de Soignes], 1.X.1933), coll. A. CRÈVE-COEUR/Nr. 22333.

Nr. 561, ♀ : (Sterbk., 31.V.1932); *Loxotropa ruficornis* THOMS. (1858), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.

Nr. 562, ♀ : Hockai (Hautes-Fagnes), 11.VIII.1939, A. COLLART leg., coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.

Nr. 563, ♂ : (XL jar. [Ixelles, jardin], 7.IX.1947); *Idiotypa* sp. coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.

Nr. 564, ♂ : Wavreille (mousses lâches), 5.XI.1947, N. LELEUP leg.

25. *B. (Loxotropa) tritoma* THOMSON (1858)

Nr. 565, ♀ : Wavreille (mousses lâches), 27.VII.1947, N. LELEUP leg.; *Loxotropa tritoma* THOMS. (1858) (G. E. J. NIXON det. 1968).

Nr. 566, ♂ : Anvers (Belgische), Fauchage prairie, 14.IX.1967, P. DESSART leg.

26. *B. (Basalys) fumipennis* WESTWOOD (1833) [= *Basalys ? thomsoni* KIEFF. (1911), *B. ? erythropus* KIEFF. (1911), *B. ? bipunctatus* KIEFF. (1911)]

Nr. 567, ♀ : Wavreille, 26.VIII.1947, N. LELEUP leg.; *Basalys* sp. (P. DESSART det. 1967) (I. G. 15638).

Nr. 568, ♀ : Nespeky (ČSL), Fauchage prairie, 2.VIII.1967, P. DES-SART leg.

Nr. 569, ♂ : Bruxelles/Watermael-Boitsfort, 1.VIII.1934; *Basalys erythropus* KIEFF. (1911) (MANEVAL det. 1937), coll. A. CRÈVE-COEUR/Nr. 22333.

Nr. 570, ♂ : Groenendaal, 8.VII.1901, coll. Dr. J. TOSQUINET; *Basalys ? bipunctatus* KIEFF. (1911) (P. DESSART det. 1968).

Nr. 571 + 572 : 2 ♂ : Hautes-Fagnes (Duzo-Moûpas), 21.X.1938, A. COLLART leg. (I. G. 11519).

Nr. 573, ♂ : Hautes-Fagnes (Duzo-Moûpas), 5.VIII.1938, A. COLLART leg. (I. G. 11519).

Nr. 574-577, 4 ♂ : Anvers (Belgique), Fauchage prairie, 14.IX.1967, P. DESSART leg.

6. Gattung : *Corynopria* HALIDAY (1857)

[= *Entomopria* KIEFF. (1911), *Monelata* auct. non FÖRST.)]

27. *C. rufipes* KIEFFER (1910)

Nr. 515, ♀ : Sterrebeek, VIII.1927; *Monelata rufipes* KIEFF. (1910), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.

- Nr. 516-523, 8 ♀ : Lierre (Inondations), 10.X.1930, A. BALL leg.
Monelata cincta HAL. (1858) (MANEVAL det. 1936) (I. G. 9451).
 Nr. 524, ♀ : Forêt de Soignes (Tamisage humus), 24.IV.1962, P. DESSART leg.; *Monelata rufipes* KIEFF. (1910) (P. DESSART det. 1962).

28. *C. cincta* HALIDAY (1858)

- Nr. 525 + 526, 2 ♀ : Lierre (Inondations), 10.X.1930, A. BALL leg.;
Monelata cincta HAL. (1858) (MANEVAL det. 1936) (I. G. 9451).
 Nr. 527, ♀ : Moressée/Heure (Belgique), 8.V.1961, Fauchage prairie,
 P. DESSART leg.; *Monelata cincta* HAL. (1858) (P. DESSART det. 1967).

7. Gattung : Entomacis FÖRSTER (1856)

[= *Hemilexis* FÖRST. (1856)]

29. *E. biguttata* KIEFFER (1911)

- Nr. 528, ♀ : Anvers-Berchem/Roelofs, 1.III.1943, coll. A. CRÈVE-COEUR/Nr. 22333.

30. *E. (Hemilexis) perplexa* HALIDAY (1857) [= *E. subtruncata* KIEFF. (1909)]

- Nr. 529 + 530, 2 ♀ : Hockai (Hautes-Fagnes), 21.IV.1939, A. COL-LART leg. (sous écorces humides de vieilles souches d'Épicéas) (I. G. 12190).

8. Gattung : Paramesius WESTWOOD (1832)

31. *P. tenuicornis* THOMSON (1858) [= *Paramesius* ? *angustipennis* KIEFF. (1911), *P.* ? *belytoides* T. A. MARSH. (1867)]

- Nr. 531, ♀ : *Paramesius belytoides* T. A. MARSH. (1867) (MANEVAL det. 1937), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.

32. *P. elongatus* THOMSON (1858) [= ♂ ? *inermis* KIEFF. (1910)]

- Nr. 531, ♀ : *Paramesius belytoides* T. A. MARSH. (1867) (MANEVAL det. 1937), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.

- Nr. 533, ♀ : Minsk (Weissrussland/UdSSR), coll. WANKOWICZ.

- Nr. 534, ♀ : Chambon sur Loire (France), 20.IX.1935, H. MANEVAL leg.; *Paramesius elongatus* THOMS. (1858) (MANEVAL det. 1936) (I. G. 11159).

- Nr. 535, ♀ : Tervueren (Belgique), 8.VII.1947, G. FAGEL leg. (I. G. 15620).

- Nr. 536, ♀ : Nespeky (ČSL), Fauchage prairie, 2.VIII.1967, P. DES-SART leg.
- Nr. 537, ♀ : Duffel, 14.IX.1949, V. HENDRICKX leg. (I. G. 16926).
- Nr. 538, ♀ : Keerbergen (Zeept), 20.X.1949, V. HENDRICKX leg. (I. G. 16981).
- Nr. 539, ♀ : Dinant/Neffe, 24.VIII.1946, G. FAGEL leg. (I. G. 15620).
- Nr. 540, ♂ : Laxford, 20.VII.1936, Dr. GILTAY leg.
- Nr. 541, ♂ : Layoute-sur-Loire (France), 7.VIII.1936, H. MANEVAL leg. *Paramesius elongatus* THOMS. (1858) (MANEVAL det. 1936) (I. G. 11159).
- Nr. 542, ♂ : (Roelofs), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.
- Nr. 543 + 544, 2 ♂ : Tervueren (Belgique), 1.VIII.1962, Fauchage prairie, P. DESSART leg.

33. *P. rufipes* WESTWOOD (1829)

- Nr. 545, ♀ : Breznicze (Polen), 1.IV.1880, coll. DE HORVATH.
- Nr. 546 + 547, 2 ♀ : Minsk (Weissrussland/UdSSR), coll. WANKOWICZ.
- Nr. 548, ♂ : coll. C. WESMAEL/WESTWOOD; *Paramesius rufipes* WESTW. (1829).
- Nr. 549 + 550, 2 ♂ : Loch Maree (Scotland), 27.VII.1936, Dr. GILTAY leg.
- Nr. 551, ♂ : Laxford, 29.VII.1936, Dr. L. GILTAY leg.
- Nr. 552, ♂ : Baraque Fraiture (Tourbière), 26.VIII.1954 (I. G. 21386).
- Nr. 553, ♂ : Bruxelles-Uccle, 12.IX.1946, J. PASTEEELS leg. (I. G. 15638).

9. Gattung : *Spilomicrus* WESTWOOD (1832)

[= *Loxotropa* FÖRST. (1856) non auct., *Eriopria* KIEFF. (1910),
Tritopria KIEFF. (1910), *Scutellipria* SZABO (1961)
(syn. nach. MASNER, 1964)]

Anmerkung : Die Antenne von *Eriopria* KIEFF. (1910) ist zwar 13-gliedrig, doch sollte die Gattung aufgrund von anderen Merkmalen meines Erachtens nicht zu *Spilomicrus* WESTW. gezogen werden.

34. *S. nigripes* THOMSON (1858) [= ? *tripartitus* KIEFF. (1911)]

- Nr. 582, ♂ : Moressé/Haure, Fauchage prairie, 8.V.1967, P. DES-SART leg.; *Spilomicrus* sp. (P. DESSART det. 1967).
- Nr. 583 + 584, 2 ♂ : Tervueren (Belgique), Fauchage prairie, 19.V.1966, P. DESSART leg.; *Spilomirus* sp. (P. DESSART det. 1966).

35. *S. basalyiformis* T. A. MARSHALL (1858)

- Nr. 585, ♀ : (T. Fl./Roelofs, 4.III.1938); *Spilomicrus tripartitus* KIEFF. (1911) (MANEVAL det. 1939), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.

Nr. 586, ♀ : Hautes-Fagnes (Duzo-Moûpas), 17.V.1948, A. COLLART leg. (I. G. 15983).

Nr. 587, ♂ : (Br. l'Alleud., 26.V.1929); *Spilomicrus basalyformis* T.A. MARSH. (1858), coll. A. CRÈVECOEUR/Nr. 22333.

36. *S. compressus* THOMSON (1858)

Nr. 588, ♀ : coll. C. WESMAEL; *Diapria antennata* JURINE (1807) (det. C. WESMAEL).

Nr. 589, ♀ : (nur das Abdomen vorhanden); coll. C. WESMAEL; *Diapria antennata* JUR. (1807) (det. C. WESMAEL); *Spilomicrus compressus* THOMS. (1858), det. J. GHESQUIÈRE 1947.

Anmerkung : Beide Exemplare dieser Art stimmen nicht mit der Type von *Diapria antennata* JUR. (*Psilus antennatus* JUR., 1807 : Nouv. Méth. Hym., p. 310) überein (vgl. auch MASNER, Entomoph., 1964, 9 (1), p. 83).

37. *S. annulicornis* KIEFFER (1911) [= ♂ *autumnalis* KIEFF. (1911)]

Nr. 590 + 591, 2 ♂ : Hodister (Belgique), 24.IX.1960, P. DESSART leg.

Nr. 592, ♂ : Dilbeek, 6.VI.1949; *Idiotypa* sp., coll. A. CRÈVE-COEUR/Nr. 22333.

10. Gattung : *Aneurhynchus* WESTWOOD (1832)

[= *Mythras* BRULLÉ (1846), *Glyptonota* FÖRST. (1856)]

38. *A. gracilicornis* WALL (1971)

Nr. 578, ♂ : Linkebeek, 23.IX.1950, E. JANSSENS leg. (I. G. 17559).

39. *A. crinicornis* WALL (1971)

Nr. 579, ♂ : (Wesemb., 18.V.1939); *Idiotypa* sp., coll. A. CRÈVE-COEUR/Nr. 22333.

40. *A. galesiformis* WESTWOOD (1832)

Nr. 580, ♀ : Visé, 9.IX.1942, coll. J. MULLER; *Aneurhynchus galesiformis* WESTW. (1832) (det. J. MULLER) (I. G. 18717).

11. Gattung : *Psilus* PANZER (1801)

[= *Galesus* CURTIS (1831)]

41. *P. ornatus* RISBEC (1950) (= *P. straeleni* GHESQUIÈRE in litt./TYPE)

Nr. 581, ♀ : Forêt de Kawa (Lac Albert/Ostafrika), 14.IV.1929, A. COLLART leg. (« *Galesus* sp. prope *silvestrii* KIEFF. ») (I. G. 10419).

42. *P. cornutus* PANZER (1801)

- Nr. 593 + 594, 2 ♀ : coll. C. WESMAEL; *Diapria cornata* LATR. (1805) (det. C. WESMAEL); *Galesus cornutus* PANZ. (1801) (det. J. GHESQUIÈRE 1947).
- Nr. 595, ♀ : Hamois (Belgique), Fauchage prairie, 15.VIII.1967, P. DESSART leg.
- Nr. 596-599, 4 ♂ : coll. C. WESMAEL; *Diapria cornata* LATR. (1805) (det. C. WESMAEL).
- Nr. 600, ♂ : coll. C. WESMAEL; *Diapria cornata* LATR. (1805) (det. C. WESMAEL); *Galesus cornutus* PANZ. (1801) (det. J. GHESQUIÈRE 1947).
- Nr. 601, ♂ : Alpes-Maritimes (St. Etienne-Tinée/Lioson-Bercia), 25.VII.1938, G. F. de WITTE leg. (I. G. 11838).
- Nr. 602, ♂ : Mt. St. Pierre, 29.VIII.1947, A. COLLART leg. (I. G. 15552).
- Nr. 603, ♂ : Tervueren (Belgique), Fauchage prairie, 4.VIII.1962, P. DESSART leg.
- Nr. 604, ♂ : Vassbygda (Flåm./Norge), Fauchage prairie, 15.VIII.1965, P. DESSART leg.; *Galesus ? foersteri* KIEFF. (1911) (det. P. DES-SART 1968).
- Nr. 605, ♂ : Insepré, 26.7.1947, J. GRESQUIÈRE leg. (I. G. 15638).
- Nr. 606 + 607, 2 ♂ : Nespeky (ČSL), Fauchage prairie, 2.8.1967, P. DESSART leg.
- Nr. 608, ♂ : coll. C. WESMAEL; *Diapria cornata* LATR. (1805) (det. C. WESMAEL); *Psilus ? caecutiens* T. A. MARSCH. (1867) (det. G. E. J. NIXON 1968).

II. BELYTINAE

12. Gattung : *Pantolyta* FÖRSTER (1856)

[= *Meuselia* KIEFF. (1909), *Opazon* HAL. (1857),
Promeuselia (subgen.) KIEFF. (1910)]

43. *P. parvula* HALIDAY (1857) [= *Opazon incrassatum* THOMS. (1858), *Opazon parvulus* HAL. (1857)]

Nr. 609, ♂ : Zeventoren (Belgique), 12.V.1873, coll. Dr. J. TOSQUINET.

44. *P. subtilis* KIEFFER (1908)

Nr. 610, ♂ : Moressée/Heure (Belgique), 26.VIII.1966, Fauchage prairie, P. DESSART leg.

13. Gattung : *Diphora* FÖRSTER (1856)45. *D. balli* GHESQUIÈRE

Nr. 611, ♂ : Asni (Maroc), 3.-11.VI.1934 (alt. 1200-1300 m), A. BALL leg. (27 M 82).

14. Gattung : *Belyta* JURINE (1807)

[= *Paraclista* (*subgen.*) KIEFF. (1909)]

46. *B. depressa* THOMSON (1858)

Nr. 612-615, 4 ♂ : Mirwart (Bois de Smuid), 27.VIII.1948, R. DELVIGNE leg. (I. G. 16012).

Nr. 616, ♂ : Alpes-Maritimes (Berre les Alpes; alt. 700 m), 1.-2.VIII.1938, G. F. de WITTE leg. (I. G. 11838).

47. *B. quadridens* KIEFFER (1909) [= ? *brachyptera* THOMS. (1858)]

Nr. 617, ♂ : La Hulpe (Belgique), 21.VII.1966, P. DESSART leg.

15. Gattung : *Oxylabis* FÖRSTER (1856)48. *O. bisulca* NEES (1834) [= *maculata* KIEFF. (1907), *punctulata* KIEFF. (1907)]

Nr. 618, ♀ : Moressée/Heure (Belgique), Fauchage prairie, 26.VIII.1966, P. DESSART leg.

49. *O. thomsoni* KIEFFER (1916) [= *Lyteba bisulca* (NEES) THOMS. (1858)]

Nr. 619, ♂ : Moressée/Heure (Belgique), 26.VIII.1966, Fauchage prairie, P. DESSART leg.

16. Gattung : *Pantoclis* FÖRSTER (1856)

[= *Zelotypa* FÖRST. (1856)]

50. *P. ? hirtistilus* KIEFFER (1909)

Nr. 620, ♂ : Pied du Jura, IX.1874, coll. H. TOURNIER.

51. *P. ? trisulcata* KIEFFER (1907)

Nr. 621, ♂ : Alpes-Maritimes (St. Etienne-de-Tinée/Vallée de Vens), 29.VII.1938, G. F. de WITTE leg.

52. *P. ruralis* NIXON (1957)

Nr. 622, ♀ : Moressée/Heure (Belgique), 26.VIII.1966, Fauchage prairie, P. DESSART leg.

17. Gattung : *Zygota* FÖRSTER (1856)
[= *Aclista* FÖRST. (1856) sensu KIEFF.]

53. *Z. spinosipes* KIEFFER (1908)

Nr. 623, ♂ : Moressé/Hure (Belgique), 26.VIII.1966, Fauchage prairie, P. DESSART leg.

54. *Z. fuscata* THOMSON (1858) [= *Aclista lasiorum* KIEFF. (1904)]

Nr. 624, ♂ : France, Hte. Savoie, 27.VII.1949, J. GHESQUIÈRE leg.
(Nr. 10) (I. G. 17726).

55. *Z. fossulata* THOMSON (1858)

Nr. 625, ♂ : Moressé/Hure (Belgique), 26.VIII.1966, Fauchage prairie, P. DESSART leg.

56. *Z. brevipennis* KIEFFER (1908)

Nr. 626, ♀ : Ben-Ahin (Belgique), 18.IV.1949, G. FAGEL leg. (I. G. 15620).

Nr. 627, ♀ : Hodister (Belgique), 24.IX.1961, Fauchage prairie, P. DESSART leg.

18. Gattung : *Aclista* FÖRSTER (1856)

[= *Acoretus* (subgen.) HAL. (1857), *Xenotoma* FÖRST. (1856),
Anectata FÖRST. (1856)]

57. *A. acuta* KIEFFER (1909) [= *Xenotoma (Zelotypa) alticollis acuta* KIEFF. (1916)]

Nr. 628, ♀ : Envir. de Genève, coll. H. TOURNIER.

58. *A. alticollis* THOMSON (1858) [= *Xenotoma (Zelotypa) fallax fallax* (♀) KIEFF. (1909), *X. (Xenotoma) nigra* (♀) KIEFF. (1907), *X. (Xenotoma) cilipes* (♂) KIEFF. (1907)]

Nr. 629 + 630, 2 ♂ : Malines (Belgique), 2.V.1966, Fauchage prairie, P. DESSART leg.

Nr. 631, ♂ : Mirwart (Bois de Smuid), 27.VIII.1948, R. DELVIGNE leg.

59. *A. rufopetiolata* NEES (1834) [= *Xenotoma (Xenotoma) pleuralis* (♀) KIEFF. (1907), *X. (X.) veriscolor versicolor* (♀) KIEFF. (1910), *X. (X.) castaneiventris* (♂) KIEFF. (1907)]

Nr. 632, ♀ : Nespeky (ČSL), Fauchage prairie, 2.VIII.1967, P. DES-SART leg.

Nr. 633, ♀ : Moressée/Heure (Belgique), 26.VIII.1966, P. DESSART leg.

Nr. 634, ♂ : Mirwart (Bois du Marsaut), 27.VIII.1948, R. DELVIGNE leg. (I. G. 16012).

Nr. 635, ♂ : France Hte. Savoie (Salève, 1200 m), 27.VII.1949, J. GHESQUIÈRE leg. (Nr. 10) (I. G. 17726).

60. *A. elevata* THOMSON (1858)

Nr. 636, ♂ : coll. CAMILLE VAN VOIXEM.

Nr. 637, ♂ : Mirwart (Bois de Smuid), 27.VIII.1948, R. DELVIGNE leg. (I. G. 16012).

Nr. 638, ♂ : Moressée/Heure (Belgique), Fauchage prairie, P. DES-SART leg.

19. Gattung : *Cinetus* JURINE (1807)

61. *Cinetus spec.*

Nr. 639, ♂ : Moressée/Heure (Belgique), Fauchage prairie, P. DES-SART leg.

LITERATUR

WALL, I.

1980. Die Diapriinen und Belytinen der Sammlung von Prof. Dr. Hubert Robert DEBAUCHE (1904-1971) (Louvain/Löwen) im Königlich-Belgischen Institut für Naturwissenschaften in Bruxelles (Belgien) (Hymnoptera Proctotrupoidea : Familie Diapriidae) (3. Beitrag zur Kenntnis europäischer Zehrwespen). — *Bull. Inst. r. Sci. nat. Belgique*, 52, Ent., 18, pp. 1-17.

