

SAGRIDÆ (COLEOPTERA CHRYSOMELOIDEA)

PAR

P. JOLIVET (Bruxelles).

Nulle part ailleurs que chez les *Sagra* (sauf peut-être chez les *Timarcha* et les *Syneta*) la notion d'espèce est plus difficile à délimiter. Outre le polymorphisme spécifique incroyable dans des caractères généralement considérés comme ayant une valeur systématique, la nomenclature s'est trouvée encore compliquée du fait que certains auteurs se sont crus obligés de multiplier inconsidérément les espèces ou de créer des noms différents pour le ♂ et la ♀ de la même espèce, évidemment très dissemblables.

Au point de vue biologique ⁽¹⁾, il est très regrettable qu'on ne sache pratiquement rien des *Sagra* africains, alors que les mœurs des espèces indo-malaises sont relativement bien connues. Certaines espèces sont nuisibles aux cultures.

Dans cette liste, nous avons mentionné tous les *Sagra* capturés au Parc National Albert lors de la Mission G. F. DE WITTE (1933-1935). Malheureusement, une partie seulement des espèces existant vraisemblablement dans cette région a été capturée. Au point de vue nomenclature nous avons suivi, autant que possible, celle du récent travail de CROWSON (1946) ⁽²⁾, le dernier en date sur les Sagrides.

⁽¹⁾ On sait cependant que tous les *Sagra* sont gallicoles à l'état larvaire. la femelle provoquant une galle en pondant sur les tiges de divers végétaux. Nous avons ainsi trouvé, attachée aux tarsi postérieurs d'un *Sagra dohrni* BALY, de Rutshuru, une petite galle caractéristique de ces insectes, vraisemblablement ramassée par fauchage avec le *Sagra* en question. De plus, on n'ignore pas que les *Sagra*, malgré leurs énormes fémurs, ont une démarche lente et ne progressent pas occasionnellement par bonds, comme les Halticidés.

⁽²⁾ CROWSON, R. A., 1946, A revision of the genus of the Chrysomelid group *Sagrinx* (Coleoptera) [Trans. R. Ent. Soc. Lond., 97 (4), 75-115].

Genre **SAGRA** FABRICIUS.

Sagra FABRICIUS, Ent. Syst., I, 2, p. 51 (1792).

1. — **Sagra cyanea deyrollei** THOMSON.

Sagra cyanea deyrollei THOMSON, Arch. Ent., II, p. 203 (1858).

1 ex. : R. Tungula, piste Mwenda Katuka, 1.000 m, 12.III.1947 (Coll. J. DE WILDE).

2. — **Sagra tristis** FABRICIUS.

Sagra tristis FABRICIUS, Suppl. Ent. Syst., p. 104 (1798).

24 ex. : Ruwenzori : Mutwanga, 1.000-1.300 m, XI.1936; 7.I.1937; 2.III.1937 (Coll. HACKARS); plaine Semliki, 900-1.400 m, 4.X.1937 (Coll. HACKARS); forêt Semliki, 900-1.200 m, 10.XI.1937 (Coll. HACKARS); Mutsora, 1939 (Coll. HACKARS).

3. — **Sagra dohrni** BALY ⁽³⁾.

Sagra dohrni BALY, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.), V, p. 253 (1860).

7 ex. : Rutshuru, 1.285 m, 15-30.XI.1934; 23-30.X.1934 (Miss. G. F. DE WITTE); Ruwenzori : Mutwanga, 1.000-1.300 m, 2.III.1937 (Coll. HACKARS); forêt Semliki, 900-1.200 m, 10.XI.1937 (Coll. HACKARS); Mutsora, 1939 (Coll. HACKARS).

4. — **Sagra galinieri** LACORDAIRE.

Sagra galinieri LACORDAIRE, Mon. Phyt., I, p. 64 (1845).

4 ex. : W. Ruwenzori, 3.000-4.000 m, III.1937 (Coll. HACKARS); forêt Semliki, 900-1.200 m, 10.XI.1937 (Coll. HACKARS); Mutsora, 1939 (Coll. HACKARS).

⁽³⁾ Il est très vraisemblable que *Sagra murrayi mulleriana* QUEDENFELDT tombe en synonymie avec cette espèce.