

GASTERUPTIONIDÆ (HYMENOPTERA, EVANOIDEA)

PAR

JEAN J. PASTEELS (Bruxelles).

Les récoltes ne contiennent que quatre exemplaires, appartenant à trois espèces.

1. — **Gasteruption tropicale** KIEFFER.

KIEFFER, J. J., 1911, Bull. Soc. H. Nat. Metz, **27**, p. 93, ♀.

1 ♀, Kivu : Kinyamahura (Djomba), 1.300 m, 23.VIII.1934 (G. F. DE WITTE).

(Espèce connue du Congo Belge : Léopoldville, Eala, Kivu, Katanga et de l'Uganda.)

2. — **Gasteruption sjoestedti** KIEFFER.

KIEFFER, J. J., 1904, Ark. zool., **1**, p. 553, ♂ ♀.

(*G. glabroratum* var. *sjoestedti* KIEFFER, 1912; *G. lissocephalum* CAMERON, 1905; *G. subæquale* KIEFFER, 1911; *G. fossatum* BRUES, 1924; *Dolichofœnus subæqualis* KIEFFER.)

2 ♂♂, Kimboho, 925 m, 25.XI.1935 (Mission H. DAMAS).
(Espèce répandue du Cap jusqu'à l'Afrique équatoriale.)

3. — **Gasteruption obconicum** PASTEELS.

PASTEELS, J. J., Expl. Parc National Upemba (sous presse).

1 ♂, Rwindi, 1.000 m, 20 au 24.XI.1934 (G. F. DE WITTE).

(Espèce se rencontrant aussi au Katanga : Parc National de l'Upemba, Élisabethville et en Mozambique.)

