

## XII

# PASSALIDAE (COLEOPTERA)

PAR

C. MOREIRA (Rio de Janeiro)

---

### *Passalus interstitialis* ESCHSCHOLTZ

*P. interstitialis* ESCHSCHOLTZ, Mém. Soc. Nat. Moscou, VII, 1829. Nouv. Mém., I, p. 18;  
W. D. HINCKS et J. R. DIBB, Coleopterorum Catalogus, pars 142. *Passalidae*, p. 58,  
1935, et synonyma.

Le Passalide sujet de cette note a été récolté par M. le Dr W. ADAM, chargé de mission à bord du navire-école belge *Mercator*, à l'Amazone au Brésil, entre Obidos et le canal do Breves, le 12.I.1936. Un seul exemplaire.

Le *P. interstitialis* d'Eschscholtz est une espèce très variable, comme on peut voir par ses synonymes, au nombre de 19.

KUWERT l'a décrit sous 11 noms différents comme espèces distinctes.

C'est une espèce très répandue, du Mexique dans l'Amérique du Nord à l'Argentine dans l'Amérique du Sud.

Le *P. interstitialis* a les tubercules secondaires du bord frontal de la tête bien écartés, le front entre ces tubercules est concave, les rides frontales sont bien saillantes en angle droit, un tiers à peu près de leur longueur est courbe et déprimé.

Le *P. interstitialis* a été trouvé jusqu'à présent : au Mexique, Guatemala, Honduras, Panama, Cuba, Surinam, Pérou; au Brésil dans les états de l'Ama-

zone, de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santa-Catharina; en Bolivie, au Paraguay et en Argentine.

Dimensions de l'exemplaire récolté à l'Amazone au Brésil par M. le D<sup>r</sup> W. ADAM :

Longueur de la tête	...	...	...	...	...	...	...	...	3 mm.
Largeur de la tête	...	...	...	...	...	...	...	...	6 mm.
Longueur du pronotum...	...	...	...	...	...	...	...	...	8 mm.
Largeur du pronotum	...	...	...	...	...	...	...	...	9 mm.
Longueur de chaque élytre...	...	...	...	...	...	...	...	...	16 mm.
Largeur de chaque élytre	...	..	...	...	...	...	...	...	10 mm.
Longueur totale...	...	...	...	...	...	...	...	...	27 mm.

---